



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как минимум о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.


- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



3 3433 00734571 7



Fabricius
QKE

IOH. CHRIST. FABRICII

HIST. NAT. OECONOM. ET CAMERAL. P. P. O.
SOCIET. HAFN. NORW. NAT. CVRIOS. BEROL. LIPS. LVND.
PETR. OECON. TAVR. LOND. HIST. NAT. IENENS.
BOVRD. NEC NON PARIS. AGRICVLT. HIST. NAT.
ET PHILOM. MEMBR.

SYSTEMA ELEVTHERATORVM

SECYNDVM

ORDINES, GENERA, SPECIES

ADIECTIS

SYNONYMIS, LOCIS, OBSERVATIONIBVS,
DESCRIPTIONIBVS.

TOMVS I.



KILIAE

IMPENSIS BIBLIOPOLII ACADEMICI NOVI.

1801.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

NEW

ELEVATHERATA.

Insecta hexapoda, coleoptrata, antennis duabus instructa, saepius alata.

Caput rudimentum cerebri, sensorium commune sensusque proferens, thoraci insertum aut exsertum, interdum in rostrum protractum, antice fronte, supra vertice, subtus gula continet os oculos, aures? antennis.

Os, quo cibum hauriunt, instrumenta praebet cibaria differentia secundum numerum, situm, figuram et proportionem. Sunt vero:

Labrum horizontale, os superne tegens, saepe inflexum, corneum, transuersum aut rotundatum.

Mandibulae transuersales latera oris superne includentes, corneae, validae, saepius dentatae, rarius exsertae aut membranaceae.

Maxillae transuersales, latera oris inferne includentes, corneae, aut membranaceae, videntatae, bifidae aut integrae, palpos anteriores proferentes.

Palpi articulati, sensorii, mobiles quatuor aut sex:

anteriores, si sex; breuiiores, maxillae incumbentes, biarticulati, maxillae dorso adhaerentes;

intermedii aut anteriores, si quatuor; longiores, quadriarticulati, maxillae dorso inserti;

posteriores plerumque breuiiores, triarticulati, ligulae saepius adnati.

Ligula membranacea, saepius bifida, tenera, a labio plerumque omnino distincta, palpigera.

Labium corneum, transuersum, os inferne tegens, articulatione a capitis substantia cornea distincta, ligulam tegens.

Oculi duo globosi, prominuli, oblongi, reniformes, marginales, interdum clypeo immerfi, vt superne inferneque obseruent.

Aures nondum obseruatae sunt, sed ex analogia ad antennarum basin sitas esse, credere fas est.

Anten-

Antennae duae, articulatae: articulis saepe undecim, capiti insertae, figura, situ, proportione distinctae.

Thorax organa circulationis respirationisque continens supra dorso, subtus pectore, sterno diuiso, antice posticeque interdum porrecto aut spinoso.

Scutellum thoraci postice additum ad expansionem alarum, rarius elongatum, rotundatum aut triangulum, elytris connatis omnino nullum.

Abdomen visceribus genitalibusque fetum, segmentis distinctis annulatum porisque lateralibus respirantibus pertusum, supra tergo, subtus ventre, terminatur ano interdum aculeato, exitu communi pro genitura et excrementis.

Artus eleutheratorum sunt *Alae*, *Pedes*.

Alae duae membranaceae, neruosae, hyalinae, complicatae teguntur coleoptris duris corneis, futura in elytra mobilia longitudine abdominis diuisis, rarius abbreviatis aut connatis absque alis.

Pedes sex, thoraci affixi, constant femore saepe fulcro suffulto, tibia, tarso articulado, digito, ungue, at natatorii mutici, compressi, ciliati.

Sexus eleutheratorum duplex:

Mas minor, agilis, generans, viuificans, feminam obruens, deprimens.

Femina

Femina crassior, tardior, interdum aptera, concipiens, ouipara, marem attrahit aut sono aut luce phosphorea.

Generatio ideo aequiuoca, androgyna, hermaphrodita, aut neutra, in eleutheratorum classe omnino nulla.

Ouum summa matris cura loco proprio, idoneo positum, deponit tunicas vnam post alteram, quo mutata structura, Larua, Pupa, Imago, produnt.

Larua maior, aptera, mollis, succosa, hexapoda, vorax, crescens, sterilis, plerumque annua, rarius perennis, infans.

Pupa coarctata, minor, ficcior, durior, sterilis, nuda, quiescens, imaginem similans, adolescens.

Imago declarata, perfecta, agilis, saepius volitans, vorax, annua, generans, ouipara, virilis aetas.

Numerus eleutheratorum stupendus ad determinationem et denominationem specierum systemate certo omnino eget, at hic labor, hoc opus. Animalcula saepius minima, quid ideo mirum, si partes, ex quibus characteres desumuntur, difficilius et oculo tantum armato eruuntur. Multi quidem insectorum ordines naturales crepant; ex omnibus corporis partibus characteres desumentes, at perperam. Vix species, in qua haud vna alteraue pars a reliquis specie-

speciebus eiusdem generis aberrat, ideoque tot fere genera forent, quot insectorum species.

Instrumenta cibaria ideo introduxi. Praestant numero et certitudine characterum, quos praebent, praestant generibus naturalioribus, quae indicant. Figura enim oris eadem eundem victum, eandem oeconomiam, idem genus eandemque certe classem demonstrat. Vidimus eorum praestantiam in mammalium classe, et forte in reliquis omnibus, si rite elaborentur, idem praestarent.

Genera firma certitudinem systematis continent, et characteres naturales eorum sunt custodes. Entomologus verus ideo in hisce enucleandis lege artis et systematis desudabit. Genera adhuc plura conficienda, quae attingere nondum valui, at genus proponere, absque caractere, aut cum caractere vacillante, omnino absurdum. Genera sic multiplicata scientiae nitorem polluunt.

Habitus est convenientia partium omnium specierum inter se. In generibus conficiendis semper occulte consulendus, at nunquam generum characteres intrat, saepius enim fallit. Addidi quidem tyronum causa characteres secundarios ex habitu, at minus valent. Difficillime comparatione omnium specierum eruuntur, saepius fallunt et omnino nil demonstrant. Exempla in systemate nostro haud pauca inveniuntur, me species haud rite examinatas, ex habitu, ad falsa genera, quid? quod ad

ad plura genera retulisse; nec sane miror, nam differens dies differentem affinitatem obseruat. Vnica vbi tantum species, habitus et descriptio idem.

Nomina valent vti nummi, pretio certo, determinato. Optima sunt, quae omnino nil significant. Characterem generis essentialem generico nomine indicare impossibile, nec opus est. Characterem genus distinguimus, nomine appellamus. Character autem accidentalis ex habitu, loco aut colore desumptus vnius speciei, saepius aliis contrarius, ideoque nomine haud exprimendus, sub quo omnes species militant. *Lagria glabra* contradictio in adiecto. Optima sunt breuissima, nec sono inconsueto, rauco aures laudentia. Plurima in primis *Linnaeana*, bene composita sancte seruaui. Quaedam mutauit, partim nescius, ad quodnam genus pertinerent, partim iure meritoque, partim si duo aut plura eidem generi imposita.

Vfus eleutheratorum in oeconomia naturae eximius. Mole quidem parua, at numero stupendo fecunditateque immensa, naturae opus perficiunt. Detondent quotannis vegetabilia, ne luxurient. Penetrant, auferunt immunda, emortua, putrida, languida, vt nitor aulae semper fulgeat. Rodunt, destruunt asseruata, accumulata, vt natura omnia in nouas formas redigat.

Aucto.

Auctores huius classis numerosi, qui impari passu arenam mouent, at omnes scientiam augere tentant.

Scientiae heroes systemata condunt et characteribus generum certis, bene elaboratis firmant. Linné, Geoffroy, Illiger, Latreille, Clairville.

Ichniographi iconibus accuratissimis eleutheratorum figuram exprimunt. Voet, Roessel, Drury, Olivier, Panzer, Creutzer, Schaeffer.

Descriptores eleutheratorum species saepius nimia verbofite describunt. Scopoli, Paykull.

Observatores, oeconomiam et mores eleutheratorum obseruant. Reaumur, Degeer, Swammerdam.

Faunistae eleutherata regionis vnus illustrant. Illiger, Panzer, Paykull.

Monographi vnum alterumue genus elaborant. Clairville, Latreille, Paykull.

Damnandae vero memoriae John Hill et Louis Renard, qui insecta ficta proposuere.

His vtere L. B. vsque dum alii plura meliora
que sistant.

Dab. Kiliae d. 10. April. 1801.

CHARACTERES GENERVM.

* *Antennis rostro corneo elongato infidentibus.*

158. CALANDRA. Mandibula lata, fornicata, truncata. Antennae fractae: claua articulo vltimo spongioso, retractili.
159. RHYNCHAENVUS. Maxilla cylindrica, vnidentata. Antennae fractae: claua triarticulata.
160. LIXVS. Palpi breuiffimi: articulo vltimo subulato. Maxilla breuiffima, cornea, integra. Antennae fractae: claua triarticulata.
161. COSSONVS. Mandibula arcuata. Antennae fractae: claua vniarticulata.
162. CVRCVLIO. Maxilla breuis, cornea, apice dilatata, truncata. Antennae fractae: claua triarticulata.
163. BRENTVS. Rostrum rectum, porrectum, cylindricum. Antennae moniliformes.
156. ATTELAVS. Rostrum elongatum, incuruum. Maxilla bifida. Antennae extrorsum crassiores.
157. RHINOMACER. Palpi quatuor, extrorsum crassiores: articulo vltimo obliquo, truncato. Antennae fetaceae.
154. ANTHRIBVS. Maxilla bifida. Ligula bifida. Antennae articulis rotundatis: vltimis tribus oblongis, crassioribus; vltimo acuto.

155. BRACHYCERVS. Os rostro breui apice incrassato. Antennae breues, extrorsum crassiores.
152. HYLESINVS. Os rostro obsoleto. Antennae fractae claua triarticulata acuminata.

** *Antennis claua lamellata.*

131. LVCANVS. Ligula bifida, penicillata.
133. PASSALVS. Maxilla cornea, arcuata, dentata acuta
132. AESALVS. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla brevissima, apice palpigera.
3. SCARABAEVS. Labium emarginatum: apicibus elongatis palpigeris. Ligula nulla.
2. GEOTRVPES. Labium ovatum, pilosum, integrum corneum.
4. ONITIS. Palpi postici compressi pilosi. Mandibula membranacea. Ligula bifida: laciniis obouatis.
5. COPRIS. Mandibula compressa, membranacea. Ligula bifida: laciniis linearibus intus dentatis.
6. ATEVCHVS. Mandibula brevis, membranacea, rotundata, ciliata. Ligula bifida: laciniis acutis.
7. APHODIVS. Mandibula membranacea, compressa. Labium corneum: lateribus rotundatis, apice palpigerum.
15. TROX. Palpi quatuor, capitati. Maxilla bifida.
8. HEXODON. Palpi antichi subclauati. Maxilla cornea tridentata: dentibus fissis.
127. MELOLONTHA. Maxilla brevis cornea, apice multidentata.
125. TRICHIVS. Palpi quatuor, filiformes. Maxilla bifida

126. CETONIA. Maxilla apice setosa. Ligula coriacea, emarginata, palpos tegens.
149. SINODENDRON. Palpi filiformes. Ligula cornea, filiformis, apice palpigera.
67. DORCATOMA. Palpi inaequales, securiformes. Maxilla bifida.
108. PAVSVS. Palpi quatuor inaequales. Antennae biarticulatae: articulo ultimo maximo.
1. LETHRVS. Mandibula adunco falcata. Antennae clava truncata, tunicata.
- *** *Antennis clava perfoliata.*
150. APATE. Palpi aequales, filiformes. Maxilla unidentata. Ligula membranacea, truncata.
61. MELYRIS. Palpi aequales, filiformes. Maxilla unidentata, acuta. Ligula clauata, emarginata.
172. IPS. Palpi aequales filiformes: articulo ultimo obtuso, truncato. Maxilla bifida. Ligula emarginata.
13. BYRRHVS. Palpi aequales: articulo ultimo obtuso, truncato, subcrassiori. Ligula bifida: laciniis conniuentibus.
164. COLLYDIVM. Palpi aequales clauati. Ligula bifida.
54. TRICHODES. Palpi inaequales: extrorsum subcrassiores. Ligula brevis, emarginata.
63. CORYNETES. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla bifida. Ligula rotundata.
62. DERMESTES. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla bifida. Ligula cornea, obtusa.

171. SCAPHIDIVM. Palpi inaequales, filiformes: articulo ultimo acuto. Maxilla membranacea, bifida.
10. SPHAERIDIVM. Palpi inaequales, filiformes. Ligula quadrata emarginata.
11. ANISOTOMA. Palpi inaequales, filiformes. Ligula brevis, bifida: laciniis rotundatis.
170. TETRATOMA. Palpi inaequales, crassiusculi. Maxilla membranacea, bifida. Ligula brevis, rotundata, integra.
117. COSSYPHVS. Palpi inaequales: anteriores securiformes. Maxilla bifida. Ligula integra.
169. TRITOMA. Palpi antichi securiformes. Ligula emarginata.
88. AEGITHVS. Palpi inaequales: anteriores malleiformes, posteriores capitati.
87. EROTYLVVS. Palpi inaequales: anteriores malleiformes, posteriores filiformes.
89. EVMORPHVS. Palpi inaequales: anteriores filiformes, posteriores capitati.
72. PELTIS. Maxilla unidentata. Ligula apice dilatata, truncata.
70. NECROPHORVS. Ligula cordato-emarginata, crenata.
71. SILPHA. Maxilla unidentata. Ligula dilatata, bifida.
45. HYDROPHILVS. Palpi filiformes. Maxilla bifida. Ligula subemarginata.
176. DIAPERIS. Palpi subfiliformes. Maxilla bifida. Ligula cylindrica, apice palpigera.

46. SPERCHEVS. Palpi sex filiformes. Labium corneum, quadratum.

**** *Antennis claua solida.*

9. HISTER. Maxilla videntata. Labium corneum, cylindricum, integrum.
151. BOSTRICHVS. Maxilla cornea. Labium cylindricum, apice palpigerum.
168. LYCTVS. Palpi breuissimi, filiformes. Maxilla membranacea, bifida.
14. ANTHRENVS. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla linearis, bifida. Labium integrum.
179. STENVS. Palpi inaequales: articulo longiori acuto.
50. ELOPHORVS. Maxilla cornea, apice membranacea. Labium corneum, quadratum, apice palpigerum.
73. NITIDVLA. Palpi filiformes. Maxilla cylindrica, membranacea. Labium cylindricum, integrum, medio palpigerum.
75. COCCINELLA. Palpi antici securiformes, postici filiformes.

***** *Antennis flabelliformibus.*

67. HYPOPHLOEVS. Palpi aequales, clauati. Maxilla membranacea, videntata. Ligula filiformis, medio palpigera.
66. PTILINVS. Palpi subaequales, filiformes. Maxilla bifida. Ligula brevis, subemarginata.

68. MELASIS. Palpi clauati: articulo ultimo ouato. Ligula membranacea, integra.
122. RHIPIPHORVS. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla breuissima, ouata. Ligula acuta.
- ***** *Antennis extrorsum crassioribus.*
145. MEGALOPVS. Palpi aequales, filiformes; articulo ultimo acuto. Maxilla cornea: intus ferrata. Ligula bifida: laciniis approximatis.
28. TROGOSITA. Palpi aequales: articulo ultimo obtuso, truncato. Maxilla videntata. Labium corneum, bifidum: laciniis rotundatis, ciliatis.
165. MYCETOPHAGVS. Palpi inaequales: articulo ultimo obtuso. Labium rotundatum, integrum.
175. VPIS. Palpi inaequales, clauati. Ligula brevis membranacea, emarginata.
166. CATOPS. Palpi inaequales, fubulati. Ligula membranacea, bifida: laciniis breuibus, acutis.
27. TENEBRIO. Palpi inaequales, antichi subclauati, postici filiformes. Maxilla bifida. Labium corneum, integrum.
16. BOLITHOPHAGVS. Palpi inaequales, filiformes. Labium corneum, cordatum, ciliatum.
110. MYLABRIS. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla cornea, bifida. Ligula subemarginata.
51. CLERVS. Palpi inaequales: anteriores filiformes; posteriores securiformes. Ligula bifida: laciniis breuibus, distantibus.

53. **NOTOXVS.** Palpi inaequales, securiformes. Ligula bifida, laciniis conniventibus obtusis.
64. **ANOBIUM.** Palpi aequales, clauati. Maxilla cornea.
83. **HELODES.** Palpi sex inaequales. Labium emarginatum.

***** *Antennis cylindricis.*

102. **HISPA.** Palpi aequales, medio crassiores. Maxilla bifida. Labium integrum.
103. **CVPES.** Palpi aequales: articulo ultimo crassiori, truncato. Ligula brevis, bifida.
99. **SAGRA.** Palpi inaequales, filiformes. Maxilla cornea, videntata. Labium breue, fissum.
69. **PARNVS.** Palpi quatuor clauati: claua orbiculata. Maxilla bifida.
65. **SARROPRIVM.** Palpi filiformes: articulo ultimo obtuso. Maxilla bifida.
72. **IMATIDIUM.** Os apertura orbiculata. Palpi breues, subulati. Maxilla membranacea, videntata.
98. **ALVRNVS.** Palpi sex breuissimi. Maxilla cornea, fornicata.

***** *Antennis moniliformibus.*

18. **ERODIVS.** Palpi aequales, filiformes. Maxilla cornea, bifida. Labium emarginatum.
107. **CEROCOMA.** Palpi aequales, filiformes. Maxilla linearis, integra. Ligula bifida.

148. SPONDYLIS. Palpi aequales, subfiliformes. Maxilla conica, integra. Labium bifidum.
81. CRIOCERIS. Palpi aequales, filiformes. Maxilla bifida. Labium integrum.
178. STAPHYLINVS. Palpi aequales, filiformes. Ligula trifida.
114. CVCVIVS. Palpi aequales: articulo ultimo truncato, crassiori. Ligula brevis, bifida: laciniis linearibus.
129. TRACHYS. Palpi aequales, brevissimi. Maxilla bifida.
19. SCAVRVS. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla unidentata. Labium truncatum, integrum.
95. ZYGIA. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla unidentata. Ligula elongata.
177. MELOE. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla recta bifida. Ligula cylindrica, late emarginata.
85. ENDOMYCHVS. Palpi inaequales: articulo ultimo truncato. Labium elongatum, integrum.
111. HORIA. Maxilla unidentata. Ligula bifida: laciniis linearibus, distantibus.
26. BLAPS. Palpi inaequales, clauati. Maxilla bifida. Ligula fissa.
25. PLATYNOTVS. Palpi inaequales: anteriores articulo ultimo dimidiato. Labium vtrinque unidentatum.
29. HELOPS. Palpi inaequales: anteriores securiformes, posteriores clauati. Labium integrum.
12. CHELONARIVM. Palpi inaequales: anteriores articulo ultimo maiori, ovato. Maxilla bifida.
181. PAEDERVS. Palpi inaequales: anteriores capitati. Ligula cylindrica, integra.

76. CASSIDA. Palpi inaequales: anteriores capitati. Maxilla simplex. Ligula elongata, integra.
17. OPATRYM. Palpi inaequales: anteriores clauati; claua oblique truncata. Labium subemarginatum.
123. MORDELLA. Palpi inaequales: anteriores clauati. Maxilla bifida. Ligula bifida.
180. OXYPORVS. Palpi inaequales: posteriores clauati. Ligula emarginata cum mucrone.
78. CHRYSOMELA. Palpi sex filiformes. Labium integrum.
20. SCARITES. Palpi sex filiformes. Labium corneum, dentatum.

***** *Antennis filiformibus.*

97. APALVS. Palpi aequales, filiformes. Maxilla cornea, vnidentata. Ligula truncata, integra.
32. MANTICORA. Palpi filiformes. Maxilla cornea, acutissima. Labium trifidum.
22. PIMELIA. Palpi filiformes. Maxilla vnidentata. Ligula breuissima, truncata.
49. GYRINVS. Palpi aequales, filiformes. Maxilla vnidentata, acutissima. Labium emarginatum.
116. BRONTES. Palpi aequales, filiformes. Maxilla bifida.
24. AKIS. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla compressa, ciliata. Ligula elongata, cordata.
74. HETERO CERVS. Palpi aequales, filiformes. Maxilla vnidentata. Ligula late emarginata.
101. CRYPTOCEPHALVS. Palpi aequales, filiformes. Maxilla vnidentata. Labium integrum.

153. BRVCHVS. Palpi aequales, filiformes. Maxilla meſo-
branacea, bifida. Ligula brevis, acuminata.
64. PTINVS. Palpi aequales, filiformes. Maxilla bifida.
Ligula bifida.
100. CLYTHRA. Palpi inaequales, filiformes. Mandibul
bifida. Ligula emarginata.
119. OMALYSVS. Palpi extrorſum craſſiores. Maxilla b
fida. Ligula emarginata.
79. ADORIVM. Palpi extrorſum craſſiores. Maxilla b
fida. Ligula rotundata, integra.
141. LYCVS. Os roſtro cylindrico, inflexo. Palpi articul
ultimo craſſiori, truncato.
91. CEBRĪO. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla vn
dentata. Ligula apicē palpigera.
82. LEMA. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla corne
bifida. Ligula rotundata, bifida.
59. MALACHIVS. Palpi inaequales, filiformes: articul
ultimo fetaceo. Ligula rotundata.
128. BVPRESTIS. Palpi filiformes: articulo vltimo obtuſi
truncato. Ligula cylindrica, acuminata.
92. ATOPA. Palpi aequales, filiformes. Ligula bifida
laciniis linearibus, diſtantibus.
93. CISTELA. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla b
fida. Ligula rotundata, integra.
106. DASYTES. Palpi inaequales, filiformes. Maxil
vnidentata. Ligula ſubemarginata.
21. SEPIDIVM. Palpi inaequales, filiformes. Maxil
vnidentata. Labium breue, emarginatum.
146. NECYDALIS. Palpi filiformes. Ligula late emarg
nata.

86. **CYPHON.** Palpi inaequales: posteriores articulo ultimo bifido. Ligula bifida.
120. **PYROCHROA.** Palpi inaequales, subfiliformes. Maxilla integra. Ligula lata, bifida: laciniis aequalibus.
118. **LAMPVRIS.** Palpi inaequales, subclauati. Maxilla bifida. Labium integrum.
23. **EVRYCHORA.** Palpi inaequales, filiformes. Maxilla bifida, truncata. Labium integrum.
58. **CANTHARIS.** Palpi inaequales, securiformes. Maxilla bifida. Ligula integra.
90. **CNODVLON.** Palpi inaequales: anteriores securiformes, posteriores capitati. Ligula rotundata, integra.
130. **ELATER.** Palpi securiformes. Maxilla obtusa. Ligula bifida.
77. **COLASPIS.** Palpi inaequales: anteriores articulo ultimo crassiori, ovato. Ligula brevis, integra.
138. **CALOPVS.** Palpi anteriores clauati, posteriores filiformes. Ligula bifida.
109. **LYTTA.** Palpi inaequales: posteriores clauati. Maxilla bifida. Labium truncatum.
112. **LYMEXYLON.** Palpi anteriores porrecti: articulo penultimo magno: appendiculo ovato, fisco, ultimo ovato acuto.
30. **MELANDRYA.** Palpi inaequales: anteriores porrecti serrati: articulo ultimo ovato, posteriores capitati.
105. **LAGRIA.** Palpi inaequales: anteriores securiformes: posteriores extrorsum crassiores. Ligula integra.

38. TILLVS. Palpi inaequales: posteriores securiformes
Labium integrum.
104. DRYOPS. Palpi inaequales: anteriores securiformes
posteriores filiformes. Ligula late emarginata.
113. DIRCHAEA. Palpi inaequales: anteriores porrecti
articulo ultimo maximo, trilobo.
54. ANTHICVS. Palpi inaequales: anteriores securiformes.
Ligula truncata.
78. EVMOLPVS. Palpi sex inaequales: intermediis arti-
culis duobus ultimis crassioribus, ouatis. Ligula inte-
gra.
34. ANTHIA. Palpi sex: articulo ultimo cylindrico, ob-
tusulo. Labium corneum, porrectum, fornicatum, inte-
grum.
83. GALERVCA. Palpi sex: articulo ultimo acuto. Li-
gula bifida.
115. PYTHO. Palpi sex, extrorsum crassiores. Ligula bre-
uis, quadrata, emarginata.
44. SCOLYTVS. Palpi sex filiformes: articulo ultimo ob-
conico. Maxilla cornea, integra. Ligula acuminata.

***** *Antennis setaceis.*

124. DONACIA. Palpi aequales, filiformes. Maxilla vni-
dentata. Ligula integra.
135. CERAMBYX. Palpi aequales, filiformes: articulo vl-
timo setaceo. Ligula bifida.
134. PRIONVS. Palpi aequales, filiformes. Maxilla cylim-
drica, integra. Ligula breuissima, rotundata.
140. GNOMA. Palpi aequales: articulo ultimo setaceo.
Maxilla bifida. Ligula subemarginata.

141. SAPEPDA. Palpi subaequales, filiformes. Maxilla bifida. Ligula cordata, truncata.
136. LAMIA. Palpi subaequales, filiformes. Maxilla cornea, bifida. Ligula cornea, bifida.
144. LEPTVRA. Palpi inaequales, filiformes: articulo ultimo truncato. Ligula bifida.
147. MOLORCHVS. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla bifida. Ligula bifida.
143. CLYTVS. Palpi breues, extrorsum crassiores. Maxilla bifida. Ligula breuis, truncata, integra.
142. CALLIDIVM. Palpi aequales subclauati. Maxilla bifida. Ligula bifida: laciniis tenuissimis.
139. RHAGIVM. Palpi inaequales, capitati. Maxilla vni-dentata. Ligula bifida: laciniis rotundatis.
138. STENOCORVS. Palpi inaequales: postici clauati.
42. ODACANTHA. Palpi sex filiformes. Maxilla arcuata, spinosa. Labium breue, integrum.
89. AGRA. Palpi sex: intermedii longiores, securiformes.
40. DRYPTA. Palpi sex. Ligula filiformis, angustissime integra.
41. COLLYRIS. Palpi sex.
43. CICINDELA. Palpi sex filiformes: posteriores pilosi, multiarticulati.
33. CARABVS. Palpi sex: articulo ultimo truncato. Ligula truncata. Labium trifidum.
32. CYCHRVS. Palpi sex: articulo ultimo obconico. Maxilla intus ciliato-dentata. Labium bifidum.
34. GALERITA. Palpi sex: articulo ultimo crassiori, oblique truncato. Ligula acuminata, vtrinque seta suffulta.

-
35. TACHYPVS. Palpi sex: articulo vltimo quato, obtuso.
Ligula truncata, tridentata. Labium emarginatum.
36. CALOSOMA. Palpi sex inaequales: anteriores breuissimi, capitati. Labium breue, acuminatum.
44. ELAPHRVS. Palpi sex filiformes. Labium rotundatum, acuminatum, integrum.
47. DYTISCVS. Palpi sex filiformes. Labium truncatum integrum.
-

1. LETHRVS. *Mandibula aduncofalcata.*

*Antennae claua truncata, trisegmentata, 12-seg-
nicata.*

1. **L.** corpore subrotundo nigro. Ent. syst. 1. 1. 1. *cephalotes.*

Lethrus cephalotes. Oliv. Inf. 1. 24. 1. tab. 1. fig. 1.

Lethrus cephalotes. Illig. Fn. Bor. 1. 1. 1.

Bulbocerus cephalotes. Act. Sv. 1781. 246. tab. 5.

fig. 3-12.

Lucanus apterus. Pall. Icon. Inf. 1. tab. A. fig. 1.

Lucanus cephalotes. Pall. Itin. 1. App. 461. 23. III 1.

Lucanus apterus. Laxm. Nov. Comm. Petrop. 14.

59. 4. tab. 24. fig. 1.

Clunipes scarabaeoides. Act. soc. Berol. 6. 347.

tab. 8. fig. 7. 8. *Herbst K. 3. 21. T. 24. f. 9. 10.*

Panz. Fn. Germ. 28. tab. 1. *Sturm Ent. Meiss. 110. 1. Tabl. 1. n*

Habitat in Europae australioris desertis, aridis,

monogamus, fodiens.

Femi-

Lethri corpus subrotundum, gibbum, glabrum, tardum, capite plano longitudine thoracis, mandibulis arcuatis, prominulis intus ferratis, maris subtus dente longissimo, arcuato, clypeo late emarginato, oculis parvis, rotundatis, lateralibus, anteunis capite brevioribus, pone basin mandibularum insertis, thorace gibbo: lateribus deflexis, rotundatis, scutello nullo, elytris coenatis, abdomine longioribus: margine deflexo, linea unica ante marginem carinata, apice inflexa, pedibus brevibus, validis, compressis, tibiis anticis dentatis, posticis ciliatis; tarsis quinque-articulatis, colore nigro aut aeneo.

LETHRYS. GEOTRYPES.

Femina mandibulis crassis exsertis et absque d
te laterali arcuato thoracisque margine mi
dilatato,

aeneus.

a. L. corpore oblongo viridi- aeneo.

Habitat in Norfolk maris pacifici Insula. M
Dom. Banks.

H. m. Lucas.

*Sub Geotrypa
aenea.*

Forte proprii generis. Magnitudo praecedentem
Antennae extrorsum crassiores, breues, nigrae
apice pertusae. Caput viridi-aeneum triang
medio eleuato. Mandibulae magnae, exsert
validae, recuruae, apice truncatae, emargi
tae, intus ferrugineo-hirtae. Maxillae breu
membranaceae, setosae. Labium corneum,
fundatum, integrum. Thorax magnus, aene
subpunctatus margine vtrinque angulo defle
Elytra subrugosa, aenea, nitida, immacula
haud connata. Pedes aenei tibiis latiorib
dentatis.

2. GEOTRYPES.

Palpi quatuor filiformes
Labium pilosum, ouatu
integrum, palpigerum
Antennae clauato - lam
latae.

* *thorace cornuto.*

Hercules.

1. G. thoracis cornu incuruo maximo subtus bar
to vtrinque unidentato, capitis recuruato d
tato. Ent. syst. 1. 2. 1.

Sca

Geotrupae corpus magnum, oblongum, gibbum, immargi
tum, tardum, supra glabrum, subtus pilosum, clypeo
tegente breui, saepius bidentato, maris cornuto, semi
tuberculato, oculis magnis, globosis, vtrinque conspic
margine postico insertis, vtrinque hamo firmatis, anter

Scarabaeus Hercules. Linn. syst. Nat. 2. 541. 1.
 Mus. Lud. Vlr. 3. Tabl. Coleopt. 1. tab. 1.
 fig. 1. 2. Oliv. Inf. 1. 3. 6. tab. 1. fig. 1.
 tab. 23. fig. 1.

Degeer Inf. 4. tab. 18. fig. 9.

Roess. Inf. 2. scarab. 1. tab. A. fig. 1. et 5.

- - - - - tab. 5. fig. 3.

Voet. Inf. 1. tab. 12. fig. 99. 98

Drury Inf. 1. tab. 30. fig. 1. 2.

Scarabaeus scaber scutellatus clypei centro pro-
 minulo, elytris antice scabris. Mant. Inf. 1. 9.
 79. Linn. syst. Nat. 2. 549. 37. Mus. Lud.
 Vlr. 17. femin.

Habitat in America meridionali.

Thoracis cornu longissimum, subtus barbatum,
 antice nudum, emarginatum.

Variat capitis cornu bidentato et tridentato, ely-
 trisque piceis et glaucis nigro-punctatis.

Femina mutica vertice prominulo thorace ely-
 trisque rufo-hirtis, elytris basi scabris lineisque
 tribus elevatis.

♂. *G. thoracis* cornu incuruo subtus barbato vni- *Alcides*
 dentato, capitis recurvato mutico. Ent. syst.
 1. 3. 2.

Scarabaeus Alcides. Oliv. Inf. 1. 3. 7. 2. tab. 1,
 fig. 2.

Habitat in India orientali. Mus. D. Banks.

Differt

breuibus, ante oculos infertis, thorace rotundato, gibbo,
 maris saepius cornuto: marginibus rotundatis, scutello
 rotundato, elytris longitudine abdominis, pedibus breui-
 bus, valldis, femoribus compressis, tibiis dentatis tarsis
 quinque-articulatis, colore nigro aut obscuro. Goetrupae
 in ligno putrescente degunt, Scarabaei in animalium ster-
 core. Ligula omnino nulla.

GEOTRYPES.

Differt a *G. Hercule*, cui affinis magnitudine nore, cornu capitis inermi, thoracis dentibus magis versus basin nec apice emarginato.

Conf. *Scarabaeus Perseus* Oliv. Inf. 1. 3. 8. tab. 1. fig. 3. vix distinctus videtur.

Gideon.

3. *G.* thoracis cornu incuruo maximo apice bifido capitis recurvato bifido supra videntato.

Scarabaeus Gideon. Ent. syst. 1. 4. 3. Lin. syst. Nat. 2. 541. 2. Tabl. Coleopt. 1. tab. fig. 3.

cf. 19.

Roess. Inf. 2. scar. 1. tab. A. fig. 5.

Oliv. Inf. 1. 3. 14. 10. tab. 11. fig. 102.

Edw. Av. tab. 40.

Voet. Scar. tab. 12. fig. 100.

Habitat in India orient.

Femina minor, obscura mutica capite tuberculis subtribus: posteriore minore, thorace subscabro.

Oromedon. 4. *G.* thoracis cornu breui emarginato, capitis recurvato bifido.

Scarabaeus Oromedon. Ent. syst. 1. 4. 4. Tab. Col. 1. tab. 2. fig. 2.

Oliv. Inf. 1. 3. 17. 14. tab. 18. fig. 65.

Voet. Col. tab. 13. fig. 102.

Variet. Gideon.

Aubent. Miscell. tab. 40. fig. 4.

Mig. mag. 1/2

Habitat in India orient.

Femina minor, obscurior, mutica, capite tuberculis duobus thoraceque punctato.

Centaurus. 5. *G.* thoracis cornu incuruo basi bidentato apice bifido, capitis recurvato videntato.

Scarabaeus Centaurus. Ent. syst. 1. 4. 5. Tabl. Col. 1. tab. 2. fig. 1.

Oliv. Inf. 1. 3. 14. 9. tab. 11. fig. 104.

Drury Inf. 1. tab. 36. fig. 1.

Habi

Habitat in India orientali, Africa.

Variat dente capitis cornu obtusissimo et acutiore.

Femina mutica capitis tuberculo magno transverso, emarginato; thoraceque antice scabro.

6. *G. thoracis* cornu incuruo subulato, capitis breui *Gangmedes.*
recuruo.

Habitat in Guinea, Mus. Dom. Lund.

Statura et magnitudo *G. Centauri*. Capitis clypeus brevis, bidentatus, cornu elenato, breui incuruo. Thorax laevis cornu porrecto, incuruo, inermi. Elytra laevia, picea. Tibiae piceae.

Variat capitis thoracisque cornu adhuc triplo brevioribus,

7. *G. thoracis* cornu incuruo basi bidentato apice *Iephta.*
simplici, capitis recurvato unidentato.

Habitat in Guinea. Mus. Dom. de Sehestedt.

Affinis certe *G. Centauro* eiusdemque magnitudinis. Differt in primis thoracis cornu apice simplici. Femora antica unidentata.

8. *G. rufus* thoracis cornu breui incuruo subtus barbato, capitis recurvato subulato. *Aegeon.*

Scarabaeus Aegeon. Ent. syst. 1. 4. 6. Tabl. Col. 1. tab. 1. fig. 4.

Oliv. Inf. 1. 3. 26. tab. 26. fig. 219.

Drury Inf. 2. tab. 30. fig. 5.

Habitat in Indiis.

9. *G. thoracis* cornu incuruo crassissimo apice bifido, capitis longiore bifido. *Chorinaeus*

Scarabaeus Chorinaeus. Ent. syst. 1. 5. 8. Tabl. Col. 1. tab. 2. fig. 5.

Oliv. Inf. 1. 3. 15. 16. tab. 2. fig. 2. 7. 4. 6

Aubert. Miscell. tab. 15. fig. 4.

Voett. Inf. tab. 13. fig. 104.

Habitat in Brasilia. Mus. D. Tunstall.

10. G.

- dichotomus* 10. *G. thoracis cornu bidentato, capitis dichotome, elytris rufis.* Ent. suppl. 9. 9.
Scarabaeus dichotomus. Ent. syst. 1. 5. 9. Linn.
 Mant. 1. 529. Iabl. Coleopt. 1. tab. 2. fig. 6.
 Oliv. Inf. 1. 3. 20. 17. tab. 17. fig. 156.
 Aub. Miscell. tab. 40. fig. 5.
 Voet. Inf. tab. 14. fig. 107.
 Sulz. Hist. Inf. tab. 1. fig. 1.
 Habitat in Indiis.
- claviger.* 11. *G. rufus thoracis cornu elevato, capitis sabulato recurvo.* Ent. suppl. 10. 10.
Scarabaeus claviger. Ent. syst. 1. 6. 10. Linn.
 Mant. 1. 529.
 Oliv. Inf. 1. 3. 20. 18. tab. 5. fig. 40.
 Drury Inf. 3. tab. 48. fig. 3. *Jablonsky. 1. Tab. 2.*
 Voet. Col. tab. 14. fig. 108. *fig. 1.*
 Aubent. Miscell. 1. tab. 40. fig. 1.
 Habitat in Indiis.
- hastatus.* 12. *G. thoracis cornu breui fornicato hastato subtus hirto, capitis recurvo.* Ent. suppl. 10. 11.
Scarabaeus hastatus. Ent. syst. 1. 6. 11. *
 Oliv. Inf. 1. 3. 21. 19. tab. 19. fig. 175.
 Habitat in America meridionali. Mus. Dr. Hunter.
- Enema.* 13. *G. thoracis cornu incurvo simplici basi crassissimo, capitis recurvo bifido.* Ent. suppl. 10. 12.
Scarabaeus Enema. Ent. syst. 1. 6. 12. *
 Oliv. Inf. 1. 3. 22. 20. tab. 12. fig. 114.
 " " " " tab. 17. fig. 157.
 Habitat in India. Mus. Dr. Hunter.
- Pan.* 14. *G. thoracis cornu incurvo basi crassissimo apice bifido, capitis recurvo videntato.* Ent. suppl. 11. 13.
Scarabaeus Pan. Ent. syst. 1. 6. 13. *
 Habitat in Indiis. Dom. Drury. *Ind Annotta*
 Affinis videtur *G. Chorintea* 15. G.

15. *G. thorace prominente bilobo, capitis cornu sim- bilobus,*
 plici, elytris striatis. Ent. suppl. II. 14.
Scarabaeus bilobus. Ent. syst. I. 7. 14. Linn.
 syst. Nat. I. 2. 544. 12. Labl. Col. I. tab. 9.
 fig. 2.
 Oliv. Inf. I. 3. 31. 33. tab. 5. fig. 35.
 - - - - - tab. 23. fig. 35.
 - - - - - tab. 1. fig. 5.
 Edw. Av. tab. 105. fig. 2.
 Voet. Col. tab. 14. fig. 106.
 Aubent. Miscell. tab. 15. fig. 3.
 Habitat in Europa australi. *Brasilia.*
16. *G. thorace eleuato fornicato, capitis cornu elon- Croesus,*
 gato recuruo.
 Habitat in Iaua. Mus. Dom. Lund.
 Magnitudo *G. nasicornis.* Clypeus submarginatus,
 cornu magno compresso, recuruo simplici.
 Thorax retusus dorso valde eleuato, fornicato,
 subrugoso, obtusissimo. Elytra laeua.
17. *G. thorace antice fornicato excauato: cornu Daidalus,*
 breuissimo, capitis cornu plano vtrinque im-
 presso. Ent. suppl. II. 15.
Scarabaeus Daidalus. Ent. syst. I. 7. 15.
 Habitat in India orientali. Mus. D. de Scheffedt.
Femina thorace mutico, capitis cornu breui ap- *fasciina ad*
 ce emarginato et vtrinque videntato. *fr. Diadema Oliv. 2/151.*
 219
18. *G. thorace retuso cornu breui truncato, capite truncatus,*
 mutico. Ent. suppl. II. 16.
Scarabaeus truncatus. Ent. syst. I. 7. 16. Oliv.
 Inf. I. 3. 31. 32. tab. 11. fig. 103.
 Voet. Col. tab. 5. fig. 38.
 Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.
19. *G. thorace antice retuso mucronato, capitis cor- Zoilus,*
 nu breuissimo recuruo. Ent. suppl. II. 17.
Scara-

Scarabaeus Zoilus. Ent. syst. 7. 17. *
 Oliv. Inf. 1. 3. 45. 51. tab. 9. fig. 84.
 Habitat Cajennae. Mus. Dom. Olivier.

Actaeon. 20. *G. glaber* thorace bicorni, capitis cornu unidentato bifido, elytris laevibus. Ent. suppl. 12. 18.

Scarabaeus Actaeon. Ent. syst. 1. 18. Linn. syst. Nat. 2. 541. 3. Mus. Dom. Vlr. 4.

Iabl. Col. 1. tab. 3. fig. 4.

Oliv. Inf. 3. 20. 5. tab. 5. fig. 32.

Aubent. Miscell. tab. 6. fig. 49.

- - - - - tab. 15. fig. 5.

Voet. Col. tab. 16. fig. III. 112.

Roess. Inf. 2. scarab. 1. tab. A. fig. 2.

Habitat in America meridionali.

Variat elytris nigris et glaucis nigromaculatis.

Femina minor, obscura, mutica, capitis vertice prominulo, acuto, clypei margine eleuato apice bidentato, thorace elytrorumque basi inaequalibus.

Simson. 21. *G. thorace* bicorni, capitis cornu apice bifido, clypeo denticulato. Ent. suppl. 12. 20.

Scarabaeus Simson. Ent. syst. 1. 8. 19. Linn. syst. Nat. 2. 542. 4. Mus. Lud. Nr. 5.

Oliv. Inf. 1. 3. 13. 8. tab. 15. fig. 142.

Habitat in Indiis. Mus. Britann.

Elephas. 22. *G. villosus* thorace gibbo bicorni, capitis cornu unidentato apiceque bifido. Ent. suppl. 12. 20.

Scarabaeus Elephas. Ent. syst. 1. 8. 20. *

Oliv. Inf. 1. 3. 11. 6. tab. 15. fig. 138.

Olear. Mus. tab. 16. fig. 2.

Habitat in Guinea. Mus. Britann.

Boas. 23. *G. thorace* retuso excuato bidentato, capitis cornu recuruo simplici. Ent. suppl. 12. 21.

Scara-

Scarabaeus Boas. Ent. syst. 1. 8. 21. *

Oliv. Inf. 1. 3. 35. 38. tab. 4. fig. 24.

Scarabaeus Augias. Ent. syst. 1. 16. 47. *

Oliv. Inf. 1. 3. tab. 24. fig. 212.

Habitat in Africa meridionali.

Femina thorace mutico ciliato antice retuso, vertice eleuato, acuto.

24. *G.* thorace excauato bidentato, capitis cornu *Ianus*.
recuruo intus canaliculato emarginato.

Habitat in Guinea. Mus. Dom. Lund.

Corpus paruum, atrum. Clypeus apice tridentatus. Capitis cornu porrectum, recuruum, scabrum, intus canaliculatum, apice late emarginatum. Thorax laeuis, nitidus, in medio valde excauatus dentibus duobus crassis, eleuatis, obtusiusculis. Elytra striata.

25. *G.* thorace bicorni, capitis cornu recuruo vni-*bicornis*.
dentato, elytris rufis. Ent. suppl. 13. 23.

Scarabaeus bicornis. Ent. syst. 1. 9. 23. * Iabl.

Col. 1. tab. 4. fig. 1.

Leske Anf. Gr. 1. tab. 9. fig. 1.

Aubent. Miscell. tab. 15. fig. 2.

Habitat in America meridionali.

26. *G.* brunneus thorace bicorni; cornubus com-*Orion*.
pressis, capite tricorni: intermedio breuissimo.
Ent. suppl. 13. 24.

Scarabaeus Orion. Ent. syst. 1. 9. 24. *

Oliv. Inf. 1. 3. 47. 52. tab. 4. fig. 30.

- - - - - tab. 5. fig. 30.

Habitat in Senegallia. Mus. Dom. Olivier.

27. *G.* thorace retuso bidentato, capitis cornu breui *bicolor*.
erecto plano.

Voet. Scarab. tab. 20. fig. 31,

Habi-

Habitat in India orientali. D. Daldorff. Mus. D. Lund.

Parnus. Capitis clypeus rotundatus, integer, cornu breui, eleuato, subtus plano. Thorax laeuis, retusus denticulis duobus compressis. Elytra vix friata. Color supra niger subtus brunneus.

Tityus.

28. *G. glaucus* thorace tricorni: lateralibus breuissimis subulatis, medio subtus barbato, capitis recuruo simplici. Ent. suppl. 13. 25.

Scarabaeus Tityus. Ent. syst. 1. 10. 25. Linn.

syst. nat. 2. 542. 5. Am. acad. 6. 391. 1.

Oliv. Inf. 1. 3. 9. 4. tab. 4. fig. 31.

tab. 10. fig. 31.

Iabl. Col. 1. tab. 4. fig. 2.

Voet. Col. tab. 12. fig. 99.

Degeer Inf. 4. tab. 8. fig. 10.

β. *Scarabaeus Marianus.* Ent. syst. 1. 30. 95.

Linn. syst. Nat. 2. 549. 35. Fem.

Aubent. Miscell. 1. tab. 40. fig. 2.

Habitat in America meridionali,

Variat colore nigro griseo maculato et griseo nigro maculato.

Femina mutica capite tuberculo medio clauato.

Atlas.

29. *G. thorace* tricorni: intermedio breuissimo, capitis resuruo intus ferrato. Ent. suppl. 14. 26.

Scarabaeus Atlas. Ent. syst. 1. 10. 26. Linn.

syst. Nat. 2. 542. 6. Mus. Lud. Vlr. 6.

Voet. Col. 1. tab. 15. fig. 109.

Oliv. Inf. 3. tab. 28. fig. 242.

Habitat in America meridionali.

Capitis cornu intus ferratum.

Caucasus.

30. *G. thorace* tricorni: intermedio breuissimo, capitis cornu recuruo intus bidentato.

Iabl.

Iabl. Col. 1. tab. 4. fig. 3.

Voet. Col. 1. tab. 15. fig. 110. } at dentes cornu

Oliv. Inf. 3. tab. 28. fig. 242. b. } capituli defunt.

Habitat in India orientali. Mus. D. de Sehestedt.

Affinis certe G. Atlas at distinctus mihi videtur.

Differt capituli cornu intus haud ferrato, at bidentato: dente posteriore longiore, validiore, acutiusculo. Elytra viridi nitidula.

31. G. thorace excauato tricorni: lateralibus compressis unidentatis, capituli recurvo simplici. *Geryon.*
Ent. suppl. 14. 27.

Scarabaeus Geryon. Ent. syst. 1. 10. 27. ♀

Oliv. Inf. 1. 3. 30. 31. tab. 24. fig. 208.

Iabl. Col. 1. tab. 4. fig. 5.

Drury Inf. 2. tab. 30. fig. 6.

Habitat in Indiis.

32. G. thorace tricorni: intermedio longiori simplici, capite submutico, elytris unistriatis. Ent. *Aloeus.*
suppl. 14. 28.

Scarabaeus Aloeus. Ent. syst. 1. 11. 28. Linn.
syst. Nat. 2. 54. 27. Mus. Lud. Vlr. 7.

Iabl. Col. 1. tab. fig. 3.

Oliv. Inf. 1. 3. 23. 22. tab. 3. fig. 22.

Aubent. Miscell. tab. 15. fig. 7.

Voet. Col. tab. 18. fig. 122. mas.

- - tab. 19. fig. 128, fem.

Roess. Inf. 2. scarab. 1. tab. A. fig. 6.

Habitat in America meridionali.

Femina minor thorace retuso antice dente brevissimo, elytrisque striata unica ad suturam.

- Typhon.* 33. G. thorace tricorni: intermedio emarginato, capitis longiori recuruo basi videntato apice bifido. Ent. suppl. 15. 29.
Scarabaeus Typhon. Ent. syst. 1. 11. 29. *
cf. Hlig. Oliv. Inf. 1. 3. 12. 7. tab. 16. fig. 152.
 Habitat in *Brasilia* Mus. Britann.
- Vulcanus.* 34. G. thorace tricorni: lateralibus breuioribus compressis ante apicem dilatatis, capite mutico, elytris striatopunctatis. Ent. suppl. 15. 30.
Scarabaeus Vulcanus. Ent. syst. 1. 11. 30. *
 Habitat in Infula Guadeloupe Americis.
- Semiramis.* 35. G. thorace tricorni: cornubus breuibus compressis, clypeo reflexo bidentato.
 Habitat in America meridionali. Mus. Dom. Sehestedt.
 Forte potius femina. Caput in medio punctis duobus eleuatis. Thorax rugosus, in medio retusus, cornubus tribus: intermedio breuissimo, obtusissimo, canaliculato. Elytra laeuius striata vnica ad futuram. Subtus hirtus, piceus.
- Antaeus.* 36. G. thorace tricorni: intermedio longiori simplici, capite mutico, elytris laeuissimis. Ent. suppl. 15. 31.
Scarabaeus Antaeus. Ent. syst. 1. 12. 31. *
 Iabl. Col. 1. tab. 5. fig. 4. 5.
 Oliv. Inf. 1. 3. 25. 23. tab. 12. fig. 105. tab. 14. fig. 125.
cf. Hlig. Voet. Col. 1. tab. 17. fig. 115.
 Drury Inf. 1. tab. 34. fig. 24.
 Habitat in America meridionali.
- Syphax.* 37. G. thorace tricorni: intermedio longiori simplici, capite mutico, elytris punctatis. Ent. suppl. 25-32.
Scarabaeus Syphax. Ent. syst. 1. 12. 32. *
 Oliv.

Oliv. Inf. 1. 3. 25. tab. 11. fig. 99.

- - - tab. 22. fig. 99.

- - - tab. 25. fig. 99.

Habitat in America.

38. *G. thorace tricorni*: cornubus aequalibus brevissimis, elytris laevibus. Ent. suppl. 15. 33. *Maimon.*

Scarabaeus Maimon. Ent. syst. 1. 12. 33. *

Oliv. Inf. 1. 3. 29. 30. tab. 11. fig. 101.

Habitat in America. Mus. Dom. Banks.

39. *G. thorace tricorni*: intermedio longiori apice bifido, lateralibus subarcuatis acutis, capite mutico. Ent. suppl. 16. 34. *Titanus.*

Scarabaeus Titanus. Ent. syst. 1. 13. 36. *

Iabl. Col. 1. tab. 6. fig. 3.

Oliv. Inf. 1. 3. 26. 25. tab. 5. fig. 38.

Drury Inf. 1. tab. 36. fig. 3. 4.

Habitat in America.

40. *G. thorace tricorni*: medio longiori emarginato lateralibus obtusis, capite bituberculato. *Aenobarbus.*

Ent. suppl. 16. 35.

Scarabaeus Aenobarbus. Ent. syst. 1. 13. 37. *

Oliv. Inf. 1. 3. 28. tab. 16. fig. 147.

Habitat in America. Mus. Dr. Hunter.

41. *G. thorace prominentia triplici, capitis cornu recurvo, elytris laevibus.* Ent. suppl. 16. 36. *naficornis.*

Scarabaeus naficornis. Ent. syst. 1. 14. 38. Linn.

syst. Nat. 2. 544. 14. Fn. Sv. 378.

Iabl. Col. 1. tab. fig. 4. 5.

Roess. Inf. 2. scarab. 1. tab. 6. ^{fig.}

Oliv. Inf. 1. 3. 37. 41. tab. 3. fig. 19.

Habitat in Europae ramis putrescentibus.

Femina thorace antice retuso et rudimento parvo cornu capitis.

Larva grisea capite, spiraculis pedibusque rufis.

Variet. minor: *Par. Aries Jablowsky, Inf. 3. 42.*
Aurum. Fn. S. 1. 8. 1. Tab. 4

III. 1.
Panz. Fn. Germ. 28. f. 2.

- Sylvanus.* 42. *G. thorace retuso: prominentia triplici: intermedia obsoleta, capitis cornu recuruo. Ent. suppl. 16. 37.*
*Scarabaeus Sylvanus. Ent. syst. 1. 14. 39. **
 Oliv. 1. 3. 29. 29. tab. 12. fig. 107.
 Habitat in Brasilia. Mus. Dom. Banks.
- quadrispinosus.* 43. *G. thorace retuso: prominentia quadruplici, capitis cornu recuruo. Ent. suppl. 16. 38.*
*Scarabaeus spinosus. Ent. syst. 1. 15. 41. **
 Oliv. Inf. 1. 3. 33. 35. tab. 19. fig. 179.
 Habitat Cajennae. Mus. Dr. Hunter.
- Milon.* 44. *G. thorace cornubus quinque: postico longiori incumbente, capitis recuruo ferrato. Ent. suppl. 17. 40.*
*Scarabaeus Milon. Ent. syst. 1. 16. 45. **
 Oliv. Inf. 1. 3. tab. 20. fig. 185.
 Habitat in Brasilia.
- Ajax.* 45. *G. thorace antice foveato quiquedentato, capitis cornu recuruo.*
 Habitat in Insula Iava. Mus. Dom. Bosc.
 Minor *G. nasicorni. Capitis clypeus brevis, tridentatus cornuque medio elevato, recuruo capitis longitudine obtuso. Thorax antice vtrunque retusus vel potius fovea lata dentem anteriorem medii amplectens, compressus, medio prominulo, tridentato: dente intermedio acutiore lateribus carinatis, unidentatis vel potius fere sinuatis, postice laevis, ater, nitidus. Elytra punctatofriata. Corpus nigrum tarsis anticis articulo ultimo incrassato, pollicato vngue valido incuruo.*
 * *Thorace inermi, capite cornuto.*
- Rhinoceros.* 46. *G. thorace retuso subbituberculato, capitis cornu simplici, clypeo bifido, elytris punctatis. Ent. suppl. 17. 41.*
Scar-

Scarabaeus Rhinoceros. Ent. syst. 1. 16. 46.

Linn. syst. Nat. 2. 544. 14. Mus. Lud. Vlr. 10.

Tabl. Col. 1. tab. 9. fig. 5. 6.

Oliv. Inf. 1. 3. 34. 36. tab. 18. fig. 166.

Voet. Col. tab. 18. fig. 117. 118.

Barrel. Icon. tab. 163.

Wulf. Inf. Cap. tab. 2. fig. 18.

Roess. Inf. 2. scar. 1. tab. A. fig. 7.

Petiv. Gazoph. tab. 44. fig. 9.

tab. 100. fig. 3.

Habitat in Asia.

Magnitudine valde variat.

47. *G. thorace inermi antice scabro, capitis cornu Barbarossa recurvo breui.* Ent. suppl. 17. 42. sa.

Scarabaeus Barbarossa. Ent. syst. 1. 17. 48. *

~~Tabl. Col. 1. tab. 9. fig. 7.~~ *Tabl. 2. 79. 66. 7. 9. 7.*

Oliv. Inf. 1. 3. 32. 34. tab. 12. fig. 109. *Voet Col. 1. 7. 19. f. 127.*

Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

48. *G. thorace antice retuso, capitis cornu recuruo Scentor breui, clypeo bidentato.*

Habitat in Isle de France. Mus. D. Billardiere.

Maior *G. Iamaicensis*. Caput paruum clypeo antice dentibus duobus validis cornuque medio, capite breuiori, obtuso, recuruo. Thorax laeuis, glaber, nitidus, antice retusus. Elytra picea, striata, subrugosa. Corpus atrum pedibus piceis.

49. *G. thorace inermi antice truncato, capitis cornu Satyrus recuruo capite longiori.* Ent. suppl. 18. 43.

Scarabaeus Satyrus. Ent. syst. 1. 17. 49. *

Oliv. Inf. 1. 3. 39. tab. 11. fig. 94. *Sc. Iamaicensis. Tabl. 6.*

Drury Inf. 1. tab. 34. fig. 1. 2. *2. Tab. 9. f. 8. 9.*

Habitat in America boreali. Mus. Dom. Banks.

Femina clypeo tuberculato, thorace plano.

Jamaicensis. 50. G. thorace inermi antice retuso, capitis cornu recuruo, elytris striatis. Ent. suppl. 18. 44.
Scarabaeus Jamaicensis. Ent. syst. 1. 17. 50.
 Oliv. Inf. 1. 3. 40. 44. tab. 16. fig. 148.
 Habitat in Jamaica.
 Femina mutica.

Silenus. 51. G. thorace inermi antice excavato, capitis cornu recuruo, elytris laevissimis. Ent. suppl. 18. 45.
Scarabaeus Silenus. Ent. syst. 1. 18. 51. *
 Oliv. Inf. 1. 3. 41. 45. tab. 8. fig. 62.
 Scop. Del. Fl. et Fn. Inf. 1. tab. 21. fig. 61.
 Ross. Fn. Etrusc. 1. 3. 8.
 Barrel. Plant. Hisp. tab. 163.
~~Tabl. Col. 1. tab. 10. fig. 2.~~
 Habitat in Europa australiori.
 Variat minor elytris sublaevibus.

Syrichthus. 52. G. thorace inermi rotundato, capitis cornu recuruo. Ent. suppl. 19. 47.
Scarabaeus Syrichthus. Ent. syst. 1. 18. 52. *
 Oliv. Inf. 1. 3. 50. 57. tab. 6. fig. 48.
 - - - - - tab. 20. fig. 48.
 Tabl. Col. 2. tab. 11. fig. 4. *Spinifer*
 Voet. Col. tab. 20. fig. 138.
 Habitat in America. Mus. Dom. Banks.

Hylax. 53. G. thorace inermi, capitis cornu emarginato, tibialis posticis brevissimis apice spinosis. Entom. suppl. 19. 43.
Scarabaeus Hylax. Ent. syst. 1. 19. 54. *
 Oliv. Inf. 1. 3. 50. 58. tab. 11. fig. 95.
 Habitat in Africa. Mus. Dom. Lee.
 Forte potius Trichius. Scutellum triangulum,

54. *G. thorace inermi rotundato, capitis cornu Aries.*
breuissimo subulato, corpore subtus rufo-pi-
loso. Ent. suppl. 19. 49.

Scarabaeus Aries. Ent. syst. 1. 19. 55. *

~~Iabl. Col. 1. tab. 10. fig. 3.~~

Habitat ad Cap. B. Spei. Dom. Vahl.

55. *G. thorace inermi rotundato, capitis tuberculo Monodon.*
lo eleuato subcornuto, corpore subtus nudo.
Ent. suppl. 19. 50.

Scarabaeus Monodon. Ent. syst. 1. 20. 57. *

Iabl. Col. 2. tab. 17. fig. 4. *Scar. Idiota*

Habitat in Hungaria. Dom. Smidt. *Atlas lesus l. punctati*

G. Ariete minor.

Sturm Handb. 1. 16. 4 21. f. B.

50. *G. thorace inermi, capitis clypeo postice emarginato.*
coronatus. Ent. suppl. 20. 51.

Scarabaeus coronatus. Ent. syst. 1. 20. 50. *

Oliv. Inf. 1. 3. 52. 61. tab. 12. fig. 110.

Habitat in Iava. Mus. Dom. Banks.

57. *G. thorace inermi excavato, capitis cornu recuruo depresso apice crassiori.*
Dionysius. Ent. suppl. 20. 52.

Scarabaeus Dionysius. Ent. syst. 1. 20. 59. *

Habitat Tranquebariae. Mus. Dom. Lund.

58. *G. thorace inermi antice inaequali, capitis cornu breuissimo truncato, elytris striatis.*
Meliboeus. Ent. suppl. 20. 52.

Scarabaeus Meliboeus. Ent. syst. 1. 20. 60. *

Habitat in America boreali. Dom. Lee.

59. *G. depressus thorace fossula excavato, capite tricuspidate,*
Didymus. elytris striatis. Ent. suppl. 20. 54.

Scarabaeus Didymus. Ent. syst. 1. 20. 61.

Linn. syst. Nat. 2. 545. 19. Mus. Lud. Vlr.

14.

B

Oliv.

- Oliv. Inf. 1. 3. 42. 46. tab. 2. fig. 9.
 Petiv. Gazoph. tab. 27. fig. 7.
 Drury Inf. tab. 32. fig. 3.
 Iabl. Col. 1. tab. 11. fig. 2.
 Voet. Scarab. tab. 19. fig. 126.
 Habitat in America.
 Alter sexus in antico thoracis margine, mucrone
 paruo eleuato armatus.
- valgus.* 60. *G. depressus* thorace fulcato mucronato, capite
 cornubus duobus breuibus. Ent. suppl. 20. 55.
Scarabæus valgus. Ent. syst. 1. 21. 62. Linn.
~~Syst. Nat. 2. 546. 20. Mus. Dom. Vir. 15.~~
 Oliv. Inf. 1. 3. tab. 17. fig. 160.
 Petiv. Gazoph. tab. 27. fig. 8.
 Habitat Cajennae.
 Affinis praecedenti, at minor.
- depressus.* 61. *G. thorace punctato*, capite bituberculato cly-
 peoque acuminato reflexo.
 Habitat in America meridionali. Mus. Dom. de
 Seheftedt.
 Magnitudo et statura depressa *G. valgi*. Caput
 tuberculis duobus eleuatis in medio, clypeoque
 acuminato, reflexo. Thorax depressus, pun-
 ctatus, in medio subcanaliculatus. Elytra ful-
 cata fulcis punctatis. Corpus atrum.
- hircus.* 62. *G. thorace inermi scabro*, capite linea transuer-
 sa carinata, clypeo bidentato. Ent. suppl. 21.
 56.
Scarabæus hircus. Ent. syst. 1. 21. 63.*
 Iabl. Col. 2. tab. 10. fig. 5.
 Habitat Tranquebariae. Dr. Koenig.
- punctatus.* 63. *G. thorace inermi punctato*, capitís clypeo in-
 tegro: dentibus duobus eleuatis obtusis. Ent.
 suppl. 21. 57.

Scarabaeus punctatus. Ent. syst. 1. 21. 64. *

Roff. Fn. Etrusc. 9. 19. tab. 1. fig. 1.

Oliv. Inf. 1. 3. 52. 60. tab. 8. fig. 70.

Iabl. Col. 2. tab. 17. fig. 6.

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

add. sex Monodon.
Harnis Amide 1. 15. 3. 2. 1. 1. 1.

64. *G. brunneus* capite subbicorni, elytris puncta-
to-striatis apice nigris. Ent. suppl. 21. 58.

Scarabaeus farctus. Ent. syst. 1. 22. 65. *

Scarabaeus Cephus. Oliv. Inf. 1. 3. 68. 76.
tab. 11. fig. 96.

Voet. Col. 10. fig. 92. *Ein Scarabaeus*

Habitat in Pennsylvania.

Forte potius *Scarabaeus*, mihi haud rite notus.

65. *G. thorace* retuso, capitis cornu breui plano,
femoribus posticis incrassatis. Ent. suppl. 21.
59.

Scarabaeus retusus. Ent. syst. 1. 22. 66. *

Oliv. Inf. 1. 3. 46. 55. tab. 11. fig. 100.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Dom. Banks.

66. *G. piceus* thorace inermi glabro, capite bicor-
ni, elytris striatis. Ent. suppl. 21. 60.

Scarabaeus piceus. Ent. syst. 1. 22. 67. *

Oliv. Inf. 1. 3. 52. 63. tab. 24. fig. 211.

Iabl. Col. 1. tab. 11. fig. 3.

Eyes! Col. 1. 4. 6. tab. 19. fig. 1. | *Waldt Archiv*

Habitat in Indiis. Dom. Drury.

*** *Mutici capite thoraceque inermi*.

67. *G. muticus* thorace retuso mucronato, clypeo
reflexo integro. Ent. suppl. 22. 61.

Scarabaeus excauatus. Ent. syst. 1. 31. 100. *

Scarabaeus Candidae. Petagna Spec. Cal. vlt. 3.
9. tab. 1. fig. 6.

Cyrill. Neap. Ent. 1. tab. 1. fig. 12.

Melolontha cornuta. Oliv. Inf. 1. 5. 20. 16.
tab. 9. fig. 74.

Habitat in regno Neapolitano. Mus. D. de Schlabusch.

dentatus. 68. *G. muticus punctatus clypeo multidentato.*

Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff.

Statura *G. Talpae*, at maior. Capitis clypeus muticus tuberculis duobus paruis approximatis eleuatis, apice sexdentatus dentibus duobus lateralibus maioribus connatis. Thorax et elytra punctata, fusca. Pedis sub unguibus setae longitudine unguulorum, apice emarginata.

Talpa. 69. *G. muticus thorace antice mucronato, capite clypeo reflexo, elytris striis suturali.* Ent. suppl. 22. 62.

Scarabaeus Talpa. Ent. syst. 1. 32. 101.

Habitat in Insula Bartholomaei Indiae occidentalis. Dom. de Paykull.

Affinis certe *G. Iuuenco*, at triplo minor. Clypeus rugosus, reflexus, integer. Thorax antice rugosus niger, nitidus, antice mucrone paruo, eleuato, crasso. Elytra sublaeuia, striis vnicis ad suturam, nigra. Corpus hirtum, piceum.

Femina minor thorace antice subretuso: mucrone minutissimo.

cuniculus. 70. *G. muticus thorace punctato submucronato, capitis clypeo bidentato, elytris striatis.*

Habitat in America.

Duplo minor *G. Talpa* et omnino distinctus. Capitis clypeus stria media eleuata apiceque reflexus, bidentatus. Thorax vage punctatus, nitidus puncto antico impresso, et ante hoc punctum mucro paruus, eleuatus. Elytra striata. Corpus hirtum, piceum.

Iuuenus. 71. *G. muticus thorace antice impresso mucronato, clypeo subemarginato.* Ent. suppl. 22. 63.

Scu-

Scarabæus juvenis. Ent. syst. I. 32. 102. *

Oliv. Inf. I. 3. 45. 50. tab. 16. fig. 143.

- - - - - tab. 8. fig. 66.

Habitat in America. Mus. Dom. Banks.

72. *G. muticus rufus*, capite thoraceque linea ca-
rinata eleuata.

Scarabæus veter. Ent. syst. I. 33. 104. *

Habitat in India orientali. Dom. Vahl.

73. *G. muticus ater* thorace punctato, elytris stria-
laboratoris, clypeo emarginato.

Scarabæus laborator. Ent. syst. I. 33. 105. *

Oliv. Inf. I. 3. 53. 62. tab. 14. fig. 132.

Habitat in stercore bouino Brasiliae. Mus. D. Banks.

Forte potius *Scarabæus* mihi haud examinatus.

74. *G. muticus ater* thorace punctato, elytris stria-
moratoris, clypeo reflexo integro.

Scarabæus morator. Ent. suppl. 24. 104. *

Habitat in India orientali. Dom. Hybner.

75. *G. muticus niger* thorace laeui, elytris puncta-
to-friatis.

Scarabæus arator. Ent. syst. I. 33. 106. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. *Ein Scarab. v. Mus. N. D. 2127*

76. *G. muticus* thorace elytrisque punctatis ob-
globatoris scure nigris.

Scarabæus globator. Ent. syst. I. 33. 107. *

Melolontha globator. Oliv. Inf. I. 5. 40. 49.
tab. 6. fig. 60.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks: *Pure Melolontha*
An potius *Melolontha*?

3. SCARABAEVS. *Palpi* quatuor filiforme
Mandibula cornea, arcu-
 ta, acuta.
Labium late emargin-
 tum.
Antennae clauato-lame-
 latae.

* *Thorace cornuto.*

- dispar.* 1. S. thoracis cornu subulato protenso, capitis f-
 bulato subrecuruo, scutello cordato. Ent. sy-
 1. 5. 7.

Geotrupes dispar. Ent. suppl. 9. 7.

Oliv. Inf. 1. 3. 58. 64. tab. 3. fig. 20.

Pall. Icon. Inf. 1. tab. A. fig. 3. A. B.

Roff. Fn. Etr. 1. 4. 6.

Iabl. Col. 1. tab. 2. fig. 3. 4.

Habitat in regionibus Rossiae australioribus. Mu-

D. Banks. *Italia. Lusitania.*

Mas capitis thoracisque cornu subulato. *Femur*
 capitis medio antico denticulis duobus erect
 acutis, thorace antice dentibus duobus eleu-
 tis, prominulis.

- Coryphae-* 2. Sc. thorace bicorni, corpore ferrugineo. En-
us. syst. 1. 9. 22. *

Geotrupes Coryphaeus. Ent. suppl. 13. 22.

Oli

Scarabaei corpus rotundatum, brevis, gibbum, immargin-
 tum, glabrum, tardum, capitis clypeo brevi, rotundato
 integro; oculis vtrinque pertuso rotundatis, in med-
 saepius prominulo, rarius cornuto; antennis longitudi-
 capitis, sub clypeo insertis, thorace rotundato, laevi ma-
 ginibus deflexis, rarius cornuto; scutello rotundato; el-
 tris longitudine abdominis, cingentibus, rigidis; pedib-
 brevibus validis, femoribus compressis, tibiis omnibus de-
 tatis, tarsis quinquearticulatis; colore nigro aut obscur

Oliv. Inf. I. 3. 61. 68. tab. 16. fig. 150.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Dom. Lee.

3. Sc. thorace tricorni: intermedio minori, latera- Typhoeus.
libus porrectis longitudine capitis mutici. Ent.

fyft. I. 12. 34. Linn. fyft. Nat. 2. 543. 9.

Muf. Lud. Vlr. 8.

Geoff. Inf. I. 72. tab. I. fig. 3.

Iabl. Col. I. tab. 6. fig. I. 2.

J. I.

Oliv. Inf. I. 3. 59. 68. tab. 7. fig. 52.

Voet. Col. tab. 19. fig. 124. 125. *Kaf. Br. 1.9.1.*

Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 5. *Sturm Handb. Th. 1. 161.*

Frisch. Inf. 4. tab. 10. fig. 8.

Schaeff. Icon. tab. 26. fig. 4.

Habitat sub stercore ouino, cuniculos in terra pro-
fundos fodiens nidulansque.

Variat cornubus capite aequalibus et duplo lon-
gioribus.

Femina minor, thorace antice vtrinque denticulis
duobus, lineaque media transuersa eleuatis.

4. Sc. thorace tricorni: intermedio breuissimo, ely- *Momusi*
tris breuibus. Ent. fyft. I. 13. 35. * Oliv. 1. 260. T. 17. f. 159
Habitat in India orientali. Dom. Lee. *Lusitania*

5. Sc. thorace trituberculato, capitis cornu breui *Lazarus*
emarginato. Ent. fyft. I. 14. 40. *

Oliv. Inf. I. 3. 63. 70. tab. 16. fig. 146.

Habitat in America boreali. Dom. Yeats.

Varietas maior clypeo cornubus duobus breuibus
emarginatis vno pone alterum vix distincta in
Museo Dom. Bosc.

6. Sc. thorace quadridentato, capitis cornu eleuato *quadri-*
simplici, corpore ferrugineo. Ent. fyft. I. 15. *dens.*

42. * *quadridentatus*

Oliv. Inf. II. 3. 62. 69. tab. 12. fig. 108. fem. *I. I.*

~~Panz. Beytr. Inf. Gesch. I. Sturm Th. 1. 14. 2~~

Habi-

Habitat in India orientali. Mus. D. Banks.

Femina vix minor, thorace antice linea eleuata, tranuerfa, acuta abbreviata, capitis vertice prominulo.

mobilicornis. 7. Sc. thorace quadridentato, capitis cornu recuruo mobili. Ent. syst. 1. 15. 43.

Scarabaeus armiger. Laichart. 1. 18. 11. tab. 1. fig. 11.

I. i. Oliv. Inf. 1. 3. 63. 71. tab. 10. fig. 88. mas, tab. 25. fig. 88. fem.

Iabl. Col. 1. tab. 68. fig. 6. 7.

Habitat in Germania, Anglia.

Femina vix minor, thorace subinermi capiteque tuberculo vnico.

varietas eius est
S. testaceus

Cyclops. 8. Sc. thorace quadricorni: cornubus lateralibus maioribus, capite bidentato, corpore ferrugineo. Ent. syst. 1. 15. 44.

Geotrupes Cyclops. Ent. suppl. 17. 39.

Oliv. Inf. 1. 3. 60. 67. tab. 15. fig. 140.

Habitat in Indiis. Mus. D. Lee.

** *Mutici thorace inermi*.

longimanus. 9. Sc. muticus, pedibus anticis arcuatis longissimis. Ent. syst. 1. 30. 96. Linn. syst. Nat. 2. 549. 39. Mus. Lud. Vlr. 18.

Oliv. Inf. 1. 3. 48. 55. tab. 4. fig. 27.

Iabl. Col. 2. tab. 17. fig. 1.

Aubent. Miscell. tab. 41. fig. 1.

Voet, Scarab. tab. 11. fig. 197.

Habitat in Indiis.

stercorarius. 10. Sc. muticus ater, clypeo rhombeo: vertice prominulo, elytris fulcatis. Ent. syst. 1. 30. 97. Linn. syst. Nat. 2. 541. 32. Fn. Sv. 388.

Geoff. 1. 75. 9. Iabl. 2. 7. 7

Oliv. Inf. 1. 3. 54. 72. tab. 5. fig. 39.

Sturm Handb. 1. 83. 37. T. 2

— Fa. G. 1. 21. 4 T. 11.

Panz.

Panz. Fn. Germ. ~~tab. 23.~~ 49. f. 1.

Schaeff. Icon. tab. 5. fig. 1. ~~tab. 13. f. 1.~~ 7. 23. f. 9. *N. 1.*

Voet. Scarab. tab. 20. fig. 134.

Habitat in Europa sub stercore fodiens.

Vesperi circumuolitat magno cum susurro serenum diem annuntians. Infestatur Acaris, Ichneumone.

Alium simillimum ad subtus aeneum nitidissimum ex Italia Dr. Allioni, at vix differt.

Variat rarissime elytris brunneis.

11. Sc. hemisphaericus clypeo rhombeo: vertice syluaticus, prominulo, elytris striatis: striis subrugosis.

Scarabaeus syluaticus. Illig. Fn. Bor. 1. 9. 3.

Habitat in Germaniae Boletis. Dom. Meyerlee.

Medius inter Sc. stercorarium et vernalem; subtus cyaneus, nitidus, supra niger. Thorax punctis paucis sparsis impressus. *Suon. Fn. S. 1. 29. 5*

N. 1.

12. Sc. muticus, elytris glabris laeuissimis, clypeo vernalis,

rhombeo: vertice prominulo. Ent. syst. 1.

31. 98. Linn. syst. Nat. 2. 541. 83. Fn. Sv. 389.

Geoff. Inf. 1. 77. 10.

Voet. Scarab. tab. 20. fig. 135.

Oliv. Inf. 1. 3. 66. 74. tab. 42. fig. 15. *N. 1.*

Herbst. Col. 2. tab. 18. fig. 1. *Suon. Fn. S. 1. 75. 6*

Habitat in Europae stercore, Moschum spirans.

A. Lanio Collurione et Excubitore aculeis Pruni spinosae affigitur.

13. Sc. muticus laeuissimus opacus, thorace longi-laeuigatus tudine elytrorum. Ent. suppl. 25. 98. *

Scarabaeus hemisphaericus. Oliv. 1. 3. 66.

75. tab. 2. fig. 15. *Suon. Handb. 1. 66. 59. 7. 2.*

Habitat in Tangier. D. Schousboe, Mus. Dom.

Sehestedt. *Lusitania*

Liburnium frequens. 1816

- ~~cordatus~~ 14. *Sc. muticus ater*, thorace antice cordato-impref-
so mucronato, capite bituberculato. Ent. fyft.
I. 31. 99. *
Habitat in Infula Guadeloupe. Mus. Dom. Lund.
- ~~Splendidus~~ 15. *Sc. muticus viridi-nitens*, elytris striatis. Ent.
fyft. I. 32. 103. *
Oliy. Inf. I. 3. 67. 75. tab. 14. fig. 126.
Habitat in America. Dom. Drury.
- ~~Blackbur-~~ 16. *Sc. muticus*, thorace nigro-aeneo, elytris stria-
nis. Ent. fyft. I. 35. 113. *
Habitat in America. Mus. D. Blackburn.
Statura omnino *Sc. vernalis*, at duplo fere minor.
- ~~testaceus~~ 17. *Sc. muticus*, capite bituberculato, elytris pun-
ctato-striatis. Ent. fyft. I. 27. 83.
varietas Spar-
bnei mobilicornis Oliv. Inf. I. 3. 69. 77. tab. 17. fig. 138.
Iabl. Col. I. tab. 12. fig. 3. *Silvan. Fr. S. 1. 20. 5*
Habitat in Anglia. Dom. Lee. *tab. 6*
III. 2 Forte varietas *Sc. mobilicornis* feminae.

4. ONITIS. *Palpi* postici compressi pilosi.
Mandibula compressa, membrana-
cea.
Ligula bifida: laciniis obouatis,
palpigeris.
Labium emarginatum.
Antennae clauato-lamellatae.

* *Scutellati*.

- Inuus*. 1. *O. scutellatus*, capite quadrituberculato, corpore
viridi-aeneo. Ent. suppl. 25. 1.

Sca-

Onitia corpus medium, depressum, planiusculum, immargina-
tum, tardum; ore hirto, clypeo porrecto, rotundato, inte-
gro,

Scarabaeus Inuus. Ent. syst. 1. 22. 68. *
 Oliv. Inf. 1. 3. 138. 165. tab. 14. fig. 135.
~~Jabl. Col. 2. tab. 11. fig. 4.~~
 Habitat in Sierra Leon. Africae.

1. *O. scutellatus*, capite tuberculato, elytris testaceis. Ent. suppl. 25. 2. *Aygulus*.

Scarabaeus Aygulus. Ent. syst. 1. 23. 68. *
 Oliv. Inf. 1. 3. 136. 164. tab. 13. fig. 120.
 - - - - - tab. 4. fig. 28.

Voet. Col. tab. 28. fig. 42. *Jabl. K 7. t. 2. f. 5. S. Inuus*
 Habitat in India. Mus. Dom. Banks.

3. *O. scutellatus*, thorace vtrinque dilatato, elytris cinereo fuscoque variis. Ent. suppl. 26. 4. * *Lophus*.

Habitat in Barbaria. Dom. Sehousboe, Mus. D. Lund. *Squid des Inuus et Clinus. Rossi F. 9. 1. 240. 7. S. Inuus*

4. *O. scutellatus*, capitis clypeo rotundato: cornu medio brevissimo. Ent. suppl. 25. 3. *Clinius*.

Scarabaeus Clinius. Ent. syst. 1. 19. 56. *

Scarabaeus Hungaricus. Jabl. Col. 2. tab. 16. fig. 4. *Ström Handb. 1. 69. 61. Tab. 3. Mig. N. 9. III. 148. II. 198*

~~*Scarabaeus Muuris*. Pall. Icon. Inf. tab. A. fig. 2.~~

Scarabaeus irroratus. Ross. Fn. Etr. 7. 16. *Creat. Voj. pag 75.*
 Habitat in Europa australiori. Dom. Hybner.

5. *O.*

gro, interdum tuberculato, oculis magnis, rotundatis, vtrinque conspicuis, hamo anteriore firmante, dimidiatis, postice insertis, thorace laevi, punctis quatuor impresso, marginibus deflexis, rotundatis, scutello interdum nullo, interdum brevi, triangulari, elytris planiusculis, longitudine abdominis, pedibus breuib. validis, femoribus crassis, compressis, tibiis anticis arcuatis, extus dentatis, tarsis nullis, posticis breuib., apice crassioribus, dentatis, tarsis quinquearticulatis.

Onitis genus Copridi certe affine. Differt tamen Ligulae figura. Characterem generis naturalem in Entomologiae supplemento dedi.

Vandelli. 5. *O. scutellatus* thorace inermi capitis clypeo acuto: cornu postico breuissimo.

Habitat in Lusitania. Mus. D. Lund.

Sturmi Handl.
170. 62. 73 *Statura et summa affinitas O. Cliniae, at capitis clypeus haud rotundatus, sed acutus et cornu fere in ipso margine postico positus.*

Apelles. 6. *O. scutellatus*, capitis cornu breuissimo, elytris cinereis: punctis eleuatis atris. Ent. suppl. 26. 3.

Scarabaeus Apelles. Ent. syst. 1. 18. 53. *

Coprii scabro- Oliv. Inf. 1. 3. 41. 170. tab. 11. fig. 97.

in eadem Iabl. Coleopt. 2. tab. 13, fig. 9.

notatur. Voet. Col. tab. 25. fig. 23.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Dom. Banks.

** *Exscutellati scutello omnino nullo.*

Bison. 7. *C. exscutellatus*, thorace antice mucronato, capite cornubus duobus lunatis.

Scarabaeus Bison. Ent. syst. 1. 50. 64. Linn. syst. Nat. 2. 547. 27.

Oliv. Inf. 1. 3. 120. 140. tab. 6. fig. 43.

Iabl. Col. 2. tab. 15. fig. 6.

Roff. Fn. Etr. 12. 25.

Habitat in Gallia, Hispania.

Femina thoracis margine antico striga marginata capitisque clypeo dentibus tribus eleuatis.

Iafus. 8. *O. exscutellatus*, thorace antice bidentato, capite cornubus duobus breuibas basi connatis.

~~*Scarabaeus Iafus.* Oliv. Inf. 1. 3. tab. 7. fig. 30.~~

Voet. Col. 1. tab. 12. fig. 12.

Habitat in America meridionali. Mus. Dom. Lund.

Statura et magnitudo omnino O. Bifontis. Capitis clypeus rotundatus, in medio acute bidentatus centroque eleuato cornubus duobus paruis, acutis. Thorax eleuatus, bidentatus vtrinque puncto

puncto posticeque duobus impressus. Elytra striata. Corpus nigrum subtus hirtum.

9. *O. exscutellatus*, niger opacus, capite subcornu- *Sphinx*.
to. Ent. suppl. 26. 6.

Scarabaeus Sphinx. Ent. syst. 1. 53. 173. *

Scarabaeus fulcratus. Wulff. Inf. Cap. tab. 2.
fig. 17.

Oliv. Inf. 1. 3. 135, 162. tab. 7. fig. 57. a. f. 58

Tabl. Coleopt. 2. tab. 13. fig. 8.

Voet. Col. tab. 26. fig. 30.

Herbst. Arch. tab. 19. fig. 17.

Drury Inf. 1. tab. 35. fig. 8.

Habitat in India orientali.

O. Inuo nimis affinis.

vid. Fabr. Suppl. p. 26
Hic America et Gallia
meridionali pro
habita pronuntiatur.

10. *O. exscutellatus*, thorace mutico, capite lineis *Belial*.
duabus transuersis, femoribus tibiisque anticis
acute dentatis. Ent. suppl. 27. 8. *

Scarabaeus cupreus. Oliv. Inf. 1. 3. tab. 7.
fig. 58.

Habitat Cajennae. Dom. Richard.

11. *O. exscutellatus*, thorace inermi, capite lineis *vinguicula-*
duabus transuersis, femoribus dentatis, tibiis *tus.*
anticis subtus vinguiculatis. Ent. suppl. 27. 7.

Scarabaeus vinguiculatus. Ent. syst. 1. 53.
174. *

Oliv. Inf. 1. 3. 157. 192. tab. 20. fig. 180.

Habitat in Senegallia. Mus. Dom. Olivier.

12. *O. exscutellatus*, thorace mutico, capitis cornu *Nicanor*.
recurso bidentato, elytris striatis.

Scarabaeus Nicanor. Ent. syst. 1. 54. 174. *

Scarabaeus fulcatus. Drury Inf. 1. tab. 35. fig. 1.

Tabl. Col. 2. tab. 15. fig. 8.

Habitat in America.

Menalcas. 13. *O. exscutellatus aeneus*, elytris testaceis: lineaeleuatis aeneis.

Scarabaeus Menalcas. Pall. Icon. 1. tab. A fig. 4.

Habitat in Rossia. Dom. Weber.

Elytris testaceis aeneo-lineatis distinctus.

~~*Philomon*~~. 14. *O. exscutellatus* obscure aeneus thorace mutico capite subcornuto, elytris fulcatis.

Habitat in India orientali. Dom. Daldorff.

Summa affinitas *O. Sphingis*, cuius varietatem olim credidi, at distinctus videtur. Differt dupl
varietas non
Sphingis. cf. Hlg. fere minor, colore obscure aeneo, elytrisqu
 magis fulcatis.

5. COPRIS. *Palpi* postici pilosi.

Mandibula compressa membranacea.

Ligula bifida: laciniis linearibus intus dentatis.

Labium rotundatum apice emarginatum.

Antennae clauato-lamellatae.

* *Thorace* cornuto.

~~*Oedipus*~~. 1. *C. thoracis* cornu plano subtus dentato, capiti truncato tridentato.

Sca

Copridis corpus magnum, gibbum, immarginatum, tardum clypeo magno, rotundato, saepius integro, oculis parvis rotundatis, vtrinque conspicuis, postice insertis, thorac rotundato, gibbo: marginibus deflexis, saepius cornuto aut inaequali scutello nullo, elytris rigidis longitudine abdominis, pedibus brevibus, validis, femoribus crassius rotundatis, tibiis dentatis, tarsis quinquearticulatis, color saepius nigro interdum aeneo aut rufo.

Scarabaeus Oedipus. Ent. syst. 1. 40. 132. *

Oliv. Inf. 1. 3. 112. tab. 13. fig. 121.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Dom. Banks.

2. C. thorace late foveolato antice cornu recuruo, *Rhadami-*
capite inermi, elytris rufis: futura punctisque *stus*.
duobus nigris.

Scarabaeus Rhadamistus. Ent. syst. 1. 40.
133. *

Habitat in Coromandel. Dr. Koenig.

3. C. thorace cornubus duobus porrectis acutis, ca- *nemestrin-*
pitis erecto subulato. *nus*.

Scarabaeus nemestrinus. Ent. syst. 1. 41. 134. *

Scarabaeus tricornutus. Degeer Inf. 7. 6. 37.
tab. 47. fig. 16.

Oliv. Inf. 1. 3. 104. 120. tab. 12. fig. 115.

Iabl. Col. 1. tab. 7. fig. 6.

Herbst. Arch. tab. 48. fig. 1.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Dom. Banks.

4. C. thorace prominente bilobo, capitis recuruo *Iachus*.
simplici.

Scarabaeus Iachus. Ent. syst. 1. 41. 135. *

Oliv. Inf. 1. 3. 105. 121. tab. 22. fig. 195.

Iabl. Col. 1. tab. 7. fig. 7.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

5. C. thorace prominente submarginato, capite mu- *hastator*.
tico. Ent. suppl. 28. 135. *

Habitat in America boreali. Dr. Hirschel.

6. C. thorace prominentia duplici, capitis cornu efe- *Sabaenus*.
cto simplici longitudine thoracis.

Scarabaeus Sabaenus. Ent. syst. 1. 41. 136. *

Oliv. Inf. 1. 3. 118. tab. 9. fig. 185.

Habitat in Coromandel. Dr. Koenig.

Femina thorace mutico, capitis linea media trans-
versa elenata.

7. C.

Nanus. 7. *C. thorace prominentia duplici, capitis cornu erecto simplici longitudini capitis.*

Scarabaeus Nanus. Ent. syst. 1. 42. 137. *

var. *el. Sabai*

Habitat Tranquebariae. Mus. D. Lund.

Femina minor thorace mutico, capitis clypeo lineae media transuersa eleuata.

Splendidulus. 8. *C. thorace aeneo: cornubus duobus compressis nigris, capitis erecto apice compresso.*

Scarabaeus splendidulus. Ent. syst. 1. 42. 138. *

Oliv. Inf. 1. 3. III. 128. tab. 2. fig. 18.

Habitat in America meridionali. Mus. Dr. Hunter.

conspicillatus. 9. *C. viridis, thorace retuso bidentato, capite atro: cornu recuruo.*

Habitat in Brasilia. Dom. Weber.

Statura omnino C. festiui. Clypeus rotundatus, ater, cornu erecto, recuruo. Thorax viridis antice in medio valde retusus, vtrinque dente breui, compresso obtuso maculae magna nigra. Punctum vtrinque impressum, postice inter elytra acuminatus Elytra fulcata, viridia, immaculata. Corpus nigrum.

festiuus. 10. *C. thorace gibbo bicorni, capitis cornu erecto, elytris rubro-aeneis.*

Scarabaeus festiuus. Ent. syst. 1. 42. 139. *

Linn. syst. Nat. 2. 552. 52.

Roef. Inf. 2. scar. 1. tab. B. fig. 3.

Voet. Scarab. tab. 23. fig. 5. 7.

Oliv. Inf. 1. 3. 110. 127. tab. 3. fig. 21.

Tabl. Coleopt. 1. tab. 7. fig. 8. 9.

Habitat in America.

Femina minor thorace mutico aequali nigro maculato, capite mutico.

Harpax. 11. *C. auratus, thorace bidentato, capitis cornu elongato recuruo, elytris testaceis.*

Habi-

Habitat in Guinea. Mus. Dom. de Sehestedt.

Statura et summa affinitas C. Pactoli. Clypeus rotundatus, aeneus, pallide villosus, cornu elongato, recuruo, atro, edentulo. Thorax antice bidentatus, aeneus, margine antico et laterali villosis, pallidis. Elytra striata, testacea. Corpus aeneum.

Variat capitis cornu dimidio breuiore.

12. C. thorace bidentato, capitis cornu elongato re- *Pactolus*,
curuo: medio bidentato.

Scarabaeus Pactolus. Ent. syst. 1. 42. 140. * 141.

Oliv. Inf. 1. 3. 119. 139. tab. 16. fig. 144.

Iabl. Col. 1. tab. 8. fig. 1.

Habitat in America. Mus. Dr. Hunter.

13. C. thorace bidentato, aeneus, capitis cornu elon- *aurata*.
gato: medio bidentato.

Habitat in Guinea. Mus. Dom. de Sehestedt.

Affinis certe C. Pactolo, at corpus totum aeneum.

14. C. thorace bicorni: cornubus breuissimis, capi- *Pithecius*.
tis cornu erecto subulato.

Scarabaeus Pithecius. Ent. syst. 1. 43. 141. *

Oliv. Inf. 1. 3. 117. 136. tab. 9. fig. 73.

~~Iabl. Col. 1. tab. 8. fig. 2. 3.~~

Habitat in Indiis. Mus. Britann.

15. C. thorace antice, clypeo postice bicorni.

Seniculus.

Scarabaeus Seniculus. Ent. syst. 1. 43. 142. *

Oliv. Inf. 1. 3. 124. 146. tab. 7. fig. 56.

Panz. Naturforsch. 24. 4. 5. tab. 1. fig. 5.

Iabl. Col. 1. tab. 8. fig. 4. 5.

Herbst. Arch. tab. 19. tab. 16.

Habitat Tranquebariae. Mus. Dom. Schulz.

Variat puncto vno alteroue flavescente apicis.

16. C. thorace gibbo, antice bidentato, capitis cor- *Iauana*.
nubus duobus distantibus erectis.

C.

Habi-

Habitat in Iava Infula. Mus. Dom. Bosc.

Statura et magnitudo C. Seniculi. Capitis clypeus rotundatus, integer, vtrinque cornu breui recto, erecto, fere marginali. Thorax valde eleuatus, gibbus, punctatus, niger, antice obtusus, tuberculis duobus paruis, obtusis. Elytra striata, obscura, basi parum palleſcentia.

metallica. 17. C. thorace aeneo antice denticulis duobus compressis, capitis clypeo linea eleuata carinata.

varietas feminina Ent. suppl. 28. 142. *

Saj Mal Habitat in India orientali. Dom. Daldorff.

Guineensis. 18. C. thorace bidentato aeneo, capitis cornu eleuato breui.

Scarabaeus Guineensis. Ent. syst. 1. 43. 143. *

Habitat in Guinea. Dom. Isert.

Femina clypei linea transuersa carinata, vtrinque in cornu abutum porrecta.

Canadensis. 19. C. viridis, thorace supra caput porrecto: cornubus duobus apice emarginatis, capite inermi. Habitat in Canada. Mus. Dom. Bosc.

Paruus. Capitis clypeus porrectus, subangulatus, viridis. Thorax planus, punctatus, antice valde supra caput protensus, bicornis vel potius late emarginatus: laciniis incrassatis, emarginatis. Elytra substriata, viridia.

latebrosus. 20. C. thorace scabro supra caput protenso subfido, capitis clypeo apice reflexo acuto.

Habitat in Carolina. Mus. Dom. Bosc.

Paruus. Capitis clypeus apice valde reflexus acutus. Thorax niger punctis eleuatis, scaber, antice supra caput porrectus, bidentatus, vix tam cornutus. Elytra striis punctatis nigra. Corpus nigrum.

Femi-

Femina clypeo subreflexo thoraceque antice vix porrecto.

21. *C. thorace bidentato aeneo, clypeo mutico emarginato, elytris testaceis nigro-punctatis.*

Scarabaeus pygmaeus. Ent. syst. 1. 44. 144. *

Act. Hall. 1. 239.

Habitat Tranquebariae. Dom. Hybner.

22. *C. ater, thorace bidentato, capitis cornu erecto Pardalis breui.* Ent. suppl. 29. 144. *

Habitat in India orientali. Dom. Daldorff.

23. *C. thorace antice bidentato, clypeo lineis duabus eleuatis transuersis caeinatis.*

Scarabaeus Pardalis. Ent. syst. 1. 43. 145. *

Oliv. Inf. 1. 3. 124. 147. tab. 23. fig. 201. *cf. Flug. III. 149*

Habitat in Coromandel. Dom. Zschuck.

24. *C. thorace antice bicorni, postice eleuato tricorni, capitis cornu compresso ferrato.*

Scarabaeus Rosalius. Ent. syst. 1. 44. 146.

Habitat in America. Dom. Baker.

25. *C. thorace tridentato, capitis cornu recuruo, elytris striatis.*

Scarabaeus Ammon. Ent. syst. 1. 44. 147. *

Oliv. Inf. 1. 3. 123. 145. tab. 12. fig. 111.

~~Tabl. Col. 1. tab. 9. fig. 1.~~

Habitat in America. Mus. Dom. Banks.

26. *C. thorace tricorni: cornubus subaequalibus depressis, capite cornubus duobus erectis, basi connatis.*

Habitat in Guinea. Mus. D. de Sehestedt.

Statura et magnitudo *C. Hamadryadis*. Capitis

clypeus rotundatus, dilatatus, in medio fissus.

Cornua duo erecta, capite longiora, basi connata.

Thorax scaber, eleuatus, dorso plano cornubus

nubus tribus planis, depressis aequalibus: Elytra striata, basi tuberculis aliquot eleuatis.

Midas. 27. C. thorace tricorni, capitis clypeo sinuato bicorni.

Scarabaeus Midas. Ent. syst. 1. 45. 148. *

Oliv. Inf. 1. 3. 99. 114. tab. 20. fig. 183.

Habitat in America. Mus. Dom. Banks.

Hamadryas. 28. C. thorace tricorni: intermedio plano acuto bidentato, clypeo reflexo bicorni.

Scarabaeus Hamadryas. Ent. syst. 1. 45. 149. *

Oliv. Inf. 1. 3. 98. 112. tab. 10. fig. 92.

- - - - - tab. 23. fig. 92.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Dom. Banks.

lunaris. 29. C. thorace tricorni: medio obtuso bifido, capitis cornu erecto, clypeo emarginato.

Scarabaeus lunaris. Ent. syst. 1. 46. 150. Linn.

syst. Nat. 2. 543. 10. Fn. Sv. 379.

Oliv. Inf. 1. 3. 114. 132. tab. 5. fig. 36.

Geoff. Inf. 1. 88. 1. *Muz. K. Pr. 159.*

Iabl. Col. 1. tab. 8. fig. 7. *Humm. Mayb. 187*

Roef. Inf. 1. scarab. tab. B. fig. 2. *Fris. 155*

V. 2. Fris. Inf. 4. tab. 7.

Schaeff. Icon. tab. 63. fig. 3.

Voet. Scarab. 1. tab. 25. fig. 24. 25.

tab. 26. fig. 26.

Habitat in Europae stercore.

Clypeus in utroque sexu cornutus, at femina thorace mutico.

Character generis in Entomologiae supplemento datus, emendandus.

Palpi quatuor inaequales, filiformes, *anteriores* paullo longiores, quadriarticulati: articulis subaequalibus; ultimo cylindrico, acutiusculo, adhaerentes maxillae dorso, *posteriores* breviores,

uiiores, pilosi, triarticulati: articulo ultimo breui, subglobofo, adnati sub ligulae apice. *Labrum* reconditum, rotundatum, membranaceum, ciliatum. *Mandibula* membranacea, compressa, ciliata. *Maxilla* basi cornea, apice membranacea, rotundata, videntata. *Ligula* membranacea, bifida: laciniis linearibus, intus denticulatis. *Labium* breue, corneum, rotundatum, apice emarginatum.

30. C. thorace inaequali subtricorni, capitis cornu *emarginata*.
erecto, emarginato. Illig. Fn. Bor. 1. 39. 1. β.

Scarabaeus emarginatus. Ent. syst. 1. 46. 151. *

Oliv. Inf. 1. 3. 115. 133. tab. 8. fig. 64.

Degeer Inf. 4. 257. 2. tab. 10. fig. 1.

Schaeff. Icon. tab. 63. fig. 2.

Habitat in Europae stercore.

Praecedentis videtur varietas.

31. C. thorace triretuso tricorni: medio quadriden- *caelata*.
tato, capitis cornu elongato recuruo intus vni-
dentato. Ent. syst. App. 435. *

Voet. Col. tab. 23. fig. 6.

Habitat ad Cap. Bon. Spei.

32. C. thorace prominentia triplici, capite tricorni; *Belzebul*,
medio maiori.

Scarabaeus Belzebul. Ent. syst. 1. 46. 152. *

Oliv. Inf. 1. 3. 107. 124. tab. 14. fig. 136.

Habitat in America. Dom. Drury.

33. C. thorace prominentia triplici, capitis cornu *bifasciata*,
erecto, elytris nigris: fasciis duabus rufis.

Scarabaeus bifasciatus. Ent. syst. 1. 47. 153. *

Oliv. Inf. 1. 3. 129. 155. tab. 13. fig. 119.

labl. Col. 2. tab. 9. fig. 2.

Habitat in Coromandel. Mus. Dom. Banks.

- Dromedarius.* 34. *C. thorace prominentia triplici rufo, elytris flavis: puncto fasciaque nigris.* Ent. suppl. 29, 153. *
Habitat in India orientali. Mus. D. de Sehestedt.
- Sinox.* 35. *C. thorace quadridentato, capitis cornu recurvo subulato.*
Scarabaeus Sinox. Ent. syst. 1. 47. 154. *
Oliv. Inf. 1. 3. 128. 144. tab. 9. fig. 79.
Habitat in Insula Goree Africae.
- Faunus.* 36. *C. thorace quadricorni: cornubus mediis brevissimis, capitis cornu recurvo ferrato.*
Scarabaeus Faunus. Ent. syst. 1. 47. 155. *
Oliv. Inf. 1. 3. 103. 119. tab. 7. fig. 87.
tab. 22. fig. 87.
Iabl. Col. 1. tab. 9. fig. 3.
Drury Inf. 3. tab. 48. fig. 6.
Voet. Col. tab. 24. fig. 15.
Habitat Cajennae.
- Pirmal.* 37. *C. thorace quadricorni: cornubus intermediis depressis, capitis cornu breui obtuso.* Ent. suppl. 29. 155. *
Habitat in India orientali, Daldorff. Mus. de Sehestedt.
- Tarandus.* 38. *C. thorace quadricorni, capite cornubus duobus compressis,*
Scarabaeus Tarandus Ent. syst. 1. 48. 156. *
Habitat in India orientali. Dom. Lee.
- Capucinus.* 39. *C. thorace quadridentato, capitis cornu recumbente; vtrinque unidentato.*
Scarabaeus Capucinus. Ent. syst. 1. 48. 156. *
Oliv. Inf. 1. 3. 117. 135. tab. 2. fig. 12.
tab. 25. fig. 12.
Iabl. Col. 1. tab. 9. fig. 4.

Habi-

Habitat in India orientali. Mus. D. Banks.

Femina thorace mutico, capite linea eleuata, carinata.

40. C. thorace subquadridentato, capitis cornu eleuato intus bidentato. Carmelita.

Habitat in Guinea. Mus. Dom. Lund.

Statura C. Capucini, at duplo minor. Capitis clypeus rotundatus, reflexus, integer. Cornu capite longius, eleuatum, intus denticulis duobus breuibus, approximatis. Thorax eleuatus, denticulis fere obsoletis punctoque vtrinque impresso. Elytra striata.

41. C. thorace quadridentato, capitis cornu breuissimo transuerso, elytris testaceis: sutura nigra. Lucida.

Habitat in Austria. Dom. Mecherle. Sturm. Handb. 1. 48. T. 11.

Statura C. Lemuris. Clypeus pubescens, rotundatus, emarginatus, postice cornu breui, vel potius linea transuersa eleuata. Thorax pubescens, ater antice denticulis quatuor. Elytra striata, liuida, sutura nigra. Corpus pubescens, nigrum. F. S. 1. 53. 13
Wiedemann. 7001.
Arch. 1. 2. 106

42. C. thorace quadridentato cupreo, clypeo postice transuerso carinato, elytris testaceis. Lemur.

Scarabaeus Lemur. Ent. syst. 1. 48. 158. *

Oliv. Inf. 1. 3. 129. 152. tab. 21. fig. 191.

Iabl. Col. 2. tab. 16. fig. 9. Sturm. T. 8. 638

Panz. Naturf. 24. 5. 6. tab. 1. fig. 6. 11. 8.

Habitat in Germania haud infrequens.

43. C. thorace quadridentato, clypeo postice bicorni corpore atro. Camelus.

Scarabaeus Camelus. Ent. syst. 1. 49. 159.

Oliv. Inf. 1. 3. 149. tab. 20. fig. 181. V. 2.

Herbst. Col. 2. tab. 14. fig. 9. Sturm 7. 1. 38

Illig. Col. Bor. 1. 44. 6.

Panz.

Panz. Naturf. 24. 6. 7. tab. 1. fig. 7.

Habitat in Germaniae stercore.

Femina clypeo linea duplici transuersa carina posteriore maiore.

Vertagus: 44. C. thorace subquadridentato, clypeo postice lir
eleuata bicorni: Ent. suppl. 30. 159. *

Habitat in China. Mus. Dom. Lund.

Melstaenus. 45. C. thorace quadridentato, clypeo reflexo post
bicorni, corpore atro. Ent. suppl. 30. 159.

Habitat in Tangier. D. Sehouboe. Mus. Do
de Sehestedt.

*vnifascia-
ta*. 46. C. thorace quinquedentato, ater elytris testace
fascia nigra.

Scarabaeus vnifasciatus. Ent. syst. 1. 49. 160
Act. Hall. 1. 240.

Habitat Tranquebariae, Dom. Hyhner.

Aespa. 47. C. thorace sexdentato, clypeo rhombico: ce
tro prominulo, elytris laeuiibus.

Scarabaeus Boas. Ent. syst. 1. 49. 161. *

Habitat in India. Dom. Daldorff.

Statura omnino Scarabaei, at exscutellatus.

Antenor. 48. C. thorace truncato, multidentato, capitis corn
eleuato tridentato,

Scarabaeus Antenor. Ent. syst. 1. 49. 162.

Oliv. Inf. 1. 3. 97. III. tab. 6. fig. 42.

Habitat in Senegallia. Dom. Olivier.

** *Thorace inermi, capite cornuto*, 1 r

Bonafus. 49. C. thorace prominentia duplici, capite bicorn
cornubus lateralibus maioribus arcuatis.

Scarabaeus Bonafus. Ent. syst. 1. 50. 163.

Oliv. Inf. 1. 3. 121. 142. tab. 9. fig. 82.

Tabl. Col. 2. tab. 13. fig. 3. 4.

Hérbst. Atch. tab. 43. fig. 2.

Pall. Icon. 5. tab. A. fig. 5.

Schroet. Abh. 1. tab. 3. fig. 5.

Habitat in India orientali.

50. C. thorace antice mucronato, capitis cornu foli-*sagittarius.*
tario erecto.

Scarabaeus sagittarius. Ent. syst. 1. 50. 165. 9

Oliv. Inf. 1. 3. 126. 148. tab. 14. fig. 133.

Habitat in China. Mus. D. Lund.

51. C. thorace antice mucronato, capite linea trans-*Nimrod.*
uersa carinata vtrinque cornuta.

Habitat in Guinea. Mus. D. de Sehestedt.

Statura et magnitudo praecedentis. Capitis clypeus rotundatus, integer, obscurus, in medio linea valde eleuata, transuersa, carinata, vtrinque porrecta. Thorax aeneus medio antico mucronato anguloque vtrinque porrecto. Elytra testacea fascia lata nigra.

52. C. thorace antice mucronato, capitis cornu por-*Venator.*
recto bifido.

Habitat in Iava. Mus. Dom. Bosc.

Statura et magnitudo C. sagittarii. Capitis clypeus apice rotundatus, subsenuatus, pallefcens, cornu elongato, recuruo, apice bifido. Thorax obscurus, vtrinque macula marginali, pallefcente, antice mucronatus in spinam prominentem, validam, acutam. Elytra striata, liuida. Corpus obscuram, pedibus quatuor posticis pallidis.

53. C. thorace antice mucronato, capite cornubus *Vulcanus.*
duobus recuruis.

Habitat Tranquebariae. Mus. D. Lund.

Statura parua praecedentium. Capitis clypeus rotundatus, reflexus, integer, cornubus duobus, capite longioribus, recuruis, fere truncatis. Thorax punctatus, obscure aeneus, antice valde

valde mucronatus. Elytra substriata, nigra apice rufa.

Bucephalus.

54. C. thorace retuso quadridentato, capitis clypeo angulato: cornu breui erecto.

Scarabaeus Bucephalus. Ent. syst. 1. 51. 166. *

Oliv. Inf. 1. 3. 99. 113. tab. 4. fig. 26. } omnes
tab. 10. fig. 92. } feminae.
tab. 22. fig. 92. }

Iabl. Col. 2. tab. 13. fig. 1. 2. mas.

Habitat in India orientali, Guinea.

Cornu capitis maris erectum, haud emarginatum.

Femina minor, thorace linea transuersa, carinata, capitisque clypeo cornu eieuto, breui, truncato, subemarginato.

Gigas.

55. C. thorace retuso: margine eleuato repando, capitis cornu breuissimo tridentato, clypeo repando.

Scarabaeus Gigas thorace inermi retuso, capite inermi supra margineque angulato. Linn. syst. Nat. 2. 549. 36. Mus. Lud. Vlr. 16.

Oliv. Inf. 1. 3. tab. 14. fig. 137.

Habitat in India orientali. Mus. D. de Sehestedt.

Corpus maximum. Clypeus porrectus rotundatus margine repando. Thorax eleuatus margine antico valde prominente, repando. Elytra substriata.

Molossus.

56. C. thorace retuso bidentato vtrique impresso, clypeo lunato vnicorni integro, elytris laeuius. Ent. syst. 1. 51. 167.

Scarabaeus Molossus. Linn. syst. Nat. 2. 543. 8. Mus. Dom. Vlr. 11.

Oliv. Inf. 1. 3. 100. 125. tab. 5. fig. 37.

Iabl. Col. 1. tab. 8. fig. 10. *S. abbreviatus*

Drury Inf. 1. tab. 32. fig. 2.

Habitat in China officinalis.

57. C.

57. *C. thorace bidentato*: vtrinq̄ue impresso, capitis *Vrsus*.
cornu breui vtrinq̄ue basi vndentato.

Oliv. Inf. 1. 3. tab. 4. fig. 25.

tab. 19. fig. 25.

Habitat in China. Mus. D. de Sehestedt.

Statura omnino *C. Molossi*, cuius varietatem olim credidi. Clypeus porrectus, rotundatus, cornu erecto breui, basi crassiori, vtrinq̄ue vndentato. Thorax in medio linea eleuata, carinata, abbreviata, vtrinq̄ue vndentata. Punctum magnum vtrinq̄ue impressum. Elytra laeui.

Femina minor, thorace linea parua eleuata, capiteque linea transuersa carinata.

58. *C. violaceus*, thorace dentato, capitis cornu *an-lancifer*.
gugato, elytris fulcatis.

Scarabaeus lancifer. Linn. syst. Nat. 2. 544.

13. Ent. syst. 1. 51. 168.

Oliv. Inf. 1. 3. 102. 117. tab. 4. fig. 32.

Iabl. Col. 2. tab. 15. fig. 1.

Voet. Col. tab. 23. fig. 1. 2.

~~Schroet. Abhandl. 1. tab. 9. fig. 4.~~

Habitat in America meridionali.

59. *C. thorace retuso eleuato*, capitis cornu recur- *Paniscus*.
uo, clypeo fisso.

Scarabaeus Paniscus. Ent. syst. 1. 51. 169. *

~~Linn. syst. Nat. 2. 546. 20. Mus. Lud. Vlr.~~

~~13. varietas C. Hispanae~~

Oliv. Inf. 1. 3. 112. 130. tab. 5. fig. 34.

Habitat in Europa australi, Mauritania.

60. *C. thorace retuso binodi*, capitis cornu erecto *Carolinus*.
breuissimo, clypeo integro, elytris fulcatis.

Scarabaeus Carolinus. Ent. syst. 1. 52. 170. *

Linn. syst. Nat. 2. 545. 16.

Oliv. Inf. 1. 3. 134. 160. tab. 12. fig. 113.

Iabl.

Iabl. Col. 2. tab. 14. fig. 2.

Drury Inf. 1. tab. 35. fig. 2.

Voet. Scarab. tab. 24. fig. 14.

Habitat in Carolina.

Nifus. 61. *C. thorace inermi rotundato, capitis cornu brevissimo emarginato.*

Scarabaeus Nifus. Ent. syst. 1. 52. 171. *

Oliv. Inf. 1. 3. 139. 166. tab. 2. fig. 17.

Habitat Cajennae. Mus. D. Olivier.

Femina minor, tuberculo capitis transverso.

Melaeager. 62. *C. thorace inermi, capitis cornu brevis compresso truncato, corpore virescente.* Ent. sup 30. 172. *

Habitat Cajennae. Dom. Cuvier.

orientalis. 63. *C. thorace rotundato, capitis cornu brevissimo elytris striatis.*

Scarabaeus orientalis. Ent. syst. 1. 52. 172

Habitat in India orientali. Mus. D. Banks.

Dorcas. 64. *C. ater nitidus, thorace rotundato, capitis cornu recurvo,* Ent. suppl. 31. 172. *

Habitat in Mauritania. D. Schousboe. Mus. Schestedium.

Tullius. 65. *C. thorace canaliculato vtrinque retuso, capitis cornu brevissimo, elytris striatis.*

Scarabaeus Tullius Oliv. Inf. 1. 3. tab. 19. fig. 8
tab. 11. fig. 5

Habitat in India orientali. Mus. D. Lund.

Affinis certe *C. orientali*, at thorax dorso canaliculato antice vtrinque retuso.

Plutus. 66. *C. thorace mutico, vtrinque puncto impresso capitis cornu brevissimo subulato.*

Scarabaeus Plutus. Ent. syst. App. 4. 436. 172

Habitat in India orientali. Dom. Daldorff.

Femina

Femina minor capitis tuberculo eleuato, obtuso.

67. *C. thorace antice eleuato, capitis cornu truncato, subemarginato, cotpore aeneo.* ~~*Fricator.*~~

Scarabaeus Fricator. Ent. syst. 1. 54. 176.

Oliv. Inf. 1. 3. 122. 143. tab. 16. fig. 149.

Habitat in India. Mus. Dr. Hunter.

68. *C. thorace mutico retuso angulato, capite obsolete bicorni, elytris friatis inauratis.* ~~*Mimas.*~~

Scarabaeus Mimas. Ent. syst. 1. 54. 177. Linn.

syst. Nat. 2. 545. 17. Mus. Lud. Vlr. 9,

Oliv. Inf. 1. 3. 108. 123. tab. 7. fig. 50.

Iabl. Col. 2. tab. 15. fig. 2. 3.

Voet. Col. tab. 23. fig. 4.

Roef. Inf. 2. Scarab. 1, tab. B. fig. 1.

Sulz. Hist. Inf. tab. 1. fig. 4.

Habitat in America meridionali.

Fortè ad *Onitis* genus amandandus.

69. *C. thorace mutico, occipite cornubus duobus reclinatis arcuatis.* *Taurus.*

Scarabaeus Taurus. Ent. syst. 1. 54. 178.

Linn. syst. Nat. 2. 547. 26. Geoff. Inf. 1. 92.

Oliv. Inf. 1. 3. 144. 174. tab. 8. fig. 73.

Iabl. Col. 2. tab. 13. fig. 6. 7.

I. 2.

Voet. Col. tab. 24. fig. 16.

Schaeff. Icon. tab. 63. fig. 4.

Illig. Col. Bor. 1. 44. 8.

Panz. Fn. Germ. 12. tab. 3.

Habitat in Germania, Gallia.

Variat cornubus duplo breuioribus.

Femina lineis duabus eleuatis transuersis clypei.

70. *C. thorace aeneo acuminato, occipite spina erecta gemina.* *Vacca.*

I. 2

Sea-

- Scarabaeus Vacca*. Ent. syst. 1. 55. 179. L.
syst. Nat. 2. 547. 23.
Oliv. Inf. 1. 3. 128. 151. tab. 8. fig. 65.
Geoff. Inf. 1. 90. 5.
Iabl. Col. 2. tab. 14. fig. 3. 4.
Schaeff. Icon. tab. 73. fig. 4. 5.
Panz. Fn. Germ. 12. tab. 4. fem.
Illig. Col. Bor. 1. 41. 3.
Habitat in Germaniae stercore bouino.
? *Femina* clypeo lineis duabus eleuatis.
- media*. 71. C. thorace nigro acuminato, occipite spina
mina breui, elytris griseis nigro-punctatis
Copris media. Illig. Col. Bor. 1. 41. 4.
17. 12 *Scarabaeus medius*. Panz. Fn. Germ. 37. tab
Habitat in Austria. Dom. Mecherle.
- Capra*. 72. C. thorace mutico, occipite cornubus duo
subarcuatis, corpore nigro obscuro.
Scarabaeus Capra. Ent. syst. 1. 55. 180. *
V. 3. *Scarabaeus recticornis*. Leske Iter. 45. tab.
fig. 9.
Oliv. Inf. 1. 3. 145. 175. tab. 20. fig. 182.
Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.
Mera varietas C. Tauri, obseruante D. Helwig
- Cernuus*. 73. C. thorace mutico, capite cornubus duobus
flexuosis, elytris basi apiceque rufis. F
suppl. 31. 180. *
Habitat in India orientali. Dom. Daldorff.
- Ibex*. 74. C. thorace mutico, capite cornubus duobus
uissimis, elytris nigris flauo-maculatis.
Scarabaeus Ibex. Ent. syst. 1. 55. 181. *
Habitat in India orientali. Dom. Lee.
- Alces*. 75. C. thorace mutico biretuso, capitis clypeo li
eleuata transuersa subbicorni, corpore la
atro.
? *femina C. Hubneri*. Mus. H. 206.
In. *juuencus Scriba* Bestr. 1. 311. T. 4. f. 1.

Scarabaeus Alces. Ent. syst. 1. 56. 182. *

Habitat in Hungaria. Dom. Hybner.

76. *C. thorace submutico aeneo, occipite cornubus* *Gazella*.
duobus arcuatis, elytris testaceis.

Scarabaeus Gazella. Ent. syst. 1. 56. 183. *

Habitat in Guinea. Mus. Dom. Lund.

77. *C. thorace mutico: margine antico flavescente, femorata*.
capitis clypeo bidentato.

Copris femoratus. Illig. Wiedem. Arch. 1. 2.
108. 5.

Copris bidens. Web. Inf. 36. 2.

Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff.

Statura praecedentis. Clypeus rotundatus, integer, occipite denticulus duobus eleuatis, breuiibus. Thorax linea media baseos impressa punctatus, niger, antice subretusus margine, flavescente. Elytra profunde striata, nigra. Corpus obscure rufum.

Femina thoracis margine minus flauis capitisque clypeo denticulis minutissimis.

78. *C. thorace submutico, clypeo antice cornubus* *Oryx*.
duobus erectis, elytris griseis.

Scarabaeus Oryx. Ent. syst. 1. 56. 184. *

Habitat in China. Mus. Dom. Lund.

79. *C. thorace mutico, capitis clypeo cornubus duo-* *nuchidens*.
bus erectis, coleoptrorum limbo griseo.

Habitat Tranquebariae. Dom. Daldorff.

Corpus paruum, nigrum. Clypeus rotundatus, margine subreflexo, in medio linea eleuata, acuta, postice cornubus duobus erectis, breuiibus. Antennae testaceae. Thorax ater, nitidus, laeuis. Coleoptra striata, nigra limbo omni griseo. Pedes nigri femoribus ferrugineis.

Jahrb. K. II. T. 14. f. 4. S. limbatus

Variat

Variat elytris tantum lituris nigris et griseis immaculatis.

Femina simillima, at inermis.

Tragus.

80. *C. thorace mutico, capite cornubus duobus rectissimis, corpore atro.*

Scarabaeus Tragus. Ent. syst. 1. 56. 185. *

Habitat in China. Mus. D. de Sehestedt.

Antilope.

81. *C. thorace mutico aeneo, clypeo cornubus duobus erectis, corpore ferrugineo.*

Habitat in India. Dom. Daldorff.

Statura omnino praecedentium. Capitis clypeus rotundatus: occipite cornubus duobus erectis.

Thorax laevis, aeneus, nitidus. Elytra striata vti totum corpus ferruginea.

Femina simillima, at clypeo mutico.

Dama.

82. *C. thorace mutico, clypeo cornubus duobus erectis, corpore aeneo.* Ent. suppl. 32. 185. *

Habitat in India orientali. Dom. Daldorff.

Femina minor mutica.

Vitulus.

83. *C. ater, thorace mutico retuso, capite cornubus duobus basi connatis.* Ent. suppl. 82. 184. *

Habitat in India orientali. Dom. Daldorff.

Carnifex.

84. *C. thorace mutico angulato, capitis cornu reflexo, corpore aeneo.*

Scarabaeus carnifex. Ent. syst. 1. 57. 186. Linn. syst. Nat. 2. 546. 22.

Oliv. Inf. 1. 3. 135. 161. tab. 6. fig. 46.

tab. 10. fig. 86.

Tabl. Cöl. 2. tab. 15. fig. 4. 5.

Drury Inf. 1. tab. 35. fig. 3. 5.

Petiv. Gazoph. tab. 27. fig. 8.

Habitat in America.

Femina inermis.

15. C. thorace inermi cupreo, capite basi tridentato, elytris nigris.

Scarabaeus tridens. Ent. syst. 1. 57. 187. *

Oliv. Inf. 1. 3. 139. 167. tab. 12. fig. 106.

Habitat in Africa. Mus. Dom. Banks.

16. C. thorace mutico retuso, clypeo cornuto emarginato, elytris striatis. *Hispanus*.

Scarabaeus Hispanus. Ent. syst. 1. 57. 188.

Linn. syst. Nat. 2. 546. 21. Mus. Lud. Vlr. 12.

Oliv. Inf. 1. 3. 113. 131. tab. 6. fig. 47.

Tabl. Col. 2. tab. 16. fig. 3.

Petiv. Gazoph. 13. tab. 8. fig. 4.

Roff. Fn. Etr. 12. 26.

Voet. Scarab. 1. tab. 24. fig. 13.

Habitat in Europa australiori.

17. C. niger, thorace rotundato mutico, capitis cornu erecto breuissimo. *Mopsus*.

Scarabaeus Mopsus. Ent. syst. 1. 58. 189. *

Habitat in India orientali. Dom. Lee.

18. C. thorace rotundato mutico, occipite spina recurva. *spinifex*.

Scarabaeus spinifex. Ent. syst. 1. 58. 190. *

Oliv. Inf. 1. 3. 148. 180. tab. 12. fig. 112.

Habitat in Coromandel. Mus. Dom. Banks.

19. C. thorace mutico retuso viridi, capitis cornu basi dilatato apice nutante. *Coenobita*.

Scarabaeus Coenobita. Ent. syst. 1. 58. 191. *

Oliv. Inf. 1. 3. 147. 178. tab. 26. fig. 228.

Tabl. Col. 2. tab. 14. fig. 7. 8.

Voet. Col. tab. 25. fig. 20.

Schaeff. Iconi. tab. 73. fig. 2. 3.

Illig. Col. Bor. 1. 40. 2.

Panz. Fn. Germ. 48. tab. 6.

Habitat in Germania. Dom. Smidt.

D

Femi-

Femina clypeo lineis duabus transuersis, electis, thorace antice prominulo.

nuchicornis.

90. *C.* thorace rotundato mutico, occipite spina erecta armato, clypeo marginato.

Scarabaeus nuchicornis. Ent. syst. 1. 58. 19

Linn. syst. Nat. 2. 547. 24. Fn. Sv. 381.

Oliv. Inf. 1. 3. 6. 14. 177. tab. 7. fig. 55.

Iabl. Col. 2. tab. 14. fig. 5. 6. 53

Geoff. Inf. 1. 89. 3. 4.

I. 2.

Panz. Fn. Germ. 4. tab. 1. *Xiphias A. mir*

Illig. Col. Bor. 1. 42. 5. *Harum F. S. 1. 57. 15.*

Roef. Inf. 2. Scar. 1. tab. A. fig. 4.

Schaeff. Icon. tab. 96. fig. 1.

Habitat in Europae stercore.

Femina lineis clypeis duabus transuersis, utriusque connexis.

fracticornis.

91. *C.* thorace mutico scabro, occipite spina erecta flexuosa, elytris ferrugineo variis.

Scarabaeus fracticornis. Panz. Fn. Germ.

Habitat in Austria. Dom. Meyerle.

Statura et magnitudo *C. nuchicornis*. Capitis clypeus pilosus, rotundatus, margine reflexo, occipite spina basi dilatata, apice flexuosa. Thorax eleuatus, scaber. Elytra striata nigro ferrugineoque varia.

V. 3.
July. 1. 91. (Musk. 1. 63.)
Harum F. S. 1. 54

Xiphias.

92. *C.* thorace mutico antice subacuminato, occipite spina erecta, clypeo integro.

Scarabaeus Xiphias. Ent. syst. 1. 59. 193.

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

Femina clypeo lineis duabus transuersis, electis. *Varietas nunc C. nuchicornis*

V. 3.

nutans.

93. *C.* thorace antice impresso, occipite spina erecta apice nutante, corpore nigro.

I. 3.

See

Scarabaeus nutans. Ent. syst. 1. 59. 194. •

Oliv. Inf. 1. 3. 145. 176. tab. 21. fig. 188.

Illig. Col. Bor. 1. 44. 7.

Panz. Fn. Germ. 6. tab. 1.

Iabl. Col. 2. tab. 14. fig. 10.

Panz. Naturf. 24. 7. 8. tab. 1. fig. 8.

Habitat Halae Saxonum.

Femina lineis clypei duabus transuersis eleuatis,
thorace antice prominulo.

94. *C. aureus* thorace subretuso, capitis cornu elongato recumbente. *Cicodia,*

Habitat in Guinea. Mus. Dom. de Sehestedt.

Statura parua praecedentium. Caput angulatum, clypeo antice incrassato, acutiusculo. Cornu elongatum, recumbens. Thorax punctatus cupreus, angulo antico vtrinque prominente. Elytra substriata. cuprea. Abdomen nigrum.

95. *C. thorace* mutico, aeneus, capitis cornu erecto truncato. *aenea.*

Scarabaeus aeneus. Ent. syst. 1. 59. 195.

Oliv. Inf. 1. 3. 131. 155. tab. 14. fig. 128.

Iabl. Col. 2. tab. 14. fig. 12.

Herbst. Arch. tab. 43. fig. 4. fem.

Act. Hall. 1. 238.

Habitat Tranquebariae.

Femina obscurior thorace antice tuberculis duobus eleuatis.

96. *C. niger*, thorace subbidentato, capitis cornu erecto breui basi dilatato. *Hyaena.*

Habitat ad Cap. Bon. spei. Dom. Daldorff.

Statura *C. nuchicornis*, at minor. Clypeus rotundatus, integer linea in medio eleuata et pone hanc cornu breue, erectum, basi dilatatum. Thorax antice subretusus denticulus duobus

bus obtusis brevissimis. Elytra substriata. Capus nigrum.

Femina eiusdem magnitudinis et clypeo lineae elevata carinata.

~~thoracicus.~~ 97. C. thorace inermi cupreo nitido, capitis cor-
elongato simplici, elytris testaceis: fascia
gra.

Scarabaeus thoracicus. Ent. syst. 1. 60. 196
Oliv. Inf. 1. 3. 149. 181. tab. 28. fig. 218.
Habitat in Senegallia.

~~contricornis~~ 98. C. thorace mutico aeneo, capitis cornu ere-
acuto, elytris testaceis. Ent. suppl. 33. 196
Habitat Tranquebariae. Dom. Daldorff.

~~unicornis.~~ 99. C. nigra thorace mutico, capitis clypeo sub-
flexo: cornu erecto acuto. Ent. suppl. 33.
196. *

Habitat Tranquebariae. Dom. Daldorff.

~~scabrosa.~~ 100. C. thorace mutico rugoso, capitis cornu ere-
breuissimo, elytris testaceis nigro-scabris.

Scarabaeus scabrosus. Ent. syst. 1. 60. 197
Voet. Scarab. tab. 25. fig. 23.

cf. Apelles

Iabl. Col. 2. tab. 13. fig. 9.
Habitat Surinami. Dr. Schulz.

~~furcata.~~ 101. C. thorace mutico rotundato, clypeo ema-
nato: postice cornubus tribus erectis; me-
breuiore. Ent. suppl. 33. 197. *

Habitat in India orientali. Dom. Daldorff.

~~furcata.~~ 102. C. thorace inermi rotundato, capite cornu
tribus erectis approximatis: medio breui
clypeo rotundato.

I. 3.

Scarabaeus furcatus. Ent. syst. 1. 60. 198.
Oliv. Inf. 1. 3. 150. 182. tab. 8. fig. 61.
Iabl. Col. 2. tab. 13. fig. 5.

Roff. Fn. Etr. 1. 14. 31.

Laich. Inf. tab. 1. fig. 20.

Panz. Naturf. 24. tab. 1. fig. 9.

Habitat in Europa australiori.

103. *C. thorace mutico griseo nigro-punctato, ca-verticor-
pitis cornu erecto breuissimo.*

ais.

Scarabaeus verticicornis. Ent. syst. 1. 61.

199. * *Höllniss variet. n. G. flavipes*

Habitat in Anglia. Mus. Dom. Tunstall.

104. *C. ater, capitis tuberculo unico, elytris striatis.* *fulcator.*

Scarabaeus fulcator. Ent. syst. 1. 61. 200. *

Oliv. Inf. 1. 3. 142. 171. tab. 26. fig. 225.

Habitat Cajennae. Dom. Mallet.

105. *C. ater, thorace mutico, capite bituberculato, elytris maculis duabus rubris.* *apustulatus.*

ins.

Scarabaeus quadripustulatus. Ent. syst. 1. 61.

201. *

Oliv. Inf. 1. 3. 175. 219. tab. 15. fig. 141.

Habitat in noua Hollandia. Mus. Dom. Banks.

106. *C. niger thorace mutico, capite trituberculato, clypeo reflexo emarginato.* *reflexus.*

Scarabaeus reflexus. Ent. syst. 1. 61. 202. *

Voet. Scarab. tab. 27. fig. 36.

Scarabaeus Oryctes. Herbst. Col. 2. 215. tab.

14. fig. 14.

Habitat in China. Mus. D. Banks.

107. *C. ater, thorace inermi, clypeo tuberculis tribus: intermedio subcornuto.* *Hybneri.*

Scarabaeus Hybneri. Ent. syst. 1. 61. 203. *

Scarabaeus Tages. Oliv. Inf. 1. 3. 143. 173.

tab. 9. fig. 76.

vi. 2

Habitat in Hungaria. Dom. Hybner.

Ann. Mus. J. Alce. — Scriba Beitr. 1833. 2. 4. p. 55. C. gibbosus

4cornis.

108. *C. ater*, thorace vtrunque retuso, capite cornubus quatuor: lateralibus longioribus arcuatis.

Habitat Tranquebariae. Dom. Daldorff. Mus. d. Sehestedt.

Statura parua praecedentium. Capitis clypeus rotundatus, integer postice cornubus duobus porrectis, arcuatis et inter haec duo breuissimis erecta. Thorax ater, nitidus, antice vtrinquerefusus. Elytra striata, atra.

4dentatus.

109. *C. ater*, thorace mutico, capitis clypeo postice quadridentato. Ent. suppl. 34. 203.

Habitat Tranquebariae Dom. Daldorff.

Femina simillima, at omnino mutica.

cristatus.

110. *C. niger*, thorace mutico crenato, clypeo tuberculato quadridentato.

Scarabaeus cristatus. Ent. syst. 1. 62. 204.

Habitat in Aegypto. Prof. Forskahl.

Forte potius ad sequens genus amandandus mihi haud rite notus.

6. ATEVCHVS. *Palpi* postici ligulae basi adnati.

Mandibula brevis, membranacea, rotundata, ciliata.

Labium corneum, integerrimum.

Antennae clauato-lamellatae.

facies.

7. *A. clypeo* sexdentato, thorace inermi crenulato tibiis posticis ciliatis, elytris laeuibus.

See

Ateuchi corpus medium, ovatum, saepius gibbum, immarginatum

Scarabaeus sacer. Ent. syst. 1. 62. 205. Linn.

syst. Nat. 2. 545. 18. Mus. Lud. Vlr. 18.

Oliv. Inf. 1. 3. 150. 183. tab. 8. fig. 59. b.

Iabl. Col. 2. tab. 20. fig. 2.

Sulz. Hist. Inf. tab. 1. fig. 3.

Voet. Scarab. tab. 27. fig. 39. 40. *11. 9*

Schaeff. Icon. tab. 201. fig. 3.

Degeer Inf. 7. tab. 47. fig. 8.

Habitat in Europa australi, in Rossiae aridis globum e stercore bouino voluens.

Variat rarius dentibus clypei obsoletis tibiisque posticis minus ciliatis Scarabaeus impius *pinus*
Auct. at vix distinctus.

2. *A. clypeo sexdentato niger, elytris fulcatis.*

laticollis.

Scarabaeus laticollis. Ent. syst. 1. 62. 206.

Linn. syst. Nat. 2. 549. 38.

Oliv. Inf. 1. 3. 152. 185. tab. 8. fig. 68.

Iabl. Col. 2. tab. 20. fig. 6.

Geoff. Inf. 1. 89. 2. *11. 9*

Voet. Col. 2. tab. 27. fig. 41.

Habitat in China, in Europa australiori,

3. *A. clypeo sexdentato ater, thorace punctato elytris laevibus.* *semipunctatus.*

Scarabaeus semipunctatus. Ent. syst. 1. 63.

207. *

Habitat in Barbariae stercore. Dom. Vahl. *11. 2*

Euroxa australiore

4. A.

natum, tardum, clypeo porrecto, rotundato, saepius dentato, oculis parvis, rotundatis, vix prominulis, postice insertis, antennis brevibus, sub clypeo insertis, thorace rotundato, saepius gibbo, mutico, scutello nullo, elytris longitudine abdominis, rigidis, tegentibus, pedibus brevibus, validis, femoribus crassis, compressis, tibiis dentatis; tarsis quinquearticulatis, colore vario.

- variolosus.* 4. *A. clypeo sexdentato elytris que nigris: impressis variolosis.*
Scarabaeus variolosus. Ent. syst. 1. 63. 208. *
 Oliv. Inf. 1. 3. 131. 184. tab. 8. fig. 60.
 Habitat in Europa australiori. Dom. Saldoner.
- millaris.* 5. *A. clypeo sexdentato, thorace elytris que nigris & maculis eleuatis atris.*
Scarabaeus millaris. Ent. syst. 1. 63. 209. *
 Oliv. Inf. 1. 3. 167. 206. tab. 18. fig. 164.
 Habitat in India. Mus. Dr. Hunter.
- sanctus.* 6. *A. clypeo sexdentato cupreo nitens, thorace vtrinque ferrato, elytris porcatis.*
Copris sancta. Ent. suppl. 34. 209. *
 Habitat Tranquebariae. Mus. D. Sehestedt.
- morbillofus* 7. *A. clypeo sexdentato, thorace punctato, elytris striis eleuatis vndatis, tibiis posticis hirsutis.*
Scarabaeus morbillosus. Ent. syst. 1. 63. 210. *
 Habitat in Guinea. Dom. Isert.
- intricatus.* 8. *A. clypeo sexdentato, thorace punctato: linea dorsali eleuata, elytris lineis punctorum quadratorum.*
 Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Dom. Lund.
 Statura, magnitudo et summa affinitas *A. morbillosi*, cuius forte mera varietas. Thorax punctatus, ciliatus linea, dorsali parum eleuata. Elytra lineis punctorum eleuatorum, quadratorum. Pedes postici ciliati.
- profanus.* 9. *A. clypeo sexdentato, nigro-cyaneus, elytris laeuius.*
Scarabaeus profanus. Ent. syst. 1. 64. 211. *
 Habitat in Guinea. Dom. Isert.
- cyaneus.* 10. *A. clypeo sexdentato cyaneus, thorace punctato, elytris rugosis.*

Copris cyaneus. Ent. suppl. 34. 211. *

Habitat Tranquebariae. Dom. Daldorff.

11. *A. clypeo sexdentato nigro, pedibus posticis minutis elongatis.*

Scarabaeus minutus. Ent. syst. 1. 70. 236. *

Scarabaeus longipes. Oliv. Inf. 1. 3. 154. 202.

tab. 19. fig. 177.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Dom. Lee.

12. *A. clypeo quadridentato, thorace gibbo, elytris- que glabris, tibiis vndique ferratis.*

Scarabaeus Bacchus. Ent. syst. 1. 64. 212. *

Oliv. Inf. 1. 3. 153. 186. tab. 17. fig. 161.

Iabl. Col. 2. tab. 19. fig. 4.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Dr. Schulz.

13. *A. clypeo quadridentato nigro, elytris basi gibbere notatis.*

Scarabaeus gibbosus. Ent. syst. 1. 64. 213. *

Oliv. Inf. 1. 3. 154. 188. tab. 16. fig. 151. b.

Habitat in America.

14. *A. clypeo quadridentato laevis cyaneus, thorace vtrinque puncto impresso.*

Habitat in Guinea. Mus. Dom. Lund.

Statura omnino *A. finuati*. Clypeus rotundatus, quadridentatus: dentibus intermediis maioribus. Corpus planum, laeve, cyaneum, nitens. Thorax vtrinque puncto impresso. Elytra margine parum sinuato.

15. *A. clypeo quadridentato ater, elytris sulcatis.*

Scarabaeus Hollandiae. Ent. syst. 1. 65. 214. *

Oliv. Inf. 1. 3. 174. 217. tab. 13. fig. 117.

Habitat in noua Hollandia. Mus. Dom. Banks.

16. *A. obscure cupreus subtus niger, clypeo emarginato.*

Sea-

Scarabaeus Leei. Ent. syst. 1. 65. 215. *

Habitat in India orientali. Dom. Lee.

Variat ex Guinea totus cupreus, magis inaequalis

Scarabaeus fulgidus. Oliv. Inf. 1. 3. tab.

22. fig. 199. vix distinctus.

smaragdus,
lus,

17. A. clypeo bidentato aeneus nitidus laevissimus.

Scarabaeus smaragdulus. Ent. syst. 1. 70.

234. *

~~Oliv. Inf. 1. 3. 159. 194. tab. 14. fig. 191.~~

Habitat in America meridionali. Mus. Dr. Hunter.

muricatus.

18. A. clypeo subbidentato, thorace antice vtrinque videntato, elytris spinoso - striatis, pedibus elongatis.

Scarabaeus muricatus. Ent. syst. Append. 426.

215. *

Oliv. Inf. 1. 3. tab. 27. fig. 240.

Habitat in America.

Koenigii.

19. A. clypeo bidentato, thorace scabro, elytris variolosis.

Scarabaeus Koenigii. Ent. syst. 1. 65. 216. *

Oliv. Inf. 1. 3. 163. 200. tab. 9. fig. 77.

Tabl. Col. 2. tab. 19. fig. 8.

Pall. Icon. 17. tab. A. fig. 7.

Habitat Tranquebariae. Dr. Koenig.

Os maxillis palpisque. Palpi quatuor inaequales, anteriores longiores, quadriarticulati: articulo ultimo parum longiori, cylindrico, obtuso adhaerentes maxillae dorso, posteriores breves, pilosi, triarticulati: articulis subaequalibus adnati ligulae basi. Labrum reconditum, membranaceum, rotundatum, integrum. Mandibula brevis, membranacea, apice rotundata, ciliata. Maxilla basi cornea, in medio videntata, apice membranacea, rotundata. Ligula mem-

membranacea, bifida: laciniis compressis, acutis, intus ciliatis. Labium breue, corneum, rotundatum, integrum.

40. A. clypeo emarginato cinereo, pubescens, thorace elytrisque punctis eleuatis atris. *granulatus*

Scarabaeus granulatus. Ent. syst. 1. 65. 217. *

Oliv. Inf. 1. 3. tab. 8. fig. 67.

Habitat Tranquebariae. Mus. D. de Scheffedt.

41. A. clypeo emarginato nigro cupreus, thorace gibbo. *cupreus*.

Scarabaeus cupreus. Ent. syst. 1. 66. 218. *

Habitat in Africa aequinoctiali. Dom. Yeats.

42. A. clypeo emarginato; niger, thorace elytrisque scabris. *flagellatus*.

~~*Scarabaeus flagellatus*. Ent. syst. 1. 66. 219. *~~

Oliv. Inf. 1. 3. 162. 199. tab. 7. fig. 5.

Labl. Col. 2. tab. 20. fig. 4.

Habitat ad Cap. Bon. Spei, in Europa australiori.

Varietas maior e Barbaria in Museo Dom. Lund. vix distincta.

43. A. clypeo emarginato, thorace laevi, elytris scabris. *scabratus*.

Scarabaeus scabratus. Ent. syst. Append. 436.

219. * *Hispania et*

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Dom. Daldorff.

44. A. clypeo emarginato, thorace rotundato, elytris triangulis, femoribus posticis elongatis dentatis. *Schaefferi*.

Scarabaeus Schaefferi. Ent. syst. 1. 66. 220.

Linn. syst. Nat. 2. 550. 41.

Geoff. Inf. 1. 92. 9.

Oliv. Inf. 1. 3. 164. 201. tab. 5. fig. 41.

Labl. Col. 2. tab. 20. fig. 3.

Schaeff.

Schaëff. Icon. tab. 3. fig. 8.

Voet. Scarab. tab. 25. fig. 17.

Habitat in Galliae, Germaniae collibus apr
globulos e stercore ouino confectos voluet

Helwigii.

25. A. clypeo emarginato, gibbosus laevis ater, p
bus elongatis.

Copris Helwigii. Ent. suppl. 35. 220. *

Habitat Tranquebariae. Mus. Dom. de Sehest

voluens.

26. A. clypeo emarginato, niger opacus laevis,
race postice rotundato, elytris integris.

Scarabaeus voluens. Ent. syst. 1. 66. 221

Oliv. Inf. 1. 3. 161. 197. tab. 10. fig. 89.

Drury Inf. 1. tab. 35. fig. 7.

Voet. Col. tab. 27. fig. 37.

Degeer Inf. 4. tab. 18. fig. 14.

Habitat in Europa australiori globulos e ster
conficiens, voluens.

pillularius. 27. A. clypeo subemarginato, niger opacus laevis,
clypeo lineis duabus elevatis obliquis, an
nis nigris.

Scarabaeus pillularius. Ent. syst. 1. 67. 221

~~Linna. syst. Nat. 2. 550. 40. Mus. Lud. Vlr.~~

Geoff. Inf. 1. 91. 8.

Oliv. Inf. 1. 3. 161. 198. tab. 10. fig. 91.

Pall. Icon. 1. tab. A. fig. 3.

Sulz. Icon. tab. 1. fig. 7. *Herbst. V. 1. 20. 75*

Habitat in Europa australiori.

sinuatus.

28. A. clypeo emarginato, niger nitens, elytra
margine sinuato, antennis flavis.

Scarabaeus sinuatus. Oliv. Inf. 1. 3. tab.
fig.

t. 3. 21. fig.

Habitat in China. Mus. Dom. Lund.

Affinis certe *A. pillulario*, at tamen distinctus videtur. Clypeus magis fissus. Corpus magis planum, latius, nitidulum. Elytra substriata margine sinuato. Antennae flavae. Thorax postice vtrinque in angulum acutum excurrit.

29. *A. clypeo integro, fuscus, thorace aeneo: antice vtrinque oblique retuso.*

Scarabaeus obliquus. Ent. syst. 1. 67. 223. * ~~obliquus.~~

Oliv. Inf. 1. 3. 165. 203. tab. 9. fig. 78.

Habitat in Senegallia. Dom. Olivier.

30. *A. clypeo emarginato, ater, elytris striatis.*

Scarabaeus squalidus. Ent. syst. 1. 68. 224.

Habitat in stercore bouino Brasiliae. Mus. Dom. Banks.

Affinis *A. Koenigii*, at thorax laevis, obscurus et elytra simpliciter striata.

31. *A. clypeo emarginato, niger, thorace elytris-que elevato-striatis.* ~~planus.~~

Habitat in Insula Iava. Mus. D. Bosc.

Statura parva depressa *A. Schreberi*. Capitis clypeus late emarginatus. Thorax niger lineis sex elevatis, postice rotundatus. Elytra depressa, plana, lineis elevatis plurimis, duabus exterioribus distinctioribus. Tibiae anticae valde dentatae.

32. *A. clypeo subemarginato, ater nitidus, elytris maculis duabus rubris.* *Schreberi.*

Scarabaeus Schreberi. Ent. syst. 1. 68. 225.

Linn. syst. Nat. 2. 551. 45.

Geoff. Inf. 1. 91. 7.

Oliv. Inf. 1. 3. 172. 214. tab. 19. fig. 176.

Iabl. Col. 2. tab. 20. fig. 8.

Schaeff. Icon. tab. 73. fig. 6.

Illig. Col. Bor. 45. 9.

III. 6

Panz.

Panz. Fa. Germ. 28. tab. 14.

Habitat Halae Saxonum.

Varietas simillima vix distincta e Germania nior et thorace quadrituberculato.

bidentis.

33. *A. clypeo bidentato, ater nitidus, elytris lunissimis testaceis: macula marginali fusca.*
Habitat in America meridionali. Smidt. Mus. Lund.

Statura parua A. Schreberi. Clypeus ater, apice bidentatus. Thorax ater aeneo parum mixto nitidissimus, margine rotundato. Elytra laevissima, nitida brunnea: macula marginali triangulari, fusca.

glabratus.

34. *A. glaber ater, pedibus obscure rufis.*
Scarabaeus glabratus. Ent. syst. 1. 68. 226.
Habitat in Barbaria. Mus. Dom. Desfontaines.

laevigatus.

35. *A. clypeo rotundato, glaber ater, elytris striatis.*
Copris laevigata. Ent. suppl. 35. 226. *
Habitat in India orientali. Dom. Daldorff.

capistratus.

36. *A. clypeo bidentato, ater nitidus, elytris striatis, antennis flavis.*
Habitat in Carolina. Mus. Dom. Bosc.
Paullo maior A. Schreberi. Capitis clypeus magnus, rotundatus, antice late emarginatus vix potius bidentatus. Thorax ater, nitidus, vix punctatus: postice lineola parua media, impressa. Elytra nitida, simpliciter striata. Pedes nigri.

apustulatus

37. *A. clypeo rotundato, ater, elytris basi macula rufa.*
Scarabaeus apustulatus. Ent. syst. 1. 68. 227
Oliv. Inf. 1. 3. 174. 218. tab. 13. fig. 118.
Habitat in noua Hollandia. Mus. Dom. Banks.

38. A. clypeo rotundato, capite thoraceque pallido *pallipes*.
viridique variegatis, pedibus pallidis.

Scarabaeus pallipes Ent. syst. 1. 68. 228. *

Habitat in Coromandel. Mus. D. Banks.

Mas capitis cornu breui, erecto, compresso.

39. A. clypeo rotundato, nigricans, thoracis margi- *flauipes*.
nibus elytris pedibusque flavescentibus.

Scarabaeus flauipes. Ent. syst. 1. 70. 233. *

Schaeff. Icon. tab. 74. fig. 6.

Oliv. Inf. 1. 3. 169. 210. tab. 7. fig. 57.

Tabl. Col. 2. tab. 20. fig. 7.

Herbst. Arch. tab. 19. fig. 19.

Illig. Col. Bor. 1. 46. 11.

Panz. Fn. Germ. 48. tab. 11.

Habitat in Germaniae stercore.

40. A. clypeo rotundato, pallens, thorace nigro *pallens*.
punctato, elytris striatis flauo-punctatis.

Scarabaeus pallens. Oliv. Inf. 1. 3. t. 23. f. 203.

Habitat in Marocco. Mus. de Sehestedt.

Affinis certe A. flauipedis. Caput magis obscurum.

Thorax planus pallens punctis nigris. Elytra

striata, pallida punctis aliquot^{is} flauis, sparsis,

minus tamen distinctis.

41. A. clypeo rotundato, niger, elytrorum margine *cinctus*.
pallido.

Scarabaeus cinctus. Ent. syst. 1. 69. 231. *

Oliv. Inf. 1. 3. 169. 209. tab. 10. fig. 90. at

scutellatum pinxit ~~Tabl. Col. 2. tab. 14. fig. 11.~~

Habitat in China. Dom. Drury.

Clypeus vix emarginatus.

Spec. 38 - 41. forte potius ad *Onitis* genus aman-
dandae.

42. A. clypeo bidentato, niger, thoracis margine *triangula-*
obtusè angulato femoribusque pallidis. *ris.*

Scar.

Scarabaeus triangularis. Ent. syst. 1. 69. 229. *

Oliv. Inf. 1. 3. 166. 204. tab. 13. fig. 139.

Tabl. Col. tab. 19. fig. 5. 6.

Voet. Scarab. tab. 28. fig. ~~40~~ 44-48

Drury Inf. 1. tab. 36. fig. 7.

Habitat Surinami.

Variat totus ater, femoribus posticis tamen femper brunneis.

affinis.

43. *A.* clypeo bidentato, thorace aeneo: margine acute angulato, corpore nigro obscuro.

Habitat in America meridionali. Mus. D. de Sehestedt.

Statura et summa affinitas praecedentis et sequentis, qui forte omnes merae varietates coloris.

Clypeus rotundatus aeneus. Thorax rotundatus aeneus, nitidus, margine in angulum acutam excurrente. Elytra substriata, nigra.

melanocephalus.

44. *A.* clypeo bidentato, testaceus, capite thoracisque linea dorsali nigris.

Scarabaeus melanocephalus. Ent. syst. 1. 69. 230. *

Oliv. Inf. 1. 3. 173. 216. tab. 2. fig. 18.

Habitat in Americae Insulis. Dom. Olivier.

maculatus.

45. *A.* clypeo integro, capite thoraceque cupreis, elytris testaceis nigro-maculatis.

Habitat in Guinea. Mus. Dom. Lund.

Statura et magnitudo praecedentium. Capitis clypeus rotundatus, integer, cupreus. Thorax gibbosus, laevis, cupreus, nitidus. Elytra substriata, testacea, strigis duabus e maculis quadratis nigris. Corpus atrum.

politus.

46. *A.* clypeo submarginato, ater nitidus, elytris griseis: fascia media atra,

Co.

Copris polita. Entom. suppl. 35. 231. *
Habitat Tranquebariae. Dom. Daldorff.

47. *A. clypeo emarginato, fuscus, thorace griseo, punctatus.*
punctis sex nigris.

Scarabaeus sexpunctatus. Ent. syst. 1. 694.
232. *

Oliv. Inf. 1. 3. 167. 205, tab. 2. fig. 16.

Habitat Cayennae. Dom. Olivier.

48. *A. clypeo bidentato, laevis violaceo nitens, violaceus.*
ano rufo.

Copris violacea. Ent. suppl. 35. 233. *

Habitat in Insula St. Domingo. Mus. Dom. Bosc.

49. *A. clypeo bidentato, postice bituberculato, tho-* *bitubercu-*
race aeneo nitidulo. *latus.*

Habitat in America meridionali. Mus. Dom. de
Sehestedt.

Corpus paruum. Capitis clypeus rotundatus, ni-
ger, antice bidentatus, in medio tuberculis duobus
elevatis parvis. Antennae obscurae. Tho-
rax elevatus, rotundatus, niger, aeneo mox ma-
gis, mox minus nitidulus. Elytra substriata.
Pedes nigri.

50. *A. clypeo rotundato, nigricans, elytris testa-* *discoideus.*
ceis: macula communi transversa fusca.

Scarabaeus discoideus. Ent. syst. 1. 70. 235. *

Oliv. Inf. 1. 3. 171. 212. tab. 22. fig. 196.

Habitat in Africa. Mus. Dom. Olivier.

51. *A. clypeo rotundato, ater, antennis testaceis, aterrimus.*
elytris substriatis.

Copris aterrima. Ent. suppl. 35. 236. *

Habitat in India orientali, Dom. Daldorff.

52. *A. clypeo rotundato, niger, thorace rotundato* *onatus.*
sabaeneo, elytris abbreviatis.

E

Sca-

- Scarabaeus vitatus*. Ent. syst. 1. 70. 237. L.
syst. Nat. 2. 55f. 46.
Oliv. Inf. 1. 3. 175. 220. tab. 20. fig. 187.
Illig. Col. Bor. 1. 45. 10.
Panz. Fn. Germ. 48. tab. 11.
Tabl. Col. 2. tab. 20. fig. 9.
Herbst. Arch. tab. 19. fig. 18.
Habitat in Europae stercore bouino.
- chrysis*. 53. *A. clypeo rotundato, viridiaeneus nitidus, tennis pedibusque testaceis.*
Habitat in America meridionali. Mus. Dom. Sehestedt.
Paruus. Clypeus rotundatus, vix emarginatus viridiaeneus. Antennae testaceae. Thorax aeneus. Elytra striata aenea. Pedes testacei.
Variat colore nunc splendidiore, nunc magis fuscato.
- pufillus*. 54. *A. clypeo rotundato, pubescens obscurus.*
Copris pufilla. Ent. suppl. 36. 238. *
Habitat in India orientali. Dom. Daldorff.
- variegatus*. 55. *A. clypeo emarginato, thorace elytrisque fuscis flavoque variegatis.*
Copris variegata. Ent. suppl. 36. 238. *
Habitat in India orientali. Dom. Daldorff.
- paruulus*. 56. *A. clypeo emarginato, corpore nigro immaculato.*
Copris paruula. Ent. suppl. 36. 238. *
Habitat in India orientali. Dom. Daldorff.
- fusco-punctatus*. 57. *A. clypeo emarginato, niger, thorace elytrisque griseis fusco-punctatis.*
Copris fusco-punctata. Ent. suppl. 36. 241.
Habitat in India orientali. Dom. Daldorff.
- femoratus*. 58. *A. clypeo emarginato, ater nitens, pedibus 11. femoribus posticis compressis clauatis.*

Ha

Habitat in America meridionali. Mus. D. Lund.
 Minutus. Capitis clypeus rotundatus, apice emarginato bidentatus. Thorax et elytra laevia, atra, immaculata. Pedes omnes rufi, femoribus posticis compressis, crassioribus.

Subicornis

APHODIVS. *Palpi* postici, articulis globosis, ligulae medio adhaerentes.
Mandibula membranacea compressa.
Labium corneum, lateribus rotundatis, apice emarginatum.
Antennae clauato-lamellatae.

* *capite tuberculato.*

A. capite tuberculis tribus: medio subcornuto, *Sorex.*
 elytris striatis griseis: margine nigro.

Scarabaeus Sorex. Ent. syst. I. 23. 71. *

Habitat in China. Mus. Dom. de Sehestedt.

A. thorace retuso, capite tuberculis tribus: medio subcornuto. *Fossor.*

Sca-

Aphodii corpus paruum, oblongum, gibbum, emarginatum, tardum, clypeo os tegente porrecto, rotundato, interdum tuberculato, oculis parvis, rotundatis, supra vix conspicuis, angulo postico marginis utrinque infertis, antennis brevibus sub clypeo ante oculos adnatis, thorace gibbo, laevi: marginibus deflexis, scutello parvo, rotundato, elytris longitudine abdominis, rigidis, includentibus, pedibus brevibus, validis, femoribus compressis, tibiis anticis compressis, apice latioribus, dentatis, posticis dentato-ciliatis, tarsis quinque-articulatis, colore nigro aut obscuro,

Scarabaeus Foffor. Ent. syst. 1. 23. 72. L.
Syst. Nat. 2. 548. 31. Fn. Sv. 384.

Jllig. Col. Bor. 1. 19. 3.

Geoff. Inf. 1. 82. 20.

III. Oliv. Inf. 1. 3. 75. 78. tab. 20. fig. ~~148~~ ^{189. a b}

Iabl. Col. tab. 12. fig. 1.

Voet. Col. tab. 21. fig. 141. 142.

Schæff. Icon. tab. 144. fig. 7. 8.

Degeer. Inf. 4. tab. 10. fig. 7.

Habitat in Europæ stercore.

Os maxillis palpisque. *Palpi* quatuor inaequales, filiformes: *anteriores* paullo longior quadriarticulati: articulo secundo longior tertio brevis, ultimo longiori, cylindrico, olfo, adhaerentes maxillae dorso: *posteriores* breviores, triarticulati: articulis brevibus, tondatis, pilosis, adnati ligulae medio exteriori. *Labrum* reconditum, membranaceum, transversum, truncatum. *Mandibula* brevis, membranacea, compressa, rotundata, nuda. *Ligula* membranacea, bifida: laciniis elongatis, in medio incrassatis, palpigeris, apice obtusis. *Labium* corneum, lateribus rotundatis, apice exginatum.

Variat rarius elytris brunneis.

elongatulus 3. A. thorace laevi, capite tuberculis tribus: in medio longiori cornuto.

Habitat in China. Mus. D. de Schæffedt.

Statura omnino Aph. Fofforis at duplo fere minor. *Capitis* clypeus rotundatus, integer tuberculis tribus elevatis: intermedio longiori, cornuto. *Thorax* laevis nitidus. *Elytra* crenato-fimbriata. *Corpus* subtus ferrugineum.

conjugatus

~~*postatus*~~

4. A. capite trituberculato, elytris pallidis: fimbriata abbreviata nigra.

Habitat in Austria. Dom. Mecherle.

Statura et magnitudo A. Fofforis. Caput atrum, submarginatum, tuberculis tribus: medio majori. Thorax punctatus, ater, nitidus. Antice macula laterali, pallida. Elytra striata, pallida: fascia lata, dentata, atra, quae tamen marginem anteriorem haud attingit. Corpus nigrum.

III

A. capite tuberculis tribus, elytris abdomineque scrutator.
rulis.

Scarabaeus scrutator. Ent. syst. 1. 24. 73. *

Scarabaeus rufidus. Oliv. Inf. 1. 3. 77. 80 tab. III. 2
26. fig. 224. Herbst. Col. tab. 16. fig. 6.

Habitat in Europa australi. Dom. Prof. Helwig.

A. capite tuberculis tribus, elytris striatis, testaceis. Hydrochaeris.

Scarabaeus hydrochaeris. Ent. suppl. 23. 1. *

Habitat in Tanger. Schoustoe. Mus. Dom. de Sehestedt.

A. ater nitidus, capite tuberculis tribus validis, fulcatus.
elytris fulcatis: fulcis rugosis.

Scarabaeus fulcatus. Ent. syst. 1. 24. 74. *

Habitat in Germania. Mus. Dom. de Loewen-
skiold. *Ann. 75. 1. no. 24. Tab. 14.*

A. capite tuberculis tribus: medio acuto, ely- foetens.
trorum limbo ferrugineo.

Scarabaeus foetens. Ent. syst. 1. 24. 75. *

Schaeff. Icon. tab. 144. fig. 5.

Hig. Col. Bor. 1. 31. 24.

Panz. Fn. Germ. 48. tab. 1.

Herbst. Col. 2. tab. 12. fig. 5.

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

A. capite tuberculis tribus aequalibus, niger, ely- ovalis.
tris apice ferrugineis.

Scar-

Scarabaeus analis. Ent. syst. 1. 25. 76.
 Habitat in India orientali. Mus. Dom. Lund.

scybalarius 10. A. capite tuberculis tribus: medio acuto,
 tris striatis testaceis.

Scarabaeus scybalarius. Ent. syst. 1. 25. 7

Scarabaeus fimetarius. Linn. syst. Nat. 2. 5

11. 1. 32. β.

Illig. Col. Bor. 1. 33. 26.

Oliv. Inf. 1. 3. 84. tab. 26. fig. 226.

Voet. Col. tab. 21. fig. 146.

Iabl. Col. 2. tab. 12. fig. 2.

Panz. Fn. Germ. 47. tab. 1.

Habitat in Germania.

prodromus. 11. A. capite tuberculis tribus, elytris crenato-striatis, griseo-fuscis, thoracis margine pedibus flavis.

~~*Aphodius prodromus.* Illig. Col. Bor. 1. 36. γ. δ.~~

Scarabaeus icterus. Payk. Fn. Sv. 1. 17. 21

Habitat in Germania. Dom. Mecherle.

Parvus. Clypeus laevis, emarginatus, niger,
 teribus subflavescentibus, in medio tuberculo
 tribus minutis. Thorax laevis, ater, margi-
 flavo. Elytra crenato-striata, grisea, fusc-
 nebulosa. Corpus nigrum, pedibus flavis.

obsoletus. 12. A. capite trituberculato, elytris striatis griseo-
 vittis duabus flavescentibus futuraeque nigrae
 Habitat in India orientali. Dom. Daldorff.

Statura parva praecedentis. Caput nigricans
 tuberculis tribus minutis. Thorax laevis, at-
 lateribus flavescentibus. Elytra striata, griseo-
 vitta flava fere marginali, aliaque ad futurae
 postice coeuntibus. Sutura ipsa atra. Ped-
 obscuri, femoribus posticis flavis.

13. *A. capite tuberculis tribus aequalibus, elytris terrestris.*
punctato-friatis obscurioribus.

Scarabaeus terrestris. Ent. syst. 1. 25. 78. *

Aphodius terrestris. Illig. Col. Bor. 1. 24. 13.

Oliv. Inf. 1. 3. 77. 8. tab. 24. fig. 209. *V. 1.*

Panz. Fn. Germ. 47. tab. 3.

Habitat in Anglia, Germania.

14. *A. capite tuberculis tribus obsoletis, elytris obscurus.*
striatis. *Arthemioides Sturm Handb. 1. 144*

Scarabaeus obscurus. Ent. syst. 1. 25. 79. * *VIII. 1.*

Habitat in Germaniae stercore.

15. *A. capite tuberculis tribus: medio subcornuto, ater.*
elytris striis laevissimis.

Scarabaeus ater. Ent. syst. 1. 26. 80. *

Aphodius ater. Illig. Col. Bor. 1. 19. 4. ?

Panz. Fn. Germ. 43. tab. 1. *Creat. V. 11. 2.*

Habitat Kiliae.

16. *A. capite tuberculis tribus: medio subcornuto, Porcus.*
elytris substriatis rufis.

Scarabaeus Porcus. Ent. syst. 1. 26. 81. *

Scarabaeus Anachoreta. Panz. Fn. Germ. 36.

tab. 1. *III. 6*

Aphodius Porcus. Illig. Col. Bor. 1. 31. 22.

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

17. *A. capite subtrituberculato, elytris striatis: macula baseos rufa.*
amaculatus

Scarabaeus amaculatus. Ent. syst. 1. 26. 82. *

Oliv. Inf. 13. 85. 91. tab. 9. fig. 72.

Panz. Naturf. 24. 3. 2. tab. 1. fig. 2. *IV. 2.*

Panz. Fn. Germ. 43. tab. 2.

labl. Col. 2. tab. 1. fig. 14.

Habitat in Germania. Dom. Hybner.

Varietatem A. terrestris; Dom. Illiger credit at vix merito.

subterraneus. 18. A. capite tuberculis tribus, ater, elytris fere crenatis.

Scarabaeus subterraneus. Ent. syst. 1. 23.

Aphodius subterraneus. Illig. Col. Bor. 1. 20

Oliv. inf. 1. 3. 76. 79. tab. 18. fig. 162.

Iabl. Col. 2. tab. 11. fig. 6.

Panz. Fn. Germ. 28. tab. 3.

IV. 1.

Habitat in Europae stercore frequens.

Variat rarius elytris obscure rufis.

fmietarius. 19. A. capite tuberculato, ater, elytris rufis.

Scarabaeus fmietarius. Ent. syst. 1. 27.

Linu. syst. Nat. 2. 548. 32. Fn. Sv. 385.

Aphodius fmietarius. Illig. Col. Bor. 1. 32.

Geoff. Inf. 1. 81. 18.

Oliv. Inf. 1. 3. 78. 82. tab. 18. fig. 167.

Iabl. Col. 2. tab. 12. fig. 4.

Fresh. Inf. 4. tab. 19. fig. 3.

Roess. Inf. 2. tab. A. fig. 3.

III. 3.

Panz. Fn. Germ. 31. tab. 2.

Schaeff. Icon. tab. 144. fig. 6.

Voet. Scarab. tab. 21. fig. 147.

Habitat in Europae stercore frequens.

Variat thorace antice retuso, forte sexu.

conflagratus. 20. A. capite tuberculato, ater, thorace immaculato, elytris striatis griseis: macula nigra.

Scarabaeus conflagratus. Ent. syst. 1. 27. 8.

IV. 7. Oliv. Inf. 1. 3. 80. 85. tab. 26. fig. 220.

Iabl. Col. 1. tab. 12. fig. 7.

Habitat in Germaniae stercore. Dom. Smidt.

Varietatem A. scybalarii putat Illiger, an meriti

erraticus. 21. A. capite tuberculo unico, niger, elytris fuscis.

Aphodii in stercore degunt, at haud sub stercore fodiant, Scarabaei; nec globulos e stercore confectos voluunt Coprides.

Scarabaeus erraticus. Ent. syst. 1. 27. 86. Linn.

syst. Nat. 2. 548. 29. Fn. Sv. 383. IV. 9.

Aphodius erraticus. Illig. Col. Bor. 1. 34. 27.

Oliv. Inf. 1. 3. 179. 83. tab. 18. fig. 163.

Panz. Fn. Germ. 47. tab. 4.

Iabl. Col. 2. tab. 12. fig. 6.

Herbst. Arch. tab. 19. fig. 2.

Habitat in Europae stercore.

Variat rarius elytris nigris; margine tantum exterioriore fusco.

22. *A. capite tuberculato, thoracis lateribus albidis, conspurcatus.*
elytris striatis griseis, fusco-maculatis. tus.

Scarabaeus conspurcatus. Ent. syst. 1. 28. 87. *

Linn. syst. Nat. 2. 549. 34. Fn. Sv. 387.

Geoff. Inf. 1. 82. 19. IK. 9.

Illig. Col. Bor. 1. 25. 15.

Oliv. Inf. 1. 3. 81. 86. tab. 24. fig. 210.

tab. 25. fig. 214.

Iabl. Col. 2. tab. 12. fig. 8.

Habitat in Europae stercore frequens.

23. *A. capite trituberculato, elytris griseis fusco-inquinatus.*
maculatis.

Scarabaeus inquinatus. Ent. syst. 1. 28. 88. *

Oliv. Inf. 1. 3. 348. 90. tab. 26. fig. 221. III. 3

Iabl. Col. 2. tab. 12. fig. 13.

Habitat in Europae stercore.

Scarabaeus taffellatus. Paykull. 1. 20. 24. vix differt.

Ab *A. conspurcato* omnino distinctus.

24. *A. capite tuberculato, ater, thorace laevi, elytris striatis, pedibus ferrugineis.* nigrita.

Habitat in Isle de France. Mus. D. de Sehestedt.

Parus. Capitis clypeus rotundatus, tuberculis tribus, ater, antennis testaceis. Thorax laevis, ater,

- ater, nitidus, immaculatus. Elytra striata.
Corpus nigrum, pedibus ferrugineis.
- futuralis.* 25. A. capite trituberculato, nigricans, elytris tenebris, futura nigra.
Scarabaeus futuralis. Ent. syst. 1. 28. 89. ♀
Habitat in Americae Insulis. Dr. Pflug.
- fordidus.* 26. A. capite tuberculato thorace nigro: margine pallido, puncto nigro, elytris griseis.
Scarabaeus fordidus. Ent. syst. 1. 29. 90. ♀
Aphodius fordidus. Illig. Col. Bor. 1. 32. 25
Oliv. Inf. 1. 3. tab. 25. fig. 216.
Iabl. Col. 2. tab. 12. fig. 9.
Schaeff. Icon. tab. 74. fig. 3.
Herbst. Arch. tab. 19. fig. 3.
Panz. Fn. Germ. 48. tab. 2.
Naturf. 24. 4. tab. 1. fig. 4.
Habitat in Europae stercore.
- rufus.* 27. A. capite tuberculato, niger, elytris striatis, a domineque rufis.
Scarabaeus rufus. Moll. Nat. Bric. 1. 160. 6.
Scarabaeus fordidus. Paykull. Fn. Sv. 1. 1. 15. β.
Habitat in Europa boreali. Mus. D. deScheffel.
Statura omnino A. fordidi, et forte mera eius varietas. Caput trituberculatum, minus nigrum.
Thorax niger, interdum macula apicis vtrinque rufa. Elytra striata, rufa: striis laevibus. Corpus obscurum, abdomine pedibusque rufis.
- Atachora-* 28. A. capite tuberculo unico, ater, elytrorum margine striaque ad futuram pallescentibus.
ta. Habitat in Germania. Mus. Dom. Bosc.
- 11.1.* Paruus. Caput nigrum, antice pallescens, margine antice subreflexo tuberculoque unico elevato, subcornuto. Thorax laevis, ater, nitidus, marginibus

fordidus. Genty. V. 44. 17. T. 1. f. 7.

margine omni pallescente. Elytra striata, atra,
 margine lato pallescente. Sutura nigra at
 te futuram stria pallescens. Corpus et pedes
 pallescens.

29. A. clypeo tuberculo solitario, niger, elytris po- granarius.
 fice testaceis.

Scarabaeus granarius. Ent. syst. 1. 29. 92. *
 Linn. Syst. Nat. 2. 547. 23.

Aphodius granarius. Illig. Col. Bor. 1. 22. 11.

Oliv. Inf. 1. 3. 82. 88. tab. 18. fig. 172.

Panz. Fn. Germ. 43. tab. 3. V. 4.

Iabl. Col. 2. tab. 12. fig. 10. IV. 4

Habitat in Europae stercore.

30. A. capite tuberculato, thorace punctato, elytris *haemorrhoi-
 striatis apice rufis. dalis.*

Scarabaeus haemorrhoidalis. Ent. syst. 1. 29.
 93. * Linn. Syst. Nat. 2. 548. 33. Fn. Sv.
 386.

Aphodius haemorrhoidalis. Illig. Col. Bor. 1.
 22. 12.

Panz. Fn. Germ. 28. tab. 8.

Oliv. Inf. 1. 3. 83. 89. tab. 26. fig. 223. VII. 3.

Iabl. Col. 2. tab. 12. fig. 11.

Herbst. Arch. tab. 19. fig. 4.

Habitat in Europae stercore.

31. A. capite quadrituberculato, ater, elytris striatis. *quadritu-
 berculatus.*

Scarabaeus quadrituberculatus. Ent. suppl. *berculatus*
 23. 94. *

Habitat in America. Dom. Hybner.

32. A. capite quadrituberculato, ferrugineus, ely- nitidulus.
 tris pallidis.

Scarabaeus nitidulus. Ent. syst. 1. 30. 94. * VIII. 1.

Habitat in Europae stercore.

- ** capite mutico.
- 7maculatus* 33. *A. muticus* obscurus, elytris striatis, palli nigro-maculatis.
Scarabaeus 7maculatus. Ent. syst. 1. 34. 10.
 Oliv. Inf. 1. 3. 86. 96. tab. 4. fig. 134.
 Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. D. Bank
- apunctatus* 34. *A. muticus*, thorace nigro, rubro-marginato elytris rubris: puncto nigro.
Scarabaeus apunctatus. Ent. syst. 1. 34. 10.
 Lepech. Itin. 2. 324. tab. 10. fig. 7.
 Pall. Icon. Inf. 1. 12. tab. A. fig. 12.
 Illig. Col. Bor. 1. 18. 1.
 IV. 4. Panz. Fn. Germ. 28. tab. 9.
 Iabl. Col. 2. tab. 16. fig. 10.
 Habitat in Europae stercore equino.
- rufipes*. 35. *A. muticus*, ater, thorace glabro nitido, elytris striatis, pedibus rufis.
Scarabaeus rufipes. Ent. syst. 1. 34. 110.
 Linn. syst. Nat. 2. 559. 86. Fn. Sv. 403.
Aphodius oblongus. Illig. Col. Bor. 1. 19. 2.
 Oliv. Inf. 1. 3. 87. 94. tab. 18. fig. 171.
 IV. 4. Panz. Fn. Germ. 47. tab. 10.
 Iabl. Col. 2. tab. 28. fig. 2.
 Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 6.
 Habitat in Europae stercore.
- nigripes*. 36. *A. muticus*, niger, thorace subpunctato, elytris striatis, pedibus nigris.
Scarabaeus nigripes. Ent. syst. 1. 35. 111. 0.
Aphodius rufipes. Illig. Col. Bor. 1. 28. 18.
 IV. 5. Panz. Fn. Germ. 47. tab. 9.
 Iabl. Col. 2. tab. 19. fig. 3.
 Habitat in Europae stercore.
- luridus*. 37. *A. muticus*, ater, elytris griseis, nigro-striatis
Scarabaeus luridus. Ent. syst. 1. 29. 81. 0

- Aphodius rufipes*. Illig. Col. Bor. 1. 18. 7.
 Panz. Fn. Germ. 47. tab. 7. 8.
 Tabl. Col. 2. tab. 18. fig. 3. *IV. 4.*
 Schaeff. Icon. tab. 26. fig. 8.
 Voet. Scarab. tab. 21. fig. 145.
 Habitat in Europae stercore.
 Affinis praecedenti et specimina plura transitum
 ad *A. nigripedem* afficiunt forte generatione hy-
 brida orta. Vix tamen mera varietas praecedentis.
38. *A. muticus, niger, elytris striatis: maculis dilutarius.*
 distinctis nigris.
Scarabaeus lutarius. Ent. syst. 1. 35. 112. *
 Habitat in Germaniae stercore. Dom. Smidt.
 Elytra crenato-striata, grisea, maculis aliquot distinctis nigris.
39. *A. muticus ater, elytris striatis griseis: signaturis fuscis. contaminatus.*
Scarabaeus contaminatus. Ent. syst. 1. 35. 114. *
Aphodius contaminatus. Illig. Col. Bor. 1. 26. 16. Creutz. Inf. 34. tab. 1. fig. 5. *IV. 5.*
 Herbst. Arch. tab. 19. fig. 13.
 Habitat in Germaniae stercore. Dom. Smidt.
 Thorax laevis ater, vtrinque macula antica pallida.
40. *A. muticus ater, thoracis margine pallido, elytris striatis griseis: macula disci fusca. consputus.*
Scarabaeus consputus. Creutz. Inf. 41. 11. tab. 1. fig. 6. *V. 7.*
 Habitat in stercore humano.
 Affinis certe *A. contaminato*, at margo thoracis totus pallidus et macula magna disci fusca.
41. *A. muticus niger obscurus, elytris striatis obscure rufis. immundus.*
IV. 5.
 Habi-

Habitat in Germania.

Paullo minor A. Pecari et distinctus. Caput thorax nigra, obscura, Elytra simpliciter striata, obscure rufa, subholosericea. Corpus grum.

amaculatus 42. A. muticus oblongus niger, thorace, elytrorum maculis pedibusque rubris.

Scarabaeus amaculatus. Ent. syst. I. 36. 115

Aphodius aguttatus. Illig. Col. Bor. 35. 32.

Oliv. Inf. I. 3. 92. 103. tab. 19. fig. 174.

Panz. Fn. Germ. 28. tab. 10.

IV. A. Panz. Naturf. 24. 43. tab. 1. fig. 3.

Tabl. Col. 2. tab. 18. fig. 10.

Habitat in Anglia, Germania.

apustulatus 43. A. muticus oblongus niger, thorace immaculato, elytris maculis duabus rubris, pedibus nigris.

Scarabaeus apustulatus. Ent. syst. I. 36. 116.

Scarabaeus amaculatus. Linn. syst. Nat. 2. 55.

84. Fn. Sv. 398.

Aphodius amaculatus. Illig. Col. Bor. I. 3. 33. Panz. Fn. Germ. 43. tab. 5.

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

Sus. 44. A. muticus oblongus obscure rufus, elytris testaceis nigro-maculatis.

Scarabaeus sus. Ent. syst. I. 36. 117.

Aphodius sus. Illig. Col. Bor. I. 27. 17.

Oliv. Inf. I. 3. tab. 1. fig. 14.

III. A. Panz. Fn. Germ. 28. tab. 11.

Habitat in Germaniae stercore.

moestus. 45. A. muticus, ater, thorace margine griseo: puncto nigro, elytris striatis griseis: maculis duabus nigris.

Habitat in India orientali. Dom. Daldorff.

Statu

Statura et magnitudo omnino *A. fordidi*. Caput laeve, muticum, atrum. Thorax ater margine laterali et postico griseis, laterali puncto nigro. Elytra striata, grisea, maculis duabus linearibus disci nigris. Corpus obscurum, pedibus griseis.

46. *A. muticus*, gibbosus, ater, elytris crenato-striatis, clypeo emarginato: *elevatus*.

Scarabaeus elevatus. Ent. syst. 1. 37. 118. VIII. 1

Oliv. Inf. 1. 3. tab. 21. fig. 190. a. b.

Habitat in Gallo prouincia. Mus. Dom. Olivier.

47. *A. muticus*, niger, elytris plaga rufescente: *plagiatus*

Scarabaeus plagiatus. Ent. syst. 1. 37. 119. *

Linn. syst. Nat. 2. 539. 85. IV. 6.

Oliv. Inf. 1. 3. 92. 104. tab. 25. fig. 215.

Habitat in Svecia.

Variat elytris totis nigris obseruante D. Helwig.

48. *A. muticus*, niger, thoracis elytrorumque margine testaceo: *marginellus*.

Scarabaeus marginellus. Ent. syst. 1. 37. 120. *

Oliv. Inf. 1. 3. 91. 103. tab. 13. fig. 116.

Habitat in Coromandel. Mus. Dom. Banks.

49. *A. muticus*, niger, elytris striatis: margine fasciata: postica ferrugineis: *fasciatus*.

Scarabaeus fasciatus. Ent. syst. 1. 37. 121. *

Oliv. Inf. 1. 3. 90. 99. tab. 14. fig. 130.

Habitat in Kamtschatka. Mus. Dom. Banks.

50. *A. muticus*, niger, elytris fulcatis, piceis, ferrugineo-punctatis: *testudinarius*.

Scarabaeus testudinarius. Ent. syst. 1. 38.

122. *

Aphodius testudinarius Illig. Fn. Bor. 1. 35. 80. III. 5

Oliv. Inf. 1. 3. 93. 105. tab. 20. fig. 186.

Tabl. Col. 2. tab. 18. fig. 13.

Panz.

Panz. Fn. Germ. 18. tab. 12.

Herbst. Arch. tab. 19. fig. 7.

Habitat in Anglia: Dr. Solander.

Scrofa. 51. *A. muticus*, oblongus, niger, elytris subfufcis.

Scarabaeus Scrofa. Ent. syst. 1. 38. 123. *

Aphodius Scrofa. Illig. Col. Bor. 1. 34. 29.

IV. 6. Panz. Fn. Germ. 47. tab. 12.

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

merdarius. 52. *A. muticus*, elytris testaceis: futura nigra.

Scarabaeus merdarius. Ent. syst. Append. 4

123. Linn. syst. Nat. 2. 558. 84.

Aphodius merdarius. Illig. Col. Bor. 1. 34.

Oliy. Inf. 1. 3. 94. 107. tab. 19. fig. 173.

IV. 7. Iabl. Col. 2. tab. 18. fig. 5.

Habitat in Europae stercore.

atricapillus.

53. *A. muticus*, griseus, capite atro.

Scarabaeus atricapillus. Ent. suppl. 24. 124.

Habitat in India orientali. Mus. D. de Sehested.

Pecari.

54. *A. muticus*, ater, nitidus, elytris striatis rufis: futura nigra, pedibus rufis.

Scarabaeus Pecari. Ent. syst. 1. 38. 125. *

Aphodius Pecari. Illig. Col. Bor. 1. 29. 20.

Scarabaeus satellitius. Iabl. Col. 2. tab. 18. fig. 1.

III. 5.

Panz. Fn. Germ. 31. tab. 3.

Habitat in Hungaria. Dom. Hybner.

depressus.

55. *A. muticus*, ater, nitidus, elytris striatis rufis: pedibus nigris.

Scarabaeus depressus. Ent. syst. Append. 42

125. *

Aphodius depressus. Illig. Col. Bor. 1. 28. 1

IV. 7. Panz. Fn. Germ. 39. tab. 1.

Habitat in Germaniae stercore.

56. *A. muticus fuscus*, elytris crenato-friatis. *Sabuleti*.
Scarabaeus Sabuleti. Ent. suppl. 24. 125. *
Aphodius Sabuleti. Illig. Col. Bor. 1. 21. 7.
 Panz. Fn. Germ. 37. tab. 3. *IV. 11.*
 Habitat in Svecia. Muf. Dom. Lund.
 Obscurus, minime nitens.
57. *A. muticus fuscus*, elytris porcatis. *porcatus*.
Scarabaeus porcatus. Ent. syst. 1. 38. 126. *
 Oliv. Inf. 1. 3. 90. 109. tab. 19. fig. 128.
 Iabl. Col. 2. tab. 18. fig. 12.
 Panz. Fn. Germ. 28. tab. 13. *IV. 5*
 Herbst. Arch. tab. 19. fig. 9.
 Habitat in Saxoniae stercore.
58. *A. muticus ater*, elytris friato-crenatis, clypeo *stercorator*.
 emarginato.
Scarabaeus stercorator. Ent. syst. 1. 39. 127. *
 Oliv. Inf. 1. 3. 89. 98. tab. 17. fig. 155.
 Iabl. Col. 2. tab. 19. fig. 2.
 Habitat in America meridionali.
59. *A. muticus ater*, thorace varioloso, elytris crenato-friatis. *tibialis*.
Scarabaeus tibialis. Ent. suppl. 24. 127. *
 Habitat in Tanger. D. Schousboe. Muf. Dom.
 de Sehestedt.
60. *A. muticus ater*, elytris friatis: margine ferrugineo. *impudicus*.
 Habitat in India orientali. Dom. Daldorff. Muf.
 D. Lund.
 Paruus. Capitis clypeus rotundatus, vix emarginatus. Thorax laevis, ater, nitidus. Elytra simpliciter friata, atra: margine ferrugineo.
 Corpus atrum, pedibus ferrugineis.
Varietas maior, vix distincta e Sumatra.

asper.

61. *A. muticus*, capite thoraceque transversim sulcatis, elytris striatis.

Scarabaeus asper. Ent. syst. 1. 39. 128. *

Aphodius asper. Illig. Col. Bor. 1. 21. 8.

Oliv. Inf. 1. 3. 94. 106. tab. 23. fig. 204.

IV. 8 Panz. Fn. Germ. 47. tab. 13.

Herbst. Arch. tab. 19. fig. 10.

Habitat in Europæ stercore.

rufus.

62. *A. muticus rufus*, elytris striatis.

Scarabaeus rufus. Ent. syst. 1. 39. 129. *

Habitat in Suecia. Mus. D. de Sehestedt.

Femora postica incrassata.

arenarius.

63. *A. muticus ater*, elytris striatis, tibiis piceis.

Scarabaeus arenarius. Ent. syst. 1. 39. 130. *

Aphodius arenarius. Illig. Col. Bor. 1. 22. 10.

Geoff. Inf. 1. 86. 29.

Oliv. Inf. 1. 3. 96. 110. tab. 24. fig. 406.

V. 4.

Iabl. Col. 2. tab. 18. fig. 6.

Habitat in Sueciæ arenosis.

foetidus.

64. *A. muticus ater*, elytris crenato-striatis, rufis.

Scarabaeus foetidus. Ent. syst. 1. 40. 131. *

IV. 8

Aphodius foetidus. Illig. Col. Bor. 1. 30. 21.

Scarabaeus putridus. Iabl. Col. 2. tab. 12.

fig. 15.

Habitat in Germaniæ stercore. Dom. Smidt.

caesus.

65. *A. muticus cylindricus niger*, elytris simpliciter striatis, clypeo emarginato.

Scarabaeus caesus. Panz. Fn. Germ. . tab. .

Habitat in Germania. Dom. Scheidler,

III. 7.

Differt a reliquis omnibus statura parva, cylindrica. Clypeus emarginatus. Thorax laevis.

Elytra striata, at striis omnino simplicibus. Pedes obscure ferruginei.

8. HEXODON. *Maxilla* porrecta, cornea,
apice tridentata, dentibus
fissis.

Labium late emarginatum.

Antennae lamellatae.

1. *H. atrum* elytris reticulatis griseis. Ent. syst. 1. *reticulatum*
71. 1. ♀

Hexodon reticulatum. Oliv. Inf. 1. 7. t. 1. f. 1.

Habitat in Madagascar. Mus. Nat. Galliae.

2. *H. atrum* immaculatum. Ent. syst. 1. 72. 2. *unicolor*.

Hexodon unicolor. Oliv. Inf. 1. 7. tab. 1. fig. 2.

Habitat in Madagascar. Mus. Nat. Galliae.

9. HISTER. *Maxilla* unidentata.

Labium corneum, cylindricum,
integrum.

Antennae clavae solidae.

* *Corpore* ovato, convexo.

1. *H. ater*, elytris substriatis, thoracis marginibus *maior*
ciliatis. Ent. syst. 1. 72. 1. Linn. syst. Nat.

2. 566. 2.

14/19

Oliv.

Hexodontis corpus ovatum, supra convexum, subtus planum,
immarginatum, capite parvo, prominulo, oculis rotunda-
tis, antennis brevibus: articulo primo crassiori, secundo
breuissimo, ultimis tribus lamellatis, thorace lato, scutello
breui, lato, elytris longitudine abdominis, pedibus me-
diocribus, tibiis anticis dentatis, reliquis pilosis, tarsis
quinquearticulatis, colore obscuro.

Generis characterem naturalem in Entomologia systematica
dedi.

Histerum corpus subrotundum, gibbum, antice posticeque obtu-
sam, fere truncatum, glabrum, rarius depressum, planum.

F 2

capi-

Oliv. Inf. 1. 6. 6. 3. tab. 1. fig. 4.

~~Herbst. Col. 4. tab. 3. fig. 10.~~

~~Voet. Col. tab. 31. fig. 6.~~

Habitat in Africa.

inæqualis. 2. *H. ater*, nitidus, elytris externe friatis, marginalibus capite longioribus. Ent. suppl. 37.

17. 15. *Hister laevis*. Ross. Fn. Etr. 1. 30. 68.

Habitat in Germania. Dom. Panzer.

unicolor. 3. *H. ater*, elytris oblique trifriatis, tibiis tridentatis. Ent. syst. 1. 72. 2. Linn. syst. Nat. 567. 3. Fn. Sv. 440.

Oliv. Inf. 1. 6. 7. 5. tab. 1. fig. 1.

Geoff. Inf. 1. 91. tab. 1. fig. 4.

Illig. Col. Bor. 1. 52. 2.

Voet. Col. tab. 31. fig. 5.

Panz. Fn. Germ. 4. tab. 2.

Schaeff. Icon. tab. 42. fig. 10.

Sulz. Icon. tab. 2. fig. 8. 9.

Herbst. Col. 4. tab. 35. fig. 1.

Habitat in Europae, Americae stercore.

bis 6striatus. 4. *H. ater*, elytris friatis, pedibus rufis: tibiis tridentatis.

Habitat in Austria. Dom. de Meyerle.

Minor *H. 12striato*. Thorax laevis, linea tantum marginali impressa. Elytra striata. Pedes rufi, tibiis anticis tridentatis.

5.

capite paruo subrecondito, antennis articulo primo longissimo, vltimis tribus crassioribus, thorace glabro: margine parum eleuato, scutello minuto, triangulari, elytris abdomine breuioribus, truncatis, arcte adhaerentibus, pedibus breuibus, validis, femoribus subcompressis, tibiis compressis, anticis dentatis, posticis spinosis, tarsis quinquearticulatis, colore atro, nitido.

5. *H. ater*, elytris striatis, tibiis anticis quinquedentatis. *12striatus*.

Hister 12striatus. Illig. Col. Bor. 1. 53. 3.

Herbst. Col. 4. 29. 4. tab. 35. fig. 4.

Habitat in Germaniae stercore.

Affinis certe *H. vnicolori*. Differt tantum striis elytrorum pluribus, tibiisque magis dentatis.

6. *H. ater*, nitidus, elytris striatis, capite punctis *impressus*. duobus compressis. Ent. suppl. 37. 2. *

Habitat Kiliae.

7. *H. ater*, nitidus, elytris basi substriatis, thorace *nitidulus*. antice vtrinque impresso.

Habitat in Germania. Dom. Smidt.

Statura et magnitudo *H. vnicoloris*; totus ater, aeneo colore nitidulus. Thorax disco glaberrimo lateribus punctatis, et antice vtrinque puncto impresso. Elytra nitida, basi paruum striata, apice punctata.

VIII. 2

8. *H. ater nitidus laenissimus*, thoracis margine antico vtrinque prominulo. *angulatus*.

Habitat in America meridionali. Mus. D. Lund.

Paulo maior *H. vnicolori*. Caput vix sub thorace exsertum. Thorax margine antico vtrinque prominente laeuissimus, nitidus, ater. Elytra laeuissima, vix stria vna alteraue versus marginem, nitida, atra. Pedes nigri, tibiis anticis dentatis.

9. *H. ater nitidus*, elytris punctato-striatis, longitudine abdominis. *glabratus*.

Hister glabratus. Ent. syst. 1. 73. 3. *

Habitat in Germania. Dom. Smidt.

10. *H. ater aeneo-nitidus*, elytris basi striis obliquis *semipunctatus*. apice obsolete punctatis. Ent. syst. 1. 73. 4. *

Herbst.

Herbst. Coleopt. 4. tab. 35. fig. 6.

Habitat in Barbaria. Mus. Dom. Desfontaines.

acuminatus 11. *H. ater nitidus*, elytris abbreviatis, abdomine acuto. Ent. suppl. 37. 4. *

Habitat in Galliae Alpibus. Dom. Brognart.

Statura fere Scaphidii.

scaber. 12. *H. niger punctis eleuatis scaber*. Ent. syst. 1. 73. 5. *

Habitat in Hispania. Dom. Prof. Vahl.

cyaneus. 13. *H. thorace aeneo*, elytris coerulescentibus.

Hister cyaneus. Ent. syst. 1. 73. 6. *

Oliv. Inf. 1. 6. tab. 3. fig. 17.

Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

bicolor. 14. *H. thorace obscure aeneo*, elytris striatis cyaneis.

Hister bicolor. Oliv. Inf. 1. 6. tab. 3. fig. 20.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. de Scheffedt.

Distinctus ab *H. cyaneo*, paullo minor. Caput et

thorax obscure aenea, vix nitida. Elytra striata,

cyanea; margine postico parum rufescente.

brunnens. 15. *H. ferrugineus elytris substriatis*. Ent. syst. 1. 74. 8. *

Oliv. Inf. 1. 8. 17. 27. tab. 3. fig. 21.

Roff. Fn. Etrusc. 1. 29. 66.

Illig. Col. Bor. 1. 53. 4.

Herbst. Col. 4. tab. 35. fig. 10.

Habitat in Europa boreali. Dr. Solander.

lunatus. 16. *H. ater nitidus*, elytris macula magna lunata basales rufa.

Hister quadrimaculatus. Illig. Col. Bor. 1. 56. 8?

Hister reniformis. Oliv. Inf. 1. 8. tab. 1. fig. 5.

Habitat in Germania.

Ma-

Magnus. Caput atrum. Thorax laevis, fria marginali tantum impressa. Elytra striis tribus aut quatuor ad marginem exteriorem. Macula magna lunata (referente rubra. Tibiæ anticae tridentatae.

H. ater, elytris macula media sinuata rubra. *sinuatus.*

Hister sinuatus. Ent. syst. 1. 75. 15. *

Oliv. Inf. 1. 8. tab. 3. fig. 19.

Illig. Col. Bor. 1. 37. 9.

Voet. Col. tab. 31. fig. 3.

Habitat in Germania. Dom. Smidt.

H. niger, thorace laevi, elytris striatis: macula *purpurascens.*
disci rubra.

Hister purpurascens. Illig. Col. Bor. 1. 54. 5.

Herbst. Col. 4. tab. 36. fig. 6.

Geoff. Inf. 1. 91. 2.

Voet. Col. 1. tab. 31. fig. 2.

Habitat in Europa boreali.

Affinis certe H. bimaculato, at thorax omnino laevis et macula purpurea in medio disci.

H. coleoptris testaceis: cruce communi atra. *cruciatus.*

Ent. syst. 1. 75. 16. *

P. M. 2

Habitat in Barbaria. Mus. D. Desfontaines.

H. ater elytris striatis: puncto medio rubro, ca- *apustulatus*
pite retuso. Ent. suppl. 38. 16.

Habitat in India orientali. Dom. Daldorff.

Differt omnino ab H. bimaculato, duplo maior. Caput mandibulis exsertis muticis, fronte retusa. Thorax laevis, ater, nitidus, angulo antico vtrinque puncto impresso. Elytra striata: stria
inte-

Hibernæ larva depressa, brunnea: segmentis decem vtrinque prominulis, capite antice quadridentato, cauda ovata vtrinque videntata.

interiore abbreviata atra puncto medio distincto, rubro. Tibiae anticae valde dentatae.

pulchellus. 21. *H. viridi-aeneus* elytris striatis: puncto postico rubro, ano cupreo. Ent. suppl. 38. 16.

Habitat Tranquebariae. Mus. D. de Sehestedt.

Paruus. Caput et thorax viridi-aenea, nitida, imaculata. Elytra, imprimis versus marginem striata, puncto magno versus apicem rubro. Anus prominens cupreo nitet.

erythropterus. 22. *H. ater* nitidus elytris striatis apice rufis. Ent. suppl. 38. 16.

Oliv. Inf. 1. 8. tab. 2. fig. 12.

Habitat Tranquebariae. Mus. D. de Sehestedt.

2maculatus 23. *H. ater*, thorace vtrinque foveolato, elytris striatis, angulo postico rubro.

Hister 2maculatus. Ent. syst. 1. 76. 17. Lin.

P.VH. 2. syst. Nat. 2. 567. 5. Fn. Sv. 442.

Illig. Col. Bor. 1. 54. 6.

Herbst. Col. tab. 36. fig. 8.

Habitat in Europae stercore bouino.

4maculatus 24. *H. ater*, elytris macula humerali transuersa rubra.

Hister 4maculatus. Ent. syst. 1. 76. 18. Lin.

syst. Nat. 2. 567. 6. Fn. Sv. 443.

P.VH. 2

Oliv. Inf. 1. 8. 9. 7. tab. 3. fig. 18.

Schaeff. Elem. tab. 24. fig. 2.

Illig. Col. Bor. 1. 60. 14.

Herbst. Col. tab. 25. fig. 2.

Habitat in Europa boreali,

Macula altera in disco elytrorum supra deest.

aeneus. 25. *H. aeneus*, elytris basi striatis apice punctato tibiis anticis ferratis. Ent. syst. 1. 76. 19.

VII. 2

Hister aeneus. Illig. Col. Bor. 1. 59. 13.

- Geoff. Inf. 1. 95. 3.
 Oliv. Inf. 1. 8. tab. 2. fig. 10.
 Herbft. Col. 4. tab. 35. fig. 5.
 Habitat in Anglia, Gallia.
26. *H. violaceus*, nitidus, elytris basi striatis apice metallicus.
 punctatis, tibiis anticis quadridentatis.
Hister metallicus. Illig. Col. Bor. 1. 60. 14.
 Herbft. Col. 4. 32. 7. tab. 35. fig. 7.
 Habitat in Germania.
 Affinis certe *H. aeneo* at totus cyaneus. Thorax
 subtilissime punctatus. Elytra basi inter strias
 laevia. Tibiae denticulis quatuor maioribus.
27. *H. ater*, nitidus, laevissimus, elytris punctis agutatus.
 duobus albis. Ent. suppl. 39. 18. *
 Habitat - - - Mus. Dom. Lund.
28. *H. ater*, nitens, elytris piceis apice obscuris. detritus.
 Ent. syst. 1. 76. 20. *
 Oliv. Inf. 1. 8. 12. 11. tab. 2. fig. 16.
 Ross. Fn. Etr. 1. 29. 67.
 Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.
29. *H. ater*, elytris crenato-striatis: striis interio- abbrevia-
 ribus abbreviatis. Ent. syst. 1. 75. 14. * tus.
 Habitat in America boreali. Dom. Drury.
30. *H. ater*, elytris basi striatis apice punctatis, ti- pygmaeus.
 biis muticis. Ent. syst. 1. 74. 9.
Hister pygmaeus. Linn. Syst. Nat. 2. 567. 4.
 Fn. Sv. 441.
Hister punctatus. Illig. Col. Bor. 1. 60. 15.
 Oliv. Inf. 1. 8. 28. 23. tab. 3. fig. 24.
 Habitat in Europa boreali.
31. *H. ater*, thorace lineis elevatis quinque, elytris fulvatus.
 tribus: interstitiis punctatis. Ent. Syst. 1. 74.
 12. * Vl. 1.
Hister globulosus. Oliv. Inf. 1. 8. tab. 2. fig. 15.
 Illig.

Illig. Col. Bor. 1. 51. 1.

Habitat in Boletis plantisque putrescentibus Cliae, Germaniae.

friatus.

32. H. thorace, striis elevatis quinque, elytris 1
Hister fulcatus. Oliv. Inf. 1. 8. tab. 1. fig. 6
 Ross. Fn. Etr. 1. 31. 70. tab. 2. fig. 3.
 Herbst. Col. 4. tab. 36. fig. 1.
 Habitat in Europa australiori.

Statura omnino praecedentis at duplo fere min
 et striae elytrorum plures interstitiis haud pe
 ctatis.

- rotundatus.* 33. H. rotundatus, ater, elytris basi striatis ap
 punctatis: margine postico pedibusque pice
Hister rotundatus. Illig. Col. Bor. 1. 61. 16
 Habitat in Germania.
 Hist. pygmaeo minor et magis rotundatus.

- minutus.* 34. H. subrotundus, piceus, thorace antice ang
 stato.
Hister minutus. Illig. Col. Bor. 1. 62. 19.
 Herbst. Col. 4. tab. 36. fig. 4.
 Habitat in Germaniae Boletis.

- fulvicornis.* 35. H. ovatus, ater, elytris striatis, antennarum cla
 ua testacea.
 Habitat in America meridionali. Mus. de Seh
 stedt.

Corpus paruum, ovatum, atrum. Antennae nigrae
 claua testacea. Thorax laevis, nitidus. Elytr
 striata.

** *Corpore depresso, plano, oblongo.*

- planus.* 36. H. planus, opacus, ater, elytris laevissimis
 Ent. syst. 1. 73. 7.*

Illig

Histeres ovati in stercore aut Boletis putrescentibus degunt
 plani depressi sub arborum corticibus. Genere forte dif
 ferunt.

Illig. Col. Bor. I. 65. 25.

Oliv. Inf. I. 8. 15. tab. 3. fig. 22. VIII. 3

Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 9.

Herbst. Col. 4. tab. 35. fig. 8.

Fuesl. Inf. Halv. 68.

Habitat in Europa australiori sub arborum corti-
cibus.

Antennarum claua ferruginea.

37. *H. depressus*, ater, nitidissimus, elytris substriatis. ~~depressus.~~

Ent. syst. I. 74. 10. *

Oliv. Inf. I. 8. 15. 17. tab. 2. fig. 9.

Illig. Col. Bor. I. 64. 23. VII. 1.

Herbst. Col. 4. tab. 35. fig. 9.

Habitat sub Betulae corticibus.

38. *H. depressus*, ater, nitidissimus, elytris laevissimis abdomine dimidio brevioribus, mandibulis exsertis. ~~corticis.~~

Habitat in America meridionali. Mus. D. Lõnd.
Distinctus omnino ab *H. quadridentato*. Caput
paruum, mandibulis exsertis, breuib. Tho-
rax et elytra laevissima, nitidissima, atra, ely-
tris abdomine dimidio brevioribus.

39. *H. depressus*, ater, nitidus, elytris striata vnica, ~~4dentatus.~~
mandibulis exsertis capite longioribus. Ent.
syst. I. 74. 11. *

Oliv. Inf. I. 8. 14. 15. tab. 2. fig. 11.

Voet. Col. tab. 31. fig. 8.

Habitat in America boreali. Dom. Lee.

40. *H. depressus*, ater, nitidus, elytris striatis, man- ~~maxillofus.~~
dibulis exsertis capite longioribus. Ent. syst.

Append. 437. 11. *

Hister maxillofus. Oliv. Inf. I. 8. tab. 2. fig. 8.

Drury. Inf. 3. tab. 48. fig. 4.

Habitat in America boreali.

- oblongus. 41. H. depressus, ater, sordidus, elytris strigatis, pore oblongo. Ent. syst. 1. 75. 13. Illig. Col. Bor. 1. 63. 22. Oliv. Inf. 1. 8. tab. 2. fig. 14. Habitat in Svecia in radicibus Fagi sub cortice. Dom. Afzelius.
- picipes. 42. H. depressus, niger, elytris laevissimis, an- nis pedibusque piceis. Ent. syst. 1. 77. 2. *Hister picipes.* Illig. Col. Bor. 1. 60. 25. Herbft. Col. 4. tab. 35. fig. 11. Habitat in Germania. Dom. Smidt.
- caesus. 43. H. niger, thorace sulco transverso impresso, tennis ferrugineis. Ent. syst. 1. 77. 22. *Hister caesus.* Illig. Col. Bor. 1. 67. 17. Herbft. Col. 4. tab. 36. fig. 3. Habitat in Germania. Dom. Prof. Helwig.

10. SPHAERIDIVM. Palpi quatuor filiformi
Labium quadratum, en-
ginatum.
Antennae clava pe-
liata.

- scarabaeoides. 1. S. ovatum atrum, elytris maculis duabus ferru-
neis. Ent. syst. 1. 77. 1. Oliv. Inf. 2. 45. 4. 1. tab. 1. fig. 1. Linn. syst. Nat. 2. 563. 17. Fn. Sv. 428.

II

Sphaeridii corpus rotundatum, supra convexum, subtus
num, glabrum, immarginatum, tardum, capite parvo
flexo, antennis brevibus: articulo primo longissimo,
cylindrico, ultimo quatuor crassioribus perfoliatis, tho-
conuexo, glabro, elytris laevibus, immarginatis, longi-
ne abdominis, pedibus brevibus, validis, femoribus c-
pressis, tibiis spinosis, tarsis quinquearticulatis, colore va-

Illig. Col. Bor. 1. 65. 1.

Panz. Fn. Germ. 6. tab. 2.

Voet. Col. tab. 32. fig. 1.

Herbst. Col. 4. tab. 37. fig. 1.

Geoff. Inf. 1. 106. 17.

Degeer Inf. 4. tab. 12. fig. 17.

Habitat in Europae stercore frequens.

2. *S. onatum atrum*, elytris apice macula lunata lunatum.
tea. Ent. syst. 1. 76. 2. *

Illig. Col. Bor. 1. 65. 1. β.

Habitat in Germania. Dom. Smidt.

Forte mera praecedentis varietas.

3. *S. atrum nitidum* elytris apice rubris, pedibus *pi-
ceis*. Ent. syst. 1. 78. 3. *

Oliv. Inf. 2. 15. 5. 2. tab. 2. fig. 11.

Herbst. Col. 4. tab. 32. fig. 2.

Illig. Col. Bor. 1. 65. 1. β.

Habitat Kiliae in stercore.

Varietatem praecedentium credit Illiger, atten-
men corpus minus et elytra apice omnino rufa.

4. *S. atrum* elytrorum margine pedibusque ferrugi-
neis. Ent. syst. 1. 80. 11. *

Oliv. Inf. 2. 15. 6. tab. 1. fig. 3.

Geoff. Inf. 1. 107. 18.

Herbst. Col. 4. 67. 3. tab. 37. fig. 3.

Illig. Col. Bor. 1. 65. 1. γ.

Habitat Halae Saxonum. Dom. Daldorff.

Forte praecedentis mera varietas.

5. *S. atrum* antennis pedibusque rufis, elytris laevi-
bus. Ent. syst. 1. 79. 8. *

Oliv. Inf. 2. 15. 10. 12. tab. 2. fig. 9.

Habitat in Insula Madera, in Germania.

Praecedentibus nimis affinis. Antennae rufae cla-
va nigra.

6. S.

- abdominale* 6. *S. atrum nitidum*, abdomine pedibusque ferris. Ent. syst. 1. 79. 10. *
Habitat in Americae meridionalis Insulis.
Pflug.
- maculatum* 7. *S. atrum* coleoptris obscure rufis: maculisque nigris. Ent. suppl. 39. 8. *
Habitat in India orientali. Dom. Daldorff.
- dytiscoides* 8. *S. ferrugineum* elytris atris. Ent. syst. 1. 79. Oliv. Inf. 2. 15. tab. 2. fig. 10.
Habitat in Insula S. Helena. Mus. D. Banks.
- fasciculare* 9. *S. atrum* elytris punctis fasciculatis ferrugineis. Ent. syst. 1. 81. 17. *
Byrrhus fascicularis. Oliv. Inf. 2. 13. 8. tab. 2. fig. 7.
Habitat Parisiis. Mus. Dom. Bosc.
- Colon*. 10. *S. lutum* thorace punctis elytris macula marginali nigris. Ent. syst. 1. 78. 4. *
Dermestes Colon. Linn. syst. Nat. 2. 564. 2. Fn. Sv. 438.
Nitidula apunctata. Illig. Col. Bor. 1. 391. 1.
Strongylus apunctatus. Herbst. Col. 1. tab. 4. fig. 5.
Habitat in Suecia. Dom. de Paykull.
Ab hoc genere cum sequentibus differre videtur
Corpus magis globosum, antennarum articulus primus breuior, rotundior, ultimi tres tantum incrassati, palpi breuiiores. Ad *Nitidulas* amandavit Dom. Illiger, at vix rite. Nouum genus forte constituunt, at characteres mihi adhuc desunt, ideoque hic ad vltiorem diuisionem apposui.
- globus*. 11. *S. globosum* atrum thorace rufo. Ent. syst. 1. 78. 5. *
Habitat Parisiis. Dom. Tigny.

2. *S. luteum* elytris pubescentibus laevibus. Ent. *luteum*.

Syft. 1. 79. 6. *

Nitidula lutea. Illig. Col. Bor. 1. 390. 18.

Nitidula lutea. Oliv. Inf. 2. 12. 16. tab. 3.

yll. 3.

fig. 28.

Strongylus luteus. Herbst. Col. 4. tab. 43. fig. 3.

Habitat in Suecia. Dom. de Paykull.

3. *S. laeue testaceum* elytris obscuris.

obscurum.

Habitat in America meridionali. Mus. D. de Sehestedt.

Statura gibba et summa affinitas *S. lutei*. Corpus laeue, testaceum elytris folis obscuris.

Magnitudine variat.

4. *S. laeue obscurum* pedibus rufis.

rufipes.

Habitat in America meridionali. Mus. D. Lund.

Statura praecedentis at minus, gibbum, obscurum, pedibus folis rufis.

5. *S. nigrum*, elytris rufis apice nigris.

anale.

Habitat in America meridionali. Mus. de Sehestedt.

Statura parua, gibba praecedentium. Caput et thorax nigra, obscura. Antennae ferrugineae claua magna, perfoliata, nigra. Elytra substriata, rufa apice late nigra. Pedes ferruginei. IX.

6. *S. gibbum*, supra atrum, subtus ferrugineum.

nitidulum.

Habitat in America meridionali. Mus. D. Lund.

Statura omnino *S. lutei*. Corpus supra totum laeue, atrum, nitidum, thoracis margine parum rufescente, subtus ferrugineum.

7. *S. gibbum laeue*, flavum, nitidum.

flavum.

Habitat in America meridionali. Mus. D. de Sehestedt.

Cor-

- Corpus S. luteo minus, laeue, flauum, nitid
interdum, elytris parum fusco-maculatis.
- atomatum.* 18. S. laeue, atrum, elytris striatis. Ent. syst.
80. 13.
Geoff. Inf. 1. 107. 19.
Oliv. Inf. 2. 15. 14. tab. 2. fig. 5.
Illig. Col. Bor. 1. 67. 3.
Panz. Fn. Germ. 23. tab. 3.
Herbst. Col. 4. 78. 16.
Habitat in Europae stercore.
- melanocephalum.* 19. S. atrum glabrum, elytris griseis: macula co
muni baseos nigra. Ent. syst. 1. 80. 14. *
Oliv. Inf. 2. 15. 8. 9. tab. 1. fig. 4.
Linn. syst. Nat. 2. 563. 16. Fn. Sv. 425.
Illig. Col. Bor. 1. 66. 2.
Herbst. Col. 4. tab. 37. fig. 10.
Habitat in Europae stercore.
- lugubre.* 20. S. atrum nitidum, elytris striatis, pedibus ru
Ent. syst. 1. 81. 15.
Sphaeridium lugubre. Oliv. Inf. 2. 15. 7.
tab. 2. fig. 12.
Habitat Parisiis. Dom. Bosc.
- stercoreum.* 21. S. ferrugineum, elytris laeuibis griseis. Ent.
syst. 1. 81. 16. *
Illig. Col. Bor. 1. 69. 6.
Habitat in Germaniae stercore. Dom. Smidt.
- haemorrhoidale.* 22. S. atrum. elytris apice rufis, pedibus nigr
Ent. syst. 1. 81. 18. *
Oliv. Inf. 2. 15. 9. 10. tab. 2. fig. 6.
Herbst. Col. 4. tab. 37. fig. 9.
Illig. Col. Bor. 1. 68. 2. β.
Habitat in Europae stercore bovino.
Varietatem S. melanocephali credit Illiger,
vix merito.

- 23 *S. atrum*, elytris apice pedibusque rufis. Ent. *flavipes*.
 syst. 1. 81. 19. *
 Habitat in Selandiae stercore bouino. Mus. Dom. de Sehestedt.
- 24 *S. atrum*, coleopteris flavescentibus: puncto *unipunctatum*.
 communi atro. Ent. syst. 1. 81. 20.
Sphaeridium unipunctatum. Oliv. Inf. 2. 15.
 6. 5. tab. 2. fig. 8.
Coccinella unipunctata. Linn. syst. Nat. 2. 579.
 6. Fn. Sv. 470.
 Illig. Col. Bor. 1. 68. 5. I. 4.
 Panz. Fn. Germ. 3. tab. 1.
 Herbst. Col. 4. tab. 37. fig. 4.
 β. *Scarabæus quisquilius*, elytris lividis immaculatis. Ent. syst. 1. 38. 124. Linn. syst. Nat. 2. 558. 83. Fn. Sv. 379. mas.
 Oliv. Inf. 1. 3. 95. 108. tab. 18. fig. 170.
 Tabl. Col. 2. tab. 18. fig. 15.
 Herbst. Arch. tab. 19. fig. 8.
 Habitat in Europae stercore, tempore sereno per aërem volitans.
- 25 *S. atrum nitidum*, thoracis limbo rufo, elytris *limbatum*.
 laevissimis. Ent. syst. 1. 82. 21. *
 Habitat in Germania. Dom. Smidt.
- 26 *S. atrum nitidum*, thorace pedibusque anticis *ruficollis*.
 rufis. Ent. syst. 1. 82. 22. *
Sphaeridium ruficolle. Oliv. Inf. 2. 15. 9. 11.
 tab. 2. fig. 7.
 Herbst. Col. 4. tab. 37. fig. 7.
 Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.
- 27 *S. atrum immaculatum*, elytris laevissimis. Ent. *finstarium*.
 syst. 1. 82. 25. *
 Habitat in Europae stercore.

- testaceum*. 28. *S. testaceum*, capite obscuriore. Ent. syst. I. 83. 26. *
Habitat in Americae meridionalis Insulis. Dom. Smidt.
- aeneum*. 29. *S. aeneum nitidulum*, elytris laevissimis, pedibus nigris. Ent. syst. I. 83. 27. *
II. I. Habitat in Germania. Dom. Smidt.
IX.
- minutum*. 30. *S. atrum*, elytris striatis, pedibus concoloribus. Ent. syst. I. 83. 29.
Oliv. Inf. 2. 15. II. 14. tab. 2. fig. 5.
Silpha atomaria. Linn. syst. Nat. 2. 574. 35.
Habitat in Anglia, Germania.
- pulicarium*. 31. *S. oblongum nigrum*, elytris abbreviatis, abdomine acuto. Ent. syst. I. 83. 30.
Nitidula pulicaria. Oliv. Inf. 2. 12. 20. 31. tab. 3. fig. 27.
Dermestes pulicarius. Linn. syst. Nat. 2. 564. 24.
Silpha pulicaria. - - - 2. 574. 33.
Cateretes grauidus. Illig. Col. Bor. I. 395. I.
Habitat in Europae floribus.
Forte potius ad *Nitidulas* amandandum.
- Winteriae* 32. *S. atrum nitidum*, elytris ferrugineis. Ent. suppl. 39. 29. *
Habitat in cortice *Canellae albae*. Mus. D. Lund.

II. ANISOTOMA. *Palpi* inaequales, filiformes.

Maxilla membranacea, bifida.

Antennae perfoliatae: claua articulis quinque.

1. *A. ferruginea*, elytris striatis.

ferruginea.

Sphaeridium ferrugineum. Ent. syst. 1. 80. 12. *

Sphaeridium ferrugineum. Oliv. Inf. 2. 15. 7. tab. 3. fig. 14.

Anisotoma ferruginea. Illig. Col. Bor. 1. 75. 3.

Tritoma ferruginea. Herbst. Col. 4. tab. 38. fig. 9.

Habitat Kiliae. Dom. Daldorff.

2. *A. atra nitida*, elytris macula baseos rubra.

humeralis.

Sphaeridium humerale. Ent. syst. 1. 79. 9. *

Anisotoma humeralis. Illig. Col. Bor. 1. 76. 5.

Tritoma humeralis. Herbst. Col. 4. tab. 38. fig. 5.

Oliv. Inf. 2. 15. 8. 8. tab. 1. fig. 2. ?

II. 1.

Panz. Fn. Germ. 23. tab. 1.

Habitat in Europae arboribus. Mus. D. Lund.

Os palpis maxillisque. *Palpi* quatuor inaequales, filiformes: *anteriores* longiores, quadriarticulati: articulo primo paruo, secundo obconico, tertio breui, subglobofo, ultimo oblongo acuto

Anisotomae corpus paruum, ovatum, glabrum, laeve, nitidum, immarginatum, tardum, capite paruo deflexo, oculis rotundatis, vix prominulis, lateralibus, posticis, antennis breuibus, ante oculos insertis, thorace gibbo latitudine fere elytrorum, scutello paruo triangulari, acuto, elytris abdomine sublongioribus, apice acutiusculis, pedibus breuibus, validis, femoribus compressis, tibiis rotundatis, tarsis quatuor, anticis quinque, posticis quadriarticulatis, colore atro, aut brunneo, nitidiusculo.

acuto maxillae dorso adhaerentis, posterior triarticulati: articulis subaequalibus: vltin acuto, adnati ligulae latere exteriori. *Labrum* breue, transuersum, emarginatum. *Mandibula* cornea, tenuis, incurua, acuta, edentula. *Maxilla* basi cornea, apice membranacea, bifid laciniis aequalibus: exteriore vix longior truncata. *Ligula* breuis, membranacea, bifida: laciniis rotundatis. *Labium* breue, conicum, quadratum, integrum.

bicolor. 3. *A.* supra atra, subtus ferruginea, elytris glaberrimis: puncto ferrugineo.

Sphaeridium bicolor. Ent. syst. 1. 82. 24. ♀

IX. *Anisotoma bicolor.* Illig. Col. Bor. 1. 80. 13.
Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

nigripennis 4. *A.* rufa nitida, elytris atris, antennis fuscis.

Sphaeridium nigripenne. Ent. syst. 1. 82. 23.

Agathidium nigripenne. Illig. Col. Bor. 1. 84.

Sphaeridium ruficolle. Naturf. 26. 121. 47.

IV. 14 Panz. Fn. Germ. 39. 3.

Habitat in Germania. Dom. Smidt.

Vix ab hoc genere differt.

feminulum. 5. *A.* atra, abdomine pedibusque rufis.

Sphaeridium feminulum. Ent. syst. 1. 83. 28.

IV. 16 *Anisotoma feminulum* Illig. Col. Bor. 1. 78.

Dermestes feminulum. Linn. syst. Nat. 2. 57.

8. Fn. Sv. 447.

Panz. Fn. Germ. 23. tab. 2. ?

Habitat in Europa, Anglia. Mus. Dom. Banks.

12. CHELONARIVM. *Palpi* inaequales:
anteriores articulo
 ultimo maiori
 ovato.

Antennae monilifor-
 mes: articulo primo
 secundoque maiori-
 bus compressis, capi-
 tis apici insertis.

1. Ch. atrum, nitidum, pedibus anticis piceis.

atrum.

Habitat in America meridionali. Smidt, Mus. D.
 Lund.

Genus singulare et valde distinctum. Figura con-
 tracta Byrrhi. *Os* mandibulis palpisque. *Pal-
 pi* quatuor inaequales, subfiliformes: *anterio-
 res* longiores quadriarticulati: articulis subae-
 qualibus; ultimo maiori ovato, adhaerentes ma-
 xillae dorso: *posteriores* breviores, triarticu-
 lati: articulis subaequalibus; ultimi ovato ad-
 natii labii apice. *Mandibula* brevis, cornea,
 incurva, obtusa, edentula. *Maxilla* brevis,
 membranacea, bifida: laciniis rotundatis, ae-
 qualibus. *Labium* breve, rotundatum, cor-
 neum, integrum, apice palpigerum. *Anten-
 nae* approximatae, longitudinaliter sub sterno
 in-

Chelonarivii *corpus* parvum, ovatum, subvillosum, margina-
 tum, tardum; *capite* minuto, subrotundo, sub thoracis
 margine recondito, oculis parvis, oblongis frontalibus,
antennis brevibus, sub sterno inflexis; thorace plano, mar-
 ginato: margine subreflexo, antice porrecto, rotundato,
 scutello parvo rotundato, villoso; elytris rigidis, longitu-
 dine abdominis, margine inflexo; pedibus brevibus, vali-
 dis, compressis, tarsis quinquearticulatis, colore nigro
 obscuro.

inflexae, 11 articolatae: articulo primo secundoque multo maioribus, compressis, nigris, reliquis breuibus, moniliformibus, flavescentibus, capitis apici insertae.

Corpus ouatum. Caput thoracis clypeo, superne lateribusque tectum. Thoracis clypeus rotundatus, marginatus, laeuis, ater, immaculatus. Scutellum cinereo-villosum. Elytra subglabra atra, laeuis, vix maculata. Corpus nigrum. Alae basi flavae, apice nigrae. Pedes breues compressi, anteriores picei, tarsis nullis, vngui la magna, arcuata, flaua.

punctatum. 2. Ch. brunneum, elytris punctis villosis-albidis. Habitat in America meridionali. Smidt, Mus. D de Sehestedt.

Statura omnino praecedentis at triplo minus, minusque nigrum, punctis plurimis elytrorum villis albidis, quae tamen aetate euanescent.

13. BYRRHVS, *Palpi* aequales, subclauati
Maxilla bifida.
Labium bifidum.
Antennae claua, perfoliata.

gigas. 1. B. niger, elytris punctatis ferrugineis, Ent. syst. I. 84. 1.

IX.

Ha

Byrrhi corpus ouatum, gibbum, contractum, immarginatum tardum; capite paruo, deflexo, oculis ouatis, vix promulis, lateralibus, posticis, antennis capite longioribus articulo primo crassiori, secundo breui, globoso, vltimo ouatis, perfoliatis; thorace antice attenuato, postice ltitudine elytrorum, scutello minuto, rotundato; elytris uigidis, longitudine abdominis: margine inflexo, cingente; pedibus breuibus, validis, femoribus compressis, i tus canaliculatis ad receptionem tarforum, tarsis quinque articulatis, colore obscuro, minime nitido.

Habitat in Austria. Dom. Zschuck.

Maior B. pilula. Pedes nigri, tibiis compressis, incuruis.

Femina ano aculeato.

2. B. fuscus, elytris striis atris interruptis. Ent. *pilula*.

syft. 1. 84. 2. Linn. syft. Nat. 2. 568. 4.

Geoff. Inf. 1. 116. 1. tab. 1. fig. 8.

Degeer. Inf. 4. tab. 7. fig. 23.

I. 5.

Oliv. Inf. 2. 13. 5. 1. tab. 1. fig. 1.

Schaeff. Icon. tab. 95. fig. 3.

Voet. Col. tab. 32. fig. 3.

Panz. Fn. Germ. 4. tab. 3.

Habitat in Europae quisquilliis.

Captus, pedes artusque contrahit vix distinguendos.

3. B. thorace cinereo nigroque vario, elytris nigris: *albo-punctatus*.
striis duabus punctorum alborum. Ent. syft. 1. 84. 3.

Habitat in Germaniae quisquilliis. Dom. Daldorff.

B. pilula forte nimis affinis. Thorax nigro cinereoque maculatus.

4. B. gibbus niger, elytris strigis duabus ante marginem coeuntibus albidis. *Dianae*.

Byrrhus Dianae. Illig. Col. Bor. 1. 92. 5.

IX

Habitat in Germania.

Maior B. pilula et distinctus figura breviori et magis gibba. Thorax maculis variis albidis.

Elytra vix striata, at in medio striae duae, ante marginem exteriorem coeuntibus albidis.

5. B. nigricans, elytris, fascia vndata media rufa. *fasciatus*.

Ent. syft. 1. 85. 4. Linn. Syft. Nat. 2. 16.

13. 8.

Geoff. Inf. 1. 116. 2.

Oliv. Inf. 2. 13. 6. 2. tab. 1. fig. 2.

III 7

Voet.

- Voet. Col. tab. 32. fig. 2.
 Sulz. Hist. Inf. tab. 2: fig. 12.
 Schaeff. Icon. tab. 158. fig. 3.
 Panz. Fn. Germ. 32. tab. 1.
 Habitat in Europae quisquiliis.
 Elytra striis interruptis, holosericeis, atris.
- ater.* 6. *B. niger, immaculatus.* Ent. syst. 1. 85. 5.
 Schaeff. Icon. tab. 238. fig. 6.
 Panz. Fn. Germ. 32. tab. 2.
 Habitat in Germania. Dom. de Hattorff.
- dorsalis.* *III.* 7. *Corpus totum atrum. Elytra obsolete striata.*
 7. *B. nigricans. coleoptris, macula transversa ferruginea.* Ent. syst. 1. 85. 6. Linn. Syst. Nat. 2. 16. 13. 7.
Byrrhus Moria. Illig. Col. Bor. 1. 93. 6.
 Panz. Fn. Germ. 37. tab. 15.
 Oliv. Inf. 2. 13. 7. 4. tab. 1. fig. 5.
 Habitat Sicilia. Dom. Daldorff.
 Praecedenti nimis affinis. Thorax maculis aliquot obsoletis. Elytra nullo modo striata.
- murinus.* 8. *B. murinus, elytris atro-lineatis.* Ent. syst. 1. App. 437.
 Panz. Fn. Germ. 25. tab. 1.
III. 8. Illig. Col. Bor. 1. 95. 9.
 Habitat in Germania, Dom. Prof. Helwig.
 Praecedentibus duplo minor. Thorax vix maculatus. Corpus obscurum.
- semistriatus.* 9. *B. ater nitidus, antennis pedibusque flavis.* Ent. syst. 4. App. 437.
 Illig. Col. Bor. 1. 97. 13.
 Panz. Fn. Germ. 25. tab. 2.
III. 9. Habitat in Germania. Prof. Helwig.
 Praecedente minor. Antennae flavescentes, articulo primo crassiori nigro. Caput et thorax nigri nitida. Elytra basi striata, nigra, nitida.

10. *B. niger*, thorace aeneo, elytris striatis viridi-varians.

bus. Ent. syst. 1. 85. 7. Linn. Syst. Nat. 2.

16. 13.

Oliv. Inf. 2. 13. 7. 5. tab. 1. fig. 6.

Voet. Col. tab. 32. fig. 4.

Schaeff. Icon. tab. 227. fig. 4.

III. 8

Illig. Col. Bor. 1. 93. 7.

Habitat in Angliae arenosis.

11. *B. aeneus*, scutello albo. Ent. syst. 1. 86. 8. aeneus.

Linn. Syst. Nat. 2. 16. 13.

Cistela aenea. Laichart. Inf. 1. 73. 3.

Oliv. Inf. 2. 13. 8. 6. tab. 1. fig. 3.

VIII. 4.

Illig. Col. Bor. 1. 96. 11.

Habitat in Europa boreali.

Triplo minor *B. pilula*, supra totus aeneus, subtus murinus. Scutellum album.

12. *B. thorace nigro*, elytris aeneis nitidis, corpore nitens.
ferrugineo.

Byrrhus nitens. Panz. Fn. Germ.

III. 9

Byrrhus nitens. Illig. Col. Bor. 1. 96. 12.

Habitat in Germania australiori. Dom. Schiedler.

Statura et magnitudo omnino *B. aenei* at distinctus. Caput et thorax nigricantia, aeneo colore obscurae nitido. Elytra aenea, laeuissima, nitida. Scutellum concolor. Corpus ferrugineum.

13. *B. niger obscurus*, elytris laeuissimis. Ent. syst. minutus.

4. 437. 9. *

Habitat in Germania. Dom. Prof. Helwig.

Minutus et omnino distinctus, niger, obscurus.

III. 9.

14. AN.

14. ANTHRENVUS. *Palpi* inaequales, filiformes.
Maxilla membranacea linearis, bifida.
Labium corneum, in grum.
Antennae clava solida.

Pimpinellae 1. *A. niger*, elytris fascia alba: apice ferrugineis: tura alba. Ent. syst. 1. 263. 1.

Geoff. Inf. 1. 114. 1.

Illig. Col. Bor. 1. 398. 2.

Oliv. Inf. 2. 14. 7. 1. tab. 1. fig. 4.

Ros. Fn. Etr. 140. 96.

IX.

Habitat in Europae australioris *Pimpinellae* 1 ribus.

Thorax niger: albo ferrugineoque maculatus.

histrionis 2. *A. niger*, elytris maculis duabus marginalibus strigaque postica albis. Ent. syst. 1. 264. 2.

Habitat in Germania. Dom. Smidt.

Varietatem praecedentis credit Illiger, an rit Corpus albidum, punctis marginalibus atque Pedes nigri.

elongatulus 3. *A. niger*, thorace elytrisque maculis plurimis nereo-rufis.

Habitat in Austria. Dom. Meyerle.

Anthreni corpus paruum, ovatum, villosum, contractum immarginatum, tardum; capite parvo, ovato, reconditis oculis rotundatis, marginalibus, posticis, antennis brevibus, sub thorace reconditis, ante oculos insertis; thorace antice angustiori, postice latitudine elytrorum, scuto parvo, rotundato; elytris rigidis, vix striatis: margine inflexo longitudine abdominis; pedibus brevibus, validis sub corpore recondendis, compressis, tarsis quinquearticulatis; colore variegato, obscuro.

Reliquis paullo longior. Corpus totum nigrum, villis plurimis maculas formantibus cinereis, rufo parum micantibus.

4. *A. niger*, elytris albo-maculatis: futura sanguinea. Ent. syst. 1. 264. 3. *Scrophularia*

Byrrhus Scrophulariae. Linn. Syst. Nat. 2. 568.

1. Fn. Sv. 429.

Oliv. Inf. 2. 14. 9. tab. 1. fig. 5.

Illig. Col. Bor. 1. 398. 1.

Panz. Fn. Germ. 3. tab. 21.

I. 50.

Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 11.

Schaeff. Icon. tab. 176. fig. 4.

Degeer Inf. 4. tab. 7. fig. 20.

Habitat in Europae Scrophulariis.

5. *A. nebulosus*, elytris subnebulosis. Ent. syst. 1. *Museorum* 264. 4.

Byrrhus museorum. Linn. syst. Nat. 2. 568.

2. Fn. Sv. 430.

Oliv. Inf. 2. 14. 8. 3. tab. 1. fig. 1.

Habitat in Museis, animalia asseruata destruens.

Simillimus praecedenti, at minor et absque futura sanguinea.

6. *A. cinereo-villosus*, elytris nigris: fascia media *Gloriosae* cinerea.

Habitat in India orientali. Mus. D. de Sehestedt.

Statura et magnitudo *A. Verbasci*. Caput et thorax cinereo-villosa. Elytra laevia, nigra, fascia in medio lata, cinerea.

7. *A. niger*, elytris fasciis tribus vndatis albis. Ent. *Verbasci* syst. 1. 264. 5.

Byrrhus Verbasci. Linn. syst. Nat. 2. 568. 3.

Anthrenus varius. Illig. Col. Bor. 1. 399. 3. IX.

Geoff. Ips. 1. 115. 2.

Ha.

Habitat in Galliae Verbasco.

Minor A, Scrophulariae.

varius.

8. A. thorace elytrisque fusco cinereoque variis,
pore cinereo. Ent. syst. I. 264. 6.

Illig. Col. Bor. I. 399. 3.

Habitat Parisiis. Mus. Dom. Bosc.

IX.

Varietatem praecedentis credit Illiger, at vix
rito.

Corpus supra cinereo fuscoque varium, subtus
nereum, immaculatum.

maculatus. 9. A. ater ferrugineus maculatus. Ent. syst. I. 264. 7.

Habitat in America. Dom. Hybner.

Statura parva praecedentium. Corpus supra at
maculis ferrugineis sparsis, subtus ferrugi
pubescens.

pubescens. 10. A. thorace elytrisque griseis pubescentibus.

Ent. syst. I. 265. 7.

Habitat in Germania. Dom. de Hattorff.

Antennae clava solida. Corpus paruum, f
griseum, nitidum, pilis erectis breuibus ad
sum.

hirtus.

11. A. ater, thorace elytrisque pubescentibus.
syst. I. 265. 8.

Illig. Col. Bor. I. 402. 4.

I. 30. Panz. Fn. Germ. II. tab. 16.

Herbst. Arch. 4 tab. 21. fig. G.

Habitat in Germania. Dom. de Hattorff.

Praecedenti affinis, at totus ater.

ferraticor-
nis. 12. A. niger albo-maculatus, antennis flavis:
ua elongata ferrata. Ent. syst. I. 265. 9.

Habitat in Insula St. Crucis. Dr. Pflug.

Parvus. Antennae flavae clava valde elon
gata ferrata. Caput cinereum. Elytra nigra bal

bo rufoque varia, in medio puncta tria distincta alba et apice strigae duae vndatae albae. Corpus nigrum pedibus piceis.

13. *A. niger*, thoracis margine flavescente, elytris *denticornis*. albo-punctatis, antennis flavis: claua elongata ferrata. Ent. syst. 1. 265. 10.

Habitat in Insula St. Crucis. Dr. Pflug.

Forte cum praecedente proprii generis mihi haud rite examinatus. Antennae singulares flavae: claua valde elongata, ferrata. Thorax niger lateribus late flavis. Elytra nigra, punctis albis irrorata. Corpus nigrum, pedibus flavescentibus. Praecedente duplò minor.

14. *A. glaber ater*, elytris punctatis. *glabratus*.

Habitat in Austria. Dom. de Meyerle.

Magnitudo omnino *A. Scrophulariae*, at totus glaber, ater, nitidus, immaculatus. Elytra vage punctata.

15. TROX. *Palpi* quatuor capitati.

Maxilla bifida.

Antennae cluato-lamellatae.

1. *T. cinereus*, thorace inaequali, elytris striatis *gemmatus*. punctisque eleuatis atris. Ent. syst. 1. 86. 1.

Trox

Trox corpus ovatum, gibbum, vtrinque obtusum, luridum, tardum; *capite* paruo, inflexo, oculis paruis, rotundatis lateralibus, *antennis* longitudine capitis, saepius pilosis: claua ovata e lamellis tribus, breuibus, ante oculos inferitis, *thorace* inaequali, marginato, scutello paruo, rotundato, elytris inaequalibus, immarginatis, longitudine abdominalis: margine deflexo; *pedibus* breuibus, validis, compressis, tibiis apice dilatatis, triangularibus, edentulis, tarsis quinquearticulatis; colore obscure cinereo, nunquam lacto aut maculato.

Trox gemmatus. Oliv. Inf. 1. 4. 7. 5. tab fig. 3.

Trox monacha. Herbst. Col. 3. tab. 21. fig Voet. Col. 1. tab. 11. fig. 53.

Habitat in Senegallia. Mus. D. Olivier.

Antennae piceae, articulo primo hirto. Thorax margo int ger. Elytra crenato-friata, punctuatis, atris, nitidis.

granulatus 2. *T. cinereus*, thorace inaequali, elytris punctuatis striatis.

Habitat in Barbaria. Mus. D. Lund.

Maior *T. sabuloso*, at minor *T. gemmato*. Thorax inaequalis margine integro. Elytra punctuatis, numerosis nigris striata. Differt primis a *T. gemmato* punctis pluribus elevatis in strias dispositis.

sabulosus. 3. *T. thorace inaequali, elytris striatis: striis rufis*. Ent. syst. 1. 86. 2.

Trox sabulosus Oliv. Inf. 1. 4. 8. 6. tab. 1. fig.

Scrubaeus sabulosus. Linn. syst. Nat. 2. 5. 48. Fn. Sv. 390.

Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 12.

Herbst. Col. 3. tab. 21. fig. 1.

Illig. Col. Bor. 1. 98. 1.

I. 5. Panz. Fn. Germ. 7. tab. 1.

Habitat in Europae borealis sabuletis.

hispidus. 4. *T. thorace subinaequali, elytris striatis: striis bilosis*.

Trox hispidus. Oliv. Inf. 4. 8. tab. 2. fig. 9.

Laichart. 1. 30. 2.

Habitat in Germania, Gallia.

Nimis affinis *T. sabuloso*, cuius varietatem ocrem credidi. Differt tamen thorace minus inaequali.

li, elytrorum striis magis distinctis et fasciculis pilorum inter strias.

5. T. thorace subcanaliculato, elytris striatis, cor- arenarius.
pore obscuro. Ent. syst. 1. 87. 3.

Oliv. Inf. 4. 10. 9. tab. 1. fig. 7.

Trox barbosus. Laich. 1. 30. 3.

Silpha scabra. Linn. syst. Nat. 2. 573. 23.

Trox scaber. Illig. Col. Bor. 1. 99. 2. 17.

Oliv. Inf. 1. 4. tab. 1. fig. 7.

Herbst. Col. 3. tab. 21. fig. 2.

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

Praecedente duplo minor. Antennae, testaceae.

Thoracis margo ferrugineo-ciliatus. Elytra obsolete striata, punctisque numerosis e pilis fasciculatis ferrugineis.

6. T. thorace marginato: margine postico dentato, suberosus.
elytris striatis. Ent. syst. 1. 87. 4.

Oliv. Inf. 1. 4. 6. 3. tab. 1. fig. 6.

Herbst. Arch. tab. 19. fig. 20.

- - Col. 3. tab. 21. fig. 3.

Habitat in Brasilia. Mus. Dom. Banks.

Thorax carinatus, marginatus, postice dente unico armatus.

7. T. ater, thorace elytrisque spinosis. Ent. syst. 1. horridus.
87. 5.

Oliv. Inf. 1. 4. 5. 1. tab. 1. fig. 2.

Pall. Icon. 1. 10. tab. A. fig. 10.

Herbst. Col. 3. tab. 21. fig. 4.

Habitat in India. Mus. Dr. Hunter.

Thorax marginatus, ciliatus, spinisque plurimis breuibus, erectis armatus. Elytra striis quinque spinosis margineque ciliatis.

8. T. niger, thorace marginato inaequali, elytris striato-spinosis. Ent. syst. 1. 87. 6. lucidus.

Trox

Trox luridus Oliv. Inf. 1. 4. 5. 2. tab. 1. fig.
Scarabaeus Morticini Pall. Inf. 2. tab. A. fig.
 Herbft. Col. 3. tab. 21. fig. 5.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Dom. Vahl.

Thorax inaequalis, at haud spinofus.

cornutus. 9. T. thorace elytrisque spinofis ferratisque, ca
 cornubus duobus porrectis arcuatis. Ent. 1
 I. 88. 7.

Habitat in Ceylonia. Dom. de Paykull.

Minor T. fabuloso. Caput paruum, obscurum c
 nubus duobus arcuatis, longitudine fere tho
 cis, validis, apice obtusis, dentatis. Tho
 marginatus in medio parum eleuatus, vndi
 spinofus margineque ferrato.

Femina mari simillima, at capite mutico.

Spinicornis. 10. T. nigricans, thorace postice vtrinque ema
 nato, antennis spinofis. Ent. syst. 1. 88. 8

Habitat - - Mus. Dom. Tunstall.

T. fabuloso minor. Antennae lamellatae: arti
 lo primo spina longitudine fere stipitis arm
 Clypeus rotundatus, integer. Thorax sca
 angulis posticis emarginatis. Elytra pun
 eleuatis vix friata. Pedes nigri.

16. BOLITOPHAGVS. *Palpi* inaequales, 1
 formes.

Labium corneum, c
 datum, ciliatum.

Antennae monilif
 mes, extrorsum cr
 flores.

cornutus. 1. B. thorace cornubus duobus incuruis subtus b
 batis, capitis cornu erecto emarginato. 0)

Bolitophagi corpus paruum, oblongum, scabrum, tardum,

Opatrum bifurcum. Ent. fyft. fuppl. 40. 1. *
Opatrum cornutum. Panz. Fn. Am. boreal. Prod.
 tab. 1. fig. 5. 6.

Habitat in Carolinae fungis. Muf. Dom. Bosc.
 Caput fufcum, cornu eleuato, capite longiore, la-
 to apice truncato, emarginato. Thorax lineis
 eleuatis, in medio cornubus quobus porrectis,
 incuruis, fubtus barbatis. Margo valde den-
 tatus. Elytra fufca lineis eleuatis quatuor no-
 duloſis. Pedes fufci.

Femina capite mutico thoraceque tuberculis tan-
 tum duobus eleuatis.

2. *B. thoracis* margine crenato: angulo antico por- *crenatus.*
 recto, poſtico ſpinoſo, elytris fulcatis: fulcis
 punctatis.

Opatrum crenatum. Ent. fyft. 1. 88. 6.

Bolitophagus reticulatus. Illig. Col. Bor. 1.
 105. 1.

Panz. Naturf. 24. 14. 19. tab. 1. fig. 19.

Herbf. Col. 5. 216. 4. tab. 52. fig. 6.

Habitat in Europae Boletis.

Os maxillis palpiſque. *Labrum* reconditum,
 tranſuerſum. *Palpi* quatuor inaequales, fili-
 formes; *anteriores* multo longiores, quadri-
 articulati: articulo primo paruo, ſecundo ob-
 longo, obconico, tertio breui, vltimo compref-
 ſo,

pilae exſerto, ouato; *clypeo* rotundato, integro, *oculis* ro-
 tundatis, paruis, lateralibus, humo firmatis; *antennis* bre-
 uibus ſub clypeo infertis; *thorace* faepius inaequali, mar-
 ginato: margine crenulato anguloque antico porrecto la-
 titudine elytrorum; *ſcutello* paruo, rotundato, *elytris* ſtria-
 tis, rigidis longitudine abdominis, margine inflexo; *pedi-
 bus* mediocribus ſubcompressis, *tarſis* anticis quinque-, po-
 ſticis quadriarticulatis; *colore* obſcuro, grifeo, minime ni-
 tido.

fo, ouato, adhaerentes maxillae dorso, *posteres* breuiffimi, triarticulati: articulo primo cundoque breuibus, extremo ouato, acuto nati labii lateribus. *Mandibula* breuis, nea, dentata. *Maxilla* cornea, rotundata liata, intus vnidentata. *Labium* corneum. datum, siue apice dilatatum, emarginat margine dense ciliato.

agricola.

3. B. thorace laeni, elytris striatis.

Opatrum agricola. Ent. syst. 1. 91. 14.

Bolitophagus agricola. Illig. Col. Bor. 1. 10

Eledma. Latreille Inf.

Oliv. Inf 56. tab. 1. fig. 11.

17.18 Panz. Fn. Germ. 43. tab. 9.

Herbst, Col. 5. 222. 14. tab. 52. fig. 9.

Habitat in Europae Boletis.

Corpus paruum, obscure nigrum.

armatus.

4. B. capite bicorni, thorace inaequali: margine rato, elytris striato-echinatis.

Opatrum armatum. Panz. Fn. Germ,

Habitat in Austria. Dom. Meyerle.

Corpus paruum, obscurum, minime nitid

16.1

Caput cornubus duobus erectis, rectis. Thorax inaequalis: margine ferrato. Elytra profu striata, striis echinatis.

Femina capite mutico.

17. OPATRVM. *Palpi anteriores clauati: claua oblique truncata; posteriores filiformes.*

Labium submarginatum.

Antennae extrorsum crassiores.

1. O. cinereum, thorace plano, marginato, elytris *griseum*.
friis tribus eleuatis, postice dentatis. Ent. syst.

I. 88. I.

Oliv. Inf. 56. tab. I. fig. I. a. b. c. d.

Roff. Fn. Etr. 57. 138.

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

Corpus O. sabuloso maius, supra cinereum, immaculatum, subtus fuscum.

2. O. griseum thorace plano marginato, elytris linea *fuscum*.
eleuata vnica subdentata. Ent. syst. suppl. 40.

I. *

Habitat in Hispania. Prof. Abildgard. Mus. Dom. Lund.

Statura et summa affinitas praecedentis. Thorax planus, canaliculatus, margine dilatato, reflexo. Elytrorum linea media eleuata apicem haud attingit.

3. O.

Opatri corpus paruum, oblongum, gibbum, glabrum, utrinque obtusum, capite paruo in emarginatura lata thoracis, subrotundo, oculis rotundatis, lateralibus, antennis sub oculis insertis; thorace glabro, marginato: margine rotundato, latitudine elytrorum; scutello paruo, rotundato; elytris immarginatis, rigidis, abdomine longioribus: margine inflexo; pedibus breuibus, validis, tibiis apice dilatatis, edentulis, tarsis quinquearticulatis; colore obscure.

H 2

- obscurum.* 3. *O. fuscum*, thorace plano marginato, elytris uato-punctatis. Ent. syst. suppl. 40. 1. ⁴
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. de Sehel
Statura praecedentium. Thorax marginatus
naliculatus. Elytra plana, punctis plu-
releuatis.
- porcatum.* 4. *O. griseum*, thorace plano marginato, elytris
catis: punctis interiectis, eleuatis, atris.
syst. 1. 89. 2.
Habitat in Barbaria. Dom. Prof. Vahl.
Distinctum elytris porcatis.
- fabulosum.* 5. *O. fuscum*, elytris lineis eleuatis tribus dent
thorace emarginato. Ent. syst. 1. 89. 3.
Silpha fabulosa. Linn. syst. Nat. 2. 572. 17.
Sv. 456.
Oliv. Inf. 56. tab. 1. fig. 4.
Geoff. Inf. 1. 350. 7.
Illig. Col. Bor. 1. 107. 2.
Herbst. Col. tab. 52. fig. 5.
I. S. Panz. Fn. Germ. 3. tab. 2.
Habitat in Europae, Americae fabulosis.
- gibbum.* 6. *O. nigrum*, elytris lineis eleuatis plurimis obf
tis, tibiis anticis triangularibus. Ent. syst
89. 4.
Oliv. Inf. 56. tab. 1. fig. 6.
IV. 7. Illig. Col. Bor. 1. 108. 3.
Panz. Fn. Germ. 39. tab. 4.
Habitat in Europae collibus arenosis.
Corpus magis oblongum et postice magis gibb
- depressum.* 7. *O. griseum*, thorace elytrisque laeuibus, cly
emarginato. Ent. syst. suppl. 41. 4. ^o
Habitat in India. Dom. Daldorff.
Statura et summa affinitas *O. glabrati*, at duplo
ius et clypeus emarginatus.

O. nigrum, clypeo antice piceo, elytris subfria- *laevigatum*
tis. Ent. syst. 1. 89. 5.

Oliv. Inf. 56. tab. 1. fig. 8.

Habitat in noua Zelandia. Mus. D. Banks.

Caput et thorax laeuia, nigra, clypeo integro pi-
ceo. Thorax antice posticeque truncatus, sub-
sinuatus.

O. atrum, thoracis margine rotundato, elytris *crenatum*.
punctato-friatis.

Habitat in India orientali. Dom. Daldorff.

Satura omnino praecedentium, totum atrum et
distinctum, elytris friis punctatis simplicibus.

2. *O. nigrum*, thorace elytrisque laeuibus cinereis, *glabratum*,
clypeo integro. Ent. syst. 1. 90. 7.

Habitat in India orientali.

Magnitudo *O. fabulosi* at corpus totum laeue, gla-
brum, subtus nigrum.

1. *O. griseum*, elytris friatis. Ent. syst. 1. 90. 8. *arenarium*.

Oliv. Inf. 56. tab. 1. fig. 7.

Habitat in Germania.

Clypeus emarginatus. Thorax laeuis. Pedes nigri. IX

2. *O. cinereum*, elytris albo-friatis: friis nigro- *pictum*.
punctatis.

Habitat in Austria. Dom. Meyerle.

Satura parua *O. friati*. Thorax cinereus, margine
pallidiore punctisque duobus baseos nigris. Ely-
tra striata, cinerea, lineis obsoletis albis, et in
his puncta plurima distincta, alba.

3. *O. oblongum*, griseum, clypeo reflexo bidenta- *oblongum*.
to, elytris subfriatis.

Habitat Tranquebariae. Mus. D. de Sehestedt.

Satura reliquis longior. Clypeus apice reflexus,
bidentatus. Thorax marginatus, griseus. Ely-
tra substriata, grisea.

- clathratum.* 14. *O. nigrum*, elytris striatis: striis punctatis. Ent. syst. 1. 90. 9.
Habitat Cayennae. Dom. v. Rohr.
Distinctum elytrorum striis punctis impressis plicis serie.
- planum.* 15. *O. depressum*, nigrum, opacum, elytrorum simplicibus, clypeo integro. Ent. syst. 1. 90.
Habitat in Sibiria. Mus. de Sehestedt.
Corpus magis depressum, planum. Caput, thorax, elytra omnino nigra, opaca, immaculata.
- simplex.* 16. *O. nigrum*, opacum, elytrorum striis simplicibus, clypeo emarginato.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. de Sehestedt.
Distinctum sane a praecedentibus. Statura minus depressa. Clypeus emarginatus. Elytra simpliciter striata.
- granulatum.* 17. *O. atrum*, thoracis margine subreflexo: elytris striis elevatis tribus: sulcis punctatis. Ent. 1. 90. 11.
Habitat in Barbariae sabulosis. Mus. Dom. I. Fontaines.
Caput et thorax laevia, atra, immaculata, mane omni subreflexo. Striae elytrorum laevissime coeunt.
- subterraneum.* 18. *O. atrum*, punctatum, tibiis anticis dilatatis, dentatis. Ent. syst. suppl. 41. 12. °
Habitat in India orientali. Mus. D. Lund.
Duplo maius *O. tibiali*. Corpus totum atrum, punctatum. Pedes antici tibiis dilatatis, dentatis.
- ferrugineum.* 19. *O. thorace inaequali*, elytris clathratis, tibiis anticis dilatato-triangularibus.
Habitat in Iana. Mus. Dom. Lund.

statura et magnitudo *O. orientalis*, totum ferrugineum. Thorax marginatus, inaequalis, margine integro. Elytra clathrata. Tibiae anticae dilatato-triangularēs.

O. cinereum, thorace elytrisque rugosis, tibiis *orientale*.
anticis dilatato-triangularibus. Ent. syst. 1.
91. 12.

Alpha multistriata. Forfk. Desc. 77. 1.

Habitat in Oriente. Forfkahl.

Caput ruga transuersali, eleuata, clypeoque fisso.
Pedes cinerei.

O. nigrum, elytris punctatis subrugosis, tibiis *tibiale*.
anticis compresso triangularibus. Ent. syst. 1.
91. 13.

Civ. inf. 5. 6. tab. 1. fig. 10.

Ilig. Col. Bor. 1. 107. 1.

Panz. Fn. Germ. 43. tab. 10. 14. 18.

Herbst. Col. tab. 52. fig. 8.

Habitat in Suecia sub lapidibus.

Clypeus emarginatus. Caput et thorax laeuis,
nigra immaculata. Tibiae anticae basi bidentatae,
apice triangulares.

O. nigricans, thorace scabro: margine integro, *strigatum*.
elytris crenato-striatis, tibiis omnibus extus
subunidentatis. Ent. suppl. 41. 13. *

Habitat Tranquebariae. Dom. Daldorff.

Corpus totum paruum, griseo-nigrum. Caput et
thorax punctis eleuatis scabra. Elytra crenato-
striata. Tibiae omnes apicis margine exte-
riori dente paruo, acuto.

O. nigricans, thorace elytrisque hispidis. *hispidum*.

Corpus *hispidum*. Web. Inf. 38. 1.

Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff.

Par-

- Paruum.** Thorax emarginatus pilis eleuatis ;
pidis. Elytra striata, hispida. Corpus ful-
laeue glabrum.
- sericeum.* 24. *O. sericeum* griseum, elytris fulcatis: fu-
punctatis.
Opatrum sericeum. Web. Inf. 38. 2.
Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff.
Statura et magnitudo *O. ferruginei*. Anten-
porrectae, nigrae. Clypeus integer. Tho-
submarginatus, sericeus. Elytra sericea, n-
tifulcata: sulcis punctatis. Pedes simplices
- ouatum.* 25. *O. ouatum* griseum, elytris substriatis: marg-
albo vario.
Habitat in America meridionali. Smidt. Mus.
Lund.
Corpus paruum, magis ouatum. Antennae l-
ues, nigrae. Thorax marginatus. Elytra f-
striata grisea margine parum albo vario.
- canalicula-
tum.* 26. *O. cinereum*, elytris striatis: striis murica-
Ent. suppl. 42. 15. *
Habitat Tranquebariae. Dom. Daldorff. Mus.
de Sehestedt.
Corpus paruum, totum griseum. Capitis clyp-
integer. Thorax in medio canaliculatus, t-
ber. Elytra striata: striis muricatis. Tib-
anticae dentatae.
- minutum.* 27. *O. cinereum*, thorace rugoso, elytris lineis e-
natis quatuor laeuibus. Ent. syst. 1. 91. 1
Habitat in Suecia.
Corpus paruum, totum cinereum, obscur-
Elytra laeua lineis eleuatis quatuor.
- pusillum.* 28. *O. cinereum*, thorace scabro, elytris multostri-
tis. Ent. syst. 1. 91. 16.

Opatrum pusillum. Ross. Fn. Etr. 57. '139.

Habitat in Hungaria. Dom. Hybner.

Statura parua praecedentis.

18. ERODIVS. *Palpi* quatuor filiformes.

Maxilla truncata, cornea, bifida.

Labium corneum emarginatum.

Antennae moniliformes.

1. *E. gibbus ater*, elytris connatis, scabris: lateribus *testudinarius*.
puluerulento-albidis. Ent. syst. 1. 92. 1. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

2. *E. gibbus ater*, elytris lineis eleuatis tribus. Ent. *gibbus*.
syst. 1. 92. 2. *

Habitat in Arabia. Prof. Forstkahl.

3. *E. ater*, elytris linea eleuata vnica. Ent. syst. 1. *planus*.
92. 3. *

Habitat in Arabia. Prof. Forstkahl.

4. *E. gibbus ater*, elytris muricatis. Ent. suppl. *muricatus*.
42. 2. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Dom. Lund.

5. *E. ater*, elytris laeuissimis. Ent. syst. 1. 93. 4. * *minutus*.

Habitat in Oriente. Prof. Forstkahl.

19. SCAV-

Erodii corpus subrotundum, gibbum, glabrum, immarginatum, tardum; capite ouato, arcte thoraci innato, oculis paruis, rotundatis, lateralibus, antennis sub capitis margine insertis; thorace transuerso, latitudine elytrorum; scutello nullo; elytris connatis, abdomine longioribus, inflexis, rigidis, arcte adhaerentibus; pedibus breuibus, validis, tibiis anticis compressis, dentatis, reliquis apice bispinosis, tarsis quinquearticulatis, posticis quadriarticulatis; color atro, opaco.

20. SCARITES. *Palpi sex, filiformes.*
Labium corneum, dentatum.
Antennae moniliformes.
1. S. thorace subquadrato atro, elytris laevissimis. *depressus.*
 Ent. syst. 1. 94. 1. *
 Oliv. Inf. 36. tab. 2. fig. 15.
 Habitat Cayennae. Mus. Dr. Hunter.
2. S. thorace subquadrato, ater, elytris fulcatis: *marginatus*
 margine cyaneo. Ent. syst. 1. 94. 2. *
 Oliv. Inf. 36. tab. 2. fig. 20.
 Habitat Cayennae. Mus. Dr. Hunter.
3. S. testaceus laevissimus, capite obscuriore. Ent. *testaceus.*
 syst. Append. 437. 2.
 Habitat in Senegallia. Dom. de Paykull.
4. S. ater, thorace rugoso, elytris striatis. Ent. *grandis.*
 suppl. 43. 2. 3.
 Habitat in Brasilia. Dom. Weber.
5. S. ater, pedibus anticis palmato-digitatis, *mangigas*
 dibulis fulcatis, thorace postice dentato. Ent.
 syst. 1. 94. 3. * Voet. Col. tab. 33. fig. 1.
 Oliv. Inf. 36. tab. 1. fig. 1.
 Herbst. Arch. tab. 47. fig. 4.
 Habitat in Africa. Mus. D. Banks.

6. S.

Scaritis corpus oblongum, planiusculum, glabrum, immarginatum, agile; capite magno, ovato, inserto. antice impresso, mandibulis exsertis, forcipatis, oculis parvis, rotundatis, lateralibus, antennis brevibus, ad basin maxillarum foveae insertis: articulo primo longissimo; thorace transverso, angulo antico portecto, postice rotundato, latitudine elytrorum; scutello nullo; elytris connatis hispidis, longitudine abdominis, pedibus validis, femoribus compressis, tibiis anticis digitatis, intermediis dentatis, posticis ciliatis, tarsis quinquearticulatis; colore atro.

- impressus*. 6. *S. ater*, pedibus anticis digitatis, thorace canaliculato postice attenuato vtrinque impresso.
Habitat in America meridionali. Mus. D. Lund.
Nimis certe affinis *S. Giganti*. Caput antice bifurcatum. Thorax postice rotundatus, angustatus vtrinque impressus, denteque minuto, marginali.
- quadratus*. 7. *S. ater*, pedibus anticis digitatis, thorace quadrato, elytris striatis.
Habitat in Guinea. Mus. D. de Sehestedt.
Statura omnino *S. subterranei*, at omnino distinctus, thorace minus attenuato, omnino quadrato. Antennae fuscae.
- subterraneus*. 8. *S. ater*, pedibus anticis digitatis, capite antice sulcato, elytris striatis: striis laevibus.
Carabus interruptus. Fuesl. Arch. 6. 133. tab. 24. fig. 4.
Scarites subterraneus. Oliv. Inf. 2. 36. tab. 1. fig. 10.
Scarites Indus. Oliv. Inf. 2. 36. tab. 1. fig. 2. a. b. ex India orientali vix differt.
Carabus spinipes. Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 1. Voet. Scarab. tab. 33. fig. 2.
Habitat in America, Europa australiori.
- laevigatus*. 9. *S. thorace canaliculato, postice rotundato, at elytris laevissimis*. Ent. syst. 1. 95. 5. *
VI. 4. - Habitat in Italia. Dr. Allioni.
- porcatus*. 10. *S. ater nitidus, elytris obscuris porcatis*. Ent. suppl. 42. 4. *
Habitat in India orientali. Mus. D. de Sehestedt.
- ruficornis*. 11. *S. ater, elytris striatis, palpis antennisque ferrugineis*.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lund.

Reliquis minor et brevior. Caput antice imprefsum, atrum. Mandibulae porrectae, intus dentatae. Palpi et maxillae ferrugineae. Antennae moniliformes ferrugineae. Thorax ater, transuersim tenuiffime striatus, linea media imprefsa. Elytra striata striis laeuis. Tibiae anticae sexdentatae, dentibus tribus exterioribus validioribus, intermediae quadridentatae.

12. *S. thorace subquadrato ater, elytris striatis: crenatus.*
striis crenatis, capite antice acuminato. Ent. syst. 1. 95. 6. *

Habitat in India orientali. Mus. Dom. Lund.

13. *S. cyaneus glaberrimus, antennis pedibusque cyaneus, nigris.* Ent. syst. 1. 95. 7. *

Habitat in noua Hollandia. Mus. Dom. Banks.

14. *S. ater, elytris striatis: macula postica ferruginea.* *apustulatus* Ent. suppl. 44. 8. *

Carabus Schuch. Ent. syst. 1. 153. 125. *

Habitat in Americae Infulis. Dr. Pflug.

15. *S. piceus, pedibus anticis palmato-digitatis.* *arenarius.* Ent. syst. 1. 96. 9.

Tenebrio Foffor. Linn. syst. Nat. 2. 675. 7.

Fn. Sv. 817.

Scarites Foffor Illig. Col. Bor. 1. 211. 2.

Attelabus Foffor. Degeer. Inf. 4. 350. 1. tab.

30. fig. 12.

Panz. Fn. Germ. 43. tab. 11. 17. 18

Oliv. Inf. 36. 19. 16. tab. 1. fig. 6.

Voet. Col. tab. 33. fig. 3.

Habitat in Europae collibus arenosis.

16. *S. aeneus, thorace subglobofo, elytris punctato-thoracicus, striatis.*

Scarites thoracicus. Illig. Col. Bor. 1. 111. 3. VII. 5.

Oliv.

Oliv. Inf. 36. 14. 17. tab. 2. fig. 14.

Roff. Fn. Etrusc. 1. 274. 568.

Habitat in Europa australiori.

Praecedente minor, et thoracis, figura globosa omnino distinctus.

gibbus.

17. *S. ater*, thorace articulado canaliculato, elytris striatis. Ent. syst. 1. 96. 10. *

Illig. Col. Bor. 1. 112. 4.

1. I. 6. Panz. Fn. Germ. 5. tab. 1.

Oliv. Inf. 36. 15. 19. tab. 2. fig. 16.

Herbst. Arch. 5. 142. 58. tab. 29. fig. 17.

Habitat in Germania. Dom. Smidt.

cursor.

18. *S. testaceus*, thorace oblongo: angulis quinque denticulatis. Ent. syst. 1. 96. 11.

Tenebrio cursor Linn. syst. Nat. 2. 675. 8.

Fn. Sv. 818.

Müll. Zool. Dan. 74. 798.

Habitat in Europae fabulosis.

Arabs.

19. *S. niger*, thorace ferrato, antennis pedibusque testaceis. Ent. syst. 1. 97. 12. *

Habitat in Oriente. Dom. Forfkahl.

21. SEPIDIVM. *Palpi* quatuor, filiformes.

Maxilla brevis videntata.

Labium breue, corneum ad basin emarginatum.

Antennae filiformes.

tricospidata-

tum.

1. *S. thorace tricospidato*, corpore griseo. Ent. syst.

1. 97. 1. * Herbst. Col. tab. 126. fig. 1.

Habitat in Arabia. Dom. Prof. Forfkahl.

2. *S.*

Sepidii corpus oblongum, inaequale, immarginatum, tardum; *capite* magno, ovali, *clypeo* truncato, *oculis* magnis,

2. *S. thorace tricuspido, obscurum, elytrorum dif-variegatum*
 co albido: lineolis obliquis fuscis. Ent. syst. 1.
 97. 2. *
- Habitat in Barbariae fabulosis. D. Desfontaines.
3. *S. thorace tricuspido cristato, corpore variega-cristatum.*
 to. Ent. syst. 1. 98. 3. *
- Pall. Icon. tab. 6. fig. 26.
 Herbst. Col. tab. 126. fig. 4.
 Habitat in Arabia. Prof. Forskahl.
4. *S. thoracis lateribus angulatis, elytris reticula-reticulatum*
 tis. Ent. syst. 1. 98. 4. *
- Herbst. Col. tab. 126. fig. 2.
 Habitat ad Cap. Bon. Spei.
 Cum sequentibus vix huius generis mihi haud ri-
 te examinatum.
5. *S. thorace laevi nitido, atrum, elytris rugosis: li-rugosum.*
 nea eleuata vnica. Ent. syst. 1. 98. 5. *
- Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Dom. Banks.
6. *S. thorace subangulato, elytris atris: vittis dua-vittatum.*
 bus albis lineaque eleuata vnica. Ent. syst. 1.
 98. 6. *
- Herbst. Col. tab. 126. fig. 6.
 Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

gnis, reniformibus, lateralibus; *antennis* breuibus in fo-
 uea sub capite insertis; *thorace* magno, inaequali, lat-
 tudine elytrorum; *scutello* nullo; *elytris* connatis, inae-
 qualibus, rigidis, abdomine longioribus: margine inflexo;
pedibus mediocribus, simplicibus, tarsis anticis quinque,
 posticis quadriarticulatis; *colore* griseo, obscuro.

22. PIMELIA. *Palpi* quatuor, filiformes.
Maxilla brevis, videntata.
Ligula breuissima, membranacea, truncata.
Antennae filiformes.

striata.

1. P. atra glabra, elytris striis quatuor sanguineis.
 Ent. syst. 1. 99. 1. *
Tenebrio glandiformis. Pall. Icon. 1. tab. fig. 11. b.
 Oliv. Inf. 59. tab. 1. fig. 11.
 Wolff. Inf. Cap. tab. 2. fig. 16.
 Habitat in India. *Cap. B. sp.*

unicolor.

2. P. glabra nigra, elytris lineis tribus elevatis obsolete.
 Ent. syst. 1. 99. 2. *
Tenebrio gibbus. Pall. Icon. 1. tab. C. fig. 11.
Tenebrio gibbus. Degeer Inf. 5. tab. 13. fig. 8.
 Oliv. Inf. 39. tab. 2. fig. 22.
 Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 9.
 Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Dom. Banks.

flavicollis.

3. P. glabra atra, capite postice albo villosa.
 Ent. syst. Append. 438. 2. *
 Oliv. Inf. 59. tab. 3. fig. 26.
 Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Holthuyferi.

gibba.

4. S. atra, elytris linea elevata abbreviata lateraliter
 carinata. Ent. syst. 1. 100. 3. *

Pim.

Pimelie corpus magnum, ovatum, glabrum, immarginatum, gibbum, tardum; capite ovato, obtuso, oculis magnis lateralibus, reniformibus; in medio coarctatis, firmatis; antennis sub capitis margine insertis; thorace gibbo rotundato; scutello nullo; elytris connatis, rigidis, longitudine abdominis: margine inflexo; pedibus longiusculis, simplicibus; femoribus compressis; tarsis anticis quinque-, posterioribus quadriarticulatis; colore plerumque atro.

- Pimelia planata*. Thunb. nou. Inf. sp. 6. 120.
 Oliv. Inf. 59. tab. 2. fig. 24.
 Habitat in India. Mus. Dr. Hunter.
5. *P. oblonga, atra, elytris laeuiffimis vnicoloribus. laeuigata.*
 Ent. syst. 1. 100. 4. *
 Habitat in Hungaria. Dom. Hybner. *V. 8*
6. *P. thorace laeuiffimo, atra, elytris postice spino- globosa.*
 fis. Ent. syst. Append. 438. 4. *
 Habitat ad Cap. Bon. Spei. Dom. Paykull.
7. *P. ouata, atra, elytris laeuiffimis vnicoloribus. glabrata.*
 Ent. syst. 1. 100. 5. *
 Oliv. Inf. 59. tab. 2. fig. 14.
 Habitat in Germania. Dom. Smidt.
8. *P. nigra, corpore muricato hispido. Ent. syst. 1. hispida.*
 100. 6. *
Tenebrio hispidus. Forstkahl Descr. 79. 8.
Tenebrio setosus. Pall. Icon. 1. tab. C. fig. 7.
 Oliv. Inf. 59. tab. 1. fig. 10. 12.
 Habitat rarius in hortis Alexandrinis, sub fermen-
 tis. Dom. Prof. Forstkahl.
9. *P. nigra, elytris muricatis, pedibus elongatis. longipes.*
 Ent. syst. 1. 100. 7. *
 Oliv. Inf. 59. tab. 1. fig. 3.
 Habitat in Aegypto. Prof. Forstkahl.
10. *P. grisea, elytris linea eleuata vnica angulatis. rustica.*
 Ent. syst. Append. 438. 7. *
 Habitat ad Cap. Bon. Spei. Dom. Paykull.
11. *P. nigra, coleoptris obtusis: striis muricatis. muricata.*
 Ent. syst. 1. 100. 8. *
Tenebrio muricatus. Linn. syst. Nat. 2. 676.
 17. Mus. Lud. Vlr. 100.
Tenebrio echinatus. Pall. Icon. 1. 706. 51.

Roff. Fn. Etr. 1. 229. 573.

Geoff. Inf. 1. 352.

Habitat in Europa australi, Oriente.

tuberculata 12. *P. nigra*, thorace scabro, elytris tuberculatis muricatis. Ent. syst. 1. 101. 9. *

Habitat in Italia. Mus. Dom. de Schlangbusch.

morbillosa 13. *P. atra*, thorace laevi, elytris tuberculis nerosis lineisque duabus elevatis laevibus, pedibus elongatis. Ent. syst. App. 439. 9. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Dom. Helv.

punctata 14. *P. atra*, thorace globoso: punctis duobus pressis, elytris rugosis: striis tribus elevatis laevibus. Ent. syst. 1. 101. 10. *

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

scabra 15. *P. atra*, elytris scabris, antennis pedibusque scis. Ent. syst. 1. 101. 11. *

Oliv. Inf. 59. tab. 2. fig. 14.

Thunb. nou. Inf. sp. 6. pag. 19.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Dom. Banks

Character generis emendatus. *Oscillae* maxillisque. *Palpi* quatuor inaequales, filiformes anteriores longiores, quadriarticulati: articulo secundo longiori, ultimo obtuso, truncato adhaerentes maxillae dorso, posteriores breviores, triarticulati: articulo ultimo obtusato, adnati labii basi. *Mandibula* magna, crassa, cornea, incurva, apice fissis. *Maxilla* brevis, membranacea, videntata et bifida, dente valido, obtuso. *Ligula* membranacea, brevissima, rotundata, truncata. *Labium* corneum, breve, rotundatum, apice emarginatum.

grossa 16. *P. atra*, elytris scabris: lineis elevatis tribus laevibus. Ent. syst. 1. 101. 12. *

Oliv. Inf. 59. tab. 1. fig. 5.

Habitat in Barbariae arenosis. Dom. Vahl.

17. *P. elytris spinosis*: linea laterali eleuata ferra-angulata.
ta. Ent. syst. 1. 101. 13. *

Pimelia angulosa. Oliv. Inf. 59. tab. 2. fig. 23.

Tenebrio spinosus. Forfk. Descript. 80. 18.

Tenebrio asperrimus. Pall. Icon. 1. 55. 22.

Habitat Alexandriae. Dom. Prof. Forfkahl.

18. *P. thoracis lateribus spinosis*, elytris lineis tri-echinata.
bus eleuatis echinatis. Ent. syst. 1. 101. 14. *

Oliv. Inf. 59. tab. 3. fig. 32.

Habitat ad Cap. Bon. spei. Mus. Dom. Banks.

19. *P. thorace scabro*, elytris pilosis muricatis, fe-dentipes.
moribus anticis vnispinosis. Ent. syst. 1. 102.

15. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei.

20. *P. thorace glabro*, nigra, elytris fuscis: lineis dentata.
tribus eleuatis ferratis. Ent. syst. 1. 102. 16. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Dom. Lund.

21. *P. thorace glabro*, atra, elytris striis tribus ele-crenata.
uatis ferratis. Ent. suppl. 44. 16. *

Habitat in Sapphi. D. Schousboe. Mus. Dom. de
Sehestedt.

22. *P. thorece laeui nitido*, elytris lineis eleuatis porcata.
tribus: interiectis punctis eleuatis. Ent. syst.

1. 102. 17. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Dom. Banks.

23. *P. thorace nigro*, elytris cinereis fusco-macu-maculata.
latis: lineis tribus eleuatis, secunda subundata.

Ent. syst. 1. 102. 18. *

Oliv. Inf. 59. tab. 3. fig. 31.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Dom. Banks.

- ferrata.* 24. *P. thorace variegatq, elytris lineis tribus elevatis echinatis: interstitiis rugosis, pedibus elevatis.* Ent. syst. 1. 103. 19. ^o
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Dom. Banks.
- minuta.* 25. *P. thorace laevi obscuro, elytris cinereis his dis: lineis tribus elevatis laevibus.* Ent. syst. 1. 103. 20. ^o
Oliv. Inf. 59. tab. 2. fig. 21.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Dom. Banks.
- gemmata.* 26. *P. cinerea, thorace laevi vtrinque angulato, elytris punctis elevatis atris.*
Habitat in Guinea. Mus. Dom. de Sehestedt.
Corpus paruum, totum obscure cinereum, minus nitens. Caput et thorax laevia, thorax margine vtrinque in angulum excurrente. Elytra connata absque striis elevatis, at punctis plurimis, elevatis, atris subnitidulis.
- canaliculata.* 27. *P. cinerea, thorace subcanaliculato vtrinque angulato, elytris lineis elevatis obsolete.*
Habitat in Guinea. Mus. Dom. Lund.
Statura et magnitudo praecedentis. Thorax laevi canali medio laevissimo exaratus margineq vtrinque angulato. Elytra lineis elevatis obsolete.
- costata.* 28. *P. gibba, atra, thorace scabro, elytris lineis elevatis: interstitiis laevissimis.*
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Dom. Lund.
Statura *P. minutae* at paullo minor. Antennae moniliformes, articulo ultimo obconico. Caput et thorax atra, subscabra. Elytra gibba, atris lineis elevatis tribus: interstitiis laevissimis. Pedes scabri.
- rugosa.* 29. *P. thorace scabro, elytris rugosis antice angustioribus.* Ent. syst. 1. 103. 21. ^o H

Habitat in Aegypto. Dom. Prof. Forfkahl.

30. *P. atra*, thoracis margine rotundato, elytris striis *variolaris*. plurimis echinatis.

Pimelia variolaris. Oliv. Inf. 59. tab. . fig .

Habitat - - - Mus. Dom. Bosc.

De genere haereo. Antennae breues articulis omnibus globosis. Caput punctatum. Thorax planus, subpunctatus: lateribus rotundatis, Elytra striis eleuatis plurimis, echinatis. Pedes simplices, nigri.

31. *P. globosa*, atra, elytris crenato-striatis. Ent. *pygmaea*. suppl. 45. 35. °

Pimelia pygmaea nigra, antennis breuissimis clauatis, elytris globosis, crenato-striatis. Payk. VI. 4

Fn. Sv. 3. 440. 1.

Habitat in Suecia ad littora argillofa. D. Paykull.

23. EVRYCHORA. *Palpi* quatuor inaequales, filiformes.

Maxilla membranacea, bifida, truncata.

Labium corneum, integrum.

Antennae filiformes, articulo tertio longiori.

1. *Eurychora*.

ciliata.

Pimelia ciliata. Ent. syst. 1. 104. 28. 2.

Eurychora ciliata. Thunb. nou. sp. 6. 116.

Oliv. Inf. 59. tab. 2. fig. 19.

Herbst. Col. tab. 119. fig. 109.

Voet. Col. 2. tab. 43. fig. 23.

Habitat ad Cap. Bon. Spei.

6. palpis maxillisque. *Palpi* quatuor inaequales, subfiliformes: *anteriores* longiores, quadriarticulati: articulo secundo longiori, ultimo qua-

to, subcrassiori, adhaerentes maxillae dorso, posteriores brevissimi, triarticulati, sub labio inserti. Mandibula magna, cornea, arcuatodenticulata, acuta. Maxilla brevis, membranacea, bifida, obtusa et fere truncata. Labium breve, corneum, truncatum, integrum.

Genus sequenti affine, forte iungenda.

24. AKIS. Palpi quatuor, inaequales, filiformes.

Maxilla compressa, ciliata.

Ligula membranacea, elongata cordata.

Antennae filiformes.

* thorace marginato.

planata.

1. A. thorace marginato, atra, elytris lineis duabus lateralibus elevatis.

Habitat Tanger. Dom. Schousboe.

Corpus magnum, laeve, atrum. Thorax planus marginatus: marginibus rotundatis, nullo modo spinosis. Elytra connata, laevia, lineis duabus lateralibus elevatis; interiore abbreviata. Pedes inermes.

Variet rarius elytris postice parum muricatis.

2.

Akis corpus medium, planiusculum, agile; capite magno ovato, inserto, oculis vix prominulis, ovatis, trans lateralibus; antennis brevibus: articulo tertio longior; capitis clypeo insertis; thorace saepius plano, marginibus rotundatis, saepe orbiculato, immarginato; scutello nullo; elytris connatis, interdum planis, interdum gibbis, immarginatis, rigidis, longitudine abdominis aequine inflexo, cingente; pedibus medioeribus muticis, anterioribus compressis, tarsis anterioribus quinque, posterioribus triarticulatis; colore nigro.

2. A. thorace antice posticeque spinoso, elytris striis spinosa.
eleuatis laeuis.

Pimelia spinosa. Ent. syst. 1. 103. 22. *

Tenebrio spinosus. Linn. syst. Nat. 2. 677. 24. 1.

Mus. Lud. Vlr. III.

Akis spinosa. Herbst. Col. 8. 126. 1. tab. 125.
fig. 5.

Oliv. Inf. 59. tab. 3. fig. 35.

Habitat in Europa australi, Oriente.

Variat striis laeuis et subserratis.

3. A. thorace marginato: marginibus antice postice acuminata.
que spinosis, elytris laeuis.

Pimelia acuminata. Ent. syst. 1. 103. 23. *

Akis acuminata. Herbst. Col. 8. 129. 3. tab. 125.

fig. 7.

Oliv. Inf. 59. tab. 3. fig. 36.

Habitat in Europa australi. Dom. Boeber.

4. A. thorace marginato: marginibus reflexis, ely- reflexa.
tris mucicatis: linea laterali carinata laeui.

Pimelia reflexa. Ent. syst. 1. 104. 24. *

Oliv. Inf. 59. tab. 4. fig. 9.

Tenebrio vulgaris. Forst. Descript. 79. 9.

Akis reflexa. Herbst. Col. 8. 128. 2. tab. 126.

fig. 6.

Habitat in Oriente. Prof. Forst.

** *thorace orbiculato*.

5. A. nigra, elytris laeuis uniangulatis, thorace collaris.
angustiori, capite depresso angulato.

Pimelia collaris. Ent. syst. 1. 104. 26. *

Tenebrio collaris. Linn. Syst. Nat. 2. 671. 41.

Pimelia collaris. Herbst. Col. 8. 128. 1. tab.

125. fig. 3.

Oliv. Inf. 59. tab. 1. fig. 8.

- Vill. Ent. 1. 319. 17.
Habitat in Europa australiori.
- lineata.* 6. A. thorace rotundato scabro, elytris striis trib punctato-scabris, postice lineolis albis.
Pimelia lineata. Ent. syst. 1. 105. 29. *
Sepidium lineatum. Thunb. n. Sp. Inf. 6. 4 fig. 16.
Oliv. Inf. 59. tab. 2. fig. 20.
Habitat in Sibiria. Mus. Dom. Banks.
- ~~*leucographa.*~~ 7. A. thorace rotundato scabro, coleoptris cinerei lineis elevatis novem nigris.
Pimelia leucographa. Ent. syst. 1. 105. 30.
Tenebrio leucographus. Pall. Icon. tab. 6. fig. 2
Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.
- glabra.* 8. A. atra thorace rotundato, elytris glaberrimis.
Pimelia glabra. Ent. syst. 1. 105. 31. *
Tenebrio laevis. Foršk. Descr. 78. 7.
Tenebrio hypolithos. Inf. Ross. 1. 44. tab. 1 fig. 11.
Oliv. Inf. 59. tab. 2. fig. 13.
Voet. Col. tab. 34. fig. 5.
Habitat in Aegypto. Prof. Forškahl.
Magnitudine variat.
- punctata.* 9. A. glabra atra, elytris striis punctatis.
Pimelia punctata. Ent. suppl. 45. 31. *
Habitat Tangeer. Mus. Dom. Lund.
- abbreviata.* 10. A. grisea, punctis duobus impressis, elytris stri elevatis plurimis abbreviatis.
Habitat in Senegallia. Mus. D. de Sehestedt.
Statura omnino A. glabrae. Caput obscurum
Thorax dorso plano punctis duobus impressu
Elytra grisea striis sex elevatis, glabris, quae tamen apicem haud attingunt.
Forte potius Scaurus mihi haud rite nota.

11. *A. glabra*, thorace postice angustato, elytris acuminatis. *angustata*.

Pimelia angustata. Ent. syst. 1. 105. 32. •
Habitat in Oriente. Prof. Forstkahl.

12. *A. glabra*, thorace orbiculato, elytris acuminatis. *orbiculata*.

Pimelia orbiculata. Ent. syst. 1. 106. 34. •
Tenebrio Vernus. Pall. Icon. tab. 6. fig. 8.
Habitat in Oriente. Prof. Forstkahl.

13. *A. glabra laevis*, elytris substriatis.

Tenebrio glabratus. Ent. suppl. 49-19. •
Habitat in India orientali. Mus. Dom. Lund.
Affinis certe *A. glabratae*, at quadruplo minor.

laevigata.

14. *A. filiformis nigra*, thorace elongato cylindrico, elytris punctato-striatis. *filiformis*.

Tenebrio filiformis. Ent. syst. 1. 114. 20.
Stenosis angustata. Herbst. Col. tab. 127. fig. 1.
Rhinomacer Brentoides. Ross. Fn. Etr. 1. 135.
tab. 3. fig. 14.

Habitat in Barbaria. Mus. Dom. Desfontaines.
Corpus paruum, fere filiforme, vix huius generis.
Caput magnum ovatum, antennis articulis brevibus compressis, vtrinque prominulis. Thorax elongatus, cylindricus, punctatus. Elytra connata, punctato-striata, Pedes nigri tibiis rufis.

25. **PLATYNOTVS.** *Palpi* quatuor inaequaliter
 anteriores articulo
 ultimo dimidiato.

Labium breue, corneum
 utrinque unidentatum
Antennae apice moniliformes.

reticulatus. 1. *P. obscurum*, elytris cinerascens reticulatum
Opatrum reticulatum. Ent. suppl. 40. 1.
 Habitat in India orientali. Dom. Daldorff.

Os palpis maxillisque. *Palpi* quatuor inaequaliter
 anteriores longiores, clauati, quadriarticulati
 articulis subaequalibus; ultimo dimidiato
 clausi adhaerentes maxillae dorso, posteriori
 triangulati; articulis subaequalibus: ultimi
 quatuor adnati labii apici. *Labrum* breue tra-
 uersum, membranaceum. *Mandibula* crassa
 cornea, incurua, apice submarginata. *Maxilla*
 elongata, cornea, subflexuosa, unidentata
 apice incrassata, acuta. *Labium* breue, cor-
 neum, striatum in medio, utrinque uniden-
 tum, apice truncatum, obtusum. *Antennae*
 apice parum crassiores, moniliformes: articuli
 secundo-longiori.

excavatus. 2. *P. thorace postice angulato*, elytris excavato - pu-
 ctatis acutiusculis.

Ela

Platynoti corpus oblongum, obscurum, tardum, *capite* ovali
clypeo rotundato, emarginato, *oculis* magnis, lateraliter
 transversis, antice firmatis; *antennis* brevibus sub capite
 insertis; *thorace* planiusculo, marginato: margine
 rotundato antice posticeque angulo acuto; *scutello* par-
 tialiter triangulari; *elytris* rigidis longitudine abdominis, margine
 inflexo, cingente; *pedibus* validis, simplicibus; *femoribus*
 compressis; *tarsis* anticis quinque-, posticis quadriarticulatis,
 colore obscuro.

- Blaps excavata*. Ent. syst. 1. 107. 4. •
Helops Maurus. Ent. syst. 1. 120. 15. •
 Petiv. Gazoph. tab. 92. fig. 14.
 Act. Angl. 211. 861. 13.
 Habitat in India orientali. Dom. Daldorff.
3. *P. ater*, thorace laevi vtrinque rotundato, elytris *crenatis*.
 sulcatis: sulcis crenatis.
 Habitat in India orientali. Mus. Dom. Lund.
 Statura et magnitudo praecedentis. Caput et tho-
 rax atra, laeua. Thoracis margo rotundatus,
 parum reflexus, antice posticeque angulo acu-
 to. Elytra atra, valde sulcata: sulcis crenatis.
 Pedes inermes.
4. *P. ouatus niger*, thorace marginato, elytris *cre-* *dilatatus*.
nato - striatis.
Blaps dilatata. Ent. suppl. 47. 8. •
 Habitat in Insula St. Thomae. Mus. D. Lund.
5. *P. ater*, elytris lineis eleuatis tribus punctisque *variolosus*.
granulatis, thorace emarginato.
Blaps variolosa. Ent. syst. 1. 108. 10. •
Silpha rugosa. Scop. carn. 53.
 Oliv. Inf. 2. 11. 13. tab. 2. fig. 10.
 Habitat in Africa. Dom. Prof. Vahl.
6. *P. depressus ater*, elytris lineis eleuatis tribus *laeuigatus*.
sublaeuibus.
Blaps laeuigata. Ent. syst. 1. 108. 11. •
 Habitat in Marocco. Mus. D. de Sehestedt.
7. *P. fuscus* thorace marginato, elytris lineis eleua- *vndatus*.
tis tribus vndatis.
 Habitat Cajennae. Mus. Dom. Richard.
 Statura praecedentium, obscure fusca. Caput et
 thorax laeua thoracis margine exserto, rotun-
 dato. Elytra striis tribus valde vndatis, eleua-
 tis,

tis, quae tamen apicem haud attingunt. Pedes
 firmes.

ferratus. 8. P. thoracis margine incrassato, elytris lineis
 tribus elevatis crenatis.

Blaps ferrata. Ent. syst. suppl. 47. 12. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. de Payku

rugosus. 9. P. thorace marginato, elytris striis tribus eleu-
 tis: interstitiis subrugosis.

Habitat in Mauritania. Mus. D. Lund:

Statura et magnitudo P. variolosae. Caput et th-
 rax nigra, obscura. Elytra striis tribus eleu-
 tis, abbreviatis, sulcis subrugosis. Pedes nigri

dentipes. 10. P. niger, thoracis marginibus dilatatis, tibi
 quatuor anticis videntatis.

Blaps dentipes. Ent. syst. App. 4. 439. 8. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Dom. Paykull.

Huius generis videtur.

orbilofus XI. P. thorace marginato: marginibus reflexis, ely-
 tris linea media elevata dentata.

Pimelia variolosa. Ent. syst. suppl. 45. 24. *

VI. 4. *Pimelia variolosa*. Panz. Fn. Germ. tab.

Habitat in Germania australiori. Dom. Panzer.

granulatus 12. P. ater, elytris granulato - subspinosus.

Blaps granulata. Ent. syst. I. 107. 5. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lund.

26. BLAPS. *Palpi* quatuor inaequales, clauati.
Maxilla recta, bifida.
Ligula membranacea, fissa.
Antennae apice moniliformes.
1. B. nigra, thorace rotundato, elytris mucronatis *Gages*.
 laeuissimis. Ent. syst. 1. 106. 1. *
Tenebrio Gages. Linn. syst. Nat. 2. 676. 14. VIII. 4.
 Habitat in Europa australiori.
2. B. coleoptris mucronatis sulcatis. Ent. syst. 1. *sulcata*.
 106. 2. *
Tenebrio polychrestus. Foršk. Descript. 79. 10.
 Habitat in Oriente. Prof. Forškahl.
3. B. atra, coleoptris mucronatis subpunctatis. Ent. *mortifaga*.
 syst. 1. 107. 3.
Tenebrio mortifagus. Linn. syst. Nat. 2. 676.
 15. Fn. Sv. 822.
 Geoff. Inf. 1. 346.
 Frissh. Inf. 13. tab. 25.
 Schaeff. Icon. tab. 36. fig. 6. I. 7.
 tab. 6. fig. 13.
 Habitat in Europae suffocatis.
Mandibula cornea, crassa, apice emarginata.
4. B. oblonga atra coleoptris laeuibus obtusis. Ent. *obtusa*.
 syst. suppl. 46. 3. *
 Habitat in Europa, 5.

Blaps corpus oblongum, gibbum, glabrum, immarginatum, tardum; capite prominulo, obtuso, oculis transuersis, lateralibus; antennis breuibus, ante oculos subcapitis margine insertis; thorace vix marginato: margine rotundato, planisculo, postice rotundato, latitudine elytrorum; scutello nullo; elytris connatis, rigidis, longitudine abdominis margine inflexo, cingente; pedibus validis; femoribus compressis, subtus canaliculatis, tarsis anticis quinque, posterioribus quadriarticulatis, colore atro.

- spinipes.* 5. *B. ouata* atra, elytris laevibus. tibiis anticis
tato-spinosis. Ent. syst. suppl. 46. 5. *
Carabus Blaptoides. Creutz. Inf. 112. 5. ta
VIII. 5 fig. 17.
Habitat in Hungaria. Dom. Hybner.
- calcarata.* 6. *B. ouata*, elytris punctato-friatis, femoribus
ticipis dentatis. Ent. syst. suppl. 46. 5. *
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Dom. Weber.
- tenebrosa.* 7. *B. ouata* atra, elytris friatis, antennis tibiis
ferrugineis.
Habitat in Germania. Mus. Dom. de Sehested
Statura omnino *B. spinipedis*, at minor. Ca
atrum palpis antennisque rufis. Thorax
laeviusculus margine deflexo. Elytra fri-
friis simplicibus. Pedes breves, ferruginei
moribus nigris.
- buprestoi-* 8. *B. ouata* atra, elytris connatis laevissimis. I
des. syst. 1. 107. 6. *
Pall. Icon. 2. 719. 44.
Habitat ad Cap. Bon. Spei.
- dermestoi-* 9. *B. ouata* nigra, elytris obsolete friatis, cly
des. emarginato. Ent. syst. 1. 107. 7. *
17. 20. Illig. Col. Bor. 1. 120. 2.
V. 10 Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.
- emarginata* 10. *B. atra*, elytris crenato-friatis, labio emarg
to. Ent. syst. 1. 108. 9. *
Helops tristis. Ross. Fn. Etr. 1.
Habitat in Marocco. Mus. Dom. de Sehested
Forte potius ad *Helopsis* genus amandanda.
- tristis.* 11. *B. atra*, elytris fulcatis: fulcis laevibus. I
syst. 1. 108. 12. *
Habitat in Barbariae sabulosis. Mus. Dom. I
fontaines.

12. *B. atra*, femoribus posticis subtus canaliculatis *femoralis*
 ferrugineo-villosis. Ent. syst. 1. 109. 13. *
Opatrum femoratum. Illig. Col. Bor. 1. 109. 4.
 Panz. Fn. Germ. 39. tab. 5. 12-19
 Habitat in Germania. D. de Schefstedt.
 Ab hoc genere cum sequentibus differre videtur.
 Nullo modo tamen *Opatra*, forte potius *Platynoti*, mihi haud rite examinatae. Dom. Latreille nonnum genus: *Pedinus* ex his constituit, et quidem rite, vti mihi videtur, at characteres mihi adhuc desunt.
13. *B. atra*, elytris striatis, tibiis anticis dilatato-*tibialis*
 triangularibus. Ent. syst. suppl. 48. 13.
 Habitat ad Cap. Bon. Spei. Dom. de Paykull.
14. *B. thorace* postice angulato, griseo-fusca, ely-*crenata*
 tris crenato-striatis obtusis. Ent. syst. 1. 109.
 14. *
 Habitat in Coromandel. Mus. D. Banks.
15. *B. oblonga atra*, elytris laevissimis. Ent. syst. 1. *glabra*
 109. 15. *
 Habitat in Europae quisquiliis. 11. 10. V. 8
16. *B. atra*, antennis ferrugineis, elytris punctato-*punctata*
 striatis. Ent. syst. 1. 109. 16. *
 Habitat in Americae meridionalis Insulis. Dom. Smidt.
17. *B. atra*, elytris clathratis, antennis apice fer-*clathrata*
 rugineis.
 Habitat in America meridionali. Dom. Smidt.
18. *B. atra*, supra aeneo-nitidula, elytris punctato-*metallica*
 striatis.
 Habitat in Carolina. Mus. Dom. Bosc.
 Praecedentibus paullo minor. Clypeus magnus,
 obtusus et fere truncatus. Thorax subtilissime
 pun-

punctatus, niger, aeneo-nitidulus. Ely
punctato-friata, aeneo-nitidula. Cor
atrum.

27. TENEBRIO. *Palpi* quatuor inaequales.
anteriores clauati.
posteriores filiformes.
Maxilla bifida.
Labium truncatum, integrum
Antennae moniliformes.

Gigas.

1. *T. oblongus* ater, elytris fulcatis.
Tenebrio Gigas. alatus ater, elytris friatis, th
race laevi. Linn. syst. Nat. 2. 674. 1. A
Acad. 6. 396. 26.
Helops laminatus. Ent. syst. 1. 117. 1. *
Mylasfis Gigantes. Pall. Icon. tab. C. fig. 1.
Vpis Gigas. Herbst. Col. tab. 90. fig. L
Habitat in America meridionali.

*punctula-
tus.*

2. *T. niger*, thorace quadrato: marginibus subde
ticulatis, elytris striato-punctatis.
Helops punctulatus Ent. syst. 1. 117. 2. *
Habitat in India orientali. Dom. Daldorff.

cupreus.

3. *T. niger*, thorace subquadrato: margine crenat
elytris punctatis cupreis. Ent. syst. 1. 110. 1
Habitat in Guinea. Dom. Isert.

Vari

Tenebrionis corpus oblongum, glabrum, immarginatum, u
dum, *capite* subrotundo, obtuso, *oculis* ouatis, lateralib
hamo antice firmatis; *antennis* brevibus sub capitis el
peo insertis; *thorace* planiusculo; *marginibus* rotundato,
titudine elytrorum; *scutello* paruo rotundato; *elytris*
gildis, longitudine elytrorum, margine vix inflexo; *pedi-
bus* brevibus, validis, *femoribus* crassioribus, canaliculati
tibis incurvis, *tarsis* anticis quoque, posticis quadriartic
latis, *colore* plerumque obscuro.

Variat elytris virescentibus et nigricantibus, semper tamen cupreo-nitidulis.

4. *T. niger*, thorace subrotundato, integro, elytris *fulcatus*. striatis cupreis. Ent. syst. I. 110. 2. *

Habitat in Guinea. Dom. Isert.

5. *T. niger*, thorace subquadrato, elytris crenato-*curuipes*. striatis, tibiis anticis incuruis. Ent. syst. I.

III. 3. *

Tenebrio affinis. Ross. Fn. Etr. I. 280. 578, I. 7.

Tenebrio cylindricus. Herbst. Arch. 5. 144. 3.

Habitat in Germania. Dom. Smidt.

Conf. *Tenebrio loripes* Illig. Col. Bor. I. 113.

2. *Tenebrio curuipes* Panz. Fn. Germ. II.

tab. 3. vix satis distinctus.

6. *T. glaber*, ater, elytris striatis, tibiis posticis *ser-ferratus*. ratis. Ent. syst. I. 111. 4. *

Oliv. Inf. 57. tab. I. fig. I.

Habitat in Sierra Leon. Mus. Dom. Banks.

7. *T. ater*, elytris striatis, tibiis anticis *digitatis*. *digitatus*.

Tenebrio fossor. Ent. syst. I. 112. 12. ?

Habitat in Guinea. Mus. D. de Sehestedt.

Statura et magnitudo omnino *T. ferrati*. Antennae breues, crassae, moniliformes: articulo ultimo maiori, compresso. Caput et thorax atra, laeuis, nitida. Elytra striis laeuis. Femora antica tridentata, tibiae digitatae. Pedes reliqui inermes.

8. *T. oblongus*, piceus, elytris striatis. Ent. syst. I. *molitor*.

III. 6.

Linn. syst. Nat. 2. 674. 2. Fn. Sv. 875.

Oliv. Inf. 57. tab. I. fig. 12.

Scop. carn. 254.

Geoff. Inf. I. 349. 6.

IV. 19.

K

Illig.

- Illig. Col. Bor. 1. 113. 1.
 Panz. Fn. Germ. 43. tab. 12.
 Frish. Inf. 8. tab. 1.
 Sulz. Inf. 7. fig. 52.
 Habitat in farina, pane. *Blatta veterum*.
Mandibula crassa, cornea, incurua, apice emana-
 nata. *Larva* pabulum luscinarum.
- obscurus*. 9. T. oblongus, niger obscurus, thorace quadrato, elytris substriatis. Ent. syst. 1. III. 5. *
 17. 19. Panz. Fn. Germ. 43. tab. 13.
 Habitat in Germania. Dom. Loewenskiold.
 An satis a praecedente distinctus? mihi haud notus.
- impressus*. 10. T. niger obscurus, thorace canaliculato, elytris crenato-striatis.
 Habitat in Oceani australis Insulis. D. Billardiere.
 Antennae moniliformes extrorsum parum crassiores. Thorax quadratus, in medio canaliculatus.
 Pedes omnes simplices.
- nitidulus*. 11. T. ater, nitidus, laevis, elytris punctato-striatis.
 Habitat in India orientali.
 Statura omnino T. impressi, duplo fere minor.
 thorax laeuissimus, nitidus.
- laeuigatus* 12. T. oblongus, ater, elytris laeuiusculis. I. syst. 1. III. 7. *
 Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. D. Barthelemy.
 Species indistincta, mihi haud rite nota.
- variolosus*. 13. T. oblongus, ater, thorace quadrato, elytris punctatis excauatis, pedibus muticis.
 Habitat in America meridionali. Smidt. Mus. Lund.
 Statura et magnitudo T. molitoris. Caput atrum nitidum. Thorax quadratus, antice vtrin-

retusus. Elytra punctis maioribus excavatis
fstriata. Pedes inermes, atrii.

14. *T. ater*, elytris fstriatis, capite tuberculato. Ent. *abbrevia-*
fyst. I. 112. 10. * *tus.*

Oliv. Inf. 57. tab. 11. fig. 21.

Habitat in India. Mus. Britann.

Species mihi haud rite nota.

15. *T. thorace ferrugineo*: maculis duabus impref- *depressus.*
fis, elytris fstriatis, ferrugineis, apice nigris.
Ent. fyst. I. 112. 11. *

Habitat in Carolina meridionali. Mus. Gigot
d'Orcy.

16. *T. thoracis marginibus crenatis angulisque pro-* *cornutus.*
minulis, capite bicorni. Ent. fyst. I. 112. 13. *

Oliv. Inf. 57. tab. 1. fig. 2.

Habitat Smyrnae. Dom. Drury.

Forte potius Trogofita.

17. *T. oblongus*, ater, nitidus, elytris fstriis simpli- *variabilis.*
cibus.

Habitat in Tanger. Schousboe. Mus. Dom. de Se-
heftedt.

Corpus medium, reliquis longius. Antennae ob-
scurae, omnino moniliformes. Caput et tho-
rax plana, laeuis, atra, immaculata. Elytra
fstriata: fstriis laeuis. Pedes inermes.

Variat corpore ferrugineo, nullo modo distinctus.

18. *T. obscure aeneus*, subtus niger, pedibus cya- *aeruginos-*
neis. *sus.*

Tenebrio aeneocyaneus. Web. Inf. 40. 2.

Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff.

Magnitudo *T. molitoris.* Caput aeneum, anten-
nis nigris. Thorax laeuis, obscure aeneus, vix
punctatus. Elytra fstriata, aenea, immaculata.

Corpus nigrum, pedibus cyaneis. Femora uata, tibiae incuruae.

scaber. 19. *T. ater*, thorace angustato, scabro, elytris punctis eleuatis lineatis.

Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff.

Magnitudo fere *T. molitoris*. Antennae crassimoniliformes, extrorsum subcrassiores. Caput exsertum, scabrum. Thorax magis rotundus, elytris angustior, punctis eleuatis scalatis. Elytra striis quatuor et punctis eleuatis des inermes.

anguinipes. 20. *T. ater*, antennis pedibusque sanguineis. Ent. syst. 1. 113. 14. *

Oliv. Inf. 57. tab. 11. fig. 20.

Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

culinaris. 21. *T. ferrugineus*, elytris crenato-striatis, tibiis anticis dentatis. Ent. syst. 1. 113. 16. * Li-
syst. Nat. 2. 675. 5. Fn. Sv. 816.

Tenebrio culinaris. Illig. Col. Bor. 1. 114. 3.

f. 78 *Tenebrio ferrugineus*. Panz. Fn, Germ. 9. 1. 2.

Oliv. Inf. 57. tab. 1. fig. 15.

Roff. Fn. Etr. 675. 5.

Habitat in Germaniae ligno putrescente.

Differt paullo minor, nullo modo distinctus.

brunneus. 22. *T. laevis*, ferrugineus, ore antennisque nigris. Ent. syst. supplement. 49. 15. *

Habitat in America. Dom. Mauerhoff.

ferrugineus. 23. *T. ferrugineus*, elytris striatis subuillofis.

Helops ferrugineus. Ent. syst. suppl. 53. 2

Habitat in Tanger. Schousboe. Mus. Dom. Sehestedt.

24. *T. pallide testaceus*, thorace transverso, elytris *pallens*.
laevis. Ent. syst. 1. 113. 17. Linn. Syst.
Nat. 2. 874. 10. Fn. Sv. 820.
Oliv. Inf. 57. tab. 2. fig. 25.
Habitat in Europa boreali.
25. *T. pallide testaceus*, elytris striatis, abdomine *cadaueri-*
subtus nigricante. Ent. syst. 1. 113. 18. * *nus*.
Habitat in Germaniae cadaueribus. Dom. Smidt.
26. *T. ferrugineus*, thorace retuso, elytris striatis *retusus*.
nigris.
Habitat in America meridionali. Dom. Smidt.
Mus. D. Lund.
Magnitudo *T. culinaris*, magis gibbus. Caput
fuscum, antennis nigris. Thorax laevis, ru-
fus, antice in medio retusus. Elytra striata,
nigra. Corpus ferrugineum. Pedes inermes,
ferruginei.
Variet paullo minor, elytris apice rufis.
27. *T. niger*, subtus piceus, elytris striatis. Ent. *mauritan-*
syst. 1. 113. 15. * *cus*.
Tenebrio mauritanicus. Linn. Syst. Nat. 2.
674. 4.
Habitat in Americae meridionalis Insulis. Dr.
Pflug.
Simillimum, nullo modo distinctum ex India orien-
tali accepi.
28. *T. ater*, nitidus, elytris maculis duabus ferru- *chrysome-*
gineis. *linus*.
Tenebrio chrysamelinus. Ross. Fn. Etr. 1. 283.
581.
Habitat in Europa australiori. Mus. Dom. Lund.
Statura *T. cadauerino* at minor. Antennae fer-
rugineae. Caput et thorax laevis, atra, nitida.
Elytra laevis, maculis duabus magnis ferrugi-
neis,

neis, altera baseos altera apicis. Corpus et pedes ferruginei.

- villosus.* 29. *T. fuscus*, cinereo-villosus, elytris laevibus ferrugineis. Ent. syst. 1. 114. 19. *
Habitat in Europae quisquillis.
Species mihi haud rite nota.

28. TROGOSITA. *Palpi* quatuor, aequale articulo ultimo truncat
Labium corneum, bifidum
laciniis rotundatis, ciliatis.
Antennae moniliformes: articulis tribus ultimis crassioribus subcompressis.

- retusa.* 1. *T. atra*, nitida, capite bidentato, thorace retusis tibiis anticis ferratis.
Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff.
Magna in hoc genere. *Antennae* piceae, moniliformes: articulis inaequalibus, quibusdam altero latere dilatatis. Caput atrum, marginibus recurvo, bidentato. Thorax depressus, punctatus, antice retusus. Elytra striata. Pedes nigri, tibiis anticis valde ferratis.

2.

Trogositae corpus elongatum, saepius depressum, planum glabrum, immarginatum, agile; capite ovato, mandibulis extertis; oculis rotundatis, in medio marginis; antennis brevibus, ante oculos insertis; thorace ovato, planum postice rotundato, latitudine elytrorum; scutello minus elytris rigidis, haud deflexis, longitudine abdominis; pedibus brevibus, validis; femoribus compressis, tibiis rotundatis; tarsis omnibus quinquearticulatis; colore nigro, aut aeneo.

3. *T. nigricans*, capite thoracisque margine cinereo-*varia*, villosis.

Habitat in Guinea. Mus. Dom. Lund.

Magna in hoc genere. Caput cinereo-villosum, immaculatum, antennis nigris. Thorax subemarginatus, in medio canaliculatus, margine albo-villoso. Elytra striata, fusca, villis aliquot cinereis, sparsis. Subtus fusca, cinereo-villosa.

3. *T. coerulea*, nitida, capite linea impressa. Ent. *coerulea*.
syft. 1. 124. 1. *

Trogosita coerulea. Oliv. Inf. 2. 19. 6. 1. tab.

1. fig. 1.

Illig. Col. Bor. 1. 116. 1.

17. 20.

Panz. Fn. Germ. 43. tab. 19.

Habitat in Galliae pane diutius asseruato.

4. *T. nigra*, thorace ovali marginato, elytris cre-*gigas*.
nato-striatis. Ent. syft. suppl. 51. 1. *

Habitat in Guinea. Mus. D. Lund.

5. *T. nigra*, thorace punctato, pedibus piceis. Ent. *picipes*.
syft. suppl. 51. 1. *

Habitat in Guinea. Mus. D. de Sehestedt.

6. *T. nigra*, thorace ovali marginato, elytris stria-*caraboides*
tis: striis laevibus. Ent. syft. 1. 115. 2.

Trogosita mauritanica. Oliv. Inf. 2. 19. 6. 2.
tab. 1. fig. 2.

Trogosita caraboides. Illig. Col. Bor. 1. 117. 2.

Tenebrio caraboides. Linn. syft. Nat. 2. 677.
25. Fn. Sv. 825.

Platycerus fuscus. Geoff. Inf. 1. 64. 5.

Lucanus fuscus. Preysl. Butom. 1. 6. 3. tab.
1. fig. 1.

Panz. Fn. Germ. 3. tab. 4.

Roff. Fn. Etr. tab. 7. fig. 15.

tab. 3. fig. 12.

Herbst.

I 8

Herbst. Arch. 4. 141. 57. tab. 29. fig. 16.

Habitat in ligno putrescente, in pane diutius as-
servato.

thoracica. 7. *T. atra* glabra, capite, thorace pedibusque ob-
scuris rufis. Ent. syst. 1. 116. 5. *

Habitat in Lapponia. Dom. de Paykull.

apustulata 8. *T. atra*, thorace ovali marginato, elytris striatis:
macula magna rufa.

Habitat in America meridionali. Dom. Smidt.
Mus. D. Lund.

Statura et summa affinitas *T. caraboidis*. Tho-
rax antice canaliculatus. Elytra striata macu-
la magna disci ferruginea.

virescens. 9. *T. mandibulis* tridentatis, corpore viridi-aeneo.
Ent. syst. 1. 115. 3. *

Trogosita virescens. Oliv. Inf. 2. 19. 8. 5. tab.
1. fig. 5.

Habitat in America.

elongata. 10. *T. elongata* ferruginea, capite elytrisque cya-
neis.

Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff.

Statura *T. bicoloris*, at paullo maior. Antennae
nigrae clava compressa. Caput viridi-cyane-
um, nitidum. Thorax laevis rufus, immacula-
tus. Elytra subtilissime punctata, cyanea, ni-
tida. Corpus rufum, pedibus atris.

bicolor. 11. *T. ferruginea*, thoracis macula elytrisque nigris.
Ent. syst. suppl. 50. 1. *

Habitat in America boreali. Dom. Mauerhoff.

Statura elongata, cylindrice ab hoc genere differt.

Forte proprii generis.

filiformis. 12. *T. elongata* ferruginea, antennis pedibusque ni-
gris.

Ha-

Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff.

Statura omnino praecedentis, at duplo minor.

Antennae extrorsum crassiores, nigrae, articulis vtrinque prominulis. Caput et thorax glabra, rufa nitida. Elytra laevia, parum obscuriora, Pedes nigri.

13. *T. elongata* atra, elytris striatis, tibiis anticis *calcar* dentatis.

Habitat in Madera. Dom. Ruhtje. *Leid. Hispan.*

Statura elongata praecedentium. Corpus totum atrum, antennis piceis.

Femina maior, tibiis inermibus.

14. *T. oblonga* nigra obscura, capite cornubus duobus erectis. *Taurus.*

Tetratoma Gazella. Ent. fyft. suppl. 176. 1. *

Habitat in Guinea, Mus. Dom. Lund. in India orientali. Dom. Daldorff.

Ex Guinea maior cornubus maioribus, validioribus.

15. *T. atra*, capite cornubus quatuor: posticis maioribus ferrugineo-hirtis. *quadricornis.*

Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff. Mus. D. de Sehestedt.

Paullo maior *T. Tauro.* Caput nigrum antice cornubus duobus erectis, longitudine capitis, glabris, postice cornubus duobus maioribus, longioribus apice ferrugineo-hirtis. Thorax et elytra laevia, atra, minime nitida.

Femina simillima, at capite mutico.

16. *T. atra* nitida, elytris striatis, capite bicorni. *Vaces.*

Habitat in America meridionali. Dom. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Paullo maior *T. caraboidis.* Antennae moniliformes clava compressa. Caput cornubus duobus frontalibus porrectis, obtusis. Thorax laevis

uis nitidus, submarginatus. Elytra crenato-friata. Pedes inermes.

Femina simillima, at capite mutico.

metallica. 17. *T. viridi-aenea*, thorace ovali marginato, elytris margine flavescente.

Habitat in America meridionali. Dom. Smidt.

Muf. Dom. Lund.

Statura *T. caraboidis*, at minor, tota viridi-aenea, elytris vix friatis, margine flavescente.

Antennae et pedes nigrae.

aenea. 18. *T. supra* obscure virescens, antennis piceis.

Trogosita aenea. Oliv. Inf. 2. 19. tab. 1. fig. 3.

Habitat in America meridionali. Dom. Smidt.

Muf. D. de Sehestedt.

Statura omnino *T. virescentis*, at minor. Mandibulae vix exsertae. Caput virescens, antice canaliculatum. Thorax subpunctatus, obscure virescens, margine antico parum pallido. Elytra friato-punctata.

aguttata. 19. *T. nigra*, elytris fuscis: maculis duabus pallidis; posteriore lunata.

Habitat in America meridionali. Dom. Smidt.

Muf. Dom. Lund.

Caput et thorax nigra. Elytra subfriata fusca maculis duabus pallidis: anteriore oblonga, posteriore lunata. Pedes nigri.

Variat thoracis elytrorumque margine rufescente vix distincta.

bidens. 20. *T. atra*, thorace ovali marginato, elytris striatis, tibiis anticis bidentatis. Ent. syst. 1. 116. 4. ♀

Habitat in Gallia.

femorata. 21. *T. nigra*, elytris punctato-striatis, femoribus rufis.

He.

- Helops femoratus*. Ent. syst. suppl. 53. 23.
 Habitat in America boreali. Dom. v. Rohr.
 Caput et thorax laevia, obscure nigra, immaculata. Elytra punctato-friata. Pedes nigri femoribus rufis.
22. *T. brunnea*, thorace plano fulcato. Ent. syst. 1. *fulcata*.
 116. 6. *
Ips fulcata. Oliv. Inf. 4. 1. tab. 1. fig. 1.
 Habitat in Gallia. Mus. Dom. Bosc.
23. *T. ferruginea*, elytris friatis testaceis, clypeo *ferruginea* integro. Ent. syst. 1. 116. 7. *
Ips testacea. Ent. syst. suppl. 179. 14.
Lycetus naualis. Ent. syst. 1. 2. 504. 10. *
 Habitat in India vtraque, destruens animalia in Museis asseruata, panem aliaque.
24. *T. ferruginea*, mandibulis porrectis recurvis *cornuta*, corniformibus. Ent. syst. suppl. 51. 5. *
 Act. Hafn. 5. 2.
 Habitat in Tanager. D. Schousboe. Mus. D. Lund.
 in Madera frumentum destruens. D. Rahtje.
25. *T. laevis testacea*, mandibulis porrectis, arcuatis *maxillofa*, corniformibus.
 Habitat in America meridionali. Dom. Smidt.
 Mus. Dom. de Sehestedt.
 Praecedente duplo minor, at distincta. Caput et thorax glabra, testacea, immaculata. Mandibulae exsertae, arcuatae, acutae. Elytra sublaevia, testacea. Corpus testaceum, ano fusco.
26. *T. mandibulis porrectis incrassatis testacea*, thorace ovali, elytris friatis. *mandibularis*.
 Habitat in Pommerania. Mus. Dom. Lund.
 Statura *T. caraboidis*, at triplo minor. Mandibulae magnae, crassae, exsertae, intus dentatae.

tae. Caput et thorax plana, testacea, subcliculata. Elytra striata, testacea, immiscul. Corpus testaceum.

29. HELOPS. *Palpi* inaequales.
anteriores securiformes.
posteriores clauati.
Labium corneum, integrum.
Antennae filiformes.

coeruleus. 1. *H. coeruleus*, thorace suborbiculato, ely striatis. Ent. syst. 1. 118. 3.
Tenebrio coeruleus. Linn. syst. Nat. 2. 677. 1.
 Mus. Lud. Vlr. 98.
Tenebrio chalybeus. Ent. syst. 1. 111. 8. Linn. syst. Nat. 2. 674. 3. vix differt.
 Degeer Inf. 5. 53. 4. tab. 13. fig. 11.
 Petiv. Gaz. tab. 22. fig. 6.
 Habitat in Europa australi, Africa.

erythrocephalus. 2. *H. cyaneus*, capite femoribusque rufis. Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff.
 Magnitudo T. lanipedis. Antennae filiformes nigrae. Caput obscure-rufum, fascia pone bium lineaque dorsali cyaneis. Thorax gibbus rotundatus, laevis, cyaneus, immaculatus. E

Helopis corpus oblongum, gibbum, glabrum, immarginatum; *capite* ovato, obtuso; *clypeo* submarginato; *oculis* transversis, lateralibus; *antennis* brevibus, sub capitis (scapo) insertis; *thorace* planiusculo: marginibus rotundatis; *scutello* parvo, rotundato; *elytris* rigidis, haud deflexis; longitudine abdominis; *pedibus* mediocribus, cursorum; *femoribus* compressis, tibiis incurvis; *tarsis* anticis quatuor-, posticis quadriarticulatis; *colore* plerumque nigro aut coeruleo, aut aeneo obscuro.

tra punctato-friata, cyanea. Corpus cyaneum. Pedes nigri, femoribus rufis.

3. *H. oblongus*, cyaneus, thorace punctato, elytris *metallicus* friatis, obscuro-aeneis.

Tenebrio cyaneus. Ent. syst. App. 4. 439. ♀
Habitat in America meridionali. Mus. D. Lund.

4. *H. niger*, nigro-nitens, elytris subfriatis aeneis. *aeneus*.

Tenebrio aeneus. Ent. syst. suppl. 48. 2. ♀
Habitat in America meridionali. Mus. D. Lund.

5. *H. oblongus* cyaneus, thorace punctato, elytris *violaceus* punctato-friatis aeneis nitidis.

Tenebrio violaceus. Ent. syst. suppl. 48. 2. ♀
Habitat in Brasilia. Dom. Weber.

6. *H. aeneus*, elytris friatis acuminatis. Ent. syst. *lanipes*.

x. 118. 4.

Tenebrio lanipes. Linn. Mant. 1. 533.

Oliv. Inf. 58. tab. 2. fig. 1.

Illig. Col. Bor. 1. 119. 1.

Schaeff. Icon. tab. 51. fig. 3.

Geoff. Inf. 1. 349. 5.

Habitat in Europa australiori.

7. *H. niger*, thorace elytrisque viridi-aeneis cupro-*micans* friatis. Ent. syst. suppl. 51. 4. ♀

Habitat in America boreali. Dom. Mauerhoff.

8. *H. ater*, coleoptorum margine omni sanguineo. *marginatus*.
Ent. syst. 1. 118. 5. ♀

Habitat in Guinea. Dom. Isert.

9. *H. ater*, elytris friatis: punctis duobus rubris, *apustulatus* femoribus posticis dorso carinatis.

Habitat in Guinea. Mus. Dom. Lund.

Caput et thorax nigra, opaca. Elytra friata striis crenatis, nigra punctis duobus rubris, altero bascos, altero apicis. Femora quattuor antica compressa, duo postica dorso carinato.

10.

- excauatus*. 10. *H. ater*, elytris punctis excauatis striatis, anticis posticisque dentatis.
Habitat in America meridionali. Dom. S. Muf. Dom. de Sehestedt.
Statura praecedentis. Thorax canaliculatus a lo postico vtrinque acuto. Elytra atra, pu maioribus excauatis striata. Pedes atrifemibus tibiisque anticis videntatis, inter mutici, postici femoribus mucicis, tibiis dentatis.
- variegatus* 11. *H. oblongus*, fusco cinereoque varius.
Tenebrio variegatus Ent. syst. 1. 112. 9. 1
Habitat in Africa aequinoctiali. Muf. D. Banl
- morbillo-* 12. *H. oblongus cyaneus*, elytris variolosis.
sus. Habitat in America meridionali. Dom. S. Muf. D. de Sehestedt.
Minor praecedentibus. Caput et thorax obscuro. Elytra cyanea, nitida, punctis maioribus c trisiantibus. Corpus cyaneum, nitidum.
- cyanipes.* 13. *H. ater laevis*, pedibus violaceis.
Habitat in Guinea. Muf. D. de Sehestedt.
Statura oblonga praecedentium. Caput et thorax atra, laeuis, obscura. Elytra subtilissime punctato-striata. Pedes cyanei.
- aeruginosus-* 14. *H. viridi-aeneus*, antennis elytris pedibusque nigris. Ent. syst. 1. 118. 6. *
sus- Habitat ad Cap. Bon. Spei. Muf. Dom. Schulz
- cyanicollis* 15. *H. cyaneus*, elytris striatis aeneis.
Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff.
Affinis videtur *H. aeruginoso*. Antennae nigrae. Thorax rotundatus, canaliculatus, viridicyaneus. Elytra striato-crenata, aenea, nitida. Corpus et pedes cyanei.

- l. *H. niger obscurus*, abdomine rufo. *abdominalis.*
 Habitat in Tanager. Mus. D. de Sehestedt.
- Statura et magnitudo praecedentium totus obscurus, fuscus, abdomine solo rufo. Elytra subfriata.
- . *H. supra obscure aeneus*, subtus ater, elytris *bicolor*.
 friatis. Ent. syst. I. 118. 7. ♀
 Habitat in Americae Infulis. Dom. Smidt.
- j. *H. capite thoraceque cyaneis*, elytris *crenato-haemorfriatis* viridibus, ano rufo. Ent. syst. I. 119. *rhoidalis*.
 II. ♀
 Habitat in India. Mus. Britann.
- p. *H. niger*, elytris *punctato-friatis*, obscure aeneis, tibiis anticis acute dentatis. Ent. syst. suppl. 52. 12. ♀
 Habitat in America. Dom. Hybner.
- o. *H. viridi-aeneus*, elytris *punctato-friatis*. Ent. *viridis*.
 syst.
 Habitat in America meridionali. Dom. Smidt.
 Mus. D. Lund.
- Statura praecedentium, at minor. Caput viridi-aeneum ore antennisque nigris. Thorax viridi-aeneus, vix punctatus. Elytra punctato-friata. Corpus viridi-aeneum.
- r. *H. viridi-aeneus*, abdomine rufo, antennis compressis. *Dama*.
 Habitat in America meridionali. Dom. Smidt.
 Mus. D. de Sehestedt.
- Statura parua, oblonga praecedentis. Antennae valde compressae, nigrae. Caput et thorax aenea. Abdomen rufum. Pedes inermes.
- z. *H. niger*, pedibus fuscis. Ent. syst. I. 119. 12. ♀ *luridus*.
 Habitat in Brasilia. Mus. D. Banks.

- fasciculatus.* 23. *H. niger, obscurus, elytris breuibus, punctifasciculato-pilosis, ferrugineis.* Ent. syst. su 52. 13. *
Habitat in India orientali. Mus. D. Lund.
- laevis.* 24. *H. niger, thorace canaliculato, postice attenuato, elytris laeuis.* Ent. syst. 1. 120. 13.
Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.
- equestris.* 25. *H. ater, elytris fascia abbreviata aurea.* 1. syst. 1. 120. 14. *
Oliv. Inf. 58. tab. 2. fig. 7.
Habitat in Brasilia. Mus. Dom. Banks.
- morio.* 26. *H. ater, thorace quadrato laeui, elytrorum anticis punctatis.* Ent. syst. 1. 120. 16. *
Habitat in Americae meridionalis Infulis.
- nigrita.* 27. *H. ater, thoracis marginibus rotundatis, elytris crenato-sulcatis.* Ent. syst. 1. 120. 17. *
Habitat Tranquebariae.
Tibiae anticae in altero sexu ante apicem sinuatae.
- dentatus.* 28. *H. ater, elytris striatis: striis laeuis, femoribus anticis dentatis.*
Habitat in Guinea. Mus. Dom. Lund.
Statura *H. nigritae*, paullo crassior. Caput et thorax laeuis, nigra, opaca. Elytra striata, striis crenatis. Pedes nigri, femoribus anticis acutis dentatis, reliqui mutici.
- sinuatus.* 29. *H. laevis, ater, thoracis margine late, obscure brunneo.*
Habitat in Guinea. Mus. D. de Sehestedt.
Statura et magnitudo praecedentium, totus ater glaber, laevis. Thorax margine late, obscure rufo. Elytra apice sinuata.
- punctatus.* 30. *H. ater, elytris punctato-striatis.*
Habitat in Guinea. Mus. D. Lund.

Totus ater, obscurus. Thorax quadratus, margine postico vtrinque subspinoso. Elytra punctato-friata.

31. *H. aeneus*, nitidus, thorace fasciis duabus, elytris friatis: lineolis cupreis. *cuprarius*.

Helops cuprarius. Web. Inf. 40. 1.

Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff.

Differt omnino ab *H. micante*. Statura gibba *H. atri*. Caput aeneum basi obtusum, antennis nigris. Thorax subpunctatus, aeneus, nitidus, fasciis duabus cupreis ad marginem coeuntibus. Elytra friata, lineolis plurimis, variis, abbreviatis, cupreis. Corpus atrum.

32. *H. ouatus*, ater, elytris friatis, antennis abdomineque piceis. Ent. syst. 1. 121. 18. *

Habitat in Madera. Rahtje. Mus. D. de Sehestedt.

33. *H. niger*, elytris antennis pedibusque rufis. *rufipes*. Ent. syst. 1. 121. 19. *

Oliv. Inf. 58. tab. 2. fig. 12.

Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

34. *H. niger*, elytris friatis, pedibus elongatis: tibis secundi paris barbatis. Ent. syst. 1. 121. 20. *

Oliv. Inf. 58. tab. 2. fig. 9.

Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. D. Banks.

35. *H. ouatus*, ater, thorace laevi, elytris friatis. *capensis*. Ent. syst. 4. App. 440. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Dom. de Paykull.

36. *H. ouatus*, thoracis margine incrassato, elytris friatis laevis. *friatus*.

Helops marginatus. Ent. syst. App. 4. 440. *

37. *H. oblongus*, ater, gibbus, thorace antice attenuato, elytris friatis. Ent. syst. 1. 121. 21. *

L

Oliv.

V.g

- Oliv. Inf. 58. tab. 2. fig. 10.
Habitat Lipsiae.
- planus.* 38. *H. oblongus, planus, thorace quadrato, ely-
striatis.* Ent. syst. suppl. 52. 21. *
Habitat in America. Dom. Hybner.
- Pimelia.* 39. *H. thorace antice rotundato, niger, elytris
punctato-striatis, antennis apice rufis.* Ent. I. 121. 22. *
Habitat in Anglia rarius.
- obliquatus* 40. *H. ater, elytris punctato-striatis, antennarum
ultimo articulo scutelloque rufis.* Ent. I. 121. 22. *
Habitat in Carolina sub arborum corticibus. Dom. Bosc.
- Hotten-
tolla.* 41. *H. ater, elytris striatis: striis crenatis.* Ent. I. 122. 23. *
Habitat in Gallia.
- dentipes.* 42. *H. ater, elytris sulcato-punctatis, femoribus
anticis dentatis.* Ent. syst. I. 122. 24. *
Oliv. Inf. 58. tab. 2. fig. 11.
Habitat in Coromandel. Mus. Dom. Banks.
- spinipes.* 43. *H. niger, obscurus, pedibus ferrugineis: tibiis
anticis dentatis.* Ent. syst. suppl. 53. 23. *
Habitat in America. Dom. Hybner.
- vndatus.* 44. *H. ater, thorace rufo: maculis nigris, elytris
fulcatis, fasciis vndatis nigris.* Ent. syst. I. 122. 25.
Oliv. Inf. 58. tab. 1. fig. 4.
Habitat Cajennae. Mus. D. Olivier.
- Aethiops.* 45. *H. ovatus, ater, elytris sulcatis: sulcis punctatis
marginatis.* Ent. syst. I. 122. 26.
Habitat in America meridionali. Dom. Smi-
th. Mus. Dom. de Sehestedt.
Statura praecedentium. Thoracis margo rotun-
datus at haud marginatus. Elytra striata
marginata.

striis linea punctorum impressorum. Pedes inermes.

46. *H. niger*, antennis pedibusque ferrugineis. Ent. *quisquilius*.
syst. 1. 122. 26. *

Tenebrio quisquilius. Linn. Syst. Nat. 2. 676.

3. Fn. Sv. 821.

V. 9

Habitat in Europae quisquiliis.

47. *H. ferrugineus*, elytris striatis nigris. Ent. syst. *ruficollis*.
1. 123. 28.

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

Varietatem Blaptis Dermestoidis credit Illig. Col.

Bor. 1. 120. 2. at vix merito. Speciem mihi omnino obscuram hic ad ulteriorem indaginem oppono.

48. *H. caeruleus*, thorace punctato, elytris striatis. *cyaneus*.
Ent. syst. 1. 123. 29. *

Oliv. Inf. 58. tab. 2. fig. 15.

Habitat Hafniae. Mus. D. de Sehestedt.

30. MELANDRYA. *Palpi* quatuor, inaequales.

anteriores porrecti,
ferrati: articulo
ultimo ovato.

posteriores capitati.

Antennae filiformes.

1. *M. nigra*, digitis ferratis.

ferrata.

Helops ferratus. Ent. syst. 1. 118. 8. *

Chry. I. 8

Melandryae corpus elongatum, subcylindricum, glabrum, unimarginatum, tardum; capite magno, subrotundo, obtusissimo, oculis parvis, rotundatis, lateralibus, transversis, antennis brevibus, incurvis, articulo primo longiore,

L s

ante

Chrysomea caraboides. Linn. syst. Nat. 2. 6

116. Fn. Sv. 574.

Serropalpus caraboides. Illig. Col. Bor. 1. 126

Tenebrio rufibarbis. Schall. Act. Hall. 1. 3

Panz. Fn. Germ. 9. tab. 4.

Habitat in Germania.

Os maxillis palpisque. *Palpi* quatuor inaequa
anteriores valde elongati, exferti, compre-
 quadriarticulati: articulo primo breui, orbi-
 lato, secundo longiori, obconico, tertio bre-
 quarto longiori, ouato, omnibus apice exter-
 prominulo ferratis, adhaerentes maxillae do-
posteriores breues, triarticulati: articulis f-
 aequalibus: ultimo crassiori, truncato, ad-
 sub labii apice. *Mandibula* breuis, crassa, 1-
 nicata, unidentata. *Maxilla* breuis, mem-
 nacea, bifida: lacinia exteriori parum longie
 rotundata. *Labium* breue, gibbum, cornu
 quadratum, obtusum, integrum. *Palpi* ta-
 que apice rufescentes.

canalicu- 2. *M. nigra*, thorace canaliculato vtrinque impre-
lata. elytris striatis.

Helops canaliculatus. Ent. syst. 1. 119. 10.

Serropalpus canaliculatus. Illig. Col. Bor.

127. 2.

Tenebrio dubius. Schall. Act. Hall. 1. 326.

Panz. Fn. Germ. 9. tab. 4.

Habitat Halae Saxonum. Dom. Schaller.

ante oculos infertis; *thorace* breui: lateribus dep-
 planis, antice angustato, postice latitudine elytrae
scutello paruo triangulari; *elytris* molliusculis, un-
 deflexo, longitudine abdominis; *pedibus* longiusculis
sis anticis quinque-, posticis quadriarticulatis; *colo-*
 gro aut aeneo obscuro.

3. *M. nigra*, palpis pedibusque flavescentibus. *barbata.*

Helops barbatus. Ent. syst. 1. 119. 9. °

Serropalpus barbatus. Illig. Col. Bor. 1. 127. 3.

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

+ *M. nigricans*, thorace depresso repando, elytris repanda.
striatis: striis punctatis.

Habitat in America meridionali. Dom. Smidt.

Statura et magnitudo *M. ferratae*. Caput nigrum.

Thorax punctatus, niger, margine subrepando.

Elytra striata: striis punctatis. Pedes inermes.

31. CYCHRVS. *Palpi sex: articulo ultimo obconico.*

Maxilla cornea, intus ciliata, dentata.

Labium breue, bifidum.

Antennae setaceae.

1. *C. laevis*, niger, thorace angustiore, capite angustissimo. *rostratus,*
Ent. syst. suppl. 440.

Carabus rostratus. Ent. syst. 1. 131. 31.

Tenebrio rostratus Linn. syst. Nat. 2. 577. 20.

Fn. Sv. 823.

Carabus coadunatus, Degeer. Inf. 4. 92. 7. tab.

3. fig. 13.

Illig. Col. Bor. 1. 216. 1.

VII. 6.

Petagna.

Cychri corpus medium, oblongum, glabrum, immarginatum, agile, capite porrecto, cylindrico, oculis parvis, globosis, lateralibus; *antennis* mediocribus: articulo secundo longiori foveae ante oculis insertis; *thorace* attenuato, plano, margine suatundato; *scutello* nullo; *elytris* connatis, rigidis, longitudine abdominis, margine inflexo, cingente; *pedibus* longiusculis; *femoribus* compressis, posticis basi fulcratis; *tarsis* omnibus quinquearticulatis; *colore* obscuro.

Petagn. Spec. Cal. 25. 121. fig. 21.

Habitat in Europae syluis.

Character generis emendatus: *O*s maxillis palpisque. *P*alpi sex inaequales, subfiliformes, *an*teriores breues, biarticulati: articulo secundo foliaceo, lato, maxillam includente, maxillae dorso adhaerentes, intermedi longiores, *qua*driarticulati: articulo secundo longiori, obconico, tertio breuiori ouato, ultimo latiori, truncato, basi anteriorum adnati, *post*eriores triarticulati: articulo secundo longiori, tereti, ultimo truncato, adnati labii apice. *M*andibula tenuis, cornea, apice tridentata. *M*axilla elongata, tenuis, plana, interne ciliato-dentata, apice incurua, acuta. *L*abium breue, corneum, bifidum, laciniis rotundatis.

attenuatus 2. *C. niger*, elytris subcupreis: punctis elenatis triplici serie, capite angustissimo. Panz. Fn. Germ. 2. tab. 3.

Cychnus attenuatus. Ent. syst. 1. 131. 32. *

L. 12 *Carabus proboscideus*. Oliv. Inf. 35. 47. tab. 11. fig. 28.

Habitat in Germania syluis. Dom. Helwig.

reflexus. 3. *C. ater*, elytris fulcoatis: maculis duabus flauis.

Carabus reflexus. Ent. syst. 1. 147. 102. *

Pimelia fasciata. Ent. syst. 1. 104. 25. *

Oliv. Inf. 35. tab. 7. fig. 77.

Habitat in Germania. Mus. Dom. Lund.

elevatus. 4. *C. thoracis* margine reflexo, elytris violaceis, corpore atro.

Carabus elevatus. Ent. syst. 1. 132. 33. *

Habitat in America meridionali. Mus. Dr. Hunter.

unicolor. 5. *C. thoracis* margine reflexo, corpore atro, elytris striatis.

Ca.

Carabus unicolor. Ent. syst. 1. 132. 34. *
Habitat in America meridionali. Dr. Hunter.

32. MANTICORA. *Palpi* quatuor filiformes.
Mandibulae exsertae den-
datae.
Labium corneum, trifidum.
Antennae filiformes articu-
lis cylindricis.

1. *M. atra*, elytris connatis scabris. Ent. syst. 1. *maxillofa*.
123. 1. *

Carabus tuberculatus. Degeer Inf. 7. 623. 10.
tab. 46. fig. 14.

Cicindela gigantea. Thunb. nou. spec. 1. 25.
tab. 1. fig. 38.

Herbst. Arch. tab. 46. fig. 6.

Oliv. Inf. 57. tab. 1.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

2. *M. laevis pallida*, mandibulis basi bidentatis. *pallida*.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Dom. Lund.

M. maxillofa minor. *Antennae* articulis cylindri-
cis pallidae. *Mandibulae* exsertae, arcuatae
basi dentibus duobus validis, acutis, pallidae,
apice nigrae. Caput magnum, planum, palli-
dum. Thorax planus, in medio canaliculatus
angulo postico vtrinque porrecto, subspinoso.
Elytra connata, laeuissima, pallida, fere pellu-
cida. Corpus pallidum, pedibus apice spinosis.

33. CARABVS. *Palpi* sex, articulo ultimo truncato.

Ligula membranacea quadrata, truncata.

Labium corneum, trifidum, lacinia intermedia acuminata.

Antennae setaceae.

* *Apteri*, thorace cordato.

scabrosus. 1. *C. apterus ater*, thorace rugoso, elytris connatis punctis elevatis concatenatis.

Carabus scabrosus. Oliv. Inf. 35. tab. 7. fig. 8

Carabus Gigas. Creutz. Inf. 107. 1. tab. fig. 13.

VIII. 6

Habitat in Carnioliâ. Dom. Meyerle.

Duplo maior *C. coriaceo*. Thorax cordatus punctis impressis rugosus. Elytra connata punctis elevatis concatenatis, numerosis. Corpus atrum.

coriaceus. 2. *C. apterus ater opacus*, thorace laevi, elytris connatis: punctis intricatis subrugosis. Ent. syst. I. 125. 1.

Carabus coriaceus. Linn. Syst. Nat. 2. 668. 1
E

Carabi corpus ovatum, glabrum, submarginatum, agile; *capite* magno, ovato, mandibulis palpisque prominulis, oculis parvis, globosis, prominulis, lateralibus; *antennis* unidiocribus: articulo secundo longiori, crassiori, solum a oculos insertis; *thorace* submarginato, plano, latitudine fere elytrorum; *scutello* saepius nullo; *elytris* rigidis longitudine abdominis, margine haud deflexo; *pedibus* longiusculis, cursoriis; *femoribus* compressis, posticis bifurcatis; *tibiis* rotundatis, ante apicem seta rigida instructis; *tarsis* quinquearticulatis, colore saepius nigro aeneo.

Buprestis ater. Geoff. Inf. I. 141. P.

Paykull. Monogr. I. I.

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 44.

Schaeff. Icon. tab. 36. fig. 1. mas,
tab. 141. fig. 1. fem.

Voet. Col. I. tab. 38. fig. 43.

Habitat in Europae nemoribus.

3. *C. apterus ater*, thorace varioloso; elytris connatis: punctis intricatis rugosis: margine cyaneo nitido. *caelatus*.

Habitat in Carniola. Dom. Meyerle.

Statura et magnitudo omnino *C. violacei*. Antennae nigrae, articulis ultimis griseo-villosa. Caput laeue, atrum. Thorax cordatus, margine parum eleuato punctis numerosis, cicatrisantibus inaequalis. Elytra connata punctis numerosissimis, impressis, intricatis rugosa, margine parum cyaneo, nitido. Corpus atrum.

4. *C. apterus laeuis ater*, thoracis elytrorumque margine viridi-aureo. *marginalis*

Carabus marginalis. Ent. syst. 4. App. 440. 9

Illig. Col. Bor. I. 148. 10,

Panz. Fn. Germ. 9. tab. 7.

Habitat in Borussia. Dom. Schneider.

5. *C. apterus ater*, thorace rugoso, elytris sulcatis; *Meyerlei*.
sulcis eleuato-punctatis.

Voet. Col. 2. tab. 39. fig. 49.

Habitat in Guinea. Mus. D. Lund.

Magnus. Antennae basi atrae, apice fuscae. Palpi magni, porrecti: articulo ultimo maiori, compresso. Thorax marginato cordatus, supra rugosus. Elytra connata, sulcata sulcis stria punctorum eleanorum. Corpus atrum.

- glabratus.* 6. *C. apterus ater*, elytris laevissimis unicoloribus
 Ent. syst. 1. 125. 4.
Carabus glabratus. Payk. Monogr. 14. 5.
Carabus convexus. Herbst. Arch. tab. 29. fig. 2.
 VII. 6. Oliv. Inf. 35. 32. 29. tab. 10. fig. 112.
 Illig. Col. Bor. 1. 149. 11.
 Habitat in Germania. Dom. Smidt.
- violaceus.* 7. *C. apterus niger*, thoracis elytrorumque marginibus violaceis, elytris laevibus. Ent. syst. 1. 125. 5. Linn. syst. Nat. 2. 669. 8. Fa. Sv. 787.
 Oliv. Inf. 3. 35. tab. 4. fig. 39.
 Payk. Monogr. 12. 4.
 Schaeff. Icon. tab. 3. fig. 1.
 Frisb. Inf. 13. tab. 23.
 Illig. Col. Bor. 1. 140. 9.
 I. 9. Panz. Fn. Germ. 4. tab. 4.
 Habitat in Europae silvis.
- purpurascens.* 8. *C. apterus ater*, thoracis elytrorumque margine violaceo, elytris striatis. Ent. syst. 1. 125. 6.
 Oliv. Inf. 3. 35. tab. 4. fig. 40.
 Payk. Monogr. 13. 4.
 Schaeff. Icon. tab. 88. fig. 1.
 I. 10. Panz. Fn. Germ. 4. tab. 5.
 Habitat in Germania. Dr. Schulz.
- catenulatus.* 9. *C. apterus ater*, thoracis elytrorumque margine cyaneo, elytris striatis punctisque compressis, triplici serie. Ent. syst. 1. 125. 7.
 Oliv. Inf. 3. 35. tab. 3. fig. 29.
 Geoff. Inf. 1. 144. 4. b.
 Scopol. Carniol. 86. 264.
 Illig. Col. Bor. 1. 146. 8.
 I. 10. Panz. Fn. Germ. 4. tab. 6.
 Herbst. Arch. 7. tab. 47. fig. 5.
 Habitat in Germania. Dom. Helwig.

10. *C. apterus ater*, thorace elytrisq̄ue lænissimis carolinus.
viridi-aeneis. Ent. syst. 1. 126. 8. *
Habitat in Carolina meridionali. Mus. D. Gigot
d'Orcy.
11. *C. apterus niger violaceo-nitens*, elytris pun- cyanestis.
ctis intricatis rugosis. Ent. syst. 1. 126. 9. *
Carabus intricatus. Linn. Fn. Sv. 780.
Carabus intricatus. Illig. Col. Bor. 1. 143. 7.
Carabus cyaneus. Payk. Monogr. 10. 2.
Schæff. Icon. tab. 3. fig. 1. VII. 6.
Oliv. Inf. 2. 35. 21. tab. 5. fig. 47.
Habitat in Europæ fyluis.
12. *C. apterus ater*, thorace elytrisq̄ue cyaneis: excellens.
margine aureo. Ent. syst. suppl. 54. 9.
Habitat in Moldavia. Mus. Dom. Lund. = *Solignyi Arn*
13. *C. apterus niger*, thorace cyaneo, elytris rugo- hispanus.
fis aureis. Ent. syst. 1. 126. 10. *
Oliv. Inf. 3. 35. tab. 1. fig. 9.
Habitat in Hispania. Prof. Vahl.
14. *C. apterus niger*, elytris punctis impressis cica- nodulosus.
trifantibus.
Carabus variolosus. Ent. syst. 1. 145. 94. VII. 14.
Creutz. Inf. 108. 2. tab. 2. fig. 14.
Habitat in Hungaria. Dom. Scheidler.
Statura et magnitudo *C. catenulati* totus niger
obscurus. Elytra punctis latis cicatrisantibus
impressa.
15. *C. apterus ater*, thorace cupreo, elytris striatis monilis.
viridi-cupreis: striis tribus et punctis eleua-
tis oblongis. Ent. syst. 1. 126. 11. *
Habitat Halæ Saxonum. Dom. Hybner.
16. *C. apterus niger*, elytris striatis striisque tribus lusitanicus
& punctis eleuatis oblongis.

Ha-

Habitat in Lusitania. Dom. Schneider.

Statura fere *C. monilis*, at latior, totus niger, tris striatis punctisque eleuatis triplici serie

gemmatus 17. *C. apterus niger*, elytris striatis: punctis aequalibus excavatis triplici serie. Ent. syst. 127. 12.

Carabus gemmatus. Payk. Monogr. 15. 6.

Carabus striatus. Degeer. Inf. 4. 90. 5. tab. fig. 1.

VII. 7.

Carabus hortensis. Illig. Col. Bor. 1. 150.

Oliv. Inf. 35. 27. tab. 3. fig. 30.

Habitat in Germania. Mus. Dr. Schulz.

hortensis. 18. *C. apterus niger*, elytris subrugosis: punctis excavatis subaeneis triplici serie, margine concoloribus. Ent. syst. 1. 127. 13. Linn. syst. Nat. 668. 3. Fn. Sv. 783.

Carabus hortensis. Payk. Monogr. 16. 17.

Carabus nemoralis. Illig. Col. Bor. 1. 152.

Oliv. Inf. 3. 35. tab. 4. fig. 33.

I. 10 Panz. Fn. Germ. 5. tab. 2.

Degeer Inf. 4. 89. 3.

Schaeff. Icon. tab. 11. fig. 3.

Habitat in Europae hortis et siluis.

Variat colore toto nigro punctis elytrorum impressis fere concoloribus.

Character generis emendandus. Os maxillis piceis. Palpi sex inaequales: anteriores breviores, biarticulati: articulo ultimo longioribus incuruatis, cylindricis adhaerentes maxillae deflexae, intermedii longiores, quadriarticulati: articulo primo brevissimo, orbiculato, secundo tertioque longioribus, obconicis, ultimo obtuse truncato, adnati basi anteriorum, postici triarticulati: articulo primo breviori, secundo longiori

giffimo, ultimo extrorsum crassiori obtuso truncato adhaerentes ligulae basi superiori. *Mandibula* cornea, compressa, arcuata, subdentata, apice acuta. *Maxilla* brevis, cornea, intus ciliata, apice acuta. *Ligula* membranacea, quadrata truncata, ciliata, saepius integra. *Labium* corneum, latum, apice trifidum: laciniis lateralibus maioribus, obtusis, margine rotundato, intermedia acuminata.

19. *C. apterus* supra aeneus, elytris dense striatis: punctis excauatis triplici serie. *syluestris.*

Carabus syluestris. Illig. Col. Bor. I. 151. 14.

Panz. Fn. Germ. 5. tab. 3.

Habitat in Germaniae syluaticis.

I. //

Affinis certe *C. hortensi*, cuius varietatem olim credidi. Differt tamen thoracis angulis baseos panlo acutioribus coloreque aeneo.

20. *C. apterus* ater, elytris striatis: punctis excauatis triplici serie. Ent. syst. I. 127. 14. *concolor.*

Habitat in Holsatia.

21. *C. apterus*, capite thoraceque cupreis, elytris obscurioribus: margine punctisque excauatis triplici serie cupreis. Ent. syst. I. 127. 15. *irregularis.*

Oliv. Inf. 3. 35. tab. 11. fig. 131.

Panz. Fn. Germ. 5. tab. 4.

I. //

Habitat in truncis putridis Fagi. D. Prof. Helwig.

22. *C. apterus* ater, elytris planis marginatis eleuato-striatis punctisque impressis triplici serie. *Creutzeri.*

Habitat in Carniolia. Dom. Meyerle.

Statura depressa *C. irregularis* Antennae nigrae, articulis vltimis, fusco-villosis. Caput et thorax atra, vix rugosa. Elytra plana, marginata, eleuato-striata et in his striis puncta impressa triplici serie. Sulci vero ipsi rugosi. Corpus atrum.

- taedatus.* 23. *C. apterus*, niger, elytris sublaevibus fuscis punctis et cauatis triplici serie. Ent. syst. 127. 16. *
- Oliv. Inf. 3. 35. tab. 2. fig. 11.
Habitat in America boreali. Mus. Dom. Banks.
- Scheidleri.* 24. *C. apterus*, niger, elytris viridibus dense striatis punctisque magis impressis: sutura violacea. *Carabus Scheidleri*. Crenz. Inf. 133.
Carabus Scheidleri. Panz. En. Germ. 66.
Habitat in Austria. Dom. Mecherle.
Statura omnino *C. aruenfis*, at paullo maior. *put* cum antennis nigrum. Thorax cordatus, obscurus, margine cupreo. Elytra viridibus dense striata punctisque minutis, sparsis, impressis. Sutura violacea. Corpus et pedes atra.
- aruenfis.* 25. *C. apterus*, nigro-cupreus, elytris striatis, punctis eleuatis, catenulatis triplici serie. Ent. syst. 1. 128. 17. *
- Oliv. Inf. 35. tab. 4. fig. 33.
Illig. Col. Bor. 1. 153. 37.
Paykull. Monogr. 21. 10.
Herbst. Arch. 5. 132. 16.
Habitat in Germania. Dom. Schneider.
- hungaricus.* 26. *C. apterus*, ater, elytris laevissimis: punctis triplici serie concoloribus. Ent. syst. 1. 128. 18. *
- Habitat in Hungaria. Dom. Smidt.
- retusus.* 27. *C. apterus*, elytris striatis virescentibus: punctis aeneis excavatis triplici serie basi retusis. Ent. syst. 1. 128. 19. *
- Oliv. Inf. 35. tab. 12. fig. 132.
Habitat ad Patagoniae littore. Mus. Dom. Banks.

C. apterus, ater, elytris basi. Ent. syst. I. 128. *Maderac.*
20. *

Oliv. Inf. 35. tab. 2. fig. 21. tab. 7. fig. 74.

Habitat in Madera. Mus. Dom. Banks.

3. *C. apterus, conuexus, ater, thorace postice emar-*
ginato, elytris substriatis. Ent. syst. I. 129.

21. *

Illig. Col. Bor. I. 149. 12.

VII. 8.

Payk. Monogr. 25. 15.

Schaeff. Icon. tab. 3. fig. 2.

Habitat in Germania.

Elytra subtilissime striata.

4. *C. apterus, elytris auratis fulcatis, antennis pe-*
dibusque rufis. Ent. syst. I. 129. 22. Linn.
syst. Nat. 2. 669. 7. Fn. Sv. 786.

Illig. Col. Bor. I. 156. 20.

Oliv. Inf. 35. 32. 30. tab. 5. fig. 51. VII. 8.

Payk. Monogr. 23. 11.

Degeer. Inf. 4. 104. 1. tab. 17. fig. 20.

Geoff. Inf. I. 142. 2. tab. 2. fig. 5.

Schaeff. Icon. tab. 202. fig. 5.

Habitat in Europae agris et viis.

1. *C. apterus, supra aeneus, nitens, elytrorum su-*
pra cuprea. Ent. syst. I. 129. 23. *

Habitat in Iamaica, Mus. Dom. Bosc.

2. *C. apterus, elytris porceatis (in montibus aureis) viridibus, fe-*
moribus rufis. Ent. syst. I. 129. 24. *

Panz. Fn. Germ. 4. tab. 6.

I. "

Habitat in Germania. Dom. Hybner.

3. *C. apterus, elytris striatis viridibus: futura au-*
rea. Ent. syst. I. 129. 25. *

Oliv. Inf. 35. tab. 6. fig. 71.

Habitat in Terra del Fuego. Mus. Dom. Banks.

morbillo- 34. *C. apterus*, thorace cupreo, elytris striatis cupreis: fulcis scabris punctisque eleuatis longitudinalibus. Ent. syst. 1. 130. 26. *

Habitat in Mauritania. Mus. Dom. de Sehestedt

in *Lybia*.
haidu magaz
369 *rugosus*.

35. *C. apterus ater*, elytris striatis: stris rugo punctisque interiectis eleuatis longitudinalibus. Ent. syst. 1. 130. 27. *

Habitat in Marocco. Mus. D. de Sehestedt.

granulatus.

36. *C. apterus nigricans*, elytris striatis aeneis interiectis punctis eleuatis longitudinalibus. Ent. syst. 1. 130. 28. *

VII-9. *Carabus granulatus*. Linn. syst. Nat. 2. 668. Fn. Sv. 780.

Geoff. Inf. 1. 143. 3.

Oliv. Inf. 35. tab. 2. fig. 13. 20.

Payk. Monogr. 19. 9.

Degeer Inf. 4. 88. 4.

Schaeff. Icon. tab. 156. fig. 4.

Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 2.

Habitat in Europae aruis.

cancellatus.

37. *C. apterus supra cupreus*, elytris striatis: lineis tribus eleuatis concatenatis, antennis totis nigris.

Cancer granulatus. Illig. Col. Bor., 1. 154. 1

Schaeff. Icon. tab. 18. fig. 6.

VIII-7.

Habitat in Germaniae siluis.

Differt a *C. granulato* colore supra magis obscuris lineis tribus eleuatis, magis catenulatis antennisque totis nigris. Femora antica saepius rugosa.

clathratus

38. *C. apterus nigricans*, elytris aeneis striatis interiectis punctis excauatis cupreis. Ent. syst. 1. 131. 29.

Carabi maiores apteri insectorum tigris ocyffime cursu

Carabus clathratus. Linn. fyft. Nat. 2. 669. 5.

Fn. Sv. 782.

Oliv. Inf. 35. tab. 2. fig. 13.

VII. 9.

Illig. Col. Bor. 1. 156. 19.

Payk. Monogr. 18. 8.

Degeer. Ini. 4. 87. 1. tab. 3. fig. 12.

Habitat in Europae aruis.

39. *C. apterus obscurus, elytris fulcatis: fulcis ftria melancholenata obsoleta.* *licus.*

Habitat in Tangèr. D. Schousboe.

Statura et magnitudo praecedentium. Antennae nigrae, apice piceae. Caput atrum, oculis pallidis. Thorax cordatus linea dorsali basique vtrinque impressus. Elytra fulcata, obscura, fulcis ftria eleuata obsoleta. Corpus nigrum.

40. *C. apterus, elytris porcatis scabris viridibus, nitens.* margine aureo, pedibus nigris. Ent. fyft. 1.

131. 30.

Carabus nitens. Linn. fyft. Nat. 2. 669. 6.

Fn. Sv. 185.

Carabus aureus Degeer. Inf. 4. 94. 9.

Illig. Col. Bor. 1. 158. 22.

Oliv. Inf. 35. 38. tab. 2. fig. 18.

VIII. 7.

Payk. Monogr. 24. 12.

Voet. Col. 2. tab. 38. fig. 41.

Schaeff. Icon. tab. 51. fig. 1.

Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 3.

Habitat in Europae siluis.

41. *C. apterus ater, elytris friatis, thorace lineolis leucophthalmus* baseos impressis. Ent. fyft. 1. 132. 36.

Carabus leucophthalmus. Linn. fyft. Nat. 2.

668. 4. Fn. Sv. 784.

Carabus melanurus. Illig. Col. Bor. 1. 163. 28.

Payk. Monogr. 29. 16.

M

Geoff.

Geoff. Inf. 1. 146. 7.

Habitat in Europae quisquiliis.

*fasciato-
punctatus.*

42. *C. apterus ater*, elytris striatis punctisque pressis sparsis.

Habitat in Austria. Dom. de Creutzer.

C. leucophthalmo paullo minor. Caput atris palpibus antennisque apice piceis. Thorax pressus, planus, linea media lineolaque ut que baseos late impressis. Elytra striata, punctisque nigris plurimis impressa. Corpus atris

VI. 5

terricola.

43. *C. apterus, ater, nitidus*, elytrorum striis laevibus, antennarum apice pedibusque rufis. Ent. syst. 1. 135. 49. *

Carabus terricola. Illig. Col. Bor. 1. 184.

III. 11. Payk. Monogr. 31. 17.

Habitat in Germania sub lapidibus.

*serobicula-
tus.*

44. *C. apterus, ater, thorace trilineato*, antennis duabusque rufis.

Habitat in Austria. Dom. de Meyerle.

Paullo minor C. terricola. Caput nigrum, antennis palpibusque rufis. Thorax cordatus, marginatus: lineis tribus impressis, quarum mediana basim, laterales apicem haud attingunt. Elytra striata: striis laevibus, apice angustata. Pedes rufi.

maurus.

45. *C. apterus, ater, nitidus*, thorace utrinque impresso, elytris striatis. Ent. syst. suppl. 49. *

I. 15 *Carabus anthracinus.* Panz. Fn. Germ. tab.

Habitat in Germania. Dom. Panzer.

** *alati, thorace cordato.*

niger.

46. *C. alatus, depressus, ater, thorace utrinque impresso*, neolis duabus impressis, elytris fulcatis.

III. 10

- Carabus niger*. Illig. Col. Bor. I. 182. 56.
Carabus striatus. Payk. Monogr. 45. 26.
 Geoff. Inf. I. 146. 7.
 Panz. Fn. Germ. 30. tab. I.
 Schaeff. Icon. tab. 18. fig. 1.
 Habitat in Germania.
 Affinis certe *C. leucophtalmo* videtur at *alatus*.
47. *C. alatus*, depressus, ater, elytris substriatis. Ent. *planus*.
 Syst. I. 133. 37. *
Carabus leucophtalmus. Illig. Col. Bor. I.
 133. 37.
Carabus spiniger. Payk. Monogr. 45. 25.
Carabus obsoletus. Roff. Fn. Etr. I. 244. 514.
 Panz. Fn. Germ. 11. tab. 4.
 Oliv. Inf. 35. tab. 5. fig. 58. I. 12
 Frisb. Inf. 13. tab. tab. 23.
 Degeer. Inf. 4. 96. 12.
 Habitat in Germaniae syluis.
48. *C. alatus*, niger, thoracis basi vtrinque puncto *scriptulus*.
 impresso, elytris striatis medio glabris. Ent.
 Syst. I. 133. 38. *
 Habitat ad Patagoniae littora. Mus. D. Banks.
49. *C. alatus*, pallidus, coleoptris maculis dorsali- *arenarius*.
 bus duabus atris. Ent. Syst. I. 133. 39. *
 Oliv. Inf. 35. tab. 5. fig. 54.
 Habitat in arena mobili Cambriae. Mus. D. Banks.
 Forte mera sequentis varietas.
50. *C. alatus*, pallidus, capite coleoptrorumque ma- *fabulosus*.
 cula dorsali nigris. Ent. Syst. I. 133. 40. *
Carabus lividus. Linn. Syst. Nat. 2. 670. 15.
 Fn. Sv. 791.
 Oliv. Inf. 35. tab. 10. fig. 108.
 Illig. Col. Bor. I. 189. 68. III. 10
 Panz. Fn. Germ. 31. tab. 4.
 M 2 Payk.

Payk. Monogr. 48. 28.

Habitat in Saxoniae fabuletis.

lateralis. 51. *C. alatus, niger, thorace elytrorumque margine ferrugineis.* Ent. syst. I. 134. 41. *
Habitat in Europae sylvis. Dom. Daldorff.

4color.

52. *C. alatus, niger, capite thoraceque viridi-aeneo elytris obscuris, antennis pedibusque rufis.*

Carabus 4color. Oliv. Inf. 35. tab. 10. fig. 11

Habitat in India orientali. Dom. Daldorff. M. Dom. Lund.

Caput viridi-aeneum, ore antennisque rufis. Thorax rotundatus, viridi-aeneus, nitidus, breviter utrinque impressus. Elytra striata, obscura. Corpus nigrum, pedibus ferrugineis.

ruficornis. 53. *C. alatus, ater, elytris fulcatis, subtomentosis antennis pedibusque rufis.* Ent. syst. I. 134. 42. *

Payk. Monogr. 121. 74.

Geoff. Inf. I. 160. 38.

Illig. Col. Bor. I. 170. 38.

III. 11. Panz. Fn. Germ. 30. tab. 2.

Oliv. Inf. 35. tab. 8. fig. 91.

Habitat in Europae sylvis frequens.

fulvipes. 54. *C. alatus, ater, thorace canaliculato, elytris striatis laevibus, antennis pedibusque rufis.* Ent. syst. I. 134. 43. *

Habitat in Germaniae sylvis. Dom. Smidt.

picicornis. 55. *C. alatus, ater, capite, antennis pedibusque rufis.* Ent. syst. I. 134. 44. *

VII. 7.

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

flavicornis 56. *C. alatus, niger, thoracis margine, antennis pedibusque flavescentibus.* Ent. syst. I. 134. 45.
Illig. Col. Bor. I. 182. 57.

Payk

Payk. Monogr. 47. 17.

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

57. *C. alatus*, thorace canaliculato vtrinque biftriato, antennis tibiisque piceis. Ent. syst. 1. 135. 46. *

Carabus piceus. Linn. syst. Nat. 2. 672. 30.

Schaeff. Icon. tab. 18. fig. 9.

Habitat in Europae fyluis.

58. *C. alatus*, capite thoraceque aeneis, elytris striatis, obscurioribus, femoribus rufis. Ent. syst. 1. 135. 47. *

Habitat in Sierra Leon Africae. Mus. D. Banks.

59. *C. alatus*, thorace postice vtrinque impresso, niger, femoribus rufis. Ent. syst. 1. 135. 48. *

Carabus madidus. Payk. Monogr. 28. 15.

Oliv. Inf. 35. tab. 5. fig. 61.

Habitat in Angliae nemoribus.

60. *C. alatus*, cyaneus, thorace pedibusque rufis. *decorus*.

Habitat in Carolina. Mus. Dom. Bosc.

Medius. Antennae nigrae, basi ferrugineae. Caput nigro-aeneum, nitidum. Thorax cordatus, rufus, immaculatus. Elytra striata, viridi-cyanea, immaculata. Corpus cyaneum, nitidum. Pedes rufi, geniculis nigris.

61. *C. alatus*, cyaneus, ore, antennis tibiisque rufis. *spinibarbis*. Ent. syst. 1. 137. 55. *

Oliv. Inf. 35. tab. 3. fig. 22.

Habitat in Anglia. Dom. Lee.

62. *C. alatus*, nigro-coerulescens, elytris striatis: macula postica rufa. Ent. syst. 1. 137. 56. * *aeneocephalus*.

Habitat in Americae meridionalis Insulis.

63. *C. alatus*, ater, elytris striatis: macula baseos humeralis. pedibusque rufis. Ent. syst. 1. 137. 57. *

Ga- III. 12

Carabus humeralis. Payk. Monogr. 40. 23.

Carabus Dianae. Ent. syst. 1. 139. 64. *

Habitat in Italia. Dom. Allioni.

angusticollis. 64. *C. thorace angustato vtrinque impresso, ab elytris striatis.*

Habitat in Germania.

VII. 17. Magnitudo praecedentis. Antennae fere piceae
Thorax angustus, cordatus, basi vtrinque impressus.

miliaris. 65. *C. alatus, thorace suboordato, niger, elytris cyaneis, abdomine basi pedibusque rufis.*

Carabus vario'olus. Ent. syst. 4. App. 441. 37

Habitat in Austria. Dom. Schneider.

axillaris. 66. *C. alatus, thorace cordato, ferrugineo, elytris striatis, nigris: lunula basaeos pallida.* Ent. syst. 4. Append. 441. 37. *

Habitat in Austria, Dom. Schneider.

trilobus. 67. *C. alatus, viridi-aeneus, elytris maculis duabus albis, antennis pedibusque flavis.* Ent. syst. 1. 137. 58. *

Habitat in Aquapim Guineae. Dom. Isert.

multipunctatus. 68. *C. alatus, subaeneus, elytris punctis nigris plurimis impressis, pedibus nigris.* Ent. syst. 138. 69.

Carabus multipunctatus. Linn. syst. Nat. 2. 67. 32. Fn. Sv. 805.

Payk. Monogr. 49. 29.

Illig. Col. Bor. 1. 189. 67.

I. 12 Panz. Fn. Germ. 11. tab. 5.

Oliv. Inf. 35. tab. 12. fig. 138.

Habitat in Europae syluis.

botealis. 69. *C. alatus, niger, supra aeneus, elytris striatis punctisque impressis duplici serie, pedibus rufis.*

VI. 15.

C

Carabus borealis. Illig. Col. Bor. I. 188. 66.

Payk. Monogr. 51. 30.

Oliv. Inf. 35. 110. tab. 12. fig. 139.

Habitat in Europa boreali.

Varietatem praecedentis diu credidi; at differt corpore minore, nigro. Striae elytrorum rectiores. Pedes in meo specimine rufi, et margo elytrorum subtus rufescit.

70. *C. alatus, niger, elytris striatis: punctis dorsalibus plurimis impressis.* Ent. syst. I. 138. 60. * *oblongo-punctatus*.

Illig. Col. Bor. I. 181. 54.

VII. 10.

Payk. Monogr. 55. 33.

Oliv. Inf. 35. tab. 12. fig. 140.

Habitat in Europa boreali haud infrequens.

71. *C. alatus, capite thoraceque viridi-aeneis, elytris sulcatis, atris: margine antennarum pedibusque flavis.* *Crossus*.

Habitat in Guinea. Mus. D. de Sehestedt.

Maior *C. cincto*. Caput viridi-aeneum, antennarum palpisque flavis. Thorax subcordatus, punctatus, canaliculatus, basi vtrinque impressus, viridi-aeneus, immaculatus. Elytra sulcata, nigra, margine flavo. Corpus atrum, abdominis margine pedibusque flavis.

72. *C. alatus, aeneus, elytrorum margine pallido, antennarum tibiisque rufis.* Ent. syst. suppl. 54. 61. * *spoliatus*.

III. 18.

Carabus spoliatus. Roff. Fn. Etr. I. 33.

Habitat in Marocco. Dom. Schœusboe.

73. *C. alatus, fuscus, capite thoraceque viridi-aeneis, elytrorum margine pedibusque pallidis.* *cinctus*.

Ent. syst. I. 138. 61. *

III. 12.

Carabus cinctus. Herbst. Arch. tab. 29. fig. 7.

Oliv.

Oliv. Inf. 35. tab. 3. fig. 28.

Habitat in Coromandel. Mus. D. Banks.

festivus. 74. *C. alatus*, thorace aureo, elytris holosericeis fatis, viridibus, margine antennis pedibusque ftaeis.

III. 16. *Carabus festivus.* Panz. Fn. Germ. tab.
Habitat in Austria. Dom. Scheidler.

Statura omnino et affinitas praecedentis.

tennae totae testaceae. Caput aureum. Thorax rugosus, basi vtrinque impressus, aureus. Elytra holosericea, striata, viridia, margine ftaeco. Corpus nigrum, pedibus testaceis.

rustipes. 75. *C. alatus*, ater, antennis elytrorum margine dibusque rufis. Ent. syst. I. 138. 62. *
vB. II. 19 - Habitat in Europa boreali. Mus. Dom. Lund.

elegans. 76. *C. alatus*, supra aeneus, nitidus, elytris striata, vitta submarginali cuprea.

Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff.

Statura et magnitudo *C. rufipedis*. Caput viridi-aeneum, nitidum, antennis mandibulis nigris. Thorax cordatus, laevis, canaliculatus, viridi-aeneus, nitidus. Elytra crenato-striata, viridi-aenea, vitta fere obsoleta submarginali, cuprea. Corpus atrum.

splendidus. 77. *C. alatus*, obscure ferrugineus, elytris fuscis, margine aeneo, nitidissimo.

Habitat in Bengalia. Mus. Dom. de Sehestedt.

Statura parva praecedentium. Caput, thorax, tennae ferrugineae. Elytra striata, fusca, margine aeneo, nitidissimo. Corpus ferrugineum.

nitidulus. 78. *C. alatus*, niger, elytrorum margine aeneo, nitidissimo. Ent. syst. I. 138. 63. *

Habitat in Kamtschatka. Mus. Dom. Banks.

79. *C. thorace angustato, aeneo, elytris striatis nigris, antennis pedibusque rufis. tenuicollis*

Habitat ad Cap. Bon. Spei, in Bengalia. Mus. D. Lund.

Statura et magnitudo *C. cincti*. Caput aeneum, nitidum, antennis rufis. Thorax punctatus, reliquis angustior, at postice parum attenuatus, aeneus, dorso canaliculato lineolaque baseos vtrinque impressa. Elytra striata: striis laevibus, nigra, aeneo parum nitidula. Corpus nigrum, pedibus rufis.

80. *C. alatus, thorace ferrugineo, elytris truncatis, ruficollis. striatis, viridibus, capite plano, atro. Ent. syst.*

I. 139. 65. *

Oliv. Inf. 35. tab. 7. fig. 78.

Habitat in Guinea. Mus. D. de Sehestedt.

81. *C. alatus, thorace nigro, aeneo, elytris striatis, basi ferrugineis, apice nigro-cyaneis. tricolor.*

Habitat in Austria. Dom. Scheidler.

Parvus. Caput et thorax nigro-aenea, nitida. Thorax canaliculatus et basi vtrinque impressus. Elytra striata, basi late ferruginea, apice nigro-cyanea. Corpus atrum.

82. *C. alatus ater, elytris macula postica ferruginea. modestus.*

Habitat in Austria. Dom. Scheidler.

Statura parva praecedentis. Caput cum antennis nigrum. Thorax cordatus, linea media puncto-que vtrinque baseos impressis. Elytra striata, atra, macula magna ante apicem ferruginea. Corpus atrum, pedibus piceis.

83. *C. alatus rufus, elytris abdomineque nigris. agilis.*

Ent. syst. I. 39. 67. *

Payk. Monogr. 102. 64.

Habitat Vpsaliae. Dom. de Paykull.

VII. 10.

III. 13.

- 4nctatus.* 84. *C. alatus niger*, elytris striatis: lunula bas
maculaque postica testaceis. Ent. syst. sup
55. 68. *
Habitat in India orientali. Dom. Daldorff.
- fasciatus.* 85. *C. alatus*, thorace rufo, coleoptris flavescer
bus: fascia communi nigra. Ent. syst. 1. 1:
68. *
Carabus atricapillus. Illig. Col. Bor. 1. 20
89. ζ.
Payk. Monogr. 97. 60.
Habitat in Europa boreali.
- atricapil-
lus.* 86. *C. alatus*, thorace rufo, elytris obtusis testace
capite atro. Ent. syst. 1. 140. 69. *
Carabus atricapillus. Linn. syst. Nat. 2. 673. 4
Carabus atricapillus. Illig. Col. Bor. 1. 20
89. α.
Oliv. Inf. 35. tab. 9. fig. 106.
Habitat in Europae locis humidis.
Praecedenti nimis affinis, et forte mera eius v
rietas, at a *C. 4maculato* omnino distinctus.
- marginel-
lus.* 87. *C. alatus ater*, thorace rufo, elytris pallidi
margine rufo. Ent. syst. 4. Append. 442.
Habitat in Germania.
Statura et summa affinitas *C. agilis*, at ab *C. at
capillo* et *4maculato* omnino differt.
- bis agut-
tatus.* 88. *C. alatus flavus*, elytris fuscis: maculis duab
flavis.
Carabus 4pustulatus. Ent. syst. 1. 140. 70.
Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. D. Bank
- 3puncta-
tus.* 89. *C. alatus viridi-aeneus*, elytris punctis quatu
impressis. Ent. syst. suppl. 55. 70. *
Habitat in America boreali. Dom. Mauerhoff.
- oblongus.* 90. *C. alatus ater*, thorace oblongo, elytris striat
fuscis, antennis pedibusque flavis. Ent. syst.
III. 70. 140. 71. * III

Illig. Col. Bor. 1. 186. 63.
 Panz. Fn. Germ. 34. tab. 3.
 Erbst. Arch. 6. tab. 29. fig. 5.
 Habitat in Germania. Dom. Smidt.
 Apterum dicit Illiger; an rite?

1. C. alatus nigricans, antennis pedibusque pallidis. ^{alb}~~pallipes.~~
Carabus oblongus. Ent. syst. 1. 140. 72. *
 Habitat in Germania. Mus. Dom. Lund. VII. 16.

2. C. alatus, thorace ferrugineo, elytris rotunda-*rubens.*
 tis testaceis, capite fusco. Ent. syst. 1. 140. 73.
 Habitat Kiliae.

3. C. alatus viridi-aeneus, antennis pedibusque ni-*festinans.*
 gris. Ent. syst. suppl. 55. 74. *
 Habitat Cajennae. Dom. Richard.

*** *thorace postice attenuato.*

4. C. ater laeuissimus, thorace cornuto. Ent. syst. *cephalotes*
 1. 143. 85. Linn. syst. Nat. 2. 669. 9. Fn. Sv.
 688.

Scarites cephalotes. Illig. Col. Bor. 1. 110. 1.
 Payk. Monogr. 105. 65.
 Oliv. Inf. 35. 8. 6. tab. 1. fig. 9. VII. 4.
 Schaeff. Icon. tab. 11. fig. 1.
 Frish. Inf. 13. tab. 22.
 Habitat in Europae suffocatis. *cf. Scarites in
 collectione mea.*

5. C. ater, capite obtusissimo, elytris rufis. *megace-*
phalus.
Scarites fabulosus. Ent. syst. 1. 96. 8. *
 Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lund.

6. C. ater, thorace elytrisque striatis remotis. Ent. *interru-*
 syst. 1. 144. 87. * *ptus.*
Scarites clypeatus. Ross. Fn. Etr. 228. 570.

Erbst. Arch. tab. 29. fig. 4.
 Habitat in Oriente. Dom. Forstkahl.
 Variat magnitudine duplo minore, at vix di-
 finctus.

calydonius 97. *C. capitis cornu porrecto obtuso, mandibula cornutis.* Ent. syst. I. 144. 89. *

Carabus tricuspидatus. Ent. syst. I. 144. vix differt.

Carabus calydonius. Ross. Fn. Etr. tab. 8, fig. 8. Habitat in Italia. Mus. Dom. Bosc.

Subdiuisio haec ab hoc genere differre videtur saepius examinans, characteres proprii generis inuenio. Scaritis affinis habitu atque colore omnino differt.

**** *thorace quadrato.*

~~*caliginosus*~~ 98. *C. apterus ater obscurus, elytris striatis, antennis testaceis.* Ent. syst. suppl. 57. 94. *

Oliv. Inf. 35. tab. 6. fig. 64.

tab. 7. fig. 84.

Habitat in America boreali.

striola. 99. *C. apterus depressus ater, thorace lineis vix impressis, elytris striatis.* Ent. syst. I. 146. 95. *

Carabus depressus. Oliv. Inf. 35. 54. 63. 4. fig. 46.

I. 13. Panz. Fn. Germ. II. tab. 6.

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

~~*impressus*~~ 100. *C. apterus ater, thorace vtrinque lineis impressis, elytris striatis.* Ent. syst. suppl. 95. *

Habitat in India orientali. Dom. Daldorff.

striolatus. 101. *C. apterus ater, thorace vtrinque subimpressis, elytris laeviusculis.*

Habitat in Carneolia. Dom. Meyerle.

VIII. 8

Maior *C. striola* et alius. Antennae nigrae, pedicellae fuscae. Caput magnum, antice vtrinque impressa. Thorax quadratus, planus, luteus, postice vtrinque subimpressus. Elytra ferrea, atra.

102. *C. apterus niger*, thorace lineolis baseos vtrin- *metallicus*
que impressis, thorace elytris que aeneis. Ent.

syft. I. 146. 96. *

I. 13.

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

103. *C. apterus ater*, capite thoraceque nitidis, ely- *frigidus*.
tris striatis, antennarum articulo primo rufo.

Habitat in Germania. Mus. Dom. Lund.

Statura et magnitudo *C. metallici*. Caput atrum
nitidum, palpis antennarumque articulo primo
rufis. Thorax quadratus, planus, ater linea
media canaliculata, basique vtrinque parum
impressus. Elytra atra, striata striis laeuibus.
Corpus atrum, tibiis rufis.

104. *C. apterus ater*, thorace basi vtrinque impresso, *elatus*.
elytrorum striis laeuibus.

Habitat in Germania. Mus. Dom. de Sehestedt. I. 6.

Statura omnino praecedentis. Antennae nigrae,
apice parum griseae. Caput atrum, nitidum.
Thorax canaliculatus, basi vtrinque impressus.
Elytra striata striis laeuibus: marginali pun-
ctata. Pedes nigri.

105. *C. alatus gibbus*, supra niger subtus piceus, ely- *gibbus*.
tris striatis. Ent. syft. 4. App. 442. 96. *

Habitat in Europa haud infrequens. VII. 17

106. *C. alatus ater nitidus*, elytris striatis, anten- *postus*.
nis rufis. Ent. syft. I. 146. 97. *

Habitat in India orientali. Mus. Dom. Lund.

***** *Apteri thorace rotundato.*

107. *C. apterus viridi-aeneus*, thorace vtrinque bi- *lepidus*.
striato. Ent. syft. I. 153. 124. *

Corabus lepidus. Leske Iter. I. 17. 8. tab. A.
fig. 6.

Payk. Monogr. 32. 18.

Oliv.

Oliv. Inf. 35. tab. 11. fig. 118.

Illig. Col. Bor. 1. 164. 29.

Habitat in Lusatiae arenosis. Dom. Leske.

caesfidius. 108. C. apterus ater, thorace orbiculato, elytris
uibus. Ent. syst. 1. 148. 104. *

Illig. Col. Bor. 1. 159. 23.

III. 19 Panz. Fn. Germ. 31. tab. 8.

Habitat Parisiis. Mus. D. Bosc.

filphoides. 109. C. apterus depressus ater, thorace orbicu-
elytris striatis punctisque impressis maiori
Ent. syst. 1. 148. 105. *

VIII. 8 *Carabus filphoides* Ross. Fn. Etr. 215. tab.
fig. 7.

Carabus punctatulus. Ent. syst. 1. 152. 1.

Habitat in Gallia, Italia. Mus. D. Bosc.

fabulicola. 110. C. apterus ater, antennis pedibusque rufis.
Habitat in Austria. Dom. Meyerle.

Minor. Caput punctatum, atrum ore antennarum
rufis. Thorax rotundatus, punctatus,
IV. 16. Elytra striata, nigra, cyaneo-nitida. Caput
atrum, pedibus rufis.

glossosus. 111. C. apterus ater, thorace convexo, elytris
tis. Ent. syst. 1. 148. 106. *

Habitat in Marocco. Mus. D. de Sehestedt.

melanoccephalus. 112. C. apterus niger, thorace pedibusque ferrugineis.
Ent. syst. 1. 159. 153. *

Linn. Syst. Nat. 2. 671. 22. Fn. Sv. 795.

Geoff. Inf. 1. 162. 42.

Degeer Inf. 4. 93. 8.

Oliv. Inf. 35. tab. 2. fig. 14.

Illig. Col. Bor. 1. 161. 25.

Voet. Col. tab. 35. fig. 15.

III. 15 Panz. Fn. Germ. 30. tab. 19.

Payk. Monogr. 35. 20,
Habitat in Europae suffocatis.

13. *C. apterus fuscus*, elytris obsolete striatis, an-*fuscus*.
tennis, thoracis margine pedibusque flavis. Ent.

syft. I. 158. 150. *

Illig. Col. Bor. I. 162. 26.

Habitat in Germania. Dom. Smidt.

***** *Alati, thorace rotundato.*

14. *C. alatus ater*, antennis ferrugineis. Ent. syft. *brevicollis*

I. 150. 113. *

Illig. Col. Bor. I. 190. 69.

Panz. Fn. Germ. II. tab. 8.

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

I. 13

15. *C. alatus depressus ater*, elytris punctato - sub-*punctula-*
striatis basi retusis. Ent. syft. I. 150. 114-
tus.

Illig. Col. Bor. I. 175. 46.

Panz. Fn. Germ. 30. tab. 10.

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

II. 13.

16. *C. alatus*, capite thoraceque viridi-aeneis ni-*oculatus.*
tidis, elytris striatis atris: puncto postico rufo.

Habitat in Guinea. Mus. D. de Sehestedt.

Statura et affinitas *C. postici*. Antennae fuscae,
articulo primo rufo. Caput viridi-aeneum, ni-
tidum, immaculatum. Thorax punctatus, viri-
di-aeneus, nitidus, postice vtrinque impressus.
Elytra striata, atra, coeruleo-nitidula, puncto
magno orbiculato versus apicem rufo. Corpus
atrum, pedibus rufis.

17. *C. alatus*, thorace viridi-aeneo, elytris striatis *posticus*.
fuscis: macula postica lunata pedibusque ful-
vis. Ent. syft. suppl. I. 57. 161.

Habitat in India orientali. Dom. Daldorff.

18. *C. alatus*, elytris auro micantibus, apice macula *micans*.
testacea, pedibus rufis. Ent. syft. I. 151. 115. *

Ca-

Carabus analis. Oliv. Inf. 35. tab. 10. fig. 11
Habitat in Bengalia. Mus. D. Bosc.

macula.

119. *C. alatus*, elytris striatis, margine macula futuraque posticis flavis.

Habitat in Guinea. Mus. Dom. Lund.

Statura omnino et magnitudo *C. micantis*. Caput viridi-aeneum, nitens, ore antennisque flavis. Thorax planus, subrugosus, niger, margine flavescente. Elytra striata, margine, macula postica composita, futuraque versus anum flavis. Abdomen attum, margine abdominis pedibusque flavis.

obscurus.

120. *C. alatus ater*, thorace punctato, elytris striatis, pedibus piceis. Ent. syst. 1. 151. 116. *

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

Variat pedibus obscure piceis et rufescentibus.

stigma.

121. *C. alatus niger*, thorace nitido, elytris sulcatis: macula ante medium ferruginea.

Carabus sulcatus Ent. syst. 4. App. 443?

Habitat in India. Dom. Daldorff.

Palpi subferruginei. Antennae nigrae. Thorax canaliculatus, ater, nitidus, immaculatus. Elytra sulcata macula ante medium fulva. Corpus nigrum.

Annon.

122. *C. alatus cyaneus*, coleoptris laevibus: fascia postica lunata rufa.

Habitat in Guinea. Mus. Dom. Lund.

Statura praecedentium: at minor. Caput cyaneum, nitidum. Antennae nigrae, articulo primo et secundo rufis. Thorax rotundatus, subpunctatus, cyaneus. Coleoptra laevia, cyaneae fascia lata versus apicem lunata, ferruginea. Corpus cyaneo-nitidum, pedibus ferrugineis.

123. *C. alatus niger*, capite coeruleo nitido, thorace *pubicus*.
elytrorumque macula communi ferrugineis.
Habitat in Bengalia. Mus. D. de Sehestedt.
Statura praecedentium. Caput coeruleum, nitidum ore antennisque ferrugineis. Thorax rotundatus, flavescens: medio obscuriore. Elytra substriata, fusca; macula magna postica, communi, ferruginea. Corpus nigrum pedibus flavescentibus.
124. *C. alatus supra niger*, subtus ferrugineus. Ent. *bicolor*.
syft. I. 151. 117. *
Oliv. Inf. 35. tab. 11. fig. 92.
Habitat in America boreali. Dom. Lewin.
125. *C. alatus holosericeo-niger*, capite aeneo-nitido. Ent. syft. I. 151. 118. * *holosericeus*.
Illig. Col. Bor. I. 177. 49.
Oliv. Inf. 35. tab. 11. fig. 122. *I. 14.*
Payk. Monogr. 110. 69.
Habitat Kiliae. Dom. Daldorff.
126. *C. alatus ater*, capite punctis duobus frontibus rufis, antennis basi flavis. Ent. syft. I. 151. 119. * *anotatus*.
Illig. Col. Bor. I. 170. 37. *VIII. 8.*
Habitat Kiliae. Dom. Daldorff.
127. *C. alatus cyaneus*, ore, thorace femoribusque *fulvicollis* rufis, elytris striatis truncatis. Ent. syft. I. 152. 121. *
Habitat in Barbaria. Mus. Dom. Desfontaines.
128. *C. alatus*, elytris striatis punctisque impressis, pilicornis. antennis pilosis. Ent. syft. I. 152. 122. *
Illig. Col. Bor. I. 193. 71. *I. 14.*
Pan. Fn. Germ. 11. tab. 10.
Oliv. Inf. 35. tab. 11. fig. 119.

Pavk. Monogr. 78. 47.

Habitat in Anglia. Mus. Dom. Banks.

Variat colore nigro et aeneo.

dimidiatus 129. *C. alatus ater*, thorace cupreo, elytris striatis viridibus,

Carabus dimidiatus. Oliv. Inf. 35. tab. 1. fig. 121.

Carabus Kugellanii Illig. Col. Bor. 1. 166.

Habitat in Germania. Mus. Dom. de Sehestede.

Affinis certe *C. nigricorni*, at maior et alius. Caput viride, antennis nigris. Thorax cupreo canaliculatus basi vtrinque impressus. Elytra striata striis vix punctatis. Corpus et pedes atrii.

*coerule-
scens.*

130. *C. alatus nigro-coeruleus*, elytris striatis antennis basi rubris. Ent. syst. 1. 152. 123. Linn. syst. Nat. 2. 672. 28. Fn. Sv. 800.

Oliv. Inf. 35. tab. 12. fig. 132.

Habitat in Europae aridis.

laetus.

131. *C. alatus*, capite thoraceque cupreis, elytra striatis nigris, antennis pedibusque rufis. Ent. syst. 4. App. 443. 123. *

Habitat in Europa boreali.

viuidus.

132. *C. alatus ater*, thorace canaliculato: margine antennisque ferrugineis, abdomine pedibusque piceis.

Habitat in Madera. Dom. Rattje.

Omnino distinctus a *C. tardo*. Caput laeve, atrum antennis palpisque rufis. Thorax planus, canaliculatus, ater, margine tenuissime rufo. Elytra striata, atra. Abdomen et pedes picei.

tardus.

133. *C. alatus niger*, antennis thoracisque margine ferrugineis, pedibus testaceis.

- Carabus tardus*. Illig. Col. Bor. I. 168. 35.
 Panz. Fn. Germ. 37. tab. 24.
 Habitat in Germania. Dom. Panzer.
 Satura et magnitudo *C. cuprei*. Antennae ferru-
 gineae. Caput nigrum. Thorax laevis, niger,
 margine omni tenuissime ferrugineo. Elytra
 striata, nigra. Corpus nigrum pedibus testaceis.
34. *C. alatus cupreus*, antennis basi rubris. Ent. *cupreus*.
 Syst. I. 153. 126. Linn. Syst. Nat. 2. 672. 29.
 Fn. Sv. 801.
 Geoff. Inf. I. 161. 40. *V. II.*
 Pylt. Monogr. 113. 71.
 Illig. Col. Bor. I. 166. 31.
 Oliv. Inf. 35. tab. 3. fig. 25.
 Degeer Inf. 4. 97. 13. tab. 3. fig. 15.
 Habitat in Europae filuis.
35. *C. alatus*, ater, capite thoraceque cupreis, ely- *tricolor*.
 tris striatis aeneis. Ent. Syst. suppl. 57. 126. *
 Habitat Kiliae. Dom. Weber.
36. *C. alatus viridi-aeneus*, antennis pedibusque *carnifex*.
 rufis. Ent. Syst. I. 153. 127. *
Carabus carnifex Oliv. Inf. 35. tab. 5. fig. 59.
 Habitat in America.
37. *C. alatus nigro-aeneus*, antennis pedibusque *vulgaris*.
 nigris. Ent. Syst. I. 154. 128. * Linn. Syst.
 Nat. 2. 672. 27. Fn. Sv. 799. *V. 21.*
 Illig. Col. Bor. I. 167. 33.
 Degeer Inf. 4. 97. 14.
 Panz. Fn. Germ. 40. tab. 1.
 Schaeff. Icon. tab. 18. fig. 2.
 Habitat in Europae fabulosis.
38. *C. alatus*, supra viridi-aeneus, antennis basi *communis*.
 rufis, elytris striatis.

- Carabus communis*. Illig. Col. Bor. 1. 168.
Habitat in Germania. Dom. Meyerle.
Statura et summa affinitas praecedentis, cuius
temera varietas. Corpus supra viridi-aenei
nitidum, elytris striatis. Pedes picei.
- integer*. 139. *C. alatus*, ater, nitidus, elytrorum striis
uissimis, antennis pedibusque ferrugineis. Ent.
syft. suppl. 58. 128. *
Habitat in Americae Insulæ. Dom. v. Rohr.
- alpinus*. 140. *C. alatus*, ater, elytris striatis: disco fer-
ginoso. 11
Carabus alpinus. Payk. Monogr. 119. 73.
VII. 12. *Carabus torridus*, Illig. Col. Bor. 1. 173. 42
Habitat in Sueciae Alpibus. Dom. de Paykull.
- latus*. 141. *C. alatus*, niger, elytris crenato-striatis,
tennis pedibusque ferrugineis. Ent. syft.
154. 129. Linn. syft. Nat. 2. 672. 24.
Degeer. Inf. 4. 101. 18.
Schaeff. Icon. tab. 194. fig. 7.
Habitat in Europae sylvis.
- abdomina-
lis*. 142. *C. alatus*, niger, antennis abdominis disco p-
dibusque ferrugineis. Ent. syft. r. 154. 130.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Dom. Banks.
- ouatus*. 143. *C. alatus*, niger, elytrorum striis laeui-
bus, a-
tennis pedibusque ferrugineis. Ent. syft.
154. 131. *
Habitat in Saxonia. Dom. Smidt.
- helopioi-
des*. 144. *C. alatus*, ater, elytrorum, striis laeui-
bus, a-
tennis pedibusque nigris. Ent. syft. 1. 15.
III. 13. 132. *
Habitat in Germania. Dom. Helwig.
- cyaneus*. 145. *C. alatus*, cyaneus, antennis pedibusque rubri-
VII. 12. Ent. syft. 1. 155. 133.
VII. 15

- Carabus Proteus* Payk. 115. 72.
Carabus aeneus. Illig. Col. Bor. 1. 169. 36.
 Bergstr. Nomencl. 1. tab. 10. fig. 3.
 Habitat in Lipsiæ collibus arenosis.
146. *C. alatus*, supra *aeneus*, antennis pedibusque *aeneus*.
 ferrugineis. Ent. syst. 1. 156. 142. *
Carabus Proteus. Payk. Monogr. 115. 72. 8. VII. 12
Carabus aeneus. Illig. Col. Bor. 1. 169. 36. β.
 Oliv. Inf. 35. 76. 99. tab. 12. fig. 135.
 Habitat in Germaniæ hortis.
 Varietatem præcedentis credunt Dom. Illiger et
 Paykull.
147. *C. alatus*, niger, capite rufo, antennis pedibus- *erythroce-*
 que flavis. Ent. syst. 1. 155. 134. * *phalus*,
 Habitat Kiliae. Dom. Daldorff. #. 15
148. *C. alatus*, niger, ore, antennis, ano, pedibus- *analis*.
 que ferrugineis. Ent. syst. 1. 155. 135. *
 Habitat in Germania. Dom. Smidt.
149. *C. alatus*, ferrugineus, elytris lineola nigra. *lineola*.
 Ent. syst. 1. 155. 136. *
 Oliv. Inf. 35. tab. 7. fig. 75.
 Habitat in America boreali. Mus. D. Banks.
150. *C. alatus*, ferrugineus, elytris striatis obscu- *ferrugine-*
 rioribus. Ent. syst. 1. 155. 137. Linn. syst. *newi*.
 Nat. 2. 672. 25.
 Payk. Monogr. 124. 76. IV. 21.
 Geoff. Inf. 2. 162. 43.
 Illig. Col. Bor. 1. 172. 39.
 Herbst. Arch. tab. 29. fig. 6.
 Degeer. Inf. 4. 101. 19.
 Panz. Fn. Germ. 39. tab. 9.
 Oliv. Inf. 35. tab. 12. fig. 136.
 Habitat in Europæ aridis.

- pallidus.* 151. *C. alatus, pallidus, elytris striatis.* Ent. 1. 156. 138.
 Habitat in Saxoniae fabuletis.
Varietatem praecedentis credit D. Paykull, at merito. Differt statura multo breuiore, thorace canaliculato.
- St. Crucis.* 152. *C. alatus, niger, elytris striatis pallidis: cula communi dorsali fusca.* Ent. syst. 1. 58. 138. *
 Habitat in Americae Insulis. Dom. v. Rohr.
- Surinamensis.* 153. *C. alatus, testaceus, thorace elytrisque fuscis.* Ent. syst. 1. 156. 139. *
 Habitat Surinami. Mus. Dom. Lund.
- dorsiger.* 154. *C. alatus, ferrugineus; abdomine, coleopterumque lunula lata, nigris.* Ent. syst. 1. 140. *
 Habitat in Barbaria. Dom. Prof. Vahl.
- aterrimus.* 155. *C. alatus, thorace marginato, ater, elytris fuscis: punctis tribus impressis.* Ent. syst. 1. 141. *
 Illig. Col. Bor. 1. 194. 73.
 Payk. Monogr. 127. 78.
 Oliv. Inf. 35. tab. 12. fig. 141.
 Herbst. Arch. 5. tab. 29. fig. 3.
 Habitat in Europae syluis.
- nigricornis* 156. *C. alatus, niger, thorace cupreo, elytris fuscis viridibus, pedibus piceis.* Ent. syst. 1. 143. *
Carabus nigricornis. Payk. Monogr. 112. 7.
Carabus nitidulus. Thunb. Act. Vpf.
 Habitat in Europa boreali. Mus. D. de Sehested.
 Antennarum articulus primus ferrugineus.
- austriacus* 157. *C. alatus, niger, thorace cupreo, coleopterum striatis viridibus: dorso cupreo, pedibus nigris.*
 I. 14

Habitat in Austria. Dom. de Meyerle.

Nimis forte affinis *C. nigricorni*. Differt tamen elytris ad futuram cupreis, pedibusque nigris.

158. *C. apterus, oblongus, supra aeneus, subtus parum-ater, elytris striatis: punctis sex impressis, tibis punctatus, biis piceis.* Ent. syst. 1. 157. 144. *

Carabus Mylleri. Herbft. Arch. 5. 139. 46. VIII. 9.

Illig. Col. Bor. 1. 195. 74.

Habitat in Germania. Dom. Smidt.

159. *C. alatus, capite thoraceque viridibus, elytris 6 puncta-cupreis.* Ent. syst. 1. 157. 145. * Linn. syst. *cus.*

Nat. 2. 672. 35. Fn. Sv. 807.

Carabus 6 punctatus. Payk. Monogr. 70. 42.

Geoff. Inf. 1. 149. 14.

Schaeff. Icon. tab. 66. fig. 7.

Degeer. Inf. 4. 99, 16. III. 14.

Illig. Col. Bor. 1. 195. 76.

Voet. Col. 2. tab. 33. fig. 4.

Panz. Fn. Germ. 30. tab. 13.

Oliv. Inf. 35. tab. 5. fig. 50.

Habitat in Europae quisquiliis.

160. *C. alatus, nigro-aeneus, elytris striis duabus pallidus, punctorum impressorum: margine pedibusque pallidis.* Ent. syst. 1. suppl. 58. 58. 145. *

Habitat in America boreali. Dom. v. Rohr.

161. *C. alatus, niger, elytrorum margine exteriori discoideus, antennisque rufis.* Ent. syst. 1. 157. 146. *

Habitat in Germania. Dom. Smidt.

162. *C. alatus, viridis, elytris margine tibiisque te-margina-
staceis.* Ent. syst. 1. 158. 147. * Linn. Fn. *cus.*

Sv. 804.

Payk. Monogr. 71. 43.

Illig. Col. Bor. 1. 196. 78.

Panz. III. 14.

Panz. Fn. Germ. 30. tab. 14.
 Oliv. Inf. 35. tab. 9. fig. 98.
 Habitat in Europae syluis.

vestitus.

163. *C. alatus, viridi-aeneus, nitidus, thoracis e-*
trorumque margine, antennis pedibusque pal-
dis. Ent. syst. 1. 158. 148. *

Oliv. Inf. 35. tab. 5. fig. 49.

Payk. Monogr. 75. 44.

Linn. Syst. Nat. 2. 670. 16.

Illig. Col. Bor. 1. 178. 50.

Ill. 15. Geoff. Inf. 1. 162. 41.

Panz. Fn. Germ. 31. tab. 5.

Habitat in Germania. Dom. Smidt.

nigrita.

164. *C. alatus, ater, nitidus, thorace canaliculat-*
elytris striatis. Ent. syst. 1. 158. 149. *

Carabus striatus Payk. Monogr. 45. 26.

Degeer. Inf. 4. 96. 12.

Illig. Col. Bor. 1. 175. 47.

Panz. Fn. Germ. 30. tab. 22.

Habitat in Germania. Dom. Smidt.

pallipes.

165. *C. alatus, ater, thoracis coleoptorumque lin-*
bo, pedibusque pallidis. Ent. syst. 1. 159. 151.

Oliv. Inf. 35. tab. 9. fig. 99.

Habitat in America. Mus. Dr. Hunter.

quadrum.

166. *C. alatus, thorace rotundato, ater, elytris stris-*
tis: vitta lata, pallida. Ent. syst. 1. 159. 152.

Habitat in Senegallia. Mus. Dom. Bosc.

cyanoc-
phalus.

167. *C. alatus, thorace pedibusque ferrugineis, ca-*
pite elytrisque cyaneis. Ent. syst. 1. 159. 154

Linn. syst. Nat. 2. 671. 21. Fn. Sv. 794.

Vll. 13

Geoff. Inf. 1. 149. 16.

Payk. Monogr. 60. 63.

Degeer. Inf. 4. 100. 17. tab. 3. fig. 17.

Schaeff

Schaeff. Icon. tab. 10. fig. 14.

Illig. Col. Bor. 1. 206. 92.

Ofv. Inf. 35. tab. 3. fig. 24.

Habitat in Europæ fyluis.

168. *C. alatus, niger, antennis, ore pedibusque rufis, elytris integris.* Ent. syst. 1. 159. 155. *

Habitat in Germania. Dom. Smidt.

169. *C. alatus, niger, ore, antennis pedibusque rufis, elytris subfinuatis.* Ent. syst. suppl. 59. 156. *

Habitat in India orientali. Dom. Daldorff.

170. *C. alatus, cyaneus, capite thoraceque aeneis, nitidis.* Ent. syst. 1. 160. 156. *

Habitat Cajennæ. Dom. v. Rohr.

171. *C. alatus, flavescens, capite thoraceque nigris, elytris striatis, fuscis.* Ent. syst. 1. 160. 157. *

Habitat in Dania. Mus. Dom. Lund.

172. *C. alatus, niger, elytris vitta abbreviata, interrupta, alba.* Ent. syst. suppl. 59. 157. *

Habitat in India orientali. Dom. Daldorff.

173. *C. alatus, ater, thoracis margine, elytrorum punctis duobus, pedibusque rufis.*

Habitat in Bengalia. Mus. D. de Sehestedt.

Statura et magnitudo *C. crucis*. Caput atrum, immaculatum. Thorax rotundatus, scaber, marginatus: margine rufo. Elytra striata: striis laevis maculisque duabus ferrugineis. Corpus nigrum, pedibus ferrugineis.

174. *C. alatus, depressus, ferrugineus, elytris striatis, atris: maculis duabus ferrugineis.*

Habitat in noua Cambria. Dom. Billardiere.

Magnitudo *C. crucis*, maior at magis depressus.

Caput ferrugineum, vertice obscuriore. Tho-

rax

rax magis transuersus, marginatus: marg rotundato, laeuis, ferrugineus. Elytra striis nigra, macula magna baseos ad futuram, al que apicis, ferrugineis. Corpus ferrugineu

caustus.

175. *C. alatus*, thorace orbiculato, rufus, elytr striatis, nigris: vitta abbreviata, rufa.

Habitat in noua Cambria. Dom. Billardière.

Statura omnino *C. corticalis*, at paullo minor oblongior. Thorax orbiculatus, rufus. Elytra, nigra: vitta rufa, quae tamen apicem ha attingit. Corpus rufum.

crux maior 176. *C. alatus*, thorace orbiculato, elytris que nigr maculis duabus rufis. Ent. syst. 1. 160. 158

Carabus punctulatus. Payk. Monogr. 80. 49.

Linn. syst. Nat. 2. 673. 39.

Geoff. Inf. 1. 130. 17.

Oliv. Inf. 35. tab. 8 fig. 95.

Illig. Col. Bor. 1. 193. 72.

II. 3.

Panz. Fn. Germ. 16. tab. 1.

Schaeff. Icon. tab. 1. fig. 13.

Voet. Col. tab. 34. fig. 7.

Habitat in Europae syluis.

crux minor 177. *C. alatus*, thorace orbiculato, rufo, coleopt truncatis rufis: cruce nigra. Ent. syst. 1. 16 159. *

Carabus crux maior. Payk. Monogr. 81. 50.

Linn. syst. Nat. 2. 673. 40. Fn. Sv. 809.

Geoff. Inf. 1. 150. 18.

Illig. Col. Bor. 1. 201. 87.

II. 4.

Panz. Fn. Germ. 16. tab. 2.

Oliv. Inf. 35. tab. 4. fig. 41.

Schaeff. Icon. tab. 18. fig. 8.

Habitat in Europa boreali.

vittatus. 178. *C. alatus*, thorace orbiculato rufo, elytris atris vitta alba. Ent. syst. 1. 161. 160. *

OL

Oliv. Inf. 35. tab. 6. fig. 69.

Habitat in America boreali. Dom. Yeats.

179. *C. alatus*, thorace rotundato rufo, elytris atris: *avittatus*.
vittis duabus abbreviatis albis. Ent. syst. suppl.

59. 160. *

Habitat in America. Dom. Hybner.

180. *C. alatus*, ater, nitidus, elytris striatis: vitta *angulatus*.
marginali rufa.

Habitat Tranquebariae. Dom. Daldorff.

Parvus, oblongus. Caput atrum, antennarum articulo primo rufo. Thorax rotundatus, ater nitidus, basi vtrinque parum impressus. Elytra striata vitta lata, marginali, rufa, margine tamen ipso nigro. Corpus nigrum pedibus flavescens.

181. *C. alatus*, thorace orbiculato rufo, elytris *nigricus*.
gris: lunula baseos pallida. Ent. syst. I. 161.

161. *

Oliv. Inf. 35. tab. 6. fig. 60.

Habitat in Anglia. Mus. Dr. Hunter.

182. *C. alatus*, thorace suborbiculato rufo, elytris *haemorrhoidalis*.
nigris apice rufis. Ent. syst. I. 161. 162. *

Oliv. Inf. 35. tab. 13. fig. 149. // 11. 13.

Habitat Dresdae. Mus. D. Romanus.

183. *C. alatus*, thorace orbiculato, ater nitidus, elytris *picipes*.
tris fascis pedibus ferrugineis. Ent. syst. I.

161. 163. *

Payk. Monogr. 76. 46.

Illig. Col. Bor. I. 199. 85.

Panz. Fn. Germ. 30. tab. 20.

Habitat in Suecia. Dom. de Paykull.

184. *C. alatus*, thorace orbiculato rufo, coleoptris *apustulatus*.
apice nigris: macula rufa. Ent. syst. I. 161. tus.

164. *

Ca-

Carabus crux minor. Payk. Monogr. 8. 452.
Illig. Col. Bor. 1. 200. 86.

H. 4. Panz. Fn. Germ. 16. tab. 3.
Oliv. Inf. 35. tab. 8. fig. 96.
Habitat in Anglia. Dom. Lee.

Andreae. 185. *C. alatus*, thorace orbiculato nigro nitido, elytris pallidis: fascia media nigra. Ent. syst. 162. 165. *

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

eleuatus. 186. *C. alatus*, rufus, elytris rufis pallidoribus fascia communi atra. Ent. syst. 1. 162. 166.
Habitat Parisiis. Mus. Dom. Bosc.

germanus. 187. *C. alatus cyaneus*, capite elytris pedibusque testaceis, elytris apice violaceis. Ent. syst. 1. 167. * Linn. Syst. Nat. 2. 672. 26.

Oliv. Inf. 35. tab. 5. fig. 56.

Illig. Col. Bor. 1. 179. 51.

H. 4. Panz. Fn. Germ. 16. tab. 4.
Schaeff. Icon. tab. 31. fig. 13.
Habitat in Germaniae sylvis.

Neros. 188. *C. alatus*, testaceus, thorace, pectore elytris que dimidiato-nigris.

Habitat in Tanger. Dom. Schousboe. Mus. D. de Sehestedt.

Statura et summa affinitas praecedentis, at dupli-
fere maior. Antennae fuscae, basi ferrugineae
Caput rufum, antice vtrinque impressum. Tho-
rax laevis, ater, nitidus, postice vtrinque im-
pressus. Elytra striata, nigra basi fere usque
ad medium testacea. Pectus nigrum. Abdo-
men et pedes testacei.

spinilabris 189. *C. alatus*, obscure ferrugineus, elytris striatis, gula spinosa.

Carabus spinilabris. Panz. Fn. Germ. 39. tab. 11.
Habitat in Austria. Dom. Scheidler.

Par-

Paruus. Caput, thorax, elytra friata obscure ferruginea. Caput subtus spinosum. Antennæ et pedes testacei.

190. *C. alatus, nigricans, antennis pedibusque pal-velox*
lidis, elytris obtusissimis. Ent. fyft. 1. 162.
168. * Linn. fyft. Nat. 2. 672. 233. Fn.
Sv. 803.

Oliv. Inf. 35. tab. 13. fig. 151.

Habitat in Europa arena.

191. *C. alatus ferrugineus, vertice anoque nigris. rufescens.*

Ent. fyft. 1. 162. 169. *

Payk. Monogr. 58: 35.

Illig. Col. Bor. 1. 190. 70.

Oliv. Inf. 35. tab. 12. fig. 146.

Panz. Fn. Germ. 7. tab. 2. I. 15

Habitat in Germania, Anglia. III. 20

Conf. *Carabus Bructeri*, Panz. Fn. Germ. 34.

tab. 4. an distinctus?

192. *C. alatus, testaceus, capitis vertice elytrorum praeustus*
apicibus abdomineque nigris. Ent. fyft. 1. 162.

170. *

Habitat in Germania. Dom. Smidt.

193. *alatus, supra niger, subtus ferrugineus, elytris apricarius*
crenato-friatis. Ent. fyft. 1. 163. 171.

Payk. Monogr. 125. 77. IV. 22.

Degeer. Inf. 4. 101. 19.

Geoff. Inf. 1. 162. 43.

Illig. Col. Bor. 1. 172. 41.

Panz. Fn. Germ. 40. tab. 3.

Habitat in Europæ arenosis. Dom. de Paykull.

194. *C. alatus, thorace orbiculato rufo, elytris flavo-lunatus.*
uis: maculis tribus nigris. Ent. fyft. 1. 163. II. 5.

172. *

Oliv.

- Oliv. Inf. 35. tab. 3. fig. 27.
 Schaeff. Icon. tab. 41. fig. 14.
 Habitat in Anglia. Dom. Lee.
- prafinus.* 195. *C. alatus*, niger, capite thoraceque aeneis, elytris ferrugineis: macula magna communis nigra. Ent. fyft. I. 163. 173. *
Carabus viridanus. Payk. Monogr. 57. 34-
 Illig. Col. Bor. I. 180. 32.
 Schaeff. Icon. tab. 31. fig. 13.
 Oliv. Inf. 35. tab. 5. fig. 55.
 II. 5. Panz. Fn. Germ. 16. tab. 6.
 Voet. Col. 2. tab. 33. fig. 5.
 Habitat Hafniae. Dr. Pflug.
- Curfor.* 196. *C. alatus*, thorace viridi-aeneo, elytris nigris macula apicis ferruginea. Ent. fyft. I. 163. 174. *
 Habitat in Italia. Dr. Allioni.
- furcatus.* 197. *C. alatus*, lividus, elytris vitta media abbreviata nigra, antice furcata. Ent. fyft. I. 163. 175. *
 Habitat in America. Dom. Prof. Helwig.
- vaporario-* 198. *C. alatus*, thorace, elytris antice margineque
rum. antennis pedibusque ferrugineis. Ent. fyft. I. 164. 176. Linn. fyft. Nat. 2. 671. 23. F. Sv. 796.
 Illig. Col. Bor. I. 199. 84.
 Oliv. Inf. 35. tab. 7. fig. 57.
 Myll. Zool. Dan. 78. 850.
 II. 5. Panz. Fn. Germ. 16. tab. 7.
 Voet. Col. 2. tab. 35. fig. 18.
 Habitat in Europae quisquiliis.
- meridia-* 199. *C. alatus*, niger, elytris antice, pedibusque t
nus. taceis. Ent. fyft. I. 164. 177.
 VII. 13 Lin

Linn. syst. Nat. 2. 673. 36.

Payk. Monogr. 95. 59.

Illig. Col. Bor. 1. 198. 82.

Oliv. Inf. 35. tab. 13. fig. 135.

Degeer Inf. 4. 102. 20.

Habitat in Europae arenosis.

100. *C. alatus*, thorace rufo, elytris testaceis: *maculosa* communi dorsali fusca. Ent. syst. 1. 164.

178. *

Illig. Col. Bor. 1. 187. 64.

IV. 27.

Panz. Fn. Germ. 38. tab. 7.

Habitat in Germania. Dom. Smidt.

101. *C. alatus*, niger, thorace fusco, elytris griseis: *macula* lineari nigra. Ent. syst. 1. 165. 179. *

Habitat in America. Dom. Drury.

102. *C. alatus*, ater, antennis pedibusque rufis, tibiis *vernalis*. ferratis.

Carabus vernalis. Panz. Fn. Germ. 16. tab. 8. III. 17

Habitat in Austria. Dom. Scheidler.

Parvus. Caput et thorax laevia, atra, immaculata. Elytra striata. Corpus atrum. Antennae et pedes rufi, tibiis ferratis.

103. *C. alatus*, thorace ferrugineo glabro, elytris *maculata* truncatis fasciis: maculis duabus albis. Ent. 115.

syst. 1. 165. 180. *

VII. 14.

Linn. Syst. Nat. 2. 673. 40. Fn. Sv. 809.

Geoff. Inf. 1. 152. 24.

Illig. Col. Bor. 1. 202. 88.

Oliv. Inf. 35. tab. 8. fig. 89.

Payk. Monogr. 83. 51.

Habitat in Europae quisquiliis.

104. *C. alatus*, thorace atro, elytris laevissimis *nigra* punctis duobus albis. Ent. syst. 1. 165.

181. *

IV. 22.

Elä-

- Elaphrus 4guttatus*. Illig. Col. Bor. 1. 232.
 Payk. Monogr. 90. 55.
 Oliv. Inf. 35. tab. 13. fig. 160.
 Panz. Fn. Germ. 49. tab. 5.
 Habitat in Europa boreali.
- 4pustulatus*. 205. *C. alatus*, ater, elytris striatis: punctis duobus rufis. Ent. syst. suppl. 59. 181. *
 Linn. Syst. Nat. 2. 673. 39.
 Habitat in Europa boreali.
- vstulatus*. 206. *C. alatus*, thorace nigro, elytris obscuris paucis bifasciatis. Ent. syst. 1. 165. 182.
 Linn. syst. Nat. 2. 673. 38. Fn. Sv. 810.
 Payk. Monogr. 86. 53.
Carabus dentellus. Thunb. Mus. Vpf. 50.
Elaphrus vstulatus. Illig. Col. Bor. 1. 231. 1
 Oliv. Inf. 35. tab. 9. fig. 104.
 17. 22. Panz. Fn. Germ. 40. tab. 7.
 Habitat in Europae quisquiliis.
- dorsalis*. 207. *C. alatus*, thorace nigro, coleoptris pallidis macula magna dorsali nigra. Ent. syst. 1. 16
 183.
Carabus meridianus. Payk. Monogr. 96. 59.
 Illig. Col. Bor. 1. 198. 83.
 Habitat Kiliae. Dom. Daldorff.
- 2guttatus*. 208. *C. alatus*, thorace aeneo, elytris nigris: macula apicis pallida. Ent. syst. 1. 166. 184. *
Elaphrus biguttatus. Illig. Col. Bor. 1. 230. 1
 Habitat in Norwegiae fyluis.
- guttula*. 209. *C. alatus*, ater, elytris puncto postico hyalino albo. Ent. syst. 1. 166. 185. *
Elaphrus guttula. Illig. Col. Bor. 1. 229. 11.
Carabus riparius. Payk. Monogr. 91. 56.
 Oliv. Inf. 35. tab. 14. fig. 162.
 Habitat in Germania. Dom. Smidt

210. *C. alatus, niger, thoracis margine rufescente, fenestratus.*
 elytris truncatis, macula media fenestrata. Ent.
 syst. 4. Append. 443. 185. *
 Habitat in Germania. Dom. Schneider.
211. *C. alatus, coerulescenti-micans, elytris puncto smaragdulo-*
postico, antennis pedibusque testaceis. Ent. *lus.*
 syst. suppl. 60. 184. *
 Habitat in India orientali. Dom. Daldorff.
212. *C. alatus, ater, elytris striatis basi futuraque cruciger.*
ferrugineis. Ent. syst. suppl. 60. 185. *
 Habitat in Saxonia.
213. *C. alatus, capite thoraceque ferrugineis, ely-* *testaceus.*
tris testaceis. Ent. syst. 1. 166. 186. * Linn.
 syst. Nat. 2. 633. 37. Fn. 812.
 Geoff. Inf. 1. 153. 25.
 Habitat in Europae quisquiliis.
214. *C. alatus, thorace ferrugineo, elytris striatis truncatus.*
abbreviatis, nigris. Ent. syst. 1. 166. 187. *
 Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.
215. *C. alatus, thorace rufo, elytris abbreviatis, te-* *abbrevia-*
staceis. Ent. syst. 1. 167. 188. * *tus.*
Carabus abbreviatus. Col. Bor. 1. 205. 90.
 Panz. Fn. Germ. 36. tab. 2. III. 15
 Habitat in Norwagiae rupibus.
 Nullo modo Staphylinus caraboides huc pertinet.
216. *C. alatus aeneus, antennis pedibusque nigris, 2punctatus*
elytris punctis duobus impressis. Ent. syst. 1.
 167. 189. Linn. syst. Nat. 2. 672. 33. Fn. ...
 Sv. 806.
 Payk. Monogr. 99. 62.
Elaphrus 2punctatus. Illig. Col. Bor. 1. 228. 8.
 Oliv. Inf. 35. tab. 14. fig. 163.
 Habitat in Europae quisquiliis.

- celer.* 217. *C. alatus*, aeneus nitidus, pedibus ferrugineis.
Ent. syst. I. 167. 190. *
Habitat in Europae Museis.
- minutus.* 218. *C. alatus*, ater, elytris pedibusque piceis. I
17. 28. syst. I. 167. 191.
Habitat in arborum truncis Germaniae. D. Smid.
- pygmaeus.* 219. *C. alatus*, supra aeneus nitidus, subtus aeneus.
Ent. syst. I. 167. 192. *
Carabus rufipes. Payk. Monogr. 101. 63.
Elaphrus pygmaeus. Illig. Col. Bor. I. 229.
Oliv. Inf. 35. tab. 14. fig. 164.
Habitat in Germania. Dom. Smidt.
- tristis.* 220. *C. alatus niger*, pedibus rufis. Ent. syst. I. 193. *
Habitat in Germania. Dom. Smidt.
Varietatem e Suecia misit Dom. de Paykull e Suecia.
tristis piceis.
- fasciola.* 221. *C. alatus*, pallidus, elytris striatis: fascia
media fusca.
Habitat in America meridionali. Smidt. Mus. de Sehestedt.
Minutus. Caput ferrugineum. Thorax rotundus, marginatus, pallidus. Elytra pallida, fasciata in medio fusca.
- truncatellus.* 222. *C. alatus*, supra obscure aeneus, subtus aeneus, elytris obtusis. Ent. syst. I. 168. 194. *
Linn. syst. Nat. 2. 672. 43. Fn. Sv. 814.
VII. 14 Payk. Monogr. 98. 61.
Illig. Col. Bor. I. 206. 91.
Oliv. Inf. 35. tab. 13. fig. 159.
Habitat in Europae quisquiliis.
- minimus.* 223. *C. alatus*, ater, elytris striatis. Ent. syst. I. 168. 195. *
Habitat in Germania. Dom. Smidt.

34. CALOSOMA. *Palpi* sex inaequales,
anteriores brevissimi, capi-
 tati.
Labium breue, corneum, la-
 te emarginatum cum acu-
 mine.
Antennae setaceae.
1. C. apterum nigrum, elytris reticulato-friatis: striis, *alternans*.
alternis latioribus punctisque impressis aeneis
 triplici serie.
Carabus alternans. Ent. syst. I. 146. 98. *
 Habitat in Americae Infulis.
2. C. apterum nigrum, elytris crenato - friatis: striis *calidum*.
aequalibus punctisque aureis excavatis triplici
 serie.
Carabus calidus. Ent. syst. I. 147. 99. *
 Oliv. Inf. 35. tab. 4. fig. 45.
 Habitat in Americae Infulis. Dom. v. Rohr.
3. C. apterum atrum, elytris friatis apice granulatis. *porculatum*
Carabus porcatus. Ent. syst. I. 147. 101. *
 Habitat in noua Hollandia. Mus. Dom. Banks.
4. C. apterum atrum, elytris laeuissimis: punctis *indagator*.
aeneis triplici serie.

Cara-

Calosomatæ corpus oblongum, glabrum, agile, *capite* magno,
 ouato, mandibulis palpisque prominentibus, *oculis* globo-
 sis, prominulis, lateralibus, margine superiore parum dila-
 tato firmatis; *antennis* thorace longioribus, ante oculos
 insertis; *thorace* plano: marginibus rotundatis, postice
 truncato, elytris angustiore, scutello aut nullo aut paruo, . . .
 triangulari; *elytris* rigidis, longitudine abdominis: mar-
 gine haud inflexo, *pedibus* validis, cursoriis; *femoribus*
 compressis; *tibiis* incuruis: anticis apice spinosis; *tarsis*
 quinquearticulatis, colore nigro aut aeneo.

Carabus indagator. Ent. syst. 1. 149. 107.
Oliv. Inf. 35. tab. 8. fig. 88.
Habitat in Barbaria. Dom. Prof. Vahl.

sycophanta. 5. *C. alatum violaceum nitens, elytris striatis aure*
Carabus sycophanta. Ent. syst. 1. 149. 10
Linn. syst. Nat. 2. 670. 12. Mus. Lud. V.
95. Fn. Sv. 790.

Geoff. Inf. 1. 144. 5.

VII:10.

Illig. Col. Bor. 1. 141. 1.

Oliv. Inf. 35. 42. tab. 3. fig. 31.

Schaeff. Icon. tab. 66, fig. 6.

Reaum. Inf. 2. tab. 37. fig. 18.

Payk. Monogr. 63. 36.

Sulz. Hist. Inf. tab. 17. fig. 1.

Degeer Inf. 4. 105. 2. tab. 17. fig. 19.

Voet. Col. tab. 37. fig. 32.

Habitat in Europae syluis.

Larva nigra victitat Phalaenarum laruis.

sericeum. 6. *C. alatum atrum, thorace puncto baseos vtrinque in*
presso, elytris substriatis punctisque aeneis tri-
plici serie.

Carabus sericeus. Ent. syst. 1. 147. 100. *

Carabus auropunctatus. Payk. Monogr. 68. 4.

Illig. Col. Bor. 1. 142. 4.

Herbst. Arch. 5. 131. 15.

Roff. Fn. Etr. 1. tab. 1. fig. 3.

Oliv. Inf. 35. tab. 8. fig. 88.

Habitat in Germaniae fabuletis.

inquisitor. 7. *C. alatum, elytris viridi-aeneis: punctis tripli*
ordine.

Carabus inquisitor. Ent. syst. 1. 149. 104
Linn. syst. Nat. 2. 669. 11. Fn. Sv. 789.

Payk. Monogr. 65. 39.

Geoff. Inf. 1. 145. 6.

Degeer

Degeer Inf. 4. 94. 9.

Illig. Col. Bor. I. 142. 2.

Oliv. Inf. 35. 40. tab. I. fig. 3.

Voet. Col. tab. 38. fig. 39.

Habitat in Europae fyluis.

Variat elytris aeneis et nigris,

8. *C. alatum*, elytris striatis viridibus: punctis triplici *scrutator*.
serie, thorace cyaneo: margine reflexo aurato.

Carabus scrutator. Ent. syst. I. 149. 110. *

Oliv. Inf. 35. tab. 3. fig. 32.

Habitat in Virginia. Mus. D. Banks.

9. *C. alatum nigrum*, elytris reticulatis viridi - aeneis, *reticulatum*
thoracis margine virescente.

* *Carabus reticulatus*. Ent. syst. I. 150. 111. *

Illig. Col. Bor. I. 143. 5.

VII. II.

Oliv. Inf. 35. 42. tab. 12. fig. 184.

Habitat in Germania. Mus. Dom. Zschuck.

Variat corpore toto nigricante.

Os maxillis palisque. *Palpi* sex inaequales: *anteriores* brevissimi, biarticulati: articulo secundo longiori, apice rotundato, clauato adhaerentes *maxillae* dorso, *intermedii* longiores, porrecti, quadriarticulati: articulo secundo longissimo, ultimo breui, truncato, ad basin anteriorum inferti, *posteriores* vix breuiores, triarticulati: articulo secundo longiori, ultimo truncato, adnati ligulae basi superiori. *Mandibula* magna, cornea, fornicata, obtusiuscula, edentula, exserta, tegens. *Maxilla* brevis, cornea, intus ciliata, apice vnguiculata. *Ligula* brevis, transuersa, truncata, integra. *Labium* breue, corneum, transuersum, late emarginatum cum acumine. *Antennae* setaceae: articulo secundo longiore.

10. C.

longicornis 10. *C. alatum nigrum*, capite thoraceque punctat
elytris crenato-friatis, antennis pedibusq
ferrugineis.

Carabus longicornis. Ent. syst. I. 150. 112.

Habitat in Marocco. Dom. Schousboe. Mus.
de Sehestedt.

35. GALERITA. *Palpi* sex, articulo ultimo cra
fiori, oblique truncato.

Ligula membranacea, int
palpos acuminata, vtri
que seta subulata suffulta

Antennae setaceae.

Americana 1. *G. nigra*, thorace ferrugineo, elytris cyaneis.

Carabus Americanus Ent. syst. I. 136. 50.

Carabus lanus. Ent. syst. I. 136. 51. *

Oliv. Inf. 35. tab. 6. fig. 72.

Dégeer Inf. 4. 107. 3. tab. 17. fig. 21.

Habitat in America.

attelaboi- 2. *G. pilosa atra*, elytris fulcatis truncatis, alis nulli

des.

Carabus attelaboides. Ent. syst. I. 132. 35.

Oliv. Inf. 35. tab. 6. fig. 70.

Habitat in India. Mus. Dom. Banks.

hirta.

3. *G. alata hirta atra*, elytris fulcatis,

Hab

Galeritae corpus oblongum, planum, depressum, glabrum
immarginatum, agile; *capita* ovato, exserto, *mandibul*
palpisque prominentibus, *oculis* globosis, lateralibus; *an*
tennis thorace longioribus ad basin mandibularum inse
tis; *thorace* plano, cordato, elytris angustiore; *scuteli*
saepius nullo; *elytris* planis longitudine elytrorum, ma
gine haud deflexo; *pedibus* validis, cursoriis; *femoribu*
subcompressis; *tibiis* anticis apice spinosis; *tarsis* omniu
quinquearticulatis, colore nigro, obscuro.

Habitat Tranquebariae. Dom. Daldorff. Mus. D. Lund.

Statura et magnitudo fere praecedentis. Caput punctatum, atrum, antennis brevibus crassiusculis, piceis. Thorax cordatus, hirtus, punctatus, medio canaliculatus. Elytra subabbreviata, sulcata, pilis cinereis hirta, atra. Corpus atrum.

Character generis e *G. Americana* desumptus.

O. maxillis palpisque. *Palpi* sex inaequales: *anteriores* breviores, biarticulati: articulo secundo extrorsum crassiori, obtuso, incurvo, adhaerentes maxillae dorso, *intermedii* longiores, quadriarticulati: articulo secundo longiori, quarto brevi, oblique truncato, adnati basi anteriorum, *posteriores* triarticulati: articulo secundo longiori, ultimo brevi, oblique truncato, adhaerentes ligulae basi superiori. *Mandibula* brevis, cornea, compressa, fornicata, apice acuminata, edentula. *Maxilla* brevis, membranacea, compressa, intus ciliata, apice unguiculata. *Ligula* brevis, membranacea, inter palpos acuminata, utrinque seta brevi, subulata suffulta. *Labium* corneum, trifidum: laciniis lateralibus multo longioribus: lateribus rotundatis, intermedia breviori, bifida. Antennae setaceae.

4. *G. alata*, thorace rufo, coleoptris fuscis: maculis tribus rufis. *olens*.

Carabus olens. Ent. syst. 1. 139. 66. *

Carabus olens. Ross. Fn. Etr. tab. 5. fig. 2.

Habitat in Italia. Mus. Dom. Bosc.

5. *G. alata*, punctata nigra, thorace sulcato.

Carabus depressus. Ent. syst. suppl. 56. 89. *

Habitat in India orientali. Dom. Daldorff.

depressa.

6. *G.*

- plana.* 6. *G. alata*, punctata nigra, coleoptrorum disco ru
Habita in India orientali. Dom. Daldorff. M
D. de Sehestedt.
Statura omnino depressa praecedentis, at du
fere minor. Antennae obscure ferrugineae,
ticulo primo multo longiori, incurvo, nig
Caput punctatum, nigrum, mandibulis magr
exsertis, arcuatis. Thorax postice angustat
subfulcatus, punctatus, niger. Coleoptra pu
ctata, rufa, margine omni nigro.
- flesus.* 7. *G. alata*, punctata nigra, elytris margine rufo.
Habitat in India orientali. Dom. Daldorff. M
D. Lund.
Affinis certe praecedenti, at paullo minor et
leoptra rufa, disco nigro.
- bufo.* 8. *G. alata* nigra, thorace rugoso, elytris striatis, p
dibus rufis.
Habitat in Tangier. D. Schousboe. Mus. D.
Sehestedt.
Statura depressa praecedentium. Caput magnu
planum, nigrum, ore subrufescente. Antenn
apice rufescentes. Thorax postice rotundatu
frigis latis impressis rugosus, parum mar
natus. Elytra plana, striata, nigra. Pedes ru
- fasciolatus.* 9. *G. nigra*, elytrorum vitta abbreviata, abdomi
pedibusque ferrugineis.
Carabus fasciolatus. Ross. Fn. Etr. 1.
Oliv. Inf. 35. tab. 13. fig. 155.
Habitat in Italia. Mus. Dom. de Sehestedt.
Affinis *G. fleso*, at minor. Caput porrectum, p
bescens, nigrum, antennis piceis. Thorax p
fice attenuatus, pubescens, niger. Elytra a
breuiata, striata, nigra: vitta lata, abbrevia
ferruginea. Abdomen et pedes ferruginei.

36. BRACHINVS. *Palpi* sex: articulo ultimo
ouato, obtuso.

Ligula truncata, tridentata.

Labium corneum, emarginatum.

Antennae setaceae.

1. B. niger, capite elytrorumque puncto baseos, fasciaque media ferrugineis. *amaculatus*

Carabus amaculatus. Ent. syst. 1. 145. 91.

Linn. Mant. 532. Voet. Col. 2. tab. 34. fig.

10. 11.

Oliv. Inf. 35. tab. 2. fig. 16.

Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 5.

Carabus hilaris. Ent. syst. suppl. 56. 92. * nullo modo differt.

Habitat in India orientali.

2. B. flavescens, elytris fasciis duabus nigris.

complanatus.

Carabus complanatus. Ent. syst. 1. 144. 90. *

tus.

Linn. Syst. Nat. 2. 671. 17.

Habitat in Insula St. Domingo.

Praecedenti nimis affinis, quamvis colore differt.

3. B. ater, thoracis margine antice elytrorumque annulo baseos flavescentibus.

Habitat Tranquebariae. Mus. Dom. Lund.

Affinis

Brachini corpus medium, oblongum, glabrum, immarginatum, agile, capite magno, ouato, palpis mandibulisque prominentibus; oculis globosis, lateralibus, antennis thorace longioribus: articulis subaequalibus ante oculos insertis; thorace postice angustato vix latitudine elytrorum; scutello plerumque nullo; elytris rigidis, truncatis, abdomine brevioribus, margine haud inflexo; pedibus cursoriis, tibiis anticis ante apicem sinuato-spinosis; femoribus posticis fulcatis; tarsis quinquearticulatis; colore nigro aut ferrugineo.

Affinis *B. bimaculato*. Caput flavescens vertice nigro. Thorax niger, margine antice flavescente. Elytra striata, abbreviata nigra, marginuloque baseos ovali flavescentibus. Pedes flavi.

fulminans. 4. *B. niger*, thorace rufo bimaculato, elytris striatis: puncto baseos strigaeque media abbreviata flexuosa flavis.

Habitat in Guinea. Mus. Dom. Lund.

Statura omnino praecedentium. Antennae flavescentes. Caput nigrum, ore maculaque frontis flavis, pone oculos rufum. Oculi magni, globosi, albi. Thorax niger vtrinque macula nigra, oblonga, rufa. Elytra striata, nigra macula parva baseos strigaeque abbreviata, medio valde angulata flavis. Corpus nigrum. Pedes flavi geniculis nigris.

nigripennis 5. *B. rufus*, elytris fulcatis atris.
Carabus nigripennis. Ent. syst. 4. App. 44
81. *

Voet. Col. tab. 36. fig. 28.

Habitat ad Cap. Bon. Spei.

tripustulatus. 6. *B. niger*, elytris, maculis duabus pedibusque flavis.

Carabus tripustulatus. Ent. syst. 1. 145. 92

Habitat in Siam. Mus. D. Banks.

mutilatus. 7. *B. ater*, antennis pedibusque ferrugineis, a nullis.

VIII. II.

Habitat in Austria. Dom. de Meyerle.

Statura et magnitudo omnino *B. 2maculati*. Caput nigrum ore antennisque ferrugineis. Thorax postice attenuatus, vix punctatus, obscurus niger. Elytra abbreviata, truncata, striata, 1

g

gra, litura parua obsoleta baseos ferruginea.
Corpus nigrum pedibus ferrugineis.

8. *B. ater*, elytris fulcatis, antennis ferrugineis basi *piger*.
nigris.

Habitat in India orientali. Dom. Daldorff. Mus.
D. de Sehestedt.

Paullo minor *B. tripustulato*. Antennae articulis
tribus baseos nigris. Thorax canaliculatus, pos-
tice attenuatus, niger. Elytra fulcata, nigra,
obscura.

9. *B. ater*, thorace elytrorum futura rufa, elytris *histris*.
fasciis duabus albis.

Habitat in India orientali. Dom. Daldorff. Mus.
Dom. Lund.

Minutus. Caput nigrum, vertice rufo. Antennae
nigrae, basi rufae. Thorax postice attenuatus,
rufus, immaculatus. Elytra laevia, atra: fu-
tura late rufa, fasciisque duabus albis, quae ta-
men futuram rufam haud attingunt. Femora
postica fascia alba.

10. *B. holosericeus niger*, capite pedibusque ferru- *ruficeps*.
gineis.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Dom. Lund.

Statura et magnitudo *B. fumantis*. Caput cum
antennis ferrugineum. Thorax cordatus pube
breui, ferruginea. Elytra pubescentia substriata.
Corpus nigrum pedibus ferrugineis.

11. *B. ferrugineus*, elytris nigro-cyaneis. *fumans*.

Carabus fumans. Ent. syst. 1. 136. 52. *

Habitat in America. Mus. D. Blackburn.

12. *B. capite*, thorace pedibusque ferrugineis, ely- *crepitans*.
tris nigris.

Carabus crepitans. Ent. syst. 1. 136. 53. Linn.

syst. Nat. 2. 671. 18. Fn. Sv. 272.

III. II.
Geoff.

Geoff. Inf. 1. 151. 19.

Payk. Monogr. 107. 66.

Schaeff. Icon. tab. 11. fig. 13.

Degeer. Inf. 4. 103. 22. tab. 3. fig. 18.

Illig. Col. Bor. 1. 209. 94.

Panz. Fn. Germ. 30. tab. 5.

Oliv. Inf. 35. tab. 4. fig. 35.

Habitat in Europae nemoribus.

Terrefactus crepitu ani hostem pellere tentat.

sclopetata.

13. *B. ferrugineus*, elytris cyaneis: futura ba
ferruginea.

Carabus sclopetata. Ent. syst. 1. 136. 54. *

Habitat Parisiis frequens sub lapidibus.

37. ANTHIA. *Palpi* sex: articulo ultimo
lindrico, obtuso.

Ligula porrecta, cornea, fca
cata, integra.

Antennae setaceae.

maxillofa. 1. *A. atra*, mandibulis exsertis longitudine ca
thorace postice producto bilobo.

Carabus maxillofus. Ent. syst. 1. 124. 1.

Oliv. Inf. 35. tab. 8. fig. 90. tab. 4. fig. 39.

Thunb. spec. nou. Inf. 3. 69.

Anthiae corpus magnum, glabrum, oblongum, imma
tum, agile, *capite* magno, ovato, plano, clypeo, poi
rotundato, integro, *oculis* magnis, globosis, margine
riori, prominulo firmatis; *antennis* thorace longio
articulo primo crassiori, in fovea ante oculos in
thorace plano, postice attenuato, elytris angustiore; /
nullo; *elytris* saepius conuatis, rigidis, longitudine
minis: margine vix inflexo; *pedibus* cursoriis; *sem*
compressis; *tibiis* fulcatis: anticis ante apicem sp
tarsis quinquearticulatis, colore atro, obscuro.

Voet. Col. 2. tab. 39. fig. 47. 48.

Herbst. Arch. tab. 47. fig. 3.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Dom. Banks.

2. *A. atra*, thoracé postice producto, bilobo, lateri-thoracica,
bus elytrorumque marginibus albo-villosis.

Carabus thoracicus. Ent. syst. 1. 124. 2. *

Thunb. nou. sp. Inf. 3. 69. fig. 82.

Oliv. Inf. 35. tab. 1. fig. 5.

tab. 10. fig. 5. 6.

Herbst. Arch. tab. 47. fig. 12.

Habitat ad Cap. Bon. Spei.

3. *A. atra*, coleoptris nouem sulcatis punctisque de-roguttata,
cem albis.

Carabus roguttatus. Ent. syst. 1. 141. 74.

Linn. syst. Nat. 2. 669. 10. Mus. Lud. Vlr. 96.

Carabus alboguttatus. Degeer. Inf. 47. 624.

21. tab. 46. fig. 15.

Oliv. Inf. 35. tab. 9. fig. 15.

Wulf. Inf. Cap. tab. 1. fig. 13.

Voet. Col. 2. tab. 39. fig. 46.

Habitat ad Cap. Bon. Spei.

4. *nigra*, elytris laeuis: punctis duobus griseis. 6guttata.

Carabus 6guttatus. Ent. syst. 1. 141. 75. *

Thunb. nou. sp. Inf. 3. 70. fig. 84.

Oliv. Inf. 35. tab. 1. fig. 6.

Habitat in India. Mus. Dom. Banks.

Os maxillis palpisque. Palpi sex, inaequales, fili-
formes, anteriores breuiores, biarticulati: ar-
ticulo secundo longiori, cylindrico, incuruo,
obtusio, adhaerentes maxillae dorso, intermedii
longiores, quadriarticulati: articulo primo bre-
uissimo, secundo longiori, ultimo ovato, obtu-
so, basi anteriorum adnati, posteriores triarti-
culati: articulo primo breuissimo, secundo lon-
giori,

giori, crassiori, ciliato, tertio breviori, lindrigo, incuruo, obtuso; adnati ligulae superiori. *Mandibula* porrecta, cornea, cuata, intus bidentata, acuta. *Maxilla* integra, cornea, compressa, intus ciliata, apice cuata, acutissima. *Ligula* porrecta, corni longitudine articuli secundi palporum posteriorum, linguaeformis, plana, fornicata, appropria parua incrassata, rotundata, integra. *Labium* latum, transversum, corneum, late emarginatum ad insertionem ligulae palporumque: ciliis margine exteriori rotundato. Antennae setosae.

- Venator.* 5. *A. atra*, elytris laevibus: macula basalis grisea.
Carabus Venator. Ent. syst. 1. 141. 76. •
 Oliv. Inf. 35. tab. 10. fig. 116.
 Habitat in Senegalia. Mus. Dom. Olivier.
- fulcata.* 6. *A. atra*, thoracis margine albo, elytris fulcatis, margine maculisque tribus albis.
Carabus fulcatus. Ent. syst. 1. 141. 77. •
 Oliv. Inf. 35. tab. 8. fig. 97.
 Habitat in Senegalia. Mus. D. Olivier.
- 6maculata.* 7. *A. atra*, thoracis margine albo, elytris substriatis, maculis tribus albis.
Carabus 6maculatus. Ent. syst. 1. 141. 78.
 Habitat in Barbaria. Dom. Prof. Vahl.
- 7guttata.* 8. *A. atra*, supra fusca, coleoptris striatis: punctis septem albis.
Carabus 7guttatus. Ent. syst. 4. App. 442. 78.
 Habitat ad Cap. Bon. Spei. Dom. de Paykull.
- Nimrod.* 9. *A. atra*, elytris fulcatis: maculis duabus griseis remotis.
Carabus Nimrod. Ent. syst. 1. 142. 79. •

Oliv. Inf. 35. tab. 10. fig. 117.

Habitat in Senegallia. Mus. D. Olivier.

10. *A. nigra*, elytris fulcatis: maculis duabus gri- 4guttata.
feis remotis.

Carabus 4guttatus. Ent. syst. 1. 142. 80. *

Oliv. Inf. 35. tab. 2. fig. 15.

Herbst. Arch. tab. 29. fig. 1.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Dom. Banks.

11. *A. atra*, elytris rugoso-fulcatis.

Carabus tabidus. Ent. syst. 1. 142. 81. *

Oliv. Inf. 35. tab. 2. fig. 17.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Dom. Banks.

tabida.

12. *A. atra*, capitis clypeo porrecto rotundato, ely- umbracu-
tris fulcatis. lata.

Habitat in Guinea. Mus. Dom. Lund.

Statura omnino praecedentis paullo maior. Antennae crassae, nigrae, articulis subcompressis.

Caput magnum, punctatum, atrum, labio valde porrecto, rotundato, laevi, mandibulas tegente.

Thorax punctatus. Elytra fulcata, sulcis laevibus.

13. *A. elytris planis laevibus: margine sinuato pun-* variegata.
ctisque disci albis.

Carabus variegatus. Ent. syst. 1. 143. 82. *

Cicindela Forfk. Icon. tab. 24. fig. A.

Habitat in Oriente. Mus. D. Lund.

14. *A. thorace margine albo, elytris margine stria exclamatio-*
lineola punctoque medio albis. nis.

Carabus exclamationis. Ent. syst. 1. 143. 83. *

Habitat in Barbaria. Mus. Dom. Desfontaines.

15. *A. atra*, thoracis marginibus albis, elytris albi- trilineata.
dis: futura lineaque albis.

Carabus trilineatus. Ent. syst. 1. 143. 84. *

Oliv.

Oliv. Inf. 35. tab. 9. fig. 101.

Thunb. nou. spec. Inf. 3. 71. fig. 85.

Herbst. Arch. tab. 47. fig. 6.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Dom. Banks.

obsoleta.

16. *A. atra*, elytris planis: vittis quatuor villosis cinereis.

Carabus villosus. Oliv. Inf. 35. tab. 5. fig. 6.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. de Sehestedt.

Statura omnino *A. trilineatae*, at paullo minor.

Caput et thorax nigra cinereo-villosa. Elytra connata, plana, vittis quatuor cinereo-villosis postice coeuntibus. Corpus atrum.

38. AGRA. *Palpi sex.*

posteriores longiores, securiformes.

Antennae setaceae.

agras.

1. *A. obscure aenea*, thorace punctato, elytris dentatis rugosis.

Habitat in America meridionali. Mus. Dom. de Sehestedt.

Corpus magnum, angustatum. Caput magnum ovatum, exsertum, laeve, aeneum, obscurum. Antennis obscure rufis. Thorax elongatus, cylindricus.

Agrae corpus elongatum, immarginatum, glabrum, apice capite magno, exserto, ovato, plano; palpis porrectis oculis prominulis; globosis, lateralibus; antennis thoracis longioribus: articulis cylindricis, primo longiore, mandibularum basin insertis; thorace elongato, cylindrico antice parum angustato; scutello parvo triangulari; elytrorum longitudine abdominis, ricidis: margine, haud inflexo pedibus elongatis, cursoriis; tibiis anticis ante apicem vix spinosis; tarsis quinquearticulatis: articulo penultimo lano; colore obscure nitido.

lindricus, antice parum angustatus, punctatus vel potius variolosus, aeneus, obscure nitidus. Elytra rugosa, obscure aenea, nitidula. Corpus atro-aeneum, pedibus obscure-rufis.

Varietas duplo fere minor mas videtur.

Os maxillis palpisque. *Palpi* sex inaequales; *anteriores* breuiore, filiformes, biarticulati, articulo ultimo cylindrico, obtuso adhaerentes maxillae dorso; *intermedii* paullo longiores, quadriarticulati: articulis aequalibus, cylindricis, ultimo cylindrico obtuso, basi anteriorum adnati; *posteriores* longiores, securiformes, triarticulati, articulo primo breui, rotundato, secundo longo, cylindrico, tertio magno securiformi, adnati ligulae basi superiori. *Mandibula* arcuata, cornea, acuta, edentula. *Maxilla* brevis, intus ciliata. *Ligula* porrecta, quadrata membranacea integra. *Labium* corneum, transuersum, tridentatum. *Antennae* setaceae.

2. A. nigra, thorace varioloso, elytris striatis, an-rufipes. tennis pedibusque rufis.

Habitat in America meridionali. Mus. D. Lund.

Statura omnino praecedentis, at duplo minor.

Caput laeue, nigrum, nitidum. Thorax cylindricus, niger. Elytra striata, apice bidentata.

Corpus nigrum, pedibus rufis.

3. A. thorace elongato cylindrico, rugosa nigra, attelaboides. elytris apice spinosis, pedibus rufis.

Cicindela attelaboidis. Ent. syst. 4. 443. 2.

Habitat in India orientali.

Praecedenti affinis videtur, an satis distincta.

39. COLLYRIS. *Palpi sex,*
posteriores pilosi, articu-
ultimo oblique tru-
cato.

Labium breue late emar-
natum.

Antennae filiformes.

longicollis. 1. *C. cyanea, femoribus ferrugineis, elytris punc-*
tis apice emarginatis.

Cicindela longicollis. Ent. syst. 1. 168. 1. °

Collyris Latreille.

Oliv. Inf. 33. tab. 2. fig. 17.

H bitat in Siam. Mus. Dom. Banks.

Duplo minorem ex India misit D. Daldorff,
vix distinctam.

aptera.

2. *C. atra, femoribus ferrugineis, elytris connatis*
medio rugosis.

Cicindela aptera. Ent. syst. 1. 169. 2.

Cicindela aptera. Lund. Act. Hist. Nat. S.
Havn. 1. tab. 5.

Habitat in India orientali. Dom. Lund.

formicaria. 3. *C. atra, elytris basi variolosis: fascia abbrevi-*
alba.

Habitat in America meridionali. Smidt. Mus.
de Sehestedt. Pr

Collyridis corpus elongatum, subfiliforme, inmarginatum, f
brum, agile; *sapite* exserto, fronte retusa, ovato, *ely*
magno, porrecto, fornicato, apice rotundato, denticula
oculis magnis, globosis, prominentibus; *antennis* longi
dine thoracis, in cantho oculorum insertis; *thorace* cyl
drico, elongato, antice parum angustato; *scutello* mini
triangulari aut nullo; *elytris* rigidis, longitudine ab
minis margine haud inflexo; *pedibus* longiusculis, c
fortis, tenuibus; *tarsis* quadriarticulatis, colore nitido
gro aut coeruleo.

Præcedente paullo minor. Caput atrum, antennis fuscis. Thorax rotundatus, elongatus, laevis, ater, in medio parum gibbus. Elytra nigra, basi variolosa, fascia obliqua, abbreviata, alba, apice laevis, emarginata. Pedes obscure picei.

Character generis a C. longicollis desumtus.

*O*s maxillis palisque. *Palpi* sex inaequales: *anteriores* breues, triarticulati: articulis subaequalibus; ultimo cylindrico, subincuruo, obtuso adhaerentes maxillae dorso; *intermedii* longiores, quadriarticulati: articulo primo breuissimo, secundo longissimo, obconico, tertio breui, apice parum prominulo, ultimo breui, cylindrico, obtuso, adnati basi anteriorum; *posteriores* longitudine intermediorum, triarticulati: articulo primo secundoque longioribus, cylindricis, pilosis, tertio breuiori, crassiori, nudo oblique truncato, adnati ligulae basi superiori. *Mandibula* tenuis, cornea, arcuata, acutissima, basi dilatata, denticulata. *Maxilla* brevis, cornea, intus ciliata. *Ligula* membranacea, bifida: laciniis elongatis, angustis, apice rotundatis. *Labium* breue, corneum, fere ad basin emarginatum: laciniis subulatis, acutis. *Antennae* filiformes, vix extrorsum crassiores: articulo primo maiori.

40. ODACANTHA. *Palpi* sex filiformes.
Maxilla arcuata, spino
Ligula brevis integra.
Antennae setaceae.

melanura. 1. O. thorace cyaneo, elytris testaceis apice nigri
Odacantha melanura. Payk. Fn. Sv. 1. 169
Attelabus melanurus. Linn. syst. Nat. 2. 620.
Cicindela angustata. Ent. syst. 1. 169. 3.
Carabus angustatus. Oliv. Inf. 35. tab. 1. fig.
 Illig. Col. Bor. 1. 209. 93.

I. 16. Panz. Fn. Germ. tab. 1.
 Habitat in Europa boreali.

Os maxillis palpisque. *Palpi* sex inaequales, g
 bri, filiformes: *anteriores* breviores, biar
 culati; articulo ultimo apice acuminato, max
 lae dorso adhaerentes, *intermedii* longior
 quadriarticulati: articulo ultimo obtuso, fe
 truncato adnati basi anteriorum, *posterior*
 triarticulati: articulo ultimo obtuso, trunca
 ligulae lateribus inserti. *Mandibula* cras
 cornea, arcuata, acuta, edentula. *Maxi*
 elongata, cornea, acuta: spinis plurimis lo
 gioribus, retrorsum arcuatis armata. *Ligu*
 brevis membranacea, truncata, integra. *L*
bium corneum, transversum, trifidum, lacin
 rotundatis, obtusis. 2.

Odacanthae corpus paruum, oblongum, immarginatum, ag
 capite magno, exserto, thorace latiore, *clypeo* porrec
 submarginato, *oculis* magnis, globosis, prominulis, la
 ralibus, *antennis* longitudine fere corporis: articulo 1
 mo longiori, subclauato, ad basin mandibularum insert
thorace cylindrico, capite elytrisque angustiore; *scutu*
 minuto; *elytris* vix longitudine abdominis, rigidis, tri
 catis; margine haud inflexo; *pedibus* longiusculis, ten
 bus, cursoriis; *tarsis* quinquearticulatis, colore vario,
 tido.

2. *O. pallida*, elytris fasciis duabus atris. *2fasciata.*
 Habitat in America meridionali. Mus. Dom. de Sehestedt.
 Statura parva praecedentis. Caput et thorax pallide testacea. Elytra striata, flava, fasciis duabus latis, atris, altera baseos, altera pone medium, quae tamen marginem haud attingit.
3. *O. rufa*, capite elytrorumque fasciis duabus cyanoneis. *cyanoccephala.*
Cicindela cyanocephala. Ent. syst. suppl. 60. *
 Habitat in India. Mus. D. Lund.
4. *O. atra*, coleoptris maculis duabus baseos fasciaque media ferrugineis. *3pustulata.*
Cicindela 3pustulata. Ent. syst. 1. 169. 4. *
 Habitat Parisiis. Dom. Tigny.
5. *O. nigra*, elytrorum fasciis duabus pedibusque flavescentibus. *elongata.*
 Habitat in America meridionali. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.
 Parva. Caput atrum, antennis fuscis. Thorax elongatus, cylindricus, ater, immaculatus. Elytra striata, nigra fasciis duabus flavis, quarum posterior ad futuram vsque ad apicem excurrit. Pedes flavi.
6. *O. nigra*, elytris striatis testaceis: futura late nigra. *dorsalis.*
 Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.
 Paullo minor *O. angustata.* Antennae testaceae. Caput atrum, nitidum, immaculatum, thorace latius. Thorax cylindricus, obscure ferrugineus. Elytra striata, testacea, futura late nigra, qui color apicem tamen haud attingit. Corpus nigrum pedibus testaceis.

41. DRYPTA. *Palpi* sex inaequales: *posteriores* quatuor, articulo ultimo, crassiori, ovato compresso.

Ligula filiformis integra, angustissima.

Antennae filiformes.

emarginata I. D. coerulea, ore, antennis pedibusque rufis, elytris apice emarginatis.

Cicindela emarginata. Ent. syst. I. 177. 37

Carabus dentatus. Ross. Fn. Etr. I. 222. 55
tab. 2. fig. 11.

III. 21. Habitat in Gallia. Mus. Dom. Bosc.

Characterem generis Entomologo Gallorum octavo latissimo Dom. Latreille debeo.

Oscula maxillis palpisque. *Palpi* sex inaequales, *anteriores* maxillae longitudine, filiformes: articuli articulis aequalibus, cylindricis haerentes maxillae dorso; *intermedii* longiores, quadriarticulati: articulo secundo longissimo, ultimo crassiori, ovato, compresso, inferius anteriorum basi; *posteriores* triarticulati: articulo ultimo, crassiori, ovato, compresso, inferius nati ligulae basi exteriori. *Mandibula* cornu arcu

Dryptae corpus paruum, glabrum, immarginatum, agile, epite exserto; latitudine thoracis, antice angustato, palpis maxillisque prominentibus; *clypeo* rotundato, integro; *oculis* magnis, globosis, prominulis, lateralibus; *antennis* thorace longioribus: articulo primo longissimo, reliquis aequalibus, cylindricis, ad mandibularum basia inferius *thorace* cylindrico, elytris angustiore; *scutello* nullo; *elytris* rigidis, abdomine paulo brevioribus, apice truncato margine haud deflexo; *pedibus* longissimis, cursoriis; *articulis* omnibus quadriarticulatis: articulo ultimo bilobo, color vario.

arcuata, acuta. *Maxilla* recta, cornea, intus ciliata, apice attenuata, incurua, acutissima. *Ligula* porrecta, membranacea, tenuissima, inter palpos prominens, filiformis, integra. *Labium* corneum, transuersum, trifidum: lacinis subaequalibus, acutis. *Antennae* filiformes: articulo primo longissimo.

2. D. ferruginea, elytrorum futura abbreviata fusca, *cylindricollis*: abdomine atro.

Cicindela cylindricollis. Ent. syst. suppl. 63. 37. *

Habitat in Marocco. Dom. Schousboe.

Statura et magnitudo omnino praecedentis.

42. CICINDELA. *Palpi* sex filiformes: *posteriores* pilosi. *Labium* corneum, tridentatum.

1. C. nigra, elytris acuminatis: maculis tribus *al-glossa*.
bis. Ent. syst. 1. 170. 5. *

Oliv. Inf. 33. tab. 2. fig. 23.

Hybn. Naturf. 24. 48. 14. tab. 2. fig. 18.

Habitat in Coromandel. Mus. Dom. Banks.

2. C.

Cicindelae corpus oblongum, glabrum, immarginatum, agile, *capite* thorace latiori, exserto, oblongo; *clypeo* magno, transuerso, interdum deutate; *palpis mandibulisque* dentatis prominentibus; *oculis* globosis, prominulis, lateralibus; *antennis* thorace longioribus, ante oculos insertis; *thorace* breui, cylindrico, cruce impresso, elytris angustiore; *scutello* paruo, rotundato; *elytris* rigidis, haud deflexis, longitudine abdominis; *pedibus* elongatis, tenuibus, cursoriis; *tarsis* quinquarticulatis, *colore* vario.

- Aeros.* 2. *C. obscure aenea*, elytris fuscis: margine tririmo lineisque duabus ad futuram albis.
 Habitat in maris pacifici Insulis. Dom. Billardier Magna in hoc genere. Antennae defunt. Caput fuscum, labio testaceo mandibulisque atris.
 Thorax rotundatus, aeneo obscure nitens. Elytra obscura, margine pallido, dentem antemedium, ramum flexuosum in medio, et dentem pone medium emittente. Praeterea antennis ad futuram lineolae duae. Corpus et pedes obscura, aeneo-nitida.
- labiata.* 3. *C. cyanea nitida*, ore, antennis, pedibus abdomineque rufis.
 Habitat in Oceani pacifici Insulis. D. Billardier Magna. Caput magnum, cyaneum, fronte in medio inter antennis prominente. Clypeus porrectus, apice crenato-dentatus, rufus: macula basos atra.
 Thorax cyaneus, immaculatus. Elytra punctata cyanea, immaculata. Abdomen obscure rufum. Pedes rufi.
- violacea.* 4. *C. cyanea nitida*, labio niueo.
 Habitat in Carolina. Mus. Dom. Bosc.
 Media. Corpus totum punctis elevatis scabrum cyaneum, nitidum. Antennae apice fuscae. Labium mandibulaeque basis supra niuea.
- cyanea.* 5. *C. cyanea nitida*, ore testaceo. Ent. syst. x. 170. 6. *
 Habitat in India orientali. Dom. Vahl.
- megalocéphala.* 6. *C. nigro-aenea*, elytris punctato-friatis, ore antennis pedibusque testaceis. Ent. syst. 170. 7. *
 Oliv. Inf. 33. tab. 2. fig. 12.
 Habitat in Senegallia. Mus. D. Geoffroy.

C. aenea, nitida, ore, antennis pedibusque testaceis. Ent. syst. 1. 177. 35.

Cicindela Virginica. Linn. syst. Nat. 2. 65. 75.

Oliv. Inf. 33. tab. 3. fig. 26.

Habitat in Carolina.

C. viridis nitida, elytrorum apicibus, ore, antennis pedibusque flavis. Ent. syst. 1. 177. 34. Carolina.

Cicindela Carolinae. Linn. syst. Nat. 2. 657. 6.

Oliv. Inf. 33. tab. 2. fig. 22.

Degeer Inf. 4. 120. 2. tab. 17. fig. 24.

Hvbn. Naturf. 24. 53. 17. tab. 2. fig. 21.

Habitat in Carolina.

C. punctata nigra, obscura, immaculata. Sepulchralis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.

D. de Sehestedt.

Statura crassa *C. Carolinae*, at duplo fere minor.

Caput nigrum, obscurum, labio concolore oculisque globosis, testaceis. Thorax rotundatus, vix canaliculatus. Elytra valde punctata, obscura. Corpus nigrum, cyaneo-parum nitidum.

C. viridis, nitida, elytris obscure cyaneis, immaculatis, abdominis margine testaceo. Ent. syst. 1. 170. 8. bicolor.

Habitat in India orientali. Mus. Dom. Banks.

C. viridis, elytris punctis quinque albis. Ent. campestris.
syst. 1. 170. 9.

Cicindela campestris. Linn. syst. Nat. 2. 657. 1.

Fn. Sv. 746.

Geoff. Inf. 1. 153. 27.

Oliv. Inf. 33. tab. 1. fig. 3.

Schaeff. Icon. tab. 34. fig. 8. 9.

tab. 228. fig. 3.

Illig. Col. Bor. 1. 220. 3.

Degeer Inf. 4. tab. 4. fig. 1.

Sulz.

Sulz. Inf. tab. 5. fig. 37.

Habitat in Europae campis arenosis celerrime
sitans Insectorum Leo.

Larva mollis, alba, capite pedibusque fex fe
gineis, foueam magnitudine corporis in t
excauat, in qua latens infecta arripit.

Maroccana 12. *C. viridis, purpureo-maculata*, elytris pun
quinque albis.

Habitat in Marocco. Mus. D. de Sehestedt.

Statura omnino et magnitudo *C. campestris*.
Tennae fuscae, basi cupreae. Caput viride la
albo, vertice impresso: maculis quatuor int
dum confluentibus cupreis. Thorax viri
maculis duabus magnis dorsalibus et marg
subtus purpureis. Elytra viridia, maculis p
pureis, et in his puncta quinque alba. Ab
men cupreum.

hybrida. 13. *C. subpurpurascens*, elytris fascia lunulise
duabus albis, corpore aureo nitido. Ent. f
I. 171. 10.

Cicindela hybrida. Linn. syst. Nat. 2. 657.
Fn. Sv. 747.

-VIII. 12

Oliv. Inf. 33. tab. 1. fig. 7.

Degeer Inf. 4. 115. 3. tab. 4. fig. 8.

Schaeff. Icon. tab. 35. fig. 10.

Illig. Col. Bor. 1. 49. 2.

Voet. Col. tab. 39. fig. 1.

tab. 40. fig. 3.

Habitat in Europa boreali.

finuata. 14. *C. hirta, viridi-aenea*, elytris fascia lunulise
duabus albis.

Cicindela finuata. Panz. Fn. Germ. tab.

I. 17.

Habitat in Germania australiori.

Affinis certe *C. hybridae*, at duplo minor. Cap
viridi-aeneum labio albo. Thorax aeneus,

bo-hirtus. Elytra viridia lunula baseos, fascia media finuata lunulaque lata apicis albis. Corpus aeneum, nitidum, albo-hirtum.

15. *C. nigra*, elytris fascia vndata punctisque duobus *lymnaica*.

albis, Ent. syst. I. 171. 11.

Cicindela sylvatica. Linn. syst. Nat. 2. 658. 8.

Fn. Sv. 748.

Geoff. Inf. I. 155. 28.

Oliv. Inf. 33. tab. I. fig. 9.

Herbst. Arch. tab. 27. fig. 13.

Illig. Col. Bor. I. 219. 1.

Voet. Col. tab. 40. fig. 2.

Degeer. Inf. 4. 114. tab. 4. fig. 7.

Pet. Gazoph. tab. 50. fig. 5.

Habitat in Europae borealis Pinetis.

16. *C. capite thoraceque obscure cupreis*, elytris *maura*.

atris: lunulis duabus fasciaque media albis, corpore atro.

Cicindela maura. Ent. syst. I. 178. 39. Linn.

Syst. Nat. 2. 658. 9.

Cicindela arenaria. Ent. syst. I. 171. 12. *

Habitat in Barbaria. Dom. Vahl.

Lunula baseos apicisque interdum in puncta duo diuisa, et fascia media e punctis duobus connatis.

17. *C. obscure aenea*, elytris nigricantibus: punctis *littoralis*.

sex albidis, baseos lunato, medio transuerso.

Ent. syst. I. 172. 13. *

Habitat ad Barbariae littora. Dom. Vahl.

Macula media transuersa interdum in puncta duo diuisa et puncta duo apicis connata in lunulam.

18. *C. nigra*, elytris macula media flaua. Ent. syst. *tristis*.

I. 172. 14. *

Oliv.

- Oliv. Inf. 33. tab. 3. fig. 25.
Habitat in America. Dom. Drury.
- Stincta*
interrupta 19. *C. elytris fuscis: puncto baseos, fasciis tr*
interruptis, lineolaque apicis flavis. Ent.
I. 172. 15. *
Oliv. Inf. 33. tab. 2. fig. 15.
Habitat in Sierra Leon. Mus. Dom. Banks.
- maculata.* 20. *C. nigra, elytris lunulis duabus maculis*
duabus albis: anteriore transuersa. Ent.
I. 172. 16. *
Oliv. Inf. 33. tab. 2. fig. 23.
Habitat - - - Forster. Mus. Dom. Banl
- melancholi-* 21. *C. obscura, margine exteriore triramoso pun*
ca. *que postico albis.* Ent. syst. suppl. 63. 33.
Habitat in Guinea. Mus. D. Lund.
- virida* 22. *C. obscura, elytris punctis duobus lunulis*
tribus albis: intermedia flexuosa. Ent. syst
173. 17. *
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.
- Chinensis.* 23. *C. coeruleo-nitens, elytris viridibus: maci*
duabus atris; posteriore albo bimaculata. E
syst. I. 173. 18. *
Oliv. Inf. 33. tab. 3. fig. 30.
Degeer. Inf. 4. tab. 17. fig. 23.
Habitat in China.
- analis.* 24. *C. aenea, elytris punctatis: margine cyan*
ano pedibusque rufis.
Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff.
Statura et magnitudo *C. campestris.* Anteni
fuscae. Caput aeneum, ore pallido, mandibu
apice nigris. Thorax aeneus. Elytra puncta
aenea, margine cyaneo. Corpus aeneum, s
late rufo. Pedes rufi, apice obscuriores.

25. *C. atra*, elytris vitta submarginalli abbreviata *semivittata*.
punctisque quinque albis.

Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff.

Media. Caput atrum, labio basi albido. Thorax niger, margine pectoreque auro nitidulis. Elytra laevia, atra: vitta submarginalli abbreviata, apice flexuosa, alba. Praeterea puncta tria parva, alba ad futuram baseos, et duo ad marginem apicis. Corpus atrum.

26. *C. obscura*, elytris punctis quatuor lunulisque *flexuosa*.
tribus albis: intermedia flexuosa. Ent. syst. 1.

173. 19. *

Oliv. Inf. 33. tab. 1. fig. 12.

I. 16.

Habitat ad Hispaniae littora. Dom. Vahl.

27. *C. subaenea*, elytris albis: linea fusca triramo- *capensis*.
sa. Ent. syst. 1. 174. 20.

Linn. Syst. Nat. 2. 657. 3. Mus. Lud. Vlr. 84.

Oliv. Inf. 33. tab. 1. fig. 11.

Degeer. Inf. 7. tab. 47. fig. 3.

Naturf. 14. 49. 15. tab. 2.

Wulf. Inf. Cap. tab. 1. fig. 10.

Habitat ad Cap. Bon. Spei.

28. *C. nigra*, labio elytrorumque lunula apicis albis, *abdominalis*.
abdomine rufo.

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Statura parva *C. germanicae*. Caput et thorax cylindricus nigra, cupro parum nitidula, labio niueo. Elytra nigra, obscura linea e punctis impressis ad futuram, lunulaque apicis niuea. Corpus et pedes viridi-aenea, nitida, abdomine ferrugineo.

29. *C. cuprea*, elytris viridibus: puncto lunulaque *germanica*.
apicis albis. Ent. syst. 1. 174. 21.

Linn. Syst. Nat. 2. 657. 4.

I. 16

Geoff.

Geoff. Inf. 1. 155. 29.

Oliv. Inf. 33. tab. 1. fig. 9.

Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 8.

Voet. Col. tab. 40. fig. 6.

Illig. Col. Bor. 1. 220. 4.

Panz. Fn. Germ. 6. tab. 5.

Habitat in Germaniae fabulosis.

Variat colore nigro, viridi et coeruleo.

obscura. 30. *C. nigra*, elytris punctis duobus marginali-
lunulaque apicis alba. Ent. syst. suppl.
21. *

Habitat in America boreali. Dom. Herschel.

micans. 31. *C. capite thoraceque cupreo nitidis*, elytris
fcuris: punctis minutis lunulaque apicis a
Ent. syst. suppl. 61. 21. *

Habitat in America boreali.

tuberculata 32. *C. thorace fusco, bituberculato, elytris fusco*
ridique variis: margine tridentato albo. 1
syst. 1. 174. 22. *

Oliv. Inf. 33. tab. 3. fig. 28.

Habitat in noua Zelandia. Muf. D. Banks.

unipuncta- 33. *C. subpurpurascens, labio elytrorumque pur-*
ta. albis. Ent. syst. 1. 174. 23. *

Oliv. Inf. 33. tab. 3. fig. 27.

Habitat in America. Dom. Drury.

bipunctata. 34. *C. nigra, elytris puncto albo, pedibus fiat*
femoribus nigris. Ent. syst. 1. 174. 24. *

Oliv. Inf. 33. tab. 1. fig. 2.

Habitat in America. Dom. Olivier.

Chrysis. 35. *C. cyanea nitida, elytris obscuris: punctis di-*
bus marginalibus albis.

Habitat in America meridionali. Dom. Smidt.
Statura praecedentium. Caput fuscum anten-

labio

labioque nigris. Thorax cupreo-nitidus. Elytra laevis, nigra, punctis duobus parvis marginalibus albis. Corpus cyaneum, nitidum.

6. *C. cyanea*, nitida, elytris punctis duobus niueis. *4punctata*.

Habitat in Iava. Mus. D. Bosc.

Media. Caput cyaneum, nitidum, labio linea media albida. Thorax rotundatus, cyaneus, viridi parum nitens. Elytra punctata, cyanea, nitida, punctis duobus pone medium I. I. niueis. Corpus et pedes cyanea.

7. *C. viridi-aenea*, elytrorum disco obscuriore: *6punctata*. punctis tribus albis simplicibus. Ent. syst. 1.

175. 25.

Oliv. Inf. 33. tab. 1. fig. 6.

Herbst. Arch. tab. 46. fig. 1.

Habitat ad littora Malabarica. Dom. Drury.

8. *C. cyaneo auroque variegata*, elytris punctis *aurulenta*, quatuor albis: intermedio lunato.

Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff.

Statura omnino praecedentis, cuius varietatem olim credidi. Palpi aenei. Os albidum, mandibulis apice nigris. Antennae basi cyaneae, apice fuscae. Caput obscurum, lineolis duabus baseos cyaneis. Thorax aureus, lateribus lineaque dorsali cyaneis. Elytra fusca basi parum futuraque aureis punctis quatuor albis, baseos humerali, tertio lunato, maiori. Corpus cyaneum,

9. *C. viridi-aenea*, elytris obscuris: margine lineaque media albis. Ent. syst. 1. 175. 26. * *quadri-*
neata.

Oliv. Inf. 33. tab. 1. fig. 4.

Herbst. Arch. tab. 27. fig. 15.

Habitat in India. Dr. Schulz.

- cincta.* 40. *C. atra*, elytris vitta laterali punctisque tribus albis. Ent. syst. 1. 175. 27. *
Oliv. Inf. 33. tab. 3. fig. 33.
Habitat in Africa. Mus. Dr. Hunter
- vittata.* 41. *C. cyanea*, nigrida, elytris vitta laterali indentata punctisque disci albis.
Habitat in Guinea. Mus. D. de Sehestedt.
Magnitudo *C. campestris*. Caput fuscum, labio albo, antennis in medio rufis. Thorax fuscus.
Elytra laevia, fusca, vitta lata ante marginem interne denticulos tres emittente, albida. Puncta aliquot alba in disco et tria ad futuram.
Corpus cyaneo-nitidum lateribus albo-pilosis.
Pedes nigri tibiis cupreis.
- biramosa.* 42. *C. obscure aenea*, elytrorum margine biramoso albo. Ent. syst. 1. 175. 28. *
Cicindela tridentata. Thünb. nou. Inf. spec. 26. fig. 40.
Oliv. Inf. 33. tab. 3. fig. 29.
tab. 2. fig. 16.
Herbst. Arch. tab. 27. fig. 16.
Habitat in India. Dom. Dr. Hattorff.
- marginalis.* 43. *C. thorace elytris cupreis: marginibus rufis, elytris lunulis duabus albis.*
Habitat in Canada. Mus. Dom. Bosc.
Media. Antennae basi aeneae, apice fuscae. Caput hirtum, cupreum, labio nereo. Mandibulae basi supra albae, apice nigrae. Thorax cupreus, nitidus, margine omni, inprimis tantum antice posticoque viridi. Scutellum viride.
Elytra cuprea margine omni futura, tamen in medio viridi. Praeterea lunulae duae albae, altera in medio, altera in apice. Corpus cupreum viridique nitidum, abdomine cyaneo.

14. *C. capite thoraceque cupreis, elytris punctatis punctulata.*
 obscuris: punctis lunulaque apicis albis.
Cicindela punctulata. Oliv. Inf. 33. tab. 2. fig. 18.
 Habitat in Carolina. Mus. Dom. Bosc.
 Magnitudo *C. marginalis.* Caput et thorax cuprea, nitida, labio niueo. Elytra obscura, cupro nitidula, punctis indistinctis lunulaque apicis maiori albis. Corpus cyaneum.
15. *C. viridis, nitida, elytris punctis tribus marginalibus albis.* Ent. syst. 1. 176. 29. *
6guttata.
 Oliv. Inf. 33. tab. 2. fig. 21.
 Herbst. Arch. tab. 27. fig. 17.
 Habitat in Virginia.
 Variat elytrorum disco purpurascente.
16. *C. viridi-aenea, elytris albidis: punctis sex viridibus concatenatis.* Ent. syst. 1. 176. 30. *
catena.
 Thunb. nou. sp. Inf. 2. tab. 1. fig. 41. 42. 43.
 Oliv. Inf. 33. tab. 1. fig. 12.
 Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 11.
 Naturf. 24. 52. 16. tab. 2. fig. 20.
 Herbst. Arch. tab. 27. fig. 14.
 Habitat in India orientali. Dr. Koenig.
17. *C. cuprea, elytris virescentibus: margine dentato ramoque flexuoso albis, pedibus posticis longissimis.* Ent. syst. suppl. 61. 30. *
longipes.
 Habitat Tranquebariae. Dom. Daldorff.
18. *C. viridis, elytris margine, fascia vndata punctis marginata.*
que duobus albis. Ent. syst. 1. 176. 31. *
marginata.
 Habitat in Virginia.
19. *C. obscura, elytris punctis quinque lunulaque 10guttata.*
apicis albis.
 Habitat in Insula Iava. Dom. Billardiere.
 Statura et magnitudo praecedentium. Antennae nigrae, articulo primo aeneo. Caput obscurum.

Thorax obscurus. Elytra obscura, punctis quaeque albis, antico humerali, secundo ad marginem tribusque in triangulo positis. Lunulae apicis alba. Corpus cyaneum, nitidum.

futuralis. 50. *C. viridi-aenea*, elytris albis: futura lunulae viridi-aeneis. Ent. syst. suppl. 62. 31. *
Habitat in Americae St. Thoma. Mus. D. Lur.

sguttata. 51. *C. obscura*, elytris punctis quatuor discis lunisque duabus marginalibus albis. Ent. syst. 177. 32. *
Oliv. Inf. 33. tab. 3. fig. 32.
Habitat in America. Mus. Dr. Hunter.

argentata. 52. *C. capite thoraceque argentatis*, elytris nigro puncto striga vndata lunulaeque pallidis.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Seheftedt.

C. germanica minor. Caput obscure argenteum, antennis mandibularumque apicibus nigro. Thorax cylindricus, obscure argentatus. Elytra laevia, nigra, puncto ante medium, striga media lunulaeque marginali apicis, ramulorum paruum exferente, albis. Corpus cyaneum, nitidum, lateribus albo-villosis.

viduata. 53. *C. atra*, capite thoraceque viridibus, elytris obscuris.
Habitat in Sumatra. D. Daldorff. Mus. D. Lur.
Statura parva *C. argentatae*. Caput virescens, obscurum, antennis labioque nigricantibus. Thorax cylindricus, viridis, linea dorsali nigra. Elytra obscura.

trifasciata. 54. *C. obscura*, elytris strigiis tribus albis: secunda flexuosa. Ent. syst. 1. 177. 33. *
Habitat in America, in Italia paullo minor.

5. *C. viridi-cuprea*, elytris punctatis viridibus: *angulata*.
 lunulis duabus ramoque flexuoso medio flavescentibus. Ent. syst. suppl. 62. 33. *
 Habitat Tranquebariae. Dom. Daldorff.
6. *C. nigra*, pedibus flavescentibus. *funesta*.
Cicindela obscura Ent. syst. suppl. 62. 33. *
 Habitat in India. Dom. Daldorff.
7. *C. obscure nigra*, elytris cinereo-micantibus, *holosericea*.
 pedibus nigris.
 Habitat in Iava. Mus. D. Bosc.
 Statura parva praecedentis. Caput obscurum,
 oculis magnis prominentibus, testaceis. Thorax et elytra nigra, certo situ cinereo micantia.
 Corpus nigrum.
8. *C. nigra*, obscura, elytris margine postico interrupto albo. *interrupta*.
 Habitat in Iava. Mus. D. Bosc.
 Statura parva *C. funestae*. Caput nigrum, obscurum, puncto vno alteroue viridi-micante. Labium album. Thorax rotundatus, fuscus: Elytra laevia, obscura, margine postico albo, at in medio interrupto. Corpus cyaneum, albo-villosum.
9. *C. supra fusca*, subtus cyanea, ano tibiisque posticis testaceis. *Cajennensis*.
 Ent. syst. 1. 177. 36. *
 Habitat Cajennae. Dom. v. Rohr.
6. *C. flava*, elytris fasciis duabus latis nigris. Ent. *aequinotialis*.
 syst. 1. 178. 38.
 Linn. syst. Nat. 2. 658. 7. Amoen. acad. 6. 395.
 22.
 Habitat Surinami.
 Species mihi obscura.

- guttula.* 61. *C. thorace cyaneo, elytris testaceis, punctis tribus flavis.*
 Habitat in maris pacifici Insulis. D. Billardiere.
 Parua. Caput nigrum labio testaceo. Antennae defunt. Thorax cyaneus, nitidus. Elytra laeua, testacea, punctis tribus paruis, flavis, fere marginalibus: anticis duobus approximatis. Abdomen et pedes testacei, minime nitidi.
- flavilabris.* 62. *C. thorace atro, labio flauo, elytris testaceis immaculatis.*
 Habitat in maris pacifici Insulis. D. Billardiere.
 Statura et magnitudo praecedentis. Caput atrum, labio magno flauo. Thorax cylindricus, ater, immaculatus. Elytra laeua, testacea, immaculata. Corpus et pedes testacei.
- fasciata.* 63. *C. thorace atro, elytris laeuibus testaceis: fascia postica lata atra.*
 Habitat in maris pacifici Insulis. D. Billardiere.
 Statura et magnitudo omnino praecedentium.
 Caput atrum, labio porrecto flauo. Thorax cylindricus ater, immaculatus. Elytra laeua, testacea, fascia pone medium atra. Abdomen et pedes testacei.
- minuta.* 64. *C. aenea, elytris lunulis quatuor marginalibus flavis. Ent. syst. 1. 178. 40.**
Cicindela minuta. Oliv. Inf. 33. tab. 2. fig. 13.
 Habitat in India. Mus. nat. Galliae.

43. ELAPHRVS. *Palpi* sex filiformes.
Labium rotundatum, acuminatum, integrum.
Antennae setaceae.
1. *E. viridi-aeneus*, elytris striatis: punctis impress- *vliginosus*.
 fis coeruleis. Ent. syst. 1. 178. 1. *
 Illig. Col. Bor. 1. 225. 3.
 Oliv. Inf. 34. tab. 1. fig. 1.
 Habitat in Germaniae vliginosis. Dom. Smidt.
2. *E. viridi-aeneus*, elytris punctis latis excauatis. *riparius*.
 Ent. syst. 1. 179. 2.
 Linn. syst. Nat. 2. 658. 10. Fn. Sv. 749.
 Geoff. Inf. 1. 156. 30.
 Illig. Col. Bor. 1. 225. 2.
 Oliv. Inf. 34. tab. 1. fig. 4.
 Voet. Col. tab. 40. fig. 7.
 Degeer Inf. 4. tab. 4. fig. 9.
 Schaeff. Icon. tab. 86. fig. 4.
 Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 13.
 Panz. Fn. Germ. 20. tab. 1. *II. C.*
 Habitat in Europae humentibus.
3. *E. aeneus*, elytris striatis, pedibus flavescentibus. *striatus*.
 Ent. syst. 1. 179. 3. *
 Habitat in Germania. Dom. Smidt.

4. E.

Elaphri corpus paruum, oblongum, glabrum, immarginatum, agile, capite magno, ovato, exserto, oculis globosis, prominentibus, lateralibus; antennis thorace longioribus, ante oculos insertis; thorace subcylindrico: marginibus deflexis, elytris angustiore; scutello parvo, rotundato; elytris rigidis, haud deflexis, longitudine abdominis; pedibus longis, tenuibus, cursoriis; tarsis quinquearticulatis; colore plerumque aeneo, obscuro.

impressus. 4. *E. aeneus*, elytris substriatis: punctis duobus eleuatis coeruleis nitidis.

Carabus impressus aeneus, elytris substriatis quadratis impressis cyaneo - interruptis interstriam secundam tertiamque. Illig. Col. Bor. 227. 6.

IV. 31. Panz. Fn. Germ. 40. tab. 8.

Habitat in Germaniae aquosis.

Distinctus punctis duobus ad futuram oblongis eleuatis, cyaneis, nitidis.

atratus. 5. *E. niger*, pedibus rufis. Ent. syst. suppl. 63. 3.
Habitat in America. Dom. Hybner.

flauipes. 6. *E. obscure aeneus*, elytris subnebulosis, pedibus luteis. Ent. syst. 1. 179. 4.

Linn. syst. Nat. 2. 658. Fn. Sv. 750.

Illig. Col. Bor. 1. 226. 4.

II. 6. Panz. Fn. Germ. 20. tab. 2.

Degeer Inf. 4. 119. 6.

Habitat in Europa ad riparum littora.

aquaticus. 7. *E. aeneus nitidus*, capite striato. Ent. syst. 1. 179. 5.

Cicindela aquatica. Linn. syst. Nat. 2. 658. 1.
Fn. Sv. 752.

Degeer. Inf. 4. 118. 5.

Geoff. Inf. 1. 157. 31.

Habitat ad Europae aquas.

semipunctatus. 8. *E. aeneus nitidus*, elytris punctatis: dorso glaberrimo. Ent. syst. 1. 180. 6. *

Elaphrus aquatilis. Illig. Col. Bor. 1. 224. 1.

II. 6. Panz. Fn. Germ. 20. tab. 3.

Oliv. Inf. 34. tab. 1. fig. 3.

Habitat Halae Saxonum. Dom. Schaller.

rupestris. 9. *E. nigro-aeneus nitidus*, elytris punctato-striatis

tis: maculis duabus ferrugineis, antennarum
basi pedibusque rufis.

Cicindela rupestris. Linn. fyft. Nat. 2. 658. 12. *IV. 31.*

Illig. Col. Bor. 1. 230. 13.

Oliv. Inf. 35. tab. 9. fig. 103.

tab. 14. fig. 103.

Habitat ad Germaniae aquas.

10. *E. aeneus*, elytris laevibus nitidis, apice flave- *aguttatus*.
scentibus. Ent. fyft. 1. 180. 7. *

Habitat ad Norwagiae aquas.

44. SCOLYTVS. *Palpi* sex filiformes: articu-
lo ultimo obconico.

Maxilla cornea, ciliata, acu-
ta, integra.

Ligula brevis, membranacea,
rotundata, acuminata.

Antennae filiformes.

1. *S. niger*, elytris ferrugineis: macula media sinua- *flexuosus*
ta punctoque apicis nigris. Ent. fyft. 1.
180. *

Carabus flexuosus. Mant. Inf. 1. 253. 93.

Habitat in India orientali. Dr. Koenig.

2. *S. supra ferrugineus*, thorace macula, elytris fa- *limbatus*.
sciis vndatis viridi-aeneis. Ent. fyft. 1. 181.
2. *

Cara-

Scolyti corpus paruum, subrotundum, depressiusculum, im-
marginatum, agile, capite ovato, inserto, thorace angustio-
re, oculis rotundatis, vix prominulis, lateralibus; *antennis*
thorace longioribus, ante oculos insertis; *thorace* trans-
verso, breviori, fere latitudine elytrorum; *scutello* minuto,
rotundato; *elytris* rigidis, haud deflexis longitudine abdo-
minis; *pedibus* elongatis, cursoriis, rotundatis, tenuibus;
tarsis quinquearticulatis; *colore* variegato.

Carabus limbatus. Mant. Inf. I. 202. 87.

Carabus dubius. Act. Berol. 4. tab. 7. fig. 4
A. B.

Illig. Col. Bor. I. 240. I.

Panz. Fn. Germ. 2. tab. 9.

Oliv. Inf. 35. tab. 4. fig. 43.

Habitat ad aquas sub lapidibus, Kiliae. de Sehe
stedt.

Characterem generis in Entomologia systematic
dedi, at *Palpi* sex, anteriores breuiores biar
ticulati: articulis aequalibus; secundo acuto
Ligula membranacea, breuis, rotundata, inte
palpos parum acuminata. *Labium* breue, cor
neum, transuersum, emarginatum: lateribu
rotundatis.

labiatus. 3. *S. niger*, labio thoracis elytrorumque margin
argenteis.

Habitat in Carolinae aquosis. Muf. D. Bosc.

Paullo maior *S. limbato*. Caput subpunctatum
nigrum, ore antennisque pallidis labioque ar
genteo nitido. Thorax subpunctatus, niger
margine argenteo, nitido. Elytra friata, ni
gra, margine inprimis versus apicem pallidi
testaceo margine tamen ipso argenteo nitidulo
Corpus nigrum, abdomine pedibusque pallid
testaceis.

45. SPERCHEVS. *Palpi* lex filiformes.

Labium corneum, quadra
tum, truncatum, inte
grum.

Antennae claua perfoliata.

emargina- 1. SPERCHEVS.

tus. *Hydrophilus emarginatus* fuscus obscurus, cly
peo emarginato. Ent. syst. I. 183. 7. *

VII. 17.

Dy

Dytiscus emarginatus. Schall. Act. Hall. r. 327.

Illig. Col. Bor. r. 242. r.

Habitat in Europae aquis paludosis, plantarum radicibus adhaerens. Natare haud valet.

*O*s maxillis palpisque. *Palpi* sex inaequales, filiformes: *anteriores* breuiores longitudine maxillae, biarticulati: articulo primo breui, cylindrico, secundo longissimo, incuruo, subulato, adhaerentes maxillae dorso; *intermedii* longiores, filiformes, quadriarticulati: articulo tertio paullo breuiori ad anteriorum basin inserti; *posteriores* parum breuiores, triarticulati: articulis aequalibus, adnati labii medio laterali. *Mandibula* cornea, incurua, tenuis, apice fissa. *Maxilla* membranacea recta, linearis, integra. *Ligula* nulla. *Labium* corneum, transuersum, truncatum, integrum. *Antennae* breues perfoliatae.

6. HYDROPHILVS. *Palpi* quatuor elongati, filiformes.

Maxilla bifida.

Labium corneum, subemarginatum.

Antennae claua perfoliata.

H. niger, sterno canaliculato, postice spinoso, *picens*. elytris simpliciter substriatis. Ent. syst. r. 182.

r. *

Dy-

Hydrophyli corpus oblongum, glabrum, gibbum, immarginatum, *capite* maiusculo, ouato, inserto; *palpis* porrectis, *antennis* sublongioribus; *antennis* longitudine capitis, ante oculos insertis, in foveola sub oculis recondendis; *thorace* trans-

Dytiscus piceus. Linn. syst. Nat. 2. 669. 1.
Sv. 784.

Oliv. Inf. 39. tab. 1. fig. 2.

Geoff. Inf. 1. 182. 1. tab. 3. fig. 1.

Degeer Inf. 4. 371. 1. tab. 14. fig. 12.

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 8.

Schaeff. Icon. tab. 33. fig. 1. 2.

Habitat in Europae aquis, piscibus infestus.

2. *H. niger*, sterno canaliculato, postice spinoso, elytris striis tribus punctatis. Ent. syst. 1. 182. 3. *

Habitat in America meridionali. Mus. D. Linn.

aceus.

3. *H. oliuaceus*, sterno canaliculato, postice spinoso, coleoptris emarginatis. Ent. syst. 1. 182. 2.
Dytiscus hastatus. Act. Berol. 4. tab. 7. fig.
Oliv. Inf. 35. tab. 1. fig. 1.
Habitat in Coromandel.

aboides.

4. *H. niger nitidus*, elytris substriatis. Ent. syst. 183. 4.

Geoff. Inf. 1. 183. 2.

Degeer. Inf. 4. 376. 2.

Illig. Col. Bor. 1. 247. 9.

vi. 6 Linn. syst. Nat. 2. 664. 2. Fn. Sv. 765.

Oliv. Inf. 39. tab. 2. fig. 8.

Roef. Inf. 2. Aquat. 1. tab. 4. fig. 1. 2.

Bergstr. Nomencl. 1. tab. 5. fig. 8. 9.

tab. 7. fig. 8. 9. Larva
Pug

Schaeff. Icon. tab. 33. fig. 10.

Habitat in Europae aquis, piscibus infestus.

5. 1

transverso, latitudine elytrorum; sterno saepius vtriusque prominente, acuto; scutello maiori, triangulari; elytris rigidis, haud deflexis, longitudine abdominis; pedibus natatoriis; tarsis quadriarticulatis; coloris nigri.

9. *H. niger nitidus*, elytris laevibus. *ellipticus*.
 Habitat in Guinea. Mus. Dom. Lund.
 Statura et summa affinitas praecedentis, at paullo
 minor, angustior et elytra haud striata.
10. *H. niger nitidus*, thoracis elytrorumque margi- *lateralis*.
 nibus flavis, sterno porrecto. Ent. syst. 1.
 183. 5. *
 Habitat in America meridionali.
7. *H. ater nitidus laeuissimus*, thoracis elytrorumque *abbrevia-*
 margine ferrugineo, sterno abbreviato. *tus*.
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
 D. Lund.
 Statura et magnitudo *H. lateralis*. Caput atrum,
 nitidum, ore ferrugineo. Thorax et elytra ni-
 tidissima, laeuissima, margine laterali ferrugi-
 neo. Sternum nullo modo porrectum.
Variat rarius margine magis concolore.
8. *H. niger nitidus*, pedibus rufis, sterno postice *rufipes*.
 spinoso, abdomine subtus vtrinque punctis
 rubris.
 Habitat in China, in Sumatra. Mus. Dom. Lund.
9. *H. niger*, elytris striatis, pedibus piceis. Ent. syst. *scarabaeoi-*
 1. 184. 8. *des*.
Dytiscus scarabaeoides. Linn. syst. Nat. 2.
 664. 3. VI. 6
Dytiscus fuscipes. Illig. Col. Bor. 1. 247. 8.
 Oliv. Inf. 39. tab. 2. fig. 9.
 Habitat in Europae aquis.
10. *H. niger*, pedibus piceis, elytris laevibus. Ent. *picipes*.
 syst. 1. 184. 9. *
 Illig. Col. Bor. 1. 248. 10.
 Oliv. Inf. 39. tab. 1. fig. 2.
 Habitat in Germaniae aquis.

- orbicularis.* 11. H. subrotundus, corpore glabro atro. Ent
I. 184. 10. *
Geoff. Inf. 1. 184. 3.
Illig. Col. Bor. 1. 246. 4.
VI. C Oliv. Inf. 39. tab. 2. fig. 11.
Habitat in Germaniae aquis.
- subrotundus.* 12. H. subrotundus, ater, glaber, elytris striatis.
Ent. syst. 1. 184. 11. *
Habitat in Americae aquis. Dr. Pflug.
- bicolor.* 13. H. ovatus, supra flavescens subtus ater.
syst. 1. 184. 12. *
Dytiscus chrysomelinus. Ent. syst. 1. 197.
Habitat in Daniae aquis. Mus. D. de Sehested.
- collaris.* 14. H. niger, ore thoracis lateribus lineisque
trorum ferrugineis. Ent. syst. 1. 184. 13.
Habitat in America meridionali.
- testaceus.* 15. H. ovatus, testaceus, capitis basi corpore
nigris.
Habitat in Europae aquis.
Statura et magnitudo H. vndati. Corpus to-
laeuissimum, testaceum, capitis basi corp-
que nigris.
- vndatus.* 16. H. ovatus, niger, thorace pallido, elytris fi-
tis griseis. Ent. syst. 1. 185. 14. *
Habitat in Americae meridionalis aquis. Dr. Pfl.
- erythrocephalus.* 17. H. ovatus, niger, capite, thorace elytrorum
limbo rufis. Ent. syst. 1. 185. 15. *
Habitat - - - Mus. Dom. Lund.
- haemorrhoidalis.* 18. H. ater, elytris friatis; apice tibiisque fe-
gineis. Ent. syst. 1. 185. 16. *
Habitat in Germaniae aquis. Dom. Smidt.
- marginellus.* 19. H. ater, nitidus, thoracis elytrorumque mar-
ne rufis. Ent. syst. 1. 185. 17. *

- Illig. Col. Bor. 1. 246. 5.
Habitat in Germania. Dom. Smidt.
10. H. postice attenuatus, ater nitidus, elytris punctato - striatis. *attenuatus.*
Habitat in Indiae aquis. Dom. Daldorff. Mus. D. de Sehestedt.
Corpus paruum, antice obtusum, postice attenuatum, totum atrum, nitidum; elytris tenuissime punctato - striatis.
11. H. ater, nitidus, elytris striatis basi apiceque *obscurus.* ferrugineis. Ent. syst. 1. 185. 18. *
Habitat in Germaniae aquis. Dom. Smidt.
2. H. thorace elytrisque striatis, fusco - cinereis, *luridus.* corpore nigro. Ent. syst. 1. 186. 19.
Dytiscus luridus. Linn. syst. Nat. 2. 665. 5. Fn. Sv. 767.
Degeer. Inf. 4. 378. 4. tab. 15. fig. 12.
Illig. Col. Bor. 1. 244. 2.
Panz. Fn. Germ. 7. tab. 3. *I. 18*
Oliv. Inf. 39. tab. 1. fig. 3.
Habitat in Europae aquis frequens.
3. H. ouatus, testaceus, capite thoracisque disco *melanoccephalus.* *nigris.*
Illig. Col. Bor. 1. 246. 6.
Oliv. Inf. 39. tab. 2. fig. 12.
Habitat in Europae aquis.
Medius, conexus. Caput atrum. Thorax ater, margine omni testaceo. Elytra sublaevia, testacea.
4. H. supra cinereus, subtus fuscus. Ent. syst. 1. *griseus.* 186. 21. *
Geoff. Inf. 1. 184. 5. *VI. 7.*
Illig. Col. Bor. 1. 246. 7.
Habitat in Saxoniae aquis. Dom. Hybner.
25. H.

friatulus. 25. *H. ouatus*, ater, thoracis margine elytris
substriatis griseis.

Habitat in Germania. Dr. Panzer.

Paullo maior *H. 2punctato*. Caput atrum, pa
griseis. Thorax niger, margine late gril
Elytra subtilissime striata, grisea. Cor
atrum, pedibus griseis.

2 punctatus. 26. *H. thorace atro*: margine griseo, elytris fusi
margine punctoque postico albidis. Ent. f.
i. 186. 22. *

Hydrophylus minutus. Illig. Col. Bor. i. 245

Chrysamela minuta. Linn. Syst. Nat. 2. 51
50. Fn. Sv. 637.

v. 1. 7.

Hydrophylus coccinelloides. Roff. Fn. Etr.
228. 486.

Geoff. Inf. i. 184. 4.

Habitat in Vpſaliae aquis.

minutus. 27. *H. ouatus*, niger, elytris laeuibus testaceis. E
lyft. i. 186. 20. *

Dytiscus dermestoides. Forst. nou. Inf. f.
Cent. i. 53.

Oliv. Inf. 39. tab. 2. fig. 13.

Habitat in Europae aquis.

Paruus. Caput et thorax atra, nitida, thori
margine parum flauescente. Elytra laeuia,
stacea, immaculata. Corpus nigrum.

pygmaeus. 28. *H. griseus*, capite postice atro, thorace fla
scente. Ent. lyft. i. 186. 23. *

Habitat in Americae meridionalis Insulis.
Pflug.

Varietas duplo maior vix differt.

nigriceps. 29. *H. griseus*, capite nigro.

Habitat in India orientali. Dom. Daldorff. M
Dom. Lund.

Cor

Corpus paruum H. 2punctati. Corpus nigrum.

Thorax et elytra laeuia, grisea, immaculata.

Corpus nigricans, pedibus griseis.

p. H. laeuissimus ater, elytris truncatis abbreviatis. *truncatellus.*
Hydrophylus truncatellus. Payk. Fn. Sv. 1. 183. 15.

Habitat in Daniae aquis. Mus. Dom. Lund.

Corpus minutum, laeuissimum, atrum, elytris abbreviatis.

47. HYDRACHNA. *Palpi* quatuor aequales:
posteriores extrorsum
 crassiores.

Maxilla cornea, incurua,
 acutissima.

Labium corneum inte-
 grum.

Antennae setaceae.

L. H. nigra, capite, thorace elytrorumque basi fer- *Hermannii.*
 ragineis.

Dytiscus Hermannii. Ent. syst. 1. 193. 28. *

Dytiscus tardus. Act. Berol. Nat. Cur. 4. tab. 7.
 fig. 3.

IX.

Oliv.

Hydrachnae corpus paruum, gibbum, ouatum, immarginatum, agile, capite onato, inserto, oculis magnis, globosis, prominentibus, lateralibus; clypeo breui, transuerso, emarginato; antennis thorace longioribus in fouea ante oculos insertis; thorace breui, transuerso, elytris angustiore: margine parum prominente acuto; elytris rigidis longitudine abdominis: margine haud deflexo; pedibus breuibus, natatoriis, ciliatis; tibiis anticis apice spinosis; tarsis anticis quadri-, posticis quinquearticulatis; colore nigro aut brunneo obscuro.

Oliv. Inf. 40. tab. 2. fig. 14.

Habitat in aquis stagnantibus Alsatiae. Prof. Hermann.

Scutellum paruum, triangulare. Sternum posticum quadridentatum.

Os palpis maxillisque. *Palpi* quatuor aequaliter *anteriores* vix longiores, filiformes, quadridentati: articulo secundo paullo longiore ultimo brevi, truncato, adhaerentes maxillae dorso; *posteriores* extrorsum crassiores, triarticulati: articulo primo brevissimo, secundo longiori, obconico, tertio brevi, globoso, crassiori, adnati labii lateribus. *Mandibula* crassa cornea, incurva, apice late emarginata: labiis acutis. *Maxilla* porrecta, cornea, apice incurva, acutissima. *Labium* breve, corneum subtruncatum, integrum. *Antennae* setaceae articulo secundo maiori.

gibba.

2. *H. brunnea*, sericeo-nitens.

Dytiscus gibbus. Ent. syst. 1. 193. 30. *

Dytiscus ovatus. Linn. Syst. Nat. 2. 667. 11. Fn. Sv. 2282.

Dytiscus sphaericus. Degeer Inf. 4. 402. tab. 14. fig. 17-19.

VIII. 13.

Geoff. Inf. 1. 191. 10.

Illig. Col. Bor. 1. 262. 11.

Oliv. Inf. 40. 33. 39. tab. 3. fig. 28.

Roff. Fn. Etr. 1. 234. 496.

Habitat in Europae borealis aquis stagnantibus.

ovalis.

3. *H. glabra*, punctata nigricans.

Dytiscus ovalis. Illig. Col. Bor. 1. 262. 17.

Habitat in Europae aquis.

Nimis praecedenti affinis et forte mera varietas sexus.

4. *H. atra*, nitida, capite elytrorumque striis flavis. *scripta*.

Dytiscus scriptus. Ent. syst. suppl. 65. *

Habitat in Indiae aquis. Dom. Daldorff.

Statura parua, gibba præcedentium. Caput flavum, immaculatum. Thorax niger. Elytra laeua, nitida, atra; striis plurimis, basi coëuntibus flavis. Corpus nigrum, pedibus piceis.

48. DYTISCVS. *Palpi* sex filiformes.

Labium corneum, truncatum, integrum.

Antennae setaceae.

* *scutellati*.

1. *D. niger*, elytrorum marginibus dilatatis: linea latissimus.

flava. Ent. syst. 1. 187. 1.

Linn. syst. Nat. 2. 665. 6. Fn. Sv. 768.

Illig. Col. Bor. 1. 250. 1.

Oliv. Inf. 40. tab. 2. fig. 8.

Frisch. Inf. 2. tab. 7. fig. 1. 2.

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 19.

Schaeff. Icon. tab. 27. fig. 1. 2.

Habitat in Europae aquis, piscibus infestus. Mas glaber, femina semifulcata.

In propriam speciem faeuit.

2. *D.*

Dytisci corpus oblongum, depressum, planiusculum, immarginatum, agile, capite subrotundo, inserto, clypeo breui, rotundato, integro, oculis rotundatis, prominentibus, lateralibus; antennis thorace longioribus, ante oculos insertis; thorace breui, transverso, margine parum prominente acuto; scutello breui, triangulavi; elytris rigidis, incumbentibus, longitudine abdominis; pedibus breuibus, natatoriis; tarsis quinquearticulatis; colore nigro, obscuro.

Dytiscorum scutellatorum mares saepe tibiis anticis clypeatis, feminae elytris semifulcatis aut totis striatis.

R

limbatus. 2. *D. oliuaceus*, thoracis elytrorumque margine flavo, abdomine atro: maculis lateralibus testaceis. Ent. syst. 1. 188. 6. *

Dytiscus aciculatus. Oliv. Inf. 13. 6. tab. fig. 30.

Habitat in India orientali.

Magnus. Caput oliuaceum, ore antennisque flavis. Thorax oliuaceus, margine late flavo. Elytra oliuacea, stria vna alteraue e punctis impressis margineque flavo. Corpus atrum modo punctis lateralibus rufis, modo maculis majoribus, testaceis.

marginalis. 3. *D. niger*, thoracis marginibus omnibus elytrorumque exteriori flavis. Ent. syst. 1. 187.

Linn. syst. Nat. 2. 665. 7. Fn. Sv. 769.

Oliv. Inf. 40. tab. 1. fig. 1.

Geoff. Inf. 1. 186. 2.

Illig. Col. Bor. 1. 253. 3.

111. 14.

Roef. Inf. 2. Aquat. 1. tab. 1. fig. 9. 10. 11.

Sulz. Inf. tab. 6. fig. 42.

Schaeff. Icon. tab. 8. fig. 8.

Habitat in Europae aquis.

Agilis in dorso iacens saltu se restituit. I si in sicco retineatur, aegre se immergit.

circumflexus. 4. *D. oliuaceus*, thoracis limbo elytrorumque margine flavis, scutello rufo.

Habitat in Tanger. D. Schousboe. Mus. D. de S. hestedt.

Statura et magnitudo *D. Roefelii*. Caput oliuaceum, lunula frontali rufa, oreque flavo. Antennae ferrugineae. Thorax oliuaceus, margine omni flavo. Scutellum rufum. Elytra oliuacea, stria tribus punctatis, margineque flavo. Corpus flavum nigro-fasciatum, sterno antiporrecto spinoso.

5. *D. niger*, clypeo thoracis elytrorumque margine punctulatis, elytris striis tribus punctatis. Ent. syst. *tus.*

I. 188. 4. *

Oliv. Inf. 40. tab. 1. fig. 6.

Geoff. Inf. 185. 1.

Degeer Inf. 4. 396. 3.

Frisch. Inf. tab. 1. fig. 7.

Habitat in rivulis sylvaticis, Kiliae. Dom. Lund.

Varietatem D. marginalis credit Illiger, at vix rite.

6. *D. ater*, subtus oliuaceus, elytris puncto postico immarginato ferrugineo. Ent. syst. 4. App. 444. 4. * *natus.*

Habitat in Senegalliae aquis. Dom. de Paykull.

7. *D. virescens*, clypeo thoracis elytrorumque margine exteriori striis, elytris obsolete striatis. *Roesei.*

Ent. syst. 1. 188. 5.

Dytiscus dispar. Ross. Fn. Etr. 1. 199. 489.

Illig. Col. Bor. 1. 251. 2.

Oliv. Inf. 40. tab. 3. fig. 21.

Röes. Inf. 2. Aquat. 1. tab. 2. fig. 1 - 5.

Habitat in Galliae aquis. Dom. Bosc.

8. *D. ater*, ore, thoracis elytrorumque margine, femoribusque quatuor anticis, obscure rufis. *atratus.*

Habitat in Oceani pacifici Insulis. D. Billardiere.

Minor *D. Roesei* et alius. Caput nigrum, ore

late ferrugineo. Thorax laevis, ater, obscurus,

margine exteriori ferrugineo. Elytra laevissima

atra, obscura, margine exteriori ferrugineo.

Corpus atrum. Pedes atri, femoribus quatuor

anticis obscure ferrugineis.

9. *D. niger*, capitis fascia, thoracis margine, elytrorumque stria costali postice hamato-ferrugineis. Ent. syst. 1. 187. 2. *

Dytiscus costalis. Oliv. Inf. 40. 9. 2. tab. 1. f. 7.

R 2

Ha-

Habitat Surinami.

D. limbato multo minor, subtus ater, puncto meo specimine vtrinque in pectore distincte sanguineo. Elytrorum margo stria flavescente quae tamen apicem haud attingit, at antecum hamum exferit.

lateralis. 10. D. niger, elytrorum margine flavo: linea nigra. *Dytiscus lateralis.* Ent. syst. suppl. 64. 6. *Dytiscus 3punctatus.* Oliv. Inf. 40. tab. 3. f. 2. Habitat Tranquebariae. Dom. Daldorff.

Praecedenti nimis affinis. Corpus obscure ferrugineum. Caput nigrum, antice flavum. Thorax niger, margine exteriori flavo. Elytra laevia, striis tantum duabus et punctis minutis exarata, oliuacea, margine flavo, et in laevio margine linea una altera, et punctis minutis nigricantibus, et medio ad apicem ducta.

laevigatus. 11. D. laevis niger, ore, thoracis margine, pedibusque quatuor anticis rufis.

Dytiscus laevigatus. Oliv. Inf. 40. tab. 3. f. 2. Habitat in Americae meridionalis aquis. D. Sm. Mus. D. de Sehestedt.

Statura latius depressa D. fulcati, paullo major. Caput atrum, ore antennisque rufis. Thorax ater, margine tenuissime rufo. Elytra laevia, atra, obscura, immaculata. Corpus atrum, pedibus quatuor anticis rufis.

latus. 12. D. laevis, obscure oliuaceus, ore, antennis et elytrorumque margine postico rufis.

Habitat in America meridionali. Mus. D. Lun. Statura D. fulcati, postice paullo latior. Antennae rufae. Caput obscure oliuaceum, punctis duobus impressis. Os ferrugineum. Thorax obscure oliuaceus, margine concolore. Elytra oli-

- olivacea, strilis tribus e punctis impressis, margine versus apicem rufo. Corpus atrum, pedibus rufis.
13. *D. niger*, fronte thoraceque fulvis, elytris stri- *ruficollis*.
ga baseos margineque exteriori testaceis. Ent.
syft. 1. 189. 7. *
- Oliv. Inf. 40. tab. 2. fig. 10.
Habitat in Siam. Mus. Dom. Banks.
14. *D. coleoptris fulcis decem longitudinalibus vil-* *fulcatna*
losis. Ent. syft. 1. 189. 9.
- Linn. syft. Nat. 2. 666. 13. Fn. Sv. 773.
Geoff. Inf. 1. 189. 5.
Illig. Col. Bor. 1. 254. 4.
Roef. Inf. 2. Aquat. 1. tab. 3. fig. 7. III. 21
Frish. Inf. 13. tab. 7.
Schaeff. Icon. tab. 3. fig. 3.
Panz. Fn. Germ. 30. tab. 9. 10.
Oliv. Inf. 40. tab. 4. fig. 31.
Habitat in Europae, Americae aquis.
15. *D. elytris flavis: fasciis duabus punctoque api-* *fasciatus*.
cis nigris. Ent. syft. 1. 189. 9. *
- Oliv. Inf. 40. tab. 2. fig. 19.
Habitat in Indiae aquis.
16. *D. fuscus*, thorace flavo: fascia abbreviata ni- *friatus*.
gra, elytris transuersim subtilissime striatis.
Ent. syft. 1. 189. 10.
- Linn. Syft. Nat. 2. 665. 9. Fn. Sv. 770.
Degeer Inf. 4. 399. 5. tab. 15. fig. 16.
Illig. Col. Bor. 1. 257. 7.
Oliv. Inf. 40. tab. 2. fig. 20.
Roff. Fn. Etr. 1. 233. 494.
Habitat frequens in Europae aquis.
17. *D. fuscus*, thoracis margine flavo: elytris trans- *fuscus*.
uersim *vilu. 15.*

- uetrim subtilissime striatis. Ent. syst. 1. 189.
 II. *
 Linn. syst. Nat. 2. 665. 10.
 Habitat in Germaniae aquis. Dom. Smidt.
- Lanio.** 18. *D. niger*, ore, verticis punctis duobus thoracisque marginibus rufis, elytris flauo-striatis.
 Ent. syst. 1. 190. 12. *
 Oliv. Inf. 40. tab. 2. fig. 9.
 Habitat in Maderae aquis. Mus. D. Banks.
- ciens.** 19. *D. ater*, laevis, ore verticis puncto thoracisque margine rufis, elytris flauo-striatis. Ent. syst. 1. 190. 13. *
 Habitat ad Cap. Bon. Spei. Prof. Vahl.
- vittatus.** 20. *D. ater*, laevis, elytris vitta marginali flaua: macula baseos atra. Ent. syst. 1. 190. 14. *
 Oliv. Inf. 40. tab. 1. fig. 5.
 Habitat in Indiae aquis. Mus. Dr. Hunter.
- cinereus.** 21. *D. cinereus*, elytrorum margine thoracisque medietate flauis. Ent. syst. 1. 190. 15.
 Linn. Syst. Nat. 2. 666. 11. Fn. Sv. 771.
 Geoff. Inf. 1. 188. 4.
 Degeer. Inf. 4. 397. 14.
 Illig. Col. Bor. 1. 256. 5.
 Schaeff. Icon. tab. 90. fig. 7.
 Panz. Fn. Germ. 31. tab. 11.
 Oliv. Inf. 40. tab. 4. fig. 32.
 Ross. Fn. Etr. Mant. 1. 414. 166.
 Habitat in Europae aquis frequens.
- zonatus.** 22. *D. cinereus*, thorace flauo: fasciis duabus atris elytrorum margine flauo.
Dytiscus zonatus. Illig. Col. Bor. 1. 257. 6.
 17. 32. Panz. Fn. Germ. 38. tab. 13.
 Habitat in Germaniae aquis.
 Vix, ac ne vix quidem, a *D. cinereo* distinctus.
 Differt tantum corpore paullo angustiore, e
 mar.

marginē antico posticoque thoracis parum
flavo.

23. *D. capite thoraceque rufis, elytris cinereis: fa-* *unifascia-*
scia media repanda nigris. *tus.*

Habitat in Guinea. Mus. D. Lund.

Statura et magnitudo *D. fictici*. Caput rufum,
marginē postico nigro. Thorax laevis, rufus,
immaculatus. Elytra laeuissima, fascia media,
lata, atra. Corpus atrum, pedibus testaceis.

24. *D. pallens, elytris griseis: puncto oblongo la-* *ficticus.*
terali nigro impresso. Ent. syst. 1. 191. 16. *

Linn. syst. Nat. 2, 666. 12.

Oliv. Inf. 40. tab. 2. fig. 11.

Habitat in Africae aquis.

25. *D. cinereus, elytris fascia dentata nigra.* Ent. *griseus.*
syst. 1. 191. 16. *

Oliv. Inf. 40. tab. 2. fig. 12.

Habitat in Indiae aquis. Mus. D. Lund.

Mera praecedentis varietas videtur.

26. *D. glaber, ater, elytris punctis albis quinque.* *10puncta-*
Ent. syst. 1. 191. 18. * *tus.*

Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

27. *D. ater, ore elytrorumque margine ferrugineis, fuliginosus.*
capite immaculato. Ent. syst. 1. 191. 19. *

Habitat in Germaniae aquis.

28. *D. ater, immaculatus, antennis rufis.* *carbona-*

Habitat in Germaniae aquis.

rius.

Affinis certe *D. 2pustulato* totus ater, obscure ni-
tidus, antennis solis rufis. Elytra microscopio
visa subtilissime striata punctisque minutis im-
pressa.

29. *D. laevis, ater, capite postice punctis duobus 2pustulatus*
rubris. Ent. syst. 1. 191. 20.

Schaeff. IX

Schaeff. Icon. tab. 8. fig. 9.

Linn. syst. Nat. 2. 667. 17.

Illig. Col. Bor. 1. 260. 14.

Oliv. Inf. 40. tab. 3. fig. 26.

Habitat in Europa boreali.

cinctus. 30. D. capite thoraceque flavis: elytris nigris: margine omni albo. Ent. syst. 1. 191. 21. *
Habitat in Americae aquis. Dom. Mauduit.

apunctatus 31. D. ater, thorace flavo: punctis duobus nigris, elytris flavo fuscoque variis. Ent. syst. 1. 192. 22. *

Dytiscus nebulosus. Forst. Cent. 1. 56.

Illig. Col. Bor. 1. 262. 17.

VIII. 15.

Oliv. Inf. 40. tab. 2. fig. 15.

Roff. Fn. Etr. Mant. 1. 415. 167.

Habitat in Germaniae aquis.

fenestratus. 32. D. subtus ferrugineus, supra niger, elytris margine ferrugineo punctisque duobus fenestratis. Ent. syst. 1. 192. 23. *

Dytiscus aeneus. Illig. Col. Bor. 1. 259. 12. β?

Dytiscus guttatus. Payk. Fn. Sv. 1. 211. 20.

IV. 33.

Habitat in Germaniae aquis.

VIII. 15.

Elytrorum margo ferrugineus.

ater. 33. D. ater, elytris puncto apicis fenestrato, antennis pedibusque ferrugineis.

Dytiscus ater. Illig. Col. Bor. 1. 259. 11.

IV. 32.

Dytiscus fenestratus. Payk. Fn. Sv. 1. 207. 16.

Degeer, Inf. 4. 401. 8.

Panz. Fn. Germ. 38. tab. 15.

Roff. Fn. Etr. Mant. 1. 411. 162. β.

Habitat in Germaniae aquis.

lacustris. 34. D. obscure metallicus, laevis, flavo marginatus, subtus ferrugineus.

IV. 32.

Dytiscus lacustris. Illig. Col. Bor. 1. 258. 10.

Panz.

Panz. Fn. Germ. 38. tab. 14.

Habitat in Germaniæ aquis.

35. *D. lævis*, ater, thoracis margine oreque ferrugineis; elytris linea marginali laevi. *Hybneri*.
Ent. syst. 1.

192. 24. *

Illig. Col. Bor. 1. 258. 9.

Oliv. Inf. 40. tab. 4. fig. 33.

Roff. Fn. Etr. Mant. 1. 415. 165.

Habitat in Germaniæ aquis. Dom. Hybner.

36. *D. niger*, nitidus, antennis punctisque duobus nitidus.
frontalibus rufis.

Habitat in Germaniæ aquis.

Praecedentibus minor, totus ater, nitidus, antennis solis, punctisque duobus verticalibus, rufis.

37. *D. lævis*, niger, thorace antice ferrugineo, elytris fuscis flavo-lineatis. *stagnalis*.
Ent. syst. 1. 192.

25. *

VIII. 16

Habitat in Germaniæ aquis. Dom. Hybner.

38. *D. ater*, thorace antice ferrugineo, elytrorum transuersa-
margine, striaque baseos abbreviata flavis. Ent. *lis*.
syst. 1. 192. 26. *

Myll. Zool. Dan. 71. 668.

Illig. Col. Bor. 1. 258. 8.

Oliv. Inf. 40. tab. 3. fig. 22.

Bergstr. Nomencl. 1. tab. 5. fig. 6.

Habitat in Europæ aquis.

39. *D. ater*, elytris basi margineque exteriori ferrugineis, sterno porrecto compresso. *calidus*.
Ent. syst. 1.
193. 27. *

Habitat in Americæ meridionalis aquis. D. Smidt.

40. *D. niger*, elytris striga abbreviata baseos, punctisque duobus flavescens. *abbreviatus*.
Ent. syst. 1.

193. 29. *

Illig.

- Illig. Col. Bor. 1. 263. 19.
 Oliv. Inf. 40. tab. 4. fig. 38.
 II. 7. Panz. Fn. Germ. 14. tab. 1.
 Herbst. Arch. 5. 125. 11.
 Habitat in Kiliae aquis. Dom. Daldorff.
- eliginosus.* 41. *D. ater, nitidus, antennis, pedibus elytrorum latere exteriori ferrugineis.* Ent. syst. 1. 1. 31.
 Linn. syst. Nat. 2. 667. 20. Fn. Sv. 776.
 Schaeff. Icon. tab. 8. fig. 10.
 Habitat in Europae paludibus.
- paludosus.* 42. *D. ater, nitidus, elytris basi ferrugineis.* Habitat in Germaniae paludibus.
 Statura, magnitudo et summa affinitas praecedentis. Os, antennae, pedes ferruginea. Elytra laevia, nigra, basi late ferruginea. Corium atrum.
- irroratus.* 43. *D. testaceus, nigro-irroratus, capite pectore nigris.* Ent. syst. 1. 194. 32. *
 Habitat in Americae aquis.
- agilis.* 44. *D. niger, ore, thorace, elytrorum marginibusque ferrugineis.* Ent. syst. 1. 194. 33.
 VIII. 6. Habitat in Germaniae aquis. Dom. Smidt.
- maculatus.* 45. *D. niger, thorace fascia pallida, elytris albigroque variis.* Ent. syst. 1. 194. 34.
 Linn. syst. Nat. 2. 666. 15. Fn. Sv. 777.
 Oliv. Inf. 40. tab. 2. fig. 16.
 I. 9. Panz. Fn. Germ. 14. tab. 8.
 Herbst. Arch. 5. 125. 15. tab. 28. fig. B.
 Habitat in Europae aquis.
 Maculae elytrorum variant.
- brunneus.* 46. *D. subfuscus ater, supra brunneus.* Ent. syst. 1. 194. 34. *
 Habitat in Tangier. Schousboe. Mus. D. Lun.

7. *D. onato-oblongus*, capite pedibusque rufis. *erythrocephalus*.
Ent. syst. 1. 194. 35.

Linn. syst. Nat. 2. 660. 14. Fn. Sv. 774.

Degeer Inf. 4. 404. 12.

Habitat in Europae paludibus.

8. *D. thorace rufo*, elytris cinereo-rufoque stria-*varius*.
tis. Ent. syst. 1. 195. 37. *

Oliv. Inf. 40. tab. 2. fig. 17.

Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff.

9. *D. thorace rufo*: fascia, elytris, margine lineo-*interrogatus*.
laque baseos ferrugineis.

Habitat in Carolinae aquis. Dom. Bosc.

Statura et magnitudo *D. vliginosi*. Caput antice ferrugineum, postice nigrum. Thorax niger, fascia media, ad marginem dilatata, rufa. Elytra laevia, nigra, margine lineolaque baseos parua ad futuram rufis. In margine rufo versus apicem punctum paruum, fuscum. Corpus ferrugineum.

10. *D. fuscus*, thorace flavo: punctis quatuor ni-*notatus*.
gris, elytris stria suturali flava. Ent. syst. 1.
195. 38. *

Illig. Col. Bor. 1. 261. 15.

Oliv. Inf. 40. tab. 5. fig. 47.

Bergstr. Nomencl. 1. tab. 5. fig. 10.

Habitat in Germaniae aquis.

11. *D. thorace ferrugineo*, elytris nigris flavo-irro-*adpersus*.
ratis.

Dytiscus adpersus. Illig. Col. Bor. 1. 261. 16.

Panz. Fn. Germ. 38. tab. 18.

Habitat in Germaniae aquis.

Vix a praecedente satis distinctus. Antennae ferrugineae. Caput ferrugineum, vertice nigro. Thorax ferrugineus. Elytra laevia, nigra, atomis

- mis numerosis, minutissimis, flavis. Co
 atrum, pedibus ferrugineis.
- haemorrhoidalis.* 52. *D. ater*, capite, thorace elytrorumque apice
 ferrugineis. Ent. syst. suppl. 64.
 Habitat in Germaniae aquis.
- D. notato paullo minor.* Antennae ferruginae.
 Caput et thorax laevia, ferruginea, immaculata.
 Elytra laevia, nigra, litura basae apice
 busque ferrugineis. Corpus atrum, pedibus
 ferrugineis.
- bicolor.* 53. *D. supra ater*, elytris striatis, subtus ferrugineis.
 Ent. syst. i. 195. 39. *
 Habitat in Aquapim Guineae. Dom. Isert.
- posticatus.* 54. *D. ater*, elytris striatis: basi apiceque tenuiter
 striatis.
 Habitat in Americae Insulis. Smidt. Mus. D.
 Schestedt.
 Statura omnino oblonga *D. bicoloris*. Caput
 grum, antennis rufis. Thorax niger, margine
 rufo. Elytra striata, nigra, basi tenuissime
 striata. Apex nefescit. Corpus nigrum, pedibus
 rufis.
Variat duplo minor.
- ** *Exscutellati.*
- planus.* 55. *D. oblongus*, planus, niger, tibiis solis rufis.
 Ent. syst. i. 195. 36. * Payk. Fn. Sv.
 223. 33.
 Habitat in Daniae aquis. Mus. Dom. Lund.
- depressus.* 56. *D. thorace ferrugineo*: punctis duobus basae
 nigris, elytris fuscis ferrugineo-maculatis.
 Ent. syst. i. 195. 41.
 II. 10 *Dytiscus depressus.* Payk. Fn. Sv. 221. 30.
 Habitat in Sueciae aquis.

Dytiscus alpinus. Payk. Fn. Sv. 226. 30. viz
differt.

♂ D. capite, thoracis margine elytrorumque pun-
cto baseos distincto, margineque inaequali fer-
rugineis. Ent. syst. 1. 196. 42. * Payk. Fn.
Sv. 222. 31.

Oliv. Inf. 40. tab. 1. fig. 3.

II. 7.

Dytiscus rufifrons. Ent. syst. 1. 198. 53. nullo
modo differt.

Habitat in Kiliae aquis. Dom. Daldorff.

♂ D. ater, capite ferrugineo, elytris maculis tri-
bus rufis: baseos maiore. Ent. syst. 1. 196.
43. * Payk. Fn. Sv. 1. 225. 35.

II. 8.

Oliv. Inf. 40. tab. 4. fig. 35.

Habitat in Sueciae aquis.

♂ D. laevis, elytris lituris duabus lateralibus al-
bis. Ent. syst. 1. 196. 44.

Linn. syst. Nat. 2. 667. 19. Fn. Sv. 775.

Habitat in Europae aquis.

♂ D. ferrugineus, elytris nigris: margine ferru-
gineo. Ent. syst. 1. 196. 45.

Habitat in Europae aquis.

Corpus paruum, exscutellatum, rufum, a D. oua-
to Linnaei omnino distinctus.

♂ D. niger, thorace antice ferrugineo, elytris fla-
vo-lineatis. Ent. syst. 1. 196. 46. * Payk.

Fn. Sv. 1. 228. 39.

Dytiscus rufipes. Ent. syst. 1. 195. 40. *

Mllig. Col. Bor. 1. 267. 26.

Panz. Fn. Germ. 14. tab. 3.

Habitat in Germaniae aquis. Dom. Hybner.

♂ D. niger, elytris basi lituraque apicis pallidis. *lituratus*.

Ent. syst. 1. 197. 47. *

Habitat in Italiae aquis. Dr. Allioni.

63. D.

- signatus.* 63. *D. niger*, capite thoraceque rufis: signaturis
gris. Ent. syst. I. 197. 49. *
Habitat in Patagoniae aquis. Mus. D. Banks.
- 12pustulatus.* 64. *D. testaceus*, elytris nigris: maculis sex
ceis. Ent. syst. I. 197. 50. * Payk. Fn.
I. 220. 29.
Oliv. Inf. 40. tab. 5. fig. 46.
Habitat in Germaniae aquis. Mus. Dom. Bosc.
- 8pustulatus* 65. *D. niger*, fronte, thoracis lateralibus elytror
que punctis marginalibus ferrugineis. Ent.
I. 197. 51. *
Habitat in Sueciae aquis. Dom. Com. de Souza.
- Halenfis.* 66. *D. ater*, thorace rufo: baseos medio nigro, p
cto nigro, elytris cinereis nigro-friatis. I
syst. I. 108. 52. * Payk. Fn. Sv. I. 2
41.
Habitat in Germaniae aquis. Dom. Hybner.
- granularis.* 67. *D. niger*, elytris lineis duabus flavescentibus,
dibus rufis. Ent. syst. I. 198. 54.
Linn. syst. Nat. 2. 667. 22.
Oliv. Inf. 40. tab. 2. fig. 13.
Payk. Fn. Sv. 231. 43.
Scopol. Carn. 2. 97.
Habitat in Europae borealis aquis.
- confluens.* 68. *D. niger*, capite thoraceque ferrugineus, ely
pallidis: lineis quatuor disci nigris. Ent. f
I. 198. 55. *
Oliv. Inf. 40. tab. 5. fig. 43.
Payk. Fn. Sv. I. 230. 42.
Habitat Kiliae. Dom. Daldorff.
- obliquus.* 69. *D. ferrugineus*, elytris maculis quinque o
quis fuscis. Ent. syst. I. 198. 56. *
- II. g.* *Dytiscus laminatus.* Schulz. Act. Hallenf.
12.

Sole in Pisa in Mus
P. 2109 [23-2399]
ad C. C. C. C. C. C.
confluens.
H. C. C. C. C. C. C.

II. B.

Degeer Inf. 4. tab. 16. fig. 9.

Payk. Fn. Sv. 1. 235. 50.

Habitat in Kiliae aquis. Dom. Daldorff.

0. *D. ovalis*, obscure brunneus, elytris lineolis *nigro-fulvus*.
gris.

Habitat in Europae aquis. Dom. Smidt.

Statura oblonga, antice attenuata *D. impressi*, at
duplo maior. Caput, et thorax obscure brun-
nea, immaculata, oculis albis. Elytra puncta-
to-striata: lineolis aliquot nigris. Corpus
brunneum.

1. *D. ovalis* fuscus, elytris cinereis: punctis *impressus*.
impressis striatis. Ent. syst. 1. 199. 57. *

Dytiscus impresso-striatus. Act. Hall. 1. 312.

Oliv. Inf. 40. tab. 4. fig. 40.

Illig. Col. Bor. 1. 269. 30.

Panz. Fn. Germ. 14. tab. 7.

Payk. Fn. Sv. 1. 235. 49.

Habitat in Europae aquis.

2. *D. ferrugineus*, capite basi nigro, elytris obscu- *semipuncta-*
ris apice punctatis. Ent. syst. 1. 199. 58. * *tus.*

Habitat in India orientali, Mus. Dom. Lund.

3. *D. oblongus*, ater, coleoptris ferrugineis: cruce *crux*.
atta. Ent. syst. 1. 199. 59. *

Habitat in Italiae aquis. Dr. Allioni.

4. *D. oblongus*, ater, capite elytrorumque maculis *arcuatus*.
duabus ferrugineis.

Dytiscus arcuatus. Panz. Fn. Germ. 26. tab. 1. *II. 22.*

Habitat in Germaniae aquis. Dom. Panzer.

Statura et magnitudo *D. crucis*. Caput rufum.

Thorax ater, immaculatus, Elytra laevia, atra,
maculis duabus rufis, altera bascos, altera api-
cis, arcuata.

- geminus.* 75. *D. oblongus*, ater, thorace punctis duobus, tris lineolis duabus baseos, punctoque a
 III. 22 albis. Ent. syst. 1. 199. 60. *
Dytiscus trifidus. Panz. Fn. Germ. 26. tab.
 Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.
- lineatus.* 76. *D. ferrugineus*, coleoptris fuscis: lineis fl
 scentibus. Ent. syst. 1. 200. 61. *
 Bergstr. Nomencl. 1. 32. 8. 9. tab. 6. fig. 8.
 Illig. Col. Bor. 1. 268. 27.
 Oliv. Inf. 40. tab. 5. fig. 43.
 IX. Payk. Fn. Sv. 227. 37.
 Degeer Inf. 4. 403. 11.
 Habitat in Germaniae aquis. D. Prof. Herma
- inaequalis.* 77. *D. ferrugineus*, elytris nigris: lateribus i
 qualiter ferrugineis. Ent. syst. 1. 200. 61
 Illig. Col. Bor. 1. 268. 28.
 Oliv. Inf. 40. tab. 3. fig. 29.
 Payk. Fn. Sv. 1. 237. 52.
 Habitat in Europae paludibus.
- minutus.* 78. *D. flauescens*, elytris fuscis: margine flauo
 culado. Ent. syst. 1. 200. 63. *
 Linn. syst. Nat. 2. 667. 27. Fn. Sv. 778.
Dytiscus interruptus. Panz. Fn. Germ. 26. tab.
Dytiscus variolosus. Herbst. Arch. 5. 128 2
 III. 23. *Dytiscus obscurus*. Panz. Fn. Germ. 26. tab.
 vix differt.
 Illig. Col. Bor. 1. 264. 20.
 Oliv. Inf. 40. tab. 5. fig. 49.
 Degeer Inf. 4. tab. 15. fig. 21.
 Payk. Fn. Sv. 1. 229. 40.
 Habitat in Europae paludibus.
- pygmaeus.* 79. *D. ferrugineus*, elytris nigris: margine solo
 rugineo. Ent. syst. 1. 200. 64. *

- Habitat in Daniae aquis. Mus. D. de Sehestedt.
D. ouato affinis videtur, mihi haud rite notus.
80. D. ferrugineus, coleoptrorum disco nigro, ferrugineo reticulato. Ent. syst. 1. 200. 65. * *reticulatus.*
Habitat - - Mus. D. de Sehestedt. *III. 23*
81. D. fuscus, capite thoraceque flavis, antennis medio incrassatis. Ent. syst. 1. 201. 66. * *crassicornis.*
Illig. Col. Bor. 1. 267. 25.
Oliv. Inf. 40. tab. 4. fig. 34.
Herbst. Arch. 5. tab. 28. tab. 28. b. fig. 6. B.
Myll. Zool. Dan. 779. *IX.*
Payk. Fn. Sv. 1. 227. 38.
Degeer Inf. 4. 402. 10.
Habitat in Germaniae aquis.
82. D. planus, ater, elytris basi, pedibusque ferrugineis. Ent. syst. 1. 201. 67. * *flavipes.*
Habitat in Daniae paludibus. Dom. Lund.
83. D. ferrugineus, thorace nigro, elytris pallidis: futura maculaque nigris. Ent. syst. 1. 201. 68. * *pictus.*
Payk. Fn. Sv. 1. 233. 46.
Habitat in Germaniae aquis. Dom. Hybner.
84. D. ater, immaculatus, antennis pedibusque ferrugineis. Ent. syst. 1. 201. 69. * *nigrita.*
Payk. Fn. Sv. 224. 34.
Habitat in Germaniae aquis. Dom. Smidt.
85. D. ater, thorace elytrisque margine albis. Ent. syst. 1. 201. 70. * *pufillus.*
Habitat in Italiae aquis. Dr. Allioni.
86. D. niger, thoracis fascia antica, elytrorumque marginibus ferrugineis. Ent. syst. 1. 201. 71. * *paruulus.*
Payk. Fn. Sv. 1. 232. 45. *IX.*
Habitat in Daniae aquis. Mus. Dom. Lund.

Varietatem praecedentis credit D. Payk.
vix rite.

49. GYRINVS. *Palpi* quatuor filiformes.
Maxilla cornea, videntur
acutissima.
Labium emarginatum.
Antennae cylindricae.

natator.

1. *G. coerulescenti-nitidus*; elytris punctato-
tis; pedibus ferrugineis. Ent. syst. 1, 202
Linn. syst. Nat. 2. 567. 1. Fn. Sv. 779.
Geoff. Inf. 1. 194. 1. tab. 3. fig. 3.
Roef. Inf. 3. tab. 31.
Schaeff. Icon. tab. 134. fig. 5.
Illig. Col. Bor. 1. 271. 1.
Panz. Fn. Germ. 3. tab. 5.
Oliv. Inf. 41. tab. 1. fig. 1.
Degeer. Inf. 4. 355. 1. tab. 13. fig. 4.
Payk. Fn. Sv. 1. 238. 1.

Habitat in Europae lacubus, piscinis.

Velocissime supra aquam per orbem curfitat,
diffimus, foetens, laceffit vrinatur, et
bullam aëream hydrargyri colore secum

bicolor.

2. *G. cylindricus*, glaberrimus, supra niger, f
ferrugineus. Ent. syst. 1. 202. 2.
Payk. Fn. Sv. 1. 239. 2.

Gyrini corpus oblongum, glabrum, nitidum, margini
agile, capite buato, inserto, clypeo rotundato, sube
nato, oculis globosis, vesticalibus; antennis brevibus
fis. cylindricis, in fovea laterali capituli insertis; s
breui, transverso, marginato, laeuissimo; elytris ma
tis, abdomine brevioribus, obtusis; pedibus anticis
ctis; posticis quatuor brevissimis, compressis, nata
colore nigro, nitido.

Habitat in Sueciae aquis. Dom. Prof. Leske.

Species mihi adhuc dubia.

3. *G. substriatus*, virescens, elytris abbreviatis vni-australis.
dentatis. Ent. syst. 1. 203. 3. *

Oliv. Inf. 41. tab. 1. fig. 4.

Habitat in nouae Hollandiae aquis. Mus. D. Banks.

4. *G. laevis*, ater, opacus, pedibus quatuor posticis America-
testaceis. Ent. syst. 1. 203. 4. *

Oliv. Inf. 41. tab. 1. fig. 6.

Linn. syst. Nat. 2. 568. 2.

Habitat in Americae aquis.

5. *G. laevis*, oliuaceus, nitidus, elytris fascia postica micans.
nitidiore. Ent. syst. 1. 203. 5. *

Habitat in Aquapim Guineae. Dom. Isert.

6. *G. laevis*, niger, opacus, elytris ante apicem vni-praemor-
dentatis. sus.

Gyrinus Indus. Ent. syst. suppl. 65. 5. *

Habitat in Sierra Leon.

7. *G. laevis*, nitidissimus, elytris margine flauo, hoftatus.
apice vnispinosus.

Habitat in Americae meridionalis Insulis. Dom.

Lund.

Paullo maior *G. spinoso*, totus laevis, nitidissimus,
margine paululum prominulo, flauo, apice spina
porrecta, acutissima. Corpus cum pedibus fer-
rugineum.

8. *G. niger*, nitidus, thoracis elytrorumque margine spinofus.
flauo, elytris bispinosus. Ent. syst. 1. 203. 6. *

Oliv. Inf. 41. tab. 1. fig. 7.

Habitat in Coromandel. Mus. Dom. Banks.

9. *G. viridis*, nitens, thoracis elytrorumque margine striatus.
pallido, elytris striatis. Ent. syst. 1. 203. 7. *

Gyrinus capensis. Thunb. nou. sp. Inf. 1. 27.

Oliv. Inf. 41. tab. 1. fig. 2.

Habitat in Barbariae aquis. Dom. Desfonta

minutus.

10. *G. niger*, elytris striatis, subtus ferrugineu
dominis medio nigro. Ent. syst. suppl. 6

IX.

Habitat in Europae aquis. Mus. D. Bosc.

nitidulus.

11. *G. ater*, nitidus, elytris punctato-striatis
pedibusque rufis. Ent. syst. suppl. 204.

Habitat in Indiae aquis. Dom. Daldorff.

Magnitudo *G. minuti*. Corpus atrum, nit
Elytra punctato-striata, abdomine bre
Anus et pedes rufi.

strigosus.

12. *G. thorace nigro*: margine fasciaque test
elytris striatis: margine testaceo.

Habitat in Australasiae aquis. D. Billardie

Statura et magnitudo praecedentium.

aeneo-nitens, maculis duabus inter o
brunneis. Thorax laevis, nitidulus, fusc
dia margineque testaceis. Elytra striata,
margine testaceo. Corpus atrum, pedib
ftraceis.

rufipes.

13. *G. niger*, micans, elytrorum margine viref
pedibus quatuor posticis ferrugineis.

Habitat in Australasiae aquis. D. Billardier

Statura omnino praecedentis, at distinctus

tur. Caput, thorax, elytra laevia, nigra
di-micantia, margine elytrorum toto
Pedes postici ferruginei.

villosus.

14. *G. supra niger*, griseo-pubescens, subtus f

Gyrinus villosus. Illig. Col. Bor. 1. 271. 2

Gyrinus villosus. Myl. Zool. Dan. Prodr.

Habitat in Germaniae aquis.

Paullo minor *G. natatore*, minime nitidus e
griseis tectus.

50. ELOPHORVS. *Maxilla* cornea, apice membranacea.

Labium corneum, quadratum.

Antennae claua solida.

1. E. fuscus, thorace rugoso, elytrisque fusco-aeneis. *aquaticus*.

Ent. syst. 1. 204. 1.

Silpha aquatica. Linn. syst. Nat. 2. 563. 25.

Geoff. Inf. 1. 105. 15.

Degeer Inf. 4. 379. 5. tab. 15. fig. 5. 6.

Illig. Col. Bor. 1. 273. 2.

III. 24.

Herbst. Col. 5. tab. 49. fig. 7.

Oliv. Inf. 38. tab. 1. fig. 1.

Habitat ad aquas stagnantes frequens.

Conf. *Elophorus grandis* Illig. Col. Bor. 1. 272. 1.

Panz. Fn. Germ. 26. tab. 6.

Vix differre videtur, quamvis paullo maior.

2. E. griseus, thorace elytrisque sulcato - rugosis. *nubilus*.

Ent. syst. 1. 204. 2. *

Illig. Col. Bor. 1. 273. 4.

Herbst. Col. 5. tab. 49. fig. 8.

Habitat ad Germaniae aquas. Dom. Schulz.

3. E. thorace punctato, aeneo, elytris porcatis fu- *elongatus*.

fcis, Ent. syst. 1. 204. 3. *

Illig. Col. Bor. 1. 274. 5.

III. 24.

Panz. Fn. Germ. 26. tab. 7.

Oliv.

Elophori corpus paruum, oblongum, immarginatum, capite parvo, ovato, oculis rotundatis, prominulis, lateralibus; antennis brevis, ante oculos insertis; thorace planiusculo, transverso, saepius sulcato, inaequali; scutello minuto, rotundato; elytris rigidis, fornicatis, longitudine abdominis; pedibus brevis, cursoriis; tarsis quinquearticulatis; colore obscuro, saepius aeneo.

- Oliv. Inf. 38. tab. 1. fig. 4.
Habitat in Germaniae aquis. Dom. Helwig.
- humeralis.* 4. *E. fuscus*, thorace laeui, elytris crenato-fri-
puncto humerali testaceo. Ent. syst. 1.
4. *
Habitat in Germania. Dom. de Loewenskiöld.
- flavipes.* 5. *E. niger*, thorace fulcato, elytris striatis,
dibusque testaceis. Ent. syst. 1. 205. 5.
Oliv. Inf. 38. tab. 1. fig. 3.
Habitat in Sueciae aquis. Dom. Com. de Sou-
verey.
- crenatus.* 6. *E. niger*, thorace inaequali, elytris crenato-fri-
tis. Ent. syst. 1. 205. 6. *
Silpha elongata. Schall. Act. Hall. 1.
Habitat in Kiliae aquis.
- pygmaeus.* 7. *E. thorace marginato*, sublaeui, niger, ely-
tris striatis, apice pedibusque ferrugineis.
Ent. syst. 1. 205. 7. *
Habitat in Germaniae aquis. Dom. Smidt.
- minimus.* 8. *E. thorace laeui*, elytris striatis, corpore f-
immaculato. Ent. syst. 1. 205. 8. *
Elophorus griseus. Ent. syst. 1. 205. 8. *
Herbst. Col. 5. 153. 7. tab. 49. fig. 12.
Hydrachna riparia. Illig. Col. Bor. 1. 279.
Habitat in Europae aquis. Dom. Helwig.

31. CLERVS. *Palpi* quatuor:

anteriores filiformes,
posteriores longiores, securi-
formes.

Antennae filiformes, extrorsum
parum crassiores.

1. C. niger, elytris fascia triplici alba, basi rufis. *mutilla-*

Ent. syst. 1. 206. 1. *

rius.

Illig. Col. Bor. 1. 285. 6.

Panz. Fn. Germ. 31. tab. 12.

Schaeff. Icon. tab. 18. fig. 5.

III. 24.

Habitat Halae Saxonum. Dom. Schaller.

*O*s maxillis palpisque. *Palpi* quatuor inaequales:

anteriores vix maxilla longiores, filiformes,
quadriarticulati: articulo secundo paullo lon-
giori, ultimo breui, obtuso, adhaerentes maxil-
lae dorso; *posteriores* longiores, securiformes,
triarticulati: articulo secundo longiori, cylin-
drico, ultimo maiori, obconico, oblique trunca-
to, securiformi ligulae medio laterali adnat.

Mandibula cornea, arcuata, acuta. *Maxilla*
cornea, compressa, unidentata, apice truncata,
ciliata. *Ligula* porrecta, membranacea, bifida:
laciniis breuibus, rotundatis, distantibus. *La-*
bium

Ceri corpus oblongum, villosum, immarginatum, tardum;
capite obtuso, ovato, inserto, latitudine thoracis, *oculis*
magnis, globosis, lateralibus; *antennis* longitudine thora-
cis, ferratis, ante oculos insertis; *thorace* rotundato, mar-
gine inflexo, latitudine fere elytrorum; *scutello* parvo,
rotundato; *elytris* fornicatis, abdominis longioribus: mar-
gine haud inflexo; *pedibus* validis, cursoriis; *tarsis* qua-
driarticulatis; *colore* vario, obscuro.

Ceri sub arborum corticibus degant, laruis insectorum victi-
tantes.

- bium* breue, corneum, transuerfum, subginatum.
- dubius.* 2. *C. rufus*, elytris nigris: fascia duplici alba rufis. Ent. syst. 1. 206. 2. *
Habitat in America boreali. Dom. Yeats.
- ichneumonensis.* 3. *C. capite* thoraceque rufis, elytris nigris: media rufa strigaeque apicis alba. Ent. syst. 206. 3. *
Habitat in America boreali. Dom. Yeats.
- sphegeus.* 4. *C. niger*, fronte elytrorumque fascia cinerea. Ent. syst. 1. 207. 4. *
Habitat in America boreali. Mus. Dom. Bank.
- formicarius* 5. *C. niger*, thorace rufo, elytris fascia duplici albaque rubris. Ent. syst. 1. 207. 5.
Attelabus formicarius. Linn. Syst. Nat. 2. 8. Fn. Sv. 641.
Illig. Col. Bor. 1. 285. 7.
Schaeff. Icon. tab. 188. fig. 4.
Panz. Fn. Germ. 4. tab. 8.
Sulz. Hist. Inf. tab. 4. fig. 8.
Ross. Fn. Etr. 1. 147. 351.
Habitat in Europa et America.
- 6guttatus.* 6. *C. niger*, fronte cinerascete, elytris maculis tribus albis. Ent. syst. 1. 207. 6. *
Habitat in America. Dom. Drury.
- spinosus.* 7. *C. villosus*, niger, elytris maculis tribus albis apice spinosis; femoribusque anticis rufis.
Habitat in America meridionali. Smidt. Mus. de Sehestedt.
Paruus. Caput nigrum, labio flavo. Thorax niger, dorso parum impresso. Elytra punctata, nigra, maculis tribus transuersis, flavis apice spinoso, rufo. Abdomen nigrum, ru-

rufum. Pedes nigri, femoribus anticis clavatis, rufis.

Variat futura parum rufefcente.

8. *C. niger*, thorace rubro, elytris punctis duobus *amaculatus* albis. Ent. syst. 1. 207. 7. *

Attelabus amaculatus. Schall. Act. Hall. 1. 288. IV. 34

Habitat in Saxoniae Pinetis. Dom. Hybner.

9. *C. niger*, elytris fascia alba, basi rubris. Ent. syst. *unifasciatus*. 1. 207. 8. *

Attelabus. Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 13.

Roff. Fn. Etr. 1. 138. 352.

Habitat in Europae australioris, Africae Onopordo. Dom. Prof. Vahl.

52. TILLVS. *Palpi* quatuor inaequales:

anteriores filiformes,

posteriores securiformes.

Ligula membranacea, inter palpos porrecta, integra.

Antennae serratae.

1. *T. ater*, thorace villoso rufo. Ent. syst. 1. 77. 1. * *elongatus*.

Tillus elongatus. Oliv. Inf. 2: 22. 4. 1. tab. 1. fig. 1.

Clerus elongatus. Illig. Col. Bor. 1. 286. 8.

Chrysomela elongata. Linn. Syst. Nat. 2. 603.

22.

Panz.

IV. 53.

Tilli corpus elongatum, cylindricum, pilosum, immarginatum, tardum; *capite* subrotundo, inserto, *oculis* magnis, oblongis, lateralibus; *antennis* distantibus, longitudine thoracis, ferratis, sub oculis insertis; *thorace* cylindrico, angustato, elytris brevioribus; *scutello* minuto, rotundato; *elytris* rigidis, fornicatis, longitudine abdominis: margine haud deflexo; *pedibus* longiusculis, tenuibus, cursoriis; *tarsis* quinquearticulatis; *colore* nigro, nitidiusculo.

Panz. Fn. Germ. 43. tab. 16.
Habitat in Germania, Anglia.

Characterem naturalem generis in Entomologia
systematica propofui, adde tantum:

Ligula brevis, membranacea, inter palpos pro-
nens, rotundata, integra. Labium breue,
neum, transuersum, emarginatum.

denticornis. 2. *T. villosus*, niger, thorace rufo, antennarum
tutibus duobus vltimis dilatato-compressis,
tis. Ent. syst. suppl. 117. 2. *

Habitat in America boreali. Dom. Herschel.

Weberi. 3. *T. hirtus*, niger, thorace rufo, elytris coeruleis,
antennarum articulis vltimis dilatato-com-
pressis. Ent. syst. suppl. 118. 2. *

Habitat in Germania. Dom. Weber.

ambulans. 4. *T. glaber*, ater, elytris punctatis. Ent. syst.
78. 2. *

Tillus ruficollis. Illig. Col. Bor. 1. 286. 1.

I. 94. Panz. Fn. Germ. 8. tab. 9.

Habitat in Germania. Dom. Schneider.

Varietatem *T. ferraticornis* credit Dom. Illig.

ferraticornis. 5. *T. ater*, elytris testaceis. Ent. syst. 1. 78. 3.
Tillus ferraticornis. Oliv. Inf. 2. 22. 4. 2. t.
1. fig. 2.

III. 40. Habitat Parisiis. Mus. D. Bosc.

53. TRICHODES: *Palpi* quatuor inaequales: anteriores filiformes, posteriores breuiores, securiformes.

Antennae claua obliqua, perfoliata.

1. *T. cyaneus*, hirtus, elytris rufis: punctis quatuor *Spunctatus* nigris.

Clerus Spunctatus. Ent. syst. 1. 208. 9. °

Trichodes Spunctatus. Herbst. Col. 4. tab. 41. fig. 11.

Habitat in Hispaniae umbellatis. Dom. Prof. Vahl.

2. *T. rufus*, capite nigro, elytris basi coeruleis, medio rufis, apice violaceis. *tricolor*.

Clerus tricolor. Ent. syst. 1. 208. 10. °

Habitat in Africa aequinoctiali.

3. *T. pubescens* viridi-aeneus, elytris cyaneis: fasciis duabus coccineis. *2fasciatus*.

Clerus 2fasciatus. Ent. syst. 1. 208. 11. °

Trichodes 2fasciatus. Herbst. Col. 4. tab. 41. fig. 13.

Herbst. Arch. tab. 25. fig. 3.

Habitat in Sibiria. Mus. Dom. Banks.

4. *T.*

Trichodis corpus oblongum, hirtum, immarginatum, tardum; capite ovato, inserto, *elypeo* porrecto, cordato, emarginato, *oculis* magnis, reniformibus, lateralibus; *antennis* longitudine thoracis, ante oculos insertis; *thorace* tereti, antice crassiore, postice elytris angustiore; *scutello* minuto, rotundato; *elytris* rigidis, fornicatis, longitudine abdominalis; margine haud inflexo; *pedibus* longiusculis cursoriis; *tarsis* quadriarticulatis; *colore* vario.

Trichodis larvæ insectorum larvis siccitatis, declaratae in floribus degunt.

sipylus.

4. *T. viridis*, elytris fascia duplici flava interrupta thorace hirsuto.

Clerus sipylus. Linn. syst. Nat. 2. 620. 9.
Lud. Vlr. 63.

Clerus sipylus. Ent. syst. 1. 208. 12.
Habitat in Africa.

Ammios.

5. *T. hirtus*, viridis, elytris cyaneis: maculis tribus flavis; posticis lunatis.

Clerus Ammios. Ent. syst. 1. 208. 13.

Habitat in Ammi maiori Africae. Prof. Vahl.

apiarius.

6. *T. cyaneus*, elytris rubris: fasciis tribus coloratis; tertia terminali.

Clerus apiarius. Ent. syst. 1. 208. 14.

Herbst. Col. 4. tab. 41. fig. 12.

Illig. Col. Bor. 1. 383. 3.

Panz. Fn. Germ. 31. tab. 13.

III. 25.

Attelabus apiarius. Linn. syst. Nat. 2. 620.

Degeer. Inf. 5. 157. 1. tab. 5. fig. 3.

Habitat frequens in apum alveariis.

alvearius.

7. *T. hirtus*, cyaneus, elytris rufis: macula communi fasciisque tribus nigris; tertia abscissa.

Clerus alvearius. Ent. syst. 1. 209. 15. *

Geoff. Inf. 1. 304. 1. tab. 5. fig. 4.

Illig. Col. Bor. 1. 284. 4.

III. 25.

Panz. Fn. Germ. 31. tab. 14.

Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 4.

Schaeff. Icon. tab. 48. fig. 11.

Habitat in Europae floribus frequens.

Os maxillis palpisque. *Palpi* quatuor inaequales: *anteriores* paullo longiores, filiformes articulo primo tertioque breuissimis, secundo longiori, ultimo paullo crassiori, cylindricis adhaerentes maxillae dorso, *posteriores* breviores.

uio

uiores, triarticulati: articulo ultimo maiori, oblique truncato, securiformi; adnati ligulae basi inferiori. *Mandibula* cornea, arcuata, acutissima, medio unidentata. *Maxilla* membranacea, unidentata, apice rotundata, pilosa. *Ligula* brevis, membranacea, porrecta, ovata, submarginata, *Labium* breue, corneum, cordatum, apice emarginatum. *Antennae* claua obliqua, perfoliata.

8. *T. cyaneus*, abdomine pedibusque testaceis.

cyaneus.

Clerus cyaneus. Ent. syst. I. 209. 16. *

Habitat in India. Dom. Hybner.

9. *T. niger*, hirtus, elytris rufis: fasciis tribus nigris; tertio terminali.

crabroniformis.

Clerus crabroniformis. Ent. syst. I. 209. 17. *

Habitat in Oriente. Dom. Prof. Forstkahl.

54. CORYNETES. *Palpi* quatuor filiformes.

Maxilla bifida.

Ligula membranacea, rotundata.

Antennae claua perfoliata.

1. *C. nigro-coerulescens*, thorace villosa, pedibus nigris.

violaceus.

Der. I. 23.

Corynetis corpus paruum, oblongum, villosum, immarginatum, tardum; *capite* ovato, inferto, *oculis* oblongis, lateralibus, posticis; *antennis* longitudine thoracis: articulo primo maiori, incuruo; *thorace* subrotundo, margine parum prominulo, acuto, elytris angustiore; *scutello* minuto, rotundato; *elytris* rigidis, fornicatis, longitudine abdominalis; *pedibus* breuibus, validis; *tarsis* quinquearticulatis; *colore* violaceo, nitidulo.

Corynetis et laruae et imagines in cadaueribus degunt. Imagines rarius in floribus inueniuntur.

Dermestes violaceus. Ent. syst. 1. 230.

Dermestes violaceus. Linn. syst. Nat. 2

113. Fn. Sv. 422.

Corynetes violaceus. Payk. Fn. Sv. 1. 275

Clerus violaceus. Illig. Col. Bor. 1. 282.

Geoff. Inf. 1. 304. 2.

Degeer Inf. 4. tab. 5. fig. 13.

Panz. Fn. Germ. 5. tab. 7.

Herbst. Col. 4. tab. 41. fig. 8.

Habitat in Europae cadaveribus.

Os maxillis palpisque. *Palpi* quatuor inaequaliter filiformes: *anteriores* longiores, quadrangulati; articulo primo breui, orbiculato, quibus subaequalibus, ultimo truncato, adhaerentes maxillae dorso; *posteriores* triarticulati articulo primo secundoque breuibus, tertio longiori truncato; adnati ligulae medio anteriori. *Mandibula* cornea, valida, dentata, bifida. *Maxilla* membranacea, bifida: laciniis truncatis; exteriori maiore. *Ligula* membranacea, elongata, apice rotundata, integra. *Abdominum* corneum, transuersum.

rufipes.

2. *C. nigro-coeruleus*, thorace villosus, pedibus rufis.

Dermestes rufipes. Ent. syst. 1. 230. 17.

Anobium rufipes. Thunb. nou. Inf. spec. 1. 1.

Habitat in Africa. Mus. Dom. Banks.

ruficollis.

3. *C. violaceus*, thorace elytrorumque basi rufis

Dermestes ruficollis. Ent. syst. 1. 230. 18.

Anobium ruficolle. Thunb. nou. sp. 1. 8. fig.

Habitat in India orientali. Mus. Dom. Banks.

abdominalis.

4. *C. nigro-coeruleus*, abdomine rufo.

Habitat in India.

Statura omnino praecedentium, at distinctus, corpore minus villosus, abdomineque rufo.

5. *C. elongatus*, hirtus, violaceus, thoracæ abdomi- *sanguini-*
neque rufis. *collis.*

Dermestes sanguinicollis. Ent. syst. I. 231. 19.*

Panz. Naturf. 24. 10. tab. 1. fig. 13.

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

55. NOTOXYS. *Palpi* quatuor securiformes.

Maxilla videntata.

Antennae extrorsum crassiores.

1. *N. niger*, elytris porcatis. Ent. syst. I. 210. I. * *porcatus.*

Habitat in terra Diemenii. Mus. Dom. Banks.

2. *N. pubescens*, niger, violaceo-nitidus, elytris *violaceus.*

laevibus; punctis tribus laevis. Ent. syst. I.

210. 2.*

Habitat in noua Zelandia. Mus. Dom. Banks.

3. *N. pubescens*, elytris nigris: fasciis tribus palli- *mollis.*

dis. Ent. syst. I. 211. 5.

Atelabus mollis. Linn. syst. Nat. 2. 621. 11.

Fn. Sv. 642.

Clerus fuscus Geoff. Inf. Y. 305. 3.

Clerus mollis. Illig. Col. Bor. 1. 285. 5.

Degeer. Inf. 5. 159. 2. tab. 5. fig. 6.

Panz. Fn. Germ. 5. tab. 6.

I. 20.

Schae f. Icon. tab. 60. fig. 2.

Habitat in Europa, sub arborum corticibus; victi-
tans laruis aliorum insectorum.

4-N.

Notoxi corpus elongatum, fere cylindricum, pilosum, immar-
ginatum, tardum; capite ovato, inserto, clypeo brevi, ro-
tundato, oculis subrotundis, prominulis; antennis longitu-
dine thoracis, ante oculos insertis; thorace cylindrico, po-
stice angustiore, vix latitudine elytrorum; scutello paruo,
rotundato; elytris molliusculis, longitudine abdominis;
pedibus tenuibus, cursoriis; femoribus subclauatis, tarsis
quadriarticulatis; colore vario, obscuro.

- Indicus.* 4. *N.* capite thoraceque obscuris, elytris punctato-friatis. Ent. syst. App. 444. Habitat in India. Dom. de Paykull.
- Chinensis.* 5. *N.* pubescens, fuscus, elytris punctatis fasciis inaequalibus nigris. Ent. syst. App. 4. *
Habitat in China. Dom. de Paykull.

56. ANTHICVS. *Palpi* quatuor inaequaliores anteriores securiformes
Ligula membranacea, cata, integra.
Antennae filiformes.

* *Thorace* cornuto.

monoceros. 1. *A.* thoracis cornu protenso, elytris punctis, sciaque nigris.

Nootoxus monoceros. Ent. syst. 1. 211. 6.

Meloe monoceros. Linn. syst. Nat. 2. 681.

Attelabus monoceros. Linn. Fn. Sv. 638.

Anthicus monoceros. Payk. Fn. Sv. 1. 254.

Geoff. Inf. 1. 356. 1. tab. 6. fig. 8.

Illig. Col. Bor. 1. 287. 1.

Ml. 25 Panz. Fn. Germ. 26. tab. 8.

Herbst. Arch. tab. 25. fig. 4.

Sch

Anthici corpus paruum, oblongum, immarginatum, capite magno, ovato, exserto, thorace latiore, oculis globosis, vix prominulis, lateratibus, posticis tenuis breuibux, distantibus, ad basin mandibularum; thorace tenui, cylindrico, postice parum angustiore; elytris angustiore; scutello minuto; elytris rigidis, tude abdominis: margine haud inflexo; pedibus ulculis, tenuibus, cursoriis; tarsis quadriarticulatis; obscuro.

Schaeff. Icon. tab. 188. fig. 3.

Habitat in Europae floribus.

2. A. thoracis cornu protenso, elytris fasciis tribus *cornutus*.
 atris.

Notoxus cornutus. Ent. syst. 1. 211. 7. * VII. 17

Roff. Fn. Etr. 1. 139. 354. β. tab. 2. fig. 14.

Habitat in Iuglande regia Italiae. Mus. D. Bosc.

3. A. thoracis cornu protenso, elytris atris immacu- *Rhinoceros*
 latis.

Notoxus Rhinoceros. Ent. syst. suppl. 66. 7. *

Habitat in Germania. Mus. D. de Sehestedt. III. 27.

4. A. thoracis cornu protenso, testaceus, elytris fascia *Monodon*.
 nigra.

Habitat in Carolina. Mus. Dom. Bosc.

Magnitudo et summa affinitas A. monocerotis, at
 caput et thorax testacea, immaculata. Elytra
 puncto paruo baseos, fasciaque multo angustio-
 re, nigris.

Os maxillis palpisque. Palpi quatuor inaequales,
anteriores longiores, quadriarticulati: arti-
 culo baseos brevissimo, secundo longiori, tertio
 globoso, quarto securiformi, adhaerentes ma-
 xillae dorso, *posteriores* brevissimi, filiformes,
 triarticulati, adnati ligulae medio. *Mandibula*
 brevis, cornea, arcuata, edentula, apice bifida.
Maxilla membranacea, cylindrica, obtusa, uni-
 dentata. *Ligula* membranacea, truncata, inte-
 gra. *Labium* breue, corneum, integrum.

** *Thorace mutico.*

5. A. niger, capite thoraceque rufis.

Habitat in America meridionali. Dom. Smidt.

ruficollis.

Mus. D. de Sehestedt.

T

A. flo-

- A. florali triplo maior.** Caput rufum, ore f
Antennae filiformes, nigrae, articulo v
crassiori, longiori, cylindrico. Thorax r
datus, laevis, rufus, nitidus, immacul
Elytra vix striata, cyaneo-nigra, nitida.
pus nigrum.
- fulvicollis.* **6. A. ater,** thorace rotundato rnf.
Habitat in America meridionali. Mus. D. L
Statura et summa affinitas praecedentis. C
cum antennis atrum. Thorax rotundatus,
uis, rufus, immaculatus. Elytra pubesce
nigra. Corpus atrum.
- abdomina-*
lis. **7. A. niger,** thorace rufo, elytris basi testaceis, a
nigris.
Habitat in America meridionali. Mus. Dom
Sehestedt.
Statura et summa affinitas praecedentium. C
cum antennis nigrum. Thorax rotundatus
fus, immaculatus. Elytra pubescentia, bas
ftacea, apice nigra. Corpus nigrum, abdom
testaceo, apice nigro. Pedes nigri, femor
basi testaceis.
- fuscipennis.* **8. A. ater,** nitidus, elytris obscuris.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. I
Dom. Lund.
Statura omnino praecedentium. Antennae ob
rae. Caput et thorax atra, nitida, immacu
Elytra pubescentia, fusca, obscura, immacu
Corpus nigrum.
- fasciatus.* **9. A. pubescens,** niger, elytris fascia alba.
Habitat in America meridionali. Dom. S
Mus. D. de Sehestedt.
Paruus. Caput et thorax pubescentia, n
Elytra punctata, pubescentia, nigra: f

media alba. Pedes nigri, femoribus basi tibiisque albis.

10. *A. pubescens*, cyaneus, thorace rufo: medio *thoracicus*.
cyaneo: puncto vtrinque impresso.

Habitat in Carolina. Mus. Dom. Bosc.

Paruus. Caput cyaneum. Thorax rufus, in medio cyaneus, punctis duobus dorsalibus impressis.

Elytra pubescentia, cyanea, immaculata. Corpus cyaneum.

11. *A. thorace ferrugineo*, elytris testaceis: puncto *2punctatus* nigro.

Notoxus 2punctatus. Ent. syst. 1. 212. 8. * *III. 26*

Habitat in Germania, Mus. D. Lund.

12. *A. ater*, nitidus, thorace ferrugineo, femoribus *pedestris*.
anticis dentatis.

Notoxus pedestris. Ent. syst. suppl. 69. 10. *

Notoxus pedestris. Ross. Fn. Etr. 1. *I. 11*

Habitat in Italia. Dom. Hybner.

13. *A. niger*, elytris fasciis duabus ferrugineis. *antherinus*.

Notoxus antherinus. Ent. syst. 1. 212. 9.

Meloe antherina. Linn. syst. Nat. 2. 681. 16.

Fn. Sv. 829.

Illig. Col. Bor. 1. 238. 3.

Panz. Fn. Germ. 11. tab. 14. *I. 20.*

Habitat in Europae floribus agilis, cursitans.

14. *A. capite thoraceque ferrugineis*, elytris flavescentibus: fasciis duabus nigris. *3fasciatus*.

Habitat in America meridionali. D. Smdit. Mus.

D. de Sehestedt.

Statura parua *A. antherini*. Caput et thorax ferruginea, immaculata. Elytra brevia, flavescentia, fasciis tribus nigris.

15. *A. niger*, thorace elytrorumque basi ferrugineis. *floralis*.

Notoxus floralis. Ent. syst. 1. 212. 10. *

Meloe floralis. Linn. syst. Nat. 2. 212. 10.

Illig. Col. Bor. 1. 288. 4.

L. II Panz. Fn. Germ. 23. tab. 4.

Habitat in Europae floribus.

bicolor.

16. *A. niger*, elytris ferrugineis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Statura parva praecedentis. Caput et thorax anticè angustata, nigra, immaculata. Elytrâ laevia, testacea.

limbatus.

17. *A. ater*, nitidus, thoracis limbo ferrugineo. Ent. syst. suppl. 70. 11. *

Habitat Kiliae.

hirtellus.

18. *A. hirtus*, ater, thorace obscuro, elytris puncto baseos ferrugineo.

Notoxus hirtellus. Ent. syst. suppl. 70. 11. *

III. 17. *Notoxus hirtellus*. Panz. Fn. Germ. 35. tab. 3.
Habitat in Germania. Dom. Dr. Panzer.

populneus.

19. *A. laevis*, testaceus, capite nigro.

Notoxus populneus. Ent. syst. suppl. 70. 11. *

III. 17. *Notoxus populneus*. Panz. Fn. Germ. 35. tab. 4.
Habitat in Germaniae Populo. Dr. Panzer.

Corpus minutum.

minutus.

20. *A. ater*, nitidus, antennis pedibusque pallescens.

Notoxus minutus. Ent. syst. 1. 212. 11. *

II. II.

Bryaxis Schneideri Illig. Col. Bor. 1. 293. 11.
Habitat in Europae floribus.

Helwigii.

21. *A. testaceus*, thorace globoso, elytris connatis.

Pselaphus Helwigii. Illig. Col. Bor. 1. 292. 3.

Habitat in Germania, sub cortice Pini. Mus. D.
Lund.

Corpu

Corpus minutum. Thorax globosus. Elytra con-
nata, gibba, subtilissime punctata.

*** *Elytris abbreviatis.*

22. A. ater; elytris abbreviatis sanguineis. *sanguineus.*

Staphylinus sanguineus. Ent. syst. I. 529. 51.

Linn. syst. Nat. 2. 685. 25.

Pselaphus sanguineus. Illig. Col. Bor. I. 291. 2.

Pselaphus Heisei. Herbst. Col. 4. tab. 39. fig. 9.

Oliv. Inf. 42. tab. 6. fig. 54.

Panz. Fn. Germ. II. tab. 19.

Payk. Monogr. 39. 29.

Habitat in Europa.

I. 62

23. A. testaceus, immaculatus, elytris abbreviatis. *Dresdenis.*

Pselaphus Dresdenis. Illig. Col. Bor. I. 290. 1.

Herbst. Col. 4. 110. 2. tab. 39. fig. 11. a.

Habitat in Germaniae Museis.

Pselaphi Auctorum, mihi haud rite examinati, ab hoc genere differre videntur. Habitus quidem quodammodo conuenit, at palpi, vti mihi videtur, filiformes, ideoque ab Anthicis distincti.

IX.

57. PSOA. Palpi quatuor inaequales: articulo ultimo crassiori, ouato.

Antennae perfoliatae: articulo ultimo acuto.

1. P. villosa, aenea, elytris ferrugineis.

Psoa Viennensis. Herbst. Col. 7. 214. tab. 109.

fig. 5.

Habitat in Germania.

Viennensis.

VIII-17.

Caput

Psoae corpus elongatum, cylindricum, immarginatum, agile; capite ouato, inserto, latitudine thoracis; antennis longitudine thoracis, ante oculos insertis; oculis magnis, globosis,

Caput et thorax villosa, aenea. Elytra brunnea.
Character naturalis generis adhuc desideratur.
Specimen meum mutilatum.

Americana. 2. *P. atra*, nitida, immaculata.

Habitat in America meridionali. Mus. D. Lund.
Huius generis mihi videtur animalculum haud rite
examinatum. Corpus paullo minus, atrum,
laeve, nitidum, immaculatum. Antennae per-
foliatae.

58. CANTHARIS. *Palpi* quatuor securiformes.

Maxilla bifida.

Labium integrum.

Antennae filiformes.

fusca.

1. *C. thorace marginato*, rubro: macula nigra, ely-
tris fuscis. Ent. syst. 1. 213. 1.

Linn. syst. Nat. 2. 647. 2. Fn. Sv. 700.

Telephorus fusca. Oliv. Inf. 26. 6. 1. tab. 1.
fig. 1.

Degeer Inf. 4. 60. 1. tab. 1. fig. 12.

Geoff.

basis, lateralibus; *thorace* hirsuto, plano, vix marginato;
scutello minuto, rotundato; *elytris* rigidis, longitudine ab-
dominis: margine haud deflexo; *pedibus* longiusculis, ten-
nibus, cursoriis; *tarsis* quadriarticulatis; *colore* vario,
obsuro.

Cantharidis corpus oblongum, molle, glabrum, depressiuscu-
lum, agile; *capite* ovato, deflexo, inserto, *oculis* globosis,
prominulis, lateralibus; *antennis* approximatis, inter ocu-
los insertis, *thorace* longioribus; *thorace* plano, margina-
to, rotundato; *scutello* rotundato; *elytris* brevibus, mol-
libus, incumbentibus, longitudine abdominis; *pedibus* lon-
giusculis, tennibus, cursoriis; *tarsis* quinquearticulatis;
colore obsuro, minime nitido.

- Geoff. Inf. 1. 170. 1.
 Illig. Col. Bor. 1. 295. 2.
 Frish. Inf. 12. tab. 3.
 Sulz. Inf. tab. 5. fig. 33.
 Schaeff. Icon. tab. 16. fig. 10. 11.
 Voet. Col. tab. 46. fig. 2.
 Habitat frequens in Europae sepibus.
 Saeuit in propriam speciem.
2. *C. thorace marginato, testacea, immaculata.* Ent. *livida.*
 fyft. 1. 213. 2.
Telephorus lividus, Oliv. Inf. 26. 7. 2. tab. 2.
 fig. 8.
Telephorus flauus. Degeer Inf. 4. 70. 2. V. 11.
 Linn. fyft. Nat. 2. 647. 3. Fn. Sv. 701.
 Geoff. Inf. 1. 171. 2.
 Illig. Col. Bor. 1. 296. 3.
 Voet. Col. tab. 46. fig. 1.
 Schaeff. Icon. tab. 16. fig. 9-12.
 Habitat in Europa, America boreali.
3. *C. fusca, thorace marginato, rufo, immaculato, dispar.*
 femoribus anoque rufis. Ent. fyft. 1. 213. 3.*
 Habitat in Germania. Dom. Smidt.
4. *C. thorace marginato nigro, ore abdomineque fla-* *abdomina-*
nis, elytris coerulefcantibus. Ent. fyft. suppl. *lis.*
 67. 3.* V. 18. 13
 Habitat in Galliae Alpibus. Dom. Brongiart.
5. *C. thorace marginato anoque fuluis, corpore atro.* *analis.*
 Ent. fyft. 1. 214. 4.*
 Habitat in Hungaria. Dom. Smidt.
6. *C. thorace marginato, testaceo: macula nigra, viridifcens.*
 elytris viridibus, antennis pedibusque testaceis.
 Ent. fyft. 1. 214. 5.*
 Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.
7. C.

- obscura.* 7. *C. thorace marginato: marginibus rubris, corpore nigro.* Ent. syst. f. 214. 6.
Linn. syst. Nat. 2. 648. 5. Fn. Sv. 706.
Oliv. Inf. 26. 8. 3. tab. 2. fig. 10.
Illig. Col. Bor. f. 295. 1.
Act. Nidros. 3. 386. tab. 6. fig. 5.
Schaeff. Icon. tab. 16. fig. 8.
Habitat in Europa.
- Carolina.* 8. *C. thorace marginato, nigra, thoracis limbo pallido.*
Habitat in Carolina. D. Weber.
Statura et magnitudo *C. obscurae*, at tota nigra, thōracis limbo solo toto pallido.
- nigricans.* 9. *C. thorace marginato: limbo, ore pedibusque rufis.*
Cantharis nigricans. Illig. Col. Bor. f. 298. 5.
Habitat in Germania.
Affinis certe *C. pellucidae*, attamen distincta videtur. Differt thoracis disco nigro, tibiisque posticis folis nigris.
- pellucida.* 10. *C. thorace marginato, rufo, vertice, elytris tibiisque posticis fuscis.* Ent. syst. f. 214. 7. *
Habitat in Germania. Dom. Smidt.
- ruficornis.* 11. *C. nigra, antennis thoracisque margine rufis.*
Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff.
Statura et magnitudo praecedentis. Caput nigrum, antennis rufis. Thorax ater, nitidus, lateribus late rufis. Elytra laevia, grisea, apice subferruginea. Corpus nigrum.
- limbata.* 12. *C. thorace marginato, fronte elytrorumque marginibus rufis, corpore nigro.* Ent. syst. f. 215. 8. *
Habitat in Iamaica. Mus. D. Banks.

13. *C. testacea*, pectore abdomineque nigris. *rubens.*
Cantharis clypeata. Illig. Col. Bor. 1. 299. 7?
 Habitat in Germania.
 Statura et magnitudo omnino *C. lateralis*. Antennae totae rufae. Caput testaceum, vertice obscuriore. Thorax marginatus, testaceus, disco paullo obscuriore. Elytra laevia, testacea, immaculata. Pectus nigrum. Abdomen nigrum, segmentorum marginibus testaceis.
14. *C. thorace marginato*, rubro, corpore fusco, ely- *lateralis.*
 tris margine exteriori flavescente. Ent. syst. 1.
 215. 9. *
 Linn. Syst. Nat. 2. 648. 6. Fn. Sv. 707.
Telephorus lateralis. Oliv. Inf. 26. 15. 15. tab.
 3. fig. 12.
 Habitat in Europae hortis.
15. *C. thorace marginato*, flavo: macula viridi, ely- *smaragdula.*
 tris viridibus nitidis. Ent. syst. 1. 215. 10. *
Telephorus smaragdulus. Oliv. Inf. 26. 9. 6.
 tab. 2. fig. 13.
 Habitat in Brasilia. Mus. D. Banks.
16. *C. thorace marginato*, obscure fusca, antenna- *trifidis.*
 rum articulo primo pallido. Ent. syst. suppl.
 67. 9. * *VII. 18. 13*
 Habitat in Galliae Alpibus. D. Brongniart.
17. *C. thorace marginato*, atro, postice rubro, ely- *lugubris.*
 tris obscuris, abdomine rufo.
 Habitat in Amboina. D. Billardiere.
 Statura praecedentium. Caput et thorax atra, subnitida, thorace marginato, margine postico rufo. Elytra nigra, obscura. Pectus et abdomen rufa. Pedes nigri.
18. *C. thorace marginato*, corpore toto atro. Ent. *atra.*
 syst. 1. 215. 11. Linn. syst. Nat. 2. 649. 16.
 Illig.

Illig. Col. Bor. I. 301. 10.

Oliv. Inf. 26. 13. 12. tab. I. fig. 3.

Habitat in Europa boreali.

marginata. 19. C. thorace marginato, nigra, thoracis elytrorumque marginibus rubris. Ent. syst. I. 216.
Habitat in America. Dom. Aiton.

brunnicollis. 20. C. thorace marginato oreque rufis, elytrorum marginibus pallidis, corpore nigro.

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Media. Caput cum antennis nigrum, ore latefo. Thorax laevis, marginatus, rufus, immaculatus. Elytra laevis, nigra, margine futurac pallidis. Corpus nigrum, femoribus rufis, a ce nigris.

fasciollis. 21. C. thorace marginato, abdominisque lateralibus fulvis, corpore atro.

Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff.

Media. Caput atrum, nitidum. Thorax marginatus, fulvus, immaculatus. Elytra atra. Abdomen nigrum, marginibus parum fulvis. Pedes fulvi.

diadema. 22. C. thorace marginato, nigra, fascia sub oculo thoracisque margine rufis.

Habitat in America boreali. Dom. Mauerhoff.

Statura praecedentium. Caput nigrum, sub oculo fasciaque sub antennis rufis. Thorax planus, marginatus, niger, margine rufus. Elytra laevis, nigra, immaculata. Corpus et pedes nigri.

amaculata. 23. C. thorace marginato, ferrugineo: macula nigra, elytris testaceis: macula apicis nigra. Ent. syst. I. 216. 13. *

Telephorus amaculatus. Oliv. Inf. 26. 11. tab. 2. fig. 11.

Te

Telephorus Pensylvanicus. Degeer. Inf. 4. tab.

17. fig. 15.

Habitat in America septentrionali. Mus. D. Banks.

. C. thorace marginato, atra, elytris pallidis, apice pallipes.

fuscis. Ent. syst. 1. 216. 14. *

Telephorus pallidus. Oliv. Inf. 26. 14. 13. tab.

1. fig. 5.

Habitat in Germania. Dom. de Hattorff.

Varietatem C. pallidæ credit Illiger.

. C. thorace marginato, nigra, elytris anoque testaceis. *barbara*.

Habitat in Barbaria. Dom. de Rehbinder.

Statura omnino C. pallipedis. Antennæ nigrae, basi pallidæ. Caput et thorax atra, nitida, immaculata. Elytra testacea, immaculata. Corpus nigrum, ano testaceo.

. C. thorace marginato pallido: fascia abbreviata *haemorrhoidalis*.

antica maculaque media atris, elytris pallidis, ano pedibusque rufis. Ent. syst. 1. 216. 15. *

Habitat in agro Ienenfi. Dom. Daldorff.

. C. thorace marginato atro, elytris pedibusque pallida, pallidis, testaceis. Ent. syst. 1. 217. 16. *

Telephorus pallidus. Oliv. Inf. 26. 14. 14. tab.

2. fig. 9.

VIII. 18

Geoff. Inf. 1. 173. 6.

Illig. Col. Bor. 1. 301. 9.

Habitat Kiliae. Dom. Daldorff.

. C. atra, thorace abdomineque rufis. Ent. syst. 1. *ruficollis*.

217. 17. *

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 6.

Habitat in Anglia.

. C. thorace marginato rufo, elytris nigris: marginæ dimidiato albo.

Habi-

Habitat in America meridionali. Smidt. Mus.
de Sehestedt.

Parva. Caput nigrum, ore rufo. Antennae
grae, articulo primo rufo. Thorax marginatus
rufus, immaculatus. Elytra laevia, nigra,
linea a basi ultra medium albo. Corpus nigrum,
pedibus rufis.

flavipes.

30. testacea, capite thoracis macula media ely-
trae dimidiato nigris. Ent. syst. 1. 217. 1.
Telephorus flavipes. Oliv. Inf. 26. 10. 7. ta-
bul. fig. 13.

Pall. Icon. tab. F. fig. 23.

Habitat in China. Mus. Dom. Banks.

melanocephala.

31. C. testacea, capite, elytrorum apicibus tibiis
nigris. Ent. syst. 1. 217. 19. *

Telephorus melanocephalus. Oliv. Inf. 26.
5. tab. 2. fig. 7.

Habitat in Coromandel. Mus. D. Banks.

dimidiata.

32. C. thorace marginato, testacea, elytris dimi-
diato-cyaneis. Ent. syst. suppl. 68. 19. *

Habitat in Zeylon. Dom. de Paykull.

apunctata.

33. C. thorace marginato: punctis duobus ni-
gris, elytris testaceis, apice nigris. Ent. syst. 1.
21. *

Telephorus apunctatus. Oliv. Inf. 26. 15.
tab. 3. fig. 16.

Vell. Ent. 1. 297. 26. tab. 1. fig. 30.

Habitat Lipsiae.

laeta.

34. C. thorace marginato fulvo, elytris testaceis
apiceque atris. Ent. syst. 1. 218. 22. *

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

fulvicollis.

35. C. thorace marginato pedibusque fulvis, co-
llo nigro. Ent. syst. 1. 218. 23. *

Telephorus thoracicus. Oliv. Inf. 26. 12. 10.
tab. 1. fig. 2.

Degeer Inf. 4. 72. 5.

Hilig. Col. Bor. 1. 302. 11.

Habitat in Germania. Dom. Smidt.

6. *C. thorace marginato fulvo: linea media nigra, lineola.*
corpore nigro. Ent. syst. 1. 219. 24. *

Habitat in India orientali. Mus. Dom. Lund.

7. *C. thorace marginato, nigra, elytris abbreviatis, abbreviata.*
antennis basi apiceque albis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.

Parva, tenera. Antennae basi apiceque albae.
Caput nigrum. Thorax marginatus, niger, mar-
gine parum pallido, nitido. Elytra abdomine
quadruplo breviora, nigra. Corpus nigrum, ab-
dominis segmentis apice pallidis. Pedes pallidi.

8. *C. thorace marginato rufo, elytris abbreviatis brevispinis*
nigris, antennis apice albis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
Dom. Lund.

Statura et magnitudo omnino praecedentis. An-
tennae nigrae, articulo primo rufo, ultimis al-
bidis. Caput nigrum. Thorax marginatus, ru-
fus, immaculatus. Elytra valde abbreviata,
apice attenuata, nigra. Corpus rufescens, fe-
moribus apice nigris.

39. *C. thorace marginato nigro: margine pallido, manca.*
elytris abbreviatis, antennis ferratis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.

Praecedentibus minor. Antennae valde ferratae,
nigrae. Caput nigrum, ore pallido. Thorax
marginatus, niger, margine exteriori pallido.
Elytra

- Elytra valde abbreviata, nigra. Corpus p
dum.
- avistata.* 40. C. thorace marginato testaceo: macula obl
nigra, elytris testaceis: vittis duabus apice
euntibus nigris. Ent. syst. suppl. 69. 27.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Dom. Lund.
- longicornis.* 41. C. thorace rotundato, lutea, elytris testa
apice nigris, antennis longitudine corporis.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. I
D. de Sehestedt.
Statura omnino C. nigripedis, at paullo mi
Antennae elongatae, basi nigrae, articulis
mis pallidis. Caput luteum, vertice obsc
Thorax rotundatus, luteus, immaculatus. I
tra laevia, testacea, apice fusca. Corpus
pedibus luteum.
- nigripes.* 42. C. thorace rotundato luteo, abdomine, ped
elytrorumque apicibus atris. Ent. syst. 1. 2
25. *
Habitat in Europa boreali. Mus. Dom. Lund.
- melanura.* 43. C. thorace rotundato, corpore luteo, elytris
ce nigris, pedibus rufis. Ent. syst. 1. 219.
Linn. syst. Nat. 2. 651. 27. Fn. Sv. 719.
Oliv. Inf. 26. tab. 3. fig. 21.
Illig. Col. Bor. 1. 299. 6.
Geoff. Inf. 1. 173. 5.
Schaeff. Icon. tab. 58. fig. 7.
Voet. Col. tab. 46. fig. 2.
Habitat in Europae hortis.
- pectoralis.* 44. C. thorace rotundato, testacea, antennis, ely
rum apice pedibusque nigris.
Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff.
Statura et summa affinitas C. melanurae. Ca
testaceum, antennis nigris. Thorax testace
im

- immaculatus. Elytra testacea, apice nigra.
Corpus testaceum, pedibusque nigris.
- C. thorace rotundato flavo: punctis tribus ni- *vittata.*
gris, elytris fuscis: margine vittaque flavis.
Ent. syst. I. 219. 27. *
- Habitat in Carolina. Mus. Britann.
- C. thorace rotundato rufo, corpore atro nitidu- *nitidula.*
lo. Ent. syst. I. 220. 28. *
- Habitat in Germania. D. Smidt.
- C. thorace rotundato testaceo, elytris fuscis: *lineata.*
vitta margineque omni albidis.
Habitat in Americae Insulis. Smidt. Mus. D. Lund.
Statura et magnitudo C. melanurae. Antennae
variegatae: articulis basi testaceis, apice fuscis.
Caput et thorax testacea, immaculata. Elytra
laevia, fusca, margine sutura vittisque duabus:
interiore minore fere obsoleta, albis. Corpus
testaceum. Pedes testacei geniculis nigris.
- C. thorace marginato rufo, elytris testaceis, cor- *bicolor.*
pore nigro. Ent. syst. suppl. 69. 29. *
- Habitat in Seelandia. Mus. D. Lund.
- C. thorace marginato, pubescens, corpore nigro. *nigra.*
Ent. syst. I. 220. 30.
- Dermestes niger.* Linn. syst. Nat. 2. 564. 28.
Fn. Sv. 439.
- Cantharis pilosa.* Scop. Carn. 131.
Habitat frequens in Europae floribus.
forte potius Dasytes.
- C. thorace marginato rufo: macula nigra, ely- *pulicaria.*
tris atris. Ent. syst. I. 220. 31.
- Telephorus pulicarius.* Oliv. Inf. 26. 16. 17.
tab. 3. fig. 20.
- Habitat in Germania. Dom. de Hattorff.

minima.

51. C. thorace marginato rufo: macula nigra, pore fusco, elytris apice flavis. Ent. syst. 220. 32. *

Linn. syst. Nat. 2. 649. 12. Fn. Sv. 713.

Telephorus minimus. Oliv. Inf. 26. 17. 19.

1. fig. 6. tab. 3. fig. 15.

Geoff. Inf. 1. 372. 1. tab. 7. fig. 1.

Habitat in Europae hortis.

Larua antice posticeque attenuata, virefcens, fco varia in Betula alba.

testaceo.

52. C. thorace marginato flavo: macula nigra, pore nigro, elytris pedibusque liuidis. Ent. syst. 1. 220. 33.

Linn. syst. Nat. 2. 649. 15. Fn. Sv. 714.

Telephorus testaceus. Oliv. Inf. 26. 12.

tab. 3. fig. 19.

Illig. Col. Bor. 1. 300. 8.

Geoff. Inf. 1. 174. 6.

Dégeer. Inf. 4. 71. 4.

Schaeff. Icon. tab. 16. fig. 15.

Habitat in Europae hortis.

V. H.

biguttata. 53. C. thorace marginato: medio atro, elytris breuiatis nigris apice flavis. Ent. syst. 1. 234.

Linn. syst. Nat. 2. 648. 11. Fn. Sv. 712.

Telephorus aguttatus. Oliv. Inf. 26. 16.

tab. 2. fig. 12.

I. 21. Geoff. Inf. 1. 372. 1. tab. 7. fig. 2.

Dégeer Inf. 4. 77. 10.

Habitat in Europa frequens.

Cardiacae. 54. C. thorace marginato, atra, elytris apice purp. sanguineo, antennis pectinatis. Ent. syst. 221. 35. *

Cantharis Cardiacae. Linn. syst. Nat. 2. 648. 13. Fn. Sv. 713.

13. Fn. Sv. 713.

M

Malachius Cardiacae. Payk. Fn. Sv. I. 273. 5.
 Habitat in Suecia. Dom. de Paykull.
 Antennae maris valde pectinatae.

9. MALACHIVS. *Palpi* quatuor filiformes:
 articulo ultimo setaceo.
Maxilla unidentata.
Labium membranaceum,
 rotundatum.
Antennae filiformes.

M. cyaneus, antennis, elytrorum fasciis duabus ~~pubescenter~~
 pedibusque ferrugineis.

Habitat in Guinea. Mus D. Lund.

M. aeneo paullo maior. Caput cyaneum, ore antennisque ferrugineis. Thorax laevis, cyaneus, nitidus. Elytra sublaevia, cyanea: fasciis duabus ferrugineis: altera in medio dentata, ad marginem dilatata, altera apicis. Abdomen ferrugineum, linea media cyanea. Pedes ferruginei.

M. elytris flavis: fasciis tribus cyaneis, baseos ~~laetibus~~
 Innata.

Cantharis fuscipennis Ent. syst. I. 218. 20. •

Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff.

3. M.

Malachii corpus paruum, ovatum, molliculum, laeve, subpubescens, agile; capite thorace latiore, ovato, deflexo, oculis globosis, prominulis, lateralibus; antennis approximatissimis, frontalibus, thorace longioribus; thorace plano, rotundato, marginato, margine parvo, deflexo, latitudine elytrorum; scutello parvo, rotundato; elytris mollibus, flexilibus, incumbentibus, plerumque longitudine abdominalis; pedibus elongatis, tenuibus, cursoriis; tarsis quadrarticulatis; colore vario.

V

*aeneus.*3. *M. corpore viridi-aesio, elytris extrorsum*
guineis. Ent. syst. 1. 221. 1.

Oliv. Inf. 27. 4. 2. tab. 2. fig. 6.

Cantharis aenea. Linn. Syst. Nat. 2. 648.

Fn. Sv. 708.

Geoff. Inf. 1. 174. 7.

Illig. Col. Bor. 1. 302. 1.

I. 21.

Panz. Fn. Germ. 10. tab. 3.

Ross. Fn. Etr. 1. 195. 423.

Degeer Inf. 4. 73. 6. tab. 2. fig. 16. 17.

Schaeff. Monogr. 1754. tab. 2. fig. 10. 11.

- - Icon. tab. 18. fig. 12. 13.

Habitat in Europae plantis.

Exferit tentacula duo, basi connata, obtusa,
guinea, ad basin abdominis, et duo altera
apicem thoracis.*apustulatus* 4. *M. aeneo-viridis, elytris apice rubris.* Ent. 1.
1. 222. 2.*Cantharis apustulata.* Linn. syst. Nat. 2. 648.

Fn. Sv. 709.

Oliv. Inf. 27. 5. 3. tab. 1. fig. 1.

Geoff. Inf. 1. 175. 8.

Degeer. Inf. 4. 75. 7.

Illig. Col. Bor. 1. 303. 2.

I. 21.

Panz. Fn. Germ. 10. tab. 3.

Ross. Fn. Etr. 1. 195. 424.

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 5.

Schaeff. Icon. tab. 18. fig. 10. 11.

tab. 19. fig. 14.

Habitat in Europae hortis, victitans rapina.

*rusus*5. *M. aeneus, ore, thoracis limbo elytrisque san-*
neis. Ent. syst. 1. 222. 3. *

Oliv. Inf. 27. 4. 1. tab. 1. fig. 4.

Habitat Parisiis. Mus. D. Bosc.

- M. viridi-aeneus*, thoracis margine elytrorumque *marginellus*.
 apicibus rufis. Ent. syst. 1. 222. 4. *
- Malachius marginellus*. Oliv. Inf. 27. 6. 5.
 tab. 3. fig. 18.
 Geoff. Inf. 1. 176. 9. 6.
 Habitat Parisiis.
Varietatem M. 2pustulatae credit D. Illiger, at
 vix rite.
- M. viridis*, ore elytrorumque apicibus rufis. Ent. *elegans*.
 syst. suppl. 70. 4. *
 Habitat in Gallia. Mus. D. Bose.
- M. aeneo-viridis*, ore flavescente. Ent. syst. 1. *viridis*.
 223. 5. *
Malachius viridis. Oliv. Inf. 27. 7. 6. tab. 3.
 fig. 14.
 Nyk. Fn. Sv. 1. 271. 3.
 Habitat in Scania. Dom. de Paykull.
Varietas M. 2pustulati, teste Illiger.
- M. nigro-aeneus*, thoracis margine elytrisquē *sanguinolentus*.
 sanguineis. Ent. syst. 1. 223. 6. *
- Malachius sanguinolentus*. Oliv. Inf. 27. 7. 7.
 tab. 3. fig. 13.
 Illig. Col. Bor. 1. 304. 3.
 Roff. Fn. Etr. 1. 196. 426.
 Herbst. Arch. 5. 108. 5.
 Schall. Act. Hall. 1. 303.
 Habitat Kiliae. Dom. Daldorff.
- M. ater*, thoracē elytrorumque apicibus sanguineis. Ent. syst. 1. 223. 7. *
Malachius ruficollis. Oliv. Inf. 27. 9. 10. tab.
 2. fig. 9. I. 22
 Habitat in Germania. Dom. Prof. Helwig.

- ~~angulatus~~ 11. *M. ater*, thorace rubro, elytris sanguineis: n
culis duabus cyaneis. Ent. syst. suppl. 70. 7.
Habitat in America boreali. Dom. Hybner.
- ~~viridipen-
nis.~~ 12. *M. pubescens*, rufus, elytris pectoreque viri
aeneis. Ent. syst. suppl. 70. 7. *
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Dom. de Paykull.
- ~~cyaneus.~~ 13. *M. cyaneus*, thorace abdomineque rubris. E
syst. 1. 223. 8. *
Habitat in Hispaniae umbellatis. Dom. Vahl.
- ~~thoracicus.~~ 14. *M. thorace rufo immaculato*. Ent. syst. sup
70. 7. *
Malachius thoracicus. Oliv. Inf. 27. 8. 8. t
fig.
Habitat in Gallia. Mus. D. Bosc.
- ~~angulatus.~~ 15. *M. ater*, nitidus, thoracis limbo tibiisque anti
rufis. Ent. syst. 1. 223. 9. *
Habitat in Germaniae hortis. Dom. Prof. Helw
- ~~abdomina-
lis.~~ 16. *M. cyaneus*, thoracis margine abdominisque b
rufis. Ent. syst. suppl. 70. 9. *
Habitat in Mogador. D. Schousboe. Mus. D. Lur
- ~~praeustus.~~ 17. *M. nigricans*, elytris postice flavescentibus. E
syst. 1. 224. 10. *
Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.
- ~~pedicula-
rius.~~ 18. *M. ater*, elytris apice rufis. Ent. syst. 1. 22
11. *
Malachius pedicularius. Oliv. Inf. 27. 8.
tab. 1. fig. 3.
Cantharis pedicularia. Linn. syst. Nat. 2. 64
9. Fn. Sv. 710.
Habitat in Europae hortis.
- ~~pulicarius.~~ 19. *M. niger*, thoracis margine elytrorumque api
bus rubris. Ent. syst. 1. 224. 12.
I. 22. *Malachius pulicarius*. Oliv. Inf. 27. 8. 9. t
1. fig. 5.

- Illig. Col. Bor. 1. 306. 6.
 Panz. Fn. Germ. 10. tab. 6.
 Paykull. Fn. Sv. 1. 272. 4.
 Habitat Kiliae. Dom. Lund.
10. *M. elytris nigris: fasciis duabus rufis. Ent. syst. fasciatus.*
 1. 224. 13. *
Malachius fasciatus. Oliv. Inf. 27. 10. 12. tab.
 1. fig. 2.
Cantharis fasciata. Linn. syst. Nat. 2. 648. 10.
 Fn. Sv. 711.
 Geoff. Inf. 1. 177. 12.
 Illig. Col. Bor. 1. 304. 4. I. 22
 Panz. Fn. Germ. 10. tab. 5.
 Schaeff. Icon. tab. 189. fig. 3.
 Degeer Inf. 4. 76. 9.
 Habitat in Europae Museis.
11. *M. ater, ore thoraceque rufis, elytrorum marginibusque futuraeque albis. Ent. syst. suppl. 71. 13. * limbatus.*
 Habitat in Tanger. D. Schousboe.
12. *M. viridi-aeneus, elytris rubris: fascia viridibusque equestris.*
 aenea. Ent. syst. 1. 224. 14. *
Malachius equestris. Oliv. Inf. 27. 11. 13. tab.
 2. fig. 11.
 Panz. Fn. Germ. 10. tab. 6. I. 23
Meloe Gouani. Linn. syst. Nat. 2. 1168.
 Schaeff. Icon. tab. 41. fig. 15. 16.
 Habitat in Italia. Dr. Allroni.
13. *M. niger, antennarum basi tibiisque flavis. Ent. flavipes.*
 syst. 1. 225. 15. *
Malachius flavipes. Oliv. Inf. 27. 14. 19. tab.
 3. fig. 19.
 Payk. Fn. Sv. 1. 274. 7.
 Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

- albifrons.* 24. *M. niger*, capite, thoracis parte antica elytrorum que apicibus albis. Ent. syst. 1. 225. 16.
Malachius albifrons. Oliv. Inf. 27. 13. 17: t. 3. fig. 16.
 Habitat Parisiis. Mus. D. Bosc.
- rufipes.* 25. *M. niger*, nitidus, pedibus rufis.
 .. Habitat in America meridionali. Smidt. Mus. Lund.
 .. Paruus. Caput, thorax, elytra nigra, nitida, maculata. Corpus nigrum, pedibus rufis.
- labiatus.* 26. *M. niger*, labio rufo.
 Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.
 Paruus. Corpus totum nigrum, vix nitidum, labio solo rufo.
Variat capite toto thoracisque lateribus flavis.
- concolor.* 27. *M. ater*, immaculatus.
 Habitat in Austria. Dom. Meyerle.
 Paruus, ater, omnino immaculatus.
- nitidulus.* 28. *M. viridi-aeneus*, elytris coeruleis: apice, tennis pedibusque flavis. Ent. syst. 1. 217. *
- Habitat in Barbaria. Mus. Dom. Desfontaines.

60. MELYRIS. *Palpi* quatuor filiformes.
Maxilla unidentata, acuta.
Labium cordatum, emarginatum.
Antennae totae perfoliatae.

- abdominalis.* 1. villosa, cyanea, elytris lineis elevatis tribus, domine rufo.

Melyridis corpus oblongum, subcylindricum, villosum, tardum capite ovato, inflexo, sub thorace recondito, oculis gl.

- Lugria abdominalis*. Ent. syst. 1, 2. 79. 5. *
- Melyris abdominalis*. Oliv. Inf. 21. 4. 2. tab. 1. fig. 7.
Habitat in India. Dom. Daldorff.
2. *M. viridis*, elytris lineis elevatis tribus. Ent. syst. *viridis*.
1. 226. 1. *
Melyris viridis. Oliv. Inf. 2. 21. tab. 1. fig. 1.
Panz. Naturf. 24. 11. 15. tab. 1. fig. 15.
Habitat ad Cap. Bon. Spei.
3. *M. supra coerulefcens*, subtus ferrugineus, *bicolor*.
Habitat in Cairo. Forskahl. Mus. D. Lund.
Statura omniq. *M. viridis*, at minor. Caput coerulefcens. Thorax vtrinque linea elevata coerulefcens. Elytra punctata, lineis tribus elevatis exterioribus sensim abbreviatis. Corpus cum pedibus rufum.
4. *M. nigra*, elytris lineis, elevatis tribus. Ent. syst. *nigra*.
1. 226. 2. * Oliv. Inf. 21. tab. 1. fig. 3.
Habitat in Tanger.
5. *M. viridis*, thorace vtrinque linea elytrisque trilincata.
bus elevatis. Ent. syst. 1. 226. 3. *
Habitat ad Cap. Bon. spei.

61. DER.

fis, prominulis; lateralibus; *antennis* longitudine thoracis, sub oculis infertis; *thorace* submarginato, vtrinque lineola laterali elevata; *scutello* breui, rotundato; *elytris* rigidis, abdomine longioribus latioribusque; *fornicatis*; *pedibus* tenuibus, compressis; *zocis* quinquearticulatis; *colore* vario, obscuro.

61. **DERMESTES.** *Palpi* quatuor filiforme
Maxilla bifida.
Labium corneum, obtu-
 sum, integrum.
Antennae clauato - perfor-
 liatae.

lardarius. 1. *D. niger*, elytris antice cinereis. Ent. syst.

227. 1.

Linn. syst. Nat. 2. 561. 1. Fn. Sv. 408.

Geoff. Inf. 1. 101. 5.

Illig. Col. Bor. 1. 311. 1.

Oliv. Inf. 2. 9. 6. 1. tab. 1. fig. 1.

Degeer Inf. 4. tab. 7. fig. 15.

Schaeff. Icon. tab. 42. fig. 3.

Habitat in animalibus aëruatis, lardo, carnibus
 repositoriis culinariis Muscisque infestus.

caespitosus. 2. *D. niger*, elytris antice testaceis, abdomine albo

Ent. syst. 1. 227. 2.

Oliv. Inf. 2. 9. 7. 2. tab. 2. fig. 8.

Habitat in noua Hollandia et in Germania. Don
 Smidt.

cadaueri-
cus. 3. *D. niger*, ore ferrugineo. Ent. syst. 1. 228. 3.

Dermestes cadauerinus. Oliv. Inf. 2. 9. 7.
 tab. 2. fig. 9.

Habitat in Insula St. Helena. Mus. D. Banks.

4. 1

Dermestis corpus paruum, oblongum, immarginatum, tu-
 dum; *capite* paruo, ouato, sub thorace inflexo, *oculis* t-
 undatis, viz prominulis, lateralibus; *antennis* breuib-
 longitudine, *capitis*, sub oculis insertis, reconditis; *uāra*
 transuerso, latitudine fere elytrorum, margine deflex-
scutello, paruo, rotundato; *elytris* rigidis, arcte adhaere-
 tibus; longitudine abdominis; *pedibus* breuibus, validi-
tarfis quinquearticulatis; colore obscuro, minime nitido.

4. *D. niger, glaber, pedibus piceis.* Ent. syst. 1. macellarius
228. 4. *

Dermestes macellarius. Oliv. Inf. 2. 9. 10. 8.
tab. 2. fig. 13.

Panz. Fn. Germ. 40. tab. 9.

IV. 36

Habitat in Germanja. Dom. de Hattorff.

5. *D. niger, glaber, scutello pedibusque testaceis, megatoma.*
antennarum claua solida elongata. Ent. syst.
suppl. 71. 1. *

Dermestes Schaefferi. Illig. Col. Bor. 1. 319. 7.

Megatoma Schaefferi. Herbst. Col. 4. tab. 59.
fig. 1.

Habitat in Germania. Dom. Hybner.

6. *D. niger, elytris puncto albo.* Ent. syst. 1. 228. 5. pellis.

Linn. syst. Nat. 2. 563. 2. Fn. Sv. 411.

Geoff. Inf. 1. 105. 4.

Oliv. Inf. 2. 9. 11. 10. tab. 2. fig. 11.

Frisch. Inf. 5. 22. tab. 8.

Illig. Col. Bor. 1. 316. 6.

Schaeff. Icon. tab. 42. fig. 4.

Habitat in pellitiis, lardo.

Mas antennarum claua elongata, cylindrica.

Variat rarius puncto elytrorum albo detricto.

7. *D. oblongus, niger, elytris fascia vndata alba du- vndatus.*
plici. Ent. syst. 1. 228. 6.

Linn. syst. Nat. 2. 562. 3. Fn. Sv. 410.

Dermestes vndatus. Oliv. Inf. 2. 9. 12. 11.

tab. 1. fig. 2.

VII. 19.

Illig. Col. Bor. 1. 315. 4.

Schaeff. Icon. tab. 157. fig. 17.

Habitat in Europae putridis, suffocatis.

8. *D. onatus, niger, elytris fasciis tribus vndatis ci- trifascia-*
neris. Ent. syst. 1. 228. 7. * *tus.*

Dermestes trifasciatus. Oliv. Inf. 2. 9. 13. 13.

tab. 1. fig. 7.

Geoff.

- Geoff. Inf. 1. 112. 15.*
Habitat in Europa australiori. D. de Scheffelt.
- 9. D. oblongus, ater, punctis viginti albis.* Ent. syst. 1. 229. 8.*
Illig. Col. Bor. 1. 315. 5.
II 12 Panz. Fn. Germ. 22. tab. 1.
Oliv. Inf. 9. tab. 1. fig. 5.
Suiz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 8.
Habitat Halae Saxonum. D. Schaller.
- tigrinus.* 10. D. oblongus, tomentosus, thorace nigro-punctato, elytris cinereis, maculis quatuor fuscis. Ent. syst. 1. 229. 9.*
Habitat in Italia. Mus. Dom. de Schlanbusch.
- bicolor.* 11. D. oblongus, niger, subtus testaceus, elytris striatis. Ent. syst. 1. 229. 10.*
Habitat in Germania. Dom. de Hattorf.
- vulpinus.* 12. D. oblongus, laevis, niger, thoracis lateribus cinereo-villosis, subtus albidus. Ent. syst. 1. 229. 11.*
Dermestes vulpinus. Oliv. Inf. 2. 9. 8. 4. tab. 1. fig. 3.
II. 56 Illig. Cpl. Bor. 1. 313. 3.
Panz. Fn. Germ. 40. tab. 10.
Habitat in Germania.
- felinus.* 13. D. oblongus, villosus, cinereus, immaculatus. Ent. syst. 1. 229. 12.*
Habitat in terra Diemenii. Mus. Dom. Banks.
Senior et glaber et fuscus, euadit.
- hirticollis.* 14. D. oblongus, capite thoraceque ferrugineo, villosus, elytris nigris, pectore albo. Ent. syst. 1. 229. 13.*
Habitat in Barbaria. Mus. Dom. Desfontaines.
15. D.

15. *D. oblongus*, tomentosus, nigro- alboque nebulosus, abdomine niueo. *Kist. syst.* 1. 230. 14.
Linn. syst. Nat. 2. 156. 3. 18. *Fn. Sv.* 426.
Geoff. Inf. 1. 102. 4.
Oliv. Inf. 2. 9. 8. 5. tab. 1. fig. 3.
Illig. Col. Bor. 1. 112. 2.
Panz. Fn. Germ. 40. tab. 10. 11. 38
Payk. Fn. Sv. 1. 277. 2.
Voet. Col. tab. 3. fig. 11.
Frish. Inf. 4. 34. tab. 18.
Schaeff. Icon. tab. 42. fig. 1. 2.
 Habitat in Europae arenosis.
Larua oblonga, brunnea: ore atro.
16. *D. oblongus*, tomentosus, fusco-cinereoque nebulosus, abdomine cinereo. *Dermestes cefsellatus*.
Dermestes cefsellatus, *Oliv. Inf.* 2. 9. 9. 7. tab. 2. fig. 10.
 Habitat in Angliae cadaveribus,
17. *D. subpubescens*, ferrugineo-fuscus, antennis *Lycoperdi*.
 nigris, claua ferruginea. *Ent. syst.* 1. 231. 20. *
Herbst. Col. 4. 176. 5. tab. 42. fig. 13. 11. 37.
Payk. Fn. Sv. 1. 289. 16.
 Habitat in Germaniae *Lycoperdo Bovista*. *Dom.*
 Prof. Helwig.
18. *D. oblongus*, niger, capite, elytrorum puncto apiceque, pedibusque ferrugineis. *Ent. syst.*
 suppl. 72. 20. *
 Habitat in Gallia. *D. Brongiart.*
19. *D. oblongus*, glaber, niger, thorace ferrugineo, 2 punctatus elytris testaceis: puncto nigro. *Ent. syst.* 1. 231. 21. *
 Habitat in Germania. *Dom.* Prof. Helwig.

- finetarius.* 20. *D. oblongus, niger, nitidus, pedibus ferruginei*
 Ent. syst. 1. 231. 22. *
 Herbst. Col. 4. 15. 5. tab. 45. fig. 5.
 Degeer. Inf. 4. 220. 11. tab. 8. fig. 21.
 Payk. Fn. Sv. 1. 293. 21.
 Habitat in Germaniæ Agarico finetario. Dor
 Prof. Helwig.
- fumatus.* 21. *D. oblongus, testaceus; oculis nigris.* Ent. syst
 1. 231. 23. *
 Linn. syst. Nat. 2. 564. 22. Fn. Sv. 432.
 Geoff. Inf. 1. 104. 12.
 IX. Herbst. Col. 4. 135. 15. tab. 41. fig. 1.
 Payk. Fn. Sv. 1. 282. 7. β.
 Habitat in Europæe quisquiliis.
- tomentosus.* 22. *D. oblongus, villosus, griseus, capite puncti*
duobus fuscis. Ent. syst. 1. 232. 24. *
Dermestes tomentosus. Oliv. Inf. 2. 9. 14. 15
 tab. 3. fig. 17.
 IX, 27 Illig. Col. Bor. 1. 321. 19.
 IX. Panz. Fn. Germ. 40. tab. 12.
 Geoff. Inf. 1. 102. 8.
 Degeer. Inf. 4. 199. 4.
 Payk. Fn. Sv. 1. 282. 7.
 Herbst. Col. 4. 133. 14.
 Habitat in Anglia.
Varietas præcedentis, testibus DD. Illiger e
 Paykull.
- fuscus.* 23. *D. oblongus, fuscus, immaculatus.* Ent. syst. 1
 232. 25. *
 Habitat in Kiliæ Boletis. Dom. Daldorff.
- adstrictor.* 24. *D. oblongus, obscurus, elytris crenato-striatis*
antennarum claua ferrata.
 VII, 19 *Dermestes adstrictor.* Illig. Col. Bor. 1. 322. 20
Elater clauicornis. Oliv. Inf. 31. tab. 8. fig. 85
 Ross

Röf. Fn. Etr. App. 60.

Geoff. Inf. 1. 137. 16.

Herbst. Col. 4. 140. 20. tab. 41. fig. 4.

Payk. Fn. Sv. 1. 284. 9.

Habitat larua in ligno putrido quercino, imago in plantis. D. Paykull.

Animalculum singulare, statura Elateris, at antennae claua triarticulata, altero latere ferrata:

An distinctum genus?

25. *D. oblongus*, ater, elytris brunneis: futura atra. *futuralis*.

Habitat in Austria. Dom. de Meyerle.

Medius. Antennae claua perfoliata, nigrae. Caput et thorax atra, immaculata. Elytra subtilissime punctata, obscure brunnea: futura lata atra. Pedes brunnei.

25. *D. oblongus*, fuscus, thorace sulcato, vtrunque *6dentatus*.
sexdentato. Ent. syst. 1. 232. 26. *

Habitat in Germania. D. Helwig.

II. 12.

26. *D. oblongus*, niger, elytris lunula dorsali *cine-lunatus*.
rea. Ent. syst. 1. 232. 27. *

Payk. Fn. Sv. 1. 288. 15.

Habitat in Suecia, sub arborum corticibus. Dom. de Paykull.

VII. 19.

27. *D. oblongus*, testaceus, thorace vtrunque vnicid- *unicidatus*
tato. Ent. syst. 1. 232. 28. *

Ips unidentata. Oliv. Inf. 2. 18. 10. 12. tab. 1.
fig 4.

Habitat in Gallia.

I. 23

28. *D. oblongus*, ferrugineus, thorace carinato. Ent. *adentatus*.
syst. 1. 233. 29. *

Panz. Fn. Germ. 40. tab. 13.

Habitat in Germania. D. Prof. Helwig.

VI. 37

29. D.

- nigripes.* 29. *D. oblongus, ater, pedibus nigris.* Ent. syst. 233. 31. *
IX. Habitat Halæ Saxonum. Dom. Hybner.
- obscurus.* 30. *D. oblongus, cylindricus, fuscus, antennis pedibusque testaceis.* Ent. syst. i. 233. 32. *
II. 19. Habitat in Germania. Dom. Smidt.
- testaceus.* 31. *D. oblongus, ferrugineus, elytris pedibusque testaceis.* Ent. syst. i. 233. 33. *
 Habitat in Belgio.
- scaber.* 32. *D. griseus, thorace elytrisque scabrie.* Ent. syst. i. 233. 34. *
Dermestes scaber. Oliv. Inf. 2. 9. 15. 7. tab. 2. fig. 14.
 Habitat in noua Hollandia. Mus. Dom. Banks.
- Chinensis.* 33. *D. oblongus, ferrugineus, elytris striatis.* Ent. syst. i. 233. 35. *
 Habitat in feminibus e China acceptis.
- subterraneus.* 34. *D. testaceus, elytris substriatis.*
 Habitat in Hungariæ fodinis. D. Scheidler.
 Affinis certe *D. Chinensi*, at *testaceus*, et *elytrinus striata*.
- scanicus.* 35. *D. ater, thorace punctoque elytrorum testaceis.*
 Ent. syst. i. 234. 36. *
As of Orig
Jun 2011
1253
 Linn. syst. Nat. 2. 564. 26. Fn. Sv. 437.
 Herbst. Arch. tab. 20. fig. 2.
 Panz. Fn. Germ. 4. tab. 9.
 Habitat in Suecia.
- limbatus.* 36. *D. fuscus, elytris punctatis: limbo cinereo.*
 Ent. syst. i. 234. 37. *
Dermestes limbatus Ent. syst. i. 234. 37. *
 Habitat in noua Zelandia. Mus. Dom. Banks.
- fenebratus.* 37. *D. castaneus, capite nigricante, thorace fusco.*
 Ent. syst. i. 234. 38. *

Linn. fyft. Nat. 2. 563. 15. Fn. Sv. 423. II. 14.

Payk. Fn. Sv. 1. 297. 26.

Lathridius longicornis. Herbft. Col. 5. 4. 1.

tab. 44. fig. 1.

Habitat in Sueciae fenestris.

1. *D. ouatus*, pallens, elytris laeuiffimis. Ent. fyft. *variabilis*.

I. 234. 39. *

Payk. Fn. Sv. 1. 292. 39.

Herbft. Col. 1. 141. 22. tab. 41. fig. 5.

Habitat in Daniae agaricis. Dom. Lund.

2. *D. ouatus*, niger, antennis flauis: claua oblon-*serra*.

ga ferrata. Ent. fyft. I. 234. 40. *

Illig. Col. Bor. 1. 319. 8.

Payk. Fn. Sv. 1. 283. 8.

Habitat in Suecia australi. D. Lund.

3. *D. ouatus*, nigricans, antennarum claua testacea, *cellaris*.

thorace crenato. Ent. fyft. I. 234. 41.

Dermestes cellaris. Scop. carn. 16. 42. IV. 38

Ips cellaris. Oliv. Inf. 2. 9. tab. 1. fig. 3.

Herbft. Arch. tab. 20. fig. 5.

Payk. Fn. Sv. 290. 17.

Habitat in Europae borealis quisquiliis. Muf. D.

Lund.

1. *D. ouatus*, testaceus, thorace crenato. Ent. fyft. *crenatus*.

suppl. 72. 41. *

Habitat Hafniae. Muf. D. de Sehestedt.

2. *D. ouatus*, nigricans, antennarum basi pedibus-*minutus*.

que flauis. Ent. fyft. I. 235. 42. *

Dermestes minutus. Payk. Fn. Sv. 294. 24.

Habitat in Daniae quisquiliis.

3. *D. ouatus*, testaceus, abdominis basi nigra, ely-*pedicula-*

tris abbreviatis. Ent. fyft. I. 235. 43. * *rius*.

Linn. fyft. Nat. 2. 564. 23. Fn. Sv. 434.

I. 24.
Cate-

- Cateretes pedicularius*. Illig. Col. Bor. 1. 396.
 Panz. Fn. Germ. 7. tab. 5.
 Herbst. Col. 5. tab. 45. fig. 1.
 - - Arch. tab. 20. fig. 6.
 Payk. Fn. Sv. 1. 225. 10.
 Habitat in Germania. Dom. Prof. Helwig.
- Vrticae*. 44. *D. ouatus*, ater, nitidus, antennis pedibusque
 testaceis, elytris abbreviatis. Ent. syst. 1. 23
 45. *
- Cateretes Vrticae*. Illig. Col. Bor. 1. 395. 2.
Dermestes Vrticae. Payk. Fn. Sv. 1. 286. 1.
 I. 58 *Staphylinus Quenzelii*. Payk. Monogr. 72. 5
 Panz. Fn. Germ. 4. tab. 11.
 Herbst. Col. 5. tab. 49. fig. 5.
 Habitat in Germaniae Vrtica. Dom. Helwig.
- brachypterus*. 45. *D. ouatus*, ater, nitidus, pedibus piceis, elytris
 dimidiatis. Ent. syst. 1. 235. 46. *
- Payk. Fn. Sv. 1. 288. 14.
 I. 24. Panz. Fn. Germ. 4. tab. 10.
 Habitat in Germania. Dom. Helwig.
- apustulatus* 46. *D. ouatus*, ater, elytris abbreviatis: macula fe-
 ruginea, pedibus pallidis. Ent. syst. suppl. 7.
 47. *
- Payk. Fn. Sv. 1. 286. 11.
 Habitat in Sueciae pratis. D. de Paykull.

2. ANOBIUM. *Palpi* quatuor clauati.
Maxilla obtusa, dentata.
Labium corneum, integrum.
Antennae filiformes: articulis
 tribus ultimis elongatis
 crassioribus.

A. fuscum, thorace aequali, elytris subteffellatis. *teffellatum.*

Ent. syst. 1. 236. 1.

Oliv. Inf. 2. 16. 6. 1. tab. 1. fig. 1.

Geoff. Inf. 1. 112. 4.

Degeer Inf. 4. 230. 2.

Illig. Col. Bor. 1. 225. 1.

Payk. Fn. Sv. 1. 305. 4.

Herbst. Col. 5. 53. 1. tab. 47. fig. 2.

Habitat in Europae cadaveribus.

yl. 8

- A. fuscum, thorace inaequali: punctis duobus ba- *striatum.*
 seos ferrugineis, elytris striatis. Ent. syst. 1.
 236. 2. *

Anobium striatum. Oliv. Inf. 2. 16. 9. 2. tab.
 1. fig. 4.

yl. 6

Anobium pertinax. Illig. Col. Bor. 1. 327. 3.

Herbst. Col. 5. tab. 47. fig. 4.

Payk. Fn. Sv. 1. 304. 2.

Habitat in Europae domibus.

3. A.

Anobii corpus paruum, oblongum, subvillosum, immatrina-
 tum, tardum; *capite* ovato, sub thoracem inflexo, *oculis*
 rotundatis, vix prominulis, lateralibus; *antennis* brevibus,
 sub oculis insertis, reconditis; *thorace* transverso, fere la-
 titudine elytrorum: margine antico subelevato, laterali-
 bus deflexis; *scutello* brevi, rotundato; *elytris* rigidis,
 deflexis, longitudine abdominis; *pedibus* brevibus, validis;
tarsis quinquearticulatis; *colore* obscuro.

X

reticulatum 3. A. villosum, fuscum, thorace aequali, elytris reticulatis.

Anobium reticulatum. Panz. Fn. Germ. ta
 Habitat in Austria. Dom. de Meyerle.
 III. 29. Animalculum mihi haud rite examinatum. Ant
 narum articuli vltimi breuiores, et magis
 proxinati. Corpus magnitudine A. tessel
 totum villosum, fuscum. Elytra subtilissi
 reticulata.

rusipes. 4. A. nigrum, thorace subrotundato, elytris stria
 pedibus ferrugineis. Ent. syst. 1. 236. 3.
 Illig. Col. Bor. 1. 328. 4.
 Herbst. Col. 5. tab. 47. fig. 3.
 Habitat in Germania. Dom. Smidt.

castaneum. 5. A. pubescens, castaneum, elytris striatis. F
 syst. 1. 237. 4. *
Anobium castaneum. Oliv. Inf. 2. 16. tab
 fig. 2.
 Geoff. Inf. 1. 112. 3.
 Illig. Col. Bor. 1. 326. 2.
 Habitat in Gallia.

pertinax. 6. A. fuscum, immaculatum, thorace compresso. F
 syst. 1. 237. 5.
Anobium striatum. Illig. Col. Bor. 1. 329. 5
Ptinus pertinax. Linn. syst. Nat. 2. 565.
 Fn. Sv. 414.

Geoff. Inf. 1. III. 1. tab. 1. fig. 6.
 Degeer Inf. 4. tab. 8. fig. 24. 25.
 Herbst. Col. 5. tab. 47. fig. 3.
 VI. 8. Payk. Fn. Sv. 1. 305. 3.
 Habitat in Europa boreali, destruens e ligno c
 secta.
 Denaturatur a Clero fornicario. Captum se c
 trahit immobile.

1. *A. fuscum, obscurum, pedibus testaceis.* Ent. syst. *Boleti.*
 I. 237. 6. *
- Dermejes picipes.* Ent. syst. I. 233. 30.
 Herbst. Col. 4. 137. 17. tab. 41. fig. 3.
 Illig. Col. Bor. I. 332. 8.
 Oliv. Inf. 2. 16. tab. 2. fig. 5.
 Panz. Fn. Germ. 10. tab. 7.
 Payk. Fn. Sv. I. 308. 7. I. 25.
 Habitat in Germaniae Boletis.
2. *A. testaceum, oculis nigris, elytris laevibus.* *mollis.*
 Ent. syst. I. 237. 7.
Pinus mollis Linn. syst. Nat. 2. 565. Fn. Sv. 415.
 Illig. Col. Bor. I. 333. 9.
 Oliv. Inf. 2. 16. tab. 2. fig. 8.
 Payk. Fn. Sv. I. 306. 5.
 Habitat in Europae quisquiliis.
3. *A. pubescens, ferrugineum, elytris striatis.* Ent. *parvicorn.*
 syst. I. 237. 8.
 Illig. Col. Bor. I. 330. 6.
 Herbst. Col. 5. tab. 47. fig. 6. VI. 9.
 Payk. Fn. Sv. I. 307. 6.
 Habitat in pane diutius asseruato.
4. *A. fuscum, elytris laevibus pedibusque testaceis.* *Abietis.*
 Ent. syst. I. 238. 9.
 Herbst. Col. 5. tab. 47. fig. 7. VI. 9.
 Habitat in Germaniae Abiete. D. Prof. Helwig.
5. *A. fuscum, thorace plano, elytris crenato-striatis.* *planum.*
 Ent. syst. I. 238. 10. *
 Habitat Kiliae. Dom. Daldorff.
6. *A. ferrugineum, elytris striatis pallidioribus.* *capense.*
 Ent. syst. I. 238. 11. *
 Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lund.
7. *A. testaceum, thorace rotundato, elytris sub-* *minutum.*
striatis pubescentibus. Ent. syst. I. 238. 12. *
 Habi-

Habitat in plantis ficcis ex Italia missis. M
Lund.

micans.

14. *A. glabrum, fuscum, elytris læuibus, p*
*testaceis. Ent. syst. I. 238. 13. **

Illig. Col. Bor. I. 331. 7.

I. 25.

Panz. Fn. Germ. 10. tab. 8.

Herbst. Col. 5. tab. 47. fig. 11.

Payk. Fn. Sv. 309. 8.

Habitat in Europae Boletis.

nitidum.

15. *A. laeue, atrum, nitidum, pedibus test*
*Ent. syst. I. 238. 14. **

Herbst. Col. 5. tab. 45. fig. 8.

I. 26.

Payk. Fn. Sv. I. 311. 10.

Habitat in Germania. Dom. Prof. Helwig.

63. PTINVS. *Palpi quatuor filiformes.*

Maxilla bifida.

Labium bifidum.

Antennae filiformes.

pubescens.

1. *Pt. pubescens niger, elytris striatis testaceis*
*syft. I. 239. 1. **

Oliv. Inf. 2. 17. 5. tab. 1. fig. 7.

Habitat in Gallia.

germanus.

2. *Pt. fuscus, thorace quadridentato, antennis*
busque ferrugineis. Ent. syst. I. 239. 2

Ptini corpus paruum, oblongum, immarginatum, t
capite paruo, subrotundo, sub thoracem inflexo; oculis
gnis, globosis, prominulis, lateralibus; antennis lo
bus, approximatis, fronti infertis; thorace gibbo,
angustiore, saepius inaequali; scutello paruo, rotund
terdum nullo; elytris rigidis, inflexis, abdominis lon
ae; pedibus elongatis, tenutibus; femoribus subel
tarsis quinquearticulatis; colore testaceo aut fusc
rumque obscuro.

Linn. syst. Nat. 2. 566. 6.

Oliv. Inf. 2. 17. 7. 5. tab. 1. fig. 6.

Payk. Fn. Sv. 1. 312. 1.

Habitat in Europae quercu.

Pt. oblongus, fuscus, thorace linea impressa, elytris striatis pubescentibus, antennis pedibusque rufis.

Ptinus rufipes. Illig. Col. Bor. 1. 345. 2.

Oliv. Inf. 2. 17. tab. 2. fig. 8.

Habitat in Germania. Dom. de Meyerle.

Statura omnino et magnitudo Pt. germani. Antennae et pedes rufi. Elytra striata, pubescentia, fusca, immaculata.

Pt. ater, nitidus, pedibus flavescentibus. Ent. *longicornis*.
syst. 1. 239. 3. *

Luperus Geoff. Inf. 1. 232. 1.

Habitat in Germania et Gallia. D. de Hattorff.

Pt. thorace quadrituberculato, elytris fasciis duabus punctoque apicis albis. *elegans*.

Ptinus elegans. Illig. Col. Bor. 1. 346. 4.

Habitat in Germania. D. de Meyerle.

Nimis Pt. furi affinis, et forte mera eius varietas.

Pt. testaceus, thorace quadridentato, elytris fasciis duabus albis. Ent. *fur*.
syst. 1. 239. 4.

Linn. syst. Nat. 2. 566. 5.

Ptinus striatus. Ent. syst. 1. 242. 13. *

Ptinus fur. Oliv. Inf. 2. 17. 6. 3. tab. 1. fig. 1.

Geoff. Inf. 1. 164. 4. tab. 2. fig. 6.

Illig. Col. Bor. 1. 345. 3.

Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 8.

Degeer Inf. 4. tab. 9. fig. 5. 6.

Frisch. Inf. 13. tab. 15.

Payk. Fn. Sv. 1. 313. 3.

Habi-

Habitat in Museis, seminibus pessimus, deest
herbaria, insecta, aues; vix pellendus.

Larva hexapoda, obesa; mollis; pilosa, segm
dorsalibus prominulis.

Puppa intra folliculum glutinosum.

Mus alatus, femina aptera.

imperialis, 7. Pt. fuscus, thorace subcarinato, coleoptris m

lobata alba. Ent. syst. 1. 240. 5.

Linn. syst. Nat. 2. 565. 4.

Oliv. Inf. 2. 17. 5. 2. tab. 1. fig. 4.

Illig. Col. Bor. 1. 344. 1.

I. 26 Panz. Fn. Germ. 5. tab. 7.

Sulz. Inf. tab. 2. fig.

Petagn. Inf. Calabr. 6. tab. 1. fig. 27.

Pavk. Fn. Sv. 1. 313. 2.

Habitat in Europae arboribus.

crenatus. 8. Pt. brunneus, thorace gibbo, elytris crenato-
tis unimaculatis. Ent. syst. 1. 240. 6.

Illig. Col. Bor. 1. 347. 5.

Payk. Fn. 1. 314. 4.

Habitat in Germania. Dom. Smidt.

Latro, 9. Pt. thorace bidentato, testaceus immaculatus.

syst. 1. 240. 7. *

Oliv. Inf. 2. 17. 17. 4. tab. 1. fig. 3.

Habitat in Germania. Dom. Prof. Hermann.

Marem Pt. furis credit Dom. Illiger. Nimi

men differre videtur magnitudine, color
thoracis structura.

denticornis. 10. Pt. niger, elytris striatis, antennis ferratis.

syst. 1. 240. 8. *

Habitat Parisiis. D. Bosc.

ferricornis. 11. Pt. thorace gibbo, deflexo, testaceus, ant
ferratis. Ent. syst. 1. 241. 9. *

Habitat in Americae plantis siccatis. Mus. D. L

12. Pt. oblongus, antennarum articulis duobus inferioribus longioribus spinosis. Ent. syst. 1. 241. 10. *

Ptinus spinicornis. Oliv. Inf. 2. 17. 10. 10. tab. 1. fig. 5.

Habitat in Sandwichii Insulis. Mus. D. Banks.

13. Pt. thorace quadrifurcato villosa, albidus, elytris connatis fusco-testaceis nitidis. Ent. syst. 1. 241. 11. *

Habitat in plantis ficcis ex Insulis Canariis missis. Mus. D. Lund.

14. Pt. thorace laevi piceo, elytris connatis fusco-testaceis nitidis. Ent. syst. 1. 241. 12. *

Ptinus Scotias. Oliv. Inf. 2. 17. 9. 9. tab. 1. fig. 2.

Scotias psylloides. Czempinski Diff. 51. 155.

Gibbium. Scop. Introd. ad Hist. nat. 505.

Jaquin Miscell. austr. tab. 23. fig. 1.

Illig. Col. Bor. 1. 34. 7.

Herbst. Arch. tab. 20. fig. 14.

Panz. Fn. Germ. 5. tab. 8.

Geoff. Inf. 1. 164. 2.

Habitat in Europae australioris Betula.

Gibbium Scopoli elytris connatis forte proprii generis.

14. SARROTRIVM. Palpi quatuor inaequales, filiformes; articulo ultimo obtuso.

Maxilla bifida.

Antennae breves, crassae, obtusae, pilosae, vntique serratae.

1. Sarrotrivm.

muticum.

Ptili- 1. 34

Ptilinus muticus. Ent. syst. App. 4. 445.

Sarrotrivm muticum. Illig. Col. Bor. 1. 34.

Hijpa mutica. Ent. syst. 1. 2. 71. 4.

Orthocerus. Latreille Inf.

Linn. syst. Nat. 2. 604. 4. Fn. Sv. 413.

Degeer. Inf. 5. 47. 8. tab. 3. fig. 1.

Payk. Fn. Sv. 1. 317. 3.

Panz. Fn. Germ. 1. tab. 8.

Habitat in Europae quisquiliis.

♂s maxillis palpisque. *Palpi* quatuor inaequalifiliformes: *anteriores* longiores, quadrifidulati; articulo primo paruo, secundo longiorib; obconico, tertio breui, ultimo ouato, obtusis; adhaerentes maxillae dorso, *posteriores* trifidulati: articulo primo minuto, reliquis aequalibus, ouato-globosis, obtusis; adnati ligulae medio. *Mandibula* cornea, incurua, acuminata. *Maxilla* membranacea, bifida: laciniis longioribus. *Ligula* membranacea, emarginata. *Scutum* breue, corneum, transuersum, emarginatum.

♂5. PTILINVS. *Palpi* quatuor subaequales.

Maxilla breuis, bifida.

Ligula membranacea, subaequalifidulata.

Antennae flabellatae.

mystacinus. 1. Pt. testaceus, albo-punctatus. Ent. syst. 1. 2.

I. *

Ptilini corpus paruum, oblongum, villosum, immarginatum; *capite* ouato, prominulo; *oculis* rotundatis, minutis, lateralibus; *antennis* breuibus, exsertis, appressis, ante oculos insertis; *thorace* transuerso, bifido, marginibus deflexis; *scutello* minuto, rotundato; *episterno* rigido.

Drury Inf. 3. tab. 48. fig. 7.

Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

1. Pt. fuscus, pedibus luteis. Ent. syst. 1. 243. 2. * *pectinicornis*.
Dermestes pectinicornis. Illig. Col. Bor. 1. 337. 12.

337. 12.

Linn. syst. Nat. 2. 565. 1. Fn. Sv. 412.

Oliv. Inf. 2. 17. 4. tab. 1.

Geoff. Inf. 1. 65. 1.

Panz. Fn. Germ. 3. tab. 7.

Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 6.

Payk. Fn. Sv. 1. 316. 1.

Herbst. Col. 5. 41. 5. tab. 46. fig. 11.

Habitat in Europae Corylo.

I. 27

3. Pt. subpubescens, niger, elytris flauis. Ent. syst. *flauescens*.
 1. 243. 3. *

Drilus flauescens. Oliv. Inf. 23. tab. 1.

Hispa flauescens Ross. Fn. Etr. 51. 127.

Geoff. Inf. 1. 66. 2. tab. 1. fig. 2.

Habitat in Galliae floribus.

I. 28

4. Pt. niger, antennis pedibusque flauis. Ent. syst. *pectinatus*.

1. 244. 4. *

Anobium pectinatum. Illig. Col. Bor. 1. 336. 11.

Serrocerus pectinatus. Kugell. Schneid. Mecy.

486. 2.

Brachus ferraticornis. Quenz. ignot. Inf. spec.

12.

Payk. Fn. Sv. 1. 316. 2.

Panz. Fn. Germ. 6. tab. 9.

Habitat in Germaniae lignis. Dom. Prof. Helwig.

I. 28

5. Pt.

rigidis, fornicatis, longitudine abdominis; *pedibus* breuibus, cursoriis; *tarsis* quinquearticulatis; *colore* obscure, minime nitido.

- serratus.* 5. *Pt. niger*, elytris friatis. Ent. syst. suppl. 73.
Ptilinus later. Panz. Fn. Germ. 35. 9.
 III. 29. Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

66. DORCATOMA. *Palpi* quatuor inaequaliter securiformes.

Maxilla bifida.

Antennae articulis triternis ultimis compresso-angularibus.

Dresdense. I. Dorcatoma.

Ptilinus Dorcatoma. Ent. syst. suppl. 73.

Anobium Dorcatoma. Illig. Col. Bor. I. 334.

Herbst. Col. 4. tab. 39. fig. 8. 9.

Panz. Fn. Germ. 26. tab. 10.

Habitat in Germania. Dom. Hybner.

III. 28
Os maxillis palpisque. *Palpi* quatuor inaequaliter securiformes: anteriores longiores, quadrarticulati; articulis subaequalibus; ultimo securiformi; adhaerentes maxillae dorso, posteriores breviores, triarticulati, articulis aequalibus: ultimo securiformi; adnati ligulae medio. *Mandibula* crassa, cornea, acuta, fissa. *Maxilla* membranacea, bifida: laciniis rotundatis; exterior paulo maiore. *Ligula* elongata, membranacea, apice dilatata, late emarginata. *Labium* breve, corneum, transversum integrum.

MELASIS. *Palpi* quatuor clauati: articulo ultimo ouato.

Labium membranaceum, integrum.

Antennae flabellatae.

M. nigra, elytrorum striis laeuis. Ent. syst. 1. *flabellicornis*.
244. 1. *

Melasis buprestoides. Oliv. Inf. 30. tab. 1. fig. 1.

Elater buprestoides. Linn. syst. Nat. 2. 656.

31. Fn. Sv. 742.

I. 28

Illig. Col. Bor. 1. 348. 1.

Panz. Fn. Germ. 8. tab. 9.

Herbst. Col. 5. tab. 47. fig. 1.

Payk. Fn. Sv. 1. 320. 1.

Habitat in Europa boreali.

M. nigricans, elytrorum striis punctatis. Ent. syst. *myflacina*.

4. Append. 445. 2. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Dom. de Paykull.

68. PAR.

Melasis corpus paruum, elongatum, cylindricum, immarginatum, tardum; capite paruo, obtusissimo, inserto; oculis paruis, rotundatis, vix prominulis, lateralibus; antennis longitudine thoracis: articulo primo elongato, incuruo, in cantho oculorum insertis; thorace breui, rotundato: marginibus deflexis; scutello rotundato; elytris rigidis, tegentibus, longitudine abdominis; pedibus breuibus validis; femoribus tibiisque valde compressis: margine acuto; tarsis quinquearticulatis; velore nigro, obscuro, minime nitido.

68. PARNVS. *Palpi* quatuor clauati: clauus orbiculata.

Maxilla bifida.

Labium emarginatum.

Antennae breues, filiformes.

proliferi-
cornis.

1. *P. grifeus*, antennis tentaculatis. Ent. syst. 245. 1. *

Elater oliuaceo-nitens, pilosus, antennis duobus tentaculatis. Ross. Fn. Etr. 1. 103. 11.

Dermestes tentaculis ante oculos antenniformibus, mobiliformibus. Geoff. Inf. 1. 103. 11.

Illig. Col. Bor. 1. 350. 1.

II. 14. Panz. Fn. Germ. 13. tab. 1.

Payk. Fn. Sv. 1. 321. 1.

Habitat in Sveciae plantis aquaticis, in Germania frequens. D. Bosc.

acumina-
tus.

2. *P. obscurus*, elytris acuminatis. Ent. syst. 246. 2. *

I. 29 Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

obscurus.

3. *P. niger*, elytrorum abdominisque margine, pedibusque ferrugineis. Ent. syst. 4. App. 445. 3.

Habitat in Germania. D. Schneider.

69. N

Parni corpus paruum, villosum, cylindricum, immarginatum; capite paruo, ouato, inserto; oculis rotundis, vix prominulis, lateralibus; antennis vix capite longioribus, absconditis, ante oculos insertis; thorace breuiter parum attenuato: angulis posticis acutis, prominentibus; scutello triangulari; elytris rigidis, longitudine abdominis, tegentibus: margine haud deflexo; pedibus brevibus, compressis, validis; tarsis quinquearticulatis; color obscurus.

9. NECROPHORVS. *Labium cordatum, emarginatum, crenatum.*
Antennae claua perforata.

1. N. ater, fronte margineque elytrorum ferrugi- *germanicus*
 neis. Ent. fyft. 1. 247. 1.

Silpha germanica. Linn. fyft. Nat. 2. 569. 1.

Oliv. Inf. 20. 10. tab. 1. fig. 2.

Illig. Col. Bor. 1. 353. 2.

Panz. Fn. Germ. 41. tab. 1.

Herbst. Col. 5. tab. 50. fig. 2.

Sulz. Inf. tab. 2. fig. 10.

Naturf. 6. tab. 4.

Payk. Fn. Sv. 1. 322. 1.

Degeer Inf. 4. 173. 2. tab. 6. fig. 4.

Habitat in Germaniae cadaueribus.

IV. 39.

2. N. ater, antennis apice rufis. Ent. fyft. 1. 247. 2. *humator.*

Nicrophorus humator. Oliv. Inf. 2. 10. 8. 4.

tab. 1. fig. 2.

Illig. Col. Bor. 1. 352. 1.

Schaeff. Icon. tab. 36. fig. 1.

Voet. Col. tab. 30. fig. 4. 5.

Panz. Fn. Germ. 41. tab. 2.

Herbst. Col. 5. tab. 50. fig. 3.

Geoff. Inf. 1. 99. 2.

IV. 39.

Payk.

Necrophori corpus maiusculum, oblongum, villosum, marginatum, agile; capite maiusculo, ovato, exserto; oculis reniformibus, haud prominulis, lateralibus; antennis longitudine thoracis: articulo primo longiori, incuruo, ante oculos insertis; thorace plano, saepius inaequali, margine laterali posticoque prominente, rotundato; scutello triangulari, obtuso; elytris incumbentibus: margine inflexo, abdomine brevioribus, truncatis; pedibus validis; femoribus crassis; tibiis compressis, striatis; tarsis quinquearticulatis; colore vario, pilis nitidulis.

Payk. Fn. Sv. 1. 323. r. β.

Habitat in Europae australioris cadaveribus

Varietatem praecedentis credit D. de Payk
at vix rite.

grandis.

3. *N. niger*, elytris maculis duabus, fronteque
pressa rufis. Ent. syst. 1. 247. 3. *

Nicrophorus Americanus. Oliv. Inf. 2. 10.
tab. 1. fig. 3.

Voet. Col. tab. 30. fig. 11.

Habitat in America boreali.

mediatus.

4. *N. ater*, antennarum claua, elytrorumque m
lis tribus ferrugineis.

Habitat in Carolina. Mus. Dom. Bosc.

Maior *N. vespillone*. Caput et thorax atra, imm
lata, sola antennarum claua ferruginea. El
atra, macula humerali, duabusque maiori
lunatis, ferrugineis. Corpus atrum, pec
auro-villofa.

velutinus.

5. *N. ater*, thorace auro holosericeo, elytris fa
duabus rufis.

Habitat in Carolina. Mus. Dom. Bosc.

Statura et magnitudo *N. Vespillonis*. Caput la
glabrum, atrum, antennarum claua nigra. T
rax planus pube densa aurea tectus. El
nigra, fasciis duabus sinuatis, rufis. Co
atrum, pectore auro-sericeo.

*margina-
tus.*

6. *N. ater*, elytris margine exteriori apicisque
culaque communi transuersa rufis.

Habitat in America.

Magnitudo *N. Vespillonis*. Antennae desunt.
put atrum, lunula ante clypeum rufa. Tho
planus, ater, immaculatus. Elytra atra, m
gine exteriori, macula ad apicem scutelli c
muni, transuersa, sericeata, apiceque cum r

gine exteriori coeunte, at futuram haud attingente, rufis. Pectus auro-villosum.

N. ater, elytris fascia duplici ferruginea, antennarum claua rubra. Ent. syst. 1. 247. 4. *Vespillo.*

Silpha Vespillo. Linn. syst. Nat. 2. 569. 2. Fr.

Sv. 444.

Nicrophorus Vespillo. Oliv. Inf. 2. 10. 7. 3. tab. 1. fig. 1.

Illig. Col. Bor. 1. 354. 3.

Panz. Fn. Germ. 2. tab. 21.

Voet. Col. tab. 3. fig. 1.

Herbst. Col. 5. tab. 50. fig. 4.

Geoff. Inf. 1. 98. 1. tab. 1. fig. 5.

Degeer Inf. 4. 168. 1. tab. 6. fig. 1.

Roef. Inf. 4. tab. 1. fig. 1. 2.

Schaeff. Icon. tab. 9. fig. 4.

Habitat in Europae cadaveribus, quae sepelit.

Moschum spirat. Ocyssime volitat elytris erectis, approximatis. Acaris valde infestatur. Femora postica videntata.

Variat rarius minor, fascia elytrorum anteriore abbreviata, posteriore maculari.

N. ater, elytris fascia duplici ferruginea, antennarum claua nigra. Ent. syst. 1. 248. 5. * *mortuorum*

Illig. Col. Bor. 1. 354. 4.

Panz. Fn. Germ. 41. tab. 3.

Herbst. Col. 5. tab. 50. fig. 6.

Voet. Col. 1. tab. 30. fig. 3?

Payk. Fn. Sv. 1. 324. 2. 8.

Habitat in Germaniae fungis, cadaveribus.

Varietatem praecedentis credit D. de Paykull, at perperam.

[An claua antennarum in necrophoris, pro diuesitate sexus, constanter variat? L.]

70. SILPHA. *Maxilla* videntata.
Ligula dilata, bifida.
Antennae extrorsum crassiores
 perfoliatae.

Surinamen- 1. *S. atra*, elytris fascia postica flava, femoribus posticis dentatis. Ent. syst. 1. 248. 1. *

sis.

Oliv. Inf. 11. tab. 1. fig. 3.

Habitat in America meridionali. Dr. Hunter.

littoralis. 2. *S. atra*, elytris laevibus: lineis elevatis tribus thorace orbiculato, nitido. Ent. syst. 1. 249. 2

Silpha littoralis. Linn. syst. Nat. 2. 570. 11

Fn. Sv. 450.

Oliv. Inf. 2. 11. 6, tab. 1. fig. 8.

11.46

Illig. Col. Bor. 1. 352. 3.

Voet. Col. tab. 32. fig. 1.

Panz. Fn. Germ. tab. 40. fig. 15.

Geoff. Inf. 1. 120. 3.

Degeer Inf. 4. 176. 3.

Habitat in Europae cadaveribus.

Larva ovata, fusca, voracissima.

Variat rarius femoribus posticis incrassatis, dentatis.

Silpha clauipes. Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 14

3. S

Silphae corpus depressum, ovatum, marginatum, glabrum; capite parvo, ovato, sub thoracem inflexo; oculis rotundatis, marginalibus; antennis brevibus, ante oculos insertis; thorace plano: marginibus exsertis, rotundatis; scutello subrotundo, acutiusculo; elytris incumbens, marginatis, abdomine latioribus, saepius abdomine brevioribus; pedibus brevibus, validis, cursoriis; femoribus compressis; tibiis striatis; tarsis quinquearticulatis; colore plerumque nigro, obscuro.

1. *S. fusca*, thorace, elytris pedibusque liuidis. Ent. *liuida*.
 Syst. 1. 249. 3. *
Silpha liuida. Oliv. Inf. 2. 11. 7. 3. tab. 1.
 fig. 8.
 Herbst. Col. 5. 174. 3. tab. 50. fig. 9.
 Degeer. Inf. 4. 176. 4.
 Habitat in Germania. Dom. Hybner.
Varietas praecedentis testibus D. Illiger et Pay-
 kull. Differt tamen magnitudine minore, co-
 lore antennisque totis nigris.
2. *S. atra*, viridi-nigricans, elytris striatis, truncatis, *micans*.
 videntatis. Ent. Syst. 4. App. 445. 2. *
 Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Holthuyfen.
3. *S. nigra*, elytris fasciis duabus ferrugineis, tho- *Indica*.
 race antice bidentato. Ent. Syst. 1. 249. 4.
Silpha Indica. Linn. Syst. Nat. 2. 570. 12.
 Mus. Lud. Vlr. 38.
 Habitat in India.
 Species mihi haud rite nota.
4. *S. depressa*, nigra, thorace flauo: centro nigro. *Americana*.
 Ent. Syst. 1. 249. 5. *
Silpha Americana. Linn. Syst. Nat. 2. 570. 7.
 Oliv. Inf. 2. 11. 8. 4. tab. 1. fig. 9.
 Catesb. Carol. 3. tab. 10. fig. 5.
 Seligm. Av. 4. tab. 108. fig. 7.
 Habitat in America.
5. *S. nigra*, elytris linea eletata vnica, thorace te- *thoracica*.
 staceo. Ent. Syst. 1. 250. 7.
Silpha testacea. Linn. Syst. Nat. 2. 571. 13.
 Fn. Sv. 452.
 Oliv. Inf. 2. 11. 8. 5. tab. 1. fig. 3. IV. 40
 Voet. Col. tab. 41. fig. 6.
 Geoff. Inf. 1. 121. 6.
 Schaeff. Icon. tab. 75. fig. 4. Panz.
X

- Panz. Fn. Germ. 40. tab. 16.
 Illig. Col. Bor. I. 362. 8.
 Herbst. Col. 5. tab. 50. fig. 11.
 Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 12.
 Degeer Inf. 4. 174. 3. tab. 6. fig. 7.
 Payk. Fn. Sv. I. 334. 10.
 Habitat in Europae cadaveribus.
- laeucollis.* 8. *S. gibba*, nigra, elytris rugosis: lineis elevatis, thorace laevi: emarginato. Ent. syst. 250. 8. *
- Silpha laeucollis.* Oliv. Inf. 2. II. 12. tab. fig. 15.
 Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.
- marginalis.* 9. *S. atra*, thoracis margine pallido, elytris fuscis. Ent. syst. I. 250. 9. *
- Silpha marginalis.* Oliv. Inf. 2. II. 10. tab. I. fig. 5.
Silpha noueboracensis. Forst. Cent. I. 17.
 Habitat in America boreali. D. Lee.
- rugosa.* 10. *S. nigricans*, elytris rugosis: lineis elevatis, thorace rugoso: postice sinuato. Ent. syst. I. 251. 10.
Silpha rugosa. Linn. Syst. Nat. 2. 571.
 Fn. Sv. 455.
 Oliv. Inf. 2. II. 17. tab. 2. fig. 17.
 Voet. Col. tab. 32. fig. a. 1.
 Geoff. Inf. I. 120. 4.
 Panz. Fn. Germ. 40. tab. 17.
 Illig. Col. Bor. I. 358. 4.
 Herbst. Col. 5. tab. 50. fig. 12.
 Payk. Fn. Sv. I. 332. 8.
 Habitat frequentissime in Europae cadaveribus.
- lapponica.* 11. *S. atra*, capite thoraceque argenteo-fericeis, elytris striatis punctisque elevatis globosis.

Silpha lapponica. Herbst. Col. 5. 209. 35. tab.
52. fig. 4.

Thunb. nou. Inf. spec. 5. 72.

Habitat in Lapponia frequentissime, cadauera,
piscis, carnes confugiens.

Statura et summa affinitas *S. rugosae*, quacum
coniunxerunt Linnæus et Paykullius. Anten-
nae nigrae. Caput et thorax pilis densis, ar-
genteis, holosericeis. Elytra atra, striis tribus
eleuatis, et inter has striae punctis magnis,
globosis, eleuatis.

12. *S. atra*, elytris punctatis: lineis eleuatis tribus *atrata*.
laeibus, thorace integro. Ent. syst. 1. 251.

11.

Silpha atrata Linn. syst. Nat. 2. 571. 12.

Oliv. Inf. 2. 11. 16. 15. tab. 1. fig. 4.

- - - - - tab. 2. fig. 4.

Voet. Col. tab. 40. fig. 1.

Geoff. Inf. 1. 118. 1.

Degeer. Inf. 4. 177. 5. tab. 6. fig. 15.

Illig. Col. Bor. 1. 363. 10.

Herbst. Col. 5. tab. 51. fig. 13. 14. 15.

Schaeff. Icon. tab. 93. fig. 5.

- Elem. tab. 96. fig. 1.

Payk. Fn. Sv. 1. 330. 5.

Habitat in Europae agris et riis frequens.

Mandibula crassa, cornea, incurua, dentata.

13. *S. testacea*, antennis apice nigris. Ent. syst. 1. *pedemontana*.
253. 20. *

Silphae pedemontana. Oliv. Inf. 2. 11. 19. 18.
tab. 1. fig. 6.

Geoff.

Silphae, et laruae et declaratae voraces, carniuorae. Captae
materiam foetidam, ingratam, fuscam eructant.

Geoff. Inf. 1. 123. 9.

Herbst. Col. 5. 194. 20. tab. 51. fig. 9.

Schaeff. Icon. tab. 75. fig. 6.

Habitat in agro Pedemontano. Dr. Allioni.

Affinis certe *S. atratae*, et forte mera eius varietas

inaequalis. 14. *S. atra*, elytris laevibus: lineis elevatis tribus
thorace inaequali emarginato. Ent. syst.
251. 12. *

Silpha inaequalis. Oliv. Inf. 2. 11. 14. 1.
tab. 2. fig. 20.

Habitat in America boreali. Mus. D. Banks.

lunata.

15. *S. atra*, elytris scabris: lineis elevatis tribus
laevibus, thorace plano emarginato. Ent. syst.
1. 251. 13. *

Silpha punctulata. Oliv. Inf. 2. 11. 13. tab.
fig. 19.

Habitat in Austria. D. Schulz.

laevigata. 16. *S. atra*, elytris laevibus subpunctatis. Ent. syst.
1. 252. 14. *

Silpha laevigata. Oliv. Inf. 2. 11. 14. 1.
tab. 1. fig. 1.

Geoff. Inf. 1. 122. 8.

Petagn. Inf. Col. 7. 28.

Illig. Col. Bor. 1. 369. 15.

Herbst. Col. 5. tab. 51. fig. 3.

Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 6.

Habitat in Europae sylvis.

obscura.

17. *S. nigra*, elytris punctatis: lineis elevatis
bus, thorace antice truncato. Ent. syst. 1. 2
15.

Silpha obscura. Linn. syst. Nat. 2. 572.
Fn. Sv. 457.

Oliv. Inf. 2. 11. 15. 14. tab. 2. fig. 18.

Illig. Col. Bor. 1. 367. 14.

Herbst. Col. 5. tab. 51. fig. 1.

Voet. Col. tab. 40. fig. 2.

Payk. Fn. Sv. I. 328. 3.

Habitat in Europa boreali.

18. *S. nigra*, thorace laevi, elytris rugosis: lineis reticulata.
eleuatis tribus. Ent. syst. I. 252. 16. *

Illig. Col. Bor. I. 366. 13.

Herbst. Col. 5. tab. 51. fig. 5.

Payk. Fn. Sv. I. 327. 2.

T. cop.

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

19. *S. fusca*, elytris concoloribus: lineis eleuatis opaca.
subternis, thorace antice truncato. Ent. syst. I.
252. 17. *

Silpha opaca, Linn. syst. Nat. 2. 571. 15. Fn.
Sv. 454.

Illig. Col. Bor. I. 360. 7.

Herbst. Col. 5. tab. 51. fig. 16.

Payk. Fn. Sv. I. 336. 12.

Schaeff. Icon. tab. 93. fig. 4.

Habitat in Europa haud infrequens.

20. *S. thorace emarginato scabro*, elytris lineis ele- sinuata.
natis tribus: apice sinuatis. Ent. syst. I. 252.
18. *

Silpha sinuata. Oliv. Inf. 2. 11. 18. 17. tab. 2.
fig. 12.

Voet. Col. tab. 32. fig. a. 2.

Geoff. Inf. I. 119. 2.

Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 15.

Illig. Col. Bor. I. 359. 5.

Herbst. Col. 5. tab. 51. fig. 7.

Payk. Fn. Sv. I. 332. 8.

Habitat in Anglia et Germania.

21. *S. nigra*, elytris pallidis: puncto baseos medio- apunctata.
que nigris, thorace emarginato. Ent. syst. I.
253. 19.

Sil-

- Silpha apunctata*. Linn. syst. Nat. 2. 571.
 Oliv. Inf. 2. 11. 10. 7. tab. 1. fig. 7.
 Geoff. Inf. 1. 122. 7.
 Illig. Col. Bor. 1. 363. 9.
 Panz. Fn. Germ. 40. tab. 18.
 Herbst. Col. 5. tab. 51. fig. 8.
 Voet. Col. tab. 41. fig. 5.
 Schreb. Inf. 2. fig. 5.
 Degeer Inf. 4. 181. 6.
 Payk. Fn. Sv. 1. 335. 11.
 Habitat in Anglia et Germania.
- dentata*. 22. *S. oblonga nigra*, thorace antice elytrisque
 apicem bidentatis. Ent. syst. 1. 254. 23. *
Silpha scabra Linn. syst. Nat. 2. 573. 23. P.
 Fn. Sv. 1. 538. 14.
 Habitat in Europa. Muf. D. Leske.
- limbata*. 23. *S. nigra*, thoracis elytrorumque margine sub
 rugineo, elytris lineis plurimis elevatis or-
 letis. Ent. syst. 1. 254. 24. *
~~22-23~~ *Silpha limbata*. Oliv. Inf. 2. 11. 21. 21. tab.
 fig. 14.
 Habitat in Africa aequinoctiali. Muf. D. Ban.
- undata*. 24. *S. nigra*, nitida, elytris fasciis duabus vno
 punctoque apicis albis. Ent. syst. 1. 254. 25.
 Habitat in Saxonia, sub arborum corticibus. M.
 D. Romani.
- minuta*. 25. *S. nigra*, antennarum basi pedibusque flaves-
 centibus. Ent. syst. 1. 254. 26. *
Silpha melanocephala. Illig. Col. Bor. 1. 356.
 Panz. Fn. Germ. 25. tab. 5?
 Habitat in Germania. Dom. Smidt.
 De synonymis valde dubito.

71. PELTIS. *Palpi* quatuor inaequales filiformes.

Ligula truncata, ciliata.

Antennae claua perfoliata.

1. P. picea, elytris punctatis: lineis eleuatis tribus, *grossa*.
thorace transuerso emarginato.

Silpha grossa. Ent. syst. 1. 249. 6. Linn. syst.

Nat. 2. 572. 27. Fn. Sv. 459.

Peltis grossa. Illig. Col. Bor. 1. 375. 1. VII. 20

Herbst. Col. 5. tab. 50. fig. 10.

Oliv. Inf. 2. 11. 8. tab. 1. fig. 2.

Payk. Fn. Sv. 1. 337. 13.

Habitat in Europa boreali.

Os maxillis palisque. *Palpi* quatuor inaequales, filiformes: *anteriores* paullo longiores, quadriarticulati; articulo secundo longiori, ultimo oblongo, adhaerentes maxillae dorso; *posteriores* triarticulati: articulo secundo longiori, ultimo ouato, adnati ligulae medio interiori. *Mandibula* breuis cornea, apice denticulata. *Maxilla* cornea, videntata. *Ligula* membranacea, apice dilatata, truncata, ciliata, vix emarginata. *Labium* corneum, transuersum, emarginatum.

2. P.

Peltidis corpus oblongum, depressum, glabrum, marginatum, tardum; *capite* ouato, prominulo, inserto; *oculis* oblongis, transuersis, lateralibus: *antennis* thorace breuioribus: articulo primo maiori, ante oculos insertis; *thorace* plano, breui, transuerso, antice emarginato, lateribus marginatis, rotundatis; *scutello* breui, rotundato; *elytris* marginatis, rigidis, longitudine abdominis, tegentibus; *pedibus* breuibus, compressis, cursoriis; *tarsis* quinquearticulatis; *colore* nigro, obscuro.

ferruginea. 2. *P. ferruginea*, elytris lineis elevatis senis
cantibus: margine ferrugineo.

Silpha ferruginea. Ent. syst. 1. 253. 2.

Linn. syst. Nat. 2. 572. 19.

Peltis ferruginea. Illig. Col. Bor. 1. 376.

Silpha ferruginea. Oliv. Inf. 2. 4. 20. 20.

VII. 20

2. fig. 13.

Otoma rubicunda. Laichart. 1. 102. 1.

Degeer. Inf. 4. 183. 9.

Schaeff. Icon. tab. 40. fig. 7.

Herbst. Col. 5. tab. 51. fig. 10.

Payk. Fn. Sv. 1. 339. 15.

Habitat in Europa boreali.

oblonga. 3. *P. nigra*, elytris striato-punctatis: lineis e
tis senis thorace emarginato.

Silpha oblonga. Ent. syst. 1. 253. 22. Linn.

Nat. 2. 572. 22. Fn. Sv. 460.

VII. 20

Peltis oblonga. Illig. Col. Bor. 1. 377. 3.

Silpha oblonga. Oliv. Inf. 2. 11. 20. 19.

2. fig. 16.

Degeer Inf. 4. 185. 11.

Herbst. Arch. tab. 20. fig. 22.

Payk. Fn. Sv. 1. 340. 16.

Herbst. Col. 5. 196, 22. tab. 51. fig. 11.

Habitat in Europae ligno putrescente.

limbata. 4. *P. capite*, thorace elytrisque obscuris: ma
rufo,

Cassida limbata. Ent. syst. 1. 294. 11.

Peltis limbata. Illig. Col. Bor. 1. 378. 4.

VIII. 19

Oliv. Inf. 97. tab. 1. fig. 15.

Peltis brunnea. Payk. Fn. Sv. 1. 350. 1.

Cassida brunnea. Thunb. nou. sp. 1.

Habitat in Diantho Carthusianorum Saxoniae

Hybner.

- B. IMATIDIUM.** *Os* apertura orbiculata.
Palpi breuissimi, subulati.
Maxilla membranacea, vni-
 dentata.
Antennae cylindricae.

I. *I. pallidum*, thoracis disco coleoptorumque macu- *3macula-*
 lis tribus coeruleo-atris: posteriori communi. *tum.*
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
 D. Lund.

Statura fere *Cassidae*. Caput pallidum antennis
 approximatis, cylindricis nigris: articulo pri-
 mo maiore, pallefcente. Thorax niger, nitidus: margine pallido. Elytra dilatata, abdomine latiora, punctato-striata, pallida, nitida: macula magna transuersa baseos maiorique commune ante apicem coeruleo-atris. Corpus cum pedibus pallidum.

Os maxillis palpisque, apertura orbiculari, clypeo breui, rotundato, submarginato. *Palpi* quatuor breuissimi, subaequales: *anteriores* quadriarticulati; articulo ultimo subulato, adhaerentes maxillae dorso, *posteriores* triarticulati: articulo ultimo subulato, adnati ligulae medio. *Mandibula* breuis, cornea, arcuata, acuta.
Ma-

Imatidii corpus ovatum, depresso, glabrum, marginatum, agile; *capite* minuto, subrotundo, inserto; *oculis* magnis, globosis, lateralibus; *antennis* thorace longioribus, articulis minutis, vix conspicuis: primo maiore, approximatis, inter oculos insertis; *thorace* breui, transuerso, marginato, antice valde emarginato: angulis acutiusculis; *scutello* triangulari; *elytris* dilatatis, abdomine multo latioribus, planis, incumbentibus longitudine abdominis; *pedibus* breuibus, validis, cursoriis; *tarsis* quadriarticulatis, colore vario, nitidulo.

Maxilla brevis, membranacea, videntur
Ligulam et *labium* haud rite vidi.

fasciatum. 2. I. albidum, elytris fasciis tribus atris.
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. M.
 D. de Sehestedt.

Praecedente minor. Caput prominulum, nigrum.
 Thoracis clypeus antice late emarginatus,
 transuersus, marginatus, albidus: maculis
 tribus baseos fere connatis, atris. Elytra puncto-
 striata, pallida, fasciis tribus atris, margi-
 nem haud attingentibus, baseos in medio in-
 rupta, media inaequali, dentata, tertia
 apicem minore. Corpus pallidum.

thoracicum. 3. I. atrum, thoracis clypeo flavo immaculato.
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. M.
 D. de Sehestedt.

Statura omnino praecedentis. Caput promi-
 nulum, atrum. Thoracis clypeus transuersus,
 flavus, antice late emarginatus, nitidus.
 Elytra substriata, atra, coeruleo-nitida. Ab-
 domen brunneum.

lineola. 4. I. atrum, thoracis clypeo flavo: linea dor-
 atra.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. M.
 D. de Sehestedt.

Statura omnino praecedentis, et forte mera e-
 varietas. Differt tantum linea thoracis me-
 atra.

sanguineum. 5. I. fanguineum, elytris rugosis.
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. M.
 D. Lund.

Statura et magnitudo praecedentis, totum fang-
 uineum, margine parum pallidiore. Discus re-
 cu

culatus, margo transuersim striatus. Pedes sanguinei.

3. NITIDVLA. *Palpi* quatuor filiformes.

Maxilla cylindrica, membranacea.

Antennae claua solida.

1. *N. ouata*, nigra, elytris fulcatis: maculis transuersis ferrugineis.

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Magna in hoc genere. Thorax subpunctatus, niger, margine ferrugineo. Elytra fulcata, maculis plurimis transuersis ferrugineis: posteriore maiore. Corpus nigrum, pedibus ferrugineis.

2. *N. ouata*, nigra, elytris puncto rubro. Ent. syft. *spusulata*.

I. 255. I.

Silpha 2pustulata. Linn. syft. Nat. 2. 570. 4.

Fn. Sv. 445.

Nitidula 2pustulata. Oliv. Inf. 2. 12. 4. I.

tab. 1. fig. 2.

Illig. Col. Bor. 1. 382. 6.

Panz. Fn. Germ. 3. tab. 10.

I. 30.

Geoff. Inf. 1. 100. 3.

Laichart. 1. 106. 3.

Degeer. Inf. 4. 186. 13. tab. 6. fig. 22. 23.

Herbst.

Nitidulae corpus paruum, ouatum, depressiusculum, glabrum, agile; capite ouato, inserto; oculis rotundatis, marginalibus; antennis breuibus, ante oculos insertis; thorace depresso, marginato, antice late emarginato; scutello paruo, rotundato; elytris submarginatis, rigidis, longitudine abdominis; pedibus breuibus, validis; femoribus compressis; tibiis rotundatis; tarsis quinquearticulatis; colore obscuro.

- Herbst. Col. 5. 229. 1. tab. 53. fig. 1.
 Payk. Fn. Sv. 1. 249. 4.
 Habitat in cadaueribus, lardo.
- apustulata.* 3. N. ouata, fusca, elytris maculis duabus ru
 Ent. fyft. 1. 255. 2. *
 Habitat in Germania. D. Smidt.
- obscura.* 4. N. ouata, nigra, obscura, pedibus piceis. Ent.
 1. 255. 3. *
Nitidula obscura. Oliv. Inf. 2. 12. 5. 3. tab.
 fig. 3.
 Illig. Col. Bor. 1. 383. 7.
 Herbst. Col. 5. tab. 53. fig. 2.
 Degeer Inf. 4. 188. 15.
 Herbst. Arch. 15. tab. 20. fig. 23.
 Payk. Fn. Sv. 1. 349. 3.
 Habitat in Germania. Dom. de Hattorff.
- abbreviata.* 5. N. ouata, nigra, obscura, elytris laeuius, ob
 fis abbreviatis. Ent. fyft. 1. 256. 4. *
Nitidula abbreviata. Oliv. Inf. 2. 12. 5. 5.
 tab. 1. fig. 5.
 Habitat in noua Zelandia. Mus. D. Banks.
- marginata.* 6. N. ouata, elytris fulcatis: margine punctis
 disci ferrugineis. Ent. fyft. 1. 256. 5. *
 III. 31. *Nitidula marginata.* Oliv. Inf. 2. 12. 11.
 tab. 2. fig. 15.
 Habitat in Italia. Dr. Allioni.
- aestiu.* 7. N. subtomentosa, testacea, thorace transue
 emarginato, oculis nigris. Ent. fyft. 1. 256.
 VII. 21. *Silphu aestiu.* Linn. fyft. Nat. 2. 574. 32.
 Sv. 465.
Nitidula aestiu. Oliv. Inf. 2. 12. 16. 23, t
 3. fig. 23.
Nitidula depressa. Illig. Col. Bor. 1. 385. 10.
 Herbst. Arch. tab. 22. fig. 24.

Herbst.

Herbst. Col. 5. tab. 53. fig. 5.

Payk. Fn. Sv. 1. 350. 5.

Habitat in Europae floribus.

8. *N. ouata*, pallida, pedibus flavescentibus. Ent. *pallida*.
 Syst. suppl. 73. 6. *
 Habitat in India orientali.

9. *N. ouata*, testacea, elytris laevibus, thorace emar- *obsoleta*.
 ginato. Ent. Syst. 1. 256. 7. *
Nitidula unicolor. Oliv. Inf. 2. 12. 17. 24.
 tab. 2. fig. 9.

Silpha depressa. Linn. Syst. Nat. 2. 514. 33.

Illig. Col. Bor. 1. 384. 9.

Herbst. Col. 5. 240. 11. tab. 53. fig. 10.

Payk. Fn. Sv. 1. 351. 6.

Habitat in Europae borealis Betula. Mus. Dom.
 Lund.

10. *N. ouata*, subtomentosa, ferruginea, elytris sub- *ferruginea*.
 striatis. Ent. Syst. 1. 257. 8. *

Dermestes ferrugineus. Linn. Syst. Nat. 2. 564.

21. Fn. Sv. 433.

VII. 4.

Nitidula striata. Oliv. Inf. 2. 12. 14. 19. tab. 1.
 fig. 7.

Ostoma ferruginea. Laichart. 1. 104. 2.

Strongylus aestivus. Herbst. Col. 4. 186. 6.

Payk. Fn. Sv. 1. 356. 14.

Habitat in Angliae et Sueciae Lycopodis.

11. *N. ouata*, ferruginea, mandibulis porrectis, dor- *cornuta*.
 so dentatis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
 D. de Sehestedt.

Magnitudo omnino *N. ferrugineae*, at forte pro-
 prii generis. Antennae ferrugineae, clava per-
 foliata fusca. Mandibulae porrectae, longitudi-
 ne capitis, dorso dente eleuato, valido, apice
 bifi-

bifidae. Thorax planus, latus, punctatus, rufineus. Elytra striata.

strigata.

12. *N. ovata*, fusca, thorace margine, elytris nigricante: lineola basios strigatae apicis: fusca.
Ent. syst. 1. 257. 9. *

Nitidula strigata. Oliv. Inf. 2. 12. 13. 17. 2. fig. 12.

Vll. 21.

Strongylus strigatus. Herbst. Col. 4. tab. fig. 7.

Payk. Fn. Sv. 1. 356. 13.

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

imperialis.

13. *N. ovata*, nigra, elytris maculis connatis, albis margineque rufo. Ent. syst. 1. 257. 10.
Herbst. Col. 5. 248. 24. tab. 54. fig. 8.

Payk. Fn. Sv. 1. 355. 12.

Habitat in Germania. D. Smidt.

roguttata.

14. *N. ovata*, fusca, thoracis margine elytrorum punctis quinque pallidis. Ent. syst. 1. 257. 11. *

Illig. Col. Bor. 1. 382. 5.

Herbst. Col. 5. 249. 26.

Payk. Fn. Sv. 1. 354. 10.

Habitat in Germania. D. Smidt.

varia.

15. *N. ovata*, thorace elytrisque nigro ferrugineo variis. Ent. syst. 1. 258. 12. *

Nitidula varia. Oliv. Inf. 2. 12. 12. 15. tab. fig. 10.

Illig. Col. Bor. 1. 380. 2.

Herbst. Col. 5. tab. 53. fig. 4.

- - Arch. tab. 20. fig. 25.

Degeer. Inf. 4. 184. 10.

Payk. Fn. Sv. 1. 347. 1.

Habitat Kiliae.

16. *N. ovata*, nigra, thorace elytrisque obscure fer- *fordida*.
 rugineis. Ent. fyft. 1. 258. 13. °
 Illig. Col. Bor. 1. 379. 1.
 Herbft. Col. 5. tab. 54. fig. 9.
 Payk. Fn. Sv. 1. 348. 2.
 Habitat in Germania; D. Smidt.
17. *N. obscura*, elytris punctato-striatis aeneis. *punctata*.
 Habitat in Sumatra. Dom. Daldorf.
 Statura et magnitudo *N. fordidae*. Antennae ca-
 pitatae huius generis. Thorax parum margina-
 tus, obscurus. Elytra valde punctato-striata,
 aenea, obscure nitida. Corpus obscurum.
18. *N. ovata*, nigra, thoracis margine elytrorumque *flexuosa*.
 macula flexuosa flavis. Ent. fyft. 1. 258. 14. °
Nitidula flexuosa. Oliv. Inf. 2. 12. 7. 6. tab.
 1. fig. 6.
 Herbft. Col. 5. 246. 21. tab. 54. fig. 5.
 Payk. Fn. Sv. 1. 354. 9.
 Habitat in Gallia meridionali. Mus. D. Olivier.
19. *N. ferruginea*, elytris nigris: fascia baseos pun- *bicolor*.
 ctoque apicis ferrugineis. Ent. fyft. 1. 259. 15.
 Herbft. Col. 5. 240. 4. tab. 53. fig. 10. K. K.
 Habitat Kiliae. D. Lund.
20. *N. nigra*, elytris ferrugineo-variis, thorace *Colon*.
 emarginato. Ent. fyft. 1. 259. 16.
Silpha Colon. Linn. fyft. Nat. 2. 573. 27. Fn.
 Sv. 462.
Nitidula Colon. Oliv. Inf. 2. 12. 4. 2. tab. 1.
 fig. 1.
 Geoff. Inf. 1. 164. 13.
 Illig. Col. Bor. 1. 380. 3.
 Degeer. Inf. 4. 187. 14. tab. 6. fig. 24.
 Laichart. 1. 107. 4.
 Habitat in Europa haud frequens.

- limbata.* 21. *N. nigra*, thoracis margine elytrorumque lim ferrugineis. Ent. syst. 1. 259. 17.
Nitidula limbata. Oliv. Inf. 2. 12. 20. 31. t. 3 fig. 18.
 Illig. Col. Bor. 1. 383. 8.
 Herbst. Col. 5. tab. 53. fig. 9.
 Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.
- haemorrhoidalis.* 22. *N. nigra*, elytris apice ferrugineis. Ent. syst. 259. 18. *
Nitidula haemorrhoidalis. Oliv. Inf. 2. 12. 1. 16, tab. 1. fig. 4.
 Herbst. Col. 5. tab. 53. fig. 6.
 Payk. Fn. Sv. 1. 352. 7.
 Habitat Hamburgi. Dr. Schulz.
Varietatem *N. Colonis* credit D. Illiger, *N. discoideae* D. de Paykull, at distincta videtur.
- discoides.* 23. *N. thorace marginato*, nigra, coleoptrorum disco ferrugineo. Ent. syst. 1. 259. 19. *
 VII. 21. Illig. Col. Bor. 1. 381. 4.
 Herbst. Col. 5. tab. 53. fig. 7.
 Habitat in Anglia et Germania.
- pedicularia.* 24. *N. nigra*, elytris laevibus, thorace marginato 260. 20. *
Silpha pedicularia. Linn. syst. Nat. 2. 574. 34. Fn. Sv. 466.
Nitidula pedicularia. Oliv. Inf. 2. 12. 19. 28. tab. 3. fig. 21.
Nitidula solida. Illig. Col. Bor. 1. 389. 16.
Strongylus psyllius. Herbst. Col. 4. 189. 9.
 Payk. Fn. Sv. 1. 353. 8.
 Habitat in Europae floribus.
- opustulata.* 25. *N. nigra*, elytris truncatis: punctis tribus, an pedibusque rufis. Ent. syst. 1. 360. 21. *
 II. 66. Habitat in Germaniae floribus. D. Prof. Helwig 26. N

26. N. thorace testaceo: macula atra, elytris testaceo-fasciatis. *fasciata*.
 cis: fascia media nigra, testaceo-punctata.
 Ent. syst. suppl. 74. 22. *
 Habitat in Holsatia.
 Forte potius ad Coccinellas demandanda.
27. N. testacea, elytris litura arcuata nigra. Ent. *litura*.
 syst. v. 260. 22. *
Coccinella litura. Illig. Col. Bor. I. 419. 10.
 Panz. Fn. Germ. 36. tab. 5.
 Herbst. Col. 5. tab. 59. fig. 2. *W. 32*
 Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.
28. N. viridi-aenea, antennis pedibusque nigris. *aenea*.
 Ent. syst. I. 261. 24.
Strongylus psyllius. Herbst. Col. 4. tab. 43. f. 9.
Dermestes psyllius. Herbst. Arch. 4. tab. 20.
 fig. 4.
Nitidula aenea. Oliv. Inf. 2. 12. 17. 25. tab. 3.
 fig. 20. *v. 11. 22.*
 Geoff. Inf. I. 86. 30.
 Illig. Col. Bor. I. 888. 15.
 Habitat in Europae floribus.
29. N. viridi-aenea, pedibus rufis. Ent. syst. I. *viridescens*.
 261. 25. *
Nitidula viridescens. Oliv. Inf. 2. 12. 18. 26.
 tab. 4. fig. 30. *v. 11. 22.*
 Herbst. Col. 5. tab. 54. fig. 1.
 Habitat Kiliae. Dom. Daldorff.
 Nimis praecedenti affinis, et forte mera eius va-
 rietas.
30. N. ferruginea, elytris abbreviatis, testaceis, im- *hemiptera*.
 maculatis. Ent. syst. I. 261. 26. *
 Habitat in Americae meridionalis Insulis. Dom.
 Smidt.

- humeralis.* 31. *N. nigra*, nitida, elytris dimidiatis: puncto baseos rufo. Ent. syst. suppl. 74. 26. *
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Dom. Daldorff.
- rupta.* 32. *N. ferruginea*, elytris dimidiatis: apice nigri
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.
Maior *N. hemiptera*. Caput, thorax et corpus ferruginea, immaculata. Elytra abdomine dimidiata breviora, ferruginea, margine postico nigro.
Varietas duplo minor vix differt.
- quadrata.* 33. *N. nigra*, elytris dimidiatis pallidis: litura communi fusca. Ent. syst. suppl. 74. 26. *
Habitat Cajennae. D. Prof. Cuvier.
- cadaverina* 34. *N. obscure ferruginea*, elytris dimidiatis: macula apicis flava.
Habitat in animalibus Americae conseruatis, siccatis. Mus. D. Lund.
Corpus paruum, omnino distinctum. Antenna claua solida. Caput et thorax obscura, ferruginea; immaculata. Elytra laevia, ferruginea dimidiata, litura baseos maculaque magna apicis flavis.
- macroptera* 35. *N. atra*, nitida, pedibus piceis, elytris dimidiatis
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.
Statura *N. ruptae*, at paullo minor, tota atra, nitida. Elytra laevia, dimidiata. Pedes picei.
- dimidiata.* 36. *N. nigra*, elytris abbreviatis fuscis, pedibus ferrugineis. Ent. syst. 1. 261. 27. *
Habitat in Americae Infulis. Dr. Pflug.
- truncata.* 37. *N. testacea*, elytris truncatis: macula communis baseos nigra. Ent. syst. 1. 261. 28. *
Habitat in Germania. Dom. Smidt.

38. *N. nigra, nitida, pedibus pallidis.* Ent. syst. 1. *rufipes.*
261. 29. *

Nitidula rufipes. Oliv. Inf. 2. 12. 21. tab. 5.
fig. 23.

Silpha rufipes. Linn. syst. Nat. 2. 573. 24.
Habitat in Anglia.

74. HETEROCERVS. *Palpi breues, filiformes.*
Maxilla videntata, longi-
tudine palporum.
Labium emarginatum.
Antennae breues, recur-
uae: articulo tertio
quartoque cordatis, vl-
timis ferratis.

1. *H. villosus, fuscus, elytris, margine punctisque* marginata-
ferrugineis. Ent. syst. 1. 262. 1. * tus.

Heterocerus marginatus. Bosc. Act. Soc. Hist.
nat. Paris. 1. tab. 1. fig. 5.

Dermestes fenestratus. Thunb. nou. Inf. sp. 1.
Illig. Col. Bor. 1. 397. 1.

Panz. Fn. Germ. 28. tab. 11. 12. *H. 15.*

Habitat Halae Saxonum, Dom. Hybner, in Gal-
lia. D. Bosc.

2. H.

Heteroceri corpus paruum, ovatum, villosum, immargina-
tum, tardum; *capite* ovato, latitudine fere thoracis, inter-
to; *clypeo* porrecto, rotundato; *oculis* globosis, laterali-
bus; *antennis* vix capite longioribus, distantibus, ante
oculos inertis; *thorace* rotundato, gibbo: marginibus
deflexis; *scutello* rotundato; *elytris* rigidis, fornicatis,
tegentibus, longitudine abdominis; *pedibus* breuibus, va-
lidis; *tibiis* anticis dilatatis, ferratis; *tarsis* quinquearti-
culatis; *colore* obscuro.

dabius. 2. *H. villosus*, fuscus, elytris macula marginali fœvæ ruginea. Ent. syst. suppl. 75. 2. *
Habitat Tranquebariæ. Dom. Daldorff. Mus. D. de Sehestedt.

laevigatus. 3. *H. villosus*, fuscus, elytris fasciis inaequalibus pallidis.

Habitat in Germania.

Paullo maior *H. marginato* et affinis. Caput et thorax pubescentia, fusca, obscura. Elytra laevia, glabra, fusca, fasciis tribus vndatis, abbreviatis, albidis. Pedes flavescentes, tibiis anticis dilatatis, valde ferratis.

H. 15

75. COCCINELLA. *Palpi anteriores securiformes.*

posteriores filiformes.

Antennae clava solida.

marginata. 1. *C. coleoptris rubris*: margine nigro, thorace vtrinque puncto marginali albo. Ent. syst. 1. 266. 1.

Coccinella marginata. Linn. syst. Nat. 2. 579. 1.
Habitat in America meridionali.

limbata. 2. *C. atra*, coleopterorum disco rubro: punctis duobus atris. Ent. syst. 1. 266. 2. *
Habitat Hamburgi. Dr. Schulz.

3. C

Coccinellae corpus paruum, subrotundum, saepius glabrum laeve, nitidum, supra gibbum, subtus planum., immarginatum, agile; *capite* ovato, inserto; *oculis* rotundatis, lateralibus; *antennis* brevibus, ante oculos insertis; *thorace* submarginato: margine deflexo; *scutello* minuto, rotundato; *elytris* rigidis, fornicatis, obtegentibus, longitudine abdominis: margine subtus canaliculato; *pedibus* brevibus, validis; *femoribus* compressis; *tibiis* rotundatis; *tarsis* triarticulatis; *colore* vario, nitido, saepius punctato.

3. *C. coleoptris* obscure testaceis: margine flauo. ~~*marginella*~~
Ent. syst. 1. 266. 3. * *pallidata*
Habitat in America. Mus. Dom. Romani.
4. *C. subrotunda*, thorace coleoptrisque testaceo-
diaphanis immaculatis. Ent. syst. suppl. 76. 3. * *diaphana*.
Habitat Kiliae. Dom. Daldorff.
5. *C. subrotunda*, obscure testacea, pubescens, ocu-
lis nigris. Ent. syst. suppl. 77. 3. * *pubescens*.
Habitat in India orientali. Dom. Daldorff.
6. *C. oblonga*, pallida, pectore nigricante. *Abietis*.
Coccinella Abietis. Payk. Fn. Sv. 2. 10. 10.
Habitat in Europa boreali.
Minuta, pubescens, pallida, pectore solo parum
nigricante.
7. *C. coleoptris* ferrugineis immaculatis, thorace ~~*immacula-*~~
atro: margine punctisque dorsalibus albis. *sa*.
Ent. syst. 1. 267. 5. *
Habitat in Americae Infulis. Dom. Isert.
8. *C. thorace* elytrisque testaceis immaculatis. Ent. ~~*unicolor*~~.
syst. 1. 267. 6. *
Habitat in India orientali. D. Prof. Abildgaard.
9. *C. subrotunda*, coleoptris fanguineis immaculatis, ~~*coccinea*~~.
corpore rubro.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.
Parua, subrotunda, fanguinea, capite thoracisque
antico paullo pallidior. Elytra fanguinea, ni-
tida, immaculata.
10. *C. oblonga*, coleoptris testaceis immaculatis, tho- ~~*M. nigrum*~~.
race albo, *M. nigro* notato. Ent. syst. 1. 267.
7. *
Illig. Col. Bor. 1. 430. 17.
Herbst. Col. 5. tab. 57. fig. 1-7.
Payk.

Payk. Fn. Sv. 2. 41. 42.

Degeer Inf. 5. 383. 18.

Habitat Kiliae.

discolor.

11. *C. subrotunda*, coleoptris testaceis immaculatis
thorace albo: basi punctisque duobus atris.
Ent. fyft. suppl. 77. 7. *

Habitat in India orientali. Dom. Daldorff.

cincta.

11. *C. subrotunda*, flavescens, thorace punctis quatuor nigris. Ent. fyft. suppl. 77. 8. *

Habitat in India orientali. Dom. Daldorff.

sanguinea.

12. *C. coleoptris sanguineis immaculatis*, thorace maculis nigris. Ent. fyft. 1. 267. 8.

Coccinella sanguinea. Linn. fyft. Nat. 2. 57.

3. Amoen. acad. 6. 393. 4.

Habitat in America meridionali.

impunctata

14. *C. coleoptris rubris*: puncto nullo, thorace rubro, medio fuscescente. Ent. fyft. 1. 267. 9.

Panz. Fn. Germ. 36. tab. 4.

Coccinella impunctata Linn. fyft. Nat. 2. 579.

III. 31. *Coccinella globosa.* Payk. Fn. Sv. 2. 11. 12.

Degeer Inf. 4. 369. 1.

Habitat in Sueciae hortis.

dimidiata.

15. *C. coleoptris coccineis apice atris.* Ent. fyft. 268. 10. *

Habitat in Coromandel. Mus. D. Banks.

marginata.

16. *C. coleoptris flavis*: margine albido; punctis duobus nigris. Ent. fyft. 1. 268. 11. *

punctata.

Illig. Col. Bor. 1. 438. 26.

VII. 21.

Habitat in Europae hortis.

17.

Coccinellae species difficillime eruuntur. Varietates faeples, at adhuc vix rite obseruatae. Retinui Ideo plenas, vsque dum magis illucescant. Differentia specierum distinctae nil damni inferunt, et species nulla deletur.

17. *C. coleoptris rubris*: lineolis duabus baseos ^{stri} ~~lineola~~.
 cisque nigris. Ent. syst. 1. 268. 12. *
 Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.
18. *C. coleoptris rubris*: fascia lata nigra; punctis *dorsimacula*.
 duobus rufis. Ent. syst. suppl. 77. 13. *
 Habitat in India orientali. Mus. D. de Sehestedt.
19. *C. coleoptris rubris*: fascia media atra. Ent. *unifasciata*.
 syst. 1. 268. 13. *
Coccinella dispar. Illig. Col. Bor. 1. 447. var. 14.
 Herbst. Col. 4. tab. 58. fig. 4.
 Payk. Fn. Sv. 18. 18. var. 7.
 Habitat Hamburgi. Dr. Schulz.
20. *C. coleoptris rubris*: macula subannulari nigra. *annulata*.
 Ent. syst. 1. 268. 14.
 Linn. syst. Nat. 2. 579. 5.
 Illig. Col. Bor. 1. 456. var. 9.
 Habitat in Europae hortis.
21. *C. coleoptris flauis*: lineis tribus abbreviatis *trilineata*.
 flauis. Ent. syst. 1. 268. 15. *
 Habitat in America. Mus. Dom. Zschuck.
22. *C. coleoptris flauis*: margine futura vittisque *vittata*.
 duabus atris, thorace atro; margine antico
 albo. Ent. syst. 1. 269. 16. *
 Habitat in Guinea. Mus. Dom. Isert.
23. *C. coleoptris testaceis*: futura vittisque duabus *futuralia*.
 abbreviatis atris. Ent. syst. suppl. 78. 16. *
 Habitat in India orientali. Dom. Daldorff.
24. *C. coleoptris sanguineis*: maculis duabus magnis ^{ne} *limbata*.
 futuraeque atris.
 Herbst. Col. 4. tab. 55. fig. 13.
 Voet. Col. tab. 44. fig. 29.
 Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lund.
 Magnitudo et summa affinitas *C. vittatae*. Caput
 album,

album, immaculatum. Thorax antice albus postice niger, interdum puncto vno altero nigro, basi nigra connexo. Elytra sanguinea macula magna disci futuraque atris. Corpus nigrum.

striata.

25. *C. coleoptris flavis*: margine, futura vittisque duabus abbreviatis atris, thoracé flavo, punctis duobus obscurioribus. Ent. syst. 1. 269. 17. *

Coccinella lineata. Thunb. nou. sp. Inf. 1. Habitat in Guinea. Dom. Isert,

oblongo-punctata.

26. *C. coleoptris flavis*: lineis quatuor abbreviatis punctisque sex atris. Ent. syst. 1. 269. 18. *
vll. 19. Habitat in Russia australiori. Dom. Boeber.

abbreviata.

27. *C. coleoptris rubris*: fascia postica abbreviata punctisque duobus nigris, thorace atro: lineis duabus albis. Ent. syst. 1. 269. 19. *

6lineata.

28. *C. coleoptris flavis*: lineis sex punctisque tribus nigris, Ent. syst. 1. 270. 20.

Coccinella hebraea. Linn. syst. Nat. 2. 580. 1.

Fn. Sv. 473.

Payk. Fn. Sv. 2. 14. 13. β.

Illig. Col. Bor. 1. 437. β.

Habitat in Europa boreali, Mus. D. Banks.

Varietas C. ocellatae DD. Illiger et Paykull.

2punctata.

29. *C. coleoptris rubris*: punctis nigris duobus. Ent. syst. 1. 270. 21.

Linn. syst. Nat. 2. 580. 7.

Geoff. Inf. 1. 320.

Frisch. Inf. 9. 33. tab. 16. fig. 4.

Schaeff. Icon. tab. 9. fig. 9.

Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 3.

Illig. Col. Bor. 1. 417. var. 19.

Pay

- Payk. Fn. Sv. 2. 17. 18. var. x.
Habitat in Europae hortis frequens.
30. *C. coleoptris rubris*: punctis nigris tribus. Ent. *3punctata*.
syft. 1. 270. 22.
- Coccinella collaris*. Payk. Fn. Sv. 2. 37. 37.
Linn. syft. Nat. 2. 580. 8. Fn. Sv. 472.
Roff. Fn. Etr. 1. 61. 151.
Habitat in Germania. D. Schneider.
31. *C. coleoptris luteis*: maculis duabus longitudi- *hierogly-*
nalibus sinuatis. Ent. syft. 1. 270. 23. *punca.*
Linn. syft. Nat. 2. 580. 14. Fn. Sv. 476.
Degeer Inf. 5. 382. 75.
Illig. Col. Bor. 1. 445. 31. var. γ.
Payk. Fn. Sv. 2. 35. 35.
Habitat in Europae hortis.
32. *C. coleoptris luteis*: fasciis duabus dorsalibus *riularis*.
sinuatis, punctisque sex nigris, thorace atro-
flavo bipunctato. Ent. syft. 1. 270. 24. *
Coccinella transuersalis. Thunb. nou. Inf. sp. 1.
Habitat in Suecia.
33. *C. ouata, coleoptris rubris*: fasciis tribus atris; *tricineta*.
antere abbreviata tricuspudata. Ent. syft. 1.
271. 25. *
Habitat in China. Mus. D. de Sehestedt.
34. *C. ouata, coleoptris rubris*: punctis quatuor. fa- *arcuata*.
sciis duabus punctoque apicis, nigris. Ent. syft.
1. 271. 26. *
Habitat in China. Mus. D. de Sehestedt.
35. *C. ouata, coleoptris rubris*: maculis annulari- *catenata*.
bus connatis atris.
Habitat in Amboina. D. Billardiere.
Corpus maiusculum. Caput album. Thorax ater,
angulo antico albo. Elytra rufa, nitida, annu-
lis

lis duobus atris, inter se et cum futura connexis. Exserunt dentem ad marginem externam, et postice ramus flexuosus exit, qui se futuram attingit. Subtus fusca, puncto vtriusque collari albo.

*reticulata.*36. *C. coleoptris* flavis nigro-reticulatis.

Habitat in maris pacifici Insulis. D. Billardiere Media. Caput album, immaculatum. Thorax niger, linea dorsali punctisque duobus parvis, brevibus, connexis, nigris. Coleoptra flava, nigro-reticulata. Corpus ferrugineum.

*ovata.*37. *C. oblonga*, coleoptris luteis: fascia flexuosa punctisque duobus nigris, thorace flavo punctato. Ent. syst. 1. 271. 27. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

*flexuosa.*38. *C. ovata*, coleoptris luteis: fascia flexuosa punctisque duobus nigris, thoracis margine alba. Ent. syst. 1. 272. 28. *

Coccinella hieroglyphica. Illig. Col. Bor. 1. 4: 31. β.

Coccinella trilineata. Herbst. Arch. 4. tab. 4. fig. 12.

Herbst. Col. 5. tab. 58. fig. 23.

Habitat Hamburgi. Dr. Schulz.

*angulata.*39. *C. coleoptris* luteis: punctis quatuor basibus, fascia postica punctoque apicis nigris. Ent. syst. 1. 272. 29. *

Habitat Tranquebariae. Dom. Hybner.

*inaequalis.*40. *C. coleoptris* flavis: punctis anticis tribus, tura fasciaque apicis nigris. Ent. syst. 1. 273. 30. *

Habitat in nova Hollandia. Mus. D. Banks.

1. *C. coleoptris* flavescentibus: puncto communi *varians*.
fasciisque duabus apicis nigris. Ent. syst. suppl.
78. 29. *
- Habitat in India. Dom. Daldorff.
2. *C. coleoptris* rubris: fasciis nigris tribus abbre- *trifasciata*.
uiatis. Ent. syst. I. 272. 31.
Linn. syst. Nat. 2. 580. 13. Fn. Sv. 475.
Raj. Inf. 87. 9.
Habitat in Europae hortis.
3. *C. coleoptris* flavis: fasciis duabus interruptis *interrupta*.
vndatis punctisque duobus posticis nigris. Ent.
syst. I. 272. 32. *
- Habitat in India orientali. Dom. Daldorff.
4. *C. coleoptris* ferrugineis: fasciis duabus pun- *2fasciata*.
ctisque quatuor nigris. Ent. syst. I. 273. 33. *
- Coccinella flexuosa*. Thunb. nou. Inf. sp. I. 17.
tab. I. fig. 24.
Habitat ad Cap. Bon. Spei.
5. *C. coleoptris* rubris: punctis quatuor baseos ni- *4notata*.
gris, thoracis marginibus albis. Ent. syst. I.
273. 34. *
- Habitat Kiliae. Dom. Daldorff.
6. *C. coleoptris* rubris: punctis quatuor nigris, *4maculata*.
thorace atro: macula marginali alba. Ent.
syst. I. 273. 35.
Illig. Col. Bor. I. 443. 29. var. 2.
Herbst. Col. 5. 370. 99.
Panz. Fn. Germ. I. tab. 14.
Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.
7. *C. coleoptris* sanguineis: punctis quinque ni- *5punctata*.
gris. Ent. syst. I. 273. 36.
Linn. syst. Nat. 2. 580. 4. Fn. Sv. 474.
Geoff. Inf. I. 320. 2.

Illig.

Illig. Col. Bor. 1. 441. 28.
 Herbst. Col. 5. tab. 58. fig. 11.
 Ross. Fn. Etr. 65. 152.
 Schaeff. Icon. tab. 9. fig. 8.
 Degeer. Inf. 5. 370. 3.
 Payk. Fn. Sv. 1. 16. 16.
 Habitat in Europae plantis.

5 maculata. 48. *C. oblonga*, coleoptris flavescentibus: punctis
 nigris quinque, thorace atro: margine al-
 triradiato albo. Ent. syst. 1. 273. 37. *

Coccinella mutabilis. Illig. Col. Bor. 1. 441.
 15. var. u.

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

6 punctata. 49. *C. coleoptris rubris*: punctis nigris sex.
 syst. 1. 274. 38. *

Coccinella mutabilis. Illig. Col. Bor. 1. 441.
 15. var. k.

Linn. syst. Nat. 2. 580. 12.

Herbst. Col. 5. tab. 57. fig. 12.

Habitat in Europae hortis.

glacialis. 50. *C. coleoptris rubris*: punctis sex nigris; in
 mediis maioribus sinuatis. Ent. syst. 1. 274.
 39. *

Habitat in America boreali. Dom. Drury.

6 maculata. 51. *C. coleoptris rubris*: punctis sex nigris: a-
 cis quatuor transuersis sinuatis. Ent. syst.
 1. 274. 40. *

Act. Hall. 1. 262.

Habitat in India orientali. Mus. D. Banks.

7 punctata. 52. *C. coleoptris rubris*: punctis nigris septem.
 syst. 1. 274. 41. *

Linn. syst. Nat. 2. 581. 15. Fn. Sv. 477.

VII. 29 Geoff. Inf. 1. 321. tab. 6. fig. 1.

Fris h. Inf. 4. 22. tab. 1. fig. 4.

Roef. Inf. 2. scarab. 3. tab. 2.

Schaeff. Icon. tab. 9. fig. 7.

Illig. Col. Bor. 1. 439. 27.

Herbst. Col. 5. tab. 57. fig. 8.

Habitat in Europae plantis, frequentissime in Ma-
dera. D. Rathje.

3. *C. oblonga*, coleoptris rubris: punctis nigris ~~7~~*maculata*.
septem, communi trilobo.

Coccinella notata. Laichart. Tyr. 1. 119. 3.

Illig. Col. Bor. 1. 423. 13.

Habitat in Germania. Dr. Schulz.

4. *oblonga*, coleoptris rubris: punctis septem ni- ~~7~~*notata*.
gris, thoracis margine punctisque duobus albis.

Ent. syst. 1. 275. 43. *

VI. 23.

Coccinella mutabilis. Illig. Col. Bor. 1. 426.

15. var. i.

Degeer Inf. 5. 429. 6.

Habitat in Germaniae hortis.

5. *C. coleoptris rubris: punctis nigris octo, tho- 8**punctata*.
race albo: nigro-punctato. Ent. syst. 1. 275.

44. *

Coccinella variabilis. Illig. Col. Bor. 1. 447.

32. var. 9.

*Coccinella 4**punctata*. Linn. syst. Nat. 2. 580. 9.

Habitat in Europa boreali.

Punctorum numerus in elytris interdum variat.

Quaedam interdum obsoleta.

6. *C. coleoptris flavis: maculis octo nigris; anti- transuersa-*
cis quatuor transuersis sinuatis. Ent. syst. 1. *lis.*

275. 45. *

Habitat in Coromandel. Mus. D. Banks.

7. *C. coleoptris luteis: punctis nigris octo; anti- 8**maculata.*
cis

cis sex transuersis sinuatis. Ent. syst. 1. 2
46. *

Habitat in - - Mus. D. Banks.

9notata.

58. *C. coleoptris rubris*: punctis nigris octo; d
bus communibus: anteriore transuerso.

Habitat in Oceani pacifici Insulis. D. Billardie
Media. Caput rubrum, immaculatum. Thorax
ber: maculis duabus magnis baseos atris. E
tra laeuia, rubra: punctis tribus; interme
fere marginali. Praeterea puncta duo com
nia: priore maiori, transuerso. Corpus obli
rum.

9maculata. 59. *C. coleoptris rubris*: punctis nigris nouem;
ftico communi, thorace bipunctato. Ent. f
1. 276. 47. *

Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

9notata. 60. *C. coleoptris rubris*: punctis nigris nouem.
pite thoracisque margine albis. Ent. syst. sup
76. 48. *

Coccinella 9notata. Herbst. Col. 5. tab.
fig. 16.

Habitat in America boreali. D. v. Rohr.

9punctata. 61. *C. coleoptris rubris*: punctis nigris nouem. E
syst. 1. 276. 48.

Linn. syst. Nat. 2. 581. 16. Fn. Sv. 478.

Geoff. Inf. 1. 322. 4.

Degeer Inf. 5. 373. 6.

Herbst. Col. 5. 372. 102.

Illig. Col. Bor. 1. 443. 29. var. β .

Habitat in Europae hortis.

10punctata. 62. *C. coleoptris fuluis*: punctis nigris decem, t
race quadrimaculato. Ent. syst. 1. 276. 4
Linn. syst. Nat. 2. 581. 17. Fn. Sv. 479.

Deg.

- Degeer Inf. 5. 374. 7.
 Illig. Col. Bor. 1. 448. 32. var. λ.
 Herbst. Col. 5. tab. 58. fig. 17.
 Habitat in Europae hortis.
3. *C. oblonga*, coleoptris fulvis: punctis nigris ~~decem~~ *romaculata*
 cem; duobus communibus. Ent. syst. 1. 276.
 50. *
- Habitat in America. Mus. D. Banks.
4. *C. oblonga*, coleoptris testaceis: punctis nigris *innuba*.
 decem, thorace immaculato. Ent. syst. 1. 277.
 51. *
- Habitat in Oriente. Mus. Britann.
5. *C. subrotunda*, coleoptris marginatis fulvis: *dilatata*.
 punctis nigris decem, thorace bipunctato. Ent.
 syst. 1. 277. 52. *
- Habitat in America. Mus. Britann.
6. *C. coleoptris rubris*: punctis nigris vndecim, *ripunctata*.
 corpore nigro. Ent. syst. 1. 277. 53. *
- Linn. syst. Nat. 2. 581. 18. Fn. Sv. 480.
 Degeer Inf. 5. 375. 8.
 Stroem. Act. Nidr. 3. tab. 6. fig. 2.
 Illig. Col. Bor. 1. 442. 29.
 Herbst. Col. 5. tab. 58. fig. 13.
 Arch. 7. tab. 43. fig. 15.
 Habitat in Europa boreali.
7. *C. coleoptris rubris*: punctis nigris vndecim, *rimaculata*
 corpore ferrugineo. Ent. syst. 1. 277. 54. *
- Geoff. Inf. 1. 325. 9. VII. 23.
 Illig. Col. Bor. 1. 468. 38.
 Habitat in Hispania. D. Prof. Vahl.
8. *C. coleoptris flavis*: punctis nigris duodecim: *12punctata*
 extimis linearibus repandis. Ent. syst. 1. 278.
 55.

Lian.

Linn. fyft. Nat. 2. 581. 19.

Herbst. Arch. tab. 22. fig. 8.

Illig. Col. Bor. 1. tab. 58. fig. 16.

Geoff. Inf. 1. 329. 16.

Herbst. Col. 1. 329. 16.

Habitat in Europae hortis.

variegata. 69. *C. coleoptris flavis*: punctis duodecim fasciis
media nigris. Ent. fyft. 1. 278. 56. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

chrysome-
na. 70. *C. coleoptris rufis*: punctis nigris duodecim
thorace immaculato. Ent. fyft. 1. 278. 57.

Coccinella capensis. Thunb. nou. Inf. sp. 1. 1
tab. 1. fig. 21.

Habitat in Africae Cacto Opuntia.

borealis. 71. *C. coleoptris flavis*: punctis nigris duodecim
duobus communibus, ultimis orbiculatis. Ent.
fyft. 1. 278. 58. *

Coccinella borealis. Thunb. nou. Inf. sp. 1. 1
tab. 1. fig. 20.

Habitat in America boreali. D. Drury.

12notata. 72. *C. coleoptris rubris*: punctis nigris duodecim
penultimo transverso.

Habitat in Australasia. D. Riche. Mus. D. Bo
Media. Caput rufum, immaculatum. Thorax r
fus, macula magna, quadrata baseos atra. El
tra laevia, rufa, nitida, punctis 2 parvis, a
proximatis 2, 1 magno, transverso, et 1 t
minali. Corpus atrum, abdominis margine f
rugineo.

cassidea. 73; *C. oblonga, rubra, coleoptris punctis duo-*
cim, thorace quatuor nigris. Ent. fyft. 1. 27
59.

Habitat in Marylandia. Mus. Britann.

74. *C. coleoptris flavis*: punctis nigris tredecim; *13maculata*
corpore orbiculato. Ent. syst. 1. 279. 60. *
Coccinella 13maculata. Forst. nou. Inf. spec. 1.
Cent. 1. 18.
Coccinella variabilis. Illig. Col. Bor. 1. 448.
32. var. γ .
Ross. Fn. Etr. 1. 71. 160.
Habitat in Suecia.
75. *C. coleoptris fulvis*: punctis duodecim fasciis: *dispar*.
que duabus atris; posteriore interrupta.
Coccinella variegata. Ent. syst. 4. App. 446.
59. *
Habitat in Senegallia. D. de Paykull.
76. *C. coleoptris luteis*: punctis nigris tredecim, *13punctata*
corpore oblongo. Ent. syst. 1. 279. 61.
Linn. Syst. Nat. 2. 582. 20.
Geoff. Inf. 1. 223. 6.
Degeer Inf. 5. 375. 9.
Reaum. Inf. 3. tab. 31. fig. 79.
Schaeff. Icon. tab. 43. fig. 6.
Illig. Col. Bor. 1. 425. 14.
Herbst. Col. 5. tab. 57. fig. 11.
Habitat in Europae hortis.
Thorax niger margine albo: puncto nigro.
77. *C. coleoptris rubris*: punctis nigris tredecim, *laeta*.
thorace atro: margine punctisque duobus al-
bis. Ent. syst. suppl. 78. 61. *
Habitat in Mogador. D. Schousboe. Mus. D. Lund.
78. *C. coleoptris flavis*: punctis nigris quatuordecim; *versicolor*.
duobus communibus. Ent. syst. 1. 279.
62. *
Habitat in China. Mus. D. de Sehested.
Variat saepius corpore toto aut dimidiato nigro
aut olivaceo, aut casu, aut natura.

- immaculata* 79. *C. coleoptris* luteis: futura punctisque quatuordecim nigris distinctis. Ent. syst. 1. 279. 6.
Coccinella conglobata. Illig. Col. Bor. 1. 435. var. a.
 Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.
- ocellata*. 80. *C. coleoptris* luteis: punctis nigris quindecim subocellatis. Ent. syst. 1. 280. 64.
 Linn. syst. Nat. 2. 582. 23. Fn. Sv. 484.
 VII. 24. Degeer. Inf. 5. 376. 10. tab. 11. fig. 1.
 Mirian Inf. Europ. tab. 48. fig. 5.
 Schaeff. Icon. tab. 1. fig. 2.
 Illig. Col. Bor. 1. 437. 25.
 Herbst. Col. 5. tab. 59. fig. 9.
 Habitat in Europae hortis.
- 16punctata*. 81. *C. coleoptris* luteis: punctis nigris sedecim, scilicet quadripunctato. Ent. syst. 1. 280. 65.
 Herbst. Col. 5. tab. 57. fig. 10.
 VII. 24. - Arch. 4. tab. 22. fig. 6.
 Habitat in Italia. Dr. Allioni.
Varietas C. margine punctatae; Dom. Illiger.
- 16maculata* 82. *C. coleoptris* roseis: punctis nigris sedecim, scilicet albo: immaculato.
 Habitat in Germania. D. Smidt.
 Statura oblonga, *C. 13punctatae*. Caput albo: immaculatum. Thorax albus, maculis nigris quatuor in vna ferie positis. Elytra rosea, punctis octo 2. 2. 1. maiore ad futuram, 3. Corium atrum, pedibus rufis.
- 16notata*. 83. *C. coleoptris* flavis: punctis sedecim nigris simplicibus, capite thoraceque flavis, immaculata.
 Habitat in Amboina. D. Billardiere.
 Magnitudo *C. ocellatae*. Caput et thorax flavo: omnino immaculata. Elytra flava, nitida, punctis octo parvis simplicibus atris, 2. 3. 2. 1. Caput subrotundum, flavum.

84. *C. coleoptris flavis: punctis nigris octodecim; 13punctata*
ultimo arcuato. Ent. syst. 1. 280. 66. *
Linn. syst. Nat. 2. 582. 24.
Habitat in Europa boreali.
85. *C. coleoptris flavis: punctis nigris nouemde- 19punctata*
cim. Ent. syst. 1. 280. 67. *
Linn. syst. Nat. 2. 582. 25.
Geoff. Inf. 1. 325. 10.
Myll. Zool. Dan. 67. 632.
Illig. Col. Bor. 1. 429. 16. var. β .
Herbst. Col. 5 tab. 57. fig. 15.
- Arch. 4. tab. 22. fig. 9.
Habitat in Europae plantis.
86. *C. coleoptris flavis: punctis nigris viginti. Ent. 20punctata*
syst. 1. 280. 68. *
Geoff. Inf. 1. 320. 17.
Illig. Col. Bor. 1. 468. 37.
Herbst. Arch. tab. 22. fig. 10.
Habitat in Anglia. Dom. Acton.
87. *C. coleoptris rubris: punctis nigris viginti duo- 22punctata*
bus. Ent. syst. 1. 281. 69. *
Linn. syst. Nat. 2. 582. 26. Fn. Sv. 486.
Raj. Inf. 87. 6.
Illig. Col. Bor. 1. 468. 37.
Herbst. Col. 5 tab. 57. fig. 14.
Habitat in Europae hortis.
88. *C. ferruginea, coleoptris flavescentibus: pun- 22macula-*
ctis nigris viginti duobus. Ent. syst. 1. 281. ta.
70. *
Habitat in Guinea. D. Isert.
89. *C. coleoptris rubris: punctis nigris viginti tri- 23punctata*
bus distinctis. Ent. syst. 1. 281. 71. *
Coccinella globosa. Illig. Col. Bor. 1. 470. 39.
var. γ .

Linn. syst. Nat. 2. 582. 27.

Habitat in Europae hortis.

24punctata 90. *C. coleoptris rubris: punctis viginti quatuor*

Ent. syst. 1. 281. 72. *

Linn. syst. Nat. 2. 583. 28. Fn. Sv. 487.

Geoff. Inf. 1. 526. 11.

Herbst. Arch. tab. 22. fig. 11.

Degeer. Inf. 5. 381. 6.

Habitat in Europae plantis.

24maculata 91. *C. ferruginea, coleoptris punctis nigris viginti quatuor: quibusdam minoribus.* Ent. syst.

281. 73. *

Habitat Tranquebariae. D. Lund.

A praecedente omnino distincta. Puncta elytrorum 3. 3. 3. 2. 1.

28punctata 92. *C. coleoptris rubris: punctis nigris viginti octo*

Ent. syst. 1. 282. 74. *

Habitat Tranquebariae. Dr. Koenig.

conglomerata 93. *C. coleoptris flavescentibus: punctis nigris per rimis contiguas, apice puncto nigro distincto*

Ent. syst. 1. 282. 75. *

Coccinella conglobata. Illig. Col. Bor. 1. 40. 35. var. γ .

Linn. Syst. Nat. 2. 583. 31. Fn. Sv. 490.

Geoff. Inf. 1. 316. 12.

Herbst. Arch. tab. 22. fig. 14. 15.

Frisch. Inf. 9. 34. tab. 17. fig. 6.

Degeer. Inf. 5. 383. 17.

Schaeff. Icon. tab. 171. fig. 1.

Laichart. Tyrol. 1. 127. 10.

Coccinella 14punctata coleoptris flavis: punctis nigris quatuordecim, quibusdam contiguis

Linn. syst. Nat. 2. 582. 21. Fn. Sv. 482.

Scha

Schaeff. Icon. tab. 62. fig. 6.

Habitat in Europa frequens.

94. *C. coleoptris flavis*: punctis nigris plurimis *conglobatae* contiguis apicé immaculatis. Ent. syst. 1. 282. 76. *

Coccinella impustulata. Illig. Col. Bor. 1. 459. 34. var. γ.

Linn. syst. Nat. 2. 583. 30. Fn. Sv. 489.

Geoff. Inf. 1. 326. 12.

Frisch. Inf. 9. tab. 17. fig. 6.

Degeer. Inf. 5. 3. 83.

Habitat in Europae hortis frequens.

95. *C. coleoptris albis*: punctis fuscis confluentibus. *confluens*. Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Media. Caput album. Thorax albus punctis quinque baseos fuscis. Elytra alba punctis fuscis numerosis: hinc inde confluentibus. Corpus flavescens.

96. *C. coleoptris flavescentibus*: lineolis duabus *lineola*. punctisque subcontiguis fuscis. Ent. syst. 1. 283. 77. *

Habitat in Americae meridionalis Insulis. Dom. Smidt.

97. *C. coleoptris flavis*: punctis decem rubris, *tricolor*. culisque decem atris marginalibus. Ent. syst. 1. 283. 78. *

Habitat in Insula Amsterdam. Mus. D. Banks.

98. *C. flava*, coleoptris immaculatis, thorace albo-*detrita*. maculato. Ent. syst. 1. 283. 79. *

Habitat in nova Hollandia. Mus. D. Banks.

99. *C. coleoptris rufis*: striga abbreviata alba. Ent. *strigata*. syst. suppl. 79. 80. *

Habi-

Habitat in Tanger. D. Schousboe. Mus. D.
Sehested.

2guttata. 100. *C. coleoptris rufis*: punctis duobus flavis.
Ent. syst. 1. 284. 80. *

Habitat in Europa. Mus. Dr. Hunter.

3guttata. 101. *C. coleoptris obscure rufis*: punctis octo albis.
Ent. syst. 1. 284. 81. *

Habitat in Kamtschatka. Mus. D. Banks.

10guttata. 102. *C. coleoptris luteis*: punctis albis duodecim.
Ent. syst. 1. 284. 82. *

Linn. syst. Nat. 2. 583. 33.

Herbst. Arch. tab. 22. fig. 16.

Habitat in Suecia.

bis 6guttata. 103. *C. coleoptris fulvis*: punctis duobus albis
thoracis margine albido. Ent. syst. 1. 284. 83. *

Illig. Col. Bor. 1. 432. 19.

Herbst. Col. 5. tab. 59. fig. 4.

- Arch. tab. 22. fig. 21.

Habitat in Norwagia. Mus. D. Lund.

12guttata. 104. *C. coleoptris fulvis*: punctis duodecim albis
et quinque vtrinque duabus connatis albis. Ent. syst. 1. 284. 84. *

Habitat Cayennae. D. v. Rohr.

14guttata. 105. *C. coleoptris rufis*: punctis albis quatuordecim.
Ent. syst. 1. 284. 85. *

Linn. syst. Nat. 2. 583. 34. Fn. Sv. 492.

Geoff. Inf. 1. 327. 13.

Illig. Col. Bor. 1. 435. 22.

Herbst. Col. 5. tab. 59. fig. 3.

- Arch. tab. 22. fig. 17.

Degeer Inf. 5. 385. 20.

Schaeff. Icon. tab. 9. fig. 11.

Habitat in Europae salicibus.

106. *C. coleoptris fulvis*: punctis albis quatuordecim, thoracis margine albo. Ent. syst. 1. 285. *bis 7 guttata*
86. * *sa.*

Illig. Col. Bor. 1. 433. 20.

Herbst. Col. 5. tab. 59. fig. 9.

Schall. Act. Hall. 1.

Habitat in Germania. D. Smidt.

107. *C. coleoptris luteis*: punctis albis quindecim: *15 guttata*.
communi medio obsoleto. Ent. syst. 1. 285.

87. *

Geoff. Inf. 1. 327. 14.

Illig. Col. Bor. 1. 433. 20. β.

Herbst. Col. 5. tab. 59. fig. 2.

- Arch. tab. 22. fig. 13.

Habitat in Germania. Dr. Schulz.

108. *C. coleoptris rubris*: punctis albis sedecim. *16 guttata*.
Ent. syst. 1. 285. 88. *

Linn. syst. Nat. 2. 584. 35. Fn. Sv. 493.

Illig. Col. Bor. 1. 435. 23.

Degeer Inf. 5. 385. 21.

Herbst. Col. 5. tab. 59. fig. 6.

- Arch. 7. tab. 43. fig. 16.

Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 5. 6.

Habitat in Europae hortis.

109. *C. coleoptris rubris*: punctis albis octodecim. *18 guttata*.
Ent. syst. 1. 285. 89. *

Linn. syst. Nat. 2. 385. 35.

Illig. Col. Bor. 1. 431. 18.

Schaeff. Icon. tab. 9. fig. 12.

Herbst. Col. 5. tab. 59. fig. 5.

- Arch. 4. tab. 22. fig. 19.

Habitat in Europae hortis.

110. C.

zoguttata. 110. *C. coleoptris rubris: punctis albis viginti*

Ent. syst. 1. 285. 90. *

Linn. syst. Nat. 2. 584. 37. Fn. Sv. 495.

Herbst. Arch. tab. 22. fig. 20.

Illig. Col. Bor. 1. 434. 21. β.

Degeer. Inf. 5. 386. 22.

Habitat in Europae hortis.

Varietas C. tigrinae; D. Illiger.

oblongo-
guttata.

111. *C. coleoptris rubris: lineis punctisque*

Ent. syst. 1. 286. 91. *

Linn. syst. Nat. 2. 584. 38. Fn. Sv. 496.

Illig. Col. Bor. 1. 436. 24.

Degeer Inf. 5. 384. 19.

Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 14.

Herbst. Col. 5. tab. 59. fig. 7.

Schaeff. Icon. tab. 9. fig. 10.

Habitat in Europae hortis rarius.

impustulata 112. *C. coleoptris nigris: puncto nullo.* Ent. syst.

1. 286. 92. *

Linn. syst. Nat. 2. 584. 40.

Illig. Col. Bor. 1. 460. 34. var. ♀.

Herbst. Col. 5. tab. 56. fig. 15.

Habitat in Germaniae nemoribus.

aenea.

113. *C. coleoptris pubescentibus nigro-aeneis, domine pedibusque rufis.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. M.

D. de Sehestedt.

Media. Caput et thorax tomentosa, nigro-aeneis, ore parum rufescente. Elytro concolora. Abdomen pedesque rufa.

nitidula.

114. *C. coleoptris nigro-aeneis immaculatis, thoracis margine rufo.* Ent. syst. 1. 286. 93. *

Habitat in Americae Insulis. D. Isert.

115. *C. coleoptris* nigris immaculatis, ore pedibus- *flavipes*.
que rufis.
Coccinella capitata. Ent. syst. suppl. 79. 93. *
Coccinella flavipes. Illig. Col. Bor. I. 415. 3.
Tritoma flavipes. Panz. Fn. Germ. 2. tab. 4.
Herbst. Col. 7. 342. 3. tab. 316. fig. 3?
Habitat in Suecia. D. de Paykull.
116. *C. coleoptris* atris immaculatis, rufa, thorace *nigrita*.
postice atro. Ent. syst. suppl. 79. 93. *
Habitat Tranquebariae. D. Daldorff.
117. *C. coleoptris* nigris, capite, thorace pedibusque *paruula*.
rufis. Ent. syst. I. 286. 94. *
Scymnus collaris. Herbst. Col. 7. tab. 116. f. 9.
Illig. Col. Bor. I. 414. 4.
Geoff. Inf. I. 333. 44.
Panz. Fn. Germ. 13. tab. 2. II. 15
Habitat Parisiis. Mus. D. Bosc.
118. *C. pubescens*, coleoptris obscure brunneis: su- *discoidea*.
tura nigra pedibus rufis.
Coccinella discoidea. Illig. Col. Bor. I. 418. 9.
Scymnus pilosus. Herbst. Col. 7. 343. 6. tab.
116. fig. 6.
Habitat in Germania. D. Smidt.
Statura minuta *C. paruulae*. Caput et thorax ni-
gra immaculata. Elytra obscure brunnea et
fere nigra, primo intuitu apparent futura ni-
gra. Pedes rufi.
119. *C. pubescens*, nigra, capite, ano, elytris pedi- *floralis*.
busque rufis, elytrorum futura nigra.
Nitidula floralis. Ent. syst. I. 260. 23. *
Habitat in Americae meridionalis Insulis, in flo-
ribus Zeae Mays. D. Smidt.

Statura

Scymni auctorum parvi, pubescentes, vix genere differunt.

Statura et summa affinitas praecedentis. Caput rufum. Thorax niger: margine rufo. Elytra pubescentia, testacea, futura tota nigra. Corpus nigrum; ano pedibusque rufis.

biverrucata 120. *C. coleoptris* subpubescentibus nigris: punctis duobus rubris pone medium.

Coccinella biverrucata. Illig. Col. Bor. 1. 415.

Panz. Fn. Germ. 24. tab. 11.

Herbst. Col. 7. 343. 5. tab. 116. fig. 5. s.

Habitat in Germania.

Parua, pubescens, tota nigra, puncto rotundo rufo pone medium elytrorum.

villosa. 121. *C. villosa* nigra, coleoptrorum marginibus fuscis.

Q. villosa uis. Ent. syst. 1. 286. 95. *

Habitat Cayennae. D. v. Rohr.

= *Regilla* *marginata* *marginata* Corpus maximum in hac familia.

analis. 122. *C. coleoptris* atris, apice rubris immaculatis.

Ent. syst. 1. 286. 96.

Coccinella paruula. Illig. Col. Bor. 1. 414. 4.

II. 16. Panz. Fn. Germ. 13. tab. 3.

Roff. Fn. Etr. App. 28. 29.

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

thoracica. 123. *C. coleoptris* atris: margine apicis rufo, capite thoraceque albis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. M. D. Lund.

Parua, subrotunda. Caput album, oculis nigris. Thorax albus puncto mox maiori, mox fuscis nullo baseos nigro. Elytra atra margine pectorico ferrugineo. Corpus album pectore abdominisque basi fuscis.

marginella. 124. *C. coleoptris* atris: punctis duobus antecapite thoracisque margine rufis.

Ha

Habitat in Tanager. D. Schousboe. Mus. D. de Seheftedt.

Omnino distincta. Magnitudo C. Cacti. Caput atrum, immaculatum. Thorax laevis, ater, vtrinque macula magna, marginali, rufa. Elytra atra, macula magna, fere marginali; ante apicem rufa. Corpus atrum.

125. *C. coleoptris* atris, apice rubris: fascia nigra. *haemorrhoidalis*.
Ent. syst. I. 287. 97. °

Coccinella globosa. Illig. Col. Bor. I. 470. 39.
var. *a*.

Habitat Hamburgi. Dr. Schulz.

126. *C. coleoptris* atris: maculis duabus rubris, thorace vtrinque macula marginali alba. *oculata*.
Ent. syst. I. 287. 98.

Habitat in America boreali.

127. *C. coleoptris* atris: maculis duabus rubris, thorace immaculato. *Cacti*.
Ent. syst. I. 287. 99.

Linn. syst. Nat. 2. 584. 41.

Petiv. Gazoph. tab. I. fig. 5.

Sloan. tom. 2. tab. 237. fig. 31. 33.

tab. 9. fig. 13.

Habitat in Americae Cactis, saepius inter Coccus Cacti lecta.

128. *C. coleoptris* rubris: punctis duobus compositis, abdomine sanguineo. *2pustulata*.
Ent. syst. I. 287. 100.

Linn. syst. Nat. 2. 545. 42. Fn. Sv. 498.

Geoff. Inf. I. 334. 26.

Illig. Col. Bor. I. 475. 43.

Degeer. Inf. 5. 387. 23. tab. 10. fig. 25.

Roef. Inf. 2. fcar. 3. tab. 3.

Frieh. Inf. 9. tab. 16. fig. 6.

Roff. Fn. Etr. I. 72. 169.

Herbst.

Herbst. Col. 5. tab. 59. fig. 12.
 - Arch. 4. tab. 22. fig. 25.
 Habitat in Europae hortis.

lateralis.

129. *C. coleoptris atris*: punctis duobus post-
 thoracisque margine rufis.

Coccinella lateralis. Illig. Col. Bor. 1. 472. 4.

Panz. Fn. Germ. 4. tab. 9.

Herbst. Col. 5. tab. 59. fig. 15.

- Arch. 4. tab. 22. fig. 24.

Habitat in Germania australiori. D. de Meyerle

variabilis.

130. *C. coleoptris nigris*: punctis duobus luna
 submarginalibus rubris, corpore oblongo. Ent.
 syst. 1. 287. 101.

Illig. Col. Bor. 447. 32.

Herbst. Col. 5. tab. 58. fig. 10.

Roff. Fn. Etr. 1. 75. 174.

Herbst. Arch. 4. tab. 22. fig. 22.

Habitat Hamburgi. Dr. Schulz.

rufipes.

131. *C. coleoptris nigris*: maculis duabus mag-
 marginalibus pedibusque rufis. Ent. syst. sup
 80. 101. *

Habitat in Europa australi. Prof. Vahl. Mus.
 Lund.

morio.

132. *C. coleoptris nigris*: punctis duobus margi-
 libus tibiisque rufis.

Coccinella frontalis. Illig. Col. Bor. 1. 417.

var. γ .

Scymnus bimaculatus. Herbst. Col. 7. 340.
 tab. 116, fig. 1.

Coccinella marginalis. Roff. Fn. Etr. App. 1.
 28.

Geoff. Inf. 1. 333. 23.

Habitat in Gallia. Mus. D. Bosc.

Affinis certe *C. frontali*, at differre videtur.

put et thorax nigra, immaculata. Macula elytrorum ad marginem dilatatur. Femora nigra.

133. *C. coleoptris* nigris: punctis duobus rubris, *frontalis*. fronte pedibusque anticis rufis. Ent. syst. 1. 288. 102.

Geoff. Inf. 1. 331. 22.

Illig. Col. Bor. 1. 417. 8.

Herbst. Col. 7. tab. 116. fig. 2.

Panz. Fn. Germ. 13. tab. 4.

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

II. 16 18

134. *C. coleoptris* atris: fascia interrupta punctis-*dentipes*. que duobus rufis, tibiis anticis acute dentatis.

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Maiuscula. Caput fulvum, margine postico atro.

Thorax ater, nitidus, margine laterali late, antico tenuissime fulvo. Elytra atra, nitida: fascia media ad suturam abbreviata, punctoque postico fulvis. Pedes antici flavi, tibiis extus acute dentatis; postici flavi, femoribus nigris.

135. *C. coleoptris* nigris: punctis rubris quatuor, *apustulata*. orbita oculorum thoracisque margine pallidis. Ent. syst. 1. 288. 103.*

Linn. syst. Nat. 2. 585. 43. Fn. Sv. 499.

Degeer Inf. 5. 389. 24.

Illig. Col. Bor. 1. 455. 33. var. 7.

Schall. Act. Hall. 1. 269. 6.

Herbst. Col. 5. tab. 58. fig. 9.

Schaeff. Icon. tab. 30. fig. 16. 17.

Habitat in Europae Vrtica.

136. *C. coleoptris* nigris: punctis rubris quatuor, *querrucata*. ano rufo. Ent. syst. 1. 288. 104.*

Coccinella apustulata. Illig. Col. Bor. 1. 473.

41.

Herbst. Col. 5. tab. 59. fig. 12.

Geoff.

Geoff. Inf. 1. 333. 25.

Schaeff. Icon. tab. 30. fig. 16. 17.

Habitat Kiliae.

fasciata. 137. *C. coleoptris nigris*: fasciis duabus interruptis lunatisque duabus posticis rufis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. M. D. de Sehestedt.

Parua. Caput pallidum. Thorax ater, nitidus margine antico albo. Elytra atra, nitida: fasciis duabus, altera bascos, altera in medio, interruptis, lunulaque postica flavis. Corpus grum, pedibus flavis.

divisa. 138. *C. coleoptris fuscis*: margine, fascia apiceque albis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. M. D. Lund.

Media. Caput album: Thorax fuscus margine albo. Elytra laevia, fusca: margine, fascia dentata: ftria, parua, cruciata albis. Apex albi puncto paruo fusco. Pectus fuscum, abdominis pedibusque albis.

bis punctulata. 139. *C. coleoptris nigris*: punctis rubris quatuor capite thoraceque nigris, obscuris. Ent. syst. 1. 288. 105. *

Illig. Col. Bor. 1. 415. 6.

Herbst. Col. 5. tab. 116. fig. 7.

Geoff. Inf. 1. 322. 22.

Habitat in Europae plantis.

arctica. 140. *C. coleoptris atris*, margine lunulis duabus punctisque duobus pallidis. Ent. syst. suppl. 4. App. 446. 105. *

Coccinella arctica. Payk. Fn. Sv. 2. 40. 41.

Herbst. Col. 5. 383. 114. tab. 59. fig. 10.

Habitat in Lapponia. D. de Paykull.

41. *C. coleoptris atris*: punctis rubris sex, capite *erythro-*
thoracisque margine pallide rufescentibus. Ent. *cephala*.
syst. 1. 289. 106. *
- Habitat Kiliae.
42. *C. coleoptris nigris*: punctis rubris sex, cor- *6 pustulata*.
pore atro. Ent. syst. 1. 289. 107.
Linn. syst. Nat. 2. 585. 44. Fn. Sv. 500.
Geoff. Inf. 1. 331. 10.
Illig. Col. Bor. 1. 455. 33. var. ξ .
Ross. Fn Etr. 1. 74. 172.
Herbst. Col. 5. tab. 58. fig. 8.
Degeer Inf. 5. 390. 25.
Habitat in Europae hortis.
Variat rarius puncto rubro ad futuram.
Sulz. Hist. Inf. 1. tab. 9. fig. 4.
Bergstr. Nomencl. 1. tab. 9. fig. 4.
43. *C. coleoptris atris, nitidis*: punctis sex rubris, *bis 3pustu-*
thoracis margine rufo. *lata*.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.
Media. Caput rufescens. Thorax ater, nitidus,
margine late rufo. Elytra atra, nitida, punctis
tribus rufis 2 1. Corpus nigrum pedibus rufis.
44. *C. coleoptris atris*: punctis sex albis, thorace *6verrucata*.
rufo: margine albo.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.
Parna, subrotunda. Caput rufum, immaculatum.
Thorax rufus, margine late albo. Elytra laevia,
atra, punctis tribus albis 2. 1. Corpus nigrum
pedibus pallidis.
45. *C. coleoptris atris*: punctis octo rubris, capite *8pustulata*.
thoracisque margine rubris.

Habi-

Habitat in America meridionali. D. Smidt. M
D. Lund.

Parua, subrotunda. Caput ferrugineum. Thorax ater, margine late ferrugineo. Elytra atrolaevia, nitida, punctis quatuor rufis 2. 2. Corpus atrum, ano pedibusque rufis.

lunata. 146. *C. coleoptris* nigris: maculis decem rubris, lunatis. Ent. syst. 1. 289. 108. *

Habitat in Insula St. Helena. Mus. D. Banks.

ropustulata 147. *C. coleoptris* nigris: punctis flavis decem. Ent. syst. 1. 289. 109.

Coccinella variabilis. Illig. Col. Bor. 1. 42. 32. var. *α.*

Linn. syst. Nat. 2. 585. 45. Fn. Sv. 501.

Geoff. Inf. 1. 330. 19.

Herbst. Col. 5. tab. 59. fig. 16.

Degeer Inf. 5. 391. 26.

Habitat in Europae hortis.

Variat punctis rubris et flavis.

bis 5pustulata. 148. *C. coleoptris* atris: punctis quinque albis, pite thoracisque margine albis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. M
D. de Sehestedt.

Parua, subrotunda. Caput album, nitidum. Thorax ater, margine antico late albo, qui densus in medio exferit. Elytra laevia, atra, punctis quinque albis 2. 2. 1. Corpus atrum, pedibus albis.

bis 6pustulata. 149. *C. coleoptris* nigris: punctis duodecim albis exterioribus margine connexis. Ent. syst. 1. 290. 110. *

Coccinella conglobata. Illig. Col. Bor. 1. 42. 35. var. *γ.*

Coccinella fimbriata. Sulz. Inf. tab. 3. fig. 7.
He

Herbst. Col. 5. tab. 57. fig. 18.

Habitat Hamburgi. Dr. Schulz.

50. *C. coleoptris nigris*: punctis duodecim albis. 12pustulata

Ent. syst. suppl. 80. 110. *

Linn. syst. Nat. 2. 585. 45.

Habitat in Europae hortis.

51. *C. coleoptris nigris*: lunulis duabus baseos 12verruca-
punctisque decem rubris. ta.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lund.

Magna. Caput et thorax atra, immaculata. Elytra subobscura, lunula magna baseos punctisque quinque 2. 2. 1. rubris. Corpus nigrum.

52. *C. coleoptris nigris*: punctis albis quatuordecim. Ent. syst. 1. 290. 111. 14pustulata.

Linn. syst. Nat. 2. 585. 46. Fn. Sv. 502.

Geoff. Inf. 1. 530. 18.

Degeer Inf. 5. 391. 27.

Illig. Col. Bor. 1. 445. 30.

Herbst. Col. 5. tab. 59. fig. 17.

Roff. Fn. Etr. Mant. 1. 364. 65.

Schaeff. Icon. tab. 30. fig. 10.

Habitat in Europae plantis.

53. *C. coleoptris nigris*: punctis duobus flavis 2uttato-
quatuorque rufis. Ent. syst. 1. 290. 112. * pustulata.

Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

54. *C. coleoptris atris*: punctis sex albis, corpore *felina*.
globofo. Ent. syst. 1. 290. 113. *

Habitat in America boreali. D. Drury.

55. *C. coleoptris nigris*: punctis flavis octo. Ent. *pantherina*.
syst. 1. 291. 114.

Coccinella pantherina. Linn. syst. Nat. 2. 585.

48. Fn. Sv. 504.

Coccinella dispar. Payk. Fn. Sv. 2. 17. 18. var. *z*.

Bb

Degeer.

- Degeer. Inf. 5. 392. 28.
Habitat in Europae plantis.
Species mihi haud rite nota, in distincta videtur
- pardalina.* 156. *C. coleoptris* nigris: punctis decem marginique sinuato-albis. Ent. syst. 1. 291. 115. *
Chrysomela guttata. Ent. syst. 1. 313. 28.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.
- virgata.* 157. *C. coleoptris* atris: punctis decem albis, caute thoracisque margine antico albis. Ent. syst. 1. 291. 116. *
Habitat in America boreali. Mus. Dr. Hunter.
Puncta elytrorum 2. 2. 1.
- argulata.* 158. *C. coleoptris* atris: annulis duodecim flavis. Ent. syst. suppl. 50. 116. *
Habitat in Africa. Mus. D. Bosc.
Elytrorum annuli 2. 2. 2. ultimis oblique positis.
- vulpina.* 159. *C. coleoptris* atris: punctis octo flavis, lateribusque quatuor rubris. Ent. syst. suppl. 116. *
Habitat in India. Dom. Daldorff.
- leonina.* 160. *C. coleoptris* nigris: punctis albis sedecim. Ent. syst. 1. 291. 117. *
Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.
Elytrorum puncta 2. 3. 2. 1.
- tigrina.* 161. *C. coleoptris* nigris: punctis albis viginti, tertiae maculato. Ent. syst. 1. 291. 118. *
Illig. Col. Bor. 1. 434. 21.
Linn. syst. Nat. 2. 586. 49. Fn. Sv. 505.
Herbst. Arch. tab. 22. fig. 27.
Schaeff. Icon. tab. 30. fig. 9.
Degeer Inf. 5. 386. 22.
Herbst. Col. 5. 389. 122. tab. 59. fig. 18.
Habitat in Europa boreali.

Mera varietas *C. 2oguttatae* videtur. Elytrorum puncta 1. 3. 3. 2. 1.

162. *C. coleoptris nigris*: punctis albis viginti, *ca-canina*.
pите thoraceque villosis immaculatis. Ent. syst.
1. 291. 119. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

Elytrorum puncta 2. 3. 2. 2. 1. intermedio lunato.

76. CASSIDA. *Palpi anteriores clavati*.
posteriores filiformes.
Labium elongatum, integrum.
Antennae moniliformes.

1. *C. viridis*, pedibus pallidis: femoribus nigris. *viridis*.

Ent. syst. 1. 292. 1. Linn. syst. Nat. 2. 547.

1. Fn. Sv. 467.

Cassida viridis. Oliv. Inf. 97. tab. 2. fig. 29.

Cassida rubiginosa. Illig. Col. Bor. 1. 479. 4.

Geoff. Inf. 1. 313. 1.

Roef. Inf. 2. scarab. 3. tab. 6.

Reaum. Inf. 3. tab. 18.

Schaeff. Icon. tab. 27. fig. 5.

Merian. Inf. Eur. tab. 115.

Habitat in Europae plantis variis, in primis Carduis.

Corpus

Cassidae corpus rotundatum, supra gibbum, subtus planum, marginatum, glabrum, nitidum; capite paruo, rotundato, sub thoracis clypeo dilatato, recondito; oculis ovatis, approximatis; antennis longitudine thoracis, inter oculos insertis; thorace transverso, margine dilatato, plano, latitudine elytrorum; scutello triangulo, parub; elytris rigidis, longitudine abdominis: margine dilatato, plano; pedibus breuibus, validis; femoribus compressis; tibiis rotundatis; tarsis quadriarticulatis; colore vario.

Corpus atrum: pedibus apice pallidis.

Larva hexapoda, depressa, spinis lateralibus acutis ciliata, cauda bifida; proprio stercore oblecta obambulat.

thoracica. 2. *C. thorace sanguineo, elytris viridibus: maculae basales rufae.*

Cassida thoracica. Illig. Col. Bor. 1. 478. 3.

IV. 41. Panz. Fn. Germ. 38. tab. 24.

Habitat in Germania.

Paullo minor *C. viridi* et affinis. Corpus nigrum abdominis margine virescente.

aequestris. 3. *C. viridis, elytrorum basi striga argentea, abdomine atro: margine pallido.* Ent. syst. 1. 292. 1

Cassida viridis. Illig. Col. Bor. 1. 480. 5.

Oliv. Inf. 97. tab. 1. fig. 3.

VIII. 19.

Habitat in Saxoniae *Mentha aquatica*. D. Hybner. Striga basalis elytrorum argentea cum vita perit. Pedes flavescentes.

prasinus. 4. *C. viridis, antennis pedibusque pallidis.*

Cassida prasina. Illig. Col. Bor. 1. 381. 6.

Habitat in Germaniae plantis.

Affinis certe *C. viridi*, at duplo minor. Color viridis magis aequalis. Corpus atrum: abdominis margine virescente. Antennae totae pallidae. Pedes pallidi, femoribus basi nigris.

affinis. 5. *C. elytris griseis, nigro-punctatis, thorace flavo virescente, immaculato.* Ent. syst. 1. 293. 3.

Cassida nebulosa. Illig. Col. Bor. 1. 483. 9.

Oliv. Inf. 97. tab. 3. fig. 47.

Frisch. Inf. 4. tab. 15.

Schaeff. Icon. tab. 27. fig. 4.

Herbst. Arch. 4. 50. 3.

Habitat in Germaniae *Chenopodiis*. D. de Hortic.

- Elytrorum margo flavescens antice immaculatus, postice punctis quatuor nigris.
6. *C. virens*, futura dorsali sanguinea, femoribus nigris. Ent. syst. 1. 293. 4. Linn. syst. Nat. 2. 575. 5.
Oliv. Inf. 97. tab. 2. fig. 30. VIII. 20.
Illig. Col. Bor. 1. 477. 2.
Habitat in Germaniae plantis.
Præcedentibus nimis affinis, at distincta tamen videtur.
7. *C. pallida*, elytris sanguineis: margine pallido. azurra.
Habitat in Hungaria. Dom. Meyerle.
Vina coerulea, qui vero color cum vita perit, et in pallidum transit. Elytra punctato-striata, rufa, margine pallido. Corpus atrum, pedibus pallidis.
8. *C. viridis*, nitens, elytris macula futurali coccinea, pedibus pallidis. Payk. Fn. Sv. 2. 46. 3. sanguinolenta.
Cassida sanguinolenta. Illig. Col. Bor. 1. 482. 7.
Habitat in Europa boreali. Mus. D. de Sehestedt.
A *C. vibice* omnino distincta, duplo fere minor, tota viridis, nitens, macula futurali coccinea ad basin. Pedes omnes pallidi.
9. *C. flavescens*, elytris punctatis: vitta media sanguinea. Ent. syst. 1. 293. 5. * crucata.
Habitat in India orientali.
Statura parva præcedentium. Clypeus rotundatus, flavescens, linea media maculaque vtrinque laterali sanguineis. Elytra flavescentia: punctis plurimis impressis vittaque media sanguinea. Sutura etiam sanguinea. Corpus nigrum, abdomine pedibusque flavescentibus.

austrica. 10. *C. thorace elytrisq̄ue obscuris nigro-punctatis*
 margine rufo immaculato. Ent. syst. 1. 293. 6.
 Habitat in Austria. D. Schneider.

IX.

Tota supra obscura, punctis numerosis, impressi
 nigris, margine omni prominente ferrugineo

nebulosa. 11. *C. pallide nebulosa: fusco-punctata.* Ent. sy
 1. 293. 7.

Linn. syst. Nat. 2. 575. 3. Fn. Sv. 468.

Cassida obsoleta. Illig. Col. Bor. 1. 484. 10.

Geoff. Inf. 1. 313. 2.

Habitat in Europae Carduis.

schinata.

12. *C. thorace transuerso, elytris dorso vnispinosi*
 margine emarginato ferrato.

Habitat in Australasia. D. Riche. Mus. D. Bosc.
 Animalculum singulare Peltis potius videtur. (

put ferrugineum, antennis: claua elongata qu
 quearticulata flavis. Thorax transuersus, tel
 ceus, antice valde emarginatus, lateribus di
 tatis. rotundatis, punctis eleuatis, scabris. E
 tra basi ad suturam punctato-friata, virid
 margine dilatato testaceo, in medio emargi
 to, ferrato, apice fusca: spina erecta valie
 postice carinata. Corpus ferrugineum.

atrata.

13. *C. atra, clypeo antice sanguineo.* Ent. syst.
 294. 8. *

Vin. 20.

Habitat in Austria. D. Saldoner.

murrasa.

14. *C. supra rubra aut viridis, elytris nigro-ma*
 latis, corpore nigro. Ent. syst. 1. 294. 9.

Linn. syst. Nat. 2. 575. 2.

Geoff. Inf. 1. 314 5. β.

Illig. Col. Bor. 1. 476. 1.

Oliv. Inf. 97. tab. 1. fig. 7.

Herbst. Arch. tab. 22. fig. 28.

Payk. Fn. Sv. 2. 48. 5.

Cassida maculata. Linn. syst. Nat. 2. 575. 6.

Geoff. Inf. 1. 315. 5. tab. 5. fig. 6.

Degeer Inf. 5. 175. 3.

Habitat in Germaniæ plantis.

15. *C. supra rubra*, thorace lineis tribus, elytris vit- *vittata*.
ta interrupta atris. Ent. syst. suppl. 81. 9. *

Habitat in Heluetia. D. de Clairville.

16. *C. nigra*, thorace elytrisque ferrugineis imma- *ferruginea*.
culatis. Ent. syst. 1. 294. 10. *

Illig. Col. Bor. 1. 482. 3.

Oliv. Inf. 97. tab. 1. fig. 2.

Herbst. Arch. 4. 50. 6. tab. 22. fig. 29.

Roff. Fn. Etr. 1. 72. 184.

Habitat in Germania. D. de Hattorff.

17. *C. brunnea*, clypeo elytrorumque margine fer- *brunnea*.
rugineo. Ent. syst. suppl. 81. 9. *

Habitat Cayennæ. D. Prof. Cuvier.

18. *C. ferruginea immaculata*, elytris punctato- *unicolor*.
striatis.

Habitat in India orientali. Mus. D. Lund.

Statura omnino et magnitudo *C. ferrugineae*. Ca-
pitis clypeus rotundatus, punctatus, integer.
Elytra punctis impressis striata.

19. *C. pallida*, coleoptorum disco atro: vittis dua- *scalaris*.
bus dentatis pallidis.

Cassida scalaris. Web. Inf. 51. 4.

Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff.

Statura *C. punctulariae*. Clypeus rotundatus, in-
teger, pallidus, in medio baseos sanguineus.
Elytra atra, vitta media pallida, interne tri-
-, externe bidentata, margineque pallido. Cor-
pus pallidum.

20. *C.*

- marginella.* 20. *C. viridis*, thoracis elytrorumque marginibus flavis. Ent. syst. 1. 294. 12. *
- Habitat in Brasilia. Mus. D. Banks.
- punctaria.* 21. *C. pallida*, disco atro, pallido punctato. *Cassida punctata*. Web. Inf. 51. 3.
- Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff.
- Statura et magnitudo *C. annuli*. Clypeus rotundatus, pallidus, in medio baseos ater: punctis tribus pallidis. Coleoptra pallida: disco communi atro: punctis numerosis, pallidis. Corpus pallidum.
- sincta.* 22. *C. thorace elytrisque obscuris*: margine flavescente, elytris ante marginem albo-hyalinis. Ent. syst. 1. 295. 13. *
- Habitat in Africa. Mus. D. Banks.
- ornata.* 23. *C. elytris flavis nigro-punctatis*: sutura ferruginea margineque pallido. Ent. syst. supp. 81. 13. *
- Habitat in India orientali. Mus. D. de Sehested.
- hebraea.* 24. *C. pallida*, coleoptris lineolis numerosissimis difformibus nigris. Ent. syst. 1. 295. 14. *
- Oliv. Inf. 97. tab. 1. fig. 8.
- Habitat Cayennae. Dr. Schulz.
- Judaica.* 25. *C. ferruginea*, coleoptrorum disco punctis impressis maculisque nigris. Ent. syst. 1. 295. 15. *
- Oliv. Inf. 97. tab. 2. fig. 23.
- Habitat Cayennae. Dr. Schulz.
- obscura.* 26. *C. obscure ferruginea immaculata*, elytris punctatis. Ent. syst. 1. 295. 16. *
- Habitat in India orientali.
- tristriata.* 27. *C. elytris pallidis*: disco lineis tribus approxi-
- ma

matris atris: inter media minora. Ent. syst. 1.
295. 17.

Habitat Surinami. Muf. D. Bosc.

28. *C. laevis flavescens*: disco oliuaceo; annulo medio flavescente. *Zona.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muf.
D. Lund.

Statura omnino *C. annuli*. Margo flavescens, pellucidus. Thoracis basis obscure oliuaceus scutello flavescente. Discus laevis oliuaceus annulo medio magno, flavescente.

29. *C. laevis, nigra, immaculata.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muf.
D. de Sehestedt. *Morio.*

Statura omnino *C. purpurea*. Corpus totum laeue, atrum, nitidum, immaculatum.

30. *C. obscure aenea, elytris maculis duabus marginalibus, ferrugineis.* Ent. syst. suppl. 82. 16: *

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muf.
D. Lund.

31. *C. aurea, disco atro: medio rufo; fascia atra.* *aurantia.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muf.
D. de Sehestedt.

Paullo maior *C. annulo*. Margo aureus, pellucidus, nitidus. Discus ater, medio communi ferrugineo: striga aurea colores terminante. Corpus flavescens.

32. *C. flavescens: disco purpureo: punctis duobus flavescentibus.* *purpuria.*

Cassida purpurea, flava, supra corpus purpurea.
Linn. syst. Nat. 2. 576. 12.

Degeer Inf. 5. tab. 15. fig. 19.

Habi-

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mu
D. Lund.

Statura *C. annuli*. Margo late aureus, disco pu
pureo, et in medio disco vtrinque ad futura
punctum flauescens.

Cyclops. 33. *C. flauescens*, disco atro: macula futurali cor
muni flauescente.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mu
D. de Seheftedt.

Statura omnino et magnitudo *C. purpureae*. Ma
go obscure flauescens, pellucidus. Discus pu
ctatus, ater, macula magna, futurali, flau
scente.

annulus. 34. *C. flauescens*, coleoptrorum disco atro: annu
fasciaque postica flauescens. Ent. syst.
296. 18. *

Oliv. Inf. 97. tab. 1. fig. 14.

Herbst. Col. tab. 133. fig. 3.

Habitat Cayennae. Dr. Schulz.

notata. 35. *C. flauescens*, elytris punctis tribus nigris.

Habitat in India orientali. Dom. Daldorff.

Magnitudo *C. nebulosae*. Corpus totum flau
scens, elytris punctis tribus longitudinalit
dispositis, nigris.

bifasciata. 36. *C. flauescens*: disco fasciis duabus fuscesce
tibus.

Cassida bifasciata. Linn. syst. Nat. 2. 576. 19

Degeer Inf. 5. tab. 15. fig. 18.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mu
D. Lund.

Statura praecedentis. Margo flauescens, macu
parua ad basin thoracis et quatuor maiores
disco fuscae.

37. *C. flauescens*: disco obscuriore linea nigra cin- *quadrata*.
cto.
Cassida quadrata. Degeer Inf. 5. tab. 15. f. 16.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.
Statura parua *C. purpureae*. Margo late pallide
flauescens, immaculatus. Discus obscurior, li-
nea nigra cinctus.
38. *C. flauescens*: disco atro flauo maculato. *reticulata*.
Cassida reticularis. Degeer Inf. 5. tab. 15. f. 17.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.
Statura parua *C. annuli*. Corpus et margo flau-
scentia, pellucida, immaculata. Discus ater,
punctis flauescens.
39. *C. flauescens*, coleoptrorum disco ferrugineo. *opunctata*.
Ent. syst. 1. 296. 19. *
Habitat Cayennae. Dr. Schulz.
40. *C. flauescens*, thorace immaculato, elytris ante *interrupta*.
marginem punctisque nigris. Ent. syst. 1.
296. 20. *
Oliv. Inf. 97. tab. 3. fig. 34.
Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.
41. *C. rufescens*, thorace punctis duobus, elytris *opunctata*.
quatuor cyaneis. Ent. syst. 1. 296. 20. *
Oliv. Inf. 97. tab. 3. fig. 38.
Habitat in Siam. Mus. D. Banks.
42. *C. testacea*, thorace maculis sex, elytris pluri- *scripta*.
mis atris. Ent. syst. suppl. 82. 21. *
Cassida capensis. Herbst. Col. tab. 133. fig. 10.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. de Sehestedt.
43. *C. obscure rufa*, elytris gibbosis: maculis nigris *gibba*.
numerossimis. Ent. syst. suppl. 82. 21. *
Habitat Cayennae. D. Prof. Richard.

44. C.

deusta.

44. *C. rufescens*, thorace punctis duobus, elytris numerosis cyaneo-nigris, clypeo integro. Ent. syst. 1. 297. 22 *

Oliv. Inf. 97. tab. 1. fig. 17.

Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

clathrata.

45. *C. rufescens*, thorace punctis nouem, elytris clathratis. Ent. syst. suppl. 83. 22. *

Habitat in India orientali. Mus. D. de Sehestedt.

cribraria.

46. *C. rufescens*, thorace punctis quatuor, elytris numerosis nigris, clypeo emarginato. Ent. syst. 1. 297. 23. *

Oliv. Inf. 97. tab. 3. fig. 44.

Habitat in America. Mus. D. Banks.

nobilis.

47. *C. grisea*, elytris linea coerulea nitidissima. Ent. syst. 1. 297. 24.

Linn. syst. Nat. 2. 575. 4.

Geoff. Inf. 1. 313. 3.

Oliv. Inf. 97. tab. 2. fig. 24.

Schaeff. Icon. tab. 96. fig. 6.

Illig. Col. Bor. 1. 485. 11.

1741 Panz. Fn. Germ. 39. tab. 15.

Habitat in Europae Carduis, Stellatis.

Linea elytrorum perit cum vita.

bicolor.

48. *C. clypeo elytris que griseis: margine pallidioribus, corpore atro.* Ent. syst. suppl. 82. 24. *

Habitat in America boreali. D. Mauerhoff.

taeniata.

49. *C. ferruginea*, elytris macula marginali flauo disco spinis quatuor parium; posticis connatis. Habitat in mari pacifico. D. Billardiere.

Parua. Clypeus emarginatus, pallide ferrugineus.

Elytra obscuriora, punctato-friata, macula magna, marginali, flaua. Discus spinis quatuor parium breuibibus, eleuatis. Parua duo posteriora connata, lineolas duas transuersas, eleuatas formant. Corpus pallidum.

- p. *C. viridis*, coleoptris vittis tribus abbreviatis *trivittata*.
 atris.
 Habitat in noua Cambria. D. Billardiere.
 Minor *C. nobili*. Clypeus rotundatus, laeuis, vi-
 rescens, puncto bascos nigro. Coleoptra lae-
 uia, viridia, vittis tribus abbreviatis, hinc inde
 viridi-punctatis atris: futurali breuiore.
31. *C. virens*, elytris viridi-argenteis nitidis, ca- *margarita-*
 pite pectoreque nigris. Ent. syst. 1. 297. 25. *cea.*
 Oliv. Inf. 97. tab. 2. fig. 19.
 Schall. Act. Hall. 1. 259.
 Habitat Halae sub lapidibus. Dom. Hybner.
 Color perit cum vita.
32. *C. flauescens*. coleoptrorum disco nigro: macu- *cruciata.*
 lis quatuor flauescens. Ent. syst. 1. 297.
 26. *
 Oliv. Inf. 97. tab. 1. fig. 13.
 Habitat in Americae plantis.
33. *C. aurea*, nitidissima: margine pallido, corpore *aurichalcea*
 atro.
 Habitat in Carolina. Mus. D. Bose.
 Paulo maior *C. nobili*, aenea, nitidissima, qui
 tamen color cum vita perit et in fordide fla-
 uum transit. Margo omnis pallidus. Corpus
 atrum, pedibus flauescens.
34. *C. flaua*, thoracis linea dorsali ferruginea, co- *crux.*
 leoptrorum disco ferrugineo maculis quatuor
 flauis. Ent. syst. 1. 298. 27. *
Cassida cruciata. Linn. syst. Nat. 2. 576. 9.
 Degeer Inf. 5. tab. 15. fig. 15.
 Voet. Col. 2. tab. 44. fig. 27.
 Habitat Cayennae. Dr. Schulz.
35. *C. flauescens*, thoracis puncto medio, coleoptro- *11punctata.*
 rum undecim nigris. Ent. syst. 1. 298. 28. *
 Voet.

Voet. Col. 2. tab. 43. fig. 16.

Habitat Cayennae. Mus. Dr. Hunter.

punctata 59. *C. flauescens*, thorace bipunctato, coleoptrorum disco ferrugineo: punctis vndecim nigris.

Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff.

Statura omnino *C. sinuatae*. Clypeus rotundatus obscure pallidus: punctis duobus dorsalibus nigris. Elytra fulcata: fulcis punctatis, breuiora: punctis baseos quinque atris, duobus medio ad marginem, tribus ad futuram et communi versus basin. Margo et corpus pallidus.

sinuata.

60. *C. flauescens ferruginea*, thorace postice sinuato, coleoptris punctis vndecim nigris. Ent. syst. 298. 29. *

Habitat in Asia. Mus. Britann.

arcuata.

61. *C. aeneo-flauescens*, coleoptris maculis quatuordecim atris: quibusdam arcuatis. Ent. syst. 298. 30. *

Cassida arcuata. Oliv. Inf. 97. tab. 2. fig. 2. Habitat in America meridionali. D. Olivier.

clauata.

62. *C. flauescens*, elytris tuberculatis medio nodosis: fuscis: maculis duabus lateralibus pallidis. Ent. syst. suppl. 83. 30. *

Habitat in America boreali. D. Herschell.

notata.

63. *C. testacea*, pallido-marginata, elytris immixtis: latis basi vnituberculatis. Ent. syst. 1. 2. 31. *

Habitat Cayennae. D. v. Rohr.

micans.

64. *C. flauescens*, coleoptrorum disco ferrugineo: tuberculo futurali.

Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff.

Statura parua praecedentium. Antennae flavae: apice nigrae. Thoracis clypeus rotundatus: flauus.

flavus, immaculatus. Elytra ad futuram inaequaliter ferruginea, qui color basi ad marginem excurrit. Tuberculum paruum ad basin futurae.

5. *C. cinerea*, coleoptris medio tuberculatis, ante *elevata*. marginem albidis.

Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff.

Statura et magnitudo *C. tuberculatae*. Clypeus rotundatus, cinereus. Coleoptra cinerea, interdum obscuriora, limbo dilatato albo, margine tamen ipso cinereo. Corpus cinereum.

6. *C. brunnea*, albo-marginata, elytris nigro-maculatis, basi vnituberculatis. Ent. syst. I. 299. 32. *

Habitat Cayennae. D. v. Rohr.

7. *C. testacea*, flavo-marginata: coleoptris trituberculatis. Ent. syst. I. 299. 33. *

Habitat in Sierra Leon Africae.

8. *C. nigro-aenea*, coleoptris flavis: futura antice posticeque dilatata, aenea.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Statura *C. futuralis*, at paullo maior. Antennae brunneae. Capitis clypeus transversus, nigro-aeneus, immaculatus. Elytra laevia, aenea, macula magna marginali, laevi, flava. Corpus obscure brunneum.

9. *C. brunnea*, elytris flavis: futuris brunneis. *futuralis*. Ent. syst. I. 299. 34. *

Habitat in America meridionali.

Corpus paruum, brunneum.

10. *C. thorace flavo*, elytris rufescentibus: margine nigro: maculis duabus flavis. Ent. syst. I.

299. 35. *

Oliv.

Oliv. Inf. 97. tab. 3. fig. 40.

Habitat Cayennae. D. Mauduit.

miliaris.

71. *C. flava*, thorace immaculato, elytris nigro-punctatis: margine bifasciato. Ent. syst. 1. 36. *

Oliv. Inf. 97. tab. 2. fig. 25.

Habitat in Insula St. Helena. Mus. D. Banks.

- adhaerens.* 72. *C. flava*, elytris margine vittaque postice cum margine coeunte atris.

Cassida adhaerens. Web. Inf. 51. 2.

Habitat in Oceani pacifici Insulis. D. Billardi.

Statura praecedentis. Clypeus rotundatus, immixtus, flavus, immaculatus. Elytra laevia, nigra, margine lato vittaque media, quae postice cum margine coit, atris. Corpus flavum.

Rarius vitta postice etiam cum sutura coit.

- maculata.* 73. *C. flava*, elytrorum margine nigro: macula magna flava. Ent. syst. 1. 300. 37. *

Habitat in Guinea. D. Fert.

- punctata.* 74. *C. nigra*, clypeo brunneo, elytris flavis nigropunctatis. Ent. syst. 1. 300. 38. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lund.

- adpersa.* 75. *C. clypeo* flavescente, pallidis nigropunctatis.

Habitat in Guinea. Mus. D. de Sehestedt.

Statura omnino *C. punctatae*. Clypeus rotundatus, flavescens, immaculatus. Elytra laevia, pallida, punctis nigris, sparsis; in primis futuram. Corpus atrum, abdomine pallido.

- marginata.* 76. *C. cyaneo-nigra*, elytris testaceis: margine nigro. Ent. syst. 1. 300. 39.

Linn. syst. Nat. 2. 578. 23.

Oliv. Inf. 97. tab. 1. fig. 11.

Voet. Col. 2. tab. 42. fig. 5.

Her

- Herbst. Arch. tab. 45. fig. 1.
 Naturforsch. 9. tab. 2.
 Degeer Inf. 5. 185. 19.
 Habitat in Indiis.
77. *C. thorace obscuro, elytris ferrugineis: margine cyaneo; maculis duabus rubris.* Ent. syst. 1. 301. 40. *
 Habitat Cayennae. Mus. Dr. Hunter.
78. *C. thorace elytrisque obscuris, elytris spina suturali margineque albicante: basi obscuro.* Ent. syst. 1. 301. 41. *
 Oliv. Inf. 97. tab. 3. fig. 45.
 Habitat in Siam. Mus. D. Banks.
79. *C. flava, coleoptorum disco fusco: margine fascisque quinque fuscis.* *5fasciata.*
 Habitat in Guinea. Mus. D. Lund.
 Statura et magnitudo *C. Jamaicensis*. Clypeus rotundatus, integer, obscure flavus. Coleoptorum discus obscurus, interdum ater, interdum punctis variis pallidis. Margo flavescens, pellucidus, vtrinque fasciis duabus suturaque fuscis. Corpus obscurum.
80. *C. testacea, coleoptris aureis, basi trituberculatis: margine pallido; subtus fasciis tribus duabus nigris.* Ent. syst. 4. App. 450. 41. *
 Habitat in America meridionali.
81. *C. luteo-aenea, elytris immaculatis, excavato-punctatis.* Ent. syst. 1. 301. 42.
 Linn. Syst. Nat. 2. 577. 21.
 Oliv. Inf. 97. tab. 2. fig. 32.
 Sloan. tom. 2. 208. tab. 233. fig. 27. 28.
 Habitat in Americae meridionalis Insulis, in foliis *Cordia* sebestenae.

- Chinensis.* 82. *C. testacea*, margine pallidior: macula nigra
Ent. syst. suppl. 84. 42. *
Habitat in China. Muf. D. Lund.
- exaltata.* 83. *C. elytris cyaneis*: disco vitta sinuata, margine
macula oblonga flavis.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muf.
D. de Sehestedt.
Magna. Clypeus fuscus: margine flavescent
Antennae fuscae. Elytra gibba, margine valde
dilatato, antice subspinoso, punctata, cyaneis
disco vitta inaequali, sinuata, quae tamen apicem
hand attingit. Margo cyaneus: macula magna,
oblonga, testacea. Corpus atrum.
- cyanea.* 84. *C. nigro-aenea*, elytris reticulatis; macula
vittosa rufa. Ent. syst. 1. 302. 46.
Linn. syst. Nat. 2. 577. 39. Muf. Lud. Vlr. 39
Degeer Inf. 5. tab. 15. fig. 9.
Petiv. Gazoph. tab. 57. fig. 6.
Habitat in Indiis.
Descriptio D. a Linné vix quadrat, at melius
descriptio et figura D. Degeer.
- spinifex.* 85. *C. ferruginea*, elytris angulo antico, spina
perforata, thorace vtrinque spina transuersa. Ent.
syst. 1. 302. 47.
Linn. syst. Nat. 2. 576. 7. Amoen. acad.
392. 7.
Oliv. Inf. 97. tab. fig.
Voet. Col. 2. tab. 43. fig. 21.
β. *Cassida perforata*, elytris angulo antico
perforato basique perforatis. Ent. syst. 1. 301. .
Cassida perforata. Pall. Spicil. Zool. fasc. 9.
tab. 1. fig. 1.
Habitat in America meridionali.

86. *C. cyanea*, elytris angulo antico spina truncata. *bicornis*.
Ent. fyft. 1. 301. 44.
Linn. fyft. Nat. 2. 576. 8. Amoen. acad. 6. 393. 9.
Habitat in Indiis.
87. *C. atra*, elytris angulo antico spina truncata. *Taurus*.
Ent. fyft. 1. 302. 45. *
Habitat Cayennae. D. v. Rohr.
88. *C. atra*, elytris antice porrectis: spina futurali *bidens*.
erecta. Ent. fyft. 1. 302. 48. *
Cassida atra. Oliv. Inf. 97. tab. 2. fig. 20.
Habitat in Brasilia. Muf. D. Banks.
89. *C. atra*, thorace maculis duabus villoso - aureis, *gibbosa*.
elytris virescenti - reticulatis: spina futurali
obtusa. Ent. fyft. 1. 302. 49. *
Oliv. Inf. 97. tab. 1. fig. 6.
Habitat in Brasilia. Muf. D. Banks.
90. *C. rufa*, elytris subreticulatis nigro - maculatis *truncata*.
dorfo gibbis. Ent. fyft. 1. 303. 50. *
Oliv. Inf. 97. tab. 1. fig. 9.
Habitat - - - Muf. D. Banks.
91. *C. flava*, immaculata, corpore testaceo: puncto *flava*.
scutellari nigro. Ent. fyft. 1. 303. 51.
Linn. fyft. Nat. 2. 576. 11.
Oliv. Inf. 97. tab. 1. fig. 8.
Voet. Col. 2. tab. 44. fig. 28.
Degeer. Inf. 5. tab. 15. fig. 13.
Habitat in America australi.
92. *C. testacea*, margine punctisque flavis. Ent. fyft. *leucophaea*.
1. 303. 52. *
Linn. fyft. Nat. 2. 576. 13. Amoen. acad. 6.
393. 10.
Habitat in America meridionali.

- transuersa.* 93. *C. rufa*, elytrorum margine futura, vitta medi
lineolaque vtrinque transuersa nigris. Ent. syst
suppl. 84. 52. *
Cassida clathrata. Linn. syst. Nat. 2. 577. 18.
Degeer. Inf. 5. tab. 15. fig. 7.
Voet. Col. 2. tab. 41. fig. 3.
Habitat in India. Mus. D. Lund.
- reticularis.* 94. *C. flaua*, elytris coeruleo-variegatis: lateribu
vnifasciatis. Ent. syst. 1. 363. 53. *.
Linn. syst. Nat. 2. 576. 15.
Herbst. Arch. 4. 50. 8. tab. 20. fig. 30.
Voet. Col. 2. tab. 41. fig. 4.
Degeer Inf. 5. tab. 15. fig. 17.
Habitat in America meridionali.
- variegata.* 95. *C. rufa*, elytris coeruleo-variegatis: lateralibu
bifasciatis. Ent. syst. 1. 303. 54.
Linn. syst. Nat. 2. 576. 16.
Oliv. Inf. 97. tab. 2. fig. 22. 28.
Voet. Col. 2. tab. 42. fig. 8.
Degeer Inf. 5. tab. 15. fig. 6.
Habitat in America meridionali.
- punctum.* 96. *C. flaua*, elytris fasciis duabus punctoque futu
rali atris.
Habitat in Oceani pacifici Insulis. D. Billardiere
Statura praecedentium. Clypeus rotundatus, in
teger, flauus, immaculatus. Elytra punctato
striata, flaua, fasciis duabus latis, atris, qua
rum anterior futuram haud attingit, postero
in disco dilatata, puncto flauo. In medio futu
rae punctum magnum, atrum. Corpus flauo
scens.
- trifasciata.* 97. *C. rufa*, elytrorum lateribus trifasciatis. Ent
syst. 1. 304. 55. *
Habitat in America. D. Daldorff.

98. *C. nigra*, thorace bimaculato, elytris flavis *nigro-retiformis*.
 gro-reticulatis. Ent. syst. 1. 304. 56. *
Cassida punctata. Degeer. Inf. 5. tab. 15. fig. 8.
 Habitat Cayennae. D. v. Rohr.
 Variat thoracis margine minus nigro, elytrisque
 fere fasciatis, vix reticulatis.
99. *C. nigra*, thorace immaculato, coleptorum disco *venosa*.
 rufo reticulato, margine maculato. Ent. syst.
 suppl. 84. 56. *
100. *C. nigra*, elytris rufo-reticulatis. *neruosa*.
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
 D. de Sehestedt.
 Affinis praecedenti. Clypeus transversus, laevis,
 niger, margine parum rufescente. Elytra ni-
 gra, nervis elevatis, reticulatis, rufis. Corpus
 atrum.
101. *C. nigro-aenea*, elytris rufis, nigro-aeneo-*varians*.
 riegatis.
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
 D. Lund.
 Statura praecedentium. Antennae nigrae. Cly-
 peus transversus, nunc aeneo-niger, nunc ru-
 fus, nunc rufus linea media aenea. Elytra nunc
 obscuriora, nunc dilutiora, rufa, aeneo-*varie-*
gata. Corpus obscurum.
102. *C. coerulea*, thorace maculis duabus, elytris *annulata*.
 annulis rufis. Ent. syst. 1. 304. 57. *
Cassida annulata. Naturforsch. 6. tab. 4.
 Habitat in Indiis. Dr. Schulz.
103. *C. sanguinea*, elytris disco punctis nigris spar-*grossa*.
 sis, margine lineis ramosis nigris. Ent. syst. 1.
 304. 58. *
Cassida grossa. Naturf. 6. tab. 4. fig. 4.
 Linn. Syst. Nat. 2. 577. 17.

Oliv.

Oliv. Inf. 97. tab. 1. fig. 1.
 Degeer Inf. 5. tab. 15. fig. 5.
 Voet. Col. 2. tab. 42. fig. 8.
 Habitat in America meridionali.

lineata. 104. *C. cinerascens*, elytris lineis quatuor albidis.
 Ent. syst. 1. 305. 59. *
 Habitat ad Cap. Bon. Spei. Dr. Schulz.

*exclamatio-
nis.* 105. *C. elytris lineis ternis nigris: intermedia fi-
sum!* referente. Ent. syst. 1. 305. 60. *
 Linn. syst. Nat. 2. 577. 20.
 Oliv. Inf. 97. tab. 1. fig. 10.
 Habitat in America meridionali.

*flavo ma-
culata.* 106. *C. cyaneo-aenea*, coleoptris fascia lata in me-
 dio interrupta flava.
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
 D. de Sehestedt.

Statura omnino *C. inaequalis*. Clypeus obscurus,
 in maculatus. Elytra cyanea, macula magna,
 transversa, fere fasciam constituyente, flava, an-
 tice versus futuram parum dilatata. Corpus
 nigrum.

irrorata. 107. *C. nigro-aenea*, elytris macula magna flava
 nigro-punctata.
 Voet. Col. 2. tab. 41. fig. 1.
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
 D. Lund.

Media. Clypeus magis transversus, quam in re-
 liquis, integer, nigro-aeneus, immaculatus.
 Elytra laevia, nigro-aenea, macula magna fla-
 va, punctis numerosis, nigris.

inaequalis. 108. *C. ferrugineo-aenea*, elytris macula flava sub-
 ovata disci. Ent. syst. 1. 305. 61.
 Linn. syst. Nat. 2. 678. 24.
 Oliv. Inf. 97. tab. 3. fig. 49.

Sulz.

Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 2.
 Voet. Col. 2. tab. 41. fig. 2.
 Naturf. 9. tab. 2. fig. 5.
 Degeer. Inf. 5. tab. 16. fig. 10.
 Habitat in America meridionali.

109. *C. fusco-aenea*, elytris macula flava laterali. *lateralis*.

Ent. syst. 1. 305. 62. *

Linn. syst. Nat. 2. 578. 26.

Voet. Col. 2. tab. 43. fig. 24.

Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 2.

Degeer. Inf. 5. tab. 15. fig. 12.

Habitat in America meridionali.

110. *C. nigra*, thorace villoso virescente, elytris *viridibus*: margine lineaque media ferrugineis.

Ent. syst. 1. 305. 63. *

Voet. Col. 2. tab. 42. fig. 14.

Habitat Cayennae. D. v. Rohr.

111. *C. thorace elytris que variolosis viridibus*: margine aureo. *variolosa*.

Cassida variolosa. Web. Inf. 50. 1.

Habitat in Brasilia. D. Weber.

Magna. Caput aureum. Thorax punctis latis excavatis, viridi-aeneus, nitidus, margine aureo. Elytra gibba, punctis excavata, viridia, margine late aureo. Corpus aureum.

112. *C. viridi-aenea*, elytris macula didyma flava *discoidea*.
 disci. Ent. syst. 1. 306. 64.

Linn. syst. Nat. 2. 578. 17.

Oliv. Inf. 97. tab. 2. fig. 18.

Voet. Col. 2. tab. 4. fig. 12.

Degeer. Inf. 5. tab. 15. fig. 11.

Habitat in America meridionali.

113. *C. oblonga*, gibba, elytris viridi-aeneis: macula inaequali fanguinea. *maculata*.
 Ent. syst. 1. 306. 65.

Linn.

Linn. syst. Nat. 2. 578. Amoen. acad. 6. 392.

Oliv. Inf. 97. tab. 3. fig. 35.

Voet. Col. 2. tab. 42. fig. 6.

Naturf. 6. tab. 4.

Habitat Cayennae.

Variat punctis elytrorum duobus aut nullis.

discors.

114. *C. subrotunda*, elytris viridi-aeneis: macula inaequali sanguinea.

Habitat in America meridionali. Mus. D. de Scheffed.

Nimis forte praecedenti affinis, at statura magis rotundata et minus gibba.

Variat elytris immaculatis punctisque duobus rufis.

cuprea.

115. *C. supra cuprea*, thoracis margine elytrisque maculis duabus marginalibus rufis. Ent. syst. 1. 306. 66.*

Habitat Cayennae. D. v. Rohr.

6pustulata. 116. *C. cyanea*, elytris maculis tribus rufis. Ent. syst. 1. 306. 67.*

Oliv. Inf. 97. tab. 3. fig. 36.

Habitat in Brasilia. Mus. D. Banks.

12pustulata 117. *C. thorace cupreo*, elytris viridi-aeneis: maculis sex rubris. Ent. syst. suppl. 85. 67.*

Habitat Cayennae. D. Richard.

16punctata. 118. *C. nigra*, thorace punctis duobus, elytris septem rubris. Ent. syst. 1. 307. 68.*

Oliv. Inf. 97. tab. 3. fig. 41.

Voet. Col. 2. tab. 43. fig. 20.

Habitat in America meridionali. Mus. Dr. Hunter

2punctata. 119. *C. flavescens*, elytris punctis duobus nigris. Ent. syst. 1. 307. 69.

Linn. syst. Nat. 2. 578. 19.

Oli

Oliv. Inf. 97. tab. 3. fig. 42.

Habitat in India orientali.

77. ADORIVM. *Palpi* quatuor subaequales, extrorsum crassiores.
Maxilla membranacea, bifida.
Ligula membranacea, integra.
Antennae filiformes.

1. A. ovatum, testaceum, elytris macula fusca.

Chrysomela *punctata*. Ent. syst. 1. 329. 110.

Oides *punctata*. Web. Inf. 53. 1.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

O: maxillis palpisque. *Palpi* quatuor breves, subaequales, extrorsum crassiores, *anteriores* quadriarticulati: articulo primo breui, orbiculato, secundo longiori, obconico, tertio parum crassiori, quarto breuissimo, obtuso adhaerentes maxillae dorso; *posteriores* breves, crassiusculi, triarticulati: articulo ultimo obtuso, adnati ligulae basi. *Mandibula* brevis, cornea, dentata, apicè truncata, denticulata. *Maxilla* brevis, membranacea, rotundata, bifida: lacinis aequalibus, obtusis. *Ligula* brevis, membranacea, integra. *Labium* corneum, transuersum.

punctata
tum.

2. A.

Adorii corpus ovatum, gibbum, immarginatum, glabrum, tardum; *capite* paruo, transuerso, fere latitudine thoracis, inferto; *oculis* oblongis, lateralibus: *antennis* frontalibus, longitudine thoracis: articulo primo maiori; *thorace* transuerso, breui, latitudine fere elytrorum; *scutello* paruo, triangulari; *elytris* magnis, fornicatis, abdomine multo latioribus; *pedibus* longiusculis, compressis, cursoriis; *tarsis* omnibus quadriarticulis; *colore* obscuro.

- palleatum.* 2. *A.* pallidum, antennis apice corporeque fuscis.
Habitat in Oceani australis Insulis. D. Billardiere
Affinis praecedenti. Antennae filiformes, fuscae
basi pallidae. Caput, thorax, elytra pallida, ob-
scura, immaculata. Corpus fuscum, pedibus
pallidis.
- testaceum.* 3. *A.* testaceum, antennis nigris apice albis.
Habitat in Sumatra. D. Daldorff. Mus. D. Lund
Antennae nigrae, articulis duobus ultimis albis
Caput thorax, elytra laevia, testacea. Corpus
atrum, femoribus posticis parum incrassatis
forte saltatoriis.
- lividum.* 4. *A.* pallidum, capite thoracis punctis duobus, pe-
ctore pedibusque nigris.
Habitat in Sumatra. D. Daldorff. Mus. D. de Se-
hestedt.
Reliquis magis ovatum. Thorax laevis, pallidus,
nitidus, punctis duobus nigris impressus. Cor-
pus nigrum, abdomine pallido.
- vittatum.* 5. *A.* pallidum, coleoptris vittis tribus abbreviatis
fuscis.
Habitat in Australasia. D. Billardiere.
Paruum. Antennae fuscae, basi pallidae. Elytra
punctato-friata: vitta media futuraque fu-
scis. Pedes pallidi. Corpus fuscum.
- concolor.* 6. *A.* flavescens, nitidum, oculis fuscis.
Galleruca concolor. Ent. syst. 2. 16. 16. ♀
Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. D. Banks.

18. COLASPIS. *Palpi* quatuor inaequales.
anteriores subclauati.

Labrum porrectum, planum,
truncatum.

Antennae tenues, filiformes:
articulis cylindricis.

1. C. punctata, pallide testacea, immaculata. *testacea.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.

Magna in hoc genere. Caput et thorax punctata,
paullo obscuriora, capite basi canaliculato.
Elytra pallidiora, punctata striataque. Corpus
pallide testaceum.

2. C. punctata, aenea, subtus cuprea, antennis *fla-crenata.*
uis: articulo quinto ultimoque fuscis.

Galleruca crenata. Ent. syst. 1. 2. 14. 6.

Habitat Cayennae. D. v. Röhr.

O; mandibulis palpisque. *Labrum* valde porre-
ctum, planum, apice truncatum. *Palpi* qua-
tuor inaequales: *anteriores* longiores, quadri-
articulati: articulis tenuibus; secundo lon-
giori, ultimo ovato, crassiori, clauato; adhae-
rentes maxillae dorso, *posteriores* paullo bre-
uiores, subclauati, triarticulati: articulis sub-
aequalibus; ultimo vix crassiori, adnati ligulae
basi.

Colaspidis corpus ovatum, elevatum, tardum, immargina-
tum; capite parvo, rotundato, inferto; labro magno, os
tegente; oculis magnis, rotundatis, lateralibus, vix pro-
minulis; antennis longis, ante oculos insertis; thorace
elytris angustiore, rotundato, antice parum angustiore;
scutello parvo, rotundato; elytris rigidis, saepius puncta-
tis, abdominis longitudine; pedibus mediocribus, validis;
femoribus posticis subclauatis: tarsis quadriarticulatis:
articulo ultimo ad basin fere fisso; colore saepius aeneo,
interdum testaceo, nunquam variegato.

basi. *Mandibula* brevis, cornea, crassa, incurva, apice bifida. *Maxilla* brevis, membranacea, videntata. *Ligula* brevis, membranacea truncata. Caput et thorax punctata, obscurcuprea. Elytra striata, striis punctatis. Corpus aeneum, pedibus concoloribus.

Variat rarius antennis pedibusque totis flavis.

glabrata.

3. *C.* thorace laevi, aenea, nitida, elytris punctato-substriatis, corpore nigro.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Paullo minor *C.* crenata. Antennae nigrae. Caput et thorax laevia, obscure aenea, nitida, margine tenuissime cyaneo. Elytra obscure aenea, punctis parvis, impressis substriata. Corpus nigrum, femoribus interdum subferrugineis.

flavicornis.

4. *C.* punctata, viridi-aenea, antennis pedibusque flavis.

Galleruca flavicornis. Ent. syst. 1. 2. 13. 5.

Habitat Cayennae. D. v. Rohr.

Antennae flavae. Caput et thorax punctata. Elytra striato-punctata et fere crenata. Corpus viridi-aeneum, pedibus flavis.

luteicornis.

5. *C.* subpunctata, nigro-aenea, antennis pedibusque flavis.

Chrysomela luteicornis. Ent. syst. 1. 1. 316. 42

Habitat in Americae meridionalis Insulis. Dr. Pflug. Statura et magnitudo praecedentis, at minus punctata, nigro-aenea, obscure nitida.

Crotonis.

6. *C.* subpunctata, nigro-aenea, antennis flavis, pedibus nigris.

Chrysomela Crotonis. Ent. syst. 1. 1. 327. 100

Habi

Habitat in *Crotone glanduloso Americae meridionalis*. Dr. Pflug.

Nimis praecedenti affinis, at pedes nigri.

7. *C. cyanea nitida*, pedibus rufis.

rufipes.

Cryptcephalus rufipes. Ent. syst. 1. 2. 63. 51.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

Supra cyanea, interdum viridis, nitida, immaculata. Antennae testaceae. Pedes rufi.

Varietas minor ex America meridionali vix differt.

8. *C. thorace aeneo-nitido*, elytris punctatis, obscure viridibus.

viridis.

Galleruca viridis. Ent. syst. suppl. 94. 5.

Habitat in Carolinae quercu. Mus. D. Bosc.

Paullo minor *C. flauicorni*. Caput viridi-aeneum, antennis flavis. Thorax laevis, aeneus, nitidus. Elytra punctata, viridia, obscura. Corpus et pedes nigra.

9. *C. aenea, nitida, subtus nigra, antennis, ano pedibusque ferrugineis.*

tricolor.

Chrysomela tricolor. Ent. syst. 1. 316. 41.

Habitat in Virginia.

Magnitudo *C. flauicornis*. Antennae ferrugineae.

10. *C. subpunctata, viridi-aenea, nitida, elytrorum margine tenuissime corporeque cyaneis, pedibus fulvis.*

aenea.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Statura et fere magnitudo *C. flauicornis*. Antennae testaceae; apice nigrae. Caput aeneum, clypeo porrecto, testaceo. Thorax punctatus, aeneus, nitidus. Elytra punctata, viridi-aenea, nitida, margine parum cyaneo. Corpus cyaneum, pedibus fulvis.

fulvipes.

11. *C. subpunctata*, obscure aenea, abdomine, antennis pedibusque fulvis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. M. D. Lund.

Magnitudo praecedentis. Antennae fulvae, articulo ultimo obscuro. Caput obscure aeneum clypeo porrecto, ferrugineo. Thorax punctatus, obscure aeneus. Elytra substriata, punctata, obscura. Corpus piceum, pedibus fulvis.

cuprea.

12. *C. punctata*, brunnea, thoracis elytrorumque margine viridi-aeneis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. M. D. de Sehestedt.

Statura et magnitudo *C. glabratae*. Caput brunneum, viridi-micans. Antennae flavae. Thorax punctatus, brunneus, margine aeneo, nitido. Elytra striata: striis punctatis, brunneo margine aeneo. Pedes flavescentes.

obscura.

13. *C. punctata*, obscura, subtus cyanea, femoribus rufis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. M. D. Lund.

Statura *C. flavicornis*. Antennae nigrae, basi ferrugineae. Caput et thorax punctata, obscure aenea, parum nitida, clypeo porrecto, brunneo. Elytra punctata, striata, obscura, aeneo parum nitida. Corpus cyaneum, nitidum, femoribus rufis.

fulva.

14. *C. thorace laevi*, nitido, testacea, antennis nigri Habitat in America meridionali. Muf. D. Lund.

Praecedente minor. Antennae breviores, quam in reliquis, nigrae, basi testaceae. Caput et thorax laevula, testacea, nitida. Elytra punctata vix striata.

5. *C. atra*, nitida, elytris punctatis, antennis basi *barbata*.
fluorescentibus.

Habitat in Barbaria. Mus. Dom. Desfontaines.

Antennae basi fluorescentes, apice nigrae. Caput et thorax atra, nitida, vix punctata. Elytra atra, punctata, margine tenuissime ferrugineo, obsoleto. Corpus nigrum, tarsis rufis.

6. *C. brunnea*, thorace laevi, nitido, elytris pun- *ferruginea*.
ctatis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Statura et magnitudo *C. flavicornis*. Corpus totum, cum antennis pedibusque brunneum. Elytra punctata et substriata.

7. *C. thorace laevi*, aeneo-nitido, elytris puncta- *nitida*.
tis, obscuris, pectore pedibusque ferrugineis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Media. Antennae nigrae basi ferrugineae. Caput et thorax laevia, aenea, nitida. Elytra punctata, nullo modo striata, obscura. Corpus nigricans, pectore piceo. Pedes ferruginei.

8. *C. punctata*, viridi-aenea, nitida, antennis ni- *nigricornis*.
gris, basi abdominis, margine pedibusque fulvis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Minor *C. flavicorni*. Antennae nigrae, basi fulvae. Caput viridi-aeneum, nitidum, clypeo fulvo. Thorax et elytra punctata, viridi-aenea, nitida. Abdomen parum margine anoque fulvis. Pedes fulvi.

19. *C. laevis*, supra obscure aenea, subtus atra. *laevigata*.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Sta-

Statura praecedentium, at paullo minor, totalis, vis, supra obscure aenea, subtus atra. Antennae nigrae, basi parum ferrugineae.

marginata. 20. *C. ferruginea*, nitida, elytris punctatis: margine nigro, antennis pedibusque flavis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. M. D. de Sehestedt.

Minor et magis rotundata. Antennae flavae. Caput et thorax laevia, ferruginea, nitida. Elytra subpunctata, ferruginea, margine nigro. Pedes flavi.

metallica. 21. *C. punctata*, obscure aenea, elytris basi pronulis.

Bruchus aeneus Ent. syst. suppl. 159. 7.

Habitat in India orientali. D. Daldorff.

Praecedentibus minor, tota punctata, obscure aenea. Antennae fuscae. Elytra substriata, angustate, angulo basali prominulo.

ruficornis. 22. *C. atra*, nitida, antennis pedibusque ferrugineis. Habitat in America meridionali. D. Smidt. M. D. de Sehestedt.

Minor. Antennae ferrugineae. Caput et thorax laevia, atra, labio porrecto, ferrugineo. Elytra substriata, nigra. Corpus nigrum, pedibus ferrugineis.

Variat rarius pedibus nigris.

brunnea. 23. *C. punctata*, testacea, elytrorum margine tenui sive abdomineque nigris.

Galleruca brunnea. Ent. syst. suppl. 94. 4.

Habitat in America. Dom. Hybner.

Corpus totum punctatum, testaceum, margine elytrorum subtus abdomineque nigris. Pedes postici elongati, at femora haud incrassata, valde saltatoria.

4. *C. nigro-aenea*, obscura, elytris pedibusque *ci-swilla*.
nereis.

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Statura omnino *C. brunneae*, at caput, thorax et
corpus nigra, aeneo obscure nitida.

** *saltatoriae*.

5. *C. saltatoria*, punctata, aenea, antennis pedibus-*saliens*.
que aeneis.

Habitat in India orientali. D. Daldorff. Mus. D.
Lund.

Corpus minutum, supra punctatum, aeneum, an-
tennis pedibusque totis ferrugineis. Femora
postica valde incrassata.

6. *C. saltatoria*, atra, elytris testaceis apice nigris. *gibba*.

Galleruca gibba. Ent. syst. suppl. 99.

Habitat Cayennae. D. Richard.

Gibba. Caput et thorax atra, immaculata, anten-
nis testaceis. Elytra laevia, glabra, nitida, te-
stacea, apice nigra. Corpus nigrum, femoribus
posticis incrassatis.

7. *C. saltatoria*, atra, antennis pedibusque ferrugi-*quercata*.
neis, elytris punctis duobus rufis.

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Saltatoria mihi videtur, femoribus posticis parum
incrassatis. Caput nigrum, ore antennisque fla-
vescentibus. Thorax laevis, niger, immacula-
tus. Elytra laevia, glabra, nitida, atra, puncto
humerali posticoque rufis. Corpus nigrum, fe-
moribus rufis.

Varietas paullo maior, elytris totis nigris, vix
differt.

79. EVMOLPVVS. *Palpi* sex inaequales:
intermedii articulis duobus vltimis crassioribus, ouatis.

Ligula porrecta, membranacea, integra.

Antennae filiformes.

ignitus.

1. *E. cyanea*, nitidissima, elytris aureis, antennis plantisque fuscis.

Chrysomela ignita. Ent. syst. I. 314. 30. *

Habitat Cayennae. Mus. Dr. Hunter.

nitidus.

2. *E. cyanea*, aut viridi-aenea, antennis cyaneis apice fuscis.

Chrysomela nitida. Ent. syst. I. 325. 86. *

Habitat in ~~India~~ ^{América}. Mus. D. Banks.

Os maxillis palpisque. *Labrum* elongatum, quadratum, corneum, integrum. *Palpi* sex inaequales, *anteriores* breuiores, longitudine maxillae, filiformes, biarticulati: articulis aequalibus, cylindricis; vltimo obtuso, adhaerentes maxillae dorso, *intermedii* longiores, quadriarticulati: articulo primo breui, orbiculato, secundo longiori, obconico, vltimis duobus aequalibus, crassioribus, ouatis, ad basin anteriorum inserti, *posteriores* longitudine intermediorum, triarticulati: articulo primo breui, rotun-

Eumolpi corpus ouatum, glabrum, immarginatum, tardum; *capite* ouato, obtuso, inserto; *oculis* oblongis, lateralibus, hamo firmatis; *antennis* thorace longioribus: articulo primo crassiori, ante oculos insertis; *thorace* rotundato, elytris angustiore: margine deflexo; *scutello* breui, rotundato; *elytris* rigidis, longitudine elytrorum, fornicatis: margine deflexo; *pedibus* longiusculis, compressis, cursoriis; *tarsis* quadriarticulatis; *colore* nitido.

rotundato, secundo obconico, tertio subouato, acutiufculo, adnati ligulae bafi. *Mandibula* crassa, cornea, incurua, apice immarginata. *Maxilla* breuis, membranacea, integra, obtufa. *Ligula* porrecta, membranacea, cylindrica, integra. *Labium* breue, corneum, transuerfum.

Variat eolore aeneo et cyaneo.

3. *E. viridi-aeneus*, nitidiffimus, elytris cyaneis. *Asiaticus.*
Chryfomela Asiatica. Ent. fyft. I. 314. 32. *
 Habitat in Ruffia. Muf. D. Banks.
4. *E. cyaneus*, nitidus, pedibus nigris. *cyaneus.*
Chryfomela cyanea. Ent. fyft. I. 324. 84. *
 Habitat in ~~America meridionali~~ ^{India orientali} Muf. D. Banks.
5. *E. cyaneus*, nitidus, thorace latitudine elytrorum. *pretiofus.*
Chryfomela pretiofa. Ent. fyft. I. 324. 85. *
 Habitat in Germania. D. Smidt. *IV. 45*
 Affinis praecedenti, at distinctus et alius. Thorax magis globofus, et latior.
6. *E. thorace cyaneo*, elytris aureis: margine cy- *auratus.*
 neo.
Chryfomela aurata. Ent. fyft. I. 325. 87. *
 Habitat in America boreali.
7. *E. cyaneus*, nitidiffimus, elytris punctatis viridi- *compressi-*
 aeneis, antennis compressis. *cornis.*
 Habitat in Guinea. Muf. D. de Seheftedt.
 Statura et magnitudo praecedentis. Antennae extrofum parum crassiores, compressae, cyanae. Caput et thorax cyanea, nitida, immaculata. Elytra punctata, viridi-aenea, nitida. Corpus cum pedibus cyaneum.
8. *E. punctatus*, ater, antennis compressis. *antennatus.*
 Habitat in Infula Iaua. D. Billardiere.
 Statura et magnitudo omnino *E. compressicornis*,
 Dd 2 at

- at tota atra, thorace elytrisque punctatis. Antennae extrorsum paullo crassiores, compressa
- splendidus.* 9. *C. ouatus*, viridi-aeneus, antennis plantisque nigris.
Chrysomela splendida. Ent. syst. I. 324. 81.
 Habitat Tranquebariae. Mus. D. Lund.
- sumptuosus.* 10. *E. nitidissimus*, capite thoraceque aeneis, elytris violaceis.
Chrysomela sumptuosa. Ent. syst. suppl. 88. 85.
 Habitat in Insula Trinidad. D. Ryan. Mus. D. Lund.
- glabratus.* 11. *E. ouatus*, testaceus, nitidus, elytrorum limbo cyaneo.
Chrysomela glabrata. Ent. syst. I. 318. 51.*
 Habitat Surinami. Mus. D. Bosc.
- modestus.* 12. *E. ouatus*, viridi-aeneus, thorace lineis quatuor elytris duabus cupreis.
Chrysomela modesta. Ent. syst. I. 323. 77.*
 Habitat in India orientali. D. Abildgaard.
- matellius.* 13. *E. obscure aeneus*, antennis nigris.
 Habitat in Amboina. D. Billardiere.
 Statura et magnitudo *E. splendori*, at tota obscure aenea, punctata, antennis foliis nigris.
- hirtus.* 14. *E. viridi-coeruleus*, cinereo-hirtus.
 Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff. Mus. D. d. Sehestedt.
 Statura et magnitudo praecedentium, totus pilis densis cinereis hirtus, supra coeruleus, subtus viridi-aeneus. Antennae obscurae.
- dentipes.* 15. *E. viridi-aeneus*, nitidus, femoribus posticis acute dentatis.
 Habitat in Sumatra. D. Daldorff: Mus. D. Lund.
 Paulo minor *E. aurato*. Antennae ferruginae.
 Caput et thorax subpunctata, aenea, nitidissima.

ma. Elytra punctato - striata; aenea, nitida, margine vix cyaneo. Corpus obscurum. Pedes nigri, femoribus posticis in medio dente acuto, valido.

16. *E. viridi-aeneus*, nitidus, thoracis elytrorum-~~aeneus~~.
que margine tenuissime coerulefcente, antennis
nigris.

Habitat in India orientali. Mus. D. de Sehestedt.

Statura et magnitudo omnino *E. nigriti*. Antennae nigrae. Caput et thorax laevia, aenea, nitida. Elytra subpunctata, aenea, margine futuraeque coeruleis. Corpus aeneum.

7. *E. ater*, nitidus, antennis fuscis: basi ferrugineis. ~~nigritus~~.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Duplo maior *E. atrato*. Antennae fuscae, articulis duobus baseos ferrugineis. Thorax laevis, ater, nitidus. Elytra subtilissime punctato-striata. Corpus nigrum.

8. *E. obscure aeneus*, nitidulus, subtus niger, an-~~nitidulus~~.
tennis nigris basi ferrugineis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.

Statura praecedentium. Antennae nigrae, basi ferrugineae. Caput et thorax laevia, obscure aenea, nitida. Elytra punctato-striata, obscure aenea, nitidula. Corpus nigrum.

9. *E. niger*, obscurus, pedibus posticis elongatis. ~~obscurus~~.

Cryptocephalus obscurus. Ent. syst. 2. 60.

35. *

Chrysomela obscura. Linn. syst. Nat. 2. 599. 96.

Panz. Fn. Germ. 5. tab. 12.

Payk. Fn. Sv. 2. 141. 14.

Degeer Inf. 5. 336. 40.

Habitat in Europae plantis.

I. 34.

20. E.

- vitis.* 20. *E. niger, glaber, elytris rufis.*
Cryptocephalus Vitis. Ent. syst. 2. 60. 36.
 Geoff. Inf. 1. 232. 2.
 Schaeff. Icon. tab. 86. fig. 6.
 Habitat in vite vinifera Europae australis, quam
 misere saepe depascit.
- ~~*atratus.*~~ 21. *E. ater, nitidus, antennis ferrugineis.*
Cryptocephalus atratus. Ent. syst. suppl. 106.
 34. *
 Habitat in America. Dom. Hybner.
- variabilis.* 22. *E. ater, nitidus, thorace laeui, elytris punctatis.*
 Habitat in America meridionali. Mus. D. Lund.
 Statura parua *E. nitiduli.* Antennae ferrugineae.
 Caput et thorax laeuia, atra, nitida, immacu-
 lata. Elytra subpunctata, atra, nitida. Pedes
 rufi.
- ruficollis.* 23. *E. ater, nitidus, thorace pedibusque nigris.*
^{rufus} ^{elytris}
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
 D. de Sehestedt.
 Medius. Antennae rufae, apice nigrae. Caput et
 thorax laeuia, rufa, nitida. Elytra substriata,
 atra, nitida. Corpus rufum, pedibus nigris.
- femoratus.* 24. *E. niger, femoribus quatuor anticis ferrugineis.*
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
 D. Lund.
 Paruus. Antennae basi ferrugineae, articulis quin-
 que vltimis crassioribus subcompressis, nigris.
 Caput et thorax laeuia, nigra, subpunctata.
 Elytra substriata, nigra. Corpus nigrum femo-
 ribus quatuor anticis rufis.
- aerugineus.* 25. *E. aeneus, pedibus ferrugineis.*
Chrysomela aeruginea. Ent. syst. 1. 330. 116. *
Chrysomela metallica. Ross. Fn. Etr. 84. 212.
 tab. 3. fig. 11.
 Habitat in Italia. Mus. D. Bosc. 26. E.

26. E. fuscus, immaculatus, obscurus.

arenarius.

Cryptocephalus arenarius. Ent. syst. suppl. 109.
90. *

IV. 50

Habitat in Germania. D. Panzer.

80. CHRYSOMELA. *Palpi* sex extrorsum crassiflores.

Labium corneum, integrum.

Antennae monilliformes.

* *Ouatae.*

1. C. atra, elytris flavis: punctis numerosissimis *punctatissima.*
atris, sterno cornuto. Ent. syst. 1. 307. 1. *

Oliv. Inf. tab. fig.

Habitat Cayennae. Mus. D. Olivier.

2. C. atra, elytris fasciis quinque punctorum fulvo-*pustulata.*
rum. Ent. syst. 1. 308. 2. *

Habitat Cayennae. Dr. Schulz.

3. C. aptera, atra, antennis pedibusque violaceis. *tenebricosa.*
Ent. syst. 1. 308. 3.

Geoff. Inf. 1. 195. 19.

Linn. syst. Nat. 2. 678. 29.

Roff: Fn. Etr. 1. 74. 186.

IV. 42

Schaeff. Icon. tab. 126. fig. 1.

Habitat in Europae australioris plantis.

Larva gibba, violacea, ano rufo, in plantis herbaceis polyphaga. 4. C.

Chrysomelae corpus ouato-oblongum, gibbum, immarginatum, tardum, saepius laeve, nitidum; *capite* ouato, inferto; *oculis* ouatis, lateralibus; *antennis* longitudine thoracis, ante oculos inertis; *thorace* transverso, fere latitudine elytrorum: margine saepius incrassato; *scutello* paruo, rotundato; *elytris* rigidis, fornicatis, longitudine abdominis: margine deflexo; *pedibus* mediocribus, validis; *tarsis* quadriarticulatis; *colore* vario, saepius nitido.

- rugosa. 4. *C. aptera*, atra, elytris rugosis, pedibus violaceis. Ent. syst. 1. 308. 4. *
Teuebrio rugosus. Linn. syst. Nat. 2. 678. 27.
 Habitat in Africa. Mus. D. de Sehestedt.
 Simillimam, at duplo minorem misit ex Austria
 D. de Meyerle, an distincta?
- Morio.* 5. *C. atra*, antennis pedibusque nigris. Ent. syst. 1. 308. 5. *
 Habitat in Terra Diemenii. Mus. D. Banks.
- coriaria. 6. *C. atra*, pedibus totis violaceis. Ent. syst. 1. 309. 6. *
 11. 42. *Chrysomela coriaria*. Laichart. Tyr. 143. 2.
 Habitat in Germania australiori.
- Surinamen* 7. *C. gibba*, cyanea, glaberrima, antennis plantisque
fig. fuscis.
Chrysomela Surinamensis. Ent. syst. 1. 314. 31. *
Chrysomela Americana. Sulz. Inf. tab. 3. f. 12.
 Habitat Surinami. Mus. D. Banks.
 Thorax vtrinque impressus.
- 3maculata.* 8. *C. cyanea*, coleoptris flavis; fascia maculisque duabus nigris. Ent. syst. 1. 312. 22. *
 Habitat in America meridionali.
 Fascia elytrorum interdum interrupta.
- vittata.* 9. *C. cyanea*, elytris margine vittaque media flavis. Ent. syst. 1. 310. 11.
 Hybn. Naturf. 24. 37. 1. tab. 2. fig. 1.
 Voet. Col. 2. tab. 31. fig. 17.
 Habitat in America. Mus. Dr. Schulz.
- gibbosa.* 10. *C. nigra*, elytris flavis; fasciis duabus punctisque baseos nigris. Ent. syst. 1. 311. 19. *
 Habitat in America meridionali.

11. *C. obscure ferruginea*, elytris ^{*cyaneis*} maculis quatuor *smaculata*.
flavis. Ent. syst. I. 311. 20. *
Habitat Surinami. D. Smidt.
12. *C. viridi-aenea*, elytris nitidis: futura vitta- *submargi-*
que submarginali cupreis. *nata*.
Habitat in Senegallia. Mus. D. de Sehestedt.
Praecedente paullo minor. Caput et thorax lae-
uia, obscure aenea. Elytra punctata, aenea, ni-
tidiora, futura vittaque submarginali, tenui cu-
preis. Corpus cum pedibus nigrum.
13. *C. obscure brunnea*, elytris nigris: vittis duabus *conjugata*.
postice coeuntibus *nigris, flavis*
Habitat Surinami. Dom. Stenersen. Mus. D. de
Sehestedt.
Staturae *C. pulchrae*, at maior. Antennae ferru-
gineae, apice nigrae. Caput et thorax obscure
brunnea, immaculata. Elytra striato-punctata,
nigra, vittis duabus latis flavis, ante apicem
coeuntibus. Corpus cum pedibus ferrugineum.
14. *C. obscure testacea*, elytris flavis: fasciis dua- *cincta*
bus viridi-aeneis. Ent. syst. I. 313. 25. * *trifasciata*.
Voet. Col. tab. 31. fig. 13.
Habitat Surinami. D. Prof. Helwig.
15. *C. testacea*, coleoptris flavis: fasciis duabus *futuralis*.
aeneis: baseos bipunctata. Ent. syst. I. 313.
26. *
Habitat Cayennae. D. v. Rohr.
Elytra laevia, flava, basi aenea: puncta magno
flavo. Fascia altera in medio obliqua. Sutura
aenea.
16. *C. aenea*, elytris flavis: futura vittaque aeneis. *pulchra*.
Ent. syst. I. 313. 27. *
Habitat Septentrionali. Mus. D. Banks.

17. *C.*

- crucifata.* 17. *C. atra*, elytris maculis duabus sinuatis, flavescentibus.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.
Magna. Caput et thorax laevia, atra, obscura. Elytra laevia maculis duabus magnis, sinuatis flavis. Corpus atrum.
- rugulata.* 18. *C. obscure ferruginea*, elytris aeneis: punctis sex albis.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.
Paullo praecedente minor. Caput et thorax obscure ferruginea, immaculata. Elytra fere laevia, nitida, aenea, punctis sex albis 1. 2. 2. 1. Corpus obscure ferrugineum.
- thoracica.* 19. *C. testacea*, elytris viridi-aeneis, immaculatis.
Habitat in Guinea. Mus. D. de Sehestedt.
Magnitudo et statura *C. gmaculatae*. Caput et thorax laevia, obscure testacea, immaculata. Elytra laevia, aenea, nitida. Corpus testaceum.
- affinis.* 20. *C. obscure aenea*, subtus violacea, elytris laevibus. *Eid. 1911. 1. 910. 13.*
Habitat sub Barbariae lapidibus. D. Vahl.
- friata.* 21. *C. atra*, nitida; elytris striatis, testaceis: sutura atra. Ent. syst. 1. 321. 65. *
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.
- alternans.* 22. *C. obscure aenea*, elytrorum striis viridibus rufisque alternis. Ent. syst. 4. App. 447. 65. *
Habitat in Americae Insulis. D. de Paykull.
- Australias.* 23. *C. testacea*, elytrorum disco obscuro: lituris flavescentibus.
Habitat in Oceani pacifici Insulis. D. Billardiere. Caput et thorax testacea, laevia, nitida, immaculata.

lata. Elytra vix punctata, margine testaceo, disco obscuriore, lituris variis flavescentibus. Corpus et pedes testacea.

24. *C. supra aurea nitidissima, subtus atra.*

Habitat in America meridionali. Muf. D. Lund.

Corpus medium, gibbum, subrotundum, capite, thorace elytrisque laeuissimis, aureis, nitidissimis. Corpus atrum.

globus.

25. *C. obscure brunnea, antennis apice, pedibusque atris.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muf. D. Lund.

Statura praecedentis eiusdemque magnitudinis. Antennae subcompressae, basi brunneae, apice nigrae: articulo septimo flauo. Caput, thorax, elytra obscura, brunnea, sublaeuia, nitida. Corpus brunneum, pedibus atris.

*apicalis
varicornis.*

26. *C. cyanea, nitida, corpore ferrugineo.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muf. D. de Sehestedt.

Parua. Caput, thorax, elytra laeuia, cyanea, nitida, immaculata. Corpus cum antennis pedibusque ferrugineum.

*amethysti-
na.*

27. *C. testacea, antennis pedibusque pallidis.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muf. D. Lund.

Statura et magnitudo omnino praecedentis. Antennae pallidae: articulo ultimo fusco. Caput, thorax et elytra laeuia, testacea, immaculata. Corpus testaceum, pedibus pallidis.

*sil-
testacea.*

28. *C. aenea, nitida, elytris punctatis cupreis.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muf. D. de Sehestedt.

Statura parua ouata praecedentium. Antennae
basi

bractea.

basi testaceae, apice fuscae. Caput et thorax aenea, nitida. Elytra punctata, obscuriora, cuprea. Corpus cum pedibus nigrum.

orbicula. 29. *C. atra*, capite, thorace pedibusque flavescentibus.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Statura parua *C. amethystinae*. Antennae flavae, dimidiato fuscae. Caput et thorax flava, immaculata. Elytra punctato-friata, nigra, nitida. Corpus nigrum, pedibus flavis.

micat's. 30. *C. supra* aenea, nitida, thoracis margine postico elytrorumque macula disci cupreis. Ent. syst. 4. App. 447. 69. *

Habitat in Insula Sumatra. D. de Paykull.

Centaurei. 31. *C. cuprea*, nitens, subtus viridi-aenea, pedibus cupreis. Ent. syst. 1. 315. 40. *

Chrysomela Centaurii. Herbst. Arch. tab. 23. fig. 15.

Chrysomela varians. Payk. Fn. Sv. 2. 60. 12. β.
N. 47. Habitat in Germaniae Centaurio.

Varietatem C. variantis credit D. de Paykull, at vix rite. Thorax nullo modo marginatus.

3vittata. 32. *C. atra*, coleoptris ferrugineis: vittis tribus atris; lateralibus abbreviatis.

Chrysomela 3maculata ovata, nigra, elytris flavis: maculis tribus oblongis nigris; intermedia futura communi. Linn. syst. Nat. 2. 592. 45.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Parua. Caput ferrugineum, immaculatum. Thorax ferrugineus, macula magna, quadrata, basios atra. Elytra laevia, ferruginea, vitta lata, atra,

atra, quae tamen apicem haud attingit. Sutura tota late atra. Corpus atrum, pedibus ferrugineis.

33. *C. flauescens*, elytris viridi-cinereis. Ent. syst. *flauicans*.
 I. 328. 104. * *variet. C. litura*
 Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

34. *C. rufescens*, elytris, sutura lineaque longitudinali atris. Ent. syst. I. 328. 103. *

Chrysomela litura. Payk. Fn. Sv. 2. 74. 28.

Herbst. Arch. tab. 23. fig. 18.

VII. 26.

Habitat in Angliae fabuletis.

** *Oblongae, thoracis margine saepius incrassato.*

35. *C. cyanea*, elytris punctatis obscurioribus. Ent. *nigrita*.
 syst. I. 309. 7. *

Geoff. Inf. I. 259. 6. a.

Habitat Parisiis. Mus. D. Bosc.

36. *C. atra*, pedibus violaceis, palpis tarsisque rufis. *Goettingensis*.
 Ent. syst. I. 309. 8. *

Linn. syst. Nat. 2. 586. 4. Fn. Sv. 506.

Degeer Inf. 5. 298. 8.

IV. 42

~~Payk. Fn. Sv. 2. 51. 1.~~

Habitat in Germaniae plantis.

37. *C. atro-coerulea*, antennis pedibusque concoloribus, elytris vage punctatis. Ent. syst. I. 309. 9. * *Hottentotta*.

Habitat Kiliae.

38. *C. nigra*, subtus obscurior, elytris vage punctatis. Ent. syst. I. 309. 10. * *Aethiops*.

Habitat in Germania. D. Smidt!

39. *C. viridi-aenea*, subtus violacea, elytris punctato-striatis. Ent. syst. I. 310. 12. * *bicolor*.

Chrysomela viridi-coerulea. Forfk. Descr. 77. 2.

Habitat Alexandriae.

C. gemellata, Panz, Nelli
geminata Payk

40. *C. fucata* F. p. 444
 hinc etiam pertinet

IV. 46

Lusitanica. 40. *C. thorace cupreo, elytris aeneis: punctis impressis* ^{picatissimis} ~~coeruleiscentibus~~, subtus violacea. Ent. syst. I. 310. 14. *

Habitat in Lusitania. Mus. D. Banks.

rufipes. 41. *C. nigra, antennis, thoracis elytrorumque margine pedibusque rufis.*

Habitat in Australasia. D. Billardiere.

Statura et magnitudo *C. Bankii*. Caput nigrum ore antennisque ferrugineis. Thorax niger, margine tenuissime rufo. Elytra punctato-striata, nigra, margine tenuissime rufo. Corpus nigrum, pedibus rufis.

ferruginea. 42. *C. ferruginea, subtus nigra.* Ent. syst. I. 310. 15. *

Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. D. Banks.

Bankii. 43. *C. supra aenea, subtus testacea.* Ent. syst. I. 310. 16. *

Roff. Fn. Etr. I. 75. 188.

Habitat in Lusitaniae plantis polyphaga.

metallica. 44. *C. aenea, nitida, antennis pedibusque testaceis.* Ent. syst. I. 311. 17. *

IV. 43 Habitat in Germania. D. Prof. Helwig.

lamina. 45. *C. viridi-aenea, thorace glaberrimo, elytris punctato striatis.* Ent. syst. I. 311. 18. *

IV. 42 Habitat in Germania. D. Smidt.

obscurata. 46. *C. supra obscure aenea, thorace glaberrimo, elytris vage punctatis.* Ent. syst. suppl. 85. 18. *

Habitat in Germania. Dom. Daldorff.

Raphani. 47. *C. viridis, nitida, elytris aeneis.*

Galleruca Raphani. Ent. syst. 2. 19. 26.

Chrysomela Raphani. Payk. Fn. Sv. 262. 15.

Chrysomela viridula. Degeer Inf. 5. 311. 19.

Herbst.

Herbst. Arch. tab. 23. fig. 21.

Habitat in Betula Alno, Raphano.

48. *C. atra*, elytris striato - punctatis, tibiis apice *calcarata*.
vndentatis.

Galleruca calcarata. Ent. syst. 2. 19. 27. *

Habitat in Germania. Mus. D. Löwenkiold.

49. *C. atra*, elytris punctato - striatis, antennis pedi- *punctulata*.
busque flavis.

Galleruca punctulata. Ent. syst. 2. 19. 28. *

Habitat in Germania. Mus. D. Löwenkiold.

50. *C. nigra*, antennis, thorace, abdomine pedibus- *morbillosa*.
que flavescentibus.

Galleruca morbillosa. Ent. syst. 2. 19. 29. *

Habitat in Germania. Mus. D. Löwenkiold.

51. *C. nigra*, elytris punctis quinque rufis. Ent. *rogusfulata*
syst. 1. 312. 21. *

Habitat in Insula St. Domingo Americae. Mus.

D. Gigot d'Orcy.

52. *C. atra*, thoracis margine flavo: puncto nigro, *Adonidis*.
elytris flavis: sutura vittaque nigris. Ent. syst.

1. 312. 23. *

Herbst. Arch. tab. 23. fig. 17.

Pall. Iter. 1. 463. 29.

Hybn. Naturf. 24. 88. 2. tab. 2. fig. 2.

Habitat in Austriae plantis. Dr. Schulz.

53. *C. capite* thoraceque ferrugineis, elytris nigris: *clayatis*.
vitta flavescente. Ent. syst. 1. 312. 24. *

Habitat - - Dr. Hunter.

54. *C. testacea*, coleoptris flavis, punctis sedecim ni- *14punctata*
gris; duobus communibus. Ent. syst. 1. 314.
29. *

Linn. syst. Nat. 2. 599. 94.

Habitat in India orientali.

55. C.

- 14guttata.* 55. *C. obscure testacea*: punctis sex albis. Ent. syst. suppl. 85. 28. *
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lund.
- ebriata.* 56. *C. atra, nitida, elytris albis*: maculis variis atris. Ent. syst. suppl. 86. 29. *
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lund.
- sapphirus.* 57. *C. oblongus, cyaneus, elytris subrugosis.*
Habitat in India. Mus. D. de Sehestedt.
Omnino distincta. Statura oblonga *C. graminis* eiusdemque magnitudinis. Totum corpus cyaneum. Antennae apice fuscae. Thorax planus margine incrassato. Elytra subrugosa.
- graminis.* 58. *C. viridi-coerulea, nitida, antennis pedibusque concoloribus.* Ent. syst. 1. 314. 33.
Linn. syst. Nat. 2. 587. 7. Fn. Sv. 509.
Geoff. Inf. 1. 260. 10.
Degeer Inf. 5. 304. 16.
Schaeff. Icon. tab. 21. fig. 10.
Payk. Fn. Sv. 2. 63. 16.
Habitat in Europae gramine.
- fulgida.* 59. *C. viridi-aenea, elytris punctatis, auro-nitidulis.*
Habitat in Austria. D. de Meyerle.
Statura *C. graminis*. Caput viridi-aeneum, antennae nigrae. Thorax viridi-aeneus, vix punctatus, nitidus. Elytra punctata, aenea, auro colore, nitidula. Pedes aenei.
- bifrons.* 60. *C. viridi-aenea, nitida, corpore cyaneo.* Ent. syst. 1. 314. 34. *
Habitat in Italiae plantis. Dr. Allioni.
- cuprea.* 61. *C. capite thoraceque aeneis, elytris cupreis, corpore atro.* Ent. syst. 1. 315. 35. *
Degeer Inf. 5. 305. 17.
III. 32. Geoff. Inf. 1. 263. 15.
Habitat in Germania. D. de Hattorff.

62. *C. cyanea*, antennis fuscis. Ent. syst. I. 315. *tristis*.
 36. * *haemoptera* Payk. R. 447.
 Habitat in Europa australi. Muf. D. de Sehestedt. IV. 43
63. *C. violacea*, plantis alisque rubris. Ent. syst. I. *haemoptera*
 315. 37. *
~~Linn. Syst. Nat. 9. 587. 11. Fn. Sv. 572.~~
~~Geoff. Inf. I. 258. 5. vel variet. violacea Schimperii~~
~~vel var. distincta~~
 Habitat in Europae plantis variis.
64. *C. coerulea* siue aenea, antennis pedibusque ni- *varians*.
 gris. Ent. syst. I. 315. 38. *
Chrysomela varians. Act. Hall. I. 272. 20. IV. 43.
 tab. 9. fig. 13.
Chrysomela Hyperici. Degeer. Inf. 5. 312. 20.
 Payk. Fn. Sv. 2. 60. 12.
 Habitat in Germaniae Hyperico.
65. *C. cyanea*, antennis pedibusque concoloribus. *violacea*.
 Ent. syst. I. 315. 39. *
 Act. Hall. I. 272. 21. IV. 43
 Habitat in Germania. D. Smidt.
66. *C. nigra*, elytris flavis: fascia media nigra, an- *semistriata*.
 tice posticeque nigro - striatis. Ent. syst. I. 316.
 43. *
 Habitat in Brasilia. Muf. D. Banks.
67. *C. capite* thoraceque albis, elytris punctatis, basi *Amboinen-*
 albis: fusco - irroratis, apice brunneis. *sis*.
 Habitat in Amboina. D. Billardiere.
 Magna. Antennae nigrae, basi pallefcentes. Ca-
 put et thorax niuea, disco fusco variegato.
 Elytra basi alba, punctis fuscis impressis, irro-
 ratis, apice brunnea, atomis albis. Margo ely-
 trorum ferrugineus. Corpus et pedes brunnea.
68. *C. thorace* coerulefcente, elytris rubris, apice ni- *populi*.
 gris. Ent. syst. I. 316. 44.
 E e Linn.

Linn. syst. Nat. 2. 590. 30. Fn. Sv. 523.

Geoff. Inf. 1. 256. 1.

Degeer Inf. 5. 290. 1. tab. 8. fig. 16.

Merian. Europ. 14. tab. 27.

~~Schaeff. Icon. tab. 21. fig. 9.~~

IX. Albin. Inf. 63. fig. 6.

Payk. En. Sv. 2. 55. 6.

Habitat in Europae Populo.

Larvae hexapodae, albo nigroque variae, dup
serie tuberculorum, e quibus humoris lutei g
tulas fundunt. Odorem spargunt grauem
ingratum.

tremulae. 69. *C. coerulescens*, elytris testaceis. Ent. syst.

317. 45. *

Geoff. Inf. 1. 25. 2.

IX.

Payk. Fn. Sv. 2. 55. 7.

Habitat in foliis Populi tremulae.

grossa. 70. *C. cyanea*, nitida, elytris testaceis: immaculat

Ent. syst. 1. 317. 46.

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

staphylaea. 71. *C. obscure testacea*. Ent. syst. 1. 317. 47.

Linn. syst. Nat. 2. 590. 26. Fn. Sv. 518.

Geoff. Inf. 1. 263. 15.

Schaeff. Icon. tab. 21. fig. 12.

Degeer Inf. 5. 294. 3. tab. 8. fig. 24.

Payk. Fn. Sv. 2. 53. 4.

Habitat in Europae plantis polyphaga.

serpida.

72. *C. testacea*, elytris aeneis: margine testac

Ent. syst. 1. 317. 48.

Habitat in Insula Iaua. Mus. Dr. ^{Mus. Dr.} Hunter.

polita.

73. *C. thorace aurato*, elytris testaceis. Ent. syst.

317. 49.

Linn. syst. Nat. 2. 590. 27. Fn. Sv. 522.

Geoff. Inf. 1. 257. 2.

Deg

Degeer. Inf. 5. 294. tab. 8. fig. 23.

~~Schaeff. Icon. tab. 65. fig. 9.~~

Payk. Fn. Sv. 2. 54. 5.

Habitat in Europae Salice, Populo.

4. *C. ferruginea*, elytris, margine, vitta lunulaque *lunata*.
media flauicantibus. *Ent. syst. 1. 318. 53*

Habitat - - - Mus. D. Banks.

5. *C. nigra*, elytris striato - punctatis castaneis. *lurida*.
Ent. syst. 1. 318. 52.

Linn. syst. Nat. 2. 590. 28.

Vll. 24.

Geoff. Inf. 1. 258. 3.

Habitat in Galliae Vite.

6. *C. thorace nigro, aeneo, coleoptris flauis: vit-* *linea*.
tis nouem fuscis. Ent. syst. 1. 318. 53. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

7. *C. thorace pedibusque ferrugineis, coleoptris exclamatio-*
flauis: striis nouem atris; exterioribus inter- *uis.*
ruptis abbreviatisque. Ent. syst. suppl. 86.

53. *

Habitat in America boreali. D. Smith Barton.

8. *C. ferruginea*, capite thoraceque flauis, elytris *stolida*.
variegatis. Ent. syst. 1. 318. 54.

Habitat in America meridionali.

9. *C. nigro-aenea*, capite, thoracis lateribus, ely- *nigricornis*.
trorumque macula duplici baseos, ferrugineis.

Ent. syst. 1. 318. 35. *

Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

10. *C. violacea*, thoracis marginibus albis: puncto *collaris*.
nigro. Ent. syst. 1. 319. 56. *

Linn. syst. Nat. 2. 591. 37. Fn. Sv. 528. Vll. 25.

Degeer Inf. 5. 302. 13.

~~Schaeff. Icon. tab. 52. fig. 11. 12.~~

- Payk. Fn. Sv. 2. 58. 10.
Habitat in Europae et Americae falicibus.
- falidis.* 81. *C. coerulea*, thorace laevi: margine incrassa
variet. collaris ferrugineo. Ent. fyft. 1. 319. 57. *
Habitat in Saxoniae falice. D. Smidt.
- Senegalen-* 82. *C. obscure aenea*, thorace elytrisque margini
fis. ferrugineis, thoracis puncto nigro. Ent. fyft.
319. 58. *
Habitat in Senegallia. Mus. Dom. Olivier.
- viminalis.* 83. *C. nigra*, thorace rufo bimaculato, elytris rufi
Ent. fyft. 1. 319. 59.
Linn. fyft. Nat. 2. 590. 31. Fn. Sv. 524.
Geoff. Inf. 1. 265. 18. *viminalis, 10 punctata,*
Degeer. Inf. 5. 297. 6. *haemorrhoidalis* *et*
variet. eius species
II. 25. Payk. Fn. Sv. 2. 68. 21.
Habitat in Europae falice.
- cyanipes.* 84. *C. rufa*, elytris, punctis posticeque nigris. Ent.
fyft. 1. 320. 60. *
Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.
- cyanicornis* 85. *C. rufa*, thorace, macula dorsali punctisque duo
bus, coleoptris maculis octo cyaneis. Ent. fyft
1. 320. 61. *
Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.
- 10punctata.* 86. *C. thorace rubro*, postice nigro, elytris rufis
punctis subquinis nigris. Ent. fyft. 1. 320. 62
Linn. fyft. Nat. 2. 590. 32. Fn. Sv. 525.
variet. viminalis Geoff. Inf. 1. 258. 4.
Degeer. Inf. 5. 294. 4. tab. 8. fig. 25.
IX. Schaeff. Icon. tab. 21. fig. 10.
Payk. Fn. Sv. 2. 68. 21. β .
Habitat in Europae Populo.
- 6punctata.* 87. *C. thorace rufo*: punctis duobus, elytris rufis:
III. 92 punctis tribus nigris. Ent. fyft. 1. 320. 63.

~~*Chrysomela rufipes.* Payk. Fn. Sv. 2. 69. 22.~~

Habitat in Europae plantis.

18. *C. thorace elytris que pallidis: punctis duobus* *notata.*
nigris. Ent. syst. suppl. 86. 63. *

Habitat in Tanger. D. Schousboe. Mus. D. Lund.

19. *C. pallida, thorace punctis duobus, elytris striis* *aegrota.*
quibusdam punctatis nigris. Ent. syst. suppl.
87. 63. *

Habitat in Hispania. Mus. D. Lund.

20. *C. flavescens, oculis nigris.* Ent. syst. 1. 321. 64. *pallida.*

Chrysomela dispar. Payk. Fn. Sv. 2. 66. 20.

Linn. syst. Nat. 2. 590. 25. Fn. Sv. 521.

~~Geoff. Inf. 1. 243.~~

v. 11. 25

Habitat in Europae Sorbo.

21. *C. thorace fuluo: punctis quatuor nigris, ely-* *notata.*
tris pallidis nigro variis. Ent. syst. 1. 321.
66. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

22. *C. thorace fuluo: punctis quatuor nigris, ely-* *Rumicis.*
tris fuluis: sutura vitta que media nigris. Ent.
syst. 1. 321. 67. * *var. litura*

Habitat in Hispaniae Rumice spinosa. Prof. Vahl.

23. *C. atra, elytris margine, punctis quatuor api-* *vulpina.*
ceque nigro maculato, albis. Ent. syst. 1. 321.
68.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

24. *C. flavescens, elytris maculis duabus nigris.* *crassicornis*
Ent. syst. 1. 321. 69. *

Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

25. *C. thorace viridi, elytris rubris: fascia inter* *Laponica.*
punctum maculam que lunatam, coerulea. Ent.
syst. 1. 322. 70.

Linn. Syst. Nat. 2. 591. 35. Fn. Sv. 526.

II. 19²

Degeer

Degeer, Inf. 5. 302. 12. tab. 9. fig. 3.

Schaeff. Icon. tab. 44. fig. 2.

Payk. Fn. Sv. 2. 57. 9.

Habitat in Lapponiae Salicibus, Fraxino.

interrupta. 96. *C. nigro-coerulea*, thoracis margine albido puncto coerulecente, elytris pallidis: puncto quatuor maculaque coeruleis.

Habitat in Carolinae falice. Mus. D. Bosc.

Statura omnino oblonga *C. Lapponicae*. Antennae cyaneae, basi albidae: articulo primo cyaneo. Thorax cyaneus, margine incrassato, albido: puncto parvo, cyaneo. Elytra punctata albida, punctis 2. 2. saepe in fasciam confluentibus, maculaque in margine postico cyaneo. Corpus obscure cyaneum.

Cajennensis 97. *C. ferruginea*, elytris maculis quatuor fasciisque media nigris. Ent. syst. suppl. 87. 70.

Habitat in Cajenna. D. Richard.

marmorata 98. *C. nigra*, thoracis margine antico elytrisque flavis nigro-maculatis. Ent. syst. suppl. 87. 70.

Habitat in Cajenna. D. Cuvier.

scripta. 99. *C. nigra*, thoracis margine albido: puncto nigro, elytris pallidis: lineolis interruptis nigris.

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Statura et magnitudo omnino *C. Lapponicae*. Caput nigrum, immaculatum. Thorax niger, margine incrassato, pallido: puncto parvo, nigro. Elytra punctata, pallida, lineolis nigris; intermedia longiori; lineari. Corpus nigrum.

vndulata. 100. *C. rufa*, elytris fasciis tribus vndulatis, atris coeruleis. Ent. syst. I. 322. 71. *

Linn. syst. Nat. 2. 591. 35. Amoen. acad. 6. 39.

14.

Habitat in India. 4

101. *C. elytris fuscis*: punctis octo pallidis, quibus ~~18 guttata.~~
dam connexis. Ent. syst. 1. 322. 72. *
Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.
102. *C. coerulea*, thorace, femoribus anoque rufis. Polygoni.
Ent. syst. 1. 322. 73.
Linn. syst. Nat. 2. 589. 24. Fn. Sv. 520.
~~Geoff. Inf. 1. 283. 4.~~
Reaum. Inf. 3. tab. 17. fig. 14. 15.
Degeer Inf. 5. 322. 26.
Schaeff. Icon. ~~tab. 31. fig. 5.~~
tab. 161. fig. 4.
~~tab. 173. fig. 4.~~
Payk. Fn. Sv. 2. 61. 14.
Habitat in Europae Polygono auiculari.
Grauidae ultra coleoptra ventricosa euadit.
103. *C. cyanea*, antennarum basi, thorace, ano pedi- Ruffica.
busque rufis. Ent. syst. 1. 323. 74. *
Habitat in Russia meridionali. D. Boeber.
104. *C. testacea*, elytris futura lineolaque media fu- brunnea.
scii. Ent. syst. 1. 323. 75. *
Habitat in noua Zelandia. Mus. D. Banks.
105. *C. aurata*, thorace lineis tribus coleoptrisque cerealis.
quinque coeruleis. Ent. syst. 1. 323. 76. *
Linn. syst. Nat. 2. 588. 17.
Geoff. Inf. 1. 262. 14. 11. 45
Schaeff. Icon. tab. 3.
Habitat in Europae Spartio scopario.
106. *C. cuprea*, thorace linea dorsali, elytris, vittis Megerlei.
coerulefcentibus.
Habitat in Germania australiori. D. de Megerle. 11. 9
Statum omnino *C. cerealis*, at paullo minor. Cor-
pus cupreum, obscure nitidum. Thorax pun-
ctatus linea dorsali coerulefcente. Elytra pun-
ctata

ctata vittis tribus aut quatuor obsoletis, coerulescentibus.

D. de Megerle, insectorum collector oculatus, quae benevole communicavit.

Americana. 107. *C. viridi-aenea*, elytris striis quinque sanguineis. Ent. syst. 1. 323. 78. *

Linn. syst. Nat. 2. 592. 46.

Habitat in America, in Galliae, Italiae Lavendula.

D. Broussonet.

festiva.

108. *C. nigro-aenea*, elytris lineis tribus futuraeque anticae flavis. Ent. syst. 1. 323. 79. *

Chrysomela lineata. Degeer Inf. 7. tab. 49. fig. 12.

Habitat in America.

fastuosa.

109. *C. aurea*, coleoptris lineis tribus coeruleis. Ent. syst. 1. 324. 80.

Linn. Syst. Nat. 2. 588. 19.

Geoff. Inf. 1. 261. ~~Pl. 12~~

11. 45

Scopol. Carn. 532.

Payk. Fn. Sv. 2. 64. 18.

Habitat in Europae Lamio albo.

splendidula 110. *C. nigra*, thorace elytrisque viridibus, cupromicantibus.

Habitat in Sumatra. D. Daldorff.

Statura et magnitudo *C. fastuosae*. Caput cum antennis nigrum. Thorax aeneus, cupromicans, obscure nitidus. Elytra punctato-striata, viridia, cupromicantia. Corpus nigrum.

gloriosa. 111. *C. viridis*, nitida, elytris linea coeruea. Ent. syst. 1. 324. 82. *

Chrysomela Cacaliae Schrank.

Il. 19. no Habitat in Italia. Dr. Allioni.

112. *C. viridi-sericea*, elytris lineis duabus aureis. *spaciosa*.
 Ent. syst. 1. 324. 83. *
 Linn. syst. Nat. 2. 588. 19.
 Holl. tab. 6. fig. 2.
 Habitat in Europae syluis.
113. *C. atra*, coleoptorum limbo sanguineo. Ent. *limbata*.
 syst. 1. 325. 88. *
 Geoff. Inf. 1. 260. 9.
 Schaeff. Icon. tab. 21. fig. 20. II. 20.
 Payk. Fn. Sv. 2. 70. 23.
 Habitat in Germania et Anglia.
114. *C. nigra*, elytris laevissimis: margine exteriori *carnifex*.
 sanguineo. Ent. syst. 1. 325. 89. *
 Habitat in Germania. D. Smidt. II. 20.
115. *C. atra*, elytris punctatis: margine exteriori *sanguinolenta*.
 flavescente. Ent. syst. 1. 325. 90. *
 Linn. syst. Nat. 2. 591. 38. Fn. Sv. 529.
 Geoff. Inf. 1. 259. 8. tab. 4. fig. 8.
 Degeer. Inf. 5. 298. 7. tab. 8. fig. 26. II. 21.
 Schaeff. Icon. tab. 21. fig. 15.
 Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 10.
 Payk. Fn. Sv. 2. 52. 3.
 Habitat in Europae plantis.
116. *C. nigro-aenea*, elytris punctatis: margine *marginata*.
 luteo. Ent. syst. 1. 325. 91. *
 Linn. syst. Nat. 2. 591. 39. Fn. Sv. 529.
 Degeer Inf. 5. 303. 14. I. 21.
 Schaeff. Icon. tab. 21. fig. 19.
 Payk. Fn. Sv. 2. 71. 24.
 Habitat in Europae pratis apricis.
117. *C. thorace nigro-aeneo nitidissimo*, elytris ob- *Schach*.
 scurioribus laevibus: margine sanguineo.
 Habitat in Germania. D. Smidt. II. 21.

- analis.* 118. *C. atra*, elytris fuscis: margine exteriori
 fuceo. Ent. fyft. 1. 326. 93. *
 Linn. fyft. Nat. 2. 582. 42.
 II. 21: Payk. Fn. Sv. 2. 72. 25.
 Habitat ad praedium Equitis a Linné, Hammar
 prope Vpfaliam.
- aucta.* 119. *C. thorace cyaneo nitido*, elytris puncta
 cyaneis: margine rubro. Ent. fyft. 1. 32
 II 22 94. *
Chrysomela aucta. Payk. Fn. Sv. 2. 72. 26.
 Habitat Dresdae. D. Zschuck.
- mediata.* 120. *C. villosa*, ferruginea, thoracis elytrorumq
 disco fusco.
 Habitat in Iaua. D. Billardiere.
 Statura omnino *C. analis*, tota villosa. Caput et
 antennis ferrugineum. Thorax niger, margi
 omni, siue limbo ferrugineo. Elytra nigra, m
 gine tenuiori ferrugineo. Corpus et pedes f
 ruginea.
- 20punctata* 121. *C. viridi-aenea*, thoracis marginibus albis, el
 tris albis: maculis decem aeneis.
Galleruca 20punctata. Ent. fyft. 2. 21. 36. *
 II. 52. *Chrysomela 20punctata.* Panz. Fn. Germ. tab
 Bergftr. Nomencl. 1. 87. tab. 13.
 Schaeff. Icon. tab. 3. fig. 4.
 tab. 51. fig. 7.
 Habitat in Anglia et Italia.
- marginella.* 122. *C. nigro-coerulea*, thorace elytrisq
 luteis. Ent. fyft. 1. 326. 96.
 II. 22 Linn. fyft. Nat. 2. 591. 40. Fn. Sv. 531.
 Degeer Inf. 5. 304. 15.
 Payk. Fn. Sv. 2. 73. 27.
 Habitat in Europae Ranunculis.

123. *C. cyanea*, thorace margine, elytris margine *Hannou-*
vittaque ferrugineis. Ent. syst. 1. 326. 97. *rana.*
Payk. Fn. Sv. 2. 73. 27. β.
Habitat in Enropae Sifymbrio. *II. 13.*
124. *C. atra*, thorace elytrisque laeuiffimis: margi- *arcuata,*
ne rufo. Ent. syst. 1. 327. 98. * *arcata*
Habitat Pariliis. Mus. D. Bosc.
125. *C. nigra*, thorace rufo, coleoptris testaceis: *5punctata.*
punctis quinque nigris. Ent. syst. 1. 327. 99. *
Habitat Hamburgi. Dr. Schälz.
126. *C. atra*, elytris basi rufis. *dimidiata.*
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Seheftedt.
Statura et magnitudo praecedentium. Caput et
thorax atra, nitida, immaculata. Elytra pun-
ctata, atra, basi rufa. Corpus cum pedibus
atrum.
127. *C. rufa*, coleoptris maculis quinque nigris. Ent. *scutellata.*
syst. 1. 327. 101. *
Chrysomela scutellata. Herbst. Arch. 88. 32.
tab. 23. fig. 24. *III. 53*
Coccinella scutellata. Illig. Col. Bor. 1. 421. 12.
Strongylus 5punctatus. Herbst. Col. 4. tab. 43.
fig. 2.
Panz. Fn. Germ. 26. tab. 12. *f. Coccinella*
Habitat in Germania. D. Schneider.
128. *C. rufa*, pectore abdominisque basi nigris. Ent. *pectoralis.*
syst. 1. 328. 102. * *VII. 26.*
Coccinella pectoralis. Illig. Col. Bor. 1. 420. 11.
Dermestes rufus. Herbst. Arch. 4. tab. 20. f. 7.
Habitat Kiliae. *f. Coccinella*
129. *C. flaua*, coleoptris punctis vndecim lineisque *lineola.*
duabus nigris. Ent. syst. 1. 328. 105. *
Linn. syst. Nat. 2. 593. 47.
Habitat in America. *130.*

- saeta.* 130. *C. supra rufa*, thoracis linea punctisque du-
bus elytrorumque futura nigris. Ent. syst.
328. 106.
Linn. syst. Nat. 2. 593. 49. Mus. Lud. Vlr. 4.
Habitat in Palaestina.
- haemorrhoidalis.* 131. *C. nigra*, nitida, antennis basi flavescentibu-
ano supra rubro. Ent. syst. 1. 329. 107.
Linn. syst. Nat. 2. 587. 6. Fn. Sv. 508.
VII. 26. *Chrysomela viminalis*. Payk. Fn. Sv. 2. 69. 21
var. ϵ . *nupit-viminalis*
Habitat in Betula Alno.
- fucata.* 132. *C. atra*, thorace elytrisque viridi-aeneis. Ent.
syst. 1. 329. 108. *
Habitat in Italia. Dr. Allioni.
- aenea.* 133. *C. viridi-aenea*, ano ferrugineo, antennis ti-
bisque nigris. Ent. syst. 1. 329. 109.
Linn. syst. Nat. 2. 587. 8. Fn. Sv. 510.
~~Geoff. Inf. 1. 261. 12.~~
III. 33. Payk. Fn. Sv. 2. 59. 1.
Degeer Inf. 5. 305. 18.
Habitat in Betula Alno.
- Bulgharen-
sis.* 134. *C. cyanea*, nitida, elytris vage punctatis, an-
tennis fuscis. Ent. syst. suppl. 88. 109. *
~~*Chrysomela Bulgharenfis* Schrank. Enum.~~
Habitat in Germania. D. Daldorff.
~~*nupit-viminalis C. aeneae*~~
- Philadel-
phica.* 135. *C. viridis*, elytris flavis, viridi-maculatis, an-
tennis pedibusque ferrugineis. Ent. syst. 1.
329. III.
Linn. syst. Nat. 2. 592. 44.
Degeer. Inf. 5. 353. 6. tab. 16. fig. 13.
Petiv. Gazoph. tab. 26. fig. 11.
Habitat in Pennsylvania.

36. *C. coerulefscens, nitida, fubtus nigra.* Ent. fyft. *Armoraciae.*
 I. 330. 112.
 Payk. Fn. Sv. 2. 60. 13.
 Degeer Inf. 5. 318. 24. tab. 9. fig. 24. *IV. 46.*
 Habitat in Europae Armoracia.

37. *C. coerulefscens, fubtus nigra, elytris friatis.* *Cochleariae*
 Ent. fyft. I. 330. 113. *

~~*Chryfomela Armoraciae* Linn fyft. Nat. 2. 588.~~

IV. 46

~~16. Fn. Sv. 815.~~

Chryfomela Cochleariae. Payk. Fn. Sv. 2. 75. 29.

Chryfomela Plantaginis. Degeer. Inf. 5. 322. 25.

Habitat in Germaniae plantis tetradynamis.

38. *C. nigra, elytris pedibusque pallefcentibus.* *pallipes.*

Ent. fyft. I. 330. 114. *

Habitat Kiliae. D. Daldorff.

39. *C. coerulea, tibiis plantisque flauis.* Ent. fyft. *Sophiae.*

I. 330. 115.

Chryfomela Sophiae. Schall. Act. Hall. 1. 272.

Habitat in Sifymbrio Sophiae Saxoniae.

III. 33.

*** *faltatoriae.*

40. *C. faltatoria, ferruginea, coleoptrorum difco difcoidea.*
 atro.

Gulleruca difcoidea. Ent. fyft. 2. 25. 56. *

Habitat in America boreali.

41. *C. faltatoria, fulua, elytris atris: difco albo.* *Iauanica.*

Habitat in Iaua Infula. D. Billardiere.

Magna in hac familia, fere orbiculata. Antennae

fulcae, articulo primo fuferrugineo. Caput et

thorax laeuia, glabra, fulua, immaculata. Ely-

tra laeuia, atra, macula magna difci niuea.

Corpus ferrugineum.

picta.

142. *C. saltatoria*, flava, elytris nigro-maculatis.
Gallerucapicta. Ent. syst. 2. 26. 63. *
 Habitat Tranquebariae. Mus. D. de Sehestedt.

aestuans.

143. *C. saltatoria*, viridi-aenea, elytris violaceis, pedibus flavis.
Galleruca aestuans. Ent. syst. 2. 27. 70. *
 Habitat in America meridionali. D. Smidt.

calida.

144. *C. saltatoria*, nigra, thorace viridi-aeneo, elytris violaceis.
Galleruca calida. Ent. syst. 2. 28. 72. *
 Habitat in Americae meridionalis Infulis. Dom. Smidt.

Indica.

145. *C. saltatoria*, cyanea, capite, thorace pedibusque rufis.
Galleruca Indica. Ent. syst. suppl. 98. 72. *
 Habitat in India orientali. Mus. D. de Sehestedt.

varicornis.

146. *C. saltatoria*, ferruginea, antennis albis, antecapite nigro.
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.
 Statura magna praecedentium. Antennae albae articulis tribus penultimis nigris. Caput et thorax pallide ferruginea, laevia. Elytra obscuriora. Femora postica valde incrassata.

fulvicollis.

147. *C. saltatoria*, thorace rufescente, elytris pallidis: futura maculisque duabus nigris.
Galleruca fulvicollis. Ent. syst. 2. 29. 77. *
 Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

Napi.

148. *C. saltatoria*, coeruleo-nigra, antennarum basi pedibusque testaceis: femoribus posticis nigris.
Galleruca Napi. Ent. syst. 2. 29. 78. *
Galleruca Hyoseyami. Payk. Fn. Sv. 2. 105. 25. f.
 Habitat in Germania. D. Prof. Helwig.

II. 25

149. *C. faltatoria*, viridis, nitida, pedibus testaceis: *Hyoscyami*
femoribus posticis violaceis.

Galleruca Hyoscyami. Ent. syst. 2. 29. 79.

Chrysomela Hyoscyami. Linn. syst. Nat. 2. 594.

5. Fn. Sv. 536.

Payk. Fn. Sv. 2. 104. 25.

Degeer Inf. 5. 345. 51.

II. 24.

~~Geoff. Inf. 1. 248. 11.~~

Habitat in Europae Hyoscyamo.

150. *C. faltatoria*, viridi-aenea, pedibus nigris.

nigripes.

Galleruca nigripes. Ent. syst. 1. 29. 80. *

Geoff. Inf. 1. 246. 5.

II. 25.

Habitat in Anglia. Mus. Dr. Hunter.

151. *C. faltatoria*, viridis, nitens, capite thoraceque
aureis, pedibus ferrugineis. *nitidula*.

Galleruca nitidula. Ent. syst. 1. 30. 81.

Linn. syst. Nat. 2. 594. 60. Fn. Sv. 542.

Geoff. Inf. 1. 249. 13.

Degeer Inf. 5. 346. 54.

Habitat in Europae falice.

152. *C. faltatoria*, viridi-aenea, antennis fuscis, pe-
dibus testaceis. *Helxines*.

Galleruca Helxines. Ent. syst. 1. 30. 82.

Linn. syst. Nat. 2. 594. 58. Fn. Sv. 543.

Geoff. Inf. 1. 249. 14.

II. 25

Degeer Inf. 5. 345. 52.

Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 12.

Habitat Polygono Fagopyro.

153. *C. faltatoria*, aurea, antennis pedibusque flavis. *fulvicornis*.

Galleruca fulvicornis. Ent. syst. 1. 30. 83. *

Habitat in Suecia. Mus. D. de Sehestedt.

154. *C. faltatoria*, supra atra: fasciis tribus fuscis. *3fasciata*.

Galleruca 3fasciata. Ent. syst. 2. 30. 84. *

Linn.

Linn. fyft. Nat. 2. 594. 61.

Habitat in Europae plantis.

Modeeri. 155. *C. saltatoria*, viridi-aenea, elytris, macula
stica pedibusque anticis flavis.

L. 25. *Galleruca Modeeri.* Ent. fyft. 2. 30. 85.

Linn. fyft. Nat. 2. 594. 57.

Habitat in Europae plantis.

femiaenea. 156. *C. saltatoria*, thorace aeneo, elytris punctat
nigris, apice rufis.

Galleruca femiaenea. Ent. fyft. 2. 30. 86.

Payk. Fn. Sv. 2. 109. 32.

Chrysomela rustica. Linn. fyft. Nat. 2. 595. 6.

Habitat in Germania. D. Smidt.

erythrocephala. 157. *C. saltatoria*, atro-coerulea, capite geniculisque
pedum rufis.

Galleruca erythrocephala. Ent. fyft. 2. 31. 8.

Fn. Sv. 538.

~~Geoff. Inf. 1. 246. 4.~~

Habitat in Europae plantis.

relicta. 158. *C. saltatoria*, atra, capite thoraceque rufis, the
race puncto medio nigro.

Galleruca dipidiata. Ent. fyft. suppl. 99. 94.

Habitat Cayennae. D. Richard.

testacea. 159. *C. saltatoria*, testacea, gibba, elytris laenissimis

Galleruca testacea. Ent. fyft. 2. 33. 99. *

L. 27. Geoff. Inf. 1. 250. 17.

Habitat in Anglia. Mus. D. Banks.

globosa. 160. *C. saltatoria*, subrotunda, pallida, antennis
ce nigris.

Habitat in America meridionali. Mus. D. de Sehestedt.

Praecedente triplo maior. Antennae nigrae, b
pallidae. Corpus totum laeue, pallidum, ni
dum.

81. CRIC

1. CRIOCERIS. *Palpi* quatuor filiformes.

Maxilla bifida.

Labium corneum, integrum.

Antennae filiformes.

C. fulva, elytris pallidis: margine omni fuluo. *atuberculata*.
Ent. syst. I. 2. I. I.

Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. D. Banks.

Scutellum fuscum. Pedes fulvi: plantis fuscis.

Variat sexu, tuberculis coleoptrorum duobus ver-
sus apicem approximatis, eleuatis, fuluis.

C. flava, elytris nigris, apice rufescentibus. Ent. *adentata*.
syst. I. 2. I. 2.

Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. D. Banks.

Tuberculum paruum, eleuatum ad futuram. Tar-
si omnes nigri.

C. ferruginea, pectore, elytrorum fasciis duabus *bispinosa*.
pedibusque nigris. Ent. syst. suppl. 89. I. *

Habitat in Africa. Mus. D. Bosc.

Corpus magnum, crassum, ferrugineum, pectore
nigro.

Variat sexu, tuberculis coleoptrorum duobus ba-
seos eleuatis, approximatis, compressis.

C. testacea, mandibulis oculisque nigris. *fulva*.

Habitat in noua Cambria. D. Billardiere.

Magna

Crioceridis corpus oblongum, glabrum, immarginatum, tar-
dam, saepius laeuusculum, nitidum; *capite* rotundato,
inserto; *oculis* rotundatis, prominulis, marginalibus; *an-*
tennis approximatis, frontalibus, inter oculos insertis;
thorace breui, transuerso, vix marginato, planiusculo;
scutello paruo, rotundato; *elytris* molliusculis, fornicatis,
longitudine abdominis; *pedibus* mediocribus, validis, cur-
sosis; *tarsis* quadriarticulatis; *colore* vario.

Ff

Magna, tota testacea mandibulis oculisque fuscis
nigris. Elytra laeuis, nitida.

bicolor.

5. *C. viridis*, nitida, capite, thorace pedibusque
ruginis.

Habitat in Iaua. Mus. D. Billardiere.

Statura praecedentis. Antennae ferrugineae. Caput
ferrugineum, basi viridi-aeneum. Thorax
laeuis, obscure ferrugineus, immaculatus. Elytra
laeuis, viridia, nitida. Corpus viride, nitidum,
pedibus obscure ferrugineis.

cyaneipes.

6. *C. rufa*, elytris fasciis duabus, antennis pedibusque
cyaneis.

Habitat in noua Cambria. D. Billardiere.

Magna. Antennae totae cyaneae. Caput et thorax
laeuis, rufa, immaculata. Elytra laeuis, rufa,
fasciis duabus latis, cyaneis, quarum anterior
ad basin futurae, posterior ad apicem tenditur.
Corpus rufum.

melanocephala.

7. *C. rufa*, capite nigro, elytris violaceis. Ent. f.
I. 2. I. 3.

Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

Scutellum rufum. Pedes nigri, femoribus rufis.

detrita.

8. *C. obscure testacea*, elytris vittis albidis obsoletis.
Habitat in Americae Infulis. D. Smidt. Mus. Lund.

Corpus magnum testaceum. Caput et thorax
obscure testacea, laeuis, immaculata. Elytra
laeuis, testacea, vittis tribus, nunc magis, nunc
minus obsoletis, albidis, quarum exteriores
coeunt, intermedia abbreviata.

obsoleta.

9. *C. testacea*, elytris punctis tribus baseos fuscis.
Habitat in America meridionali. Mus. D. de Hestedt.

Magna. Antennae nigrae, articulo primo incuruo.

basī ferrugineo. Caput et thorax testacea. Elytra testacea: punctis tribus fuscis, obscuris 2. 1. Corpus et pedes testacea.

10. *C. ferruginea*, elytris obscuris violaceo-nitidulis. *cyanipennis*
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Statura et magnitudo fere praecedentis. Antennae nigrae, basī ferrugineae. Caput et thorax ferruginea, immaculata, nitida. Elytra subtilissime punctata, obscure violacea, nitidula. Corpus ferrugineum.

11. *C. atra*, thorace ferrugineo, elytris margine vitatae suturali flavis. *invalida*. Ent. syst. 1. 2. 12: 49.

Habitat in Americae Insulis.

Antennae pedesque ferruginei. Elytra striata.

12. *C. ferruginea*, elytris atris: margine punctisque tribus ferrugineis, antennis ante apicem albis. *3punctata*.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Antennae nigrae, ante apicem albae. Caput atrum. Thorax ferrugineus, nitidus, immaculatus. Elytra laevia, nitida, margine punctisque tribus ferrugineis. Corpus ferrugineum, pectore nigro.

13. *C. flavescens*, elytris atris, puncto margine apiceque pallidis. *modesta*.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.

Statura praecedentis. Caput nigrum; antennis obscuris. Thorax laevis, testaceus, nitidus, immaculatus. Elytra laevia, atra, puncto ad suturam, margine apiceque late pallidis. Corpus pallidum, pectore atro.

14. *C. oliuacea*, elytris punctis quinque nigris. *oliuacea*.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mul
D. Lund.

Caput oliuaceum, antennis nigris. Thorax oliuaceus, immaculatus. Elytra laeuia, oliuaceis punctis duobus baseos, tertio in medio transuerso, fere fasciam constituyente, duobusque perfectis: anteriore maiore. Corpus oliuaceum.

3fasciata. 15. *C. atra*, elytris fasciis tribus fuluis, antennis ante apicem albis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mul
D. de Sehestedt.

Statura et magnitudo praecedentium. Antenna nigrae, basi et ante apicem albae. Caput et thorax nigra, immaculata. Elytra laeuia, atrae basi fascia vel potius macula magna, lunata, in medio fascia marginem haud attingente et apice magna fuluis. Corpus atrum, pedibus albis

capitata. 16. *C. flauescens*, elytris ferrugineis: margine punctisque duobus albis.

Galleruca melanocephala. Ent. syst. suppl. 95
53. *

Habitat in Cayenna. D. Richard.

Caput nigrum. Thorax pallidus, nitidus, immaculatus. Elytra laeuia, ferruginea, marginem apice dilatato punctisque duobus dorso albis.

5maculata. 17. *C. pallida*, capite coleoptrorumque maculis quinque atris.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mul
D. Lund.

Caput atrum. Antennae fuscae, ante apicem albae. Thorax pallidus, nitidus, immaculatus. Elytra laeuia, pallida, nitida: maculis duabus baseos, altera communi, aliaque versus apicem atris. Corpus pallidum, pectore atro.

18. (

8. C. thorace testaceo, elytris pallidis: vitta abbreviata punctoque fuscis. *abrupta*.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.

Media. Caput atrum, antennis apice albidis. Thorax nunc testaceus, nunc rufus, nitidus. Elytra laevia, pallida, vitta lata apicem haud attingente, ante marginem punctoque interiori nigris. Corpus pallidum, pectore atro.

9. C. flavescens, capitis basi elytrisque aeneis, antennis nigris. *nigricornis*.

Galleruca nigricornis. Ent. syst. 1. 2. 24. 53.

Chrysomela Halensis. Linn. syst. Nat. 2. 589. 20.

Herbst. Arch. tab. 45. fig. 5.

VIII. 21.

Habitat in Germania.

Thorax puncto vtrinque impresso. Abdomen flavescens.

10. C. pallida, elytris viridibus, capite pectoreque *aeruginea*.
nigris.

Cistela aeruginea. Ent. syst. 1. 2. 46. 27.

Habitat in Aeschynomenes floribus Africae, quos destruit.

Antennae albae, annulo medio apiceque nigris.

Caput nigrum, labio albido. Thorax pallidus, nitidus, immaculatus. Pectus nigrum. Abdomen pallidum. Pedes virescentes.

11. C. viridis, elytris maculis tribus fuscis. *viridula*.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.

Statura omnino praecedentis. Caput viride, antennis nigris. Elytra substriata, viridia, maculis tribus fuscis.

12. C. thorace ferrugineo nitido, elytris testaceis: *ruficollis*.
maculis tribus nigris.

Ha-

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mu
D. Lund.

Caput atrum, nitidum. Antennae pallidae: art
culis apice nigris. Thorax laevis, rufus, nit
dus. Elytra laevia, maculis tribus magnis, n
gris. Sutura ad basin nigra. Corpus flavescen
pectore nigro.

elata.

23. *C. pallida*, capite elytrorumque maculis duab
atris.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mu
D. de Sehestedt.

Caput atrum, antennis testaceis. Thorax laeni
glaber, pallidus, nitidus, immaculatus. Elyt
laevia, pallida, nitida, basi maculaque mag
versus apicem atris. Corpus pallidum, pector
atro.

laeta.

24. *C. capite thoraceque ferrugineis*, elytris atr
puncto, friga media margineque albis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mu
D. Lund.

Antennae pallidae, apice nigrae. Caput et thora
ferruginea, immaculata. Elytra laevia, atr
macula baseos oblonga, friga media margin
que albis: futura pone frigam alba. Corpu
atrum, pedibus albis.

marginalis.

25. *C. capite thoraceque rufis*, elytris pallidis: vi
ta marginali punctisque duobus nigris.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mu
D. Lund.

Caput ferrugineum, antennis nigris, apice ferrug
neis. Thorax glaber, ferrugineus. Elytra c
nato-friata, pallida, vitta ante marginem. a
cem haud attingente, punctisque duobus:
tero baseos, altero versus apicem, nigris. Co
pus pallidum.

26.

6. *C. thorace ferrugineo, elytris atris: margine avittata.*
vittaque futurali albis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Seheftedt.

Antennae nigrae, basi ferrugineae, ante apicem
albae. Caput nigrum, labio obscure ferrugineo.
Thorax glaber, ferrugineus, nitidus. Elytra
laevia, atra, nitida, vitta versus futuram mar-
gineque exteriori postice coeuntibus albis.
Corpus nigrum, pedibus albis.

17. *C. thorace rufo, elytris flavis: vitta nigra. Ent. vittata.*
fyft. 1. 2. 12. 48.

Petiv. Gazoph. tab. 17. fig. 11.

Habitat in Carolinae Cucumere Melone.

Caput nigrum, antennis basi pallidis. Abdomen
nigrum. Pedes flavescentes, geniculis nigris.

18. *C. glabra, atra, elytris punctatis, pedibus rufis. glabrata.*
Ent. fyft. suppl. 89. 10. *

Crioceris glabrata. Panz. Fn. Germ. 34. tab. 6.

Habitat in Germania. D. Panzer.

Antennae subferrugineae. Thorax rotundatus,
margine medio prominulo subspinoso. Elytra
punctata. Pedes rufi. *quidam C. Corasi*

19. *C. rufa, elytris cyaneis, antennis nigris, basi rufis, impressa.*
apice albis.

Habitat in Sumatra. D. Daldorff. Mus. D. de Se-
heftedt.

Statura et magnitudo *C. glabratae*. Caput rufum.

Antennae nigrae: articulo primo maiori, in-
curuo, rufo: vltimis quatuor laete albis. Tho-
rax laevis, rufus, immaculatus, punctis duobus
dorsalibus impressis. Elytra striata, cyanea,
nitida. Corpus ferrugineum.

Cerasi.

30. *C. capite thoraceque fulvis, elytris pedibusque testaceis.* Ent. syst. 1. 2. 5. 12.

Galleruca Cerasi. Ent. syst. 1. 2. 22. 43.

Chrysomela Cerasi. Linn. syst. Nat. 2. 600
101.

Geoff. Inf 1. 242. 6.

vii. 27. Habitat in Gallia. Mus. D. Bosc.

Antennae fuscae, articulo primo rufo. Caput fulvum margine postico nigricante. Corpus obscurum lanugine cinerascens. Pedes testacei.

ocrea.

31. *C. testacea, pectore tibiisque nigris.* Ent. syst. 1. 2. 4. 10.

Habitat in Insula Guadeloupe.

Antennae testaceae, articulo ultimo nigro. Caput thorax elytraque laevia, testacea. Scutellum nigrum. Pedes testacei, tibiis nigris.

ferruginea.

32. *C. brunnea, immaculata, thorace laevi, elytris punctato-friatis.*

Habitat in nova Cambria. Mus. D. Billardiere.

Corpus totum cum antennis pedibusque brunneum, immaculatum, obscure nitidum. Thorax omnino laevis. Elytra punctato-friata.

pallida.

33. *C. pallida, antennis pectoreque nigris.*

Habitat in India orientali. Dom. Daldorff.

Parva. Antennae nigrae, basi pallidae. Caput, thorax, elytra laevia, glabra, pallida, immaculata. Corpus pallidum, pectore nigro. Pedes pallidi.

fusca.

34. *C. capite thoraceque rufis, elytris atris: macula magna alba.*

Habitat in Sumatra. D. Daldorff. Mus. D. de Sehestedt.

Paullo maior *C. bioculata.* Antennae nigrae, articulo primo incurvo, rufo. Caput et thorax laevia,

- laenia, rufa, immaculata. Elytra laenia, atra, macula magna disci alba. Corpus et pedes fusca, femoribus subrufescentibus.
15. *C. nigra*, thorace elytrorumque lunula, margine *variegata*. fasciisque duabus pallidis. Ent. syst. 1. 2. 4. 7. Habitat in Cayenna. Mus. D. Bosc. Antennae pallidae, medio nigrae, in altero sexu articulo secundo tertioque elongatis, tertio apice spinoso. Corpus nigrum, abdomine pedibusque pallidis.
16. *C. nigra*, vertice thoraceque fulvis, elytris fasciis duabus albis. *thoracica*. Habitat in St. Domingo. Mus. D. Bosc. Media. Antennae desunt. Caput nigrum, postice fulvum. Thorax laevis, rotundatus, fulvus, immaculatus. Elytra laenia, nigra: fasciis duabus sinuatis, albis, altera in medio, altera ante apicem abbreviata.
17. *C. nigra*, thorace, elytrorum margine, punctis duobus fasciaque ferrugineis. *denticornis*. *Galleruca denticornis*. Ent. syst. 1. 2. 24. 52. Habitat in Dolicho Sinenfi Americae. Dr. Pflug. Antennae rufae, articulo tertio maiori, late emarginato. Pedes rufi, femoribus posticis apice nigris.
18. *C. capite thoraceque fulvis, elytris nigris: fasciis duabus albis.* *albicornis*. *Galleruca albicornis*. Ent. syst. suppl. 96. 53. * Habitat in St. Domingo. D. Brongniard. Antennae albae, articulis duobus baseos nigris. Fasciae elytrorum vndatae, altera in medio, altera versus apicem.
19. *C. thorace flavescente, elytris viridibus: punctis sex nigris.* *punctata*

Gal-

Galleruca 12punctata. Ent. syst. 1. 2. 15. 12.
Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Caput nigrum, antennarum articulo secundo tertioque virescentibus.

fusca.

40. *C. cyanea*, elytris flavis: maculis duabus cyaneis. Ent. syst. 2. 2. 9. 33.

Habitat in Insula St. Bartholomaei Americae. D. de Paykull.

Pedes obscuri, femoribus cyanei.

austrica.

41. *C. viridi-aenea*, nitida, elytris testaceis: maculis duabus cyaneis. Ent. syst. 1. 2. 9. 34.

Melyris aulicus. Oliv. Inf. 2. 21. 7. 6. tab. 1. fig. 4.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

Antennae fuscae. Os testaceum. Macula elytrorum postica maior. Pedes testacei, femoribus aeneis.

cuprea.

42. *C. pallida*, elytris basi fasciaque postica cupreis. Habitat in noua Cambria. D. Billardiere.

Parua. Caput et thorax pallida, immaculata. Elytra laeuis, pallida, basi fasciaque postica cupreis, quae tamen marginem anteriorem non attingit. Pedes pallidi.

oculata.

43. *C. flava*, elytris basi nigris: puncto flavo. Ent. syst. 1. 2. 9. 30.

Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

Antennae flavae longitudine corporis. Elytra vix striata, flava, basi nigra: puncto magno flavo. Pectus nigrum. Abdomen flavum. Pedes flavi, femoribus nigris.

bioculata.

44. *C. testacea*, thorace immaculato, elytris maculis duabus ocellaribus albis. Ent. syst. 1. 2. 9. 31.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

Anter-

Antennae nigrae, basi ferrugineae. Macula anterior elytrorum puncto antico nigra, posterior pone medium annulo nigro cincta. Tibiae fuscæ.

45. *C. flauescens*, thorace rufo, elytris albis: maculis quinque nigris. Ent. syst. 1. 2. 8. 24. *ebryaca.*

Habitat in Cayenna. Dr. Schulz.

Caput testaceum, ore oculisque nigris. Antennae subferrugineae. Elytra alba: maculis tribus basæos, exteriori elongata, lineari, et duabus versus apicem nigris.

46. *C. thorace flauo*, elytris flauis: vitta ante marginem maculisque tribus suturalibus nigris. *caminea.*

Habitat in Carolinae plantis oleraceis. D. Bosc.

Antennae nigrae, basi flauae. Caput nigrum, ore laete flauo. Thorax laevis, flauus, immaculatus. Scutellum nigrum. Elytra laeuis, flaua, vitta ante marginem, quae tamen apicem haud attingit, maculisque tribus ad futuram nigris. Corpus nigrum, femoribus flauis.

Variat colore flauo rufoque.

37. *C. pallida*, antennis nigris. Ent. syst. 1. 2. 9. 32. *pallens.*

Habitat - - Mus. D. Banks.

Caput magis obscurum, antennis elongatis, nigris. Pedes pallidi.

48. *C. ferruginea*, elytris flauescens: fasciis duabus atris. *afasciata.*

Habitat - - Mus. D. de Sehestedt

Statura et magnitudo omnino *C. bioculatae*. Antennae flauae. Caput et thorax laeuis, rufa, nitida, immaculata. Elytra flauescens: fasciis duabus atris; altera basæos, altera ante apicem. Corpus cum pedibus rufum.

- equestris.* 49. *C. capite thoraceque testaceis, elytris brunneis; margine, lineola baseos fasciæque media flavis.*
Ent. syst. I. 2. II. 47.
Habitat in Cayenna. D. v. Rohr.
Antennæ flavescentes. Corpus nigrum, pedibus flavescentibus.
- anotata.* 50. *C. pallida, elytris maculis duabus fuscis.*
Galleruca bifasciata Ent. syst. I. 2. 27. 67. *haud saltatoria.*
Habitat in Sumatra. D. Daldorff. Mus. D. Lund.
Statura parua *C. bioculatae*. Caput et thorax laeua, glabra, pallida, immaculata. Elytra laeua, pallida, maculis duabus fuscis: altera baseos, altera transuersa ante apicem. Corpus pallidum.
- triangulum* 51. *C. ferruginea, elytris margine maculaque communi baseos nigris.*
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.
Caput et thorax ferruginea, laeua, nitida. Elytra laeua, ferruginea, margine maculaque baseos communi nigris.
- humeralis.* 52. *C. thorace flavo, elytris atris: puncto baseos flavo.*
Habitat in noua Cambria. D. Billardiere.
Paullo maior *C. flauipede*. Caput cum antennis flavum. Thorax flavus, immaculatus. Elytra laeua, atra, nitida, puncto baseos laete flavo. Abdomen nigrum. Pedes flauis.
- apunctata.* 53. *C. thorace fuluo, elytris atris: punctis duobus flavis.*
Habitat in noua Cambria. Mus. D. Billardiere.
Statura et summa affinitas praecedentis. Elytra laeua, nitida: punctis duobus fuluis.

14. *C. atra*, nitida, antennarum basi pedibusque flavis. Ent. syst. I. 2. 10. 39. *rufipes.*
 Panz. Init. Fn. Germ. III. 39.
 Habitat in Germaniae plantis.
 Antennae nigrae, basi flavescentes. Corpus totum atrum, pedibus solis flavis. *eadem. ac flavipes.*
 Mera varietas *C. flauipedis* obseruante Helwigio.
15. *C. nigra*, thorace pedibusque flavis. Ent. syst. *flavipes.*
 I. 2. 10. 37.
Chrysomela flauipes. Linn. syst. Nat. 2. 601. 106. III. 39.
 Habitat in Germaniae plantis.
16. *C. capite* thoraceque rufis, elytris testaceis: macula apicis fusca. *adusta.*
Crioceris adusta. Creutz. Inf. 121. 12. tab. 2. fig. 24. *meryd. notata Ent. syst. 2. 553. 16* VIII. 21.
 Habitat in Austriae floribus. D. de Meyerle.
 Statura et magnitudo *C. 4punctatae*. Antennae fuscae, basi rufae. Caput et thorax laeuis, rufa, nitida. Elytra laeuia, testacea, macula magna, ouata, ante apicem fusca. Corpus nigrum.
17. *C. nigra*, capite, thorace pedibusque rufis, thorace spinoso. Ent. syst. I. 2. 10. 38. *subspinosa.* VII. 27
 Habitat in Europae Betula. Mus. D. Banks.
 Antennae nigrae, basi rufae. Thorax subpunctatus.
18. *C. cyanea*, thorace rufo, antennis pedibusque fuscis. Ent. syst. I. 2. 10. 40. *cyanocephala.*
 Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.
 Thorax planus, glaber.
19. *C. pallida*, capite elytrorumque lineola baseos atris. *liciens.*
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund. Caput

- Caput nigrum, antennis obscure pallidis. Thorax laevis, pallidus, nitidus. Elytra laevis, pallida, lineola parva basios atra. Corpus pallidum pectore nigricante.
- cantharoides.* 60. *C. violacea*, capite, thorace pedibusque rufis. Ent. syst. 1. 2. 1. 4.
Habitat in Anglia. Mus. Britann.
Antennae fuscae, basi rufescentes.
- Betulae.* 61. *C. nigra*, elytrorum margine, antennis pedibusque flavis. Ent. syst. 1. 2. 5. 11.
Habitat in Lapponiae Betula. D. de Paykull.
De genere haesito. Caput, thorax rotundatus elytraque nigra. Antennae, margo elytrorum pedes flavae.
Femina vitta suturali elytrorum ferruginea.
- lineola.* 62. *C. nigra*, thorace sanguineo: lineola dorsali nigra, elytris pallidis. Ent. syst. suppl.
Crioceris lineola. Panz. Fn. Germ. 34. tab. 5.
Habitat in Germania. Dr. Panzer.
- III. 35.* *variet. C. Cerasi* Statura *C. Betulae*, at minor. Antennae ferruginae apice obscuriores. Caput nigrum. Thorax pallido-ferrugineus, lineola lata dorsa nigra, quae tamen nec basin nec apicem attingit. Elytra laevis, pallida. Abdomen et pedes ferruginea.
- pygmaea.* 63. *C. rufa*, capite abdomineque atris. Ent. syst. 2. 4. 8.
Habitat in Cayenna. D. v. Rohr.
Minuta, tota rufa, capite abdomineque atris.
- minuta.* 64. *C. nigra*, thorace elytrisque pallidis, immaculatis. Ent. syst. 1. 2. 5. 13.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.
Caput nigrum, puncto basios pallido. Elytra laevis.

** *saltatoriae*.

5. *C. saltatoria*, pallida, coleoptris, macula dorsali *ephippium*.
baseos nigra.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.

Statura omnino *C. Sisybrii*, at paullo maior.

Caput pallidum antennis nigris. Thorax laeuis, pallidus, immaculatus. Elytra laeuis, pallida, macula magna, communi baseos atra. Corpus pallidum, pedibus atris.

16. *C. saltatoria*, laeuis, ferruginea, antennis nigris: *emarginata*
articulo quarto et septimo emarginatis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Magna in hac familia. Antennae singulares, nigrae: articulo primo ferrugineo, quarto et septimo intus late emarginatis, emarginatura acuta, Corpus totum laeue, glabrum, ferrugineum, immaculatum. Femora postica incrassata.

67. *C. saltatoria*, nigra, elytris viridi-aeneis, thorace *collata*.
race, abdominis margine femoribusque albidis.

Habitat in Carolina. D. Bqsc.

Antennae nigrae. Caput atrum, ore pallido. Thorax laeuis, nitidus. Elytra laeuis. Corpus nigrum, abdominis margine femoribusque albidis.

68. *C. saltatoria*, coerulea, capite, thorace pedibus, *fulvipes*.
et antennarum basi rufis.

Galleruca rufipes. Ent. syst. 1. 2. 32. 94.

~~*Chrysomela rufipes*. Linn. syst. Nat. 2. 595. 65.~~

~~Fn. Sv. 343.~~

Altica nigra. Geoff. Inf. 1. 245. 2.

II. 26

Degeer Inf. 5. 343. 47. tab. 10. fig. 11.

~~Schaeff. Icon. tab. 166. fig. 3.~~

Habitat in Europae Malva parviflora.

69. C.

- fuscipes.* 69. *C. saltatoria*, violacea, capite thoraceque rufis, pedibus nigris. Ent. syst. 1. 2. 32. 95.
Payk. Fn. Sv. 2. 107. 28.
II. 27. Habitat in Europae Maluis.
Affinis praecedenti, et forte mera eius varietas.
Differt tantum pedibus nigris.
- ruficornis.* 70. *C. saltatoria*, coerulea, capite, thorace, antennis pedibusque rufis. Ent. syst. 1. 2. 32. 96.
Linn. syst. Nat. 2. 32. 96.
II. 27. Payk. Fn. Sv. 2. 108. 29.
Degeer Inf. 5. 343. 48.
Habitat in Germania. D. Smidt.
Distincta a *C. rufipede*. Antennae totae rufae.
Elytra crenato-striata.
- anglica.* 71. *C. saltatoria*, atra, elytris tibiisque pallidis.
Galleruca anglica. Ent. syst. 1. 2. 32. 92.
Habitat in Anglia. Mus. Dr. Hunter.
Affinis *C. atricillae*, at thorax ater et tibiae pallidae.
- apustulata.* 72. *C. saltatoria*, nigra, coleoptris lineolis quatuor flavescentibus.
Galleruca apustulata. Ent. syst. 1. 2. 32. 93.
Altica. Geoff. Inf 1. 250. 15.
VIII. 22. Payk. Fn. Sv. 2. 99. 17.
Habitat in Angliae et Galliae hortis.
Lineola elytrorum altera ad basin, altera ad apicem.
- apustulata.* 73. *C. saltatoria*, nigra, elytris maculis duabus ferrugineis.
Habitat in Carolinae plantis. Mus. D. Bosc.
Parua, tota atra, elytris tantum maculis duabus, magnis, lunatis, ferrugineis, altera ad basin, altera versus apicem.
- S. littera.* 74. *C. saltatoria*, pallida, elytris nigris: linea longitudinali flexuosa alba.

Galleruca S. littera. Ent. syst. 1. 2. 35. 109.

Chrysomela S. littera. Linn. syst. Nat. 2. 995. 70.

Degeer Inf. 5. 357. 13. tab. 16. fig. 21.

Habitat Surinami.

*Variat minor, tota pallida, elytris tamen semper
linea flexuosa albidiore.*

15. *C. saltatoria, nigra, thorace elytrisque cinereis. atricilla.*

Galleruca atricilla. Ent. syst. 1. 2. 31. 89.

Chrysomela atricilla. Linn. syst. Nat. 2. 594.

55. Fn. Sv. 537.

Payk. Fn. Sv. 2. 102. 23. β.

Degeer Inf. 5. 348. 57.

Altaica. Geoff. Inf. 1. 251. 19.

Habitat in Europae plantis.

Mus. Huj

16. *C. saltatoria, atra, thorace fulvo, elytris pallidis: margine omni atro. Sifymbrii.*

Galleruca Sifymbrii. Ent. syst. 1. 2. 31. 88.

Habitat in Kiliae Sifymbrio.

Duplo maior *C. atricilla*. Antennae nigrae, basi pallidae. Thorax pallide fulvus. Elytra laevia, pallidiora: futura margineque nigris, qui tamen color apicem haud attingit. Pedes antici pallidi, postici nigri.

17. *C. saltatoria, atra, elytris testaceis: margine omni nigro. Nasturtii.*

Galleruca Nasturtii. Ent. syst. 1. 2. 31. 89.

Galleruca atricilla. Payk. Fn. Sv. 2. 102. 23. γ.

Habitat in Holsatiae oleribus.

Statura et magnitudo *C. atricillae*.

18. *C. saltatoria, nigra, thorace elytrorumque margine pallida. dorsalis.*

Galleruca dorsalis. Ent. syst. 1. 2. 31. 90. 91.

Habitat in Anglia. Mus. D. Banks.

Mera forte *C. atricillae* varietas. Differt tantum
elytrorum dorso nigro.

phthistica.

79. *C. saltatoria*, laevis, pallida, immaculata.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Statura parua *C. Sisymbrii*, at tota pallida, im-
maculata, a tabida omnino distincta et dupl.
maior. Oculi prominuli, fusci. Femora postica
valde incrassata.

Varietas minor, magis testacea vix distincta.

exoleta.

80. *C. saltatoria*, ferruginea, elytris striatis.

Galleruca exoleta Ent. syst. 1. 2. 33. 100.

~~*C. xanthota exoleta* Linn. syst. Nat. 2. 394. 54~~

~~Fn. Sv. 341.~~

D. 26

Pa. k. Fn. Sv. 2. 108. 30.

Geoff. Inf. 1. 250. 16.

Habitat in *Echii* floribus.

laevigata.

81. *C. saltatoria*, pallide testacea, elytris laevissimis.
Habitat in Tanger. D. Schousboe. Mus. D. de Se-
hestedt.

Statura parua omnino exoletae. Caput, thorax
elytra laevissima, pallide testacea, immaculata.
Antennae et pedes concolores.

*Volkame-
riæ.*

82. *C. saltatoria*, rufa, elytris coeruleis.

Galleruca Volkameriæ. Ent. syst. 1. 2. 28. 71.

Habitat in *Volkameria aculeata* Americae. Dr.
Pflug.

Elytra vix striata. Antennae fuscae.

copalina.

83. *C. saltatoria*, ferruginea, elytris striatis nigris.

Habitat in Carolinae Rhoe copalino. Mus. D.
Bosc.

Corpus parvum, totum obscure ferrugineum, ely-
tris obsolete striatis.

4. *C. saltatoria*, viridi-coerulea, antennis nigris: *St. Crucis*.
articulo primo ferrugineo. Ent. syst. 1. 2. 35.

110.

Habitat in Insula St. Crucis Americae. D. Smidt.

Antennae solae nigrae, articulo primo ferrugineo.

5. *C. saltatoria*, nigra, nitida, elytris apice puncto *Holsatica*.
rubro.

Galleruca Holsatica. Ent. syst. 1. 2. 33. 101.

Chrysomela Holsatica. Linn. syst. Nat. 2. 595.

67. Fn. Sv. 544.

Payk. Fn. Sv. 2. 99. 18.

Habitat apud nos frequens, olera depascens.

6. *C. saltatoria*, pallida, oculis nigris.

tabida.

Galleruca tabida. Ent. syst. 1. 2. 33. 102.

~~*Galleruca atricilla*. Payk. Fn. Sv. 2. 102. 29.~~ II. 28

Habitat in Anglia. Muf. D. Banks.

7. *C. saltatoria*, atra, pedibus pallidis: femoribus *Euphor-*
posticis nigris. *biae*.

Galleruca Euphorbiae. Ent. syst. 1. 2. 34. 106.

Payk. Fn. Sv. 2. 101. 20.

Habitat in Germaniae Euphorbia. D. Smidt.

Atra, parum aeneo-nitida. Antennae basi palli-
dae.

8. *C. saltatoria*, atra, antennarum basi pedibusque *atra*.
piceis.

Galleruca atra. Ent. syst. 1. 2. 34. 105.

Alica nigra. Geoff. Inf. 1. 247. 8.

~~Payk. Fn. Sv. 2. 100. 19.~~

Habitat Hafniae.

9. *C. saltatoria*, atra, elytris vitta longitudinali *nemorum*.
flava.

Galleruca nemorum. Ent. syst. 1. 2. 34. 104. II. 29.

Chrysomela nemorum. Linn. syst. Nat. 2. 595.

62. Fn. Sv. 543.

Gg 2

Geoff.

Geoff. Inf. 1. 247. 9.

Payk. Fn. Sv. 2. 98. 16.

Degeer. Inf. 5. 347. 55.

Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 11.

Habitat in Pulmonaria, Dentaria, aliisque.

Brassicae. 90. *C. saltatoria*, atra, elytris pallide testaceis: margine omni fasciaque media atris.

Galleruca Brassicae. Ent. syst. 1. 2. 34. 103.

Habitat in Germaniae Oleribus.

Antennae basi pallidae. Pedes atris.

Surinamen 91. *C. saltatoria*, flavescens, elytris margine fasciaque sanguineis.

fis.

Galleruca Surinamenfis. Ent. syst. 1. 2. 34. 103.

Chrysomela Surinamenfis. Linn. syst. Nat. 2.

595. 69.

Degeer Inf. 5. 355, 10. tab. 16. fig. 17.

Habitat Surinami.

Antennae et pedes pallidi.

Rubi.

92. *C. saltatoria*, atra, antennis pedibusque rufis.

Galleruca Rubi. Payk. Fn. Sv. 2. 112. 35.

Habitat in Germaniae Rubo. Mus. D. Lund.

Corpus paruum. Caput et thorax nigra, laevia.

Elytra striata. Pedes et antennae rufae.

hortorum.

93. *C. saltatoria*, pallide testacea, antennis nigris.

Galleruca hortorum. Ent. syst. 1. 2. 35. 111.

Habitat in America meridionali. D. Smidt.

Corpus minutum, pallide testaceum, nitidum, antennis folis nigris.

parvula.

94. *C. saltatoria*, testacea, elytris fascia abbreviata fusca.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.

D. de Schestedt.

Minuta. Caput et thorax testacea, immaculata.

Elytra laevia, testacea: fascia media fusca.

Corpus subtile obscurum.

95.

95. *C. saltatoria*, atra, nitida, elytris vitta flavescente. ~~vittata~~
Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Præcedente paullo maior. Antennae obscurae.

Caput et thorax punctata, atra, nitida, immaculata. Elytra laevia, atra, nitida, vitta media flavescente, quae tamen apicem haud attingit.

Aridata

82. HELODES. *Palpi sex inaequales.*

Labium emarginatum, corneum.

Antennae extrorsum crassiores.

1. *H. nigra*, thoracis margine elytrorumque lineis *Phellandrii*
duabus flavis.

Helodes Phellandrii. Payk. Fn. Sv. 2. 84. I.

Crioceris Phellandrii. Ent. syst. 2. II. 43.

Chrysomela Phellandrii. Linn. syst. Nat. 2. 601.

III. Fn. Sv. 569.

Geoff. Inf. 1. 266. 20.

Naturforsch. 24. tab. 1. fig. 24.

Degeer. Inf. 5. 324. 25. tab. 9. fig. 34.

Habitat ad *Phellandrii* aquatici radices.

Osa maxillis palpisque. Palpi sex inaequales, anteriores breuiore, biarticulati, subfiliformes: articulo primo breuiore, secundo truncato, maxillae dorso adhaerentes, intermedii paullo longiores, filiformes, quadriarticulati: articulis subaequalibus; ultimo obtuso anteriorum
basi

Helodae corpus elongatum, glabrum, immarginatum, tardum; capite ovato, obtuso, inserto; oculis oblongis, transuersis, lateralibus; antennis thorace breuioribus, ante oculos insertis; thorace plano, aequali, capite multo latiore; scutello breui, triangulari; elytris rigidis, fornicatis, longitudine abdominis; pedibus breuibus, validis, cursoriis; tarsis quadriarticulatis; colore vario.

basi adnati, *posteriores* intermediis breviores, filiformes, triarticulati: articulis subaequalibus: sublabii medio inserti. *Mandibula* brevis, cornea, videntata, apice fissa. *Maxilla* membranacea, integra. *Labium* breue, corneum, apice rotundatum, emarginatum, vtrinq̄ denticulo minuto. Dom. Paykull.

campestris. 2. H. nigro-coeruleseens, thoracis limbo rufo, elytris punctis tribus: posticis margine flauo connexis.

Crioceris campestris. Ent. syst. 2. 11. 44. *

I. 31. *Chrysomela campestris.* Linn. syst. Nat. 2. 602. 113,

75. 11. Schaeff. Icon. tab. 52. fig. 9. 10.

Roff. Fn. Etr. 1. 107. 273.

H. bitat in Europa australiori. D. de Slangbusch.

violacea. 3. H. nigro-violacea, elytris striatis.

Crioceris violacea. Ent. syst. 2. 11. 42. *

II. 34. Geoff. Inf. 1. 254. 6.

Habitat Parisiis. Mus. D. Bosc.

elongata. 4. H. nigra, elytris vitta flaua.

Crioceris elongata. Ent. syst. 2. 11. 45. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

porrecta. 5. H. elongata, thorace rufo, elytris vitta flaua.

Habitat ad Cap. Bon. Spei.

Affinis certe H. elongatae, tota pilosa, Caput nigrum, antennis rufis. Thorax rufus. Elytra striata: vitta lata, flaua. Corpus atrum, abdomine basi rufo, Pedes rufi.

33. LEMA. *Palpi* inaequales, filiformes.*Maxilla* cornea, bifida.*Labium* membranaceum, rotundatum, bifidum.*Antennae* filiformes.

L. nigra, elytris maculis duabus testaceis.

Crioceris apustulata. Ent. syst. I. 2. 5. 15. *

Habitat in Siam. Mus. D. Banks.

Thorax cylindricus, puncto vtrinque impresso.

Elytra laevia, punctis duobus: altero baseos, altero pone medium.

Atelabus speciosus. Ent. syst. I. 2. 384. 2. huius generis vix, differt.

L. atra, elytris striatis rubris immaculatis.

Crioceris impressa. Ent. syst. I. 2. 5. 16. *

Habitat in Siam. Mus. D. Banks.

Elytra punctato-striata. Pedes nigri, femoribus subclauatis.

L. supra rubra, elytris puncto medio atro.

Habitat in Iava. Mus. D. Billardiere.

Statura et magnitudo L. merdigerae. *Antennae* nigrae. Caput et thorax vtrinque impressus, rufa, immaculata. Elytra striata, punctata, rufa: puncto magno medio atro. Corpus nigrum. Pedes rufi, femoribus quatuor posticis clauatis atris.

Variat interdum puncto altero elytrorum.

4. L.

Lemae corpus paruum, oblongum, immarginatum, tardum; capite ovato, inserto; oculis rotundatis, prominulis, lateralibus; antennis thorace longioribus, cantho anteriori oculorum insertis; thorace gibbo, cylindrico, saepius compresso; scutello parvo, rotundato; elytris rigidis, fornicatis, longitudine abdominis; pedibus medioeribus, tenuibus; tarsis quadriarticulatis; colore vario, obscuro.

- semipunctata.* 4. *L. brunnea*, elytris laevibus, basi punctatis.
Habitat in Sumatra. D. Daldorff. Mus. D. de S
hestedt.
Paullo maior *L. merdigera*. Antennae crassa
Corpus totum obscure brunneum. Thorax
vtrinque impressus. Femora subclauata.
- armata.* 5. *L. atra*, capitis vertice, thorace subspinoso ely-
trisque punctato-friatis ferrugineis.
Habitat in Guinea. Mus. D. Lund.
Statura omnino praecedentium. Caput cum a-
tenuis nigrum, vertice rufo. Thorax ferrug-
ineus, vtrinque spina parva armatus. Ely-
trata punctato-friata, ferruginea, immaculata.
- cyaneipennis* 6. *L. ferruginea*, thorace vtrinque impresso, ely-
trata cyaneis.
Habitat in Sumatra. D. Daldorff. Mus. D. de S
hestedt.
Thorax tenuis, vtrinque impressus. Corpus ferr-
ugineum, elytris punctatis, cyaneis, nitidis.
- praeusta.* 7. *L. rufa*, elytris apice atris.
Crioceris praeusta. Ent. syst. 2. 8. 25. *
Habitat - - Mus. D. Lund.
- albicornis.* 8. *L. rufa*, elytris cyaneis, antennis apice albis.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. M
D. Lund.
Statura et summa affinitas *L. Tranquebaric*
Antennae nigrae, apice albae. Caput nigrum
Thorax cylindricus, rufus. Elytra friata, cy-
aneis, Corpus ferrugineum. Fedes ferrugineae
tibiis fuscis.
- merdigera.* 9. *L. nigra*, supra rubra, ano pedibusque rubris.
Crioceris merdigera. Ent. syst. 2. 6. 19.
17. 47 *Chrysomela merdigera*. Linn. syst. Nat. 2. 51
97. Fn. Sv. 563.

Geoff. Inf. 1. 239. 1.

Degeer. Inf. 5. 338. 43.

Reaum. Inf. 3. tab, 17. fig. 12.

Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 14.

Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 4.

Payk. Fn. Sv. 2. 80. 5.

Habitat in Europae Convallaria.

Characterem generis naturalem in Ent. syst. suppl.
dedi.

10. L. thorace ferrugineo, elytris testaceis: lineola ~~retusa~~
baseos atra.

Crioceris retusa. Ent. syst. 2. 6. 18. *

Habitat in Insula Guadeloupe. Mus. D. Bose.

11. L. ferruginea, antennis, pectore abdominisque brunnea.
basi nigris.

Crioceris brunnea. Ent. syst. 2. 6. ~~17~~ 18. *

IV. 47.

Habitat in Germania. D. Smidt.

12. L. rubra, elytris punctis sex nigris.

12punctata

Crioceris 12punctata. Ent. syst. 2. 7. 20.

Chrysomela 12punctata. Linn. syst. Nat. 2. 601.

110. Fn. Sv. 568.

IV. 47

Geoff. Inf. 1. 241. 2. tab. 4. fig. 5.

Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 5.

Frisch. Inf. 13. tab. 28.

Payk. Fn. Sv. 2. 81. 6.

Habitat in Europae Asparago, quem misere de-
pascit.

13. L. rufa, elytris punctato-friatis cyaneis. Ent. *Tranquebs*
syst. suppl. 92. 15. * *rica.*

Leptura Tranquebarica. Ent. syst. suppl. 154.
53. *

Habitat Tranquebariae. D. Daldorff. Mus. D. Lund.

14. L. thorace fulvo: punctis quinque nigris, ely- 14punctata
tris flavis: punctis septem. Ent. syst. suppl.

91. 12.

Crio- IV. 47.

Crioceris 14punctata. Ent. syst. 2. 7. 13. *

Attelabus 14punctatus. Scop. Carn. 116.

Habitat in Germania. Dr. Schulz.

ruficollis. 15. L. thorace rufo, elytris flavis: fasciis duabus
nigris. Ent. syst. suppl. 91. 13. 8

Crioceris ruficollis. Ent. syst. 2. 7. 14. 22

Habitat Cayennae. D. v. Rohr.

melanura. 16. L. rufa, elytris punctato-striatis, apice cyaneis.
Ent. syst. suppl. 91. 16. *

Habitat Tranquebariae. D. Daldorff. Mus. D. Lund.

Asparagi. 17. L. thorace rubro, punctis duobus nigris, coleo-
ptis flavis: cruce punctisque quatuor nigris.
Ent. syst. suppl. 93. 24.

Crioceris Asparagi. Ent. syst. 2. 10. 41.

Chrysomela Asparagi. Linn. syst. Nat. 2. 601.
112. Fn. Sv. 567.

Geoff. Inf. 1. 241. 3.

Schaeff. Icon. tab. 52. fig. 9. 10.

Roef. Inf. 2. scarab. 3. tab. 4.

Frisch. Inf. 1. 27. tab. 6.

Payk. Fn. Sv. 2. 82. 7.

Degeer Inf. 5. 341. 45.

Habitat in Europae Asparago.

atrata. 18. L. corpore atro, immaculato.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.

Statura et magnitudo omnino L. meridigerae, at
corpus totum atrum, immaculatum.

nigricornis. 19. L. rufa, coleoptis maculis quatuor cyaneo-ni-
gris: duobus communibus. Ent. syst. suppl. 91.
10. *

Habitat in Cayenna. D. Richard.

2. *L. nigra*, thorace rufo, coleoptris flavescentibus: maculis quinque nigris. Ent. syst. suppl. *5punctata*.

91. 10.

Crioceris 5punctata. Ent. syst. 2. 7. 23. *

VIII. 21.

Habitat in Germania. Dr. Schulz.

3. *L. rufa*, pectore, elytris pedibusque cyaneis. *Coromandeliana*.
Leptura Coromandeliana. Ent. syst. suppl. 154. *deliana*.

54. *

Habitat Tranquebariae. D. Daldorff. Mus. D. Lund.

4. *L. thorace rufo*, elytris cyaneis; margine fasciaque media flavis. Ent. syst. suppl. 93-18. *

Solani.

Habitat in Carolinae Solano nigro. Mus. D. Bosc.

5. *L. coerulea*, thoracis lateribus gibbis. Ent. syst. *cyanella*.
suppl. 93. 19.

Crioceris cyanella. Ent. syst. 2. 9. 35.

Chrysmela cyanella. Linn. syst. Nat. 2. 609.

104. Fn. Sv. 572.

VI. 10

Geoff. Inf. 1. 343. 5.

Herbst. Arch. tab. 23. fig. 34.

Payk. Fn. Sv. 2. 83. 9.

Degeer. Inf. 5. 340. 44.

Habitat in Europae plantis.

6. *L. rufa*, elytris punctato-striatis atris, capite *cornuta*.
tuberculato.

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Statura et magnitudo *L. cyanellae*. Antennae nigrae. Caput nigrum, ore fusco naribusque tuberculis duobus elevatis, obtusis. Thorax rotundatus, rufus, nitidus, striga postica impressa. Elytra punctato-striata, atra, immaculata. Corpus rufum. Pedes nigri, femoribus rufis.

7. *L. viridis*, elytris striato-punctatis, cyaneis. *cyanea*.

Ent. syst. suppl. 92. 17.

Habi-

- Habitat in India orientali. Dom. Daldorff,
Vix a Lema cyanella satis distincta.
- bicolor.* 26. L. fusca, capite elytrisque viridi-atris, thorace pedibusque rufis.
Crioceris bicolor. Ent. syst. suppl. 89. 35. °
Habitat in India orientali. D. Daldorff.
- melanopa.* 27. L. coerulea, thorace pedibusque rufis. Ent. syst. suppl. 93. 20.
Crioceris melanopa. Ent. syst. 2. 10. 36.
Chrysomela melanopa. Linn. syst. Nat. 2. 60. 105. Fn. Sv. 573.
Sulz. Inf. 3. tab. 3. fig. 19.
Degeer. Inf. 5. 342. 46.
Payk. Fn. Sv. 2. 82. 8.
Habitat in Europae borealis plantis.
- unifasciata.* 28. L. rufa, elytris, fascia atra. Ent. syst. suppl. 92. 12.
Crioceris unifasciata. Ent. syst. 2. 8. 26. °
Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.
- 2fasciata.* 29. L. rufa, elytris, fasciis duabus atris. Ent. syst. suppl. 92. 13. °
Crioceris 2fasciata. Ent. syst. 2. 8. 27. °
Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.
- nigripes.* 30. L. ferruginea, antennis, pectore pedibusque rufis. Ent. syst. suppl. 92. 14.
Crioceris nigripes. Ent. syst. 2. 8. 28. °
Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.
- obscura.* 31. L. obscura, elytris punctato-striatis.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.
Statura omnino L. cyanellae, at paullo minus tota obscura, minime nitida. Femora basi partim ferruginea.

** *saltatoriae.*

2. *L. saltatoria*, supra cuprea, elytris, futura vitta-
que viridibus, nitidis, pedibus flavis. *vittata.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Parva. Antennae longitudine corporis; fuscae.
Caput nigrum, immaculatum. Thorax cupreus,
linea dorsali virescente. Elytra punctato-striata,
cuprea, futura vittaque lata, viridibus, nitidis.
Corpus flavescens. Pedes flavescentes,
femoribus posticis incrassatis.

3. *L. saltatoria*, viridi-aenea, elytris striatis, cupre-
is, pedibus flavis. *cuprea.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.

Praecedenti nimis affinis; differt tantum elytris
totis cupreis.

4. *L. saltatoria*, ferruginea, elytris striatis, viridi-
nitidulis. *nitidula.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Summa affinitas praecedentium, at minor. An-
tennae fuscae, basi rufae. Caput et thorax
atra, immaculata. Elytra striata, viridi-
nitidula. Pedes flavi, femoribus posticis incrassatis.

5. *L. saltatoria*, nigra, thorace albo-lineato, ely-
tris striatis, pedibus quatuor anticis pallidis. *striata.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Media. Caput nigrum, ore pallescente. Antennae
nigrae, basi apiceque pallidae. Thorax cylin-
dricus, niger, lineis tribus fere obsoletis, albi-
dis. Elytra striata, immaculata. Pedes quatuor
antici pallidi. Femora postica valde incrassata,
atra, nitida.

caria. 36. *L. saltatoria*, ferruginea, elytris striatis, basi nigris.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Statura et magnitudo omnino praecedentis. Antennae ferrugineae. Thorax cylindricus, ferrugineus; Elytra striata, ferruginea, basi nigra. Corpus ferrugineum, femoribus posticis compressis, valde incrassatis.

posticata. 37. *L. saltatoria*, faevis, testacea, elytris apice nigris

Habitat in America meridionali. Mus. D. Lund.

Statura omnino praecedentium, at minor. Antennae, caput, thorax cylindricus, ferrugineus, nitidus. Elytra testacea, apice nigra. Corpus ferrugineum, femoribus posticis incrassatis, compressis, apice nigris.

84. GALLERVCA. Palpi sex: articulo ultimo acuto.

Labium bifidum.

Antennae filiformes.

amaculata. 1. *G. atra*, elytris testaceis: macula atra. Ent. syst. 2. 12. 1.

Habitat in America. D. Drury.

Affinis *Adoris* videtur, mihi haud rite nota.

2. G.

Gallerucae corpus oblongum, glabrum, depressiusculum, immarginatum, tardum; capite parvo, rotundato, inflexo; oculis rotundatis, lateralibus, proniculis; antennis approximatis, ante oculos insertis; thorace brevi, transverso, saepius linea transversa, impressa; scutello parvo, rotundato; elytris rigidis, planiusculis, longitudine abdominis; pedibus medioeibus, validis, cursoris; tarsis quadriarticulatis, colore vario.

- G. testacea; subtus nigra. Ent. syst. 2. 13. 2. * *testacea.*
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.
- G. ferruginea, elytris, apice abdomineque nigris. *pallipes.*
Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff.
Magna. Caput et thorax rufa, immaculata. Elytra
sublævia, rufa, apice nigra. Abdomen nigrum.
Pedes quatuor antici pallidi, postici nigri, plan-
tis pallidis.
- G. rufa, elytris nigris, apice rufis. *rosea.*
Habitat in Sumatra. D. Daldorff. Mus. D. de Se-
hestedt.
- Statura magna præcedentis. Antennae pallidae:
articulo primo rufo. Caput et thorax laete ru-
fa, thoracis medio striga compressa. Elytra
laevia, atra, apice laete rufa. Corpus rufum,
tibiis nigris.
- G. atra, elytris fasciis tribus flavis. Ent. syst. 2. *fasciata.*
13. 3. *
Habitat in America. D. Drury.
- G. viridi-aenea, thorace pedibusque rufis. Ent. *ruficollis.*
syst. 2. 13. 4. *
Geoff. Inf. 1. 263. 16.
Habitat in Anglia. D. Lee.
- G. atra, elytris porcatis. Ent. syst. 2. 14. 7. * *littoralis.*
Galleruca atro-fusca. Geoff. Inf. 1. 252. 1.
tab. 4. fig. 6.
Habitat ad Europae australioris littora.
- G. supra ferruginea, elytris apice lunula cyanea. *Transiberica.*
Ent. syst. 95. 6. *
Habitat Tranquebariae. D. Daldorff.
- G. testacea, immaculata, thoracis angulo postico *unicolor.*
subspinoso.
Galleruca unicolor. Illig. Widem. Archiv. 1. 2.
135. 30.
Habitat in Sumatra. D. Daldorff. Corpus

Corpus magnum, totum testaceum, immaculat abdomine interdum obscuriore. Thorax media impressa, angulo postico parum procto, subspinoso.

- Sumatrae.* 10. *G. testacea*, elytris basi apiceque cyaneis.
Galleruca Sumatrae. Web. Inf. 55. 2.
 Habitat in Sumatra. D. Daldorff.
 Statura omnino praecedentis. Caput cum antennis testaceum. Thorax testaceus, striga media impressa anguloque postico subspinoso. Elytra laevia, testacea, basi apiceque cyanea. Abdomen nigrum.
- Cajannensis* 11. *G. atra*, capite, thorace femoribusque quatuor anticis obscure rufis. Ent. syst. 2. 14. 8.
 Habitat in Cajenna. D. v. Rohr.
- nigripennis* 12. *G. pallida*, capite elytrisque nigris. Ent. syst. 14. 9.
 Habitat Surinami. Mus. D. Bosc.
- obscura.* 13. *G. thorace pallido, nigro-punctato, elytris fuscis: margine lineisque pallidis.*
 Habitat in Guinea. Mus. D. Lund.
 Magno. Antennae nigrae: articulo primo secundoque pallidis. Caput pallidum, puncto vertex nigro. Thorax pallidus, obscurus, puncto quinque, 4. intermediis minoribus 1. Elytra laevia, obscura: margine lineisque aliquot distinctis, pallidis. Corpus et pedes variegati.
- Baccharidis.* 14. *G. capite thoraceque pallidis, nigro-maculata, elytris nigris: margine vittaque abbreviata pallidis.*
Galleruca Baccharidis. Web. Inf. 57. 6.
 Habitat in Carolinae Baccharidibus. D. Bosc.
 Maior *G. Nymphaeae*. Antennae totae fuscae. Caput pallidum, macula media basios fusca. Th.

rax laevis, pallidus, maculis tribus fuscis. Elytra fusca, margine vittaque a basi ad medium ducta, attenuata, pallidis. Corpus et pedes obscura.

G. nigra, thorace elytrisque griseis. Ent. syst. 2. *rustica*.

15. 11. *

Galleruca fusca. Geoff. Inf. 1. 253. 1. β.

Galleruca rustica. Act. Hall. 1. 274.

IX.

Payk. Fn. Sv. 2. 87. 3.

Habitat in Germaniae fruticibus.

G. punctata nigra, elytris coriaceis. Ent. syst. 2. *Tanaceti*.

15. 10.

Linn. syst. Nat. 2. 587. 5. Fn. Sv. 507.

Degeer Inf. 5. 299. 4. tab. 8. fig. 27.

Roef. Inf. 2. scarab. 3. tab. 5.

Schaeff. Icon. tab. 21. fig. 14.

IX

Merian. Inf. Europ. tab. 68.

Payk. Fn. Sv. 2. 36. 1.

Habitat in Europae Tanaceto.

G. atra, elytris fascia rufa, antennis pedibusque tricolor. flavescentibus.

Habitat in Sumatra. D. Daldorff.

Magna. Caput atrum, ore antennisque flavescentibus. Thorax ater, dorso impresso. Elytra vix punctata, atra, fascia media lata, rufa. Pedes flavescentes, femoribus posticis extus, tibiis totis nigris.

G. thorace pallido, nigro-maculato, elytris marginata.

atris: margine omni pallido.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.

D. de Sehestedt.

Statura omnino G. nigripennis. Antennae nigrae, apice albae. Caput nigrum, ore albo. Thorax albus, punctis duobus magnis, nigris. Scutellum

H h

lum

lum nigrum, apice pallidum. Elytra lae atra, margine futuraque pallidis. Corpus p dum, pedibus nigris.

pallicornis. 19. *G. rufa*, elytris, apice corporeque atris. Habitat in Sumatra. D. Daldorff. Mus. D. Lun Statura et magnitudo sequentis. Caput cum tennis pallidum. Thorax laevis, rufus. Ely subpunctata, rufa, apice late atra. Cor atrum, pedibus quatuor anticis albis.

luteicornis. 20. *G. nigra*, elytris testaceis, apice nigris. Habitat in Sumatra. D. Daldorff. Statura et magnitudo praecedentium. Antennae flavae. Caput et thorax atra, immaculata. Elytra laevis, testacea, apice nigra. Corpus c pedibus nigrum.

bicolor. 21. *G. nigra*, capite, thorace elytrorumque apice rufis.

haemorrhoea
Galleruca bicolor. Web. Inf. 56. 4.
Habitat in Sumatra. D. Daldorff.

Affinis praecedentibus. Caput rufum, antennae pallidis. Thorax pallidus. Elytra laevis, alba, apice rufa. Pectus et abdomen nigra, lanugine cinerea, nitida. Pedes rufescentes.

analis. 22. *G. fulva*, elytris maculis duabus cyaneo-nigris.
Galleruca analis Web. Inf. 55. 3.

Habitat in Sumatra. D. Daldorff.
Media. Caput, thorax, antennae fulvae, immaculatae. Elytra laevis, testacea, maculis duabus magnis, cyaneo-nigris, altera basalem, altera apicalem. Corpus fulvum, ano nigro.

atripennis. 23. *G. ferruginea*, alis atris. Habitat in Sumatra. D. Daldorff.

Statura omnino praecedentium. Antennae pallidae, articulo primo obscuriore. Caput et thorax

- rax ferruginea, nitida, thoracis friga media impressa. Scutellum ferrugineum. Elytra laevia, atra. Corpus ferrugineum.
4. *G. sanguinea*, thorace immaculato, elytris punctatis tribus nigris. Ent. syst. 2. 19. 30. *
Habitat in India orientali. Mus. D. Banks.
5. *G. oblonga*, ferruginea, antennis nigris. *ferruginea*.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.
Statura praecedentium. Antennae nigrae, basi ferrugineae. Corpus totum glabrum, ferrugineum, obscurum, minime nitidum.
6. *G. flava*, antennis abdomineque fuscis: ano flavo. Ent. syst. 2. 23. 23. * *abdominalis*.
Crioceris testacea. Ent. syst. 2. 4. 9.
Hybn. Naturf. 24. 43. 8. tab. 2. fig. 9.
Habitat in India et ad Cap. Bon. Spei.
7. *G. violacea*, elytris vage punctatis, pedibus antennisque nigris. Ent. syst. 2. 16. 13. *Alni*.
Linn. syst. Nat. 2. 587. 9. Fn. Sv. 511.
Geoff. Inf. 1. 132. 1.
Schaeff. Icon. tab. 65. fig. 6. 17
Payk. Fn. Sv. 2. 87. 2.
Ross. Fn. Etr. 1. 79. 199.
Degeer Inf. 5. 314. 20. tab. 9. fig. 18.
Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 13.
Frisch. Inf. 7. 13. tab. 8.
Habitat in Europae Betula Alno.
8. *G. capite thoraceque cinereis nigro-punctatis, compressis elytris fuscis, antennis compressis.* *cornis*.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.
Antennae singulares, vix huius generis, breves, extrorsum crassiores, articulo primo cylindrico,
Hh 2 2-3.

2-3. rufis, reliquis nigris, compressis. C
cinereum, punctis duobus inter oculos ni
Thorax cinereus, punctis plurimis nigris.
tra laevia, obscura. Corpus obscurum.

Bassiae. 29. *G. cyanea*, antennis pedibusque nigris, o
albis.

Galleruca Jamaicensis. Ent. syst. 2. 16. 14

Habitat in *Bassia longifolia* Indiae orient
Mus. D. Lund.

Lawsoniae. 30. *G. cyanea*, antennis, pedibus oculisque nig
Ent. syst. suppl. 95. 14. *

Habitat in *Lawsonia spinosa* Indiae orient
D. Daldorf.

Abfinthii. 31. *G. pallida*, thorace macula, elytris lineis tri
nigris. Ent. syst. 2. 16. 15. *

Chrysomela Abfinthii. Pall. Icon. 2. 725. 7

Habitat in Siberia. Mus. D. Banks.

picea. 32. *G. picea*, pedibus testaceis. Ent. syst. 2. 17. 11
Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. D. Bank

Betulae. 33. *C. violacea*, elytris punctato-striatis. Ent. 8
2. 17. 19. *

Chrysomela Betulae. Linn. syst. Nat. 2. 587-
Fn. Sv. 514.

Degeer. Inf. 5. 318. 24. tab. 9. fig. a. b.

Roef. Inf. 2. scarab. 3. tab. 1.

Habitat in *Betulae albae* foliis paginam infe
rem exedens.

Larva fusca, lineis quatuor tuberculorum al
torum. Tubercula tacta guttulam lacteam
cernunt, quam statim retrahunt.

tricolor. 34. *G. thorace fuluo*, viridi-punctato, elytris
ventralis dibus, nitidis, abdomine nigro. Ent. syst.
17. 20. *

Habitat in Indiis. Mus. D. Banks.

5. *G. capite thoraceque testaceis, fusco-maculatis, sericea.*
 elytris viridibus. Ent. syst. suppl. 95. 20. *
Quontharis sericea. thorace marginato, capiteque
 testaceo, nigroque variis, elytris viridibus.
 Ent. syst. suppl. 69. 29. *
 Habitat in India orientali. D. Daldorf.
6. *G. thorace testaceo, immaculata, elytris testa-* *4maculata.*
maculis duabus nigris. Ent. syst. 2. 20.
 35. *
Crioceris 4maculata, thorace rufo, elytris te- *IV. 48*
 staceis: maculis duabus atris. Ent. syst. 2. 22.
 50. * 4. 5. *
Crysomela 4maculata. Herbst. Arch. tab.
 Habitat in nemoribus Kiloniensibus. Mus. D. Lund.
7. *G. nigricans, thorace pallido, elytris albidis: 6punctata.*
punctis sex nigris.
Crioceris 6punctata. Ent. syst. 2. 4. 6. *
 Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.
8. *G. rufa, thoracis dorso impresso bidentato, ely-* *impressa*
trorum disco nigro. *bidentata*
 Habitat Tranquebariae. Mus. D. de Schestedt.
- Antennae rufae: articulo primo crassiori, cylin-
 drico. Caput rufum. Thorax rufus, dorso val-
 de impresso: margine impressusae vtrinque
 elevato, unidentato. Elytra laevia, nigra, mar-
 gine omni rufo. Corpus nigrum, pedibus rufis.
9. *G. rufa, antennis elytrorumque disco nigris.* *discoides.*
 Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.
- Statura et magnitudo praecedentis. Caput ferru-
 gineum, antennis nigris. Thorax ferrugineus,
 nitidus, dorso punctis duobus impressis. Elytra
 laevia, nigra: margine omni ferrugineo. Cor-
 pus rufum, abdomine obscuriore. Pedes rufi,
 apice nigri.

- limbata.* 40. *G. rufa*, elytrorum disco atro.
 Habitat in Carolina. Muf. D. Bosc.
 Statura omnino *G. discoideae*, at paullo minor,
 alia. Caput cum antennis rufum. Thorax rufus,
 nitidus, macula media transuersa parum
 impressa. Elytra laeuis, atra, nitida, margine
 omni rufo. Corpus et pedes rufa.
- cincta.* 41. *G. pallida*, elytrorum margine omni atro. Ent.
 syst. 2. 22. 42. *
 Hybn. Naturf. 24. 42. 7. tab. 1. fig. 6-8.
 Habitat Tranquebariae. Dr. Koenig.
 Antennae in altero sexu singulares, articulo
 secundo minuto, globofo, tertio vtrinque spinoso,
 quarto et quinto compresso, extrorsum
 emarginato.
- trilineata.* 42. *G. pallida*, thorace maculis tribus, elytris
 tribus abbreviatis nigris.
Crioceris trilineata. Ent. syst. 2. 11. 46. *
 Habitat ad Cap. Bon. Spei.
- triloba.* 43. *G. capite thoraceque flavescentibus, nigromaculatis,*
elytris griseis, corpore fusco. Ent. syst.
 2. 21. 37. *
 Habitat ad Cap. Bon. Spei. Muf. D. Banks.
 Elytra laeuis, obscura. Corpus fuscum.
- lineata.* 44. *G. grisea*, thorace linea dorsali, elytris punctis
 baseos nigris. Ent. syst. 2. 21. 38. *
 Payk. Fn. Sv. 2. 90. 6.
 Degeer Inf. 5. 325. 30.
 Habitat in Italia. Dr. Allioni.
- Nymphaea.* 45. *G. fusca*, elytrorum margine prominulo
 flavo, Ent. syst. 2. 21. 31.
Chrysomela Nymphaea. Linn. syst. Nat. 2. 60.
 90. Fn. Sv. 565.
 Geoff. Inf. 1. 254. 4.

- Degeer Inf. 4. 326. 31. tab. 20. fig. 1. 2.
 Payk. Fn. Sv. 2. 92. 10.
 Habitat in Europae Nymphæis.
6. G. thorace nigro maculato elytrisquæ griseis, *capreae*.
 antennis nigris. Ent. syst. 2. 21. 32. *
Chrysomela capreae. Linn. syst. Nat. 2. 606.
 100. Fn. Sv. 516.
 Geoff. Inf. 1. 254. 5.
 Degeer Inf. 5. 325. 30. IX
 Payk. Fn. Sv. 2. 88. 4.
 Habitat in foliis Salicis capreae.
7. G. ferruginea, elytris cyaneis. Ent. syst. 2. 18. *Anicenniae*.
 24. *
 Habitat in Americae meridionalis Anicennis. Dr.
 Ufert.
8. G. nigra, elytris viridibus, ano rufo. Ent. syst. *ruficauda*.
 2. 18. 23. *
Chrysomela ruficauda. Thunb. Differt.
 Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Bose.
9. G. coerulea aut viridis, elytris punctato-friatellinae.
 tis, ano rufo. Ent. syst. 2. 18. 22.
Chrysomela vitellinae. Linn. syst. Nat. 2. 589.
 23. Fn. Sv. 519. IV. 49.
 Degeer Inf. 5. 323. 27.
 Roef. Inf. 2. scarab. 3. tab. 1.
 Payk. Fn. Sv. 2. 94. 12.
- β. *Chrysomela vulgatissima*. Linn. syst. Nat. 2.
 589. 22. Fn. Sv. 517.
 Degeer Inf. 5. 317. 23.
 Habitat in Europae Salicibus frequens.
10. G. capite thoraceque obscure ferrugineis, ely-
 tris nigro-aeneis. Ent. syst. 2. 18. 25. *
 Habitat Dresdae. Mus. D. Romanus.
 Species obscura mihi haud rite nota.

- palliata.* 51. *G. lutea*, elytris nigris. Ent. syst. 2. 22. 35. *
Chrysomela palliata. Act. Hall. 1. 279.
 Hybn. Naturf. 24. 44. 9. tab. 2. fig. 10.
 Habitat Tranquebariae. Dom. Hybner.
 Antennae flavescentes, in altero sexu 3. 4. 5. dilatatis, et in his abdomen nigrum.
- Calmariensis.* 52. *G. cinerea*, elytris, vitta lineolaque baseos nigris. Ent. syst. 2. 23. 46.
Chrysomela Calmariensis. Linn. syst. Nat. 2. 600. 101.
 Geoff. Inf. 1. 253. 3.
 Payk. Fn. Sv. 2. 90. 8.
 Habitat in Europae Salice.
- Morio* 53. *G. nigra*, obscura, pedibus ferrugineis. Ent. syst. 2. 23. 48. *
 Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.
- sanguinea.* 54. *G. rufa*, antennis oculisque nigris. Ent. syst. 2. 23. 49. *
 1x. Payk. Fn. Sv. 2. 94. 11.
 Habitat in Europa boreali. Dom. Schaller.
- marginella.* 55. *G. capite thoraceque ferrugineis*, elytris cyaneis: margine rufo.
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.
 Antennae nigrae. Caput et thorax rufa, immaculata, thoracis dorso impresso. Elytra laevia cyanea, nitida, margine laete rufo. Corpus atrum.
- notata.* 56. *G. ferruginea*, thorace punctis tribus, elytris punctatis: vittis tribus abbreviatis nigris.
 Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.
 Statura *G.* lineolae. Antennae nigrae, basi ferrugineae. Caput ferrugineum, linea verticali nigra. Thorax ferrugineus, punctis tribus nigris.
 Elytra

Elytra punctata, ferruginea, vittis tribus nigris, quarum exteriores ante apicem coeunt, interior vero valde abbreviata. Corpus fuscum, pedibus ferrugineis.

17. *G. ferruginea, thorace maculato, elytris laevi-* *notulata.*
bus: vittis quatuor nigris.

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Affinis certe praecedenti, at alia et distincta. Caput cum antennis nigrum. Thorax rufus, maculis tribus nigris; intermedia maiori. Elytra laevia, ferruginea: vittis quatuor nigris, quarum tres exteriores ante apicem coeunt, interior ante medium proximae iungitur. Pedes pallidi.

18. *G. nigra, obscura, antennis, apice, elytris, margi-* *Maura.*
ne pallescentibus.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Statura et magnitudo *G. palliatae*. Antennae nigrae, articulis tribus ultimis pallescentibus. Thorax niger, linea transversa media, impressa. Elytra linea unica fere obsoleta, elevata, abbreviata, nigra: margine pallescente. Corpus nigrum, femoribus pallidis.

59. *G. supra tomentosa, obscure ferruginea, elytris* *Americana.*
vittis tribus nigris.

Habitat in Carolinae plantis. Mus. D. Bosc.

Statura *G. Calmariensis*. Antennae nigrae, basi ferrugineae. Caput obscure ferrugineum, linea dorsali nigra. Thorax ferrugineus, obscurus, lineis tribus fuscis. Elytra punctata, sericea, obscure ferruginea, vittis tribus parvis, nigris, interiore obsoletiore. Corpus fuscum, pedibus ferrugineis.

- atomaria.* 60. *G. pallida*, elytrorum futura, atomisque ferrugineis.
 Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.
 Statura parua *G. tenellae*. Antennae ferrugineae.
 Caput ferrugineum, vertice nigro. Thorax marginatus, pallidus, immaculatus. Elytra laevia, pallida, futura, quae tamen apicem haud attingit. puncto maiori distincto in medio atomisque ferrugineis. Corpus pallidum.
- gelatinaria.* 61. *G. thorace flavescente*: punctis tribus impressis fuscis, elytris fuscis: margine omni flavescente.
 Habitat in Carolinae Gelatinaria (planta aquatica nondum descripta). Mus. D. Bosc.
 Statura et magnitudo *G. Calmariensis*. Antennae nigrae, articulis basi parum pallecentibus. Caput fuscum, ore flavescente. Thorax flavescens: punctis duobus dorsalibus, impressis fuscis: margine futuraque flavescentibus. Corpus fuscum, pedibus flavescentibus.
- tenella.* 62. *G. ferruginea*, thorace elytrorumque margine flavis. Ent. syst. 2. 23. 50.
Chrysomela tenella. Linn. syst. Nat. 2. 600. 102.
 Fn. Sv. 564.
 Payk. Fn. Sv. 2. 93. 10.
 Habitat in Europae Salice.
- haemorrhoidalis.* 63. *G. rufa*, elytris atris, apice rufis.
 Habitat in noua Cambria. D. Billardiere.
 Antennae basi rufae, medio nigrae, apice rufae articulo ultimo nigro. Caput, thorax, corpus pedes nunc rufa, nunc albida. Elytra laevia atra, apice laete rufa.
- hisfrionica.* 64. *G. fusca*, capite thoraceque flavis, nigro-maculatis.

Galleruca picta. Ent. syst. 2. 23. 37. *

Habitat in India. Mus. Dr. Hunter.

65. *G. testacea*, antennarum articulo tertio emarginato, vltimis albis. *varicornis*.

Habitat in America meridionali. Mus. D. de Sehestedt.

Statura praecedentium. Antennae singulares: articulo primo elongato, incuruo, pallido, secundo brevissimo, rotundato, tertio elongato, incuruo, late emarginato, pallido, 4-7. nigris, reliquis albis. Caput et thorax glabra, testacea, nitidula, thoracis dorso impressa. Elytra sulcata, sulcis subrugosis, testacea. Corpus pallide testaceum, abdomine nigro.

** *saltatoriae*, femoribus posticis incrassatis.

66. *G. saltatoria*, flavescens, elytris viridibus: margine pallido, Ent. syst. 2. 27. 68. *fasciata*.

Habitat in America. D. Drury.

Maxima in hac familia.

67. *G. saltatoria*, pallida, elytris cyaneis: fascia pallida, Ent. syst. suppl. 96. 55. * *fasciata*.

Habitat in St. Domingo. D. Brongiard.

68. *G. saltatoria*, flavescens, thorace punctis duobus, coleoptris vittis quinque nigris. Ent. syst. 2. 24. 55. * *Caroliniana*.

Cistela vittata testacea vittaque media nigris.

Ent. syst. 2. 47. 30. * vix differre videtur.

Habitat in Carolinae Amarantho spinoso.

69. *G. saltatoria*, thorace elytrisque albis: margine baseos fasciaque media ferrugineis. Ent. syst. 2. 20. 61. * *equestris*.

Habitat in America. Mus. Dr. Hunter.

70. *G.*

macula.

70. *G. saltatoris* pallida, elytris maculis duabus nigris.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Magna. Caput et thorax postice impressus pallida, immaculata. Elytra laevia, maculis duabus magnis, nigris. Corpus pallidum, pedibus fuscis.

rogustata.

71. *G. saltatoria*, ferruginea, thorace elytrorumque punctis quinque albis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Magna. Caput obscure ferrugineum, ore pallido, antennisque nigris. Thorax albus, immaculatus. Elytra laevia, brunnea, cyaneo parum nitida, punctis quinque albis 1. 2. 1. transverso 1. Corpus ferrugineum.

nobilitata.

72. *G. saltatoria*, ferruginea, elytrorum margine fasciaque albis. Ent. syst. 2. 20. 64. *

Hybn. Naturf. 24. 411. 5. tab. 2. fig. 4.

Habitat in Cayenna. D. v. Rohr.

afasciata.

73. *G. saltatoria*, ferruginea, elytris strigis quatuor albis. Ent. syst. 2. 20. 65. *

Habitat in Cayenna. D. v. Rohr.

sellata.

74. *G. saltatoria*, testacea, thorace albo: punctis quatuor nigris.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Magna. Antennae nigrae, apice albae. Caput albidum. Thorax marginatus, albus: punctis quatuor nigris; duobus basales, duobus apicis. Elytra laevia, testacea, immaculata. Corpus pallide testaceum.

75. *G. saltatoria*, nigra, thorace elytrorumque fascia ~~abbreviata~~ *abbreviata* duabus albis. Ent. syst. suppl. 97. 63. *

Habitat in Cayenna. D. Richard.

76. *G. saltatoria*, nigra, thoracis limbo, elytrorum ~~limbata~~ *limbata* margine vittaque fulvis. Ent. syst. suppl. 96. *ex rollans* 54. *

Habitat in Tanger. D. Schousboe.

77. *G. saltatoria*, flava, thorace nigro-punctato, ely- *thoracica* tris violaceis. Ent. syst. 2. 24. 54. *

Habitat in America. D. Lee.

78. *G. saltatoria*, atra, thorace elytrorumque fascia *nitida* albis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Magna. Caput cum antennis atrum, immaculatum. Thorax laevis, albus, nitidus. Elytra atra, cyaneo parum nitida, margine baseos fasciaque lata albis. Abdomen album. Pedes atri, femoribus posticis valde incrassatis.

79. *G. saltatoria*, thorace rubro, elytris violaceis: *aequinocialis* maculis quatuor albis alternis. Ent. syst. 2. 28. *lis* 73. *

Chrysomela aequinoctialis. Linn. syst. Nat. 2. 596. 71.

Degeer Inf. 5. 356. II. tab. 16. fig. 19.

Habitat in America meridionali.

80. *G. saltatoria*, nigra, thorace albo, elytris obscure *albivittis* ferrugineis: punctis quatuor albis; interiori lineari. Ent. syst. 2. 27. 66. *

Habitat in Cayenna. D. v. Rohr.

81. *G. saltatoria*, ferruginea, capite thoraceque al- *notata* bis, elytris ferrugineis: punctis quatuor albis simplicibus. Ent. syst. suppl. 98. 66. *

Habitat in Cayenna. D. Cuvier.

82. G.

- bicolor.* 82. *G. saltatoria*, rufa, elytris femoribusque posticis
coeruleis. Ent. syst. 2. 27. 69. *
Chrytomela bicolor. Linn. syst. Nat. 2. 593. 5.
Degeer Inf. 5. 357. 12. tab. 16, fig. 20.
Habitat in Cytiso Cajan Americae. Dom. Isert.
- humeralis.* 83. *G. saltatoria*, pallide testacea, elytris puncto humerali nigro.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.
Statura et magnitudo omnino *G. sellatae*. Antennae pallidae. Caput et thorax pallidiora. Elytra laevia, pallide testacea, puncto humerali atro. Corpus testaceum, femoribus valde incrassatis.
Variat elytris immaculatis.
- lunata.* 84. *G. saltatoria*, ferruginea, thorace elytrorum lunula fasciisque duabus albis.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.
Magna. Caput ferrugineum, antennis fuscis. Thorax albus, immaculatus. Elytra laevia, brunnea, nitida, lunula baseos, margine fasciisque duabus albis. Corpus ferrugineum.
- collaris.* 85. *G. saltatoria*, nigra, thorace anoque rufis. Ent. syst. suppl. 97. 57. *
Habitat in America. Dom. Hybner.
- cyanipennis* 86. *G. saltatoria*, ferruginea, capite elytrisque cyanis. Ent. syst. suppl. 97. 57. *
Habitat in Insula St. Domingo. D. Brongiard.
- glabrata.* 87. *G. saltatoria*, thorace pallido: punctis tribus nigris, elytris nigris: vittis duabus albis. Ent. syst. 2. 25. 57. *
Habitat in Iamaicae Myrto Pimenta. Dr. Schwartz.

88. *G.*

86. *G. saltatoria nigra*, thorace rubro, elytris *ruminata*.
 bris: futura vittaque lata nigris.
 Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.
 Magna. Caput nigrum. Thorax vix punctatus,
 ruber, macula media obscuriore. Elytra sub-
 punctata, rubra, vitta lata futuraque nigris.
 Corpus nigrum, pedibus piceis, femoribus val-
 de incrassatis.
 Post mortem color rufus, viuacissimus, in palli-
 dum obscurum transit.
89. *G. saltatoria*, capite thoraceque ferrugineis, ely- *queceta*.
 tris atris: margine ferrugineo.
 Habitat in Carolinae quercu. Mus. D. Bosc.
 Antennae ferrugineae, apice nigrae. Caput et
 thorax laeua, ferruginea, immaculata. Elytra
 laeua, atra, margine ferrugineo. Corpus atrum,
 pedibus anticis quatuor ferrugineis.
90. *G. saltatoria*, ferruginea, elytris vittis duabus *coniugata*.
 flavis, postice coeuntibus.
 Habitat in Carolinae plantis. Mus. D. Bosc.
 Statura et summa affinitas *G. glabratae*. Caput
 ferrugineum, antennis nigris. Thorax ferrugi-
 neus, immaculatus. Elytra laeua, ferruginea,
 vittis duabus flavis, postice coeuntibus. Cor-
 pus ferrugineum, pectore tibiisque nigris.
91. *G. saltatoria*, atra, thoracis limbo, elytrorum *Petaurista*
 margine vittisque duabus ferrugineis.
 Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.
 Magna in hac familia. Caput atrum. Thorax fla-
 uus, disco macula magna, atra. Elytra puncta-
 ta, atra, margine vittisque duabus, postice co-
 euntibus, ferrugineis. Corpus atrum, femori-
 bus crassissimis.

- oculata.* 92. *G. saltatoria*, testacea, elytris maculis tribus obscuris: posteriore macula testacea.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.
Statura omnino praecedentium. Antennae obscurae, basi pallidae. Caput pallidum. Thorax marginatus, pallidus, immaculatus. Elytra pallide testacea, maculis duabus oblongis baseos tertia postica, elongata: macula oblonga pallida, femoribus incrassatis.
- torcinea.* 93. *G. saltatoria*, sanguinea, subtus obscure oliuacea.
Habitat in Aquapim Guineae. Mus. D. de Sehestedt Magna. Caput cum antennis, thorax, elytra laevia, nitida, ferruginea, immaculata. Corpus cum pedibus obscure oliuaceum.
- hectica.* 94. *G. saltatoria*, laevis, pallida, thorace postice impresso.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.
Statura praecedentium, at tota laevis, pallida immaculata. Antennae et tibiae paullo obscuriores.
- impressa.* 95. *G. saltatoria*, laevis, obscure ferruginea, thorace postice impresso.
Habitat in Tanger. D. Schousboe. Mus. D. de Sehestedt.
Magnitudo *G. marginellae*. Antennae ferrugineae apice fuscae. Corpus totum laeve, ferrugineum, immaculatum, thorace postice linea transversa baseos impressa.
- marginella.* 96. *G. saltatoria*, nigra, elytris viridi-aeneis: margine punctisque duobus albis. Ent. syst. 2. 26. 62. *
Habitat in Lusitania. Dr. Gray.

7. *G. saltatoria*, coerulea, nitens, thorace, pectore *flavicollis*.
pedibusque pallidis. Ent. syst. suppl. 98. 72. *
Habitat in America australi, lecta inter Cocos
Cacti. Mus. D. Lund.
8. *G. saltatoria*, nigra, thorace ferrugineo, elytris *obsoleta*.
vitta obsoleta, testacea.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.
Statura praecedentium. Caput cum antennis ni-
grum. Thorax laete ferrugineus, immaculatus.
Elytra laevis, nigra: vitta obsoleta, testacea,
quae tamen apicem haud attingit. Pedes rufi,
femoribus posticis valde incrassatis, apice nigris.
9. *G. saltatoria*, coerulea, nitida, antennis nigris. *Erucae*.
Ent. syst. 2. 28. 26. *
Habitat in Germania. D. Smidt.
10. *G. saltatoria*, cyanea, nitida, antennis pedibus- *cyanea*.
que nigris.
Habitat in Sumatra. D. Daldorff.
Affinis certe *G. Erucae*, at paullo maior, tota cya-
nea, nitida, antennis, pedibus abdomineque ni-
gris.
11. *G. saltatoria*, pallida, antennis tibiisque nigris. *pallens*.
Ent. syst. 2. 25. 58. *
Habitat in Insula Guadeloupe. Mus. D. Lund.
12. *G. saltatoria*, ferruginea, thorace elytrorum- *aguttata*.
que maculis duabus albis. Ent. syst. 2. 25. 59. *
Habitat in America boreali. D. Drury.
13. *G. saltatoria*, ferruginea, thorace albo, elytris *aguttata*.
atris: punctis quatuor albis. Ent. syst. 2. 25.
60. *
Habitat in Cayenna. Dr. Schulz.

- liturata.* 104. *G. saltatoria*, supra pallida, elytris linea med
atra. Ent. syst. suppl. 98. 69. ♀
Habitat in Sumatra. D. Daldorff.
- trifasciata.* 105. *G. saltatoria*, pallida, elytris nigris: puncti
baseos fasciisque tribus albis.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mu
D. de Sehestedt.
Statura praecedentium. Caput cum antenn
atrum. Thorax laevis, pallide testaceus, immo
culatus. Elytra laevia, puncto baseos, fasci
duabus maculaque apicis albis. Corpus pallid
testaceum.
- geminata.* 106. *G. saltatoria*, pallida, elytris linea geminat
atra.
Habitat in Tanger. D. Schousboe. Mus. D. Lund
Statura et summa affinitas *G. lituratae*. Capu
ferrugineum. Thorax pallidus, linea baseo
transversa, impressa. Elytra substriata, pallida
lineis duabus in medio postice coeuntibus, ni
gris. Corpus ferrugineum.
- resituta.* 107. *G. saltatoria*, laevis, nitida, testacea, antenni
nigris, basi testaceis.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus
D. Lund.
Corpus totum laeve, glabrum, testaceum, nitidum
thorace linea transversa, baseos impressa. An
tennae nigrae, basi testaceae.
- oleracea.* 108. *G. saltatoria*, viridi-aenea, elytris punctatis
Ent. syst. 2. 28. 74.
Chrysomela oleracea. Linn. syst. Nat. 2. 593. 5
Fn. Sv. 534.
Degeer Inf. 5. 344. 49.
Payk. Fn. Sv. 2. 96. 12.

Hab

Habitat in plantarum Cotyledonibus, inprimis Tetradynamistarum.

Pellitur cineribus vegetabilium, inprimis Tabaci.

109. *G. saltatoria*, atra, abdominis margine rufo. *concinna*.

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Corpus maiusculum totum laeue, atrum, obscure nitidum, abdominis margine solo ferrugineo.

110. *G. saltatoria*, thorace pallido, elytris aeneis: *4punctata*.
maculis duabus fasciaque aureis. Ent. syst. 2.
29. 76. *

Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

111. *G. saltatoria*, pallida, elytrorum puncto medio *futurae*.
futurae fuscis.

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Corpus paruum, laeue, pallidum, puncto minuto, in medio futurae late fuscis, qui tamen color apicem haud attingit. Femora valde incrassata.

112. *G. saltatoria*, atra, nitida, thoracis margine, elytrorum apice pedibusque pallidis. *obsidiana*.

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Magnitudo praecedentis. Caput atrum, ore antennisque pallidis. Thorax laeuis, ater, nitidus, margine prominulo pallido. Elytra laeuis, atra, nitida, apice parum albida. Corpus atrum, pedibus albis, femoribus posticis incrassatis, atris.

113. *G. saltatoria*, subrotunda, atra, nitida, antennis pedibusque nigris. *mercurialis*. Ent. syst. 2. 33. 97.

Habitat in Germaniae Mercuriali annua. D. Prof. Helwig.

114. *G. saltatoria*, gibba, cyanea, nitida, antennis *aduenae*.
fuscis. Ent. syst. 2. 33. 98. *

Habitat in Americae meridionalis Insulis. Dom.
Smidt.

filiformis. 115. *G. saltatoria*, fulva, elytris nigris: margine
omni pallido.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.

Statura magis elongata, quam in reliquis. Caput
et thorax laevia, fulva, nitida, immaculata, an-
tennis folis nigris. Elytra laevia, nigra, margi-
ne omni pallido. Corpus pallido-ferrugineum
femoribus posticis incrassatis.

perrecta. 116. *G. saltatoria*, albida, thorace nigro-lineata
elytris vittis duabus fuscis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Statura elongata praecedentis. Caput pallidum
puncto frontali antennisque fuscis. Thorax
pallidus, lineis tribus fuscis. Elytra laevia, al-
bida, vittis duabus nigris, quae tamen apicem
haud attingunt, at punctum distinctum fuscum
ante apicem. Corpus album, pedibus apic-
e fuscis.

elongata. 117. *G. saltatoria*, nigro-aenea, elytris vitta albida
Ent. syst. suppl. 99. 109. *

Habitat in America boreali. D. Smith Barton.

frontalis. 118. *G. saltatoria elongata*, nigra, vertice rufo.

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Statura elongata praecedentium. Antennae ni-
grae: articulis 3. 4. 5. 6. pallidis. Verte-
late rufus. Thorax et elytra laevia, atra, ol-
scura nitida, immaculata. Corpus atrum.

85. CYPHON. *Palpi* quatuor:

anteriores subulati;
posteriores articulo ultimo bi-
 fido.

Labium bifidum.

Antennae filiformes.

1. *C. pallidus*, capite elytrorumque apicibus fuscis. *pallidus*.

Cyphon pallidus. Payk. Fn. Sv. 2. 118. 1.

Cistela pallida. Ent. syst. 1. 2. 46. 26.

Habitat in Anglia. Mus. Dr. Hunter.

I. 33.

Genus, mihi haud rite examinatum, secundum D.

de Paykull, recipio. *Palpi* quatuor inaequales:

anteriores longiores, 4articulati; articulo primo breui, tenuiore, secundo longiori, subfiliformi, tertio breuiori, obconico, quarto longiori, subulato, adhaerentes maxillae dorso,

posteriores triarticulati: articulo primo tenui, secundo subfiliformi, tertio paullo crassiori, bifurcato, sub labii apice inserti. *Mandibula*

elongata, cornea, acutissima, edentula. *Maxilla*

membranacea, porrecta, apice bifida. *Labium*

breue, membranaceum, apice bifidum: laciniis acutis.

2. *C. liuidus*, antennis fuscis.

liuidus.

Galleruca liuida. Ent. syst. 1. 2. 22. 44.

Habitat *I. 33.*

Cyphonis corpus paruum, subrotundum, villosum, inmarginatum, agile; *capite* paruo, transuerso, inserto; *oculis* magnis, rotundatis, prominulis, lateralibus; *antennis* thorace longioribus, distantibus, ante oculos insertis; *thorace* planiusculo, margine antico prominulo, laterali, rotundato, elytris angustiore; *scutello* paruo, subrotundo; *elytris* molliusculis, fornicatis, longitudine abdominis; *pedibus* longiusculis, compressis; *tarsis* quinquearticulatis; *colore* liuide, nullo modo nitido.

Habitat in Dania. Mus. D. de Sehestedt.

Corpus totum laeue, glabrum, obscure liuidum
antennis folis fuscis.

griseus.

3. *C. niger*, elytris pedibusque testaceis.

Galleruca liuida. Ent. syst. I. 2. 17. 21.

Habitat in Germania. D. Smidt.

Statura praecedentis. Caput nigrum, ore liuido

Elytra laeuia, subuillofa, testacea. Corpus ni-
grum, pedibus testaceis.

Variat colore dilutiore.

pubescens.

4. *C. pubescens*, griseus, capite abdomineque fuscis

Cistela pubescens. Ent. syst. I. 2. 47. 32.

Habitat in Dania. Mus. D. Lund.

Caput fuscum, antennis ferrugineis. Thorax gri-

seus, obscurus. Elytra grisea, futura parum ni-
gricante. Corpus nigrum, pedibus griseis.

marginata.

5. *C. niger*, thoracis margine rufo.

Cistela marginata. Ent. syst. suppl. 103. 25.

Habitat in Dalekarliae Alpibus. D. de Paykull.

Caput nigrum, antennarum articulo primo rufo.

Thorax rotundatus, marginatus: margine an-

teriori et laterali rufis. Elytra laeuia, nigra.

Corpus nigrum.

II. 30.

melanurus.

6. *C.* subtestaceus, elytrorum apicibus abdomineque
fuscis.

Galleruca melanura. Ent. syst. I. 2. 22. 45.

Habitat in Suecia. Mus. D. de Sehestedt.

Paullo minor *C.* liuido. Antennae testaceae, apice

nigrae. Caput, thorax, pedes laeuia, glabra, ni-

tida, testacea. Elytra magis liuida, apice nigra.

** *saltatorii.*

haemisphaericus. 7. *saltatorius*, suborbiculatus, depressus, niger.

Cyphon haemisphaericus. Payk. Fn. Sv. 2.

VIII. 23. 119. 2.

Gal-

Galleruca haemisphaerica. Ent. syst. 1. 2. 34
107.

Chrysomela haemisphaerica. Linn. syst. Nat. 2.
595. 68.

Degeer Inf. 5. 348. 56.

Habitat in Europae Corylo.

. C. saltatorius, niger, thoracis margine elytrorum-*orbicolatus*.
que puncto futurali ferrugineis.

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Statura omnino et magnitudo praecedentis, at distinctus thoracis margine punctoque in medio futurae elytrorum ferrugineis. Pedes ferruginei.

1. C. saltatorius, fuscus, antennis compressis nigris. *compressi-*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. *cornis*.

D. de Sehestedt.

Paullo maior C. haemisphaerico. Antennae valde compressae, nigrae, articulo primo pallido. Thorax depressus, fuscus. Elytra fusca, lanugine cinerea substriata. Pedes nigri.

10. C. saltatorius, ater, elytris fasciis duabus fulvis. *fasciatus*.

Habitat in America. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Corpus paruum, atrum. Thorax limbo subferrugineo. Elytra laevia, glabra, atra, fasciis duabus distinctis fulvis.

11. C. saltatorius, pallide testaceus, antennis nigri-*testaceus*.
cantibus.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Praecedentibus paullo maior et longior. Antennae nigrae, basi pallidae. Caput, thorax, elytra pallide testacea, immaculata. Corpus pallidum, femoribus incrassatis.

12. C.

depressus.

12. *C. saltatorius*, {orbiculatus, depressus, griseus
antennis nigris.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mu
D. de Sehestedt.

Statura praecedentis, at minor, fere orbiculatus
depressus, griseus, antennis nigris, basi griseis
Femora postica valde incrassata.

86. ENDOMYCHVS. *Palpi* quatuor inaequales: articulo ultimo
truncato.

Labium elongatum, conicum, integrum.

Antennae apice moniliformes.

*margina-
tus.*

1. *E. niger*, obscurus, thoracis margine elytrorum
que apice sanguineis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mu
D. de Sehestedt.

Maior. Antennae nigrae, basi ferrugineae, articulis
tribus ultimis crassioribus, subperfoliatis.
Caput obscurum. Thorax planus, marginatus
niger, margine rufo. Elytra laevia, nigra
margine tenuissime, apice latius rufo. Corpus
nigrum, abdomine pedibusque rufis.

2. 1

Endomychi corpus paruum, depressiusculum, ovatum, glabrum,
tardum; capite ovato, plano, inserto; oculis rotundatis,
vix prominulis, lateralibus; antennis thoracis longioribus,
distantibus, ante oculos insertis; thorace plano, marginato:
angulo antico prominente; scutello minuto, rotundato;
elytris abdomine longioribus, rigidis, foveolatis;
pedibus brevibus, validis; tarsis quadriarticulatis;
colore nitido.

- E. thorace sanguineo, macula nigra, elytris sanguineis maculis duabus nigris.* Ent. fyft. suppl. 100. 2.
- Endomychus coccineus.* Payk. Fn. Sv. 2. 112. 1.
- Galleruca coccinea.* Ent. fyft. 2. 20. 31.
- Chryfomela coccinea.* Linn. fyft. Nat. 2. 592. 43. Fn. Sv. 532.
- Degeer. Inf. 5. 301. 10. tab. 9. fig. 1. IV. 48.
- Naturf. 24. 14. 20. tab. 1. fig. 20.
- Habitat in Europae borealis Corylo.
- E. ruber, coleoptris cruce rubro.* Ent. fyft. suppl. *cruciatus.* 100. 3.
- Galleruca cruciata.* Ent. fyft. 2. 20. 32. *
- Endomychus cruciatus* Payk. Fn. Sv. 2. 114. 2. I. 31.
- Chryfomela cruciata.* Schall. Act. Hall. 1. 273.
- Habitat Halae Saxonum.
- E. niger, thoracis margine, elytrorum maculis duabus pedibusque rufis.* Ent. fyft. suppl. 100. 4.
- Endomychus succinctus.* Payk. Fn. Sv. 2. 114. 3. IV. 49.
- Silpha succincta.* Linn. fyft. Nat. 2. 573. 26.
- Galleruca apustulata.* Ent. fyft. 2. 20. 33. *
- Habitat in Europae Lycoperdis. Dr. Allioni.
- E. rufus, elytris laeuis: macula magna fusca.* *fasciatus.* Habitat in Hungaria. Muf. D. Lund.
- Statura et magnitudo praecedentium. Caput, thorax, antennae, corpus rufa, immaculata. Elytra laenia, rufa, macula magna, fasciam latam fere formans, fusca.
- E. ater, nitidus, antennis pedibusque ferrugineis.* *Bonifae.* Ent. fyft. suppl. 101. 5.

I. 31.

Endo-

Endomychus Bouista. Payk. Fn. Sv. 2. 115. 4

Galleruca Bouista. Ent. syst. 2. 20. 34. *

Habitat in Germaniae Lycoperdo Bouista. Don
Prof. Helwig.

IOH. CHRIST. FABRICII

HIST. NAT. OECONOM. ET CAMERAL. P. P. O.
CIET. HAFN. NORW. NAT. CVRIOS. BEROL. LIPS. LVND.
PETR. OECON. TAUR. LOND. HIST. NAT. IENENS.
BOVED. NEC NON PARIS. AGRICVLT. HIST. NAT.
ET PHILOM. MEMBR.

SYSTEMA ELEVTHERATORVM

SECVNDVM

ORDINES, GENERA, SPECIES:

ADIECTIS

SYNONYMIS, LOCIS, OBSERVATIONIBVS,
DESCRIPTIONIBVS.

TOMVS II.

KILIAE

IMPENSIS BIBLIOPOLII ACADEMICI NOVI.

1801.

1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

57. EROTYLVS. *Palpi* quatuor inaequales,
anteriores malleiformes;
posteriores subfiliformes.
Antennae claua compressa
 perfoliata.

1. E. niger, coleoptris punctis fulvis numerosissimis. Ent. syst. 2. 35. 1. *giganteus*.

Chrysomelu gigantea. Linn. syst. Nat. 2. 586. 1.

Oliv. Inf. 89. tab. 1. fig. 6.

Degeer Inf. 5. 349. 1. tab. 16. fig. 8.

Habitat in India.

2. E. ater, elytris flavis, nigro-reticulatis. Ent. syst. *reticulatus*.
 2. 36. 2. *

Habitat in Brasilia. Mus. Dr. Hunter.

3. E. ater, elytris fasciis sex vndatis, fulvis; anteriore interrupta. Ent. syst. 2. 36. 3. * *6fasciatus*.

Habitat in America meridionali.

4. E.

Erotyli corpus magnum, ovatum, gibbum, immarginatum,
 agile; capite parvo, ovato, inserto; oculis rotundatis, pa-
 rum prominulis, marginalibus; antennis thorace longiori-
 bus, ante oculos insertis; thorace transverso, plano: mar-
 gine utrinque antice prominulo, postice sinuato; scutello
 parvo, rotundato; elytris rigidis, gibbis, fornicatis, longi-
 tudine elytrorum; pedibus longiusculis, tenuibus, curso-
 riis; tarsis quadriarticulatis; colore vario.

A 2

- nistris.* 4. *E. ater*, elytris nigro-flauoque fasciatis: maculae baseos apicisque coccinea. Ent. syst. 2. 36. 4
Habitat in Cayenna. Mus. Dr. Hunter.
- testaceus.* 5. *E. testaceus*, antennis tibiisque nigris. Ent. syst. 2. 36. 5. *
Habitat in America. D. Drury.
- sphaecelatus.* 6. *E. ater*, elytris fasciis duabus flauis: punctis nigris impressis.
Habitat in America meridionali. Mus. D. de Sehestedt.
Corpus magnum, atrum. Elytra basi fasciatae prope medium flauis: punctis plurimis impressis atris.
- gibbosus.* 7. *E. niger*, elytris flavescentibus nigro-punctatis fasciâ media posticaque nigris. Ent. syst. 2. 36. 6.
Chrysomela gibbosa. Linn. syst. Nat. 2. 586.
Oliv. Inf. 89. tab. 1. fig. 4.
Herbst. Arch. tab. 23. fig. 3.
Linn. Amoen. acad. 6. 393. 13.
Gronov. Zooph. 606. tab. 14. fig. 5.
Habitat in America meridionali.
- eleonatus.* 8. *E. ater*, elytris gibbis, flauis: maculis nigris impresso-punctatis.
Habitat - - Mus. D. Lund.
Minor *E. gibboso.* Thorax depressus, inaequaliter ater. Elytra dorso eleuata, laeuius, flaua, maculis plurimis, irregularibus, atris, et in puncta impressa. Corpus atrum.
- notatus.* 9. *E. ater*, elytris fasciâ media flaua, nigro-maculata, basi rubro-notatis. Ent. syst. 2. 37. 7.
Erotylus notatus. Oliv. Inf. 89. tab. 1. fig. 1.
Habitat in Cayenna. Mus. D. Olivier.

6. *E. ater*, elytris flauo-nigroque reticulatis: fasciis duabus atris. Ent. syst. 2. 37. 8. * *compatentus.*
Habitat - - Dr. Schulz.
7. *E. elytris nigris*: punctis quinque rubris. Ent. *spunctatus*.
syst. 2. 37. 9.
Erotylus spunctatus. Oliv. Inf. 89. tab. 1. fig. 5.
Chrysomela spunctata. Linn. syst. Nat. 2. 586. 3.
Petiv. Gazoph. 613. tab. 16. fig. 7.
Habitat in America meridionali.
8. *E. niger*, elytris flauis: punctis numerosissimis *punctatissimus.*
nigris. Ent. syst. 2. 37. 10. *
Habitat in America meridionali. Mus. Dr. Hunter.
9. *E. ater*, elytris punctatis medio fuluo-maculatis. *variegatus.*
Ent. syst. 2. 37. 11. *
Erotylus variegatus. Oliv. Inf. 89. tab. 1. fig. 7.
Habitat Surinami. Mus. D. Banks.
10. *E. flauus*, elytris laeuius testaceis: maculis *smaculatus*
quatuor nigris.
Habitat - - Mus. D. Lund.
Paullo minor *E. vnifasciato*. Antennae parum compressae, nigrae, basi apiceque albae. Caput nigrum, ore flauo. Thorax planus, flauus, im-maculatus. Elytra laeuius, testacea, maculis quatuor nigris: prima humerali, tertia trans-versa. Corpus flauescens.
11. *E. ater*, elytris punctis fuluis, numerosissimis, *gemmatus.*
thorace varioloso. Ent. syst. 2. 38. 12. *
Habitat in Cayenna. Mus. D. Bosc.
12. *E. ater*, elytris fasciis atris flauisque alternis, *longimanus*
pedibus anticis elongatis. Ent. syst. 2. 38. 13. *
Habitat in India. D. Daldorff.
13. *E. ater*, elytris flauis: fasciis quatuor, vndatis *abdomina-*
punctoque distincto nigris. Ent. syst. 2. 38. 14. * *lis.*
Habitat in Brasilia. Mus. D. Banks. 18. E.

- unifasciatus*. 18. *E. ater*, elytris flavis: fascia media lata, atr
Ent. syst. suppl. 101. 13. *
Habitat - - Mus. D. Lund.
- fasciatus*. 19. *E. ater*, elytris fasciis tribus flavescentibus. Ent
syst. 2. 38. 15. *
Habitat in America. D. Drury.
Os maxillis palpisque. *Lubrum* elongatum, con
neum, truncatum. *Palpi* quatuor inaequales
anteriores longiores, malleiformes, quadria
ticulati: articulo primo breuissimo, secun
d longiori, obconico, tertio breui, rotundato
quarto maximo, ovato, transverso, concauo, i
medio articuli tertii inserto, adhaerentes ma
xillae dorso, *posteriores* breuiores, filiformes
triarticulati: articulo primo breuissimo, secu
do longiori, incuruo, cylindrico, tertio aequal
vix crassiori, adnati ligulae ante apicem. *Man
dibula* brevis, cornea, incurua, apice bifida.
Maxilla brevis, membranacea, cylindrica, ob
tusissima, integra. *Ligula* porrecta, membra
nacea, apice cylindrica, integra, obtusa, ante
apicem palpigera. *Labium* breue, transver
sum, corneum, tridentatum.
- apustulatus* 20. *E. ater*, elytris maculis duabus fulvis.
Habitat in Sumatra. D. Daldorff.
Statura et magnitudo *E. Zebrae*. Antennae nigrae
claua compressa: articulis magis approximatis.
Caput et thorax atra, immaculata. Elytra lat
uia, atra, maculis duabus magnis, ferrugineis.
Corpus atrum.
- Zebra*. 21. *E. flavescens*, capite, thoracis basi, fasciis tribus
elytrorum, pedibusque atris. Ent. syst. 2. 31
16. *
Habitat in Cayenna. D. v. Rohr.

12. *E. niger*, coleoptris fasciis duabus flavis: ante-*alternans*.
riore nigro-punctata. Ent. syst. 2. 39. 17. *

Erotylus alternans. Oliv. Inf. 89. tab. 1. fig. 10.

Chrysomela Gronouii. Herbst. Arch. tab. 23. f. 4.

Habitat in America meridionali.

Nimis affinis *E. fasciato*, et forte mera eius va-
rietas.

13. *E. obscurus*, elytris punctatis, aeneo-nitidulis: *dentatus*.
frigis tribus dentatis ferrugineis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.

D. de Sehestedt.

Magnitudo *E. Zebrae*. Antennae nigrae. Caput

et thorax declivata, obscura, thoracis margine

ferrugineo. Elytra punctata, viridi-aenea,

margine frigisque tribus valde dentatis, rufis.

Interdum strigae per dentes coeunt, et macu-

las nigro-aeneas in elytris rufis formant.

Corpus obscurum, pedibus ferrugineis.

14. *E. ater*, thoracis margine elytrorumque limbo *limbatus*.

flavo. Ent. syst. 2. 39. 20. *

Erotylus limbatus. Oliv. Inf. 89. tab. 2.

Habitat in Cayenna. Mus. D. Olivier.

15. *E. brunneus*, antennis, scutello pectoreque ni-*brunneus*.
gris.

Erotylus brunneus. Web. Inf. 59. 1.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.

D. Lund.

Minor *E. alternante*. Antennae nigrae, basi fer-

rugineae. Caput et thorax brunnea, fere im-

maculata, interdum linea dorsali fusca. Scutel-

lum nigrum. Elytra sublaevia, brunnea, mar-

gine vix pallidiore. Corpus brunneum, pecto-

re tibiisque nigris.

Variat corpore pallidiore.

26. *E.*

- atratus.* 26. *E. supra ater, subtus pedibusque brunneis.*
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
 D. de Sehestedt.
 Statura omnino praecedentis, at paullo maior.
 Antennae nigrae, articulis ultimis tribus parum crassioribus, compressis. Thorax declivis planus, laevis, niger, obscurus. Elytra vix striata, atra, immaculata. Corpus cum pedibus brunneum.
- rufipennis.* 27. *E. ater, nitidus, elytris rufis.*
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
 D. Lund.
 Statura et magnitudo praecedentium. Antennae nigrae. Caput et thorax declivis, laevis, atra immaculata. Scutellum nigrum. Elytra subtilissime punctato-striata, obscure rufa. Corpus atrum.
- tricolor.* 28. *E. ferrugineus, elytris flavescentibus: disco obscuro.*
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
 D. de Sehestedt.
 Statura omnino *E. brunnei*, at paullo minor. Caput et thorax declivis, nunc obscure ferruginea, nunc magis flavescentia. Scutellum nigrum. Elytra punctato-striata, flavescentia futura margineque parum nigricantibus et disco fusco. Corpus ferrugineum.
- undatus.* 29. *E. ferrugineus, elytris nigris, strigis duabus vix distinctis parique punctorum posticorum ferrugineis.*
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
 D. Lund.
 Antennae nigrae. Caput et thorax declivis, ferruginea, thorace maculis quatuor nigris. Elytra

tra striata, nigra, basi dentata: strigis duabus
vndatis, punctorum pari apiceque rufis. Cor-
pus ferrugineum.

18. AEGITHVS. *Palpi* quatuor inaequales,
anteriores malleifor-
mes;
posteriores capitati.
Antennae claua compres-
sa, perfoliata.

A. niger, elytris rubris immaculatis.

Surinamen

Erotylus Surinamensis. Ent. syst. 2. 39. 18. *

sis.

Coccinella Surinamensis. Linn. syst. Nat. 2. 579.

2. Amoen. acad. 6. 393. 12.

Oliv. Inf. 89. tab. 1. fig. 9.

Habitat in America meridionali.

Genus affine praecedenti, attamen distinctum.

O; maxillis palpisque. *Labrum* breue, corneum,
rotundatum, integrum. *Palpi* quatuor inaequa-
les, *anteriores* longiores, quadriarticulati,
malleiformes: articulo primo breui, secundo
longiori, cylindrico, tertio breui, rotundato,
quarto maximo, transuerso, concauo, in medio
articuli tertii inserto, adhaerentes maxillae
dorso, *posteriores* breuiores, capitati, triarti-
culati: articulo primo secundoque breuissimis,
aequa-

Aegithi corpus subrotundum, supra gibbum, subtus planum,
glabrum, immarginatum, tardum; *capite* paruo, ouato, in-
serto; *oculis* paruis, rotundatis, marginalibus; *antennis* di-
stantibus, longitudine thoracis, ante oculos insertis; *tho-*
raxe breui, transuerso, postice latiore; *scutello* paruo, ro-
tundato; *elytris* fornicatis, rigidis, longitudine abdominis;
pedibus breuibus, validis, cursoriis; *tarsis* quadriarticula-
tis; *colore* obscuro.

aequalibus, rotundatis, tertio magno, crasso, capitato, adnati ligulae apici. *Mandibula* brevis, cornea, incurva, fissa. *Maxilla* brevis, cylindrica, submembranacea, obtusa. *Ligula* brevis, cornea, plana, integra. *Labium* transversum, corneum, tridentatum, dentibus lateralibus maioribus, rotundatis.

marginatus 2. *A. flavescens*, elytris nigris: margine omni flavescente. Ent. syst. suppl. 101. 18. *
Habitat in Cayenna. D. Richard.

cinctus. 3. *A. ater*, elytrorum limbo fasciaeque media ferrugineis.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Statura rotundata et magnitudo praecedentium. Antennae nigrae, clava parva, compressa. Caput et thorax nigra. Elytra subpunctata, nigra, margine omni tenui fasciaeque media rufis. Corpus nigrum, pedibus obscure rufis.

discoideus. 4. *A. ferrugineus*, elytrorum disco cyaneo-nigro.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Summa affinitas *A. marginati*. Antennae ferrugineae, clava compressa, nigra. Caput et thorax ferruginea, immaculata. Elytra laevia, cyaneo-nigra, margine exteriori, et antico, ferrugineis. Corpus ferrugineum.

Guadeloupenfis. 5. *A. atra*, elytris fuscis: limbo flavescente.
Galleruca Guadeloupenfis. Ent. syst. 2. 16. 17. *
Habitat in Insula Guadeloupe. D. Badier. Mus. D. de Sehestedt.

89. EVMORPHVS. *Palpi* quatuor inaequales,
anteriores subfiliformes;
posteriores breues,
 capitati.
Antennae claua compressa,
 perfoliata.

1. E. niger, elytris immarginatis: punctis duobus *immargina-
 flauis.* tus.

Eumorphus Sumatrae. Web. Inf. 59. 1.

Erotylus quadriguttatus. Illig. Widem. Arch.

1. 2. 124. 18. tab. 1. fig. 4.

Habitat in Sumatra. D. Daldorff.

Statura omnino sequentis, at elytra haud marginata nec violacea.

Os maxillis palpisque. *Labrum* porrectum, corneum, quadratum, vix emarginatum. *Palpi* quatuor inaequales, *anteriores* longiores, extrorsum vix crassiores, quadriarticulati: articulo primo breuissimo, orbiculato, secundo longiori, obconico, basi tenuissimo, tertio quartoque aequalibus, breuibus, subcrassioribus, obtusis, adhaerentes maxillae dorso, *posteriores* breues, capitati, triarticulati: articulo primo secundoque breuissimis, rotundatis, tertio incrassato,

Eumorphi corpus oblongum, glabrum, submarginatum, tardum; *capite* paruo, inserto, thorace multo angustiore; *oculis* magnis, oblongis, transuersis, marginalibus, thoracis angulo antico, subtectis; *antennis* thorace longioribus, ante oculos insertis; *thorace* plano, subquadrato, angulis anticis posticisque prominulis; *scutello* paruo, rotundato; *elytris* rigidis, fornicatis, longitudine abdominis; *pedibus* tenuibus, longiusculis, cursoris; *tarsis* triarticulatis; *colore* vario.

crassato, obtuso, truncato, adnati ligulae basi exteriori. *Mandibula* crassa, cornea, compressa, edentula, apice acutissima. *Maxilla* brevis, membranacea, bifida: laciniis aequalibus, rotundatis. *Ligula* brevis, membranacea, late emarginata: laciniis distantibus, tenuibus, acutiusculis. *Labium* breue, corneum, transuersum, truncatum.

marginatus 2. *E. ater*, elytris marginatis, violaceis: punctis duobus flauis.

Habitat in noua Cambria. Mus. D. Billardiere.

Praecedente paullo maior. Antennae porrectae, nigrae, claua perfoliata, compressa. Thorax planus, marginatus, ater, nitidus. Elytra marginate dilatato, plano, sutura in medio eleuata, gibba, violaceo-nitida, punctis duobus magnis, flauis. Corpus atrum.

90. CNODVLON. *Palpi* quatuor inaequales, anteriores securiformes; posteriores breues, capitati.

Ligula apice retundata, integra.

Antennae filiformes.

cupreum.

1. *C. atrum*, thorace elytrisque cupreis.

Ero-

Cnoduli corpus oblongum, glabrum, immarginatum, tardum; capite paruo, ouato, inserto; oculis magnis, approximatis, oblongis, transuersalibus, marginalibus, hanc medio capitis firmatis; antennis distantibus, thorace longioribus, cantho oculorum insertis; thorace breui, gibbo; funtella paruo, rotundato; elytris fornicatis, rigidis, longitudine abdominis; pedibus longiusculis, tenuibus, car soris; tarsis quadriarticulatis; colore vario.

Erotylus cupreus. Ent. syst. 2. 40. 21. *

Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

Os maxillis palpisque. Palpi quatuor inaequales, anteriores longiores, securiformes, quadriarticulati: articulo primo breui, secundo longiori, obconico, tertio breui, quarto maiori, altero latere dilatato, adhaerentes maxillae dorso, posteriores breuiores, triarticulati: articulo primo secundoque breuibus, rotundatis, aequalibus, tertio crassiori, clauato, compresso, adhaerentes ligulae medio. Mandibula crassa, difformis, incurua, fornicata, intus repanda. Maxilla magna, compressa, medio videntata, apice rotundata. Ligula porrecta, cylindrica, membranacea, apice rotundata, integra. Labium breue, corneum, transuersum.

2. C. atrum, thorace elytris que ferrugineo variis. *nebulosum.*

Erotylus nebulosus. Ent. syst. 2. 40. 22. *

Habitat in America meridionali. Mus. Dr. Hunter.

3. C. atrum, thorace elytris que ferrugineis. *dilatatum.*

Erotylus dilatatus. Ent. syst. 2. 40. 23. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lee.

4. C. nigrum, elytris cyaneis. *triste.*

Erotylus tristis. Ent. syst. suppl. 102. 23. *

Habitat - -

5. C. atrum, elytris striatis viridibus. *smaragdulum.*

Erotylus smaragdulum. Ent. syst. 2. 40. 24. *

Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

6. C. atrum, thorace elytris que cyaneis. *amethystinum.*

Erotylus amethystinus. Ent. syst. 2. 40. 25. *

Cnodolon. Latreille Inf. 54. 26.

Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

7. C.

*bicolor.*7. *C. atrum*, supra aeneum.*Erotylus bicolor*. Ent. syst. 2. 40. 26. *

Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

Caput aeneum, antennis nigris. Elytra punctata
striata.91. CEBRIO. *Palpi* quatuor filiformes.*Maxilla* membranacea, vix un-
dentata.*Ligula* apice palpigera.*Antennae* filiformes.*gigas.*1. *C. villosus*, fuscus, elytris, abdomine femoribus
que testaceis. Ent. syst. 2. 41. 1.*Cebrio gigas*. Oliv. Inf. 31. tab. 1. fig. 1.

Ross. Fn. Etr. 1. 100. 256. tab. 7. fig. 9.

Panz. Fn. Germ. 5. tab. 10.

Habitat in Gallia australiori. D. Brouffonet.

I.32

*fuscus.*2. *C. fuscus*, elytris striatis. Ent. syst. 2. 41. 2. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Dom. de Paykull.

*bicolor.*3. *C. supra* griseus, subtus ferrugineus.

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Statura praecedentium, at paullo minor. Caput

nigrum, antennis palpisque ferrugineis. Tho-

rax parum tomentosus, subpunctatus, postice

vtrin

Cebriionis corpus elongatum, immarginatum, pubescens, agile; capite ovato, thorace sublatiore, mandibulis extertis inserto; oculis magnis, rotundatis, prominulis, marginalibus; antennis longitudine fere corporis, ante oculos insertis; thorace transuerso, postice latiore, angulo vtrinque porrecto, acuto; scutello paruo, rotundato; elytris rigidis fornicatis, longitudine abdominis; pedibus validis; femoribus crassiusculis, compressis; tarsis anticis quique-posticis quadriarticulatis; colore obscuro.

vtrinque dente prominulo. Elytra striata, fusca.
Corpus cum pedibus ferrugineum.

4 C. fuscus, thorace femoribusque rufis, elytris te- *ruficollis*.
faceis. Ent. syst. suppl. 102. 3. *

Habitat in Marocco. D. Schousboe. Mus. D. de
Sehestedt.

92. ATOPA. *Palpi* aequales, filiformes.

Maxilla unidentata.

Ligula membranacea, bifida:
laciniis linearibus, distanti-
bus.

Antennae filiformes.

1. A. livida, pedibus fuscis.

Cistela ceruina. Ent. syst. 2. 42. 1. *ceruina.*

Chrysomela ceruina. Linn. syst. Nat. 2. 602. 115.

Fn. Sv. 575.

Atopa ceruina. Payk. Fn. Sv. 2. 116. 1.

Dascillus. Latreille Inf. 56. 24.

Degeer Inf. 4. 235. tab. 9. fig. 8.

Oliv. Inf. 54. tab. 1. fig. 2.

Habitat in Europae plantis.

2. A. livida, elytris pedibusque fuscis.

Cistela cinerea. Ent. syst. 2. 42. 2. *cinerea.*

Habitat in Germania et Italia. *Varied. praecedentis*

Vix

Atopae corpus oblongum, immarginatum, pubescens, agile;
capite paruo, ovato, inserto; *oculis* rotundatis, vix pro-
minulis, marginalibus; *antennis* thorace longioribus, ante
oculos insertis; *thorace* planiusculo, submarginato, angulo
postico haud prominulo; *scutello* paruo, rotundato; *ely-
tris* rigidis, fornicatis, longitudine abdominis; *pedibus*
mediocribus, compressis; *tarsis* quinquearticulatis; *colore*
cinereo, obscuro.

Vix a praecedente satis distincta.

*O*s maxillis palpisque. *Palpi* quatuor aequales filiformes: *anteriores* quadriarticulati: articulis subaequalibus; ultimo obtuso, adhaerentes maxillae dorso, *posteriores* triarticulati articulis aequalibus, cylindricis, adnati ligulae basi superiori. *Mandibula* cornea, arcuata subintegra, apice obtusa. *Maxilla* porrecta membranacea, videntata. *Ligula* porrecta membranacea, cylindrica, apice bifida: laciniis aequalibus, linearibus, distantibus. *Labiun* breue, corneum, transuersum, immarginatum

liuida.

3. A. *liuida*, antennis fuscis.

Habitat in Terra del Fuego. Mus. D. Banks.

93. CISTELA. *Palpi* inaequales, filiformes.

Maxilla bifida.

Ligula membranacea, rotundata, integra.

Antennae filiformes.

ceramboi-
des.

1. C. *atra*, thorace antice angustato, elytris striatis testaceis. Ent. syst. 2. 42. 4.

Chrysomela ceramboides. Linn. syst. Nat. 2. 602. 117. Fr. Sv. 576.

Cistela ceramboides. Payk. Fn. Sv. 2. 121. 1. Oliv

Cistela corpus oblongum, immarginatum, glabrum, *agile* *capitis* ovato, exserto; *oculis* magnis, oblongis, transuersis, reniformibus, marginalibus; *antennis* thorace longioribus, oculis ipsis insertis; *thorace* postice latiore, angulo postice parum prominulo; *scutello* paruo aucto; *elytris* rigidis, fornicatis, longitudine abdominis; *pedibus* medio-cubitalibus, validis, cursoriis; *tarsis* anticis quinque posticis quadriarticulatis.

Oliv. Inf. 54. tab. 1. fig. 4.

Herbst, Arch. tab. 23. fig. 27.

Geoff. Inf. 1. 354. 1.

Habitat in Europa boreali.

C. maxillis palpisque. Palpi quatuor inaequales, subfiliformes, anteriores longiores, quadrarticulati: articulo primo brevissimo, secundo longiori, obconico, tertio brevi, quarto paullo longiori, cylindrico, obtuso, adhaerentes maxillae dorso: posteriores breves, triarticulati: articulis subaequalibus; ultimo obtuso, adnati ligulae medio. Mandibula brevis, cornea, arcuata, edentula, acuta. Maxilla membranacea, bifida, lacinia exterior paullo longiore, rotundata. Ligula brevis, membranacea, rotundata, integra. Labium breve, corneum, transversum, submarginatum.

C. atra, thorace quadrato, elytris striatis, testaceis. *lepturoides*.

Ent. syst. 2. 43. 5. *

Cistela rufitarfis. Lesk. Iter. 1. 15. 5. tab. A. fig. 4.

Oliv. Inf. 54. tab. 1. fig. 3.

I. 33.

Panz. Fn. Germ. 5. tab. 11.

Habitat in Europae australioris spicis fecalinis.

Muf. D. de Sehestedt.

C. nigra, thorace, elytris abdomineque testaceis. *testacea*.

Ent. syst. 2. 43. 6. *

Habitat in Chrysanthemo, Sambuco aliisque Barbariae plantis. D. Vahl. *Hungaria, Lusitania, Silesia, Sibiria*

C. nigra, thorace quadrato, elytris testaceis. antennarum basi tibiisque piceis. Ent. syst. 2. 43.

7. *

Habitat in Daniae plantis. Muf. D. de Sehestedt.

B

5. C.

- bicolor.* 5. *C. nigra*, elytris pedibusque sulphureis. Ent. syst. 4. 447. 8. * *variet. C. sulphurea*
 No 36. Panz. Fn. Germ. 34. tab. 8.
 Habitat in Germania. D. Schneider.
- sulphurea.* 6. *C. flava*, elytris sulphureis. Ent. syst. 2. 43. 8. *
Chrysomela sulphurea. Linn. syst. Nat. 2. 602.
 114.
Cistela sulphurea. Payk. Fn. Sv. 2. 125. 7.
Tenebrio lutea. Geoff. Inf. 1. 351. 11.
 Oliv. Inf. 54. tab. 1. fig. 6.
 Herbst. Arch. tab. 23. fig. 28.
 Habitat in Europae floribus umbellatis.
- ruficollis.* 7. *C. atra*, thorace ferrugineo, elytris striatis. Ent. syst. 2. 43. 9. *
 Oliv. Inf. 54. tab. 1. fig. 5.
 Habitat in Europae australioris Santolina.
- coerulea.* 8. *C. atra*, elytris striatis, coerulefcentibus. Ent. syst. 2. 43. 10. *
 Oliv. Inf. 54. tab. 2. fig. 18.
 Habitat in Barbariae plantis. D. Prof. Vahl.
- nigripennis* 9. *C. ferruginea*, capite elytrisque striatis nigris. Ent. syst. 2. 44. 11. *
 Habitat in Gallia meridionali.
- analis.* 10. *C. rufescens*, antennis, macula, elytrorum anoque nigris. Ent. syst. 2. 44. 12. *
 Habitat Tranquebariae. D. Koenig.
- melanoccephala.* 11. *C. testacea*, capite anoque nigris. Habitat Tranquebariae. Mus. D. Lund.
 Statura et summa affinitas *C. analis*, at distincta videtur, paullo minor. Caput nigrum. Thorax, elytra, corpus testacea, immaculata, ano solo nigro. Pedes testacei.

12. *C. nigra*, elytris laevis, antennis pedibusque *rufipes*.
ferrugineis. Ent. syst. 2. 44. 13. *
Habitat in Germania. D. Smidt. III. 39
13. *C. nigra*, elytris striatis, pedibus ferrugineis. *fulvipes*.
Ent. syst. 2. 44. 14. *
Cistela fulvipes. Payk. Fn. Sv. 2. 122. 2. ~~...~~
Habitat in Germania. D. Smidt.
14. *C. atra*, immaculata. *Morio*.
Erotylus Morio. Ent. syst. 2. 39. 19. *
Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.
15. *C. nigra*, elytris striatis pedibusque flavis. Ent. *murina*.
syst. 2. 44. 16. *
Cistela murina. Payk. Fn. Sv. 2. 126. 8.
Chrysomela murina. Linn. syst. Nat. 2. 602.
118. Fn. Sv. 577.
Mordella. Geoff. Inf. 1. 355. 4. *(C. Douvigni? Kvarn...*
Oliv. Inf. 54. tab. 1. fig. 13. *... variet. "*
~~Hebst. Arch. tab. 23. fig. 29. *... murina*~~
Habitat in Europae plantis.
16. *C. fusca*, thorace pedibusque ferrugineis, elytris *thoracica*.
laevibus. Ent. syst. 2. 45. 18. * *var. pall.* III. 37.
Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.
17. *C. atra*, elytris nigris: macula baseos flava, ab- *flavipes*.
dominis basi pedibusque flavis. Ent. syst. 2. 45.
19. *
Cistela flavipes. Payk. Fn. Sv. 2. 125. 6.
Habitat in Europae plantis. Mus. D. Banks.
18. *C. nigra*, elytris substriatis: puncto humerali *humeralis*.
tibisque flavis. Ent. syst. 2. 45. 21. *
Cistela bipustulata. Payk. Fn. Sv. 2. 124. 5. III. 37.
~~*Cistela acuticollis*. Payk. Fn. Sv. 2. 123. 4.~~
Habitat in Europa boreali.

C. flavipede minor. Antennae nigrae, basi flavae
Elytra subftriata.

Euonymi. 19. C. testacea, abdomine griseo, elytris laevibus
Ent. syst. 2. 45. 20. *

^{III. 36} Panz. Fn. Germ. 34. tab. 7.
~~var. murina~~ Habitat in Germania Euonymo. D. Schneider.

nigrita. 20. C. atra, elytris subftriatis, antennis pedibusque
concoloribus. Ent. syst. 4. App. 447. 21. *
Habitat in Germania. D. Schneider.

maura. 21. C. atra, elytris subftriatis, antennarum basi pedi-
busque ferrugineis. Ent. syst. 2. 45. 22. *

^{II. 3.}
^{III. 38} Habitat in Germania. D. Smidt.

pallipes. 22. C. nigra, nitidula, antennarum basi pedibusque
pallidis. Ent. syst. 2. 46. 23. *
Habitat in Germania. D. Smidt.

angustata. 23. C. thorace elytrisque obscure rufis, medio nigri-
Ent. syst. 2. 46. 25. *
Habitat in Anglia. Mus. D. Banks.

festiva. 24. C. ferruginea, elytris cyaneo-viridibus: mar-
gine ferrugineo. Ent. syst. 2. 47. 28. *
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

caulica. 25. C. atra, thorace rufo, elytris cyaneis. Ent. syst.
2. 47. 29. *
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

hirta. 26. C. hirta, capite thoraceque rufis, elytris cyaneis
Ent. syst. 2. 47. 31. *
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.
De genere haereo, species mihi haud rite nota.

agilis. 27. C. atra, elytris pedibusque ferrugineis.
Habitat in Germania.
Parua. Caput nigrum, antennis palpisque ferru-
gineis. Thorax laevis, niger, margine ferrugi-
neus

neo. Elytra vix striata, ferruginea. Corpus nigrum, pedibus ferrugineis.

28. C. ferruginea, elytris flavis: lineolis tribus ni- *Glineata*.
gris. Ent. syst. 2. 47. 33. *

Habitat in - - Mus. D. Banks.

94. ALLECVLA. *Palpi* quatuor, inaequales, anteriores securiformes; posteriores clauati. *Labium* emarginatum. *Antennae* setaceae.

1. A. nigra, pedibus piceis.

Morio.

Erotylus rufipes. Ent. syst. 2. 40. 27. *

Cistela Morio. Ent. syst. 2. 46. 24. *

Cistela Morio. Payk. Fn. Sv. 2. 123. 3.

Oliv. Inf. 54. tab. 1. fig. 7.

III. 38

VIII. 29.

Habitat Kiliae.

Os maxillis palpisque. *Palpi* quatuor inaequales, anteriores longiores, securiformes, quadriarticulati: articulo tertio breuissimo, ultimo crassiori, altero latere dilatato, adhaerentes maxillae dorso, posteriores breuissimi, subclauati: articulo secundo breuissimo, ultimo crassiori, truncato, inferti ligulae medio laterali. *Mandibula* cornea, concaua, acuta, edentula. *Maxilla*

Alleculae corpus oblongum, glabrum, immarginatum. agile; capite ovato, exserto; oculis magnis, oblongis, transversis, marginalibus; antennis longitudine fere corporis, distantibus, ante oculos insertis; thorace antice angustiore, margine laterali rotundato, postico sinuato; scutello paruo, rotundato; elytris rigidis, fœnicatis, longitudine abdominis; pedibus longiusculis, tennibus, cursoriis; tarsis quadriarticulatis; colore nigro, obscuro.

xilla cornea, bifida: lacinia exterior, maiore, clauata, concaua, rotundata. *Ligula* - - -
Labium breue, corneum, basi cylindricum, apice dilatatum, truncatum, submarginatum.

- varians.* 2. *A. grisea*, oculis nigris, elytris substriatis,
Cistela varians. Ent. syst. 2. 44. 15. *
 Oliv. Inf. 54. tab. 2. fig. 17.
 Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.
- pallicornis.* 3. *A. fusca*, elytris striatis ferrugineis, antennis pedibusque testaceis.
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.
 Statura et magnitudo praecedentis. Caput fuscum, ore antennisque testaceis. Elytra striata, ferruginea. Corpus fuscum, pedibus flauis.
- ferruginea.* 4. *A. testacea*, capite thoraceque fuscis, elytris striatis.
Cistela ferruginea. Ent. syst. 2. 45. 17. *
 Habitat in Germania. D. Smidt.
- fuscata.* 5. *A. nigra*, elytris striatis, antennis pedibusque testaceis.
Cistela fuscata. Ent. syst. suppl. 102. 22. *
 Habitat Kiliae.

95. ZYGIA. *Palpi* inaequales, filiformes.
Maxilla unidentata.
Ligula elongata, membranacea.
Antennae moniliformes.

- oblonga.* 1. ZYGIA.
Zygia oblonga. Ent. syst. 2. 48. 1.
 Habitat in Oriente. D. Prof. Forstkahl.

16. ZONITIS. *Palpi filiformes.*
Maxilla palpis longior, integra.
Antennae testaceae.
- i. *Z. thorace mutico, pallide testacea, antennis pedumque apicibus nigris.* Ent. syst. 4. App. 447. 1. *
Habitat in Americae meridionalis Insulis. Dom. v. Rohr.
- ii. *Z. thorace mutico, testacea, antennis elytrorum-que apicibus nigris.* Ent. syst. 2. 48. 1. *
 Panz. Fn. Germ. 36. tab. 6. 7. *II. 39*
Habitat in Italia. Dr. Allioni.
- iii. *Z. thorace mutico, rufo, elytris pectoreque nigris.* *nigripennis*
 Ent. syst. suppl. 103. 2. * *variet. praeced.*
Habitat in Marocco. Mus. D. Lund.
- iv. *Z. thorace angulato, spinoso, testacea, elytris apice cyaneis, antennis pedibusque nigris.* *angulata.*
 Ent. syst. 2. 49. 2. *
 Hybn. Naturf. 24. 45. 11. tab. 2. fig. 12.
Habitat in Insula Amsterdani. Mus. D. Banks.
- v. *Z. thorace mutico, nigra, thorace elytrisque testaceis.* *mutica.*
 Ent. syst. 2. 49. 3. *
Zonitis mutica Hybn. Naturf. 24. 44. 10. tab. 2. fig. 11.
Habitat in Hungaria. Dom. Hybner.
6. Z.

Zonitidis corpus oblongum, glabrum, immarginatum, agile; capite ovato, inflexo, exserto; oculis magnis, reniformibus, transuersis, marginalibus, vix prominulis; antennis distantibus, sub oculis insertis, longitudine corporis; thorace subquadrato, plano, antice parum angustiore; scutello paruo, triangulari; elytris molliusculis, fornicatis, longitudine abdominis; pedibus tenuibus, longituleis; tarsis anticis quinque - posticis quadriarticulatis; colore vario.

- fuluipennis.* 6. *Z. thorace mutico, atra, elytris testaceis.* Ent. syst. 2. 49. 4. *
Habitat in *Hungaria*
- chrysomelina.* 7. *Z. flava, elytris puncto medio apiceque nigris.* Ent. syst. 2. 49. 5. *
Habitat in Oriente. D. Prof. Forfkahl.
- flava.* 8. *Z. rufescens, elytris flavis apice nigris.* Ent. syst. 2. 49. 6.
Habitat in Oriente. D. Prof. Forfkahl.
- viridipennis.* 9. *Z. thorace rufo, elytris viridibus.* Ent. syst. suppl. 103. 7. *
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lund.
- rostrata.* 10. *Z. testacea, pectore elytrorumque punctis tribus nigris.* Ent. syst. 2. 50. 7. *
Habitat in Barbaria. Mus. Dom. Desfontaines.
- vittata.* 11. *Z. ferruginea, elytris testaceis: vitta lata atra.* Ent. syst. suppl. 104. 7. *
Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

97. APALVS. *Palpi aequales, filiformes.*
Maxilla cornea, vnidantata.
Ligula membranacea, truncata, integra.
Antennae filiformes.

amaculatus 1. *A. niger, elytris testaceis: puncto nigro.* Ent. syst. 2. 50. 1.

IX.

Meloë bimaculatus. Linn. syst. Nat. 2. 680. 9.
Fn. Sv. p. 228. n. 828. Vdm. Diff. 82.

Oliv.

Apall corpus oblongum, glabrum, immarginatum, agile; capite ovato, exserto; oculis oblongis, transuersis, marginalibus; antennis thorace longioribus, ante oculos insertis

Oliv. Inf. 52. tab. 1. fig. 2.

Degeer Inf. 5. tab. 1. fig. 18.

Payk. Fn. Sv. 2. 127. 1.

Habitat primo vere in Europae borealis arenosis.

2. A. rufus, capite elytrorumque maculis duabus ~~4maculatus~~
nigris. Ent. fyft. 2. 50. 2. *

Habitat in America boreali.

98. ALVRNVS. *Palpi* sex breuiffimi.

Maxilla cornea, forficata.

Antennae cylindricae.

1. A. thorace coccineo, elytris flauis. Ent. fyft. 2. *grossus*.
51. 1. *

Voet. Col. 2. tab. 29. fig. 9.

Habitat in Cayenna.

Antennae nigrae, corpore breuiores.

2. A. testaceus, antennis elytrisque ante apicem ni- *testaceus*.
gris.

Habitat in noua Cambria. Muf. D. Billardiere.

Huius

tis, distantibus; *thorace* rotundato, angustiore, linea media impressa; *scutello* breui, rotundato; *elytris* molliuiculis, incumbentibus, longitudine abdominis; *pedibus* tenuibus, longiusculis, cursoriis; *tarsis* anticis quinque-poiticis quadriarticulatis; *colore* nigro flauoque, obscuro.

Alurni corpus magnum, oblongum, depressum, glabrum, immarginatum, tardum; *capite* decliui, rotundato, inserto; *oculis* magnis, subrotundatis, marginalibus; *antennis* thorace longioribus, approximatis, inter oculos insertis; *thorace* rotundato, plano, vix marginato; *scutello* mansuculo, euato, obtuso; *elytris* rigidis, basi gibbere notatis, fornicatis, abdomine latioribus longioribusque; *pedibus* validis, longiusculis, cursoriis; *tarsis* triarticulatis: articulis latis, cordatis, subtus valde villosis; *colore* vario, obscuro.

Huius generis videtur, praecedente triplo minor.
Antennae filiformes, corpore breuiores, articulis breuibus, cylindricis. Caput et thorax lae-
uia, testacea, immaculata. Elytra punctato-
striata, testacea, ante apicem late atra. Corpus
et pedes testacea.

ferrugineus 3. A. testaceus, thorace punctato, elytris striato-
punctatis.

Habitat in Sumatra. D. Daldorff. Mus. D. de Se-
hestedt.

Statura omnino A. grossi, at duplo fere minor.
Antennae cylindricae, fuscae: articulo primo
breui, crassiori, rotundato. Caput et thorax
punctata, obscure testacea, immaculata. Elytra
obscure testacea, striata et inter strias linea ge-
minata e punctis impressis. Corpus et pedes
ferruginea,

99. SAGRA. Palpi inaequales, filiformes.
Maxilla cornea, videntata.
Labium breue, corneum, rotun-
datum, ciliatum, fissum.

femorata.

1. S. viridi-aenea, femoribus tibiisque posticis den-
tatis. Ent. syst. 2. 51. 1. * Web. Inf. 60. 1.

Tenebrio femoratus. Drury Inf. 2. tab. 34. f. 5.

Tenebrio viridis. Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 8.

Habitat in India. 2. S.

Sagrae corpus magnum, crassum, ouatum, glabrum, immar-
ginatum, tardum; capite magno, cylindrico, inserto; ocu-
lis oblongis, transversis, medio margini insertis; antennis
distantibus, corpore breuioribus, ante oculos insertis; tho-
race rotundato, angusto, subcylindrico, immarginato; scu-
tello minuto, rotundato; elytris rigide, fornicateis, longi-
tudine abdominis; pedibus cursoriis; femoribus posticis
incrassatis, dentatis; tibiis incuruis, saepius dentatis;
tarsis triarticulatis: articulis cordatis; colore nitido.

2. S. cyaneo - purpurea, femoribus posticis dentatis, *splendida*.
tibiis apice sinuatis.

Sagra splendida. Web. Inf. 61. 2.

Habitat in China.

Statura omnino praecedentis, at color omnino distinctus, totus purpureus, cyaneus - nitidus.

Antennae nigrae. Tibiae apice sinu magno excavatae

3. S. purpurea, nitida, femoribus posticis unidentata- *purpurea*.
tis, tibiis integris.

Sagra purpurea. Web. Inf. 61. 3.

Habitat in China.

Diu marem praecedentis credidi, qua duplo fere minor. Differt tamen femoribus posticis tantum unidentatis tibiisque haud sinuatis.

4. S. cyanea, elytris aureis, tibiis posticis medio unidentatis. *fulgida*.

Sagra fulgida. Web. Inf. 62. 5.

Habitat in China. D. Weber.

- Statura omnino praecedentium. Corpus, caput, thorax cyaneo - nitida, immaculata. Tibiae quatuor anticae incurvae. Femora postica incrassata, tridentata: dente medio maiori, tibiae incurvae, ante apicem unidentatae.

5. S. obscure viridis, femoribus posticis bidentatis, *tristis*.
tibiisque unidentatis.

Habitat in Cayenna.

Statura et summa affinitas praecedentium. Antennae corpore breuiores, cyanae. Caput, thorax, elytra obscure viridia, minime nitida. Abdomen subtus basi macula media villosa, aurea. Femora postica incrassata, basi interiori macula magna aurea, apice bidentata: dente posteriori longiore. Tibiae incurvae, apice unidentatae.

6. S.

*dentipes.*6. *S. nigra*, femoribus tibiisque posticis dentatis.

Ent. syst. 2. 52. 2. *

Sagra dentipes. Web. Inf. 63. 6.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Schulz.

Tibiae posticae apice sinuatae.

Species Sagrae omnes valde affines et forte merae varietates, quamvis colore pedumque dentibus differunt.

100. CLYTHRA. *Palpi* quatuor inaequales filiformes.*Ligula* brevis, membranaeae, emarginata.*Antennae* breves, ferratae*longipes.*1. *C. nigra*, obscura, elytris pallidis; maculis tribus nigris, pedibus anticis elongatis. Ent. syst. suppl. 109. 1.*Clythra longipes.* Laichart. 1. 166. 1.*Cryptocephalus longipes.* Ent. syst. 2. 52. 1.

Schaeff. Icon. tab. 6. fig. 3.

Habitat in Germaniae Corylo.

*punctata.*2. *C. nigro-cyanea*, elytris testaceis; punctis tribus nigris, pedibus anticis elongatis. Ent. syst. suppl. 110. 2.*Cry*

Clythrae corpus paruum, immarginatum, cylindricum, saepius glabrum, tardum; capite parvo, retracto, inserto, obtuso; oculis oblongis, marginalibus, vix prominulis; antennis thoracis longitudine, ferratis, distantibus, ante oculos insertis; thorace transverso, rotundato; margine dorsali flexo; scutello minuto, rotundato; elytris rigidis, fornicatis, abdominis longitudine; pedibus validis, anticis mesosculorum saepius elongatis; tarsis quadriarticulatis: articulo penultimo bifido; colore vario.

Cryptocephalus 3punctatus. Ent. syst. 2. 53.
2. ♀.

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

3. *C. ferruginea*, thorace macula, elytris flavescentibus: fascia apiceque atris. *curvata*.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Antennae breves, crassae, atrae. Caput flavum, macula inter oculos transversa, atra. Thorax laevis, rufescens, macula magna, atra. Elytra punctata, flavescentia, fascia extus ad basin dilatata, apiceque late atris. Corpus ferrugineum: tibiis incurvis nigris.

4. *C. flavescens*, thoracis macula elytrisque late atris. *curvipes*.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.

Media. Antennae nigrae. Caput flavum, vertice nigro. Thorax laevis, flavus: macula magna dorsali nigra. Elytra punctata, basi oblique flava, apice ultra medium atra. Corpus flavum, femoribus incrassatis, compressis, tibiisque incurvis, nigris.

5. *C. flavescens*, thoracis macula, elytris macula basales fasciaque atris. *tibialis*.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Statura et summa affinitas praecedentis. Differt tantum elytris macula magna basales, fasciaque media, lata, atris.

6. *C. flavescens*, thorace punctis quatuor, elytris fasciis quatuor nigris: anticis duabus obliquis. *obliqua*.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.

Sta.

Statura praecedentis, paullo minor. Antennae nigrae, ferraturis flavis. Caput flavum, puncto verticali atro. Thorax obscure flavescens, punctis quatuor nigris. Elytra punctata, flava: fasciis duabus, baseos obliquis duabusque pone medium nigris. Corpus flavescens.

palliata.

7. *C. atra*, elytris dilatatis, testaceis: punctis duobus fasciaque media atris.

Habitat in India orientali. D. Daldorff. Mus. D. Lund.

Magna. Antennae valde ferratae, nigrae, basi ferrugineae. Caput atrum. Thorax ater, margine laterali interdum rufo. Elytra laevia, testacea, puncto baseos, fascia media punctoque ante apicem atris. Elytra valde dilatata, abdomine multo latiora, margine parum angulato. Corpus atrum.

hirta.

8. *C. villosa*, cyanea, elytris rufis: punctis tribus nigris.

Habitat in Marocco. Mus. D. de Sehestedt.

Paullo maior *C. tripunctata*, ei affinis, at magis hirta et elytra rufa. Puncta elytrorum 1. 2.

fasciata.

9. *C. thorace ferrugineo-nigro*, bipunctato, elytris testaceis: macula baseos fascia margineque postico atris.

Habitat in Guinea. Mus. D. Lund.

Magnitudo et statura omnino *C. tripunctatae*. Caput nigrum. Antennae breves, ferratae, nigrae, basi rufae. Thorax glaber, rufus, nitidus: punctis duobus nigris. Elytra laevia, testacea: macula magna baseos, fascia pone medium lata, margineque postico atris. Corpus nigrum, argenteo-tomentosum.

10. *C.*

10. *C. nigra*, thorace rubro immaculato, elytris rubris: punctis tribus nigris. Ent. syst. suppl. 6 *maculata*.

110. 3.

Cryptocephalus 6maculatus. Ent. syst. 2. 53. 5.*

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

11. *C. flava*, thoracis basi et elytrorum fasciis tribus *argentata* atris.

Habitat in Guinea. Mus. D. de Sebestedt.

Magna. Caput nigrum, albo - villosum. Thorax niger, margine antico et laterali lineaque media flavis. Elytra flava, fasciis tribus latis, subdentatis, obliquis atris: tertia terminali. Macula una alteraue coccinea, marginalis in colore flavo. Corpus argenteo - villosum.

12. *C. cinereo-fericea*, thorace rubro immaculato, elytris rubris: punctis tribus nigris; medio maiori transverso. *6notata*.

Habitat in noua Cambria. D. Billardiere.

C. 6maculata duplo minor. Antennae breues, serratae, nigrae, basi ferrugineae. Caput nigrum, orbita oculorum cinereo-fericea. Thorax rubrus, immaculatus. Elytra laeuis, rubra, puncto paruo nigro, ad marginem exteriorem basios, maiori transverso in medio et tertio ad futuram versus apicem. Corpus nigrum, cinereo-fericeum.

13. *C. nigra*, elytris rubris: punctis duobus nigris. *4punctata*. Ent. syst. suppl. 110. 4.

Cryptocephalus 4punctatus. Ent. syst. 2. 54. 6.*

Chrysomela 4punctata. Linn. syst. Nat. 2. 596. 76. Fn. Sv. 547.

Geoff. Inf. 1. 195. tab. 3. fig. 4.

Degeer Inf. 5. 392. 32. tab. 10. fig. 7.

Schaeff.

Schæff. Icon. tab. 6. fig. 1. 2.

Payk. Fn. Sv. 2. 128. 1.

Habitat in Europæ Corylo frequens.

Differt interdum puncto posteriori transverso, se
fasciam constituyente.

Larva faccata: sacco ovato scabro, antice obliq
truncato. Schall. Act. Hall. 1.

picta.

14. *C. flava*, thorace maculato, elytris vittis duab
postice coëuntibus nigris.

Habitat in Guinea. Mus. D. Lund.

Magna. Antennæ breves ferratæ, nigrae, b
pallidæ. Caput nigrum. Thorax glaber, ni
dus, flavus, maculis duabus dorsalibus, margi
postico lunato nigro connexis. Elytra niti
flava, vittis duabus, quarum interior. bas
haud attingit, pone medium fere in fasciam d
latatis, coëuntibus, et postice in vnicum te
minantibus. Corpus nigrum, cinereo-nitid
lum, pedibus anticis elongatis.

anotata.

15. *C. cyaneo-nigra*, elytris rubris: maculis du
bus cyaneis. *Sub. Suppl. no 5*

Cryptcephalus anotatus. Ent. syst. 2. 54. 7.

Habitat in Barbaria. D. Prof. Vahl.

3maculata.

16. *C. nigra*, cinereo-villosa, elytris rubris: macul
tribus cyaneis: posteriore maiore transverso
Ent. syst. suppl. 110. 6. *

Habitat in India orientali. D. Daldorff. Mus. I
de Sehestedt.

rugosa.

17. *C. atra*, elytris testaceis: fasciis duabus atr
Ent. syst. suppl. 110. 6. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lund.

*Atrapha-
xidis.*

18. *C. nigra*, thorace rubro trimaculato, elytris te
staceis: maculis tribus nigris, tibiis rubis. Ent
syst. suppl. 110. 8.

(7)

Cryptocephalus Atraphaxidis. Ent. syst. 2. 54.

9. *

Chrysomela Atraphaxidis. Pall. Iter. 2. 725. 65.

Habitat in Sibiriae Atraphaxide. Mus. D. Banks.

C. viridi-cyanea, thorace elytrisque elevato-*monstrosa*
tuberculatis. Ent. syst. suppl. III. 9. *

Clythra monstrosa. Oliv. Inf.

Habitat in Cayenna. Mus. D. Bosc.

C. obscura, thorace elytrisque elevato-tubercu-*plicata*
latis. Ent. syst. suppl. III. 10. *

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

C. nigra, thorace gibbo, elytris tuberculatis. *gibber*.
Ent. syst. suppl. III. 11. *

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

C. atra, thorace elytrisque rufis nigro-*impressa*.
punctatis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.

D. de Sehestedt.

Statura praecedentium, at parua. Corpus atrum.

Thorax ruber, maculis quatuor impressis, ni-

gris; dorsalibus duabus maioribus, sinuatis.

Elytra inaequalia, rufa, punctis quatuor aut
quinque nigris impressis. Anus obtusus.

C. atra, thorace gibbo, striato-*crifata*, elytris
rugosis, tuberculatis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.

D. Lund.

Minuta. Statura praecedentium tota atra, imma-

culata. Thorax striatus, gibbus, in medio cari-

natus. Elytra rugosa, tuberculis plurimis ele-

uatis.

C. atra, nitida, elytris flavis: lunula, fascia *lunulata*.
punctoque apicis nigris. Ent. syst. suppl. III. 12.

12.

T. II.

C

Cry-

- Cryptocephalus lunulatus*. Ent. syst. 2. 55. 10.
Habitat - - Mus. D. Banks.
- maculata* 25. *C. nigra*, thorace elytrisque rubris: punctis quatuor nigris. Ent. syst. suppl. 112. 13.
Cryptocephalus maculatus. Ent. syst. 2. 51. 11. *
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.
- obsita*. 26. *C. testacea*, antennis elytrorumque margine nigris. Ent. syst. suppl. 112. 14. *
Cryptocephalus obsitus. Ent. syst. 2. 55. 12.
Habitat in America. Dom. Drury.
- tridentata*. 27. *C. coerulescens*, elytris testaceis: puncto humerali nigro. Ent. syst. suppl. 112. 15.
Cryptocephalus tridentatus. Ent. syst. 2. 51. 14. *
Chrysomela tridentata. Linn. syst. Nat. 2. 59. 73. Fn. Sv. 546.
W. 51. Geoff. Inf. 1. 196. 3.
~~Degeer Inf. 5. 333. 36. tab. 10. fig. 19.~~
Schaeff. Icon. tab. 77. fig. 5.
Payk. Fn. Sv. 2. 129. 2.
Habitat in Lonicera Xylosteo.
Pedes anteriores marium elongati.
- dominicana* 28. *C. nigra*, elytris punctatis basi gibbere notatis. Habitat in Carolina. Mus. D. Bose.
Media. Corpus totum nigrum, obscure nitidum, subtus cinereo-holofericeum. Elytra punctata gibbere ad marginem exteriorem notata.
- taxicornis*. 29. *C. obscure cyanea*, elytris testaceis immaculatis, antennis elongatis ferratis. Ent. syst. suppl. 112. 16. C.

Clythrae genus *Cryptocephalis* valde affine. Characteres generis naturalem in *Entomologiae systematicae supplemento* dedi.

Cryptocephalus taxicornis. Ent. syst. 2. 56.

15.

Payk. Fn. Sv. 130. 3.

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

0. *C. cyanea nitida*, elytris rufis, immaculatis. *decora.*

Habitat in India orientali. Mus. D. Lund.

Statura *C. taxicornis*, at omnino distincta. (caput et thorax cyanea, nitida. Elytra substriata, rufa. Corpus cyaneum.

1. *C. thorace testaceo*, basi cyaneo, elytris testaceis: *bifasciata.*
puncto fasciaque media cyaneis.

Clythra bifasciata. Illig. Wied. Arch. 1. 2. 130.

24.

Habitat in Sumatra. D. Daldorff.

Magnitudo et statura *C. taxicornis*. Antennae breves, valde ferratae, obscurae. Caput cyaneum, nitidum. Thorax laevis, testaceus, basi cyaneus, nitidus, qui color marginem tamen haud attingit. Scutellum cyaneum, apice recurvum. Elytra laevis, puncto parvo bascos, quod interdum deest, fasciaque media, margines tamen haud attingente, cyaneis, nitidis. Corpus cinereo-pubescens. Pedes testacei, femoribus cyaneis.

2. *C. nigra*, thorace rubro, immaculato, elytris *disti-*
maculis tribus cyaneis: postica maiori trans-
uerfa. *notata.*

Habitat in Tanger. D. Schousboe. Mus. D. de Sehestedt.

Media. Antennae breves, ferratae Caput nigrum. Thorax laevis, rufus, immaculatus. Elytra vix punctata, testacea, nitida, punctis tribus: 2 bascos, tertio in medio, maiori transuerso, fere quadrato. Corpus nigrum.

C 2

33. C.

signata. 33. *C. atra*, elytris ferrugineis: punctis quatuor nigris.

Habitat in Tanger. D. Schousboe. Mus. D. Lund. Magna. Antennae breues, valde ferratae. Caput et thorax laeuis, atra, nitida, immaculata. Elytra vix punctata, rufa, punctis quatuor nigris 2. 2. oblique positis. Corpus nigrum.

punctata. 34. *C. nigra*, thorace rufo, elytris testaceis: punctis quatuor nigris. Ent. syst. suppl. 112. 17. *Cryptocephalus punctatus.* Ent. syst. 2. 56. 18. *

~~Nat. Hist. 24. 17. 22. tab. 1. fig. 22.~~

Habitat in Barbariae plantis. D. Prof. Vahl.

maxilloso. 35. *C. capite* thoraceque fuluis, elytris flavis: puncto baseos scutelloque nigris. Ent. syst. suppl. 112. 18.

Cryptocephalus maxilloso. Ent. syst. 2. 56. 19. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

aurita. 36. *C. atra*, thorace vtrinque macula lutea, tibiis flavis. Ent. syst. suppl. 112. 19.

Cryptocephalus auritus. Ent. syst. 2. 57. 20. *

III. 40. *Chrysomela aurita.* Linn. syst. Nat. 2. 256. 75.

Herbst. Arch. tab. 44. fig. 5.

Habitat in Saxoniae Corylo.

Lentisco. 37. *C. coerulea*, elytris sanguineis: maculis coeruleis, cicatrisantibus. Ent. syst. suppl. 113. 20.

Cryptocephalus Lentisco. Ent. syst. 2. 57. 21. *

Chrysomela variolosa. Linn. syst. Nat. 2. 591. 33.

Habitat in Africae Lentisco. Mus. D. Desfontaines.

immaculata. 38. *C. rufa*, capitis basi elytrorumque maculis duabus cyaneis. Ent. syst. suppl. 113. 21.

Cryptocephalus immaculatus. Ent. syst. 2. 57. 23. *

Chry

af. II. 3. III. 165

~~*Chrysemela 4-naculata*~~ Linn. syst. Nat. 2. 596.

77.

Schaeff. Icon. tab. 6. fig. 67.

Habitat in Saxoniae Corylo.

39. *C. nigra*, thorace rubro: maculis duabus, elytris *turcicae*.
flavis, macula, fascia media punctoque apicis
nigris.

Habitat in India orientali. D. Daldorff. Mus. D.
de Sehestedt.

Paullo maior *C. longimana*. Caput nigrum, an-
tennis breuibus, ferratis. Thorax rotundatus,
rufus: lunula magna in ipsa basi, punctisque
duobus basi connexis, nigris. Elytra punctata,
testacea, macula magna baseos, fascia lata, me-
dia punctoque apicis nigris. Corpus nigrum,
cinereo-holosericum.

40. *C. obscure aenea*, elytris testaceis: puncto ba- *longimana*.
seos nigro. Ent. syst. suppl. 113. 22.

Cryptocephalus longimanus Ent. syst. 2. 58. 25.

~~*Chrysemela longimana*~~ Linn. syst. Nat. 2. 599.

95.

Payk. Fn. Sv. 2. 131. 4.

Habitat in Sueciae Trifolio montano, *Euphorbia*
cypariffia.

Pedes in altero sexu elongati.

Larva glabra, faccata: sacco pyriformi, piloso,
fusco.

41. *C. rufa*, elytris fuscis, cyaneo-nitidulis, pedi- *Lar*.
bus anticis elongatis. Ent. syst. suppl. 113. 23.

Cryptocephalus Lar. Ent. syst. 2. 58. 26. *

Habitat in America meridionali. Mus. Dr. Hunter.

42. *C. nigra*, obscura, elytris macula humerali rufa. *humeralis*.
Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Media.

- Media.** Caput et thorax subpunctata, nigra, aene parum nitidula. Elytra substriata, nigra, puncto magno humerali, rufo.
- plagioccephala.** 43. *C. nigra*, thorace elytrisq[ue] testaceis, capite crassiusculo. Ent. syst. suppl. 113. 24. *
Cryptocephalus plagioccephalus. Ent. syst. 1. 60. 37. *
 Habitat in Gallia meridionali. Mus. D. de Sebestedt.
- pallens.** 44. *C. nigra*, cinereo-villosa, thorace elytrisq[ue] pallidis. Ent. syst. suppl. 114. 25.
Cryptocephalus pallens. Ent. syst. 2. 61. 39. *
 Habitat in China. Dr. Pflug.
- ruficollis.** 45. *C. nigra*, thorace rufo, elytris testaceis, pedibus anticis elongatis, femoribus apice unidentatis. Ent. syst. suppl. 114. 26.
Cryptocephalus ruficollis. Ent. syst. 2. 61. 42.
 Habitat in Europa australiori. D. Prof. Helwig.
- nigripes.** 46. *C. capite* thoraceq[ue] rufis, elytris pallidis, pedibus apice nigris. Ent. syst. suppl. 114. 27.
Cryptocephalus nigripes. Ent. syst. 2. 61. 43.
 Habitat in America.
- brunnea.** 47. *C. brunnea*, antennis, corpore pedibusq[ue] nigris.
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.
 Parua. Antennae crassae, nigrae, basi ferruginea.
 Caput et thorax sublaevia, brunnea, obscura.
 Elytra punctato-striata, brunnea, immaculata.
 Variat corpore pedibusq[ue] rufis.
- coerulans.** 48. *C. cyanea*, nitida, antennis fuscis.
Cryptocephalus coerulans. Ent. syst. 2. 62. 45.
 Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. D. Banks.

49. *C. rubro-cuprea*, nitida, subtus cyanea. Ent. *cuprea*.
 syst. suppl. 114. 28.

Cryptocephalus cupreus. Ent. syst. 2. 62. 47.*

Habitat in Cayenna. D. v. Rohr.

50. *C. cyanea*, thorace pedibusque rufis. Ent. syst. *cyanea*.
 suppl. 114. 29.

Cryptocephalus cyaneus. Ent. syst. 2. 63. 52.* *IV. 52*

Geoff. Inf. 1. 197. 4.

Habitat in Gallia. D. Mallet. *Brunswigica*
in corolla

51. *C. cyanea*, ore thoracis marginibus pedibusque *bucephala*.
 rubris. Ent. syst. suppl. 114. 30.

Cryptocephalus bucephalus. Ent. syst. 2. 63. *IV. 52*

54.*

Chrysomela bucephala. Schall. Act. Hall. 1.

276.

Habitat in Anthyllide vulneraria Saxoniae.

52. *C. nigra*, thorace rufo, elytris rufis: fasciis dua- *Scopolina*.
 bus cyaneis, pedibus nigris. Ent. syst. suppl.

114. 31.

Cryptocephalus Scopolinus. Ent. syst. 2. 68. 79.* *IV. 52*

Chrysomela Scopolina. Linn. syst. Nat. 2. 597.

81.

~~Panz. Naturf. 24. 17. 23. tab. 1. fig. 23.~~ *Sp. Helyt. 11. 12. 13. 165*

Habitat in America et Europa australi.

53. *C. rufa*, elytris punctis duobus coerulefcentibus. *Koenigii*.
 Ent. syst. suppl. 114. 32.

Cryptocephalus Koenigii. Ent. syst. 2. 68. 80.*

Habitat Tranquebariae. Dr. Koenig.

54. *C. elytris flavis*: lineola punctisque tribus ni- *paracenthe-*
 gris. Ent. syst. suppl. 115. 33. *sis.*

Cryptocephalus paracenthesis. Ent. syst. 2. 68.

81.*

Chry-

Chrysomela paracenthesis. Linn. syst. Nat. 4
1066. 1.

Habitat in Europae Salice, Betula.

bicolor.

55. *C. atra*, capite thoraceque flavis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus
D. de Sehestedt.

Antennae breves, crassae, ferratae, nigrae, basi
ferrugineae. Caput et thorax laevia, fulva, ni-
tida. Elytra striata, nigra. Corpus nigrum, fe-
moribus, inprimis anticis, fulvis.

apustulata.

56. *C. atra*, capite, thorace elytrorumque macula di-
sci rufis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Statura et summa affinitas praecedentis, et forte
mera eius varietas. Differt inprimis puncto
elytrorum ferrugineo. Femora antica rufa.

punctulata.

56. *C. atra*, nitida, elytris punctatis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.

Statura et summa affinitas *C. nitidulae*, at anten-
nae et pedes concolores, et elytra magis pun-
ctata.

nitidula.

57. *C. atra*, aeneo-nitida, antennis flavescens.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Antennae flavescens, apice parum fuscae. Ca-
put, thorax et elytra laevia, glabra, atra,
aeneo-nitida. Corpus cum pedibus atrum.

concolor.

58. *C. viridi-aenea*, nitida, antennis basi flavescen-
tibus, fronte impressa. Ent. syst. suppl. 115.

35.

Cryptocephalus concolor. Ent. syst. 2. 69. 83. •

Habitat in Europa.

59. *C.*

Sp. *C. aenea*, nitida, fronte cuprea: Ent. syst. suppl. *Hordei*.

115. 34.

Cryptocephalus aeneus. Ent. syst. 2. 69. 82. *

Habitat in Barbariae Hordeo murino. D. Prof.

Vahl.

101. CRYPTOCEPHALVS. *Palpi* quatuor filiformes.

Maxilla videntata.

Maxilla videntata.

Labium corneum, integrum.

Antennae filiformes.

1. *C. niger*, thorace elytrisque rufis, elytris punctis *elatus*. duobus nigris.

Habitat in Tanger. D. Schousboe. Mus. D. de Sehestedt.

Gigas in hoc genere. *Antennae* nigrae, basi rufae. Caput nigrum, immaculatum. Thorax rotundatus, laevis, rufus, nitidus. Scutellum atrum. Elytra subpunctata, rufa, punctis duobus nigris, bases humerali, posteriore pone medium. Corpus nigrum, cinereo-villosum.

2. *C. rufus*, elytris punctato-friatis: punctis *trifigatus*. tribus nigris.

Habi-

Cryptocephali corpus paruum, cylindricum, antice posticeque obtusum, glabrum, immarginatum, tardum; capite plumpo, inserto; oculis rotundatis, marginalibus; antennis thorace longioribus, distantibus, ante oculos insertis; thorace browni, rotundato, transverso; scutello paruo, rotundato; elytris rigidis, fornicatis, abdomine vix longioribus; pedibus validis, longiusculis, concoloribus; tarsis quadrangulatis; colore vario, saepius nitido.

- Habitat Tranquebariae. D. Daldorff. Mus. D. Lund.
Corpus magnum, rufum. Thorax gibbus, nitidus.
Elytra punctato-friata, punctis tribus nigris
1. baseos 2. in medio. Pedes rufi.
- Salsis. 3. *C. ater*, nitidus, elytris rufis: punctis tribus nigris. Ent. syst. 2. 53. 3. *
Habitat in Saxonia. Dom. Hybner.
- 6notatus.* 4. *C. ater*, elytris testaceis: punctis duobus lineae laeque postica nigris. Ent. syst. 2. 53. 4. *
Habitat in Barbaria. Mus. D. Desfontaines.
- laetus.* *Mij. III. 166*
5. *C. viridi-aeneus*, elytris testaceis: maculis duobus nigris. Ent. syst. 2. 54. 8. *
IX. Habitat in Saxonia. Dom. Hybner.
- lineatus.* 6. *C. rufescens*, thorace maculis, elytris lineis duobus nigris. Ent. syst. 2. 55. 13. *
Habitat in Brasilia. Mus. D. Banks.
- venustus.* 7. *C. griseo-fuscus*, thorace margine maculis duobus flavis, elytris flavis: vittis duabus nigris. Ent. syst. 2. 56. 16. *
Habitat in America. Mus. Dr. Hunter.
- 6guttatus.* 8. *C. ater*, glaber, elytris punctis sex albis. Ent. syst. suppl. 105. 17. *
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lund.
- Gorteriae.* 9. *C. ater*, glaber, thorace elytrisque punctis quatuor flavescentibus. Ent. syst. 2. 56. 17.
Chrysomela Gorteriae. Linn. syst. Nat. 2. 596. 74. Amoen. acad. 6. 394. 16.
Habitat in Gorteria Cap. Bon. Spei.
- modestus.* 10. *C. thorace rufo*, elytris flavis rufo-lineatis.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.
Medius. Antennae elongatae, ferrugineae, apice fuscas. Caput et thorax glabra, rufa, nitida.
Elytra

Elytra flava, nitida, lineis numerosis. punctatis, rufis: intermediis duabus ante apicem coeuntibus. Corpus flavescens.

11. *C. rufus*, elytris maculis tribus nigris: anteriore *didymus*.
postice didyma. Ent. syst. 2. 57. 22. *
Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.
12. *C. niger*, thorace fuluo: punctis sex nigris, elytris pallidis: punctis duobus. *flauicollis*.
Ent. syst. 2. 58. 24. *
Habitat in Sibiria. Mus. D. Banks.
13. *C. nigro-aeneus*, elytris flauis: margine nigro. *marginatus*.
Ent. syst. 2. 58. 27. *
Cryptocephalus phaleratus. Act. Hall. 1. 216.
Panz. Fn. Germ. 68. tab. 1. *est foveicinus, capis VI. 11.*
Habitat in Germaniae plantis. *mas. C. flauicollis*
1857 Swiz. mag. III.
14. *C. niger*, elytris testaceis: puncto humerali nigro. *humeralis*.
Habitat in Mauritania. D. Schousboe. Mus. D. de
Sehestedt. *variet. C. notabi. Aug. III.*
Statura et magnitudo praecedentis. Caput, thorax, corpus nigra, obscura, immaculata. Elytra vix punctata, testacea, puncto humerali nigro.
Variat puncto postico vno alteroue elytrorum.
15. *C. thorace elytris que obscure aeneis, pubescen-* *pubescens*.
tibus. Ent. syst. 2. 58. 28. *
Habitat in America boreali.
16. *C. niger*, nitidus, elytris rubris: punctis duobus nigris, antennis longitudine corporis. *apunctatus*.
Ent. syst. 2. 59. 29. *VI. 11*
Chrysomela apunctata. Linn. syst. Nat. 2. 597.
78. Fn. Sv. 548.
Geoff. Inf. 1. 234.
Degeer Inf. 5. 332. 35.

Panz.

- Panz. Fn. Germ. 68. tab. 2.
 Payk. Fn. Sv. 2. 142. 15.
 Schaeff. Icon. tab. 8. fig. 8.
 Petiv. Gazoph. tab. 31. fig. 4.
 Habitat in Europae Corylo.

lineola.

17. *C. ater*, nitidus, elytris rubris: linea media atra, antennis longitudine corporis. Ent. syst. 2. 59. 30.*

Chrysomella apunctata. Fn. Sv. 548. β.

Cryptocephalus dispar. Payk. Fn. Sv. 2. 143. 15. β.

17.

Habitat in Europae Corylo.

Forme mera praecedentis varietas.

amaculatus.

18. *C. niger*, obscurus, thorace fulvo, elytris testaceis: punctis duobus nigris. Ent. syst. 2. 59. 31.*

~~*Chrysomella melanocephala*. Act. Hall. 1. 272.~~

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

cordiger.

19. *C. C.* thorace variegato, elytris rubris: punctis duobus nigris. Ent. syst. 2. 59. 32.

Chrysomella cordigera. Linn. syst. Nat. 2. 598. 79. Fn. Sv. 588.

Geoff. Inf. 1. 235. 2.

Payk. Fn. Sv. 2. 133. 7.

II. 90

Panz. Fn. Germ. 13. tab. 6.

Degeer. Inf. 5. 330. 33.

Schaeff. Icon. tab. 30. fig. 1.

Habitat in Europae Corylo, Salice.

Thorax ater, lateribus albis: puncto nigro. Linea dorsalis antica alba, terminatur postice in maculam cordatam, distinctam.

- variabilis.* 20. *C.* thorace atro, albo-trilineato, elytris rubris: punctis tribus nigris. Ent. syst. suppl. 105. 32.*

Cry-

Cryptocephalus variabilis. Schneid. Magaz. 2.

36. 5.

Panz. Fn. Germ. 13. tab. 7.

Habitat in Germaniae Salice.

21. *C. niger*, thorace lineis tribus flanis. Ent. syst. *trilineatus*.

suppl. 105. 32. *

Habitat in Germania.

NE 21-27. 25 / inst
variet. C. n. punctatus. Illig. 3.
Bothnicus, & f. variabilis

22. *C. ater*, thorace linea longitudinali rubra. Ent. *Bothnicus*.

syst. 2. 59. 33. *

Panz. Fn. Germ. 68. tab. 3.

Chrysomela Bothnica. Linn. syst. Nat. 2. 598.

90. Fn. Sv. 557.

Cryptocephalus varians. Payk. Fn. Sv. 2. 148.

21.

Pl. H.

Herbst. Arch. tab. 44. fig. 8.

Degeer Inf. 5. 335. 39.

Habitat in Sueciae Salice.

variet. praeval.

23. *C. ater*, capite, thorace pedibusque rufis, tho- *frenatus*.
race punctis duobus ^{notis} ~~lineis~~. Ent. syst. 2. 60.

34. *

Panz. Fn. Germ. 68. tab. 4.

Habitat in Austria. D. Schneider.

variet. f. rufus - Pl. 12
reducti

24. *C. niger*, obscurus, elytris subreticulatis. Ent. *luridus*.

syst. suppl. 106: 34. *

Habitat in America boreali. D. Mauerhoff.

25. *C. ater*, thorace punctato; elytris sulcatis: ful- *impressus*.
cis rugosis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.

D. de Sehestedt.

Thorax punctis numerosissimis impressus. Elytra
striis elevatis, hinc inde interruptis, sulcata sul-
cis rugosis.

26. *C. niger*, thorace elytrisque testaceis; futura *Coryli*.
aigra. Ent. syst. 2. 60. 38. *

Chry-

Pl. 12

- Sallus fley. mit*
Sifusung Horaf
nd. ind. v. 2
dm. C. V. 1872
Subg.
- Chrysomela Coryli.* Linn. syst. Nat. 2. 598. 88.
 Fn. Sv. 555.
 Panz. Fn. Germ. 68. tab. 6.
 Payk. Fn. Sv. 2. 137. 10.
 Habitat in Europae Corylo.
- variegatus.* 27. *C. niger*, thorace linea dorsali abbreviata, marginibusque rubris, elytris testaceis. Ent. syst. 2. 61. 40. *
Cryptocephalus variegatus. Payk. Fn. Sv. 2. 135. 8. *Panz. vol. 3. tab. 8*
 Habitat in Italia. Dr. Allioni.
- trifasciatus* 28. *C. supra testaceus*, thorace, fascia, elytris tribus nigris. Ent. syst. 2. 61. 41. *
 Habitat in China. Dr. Pflug.
- imperialis.* 29. *C. ater*, nitidus, elytris testaceis: punctis quinque nigris. Ent. syst. suppl. 106. 44. *
Cryptocephalus imperialis. Laichart. Tyrol. 49. 16.
 Habitat in Gallia. Mus. D. Bosc.
- 6punctatus.* 30. *C. niger*, thorace variegato, elytris rubris: maculis tribus nigris. Ent. syst. 2. 62. 44. *
Chrysomela 6punctata. Linn. syst. Nat. 2. 599. 92. Fn. Sv. 559.
 Degeer Inf 5. 331. 34. tab. 10. fig. 9.
 Sulz. Inf. tab. 3. fig. 18.
 Schaeff. Icon. tab. 30. fig. 3.
 Panz. Fn. Germ. 68. tab. 7.
 Payk. Fn. Sv. 2. 136. 9.
 Habitat in Europae plantis.
- flauescens.* 31. *C. supra flauescens*, elytris punctis quinque nigris: marginalibus distinctioribus. Ent. syst. 4. App. 448. 33. *
 Habitat in Germania. D. Smidt.

32. *C. rufus*, elytris flavis: vittis duabus abbreviatis atris. Ent. syst. suppl. 106. 44. *
Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.
33. *C. nigro-cyaneus*, antennis pedibusque nigris, *violaceus*.
elytris substriatis. Ent. syst. 2. 62. 46. *
Habitat in Germania. D. Smidt. IX.
34. *C. rufus*, elytris rufo nigroque variis. Ent. syst. *congestus*.
suppl. 107. 44. *
Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.
35. *C. rufus*, elytris oblique striatis, pedibus flavescentibus. *obliquus*.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.
Statura omnino *C. congesti*. Thorax laevis, rufus, nitidus, immaculatus. Elytra uti in *C. congesto* oblique striata, rufa. Pedes flavescentes.
36. *C. cyaneus*, nitidus, fronte, thoracis fascia femoribusque rubris. Ent. syst. 2. 62. 48. *
Habitat - - Dom. Prof. Leske. *rubrifrons*.
37. *C. violaceus*, capite, thorace femoribusque dentatis rufis. Ent. syst. 2. 62. 49. *
Habitat in Sierra Leon. Mus. D. Banks. *calcaratus*.
38. *C. aeneus*, cupro-nitidus, femoribus posticis dentatis. *dentipes*.
Habitat Tranquebariae. Mus. D. de Sehestedt.
Statura *C. calcarati*, at minor. Antennae nigrae. Caput et thorax punctata, viridi-aenea. Elytra punctata, aenea, cupro-nitida. Corpus aeneum, femoribus posticis dente paruo, acuto.
39. *C. obscure cyaneus*, tibiis posticis apice lobatis. *lobatus*.
Ent. syst. 2. 63. 50. *
Panz. Fn Germ. 13. tab. 9. II, 31.
Habitat in Hungaria. D. Hybner. 40. C.

cinctus. 40. *C. capite thoraceque rufis, elytris nigris: margine rufo.* Ent. syst. 2. 63. 53. *

Habitat in America meridionali. Mus. Dr. Hunter.

Billardieri 41. *C. flavus, thorace punctis duobus, coleoptris vittis tribus atris.*

Habitat in noua Cambria. D. Billardiere.

Statura parua *C. Sehestedtii*. Antennae basi flavae, apice fuscae. Caput laete flavum, oculis clypeoque nigris. Thorax gibbus, flavus: punctis duobus atris. Elytra glabra, laevia, flava: vitta media futuraque late atris, apicem tamen haud attingentibus. Scutellum flavum. Abdomen atrum, pedibus atris,

Billardiere, Professor Parisiensis, Botanicus eximius, qui Insecta Syriae et Australiae collegit, communicavit.

Lundii. 42. *C. supra testaceus, oculis atris.* Ent. syst. suppl. 107. 54.

Habitat Tranquebariae, Mus. D. Lund.

Dom. Lund, amicissimus Norwagus, miram Insectorum copiam collegit, benevole communicavit.

Sehestedtii. 43. *C. capite thoraceque rufis, nitidis, elytris flavis: vitta lata atra.* Ent. syst. suppl. 107. 54. *

Habitat in India orientali, D. Daldorff. Mus. D. de Sehestedt.

Dom. de Sehestedt, Norwagus, cubicularius Regis, Lundio mihiq̄ue amicitia iunctus, insecta vndiquaque coërcet, in Museo disponit.

Vahlii. 44. *C. rufus, thorace maculis duabus atris, elytris atris: fascia punctoque rufis.* Ent. syst. suppl. 108. 54. *

Habitat in India orientali. Mus. D. Lund.

Dom.

Dom. Vahl, Professor Hafniensis, Botanicorum
princeps, Barbariae, Hispaniae Entomologiam
castigauit.

15. *C. cyaneus*, nitidus, thoracis lateribus elytrorum apicibus femoribusque rubris. Ent. syst. 2. *collaris*.

63. 55. *

Habitat in Sibiria. Mus. D. Banks.

16. *C. viridi-coeruleus*, antennis nigris. Ent. syst. 2. *sericeus*.

63. 56.

Chrysomela sericea. Linn. syst. Nat. 2. 598. 86.

Fn. Sv. 554.

Geoff. Inf. 1. 233.

Oliv. Inf. 96. tab. 1. fig. 5.

Payk. Fn. Sv. 2. 139. 12.

Degeer Inf. 5. 334. 37.

Schaeff. Icon. tab. 65. fig. 2. 3. 5.

Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 13.

Habitat in Europae Salice.

17. *C. viridis*, nitens, ore pedibusque testaceis. Ent. *nitens*.

syst. 2. 64. 57. Payk. Fn. Sv. 2. 140. 13.

Chrysomela nitens. Linn. syst. Nat. 2. 598. 84.

Fn. Sv. 551.

Panz. Fn. Germ. 68. tab. 8.

VI. 13.

Degeer Inf. 5. 334. 38.

Habitat in Europae Corylo.

18. *C. violaceus*, thorace elytrisque aeneis, antennis fuscis. Ent. syst. 2. 64. 58. * *glabratus*.

Geoff. Inf. 1. 233. 4.

Schaeff. Icon. tab. 77. fig. 8.

Herbst. Arch. tab. 23. fig. 23.

Habitat in Europae australioris grammois.

Habitat in America.

Mus. T. Banks.

19. *C. niger*, capite thoraceque flauo-maculatis, elytris flauis: vittis duabus abbreviatis, nigris. *viduatus*.

T. II.

D

Ha-

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Statura et magnitudo C. vittati. Antennae nunc flavae, nunc fuscae. Caput nigrum, maculis tribus frontalibus, flavis. 1. 2. Thorax scabre niger, margine omni lineolisque tribus flavis media cum margine antico, lateralibus cum margine postico coeuntibus. Elytra punctata vittis duabus latis, nigris, quae tamen apices haud attingunt. Corpus nigrum, pedibus variegatis.

lituratus.

50. *C. niger*, thoracis margine elytrisque vittis duabus flavis.

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Statura C. vittati, at duplo fere minor. Caput cum antennis nigrum, immaculatum. Thorax niger, margine late flavo, et in hoc margine punctum magnum atrum. Elytra punctata striata, atra, vittis duabus postice coeuntibus flavis. Corpus atrum.

Variat rarius rudimento vittae mediae, nunc basin, nunc versus apicem.

pustulatus.

51. *C. ater*, thoracis margine antico elytrorumque basi maculisque tribus rubris, Ent. syst. supp. 108. 58. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lund.

vittatus.

52. *C. niger*, elytris, margine striaque abbreviata flavis. Ent. syst. 2. 64. 59. *

Geoff. Inf. 1. 233. 4.

Schaeff. Icon. tab. 77. fig. 8.

Hérbst. Arch. tab. 23. fig. 23.

Habitat in Europae australioris graminosis.

limbatus.

53. *C. ferrugineus*, thorace rufo, elytrorum sutura cyaneo-nitidis. Ent. syst. 2. 64. 60. *

Habitat in Cayenna. Dr. Schulz.

54. *C. thorace aeneo*, nitido, elytris cyaneis, capite, *nitidulus*.
antennarum basi pedibusque flavis. Ent. syst.
2. 64. 61. *
Habitat in Russia meridionali. D. Boeber.
55. *C. rufus*, elytris viridibus. *tricolor*.
Habitat in noua Cambria. D. Billardiere.
Paruus. Antennae nigrae. Caput nigrum, fronte
rufa. Thorax laeuis, rufus, nitidus. Elytra
punctata, nitida, immaculata. Abdomen albi-
dum, pedibus rufis.
56. *C. ater*, nitidus, ore, pedibus basique antenna- *labiatus*.
rum lutescentibus. Ent. syst. 2. 65. 62. *
Chrysomela lubrata. Linn. syst. Nat. 2. 598. 87.
Fn. Sv. 553.
Panz. Fn. Germ. 68. tab. 9. VI. 13
Payk. Fn. Sv. 2. 147. 20.
Habitat in Europae rosis.
57. *C. violaceus nitidus*, ore ~~pubescente~~ pubescente, antennis *flauilabris*.
pedibusque nigris. Ent. syst. 2. 65. 63. *
Cryptocephalus purpureus. Myll. Prodr. 519.
Payk. Fn. Sv. 2. 146. 18. ~~Ent. syst. Nat. 2. 598. 87.~~ *of Rossi Heller*
Habitat in Saxoniae Betula. D. Schaller. *2) Conari*
rustica
Larua saccoata: sacco antice oblique truncato.
58. *C. ater*, nitidus, capite pedibusque luteis. Ent. *flauipes*.
syst. 2. 65. 64. *
Panz. Fn. Germ. 68. tab. 10. VI. 14
Payk. Fn. Sv. 2. 144. 16.
Habitat in Italia et Germania. Dr. Allioni.
59. *C. coerulesco-ater*, nitidus, fronte pedibusque *flauifrons*.
flavis. Ent. syst. 2. 65. 65. *
Habitat Kilisae.
60. *C. niger*, capite, elytrorum apicibus pedibusque *Hybneri*.
flavis. Ent. syst. 2. 65. 66. *
D 2 Panz. IV. 49

Panz. Fn. Germ. 39. tab. 16.

Habitat in Germania. Dom. Hybner.

Moraei.

61. *C. ater*, elytris maculis duabus flavis marginibus. Ent. syst. 2. 66. 67.

Chrysomela Moraei. Linn. syst. Nat. 2. 597. 84

Fn. Sv. 550.

Geoff. Inf. 1. 235. 5.

Payk. Fn. Sv. 2. 145. 17.

11. 14. Panz. Fn. Germ. 68. tab. 11.

Schaeff. Icon. tab. 30. fig. 7.

tab. 238. fig. 5-2

Habitat in Europae Hypericis.

canellus.

62. *C. testaceus*, elytris punctis duobus suturaeque nigris.

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Parvus. Antennae fuscae, basi testaceae. Caput et thorax laevis, testacea, immaculata. Elytra punctato-striata, punctis duobus: altero a basin, altero in medio suturaeque tenuissima nigris. Corpus testaceum.

8guttatus. 63. *C. ater*, elytris maculis quatuor flavis. Ent. syst. 2. 66. 68. *

Habitat in Saxoniae Fraxino. D. Hybner.

15guttatus 64. *C. rufus*, thorace maculis tribus, elytris sex flavis. Ent. syst. 2. 66. 69. *

Habitat in Brasilia. Mus. D. Banks.

guttula. 65. *C. thorace elytrisque rufis, albo-punctatis.* Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Statura parva praecedentis. Caput nigrum lineolis duabus obliquis, flavis. Thorax laevis, rufus, nitidus, punctis septem albis, 3 marginis antico connexis, 4. Elytra laevis, rufa, punctis

cti

stis plurimis fuscis, albis. Corpus rufum, pectore nigro. Anus prominet punctis duobus albis.

Variat rarius colore viridi-aeneo, loco rufi.

6. C. thorace testaceo: vitta marginali atra, coleoptervis flavis: punctis decem nigris. Ent. syst. 2. 66. 70. * ~~10 punctatus.~~

Chrysomela 10maculata Linn. syst. Nat. 2. 599. 93. Fn. Sv. 560.

~~*Cryptocephalus hieroglyphicus.* Herbst. Arch. tab. 23. fig. 26. VI. 14~~

Cryptocephalus varians. Payk. Fn. Sv. 2. 148. 21. β.

Panz. Fn. Germ. 68. tab. 12.

Habitat in Europae Salice. *Fructu. III.*

Varietatem C. Bothnici credit D. Paykull.

7. C. thorace flavo: punctis nigris quinque, coleoptervis flavis: punctis nigris decem. Ent. syst. 2. 66. 71. * ~~hieroglyphicus.~~

Panz. Fn. Germ. 68. tab. 13.

Habitat in Italia. Dr. Allioni. VI. 15

8. C. niger, thorace fulvo: punctis quatuor nigris, elytris testaceis, lineola baseos punctisque duobus. Ent. syst. suppl. 108. 71. * ~~coloratus.~~

Cryptocephalus 10maculatus. Schneid. Mag. 195. 2. IX.

Habitat in Germania. D. Mauerhoff.

9. C. obscure grisea, femoribus posticis videntibus. ~~dentibus.~~

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Huius generis videtur. Antennae filiformes, fuscae, articulo primo maiori, incurvo. Caput, thorax, elytra subpunctata, obscure grisea, minime

nime nitida. Thorax vtrinque in angulum paruum, obtusum excurrit. Pedes obscuri, femoribus posticis subdentatis.

ispunctatus.

70. *C. thorace fuluo: punctis duobus, elytris testaceis: punctis quinque nigris.* Ent. syst. 2. 67. 72. *

Habitat in Germania. D. de Loewenskiold.

haemorrhoidalis.

71. *C. cyaneus, elytris apice pedibusque fulvis.* Ent. syst. 2. 67. 73. *

Panz. Fn. Germ. 68. tab. 14.

~~Reff. Fn. Ent. 1. 97. 247. 3.~~

VI. 15

Schaeff. Icon. tab. 77. fig. 7.

Habitat Parisiis. Mus. D. Bosc.

scutellaris.

72. *C. ater, thoracis margine, scutello elytrorumque maculis duabus rufis.*

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Statura et magnitudo *C. bipustulati*. Antennae flavae, apice nigrae. Caput nigrum, orbita colorum flava. Thorax subpunctatus, ater margine flavo. Scutellum flavum. Elytra punctato-striata: maculis duabus flavis; anteriori minore, transversa. Corpus nigrum, anno proximo, nunc toto flavo, nunc maculis duabus flavis. Pedes flavi.

apustulatus

73. *C. ater, elytris macula apicis rufa.* Ent. syst. 2. 67. 74. *

Cryptocephalus Podae. Lalchart. Tyrol. 197.

Cryptocephalus dispar. Payk. Fa. Sv. 2. 14. 15. Z.

VI. 15

Panz. Fn. Germ. 68. tab. 15.

Herbst. Arch. tab. 44. fig. 6.

Habitat in Chrysanthemo coronaria.

74. *C. rufus*, thorace maculis duabus, elytris fasciis *sfasciatus*. duabus nigris. Ent. syst. 2. 67. 75. *
Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. D. Banks.
75. *C. niger*, elytris laevibus, rufo-bimaculatis. *apustulatus*
Ent. syst. 2. 68. 76. *
Chrysomela apustulata. Linn. syst. Nat. 2. 597.
80. Fn. Sv. 549. *forte id. cum Keyser-*
Habitat in Suecia. *plac. 04 post - Ill.*
76. *C. niger*, elytris punctato-striatis: fascia pun-*notatus*. ctoque apicis testaceis. Ent. syst. 2. 68. 77. *
Habitat in America. Mus. Dr. Hunter.
77. *C. niger*, thorace elytrisque ferrugineo-variis, *hifrio*. pedibusque ferrugineis: geniculis nigris. Ent. syst. 2. 68. 78. *
Ross. Fn. Etr. 1. 98. 249.
Habitat in Italia. Dr. Allioni.
78. *C. nigro-aeneus*, antennis pedibusque testaceis. *smaragdus*
Habitat in Guinea. Mus. D. de Sehestedt. *lus.*
Parvus. Caput, thorax, elytra nigro-aenea, nitida. Elytra striata. Antennae elongatae pedesque testacei.
79. *C. ater*, thoracis margine elytrisque punctis tri-*3guttatus*. bus albis.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.
Parvus. Caput nigrum, puncto frontali et verticali albis. Thorax laevis, ater, nitidus, margine exteriori, linea dorsali, abbreviata albis. Elytra subpunctata, atra: punctis tribus albis; vno pone alterum. Abdomen atrum, margine albo. Femora basi alba.
80. *C. cyaneus*, nitidus, antennarum articulo primo *saponatus*. flavescente, elytris punctato-striatis.
Habi-

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Corpus paruum praecedentium cyaneum, nitidum, solo articulo antennarum primo flavo. Thorax laevis. Elytra punctato-friata.

Spengleri, 81. *C. thorace rufo, nitido: punctis duobus nigris, elytris testaceis; macula postice cyanea. Ent. syst. suppl. 199. 81. **

Habitat in India. D. Daldorff. Mus. D. de Sehestedt.

hecticus. 82. *C. pallidus, immaculatus, elytris striatis, antennis apice fuscis,*

Habitat Tranquebariae. Mus. D. Lund.

Corpus pallidum *C. Pini*. Antennae filiformes apice fuscae. Caput et thorax laevis, pallida, nitida. Elytra punctato-substriata, pallida, immaculata. Corpus pallidum.

Pini. 83. *C. testaceus, elytris vage punctatis, pallidis, antennis fuscis. Ent. syst. 2. 69. 84.*

Chrysomela Pini. Linn. *syst. Nat.* 2. 598. 89. Fn. Sv. 556.

IV. 50. Panz. *Fn. Germ.* 39. tab. 17.

Payk. *Fn. Sv.* 2. 138. 11.

Habitat in Sueciae Pino.

reticulatus. 84. *C. thorace elytrisque albis, testaceo-reticulatis. Ent. syst. 2. 69. 85. **

Habitat in Cayenna. D. v. Rohr.

pufillus. 85. *C. thorace fulvo, elytris striatis, testaceis, nigro-maculatis. Ent. syst. 2. 69. 86. **

Roff. *Fn. Etr.* 1. 100. 255.

Payk. *Fn. Sv.* 2. 149. 22. 3.

Habitat Hamburgi. Dr. Schulz.

Varietatem C. minuti credit D. de Paykull.

nanus. 86. *C. rufus, elytris striatis atris.*

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Parvus.

Parvus. Antennae nigrae, basi rufae. Caput et thorax laevis, rufa, nitida. Elytra striata, atra, immaculata. Corpus rufum.

17. *C. thorace fulvo, elytris friatis, testaceis, im-* *minutus.*
maculatis. Ent. syst. 2. 70. 87. *

Panz. Fn. Germ. 39. tab. 18.

Payk. Fn. Sv. 2. 149. 22.

Habitat Kiliae.

IV. 50

f. pusillus

18. *C. ater, nitidus, capite thoraceque rufis, pedi-* *parvulus.*
bus flavis. Ent. syst. suppl. 109. 87. *

Habitat in America boreali. D. Mauerhoff.

19. *C. ater, capite thoraceque fulvis, elytris linea* *gracilis.*
marginali baseos alba. Ent. syst. 2. 70. 88. *

Geoff. Inf. I. 237. II.

Habitat in Gallia et Dania. Mus. D. Bosc.

Caput et thorax laevis, aenea, obscure nitida: *auratus.*
margine thoracis flavo. Elytra subtilissime
striata, aenea. Pedes flavi.

IX.

f. pusillus

20. *C. ater, nitidus, elytris testaceis: sutura nigra,* *auratus.*
Ent. syst. 2. 70. 89. *

Habitat in Gallia. Mus. D. Bosc.

Variat rarius, elytris vitta media abbreviata, atra.

pygmaeus

femoribus saltatoriis,

21. *C. saltatorius, ater, elytris rubris apice atris.* *pygmaeus.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. *Saltator*
D. de Sehestedt.

Statura parva praecedentium.— Antennae nigrae,
basi ferrugineae. Caput et thorax laevis, fer-
ruginea, apice late atra. Corpus et pedes fer-
ruginea, femoribus posticis valde incrassatis,
atris.

saltator.

22. *C. saltatorius, ferrugineus: capite, elytrorum* *saltator.*
apicibus femoribusque posticis atris.

Habi-

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Statura omnino praecedentis, at paullo minor et
distinctus. Antennae nigrae, basi ferrugineae.
Caput nigrum. Thorax laevis, ferrugineus
immaculatus. Elytra laevia, rufa, apice atra.
Corpus ferrugineum, femoribus posticis valde
incrassatis, atris.

102. HISPA. Palpi aequales, medio crassiores
Maxilla bifida.

Labium corneum, integrum.

Antennae cylindricae.

foetatrix.
Spinosa

1. H. spinosissima, rufa, elytris nigris.

Hispa spinosa. Web. Inf. 65. 2.

Habitat in Sumatra. D. Daldorff.

Statura et magnitudo H. atrae. Caput rufum, in
erme, antennis nigris. Thorax rufus, spinis
quatuor nigris lateralibus trifidis, intermediis
bifidis. Elytra nigra, spinis plurimis, porrectis
validis, acutis. Corpus rufum.

spinosa
atra

2. H. atra, thorace elytrisque spinosis. Ent. syst. 2
70. 1. Linn. syst. Nat. 2. 603. 1.

Geoff. Inf. 1. 243. 7.

Act. Soc. Berol. Nat. Cur. 4. tab. 7. fig. 6.

Roff. Fa. Etr. 52. 129.

Hab

Hispae corpus paruum, oblongum, immarginatum, tardo
capite ovato, inferto; antennis approximatis et fore co
natis, longitudine thoracis, inter oculos infertis; oculi
magnis, oblongis, marginalibus; thorace brevi, rotund
to; scutello triangulo; elytris rigidis, longitudine abdom
inis, saepius, aculeatis, aut apice dentatis; pedibus bre
vibus, validis, rotundatis, cursoriis; tarsis quadriarticulati
colore vario, minus nitido.

Habitat in Europa australi ad radices graminum
Duplo maior e Guinea in Mus. D. de Sehestedt.
vix distincta.

3. H. thorace vtrinque palmato, sexdentato, flavo; ~~atra~~
lineis duabus sanguineis dorsalibus. *Spinosa*

Habitat Tranquebariae. D. Daldorff. Mus. D. Lund. *Erinaceus*

Statura omnino et summa affinitas H. Hystricis.

Antennae fusiformes, sanguineae. Thorax
vtrinque palmato-sexdentatus, flavus, lineis
duabus dorsalibus, sanguineis. Elytra puncta-
to-friata, obscura, spinis duabus erectis, acu-
tis, validis, rufis et aliquot minoribus, atris.
Margo spina valida baseos atra, tunc palmato-
sexdentatus, flavus, denique solitaria, flava, et
tandem palmato-trispinosus: spina vnica flava,
duabus rufis, demum apice ferratus, dentibus
anticis flavis, posticis rufis.

4. H. testaceo-nigroque-variegata, thorace vtrin- *Erinaceus*
que dilatato, quinquespinoso, Ent. syst. suppl. *Hystris*
116. 2. *

Habitat in Indiae Myricetis. D. Daldorff.

5. H. spinosa, corpore testaceo, antennis oculisque. *testacea*
Ent. syst. 2. 71. 2. *

Linn. syst. Nat. 2. 603. 2.

Roff. Fa. Etr. 52. 128.

Habitat in Africa. *Europa australi*

6. H. antennis ferratis, hirta atra, elytris macula ba- *apustulata*
seos rufa. Ent. syst. 2. 71. 3. *

Panz. Fa. Germ. 34. tab. 17.

IV. 53

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

7. H. antennis ferratis, hirta atra, elytris maculis *apustulata*
duabus rufis. Ent. syst. suppl. 116. 3. *

Habitat in Gallia. D. Brogniard.

8. H.

- spinipes.* 8. *H. rufa*, elytris nigris, rufis-punctatis, tibiis anticeis unispinosis. Ent. syst. 4. App. 448.
Habitat Surinami. Mus. D. Holthuyfen.
- sanguinicolis.* 9. *H. thorace elytrorumque basi sanguineis, elytris ferratis.* Ent. syst. 2. 71. 5. *
Linn. Mant. 1. 530.
Habitat in America. D. v. Rohr.
- Morio.* 10. *H. atra, immaculata, elytris sulcatis, apice rotundatis, ferratis.*
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.
Statura omnino *H. ferratae*, at tota atra, immaculata.
- haemorrhoidalis.* 11. *H. rufa, elytris nigris, apice integris, testaceis.* Web. Inf. 64. 1.
Habitat in Sumatra. D. Daldorff.
Statura praecedentium. Antennae nigrae, apice parum rufescentes. Caput et thorax rufa, immaculata. Elytra sulcata: sulcis transuersim striatis, nigra, apice integra, testacea. Corpus rufum.
- quadrata.* 12. *H. elytris ferratis, basi flavis, apice purpurascens.*
Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.
Magnitudo *H. sanguinicolis*. Caput flavum, antennis purpurascens. Thorax supra flavus, subtus purpurascens. Elytra ferrata, sulcata, basi flava, margine tamen purpurascens; apice purpurea. Corpus purpurascens, pedibus flavis.
- ferrata.* 13. *H. nigra, elytris rufescentibus, apice ferratis nigris.* Ent. syst. 2. 72. 6. *
Habitat Surinami. Mus. Dr. Hunter.

14. *H. atra*, thorace abdominisque margine sanguineo, elytris apice ferratis. *thoracica*.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Statura et magnitudo praecedentis. Thorax laevis, fanguineus, immaculatus. Elytra fulcata, atra, apice valde ferrata, at haud truncata. Corpus nigrum, abdominis margine ferrato.

15. *H. atra*, thoracis margine elytrorumque macula, *humeralis*. baseos rufis, elytris apice ferratis.

Habitat in America meridionali. Mus. D. de Sehestedt.

Statura *H. ferratae*. Caput atrum, macula frontali rufa. Thorax laevis, ater, linea marginali rufa, quae postice cum macula elytrorum coit. Elytra fulcata, atra, macula oblonga, baseos rufa, apice rotundata, ferrata.

16. *H. nigra*, thoracis margine, elytris ferratis: macula baseos fasciaque media flavis. *dentata*. Ent. syst. 2.

72. 7. *

Voet. Col. 2. tab. 44. fig. 1. β.

Habitat in Cayenna. D. v. Rohr.

17. *H. atra*, elytris truncatis, angulato-ferratis. *maura*.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Statura omnino *H. angulatae*, at tota atra, pedibus solis piceis. Elytra fulcata, apice truncata, dentata: dente exteriori maiori, angulato.

18. *H. thorace coleoptrisque atris: vittis duabus truncatis*, ferrugineis, apice truncatis, ferratis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Statura et magnitudo praecedentis. Caput cum antennis atrum. Thorax punctatus, ater: vittis duabus

duobus latis, ferrugineis cum vittis coleopterum coeuntibus. Elytra sulcata, atra, vitta laevigata ferruginea ante futuram, quae tamen apice haud attingit, et in hac vitta fascia pone medium atra. Apex truncatus, acute serratus. Corpus rufum, immaculatum.

angulata. 19. *H. flava*, capite, thoracis linea dorsali elytrorumque margine sericeato nigris. Ent. syst. 72. 8. *

Habitat in Cayenna. D. v. Rohr.

haftata. 20. *H. sanguinea*, elytris fulcatis: vitta interrupta caerulea basi apiceque unispinosis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Statura praecedentium, at distincta. Antennae rufae, basi fuscae. Caput et thorax punctato-sanguinea, immaculata. Elytra sulcata, rufi vitta media hinc inde interrupta, violacea, basi apiceque spina valida, acuta, incurva. Apex alias integer. Corpus rufum.

emarginata. 21. *H. nigra*, elytris basi macula rufa, apice bidentatis. Ent. syst. 2. 72. 9. *

Habitat Surinami. Mus. D. Bosc.

elevata. 22. *H. nigra*, thoracis margine elytrorumque basi rufis, elytris linea elevata unica apice quadridentatis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Statura et summa affinitas *H. carinatae*, Caput rufum, ore antennisque nigris. Thorax rufus macula magna dorsali maculaque vtrinque sub lateribus rufis. Elytra punctato-striata, atra macula oblonga basios rufa, linea unica elevata, carinata, apice spinosa. Praeterea dentes quatuor

quatuor validi in apice elytrorum: intermediis minoribus. Corpus nigrum, abdominis macula bascos margineque rufis. Pedes nigri, femoribus rufis.

3. *H. nigra*, thoracis margine elytrorumque basi *carinata*. rufis, elytris vniſtriatis, apice bidentatis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muſ. D. Lund.

Caput rufum, margine poſtico antennisque nigris, Thorax niger, margine antico et laterali rufo, antico, dentem in medio emittente. Elytra punctato-friata, nigra, macula bascos ruſa lineaque media eleuata, carinata, apice bidentata. Pedes nigri, femoribus basi rufis.

4. *H. nigra*, thorace ferrugineo, elytris ſtriatis, apice *ruficollis*. ſubtiliſſime ferratis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muſ. D. de Seheſtedt.

Parua. Caput nigrum. Thorax rotundatus, ruſus, immaculatus. Elytra ſulcata, ſulcis punctato-friatis, apice parum ferratis. Corpus nigrum.

5. *H. atra*, thorace, antice ſcutelloque fuluis, elytris *plicatula*. ferratis, angulatis, plicisque eleuatis.

Habitat in Carolina. Muſ. D. Boſc.

Media. Caput nigrum, antennis basi flauis. Thorax ater, antice fuluus: punctis aliquot atris. Elytra ferrata, apice angulata, et in diſco plicae plurimae eleuatae, compreſſae, acutae. Pedes nigri, femoribus annulo fuluo.

6. *H. flaua*, antennis elytrorumque ſutura nigriſ. *futuralis*. *Hispa roſea*. Web. Inſ. 66. 5.

Habitat in Carolina. Muſ. D. Boſc.

Reliquis minor. Caput flauoſcens, antennis nigris. Thorax ſcaber, teſtaceus, margine elytrorum tenuiſ-

tenuissime punctisque aliquot nigris. Elytra
fulcata, integra, flava, futura nigra. Puncti
interdum sparsa, nigra in disco.

Variat elytris corporeque toto testaceis, antennis
folis fuscis.

ferraticornis. 27. H. antennis basi compressis, ferratis, nigra, tho-
racis margine elytrisque macula baseos flavis.
Ent. syst. 2. 73. 10. *

Habitat Surinami. Mus. D. Bosc.

compressicornis. 28. H. antennis compressis, ferratis, nigra, thoracis
margine elytrorumque macula baseos rufis, ely-
tris fulcatis, apice truncatis, angulato-ferratis.

Habitat in America meridionali. Mus. D. Lund.

Nimis affinis praecedenti. Caput atrum, macula
frontali rufa. Thorax laevis, ater, margine
sanguineo. Elytra fulcata, atra, macula baseos
sanguinea, apice truncata, ferrata, dente exte-
riori maiori, angulato.

bidens. 29. H. ferruginea, thoracis linea laterali nigra, ely-
tris apice videntatis. Ent. syst. 2. 73. 11. *

Habitat Surinami. Mus. D. Bosc.

nigricornis. 30. H. glabra, coccinea, antennis nigris. Ent. syst.
2. 73. 12. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. de Paykull.

vittata. 31. H. nigra, elytris obscure aeneis: vitta rufa.

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Statura praecedentium. Caput obscure rufum, an-
tennis atris. Thorax obscure aeneis, nitens,
lateribus rufescentibus. Elytra striata puncta-
taque, obscure aenea, nitidula: vitta lata, fu-
sca. Corpus nigrum.

32. H.

32. *H. coccinea*, elytris nigris: lineola baseos fascia-*fulcata*.
que postica coccineis. Ent. syst. 4. App. 448.

13. *

Habitat Surinami. Mus. D. Holthuysen.

33. *H. atra*, thoracis margine pallido, elytris rotun-*rotundata*.
datis, integris.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Statura reliquis longior. Antennae compressae,
vix tamen ferratae. Thorax planus, laevis,
ater, margine pallido. Elytra laevis, nigra,
margine parum pallido, apice rotundata, in-
tegra.

34. *H. ferruginea*, elytris basi vtrinque gibbis, apice *gibba*.
angulato-dentatis, coeruleis. Ent. syst. suppl.

116. 13. *

Hispa gibba. Oliv. Inf.

Habitat in St. Domingo. Mus. D. Bosc.

35. *H. atra*, thorace maculaque elytrorum baseos *integra*.
rufis, elytris integris.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Schestedt.

Corpus parvum, atrum. Thorax rotundatus, ru-
fus, immaculatus. Elytra fulcata: sulcis pun-
ctatis, macula magna, oblonga, baseos rufa,
apice omnino integra. Corpus nigrum, femo-
ribus basi rufis.

36. *H. glabra*, laevis, ferruginea, elytris cyaneis. *cyanipennis*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund,

Statura et magnitudo *H. coccineae*. Caput cocci-
neum, antennis nigris. Thorax glaber, laevis,
ferrugineus, nitidus. Elytra punctato-striata,

T. II.

E

cya-

cyanea, immaculata. Corpus rufum, pedibus geniculis nigris.

metallica.

37. *H. glabra*, nigra, aeneo-nitidula, elytris integris, punctato-friatis.

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Reliquis longior et angustior. Antennae nigrae.

Caput et thorax vix punctata, nigra, aeneo punctum nitidula. Elytra omnino integra, punctato-friata.

109. CVPES. *Palpi* quatuor aequales: articulo ultimo crassiori, truncato.

Ligula brevis, membranacea bifida.

Antennae cylindricae.

capitata.

I. CVPES.

Habitat in Carolina: Mus. D. Bosc.

Characterem generis Dom Latreille debeo: 6 maxillis palpisque. *Palpi* quatuor aequales subfiliformes: anteriores quadriarticulati: articulis subaequalibus; ultimo parum crassius truncato, adhaerentes maxillae dorso, posteriores triarticulati: articulo secundo longiori, nati ligulae basi. *Mandibula* brevis, crassa apice bifida: lacinia exteriori tenui, filiformi interiore lata, rotundata. *Ligula* brevis, membranacea, bifida: lacinjiis ovatis, rotundatis, stantibus. *Antennae* cylindricae. Genus *Hispia* affine.

Corpus elongatum, glabrum, immarginatum, aeneo-nigrum; capite parvo, ovato, exserto, articulo aequali, rufo; antennis thorace multo longioribus, approximatis, cylindricis: articulo primo

primo crassiori, nigrae, inter oculos insertae. *Oculi* parui, globosi, prominuli, marginales. *Thorax* planus, brevis, transuersus, inaequalis, niger, margine parum prominulo. *Elvtra* rigida, fornicata, fulcata, fulcis punctis eleuatis, scabris, longitudine abdominis, atra. *Vedes* breues, compressi, cursorii, nigri, *tarsis* quadriarticulatis, rufescentibus.

104. DRYOPS. *Palpi* quatuor inaequales; *anteriores* securiformes, *posteriores* filiformes. *Ligula* membranacea, late emarginata. *Antennae* filiformes.

1. D. liuida, fronte maculisque duabus thoracis *femorata*. atris, femoribus posticis incrassatis. Ent. syst.

2. 75. 1. *

Oedemera femoralis Oliv. Inf. 50. tab. i. f. 1.

Habitat in Heluetia. Mus. D. Olivier.

2. D. obscura, aenea, immaculata. Ent. syst. 2. 75. *aenea*.

2. *

Oedemera aenea. Oliv. Inf. 50. tab. 1. fig. 3.

Habitat in Americae Infulis. Mus. D. Banks.

E 2

3. D.

Dryopsis corpus elongatum, cylindricum, glabrum, immarginatum, laeue, agile; *capite* ouato, inserto, ore palpisque prominulis; *oculis* magnis, globosis, lateralibus, antennis distantibus sub oculo insertis, corpore breuioribus; *thorace* subcylindrico, breui; *scutello* paruo, rotundato; *elytris* rigidiusculis, fornicatis, longitudine abdominis; *pedibus* longiusculis, tenuibus, cursoriis; *tarsis* quadriarticulatis; *colore* vario, subnitidulo.

- livida.* 3. *D. livida*, oculis nigris. Ent. syst. 2. 75. 3.
Oedemera livida. Oliv. Inf. 50. tab. 1. fig. 2
 Habitat in Insulis maris australis. Mus. D. Banks
- lineata.* 4. *D. livida*, thorace lineis, elytris vitta fusca. Ent. syst. 2. 75. 4. *
Oedemera lineata Oliv. Inf. 50. tab. 1. fig. 4.
 Habitat in nova Zelandia. Mus. D. Banks.
- cyanea.* 5. *D. coerulea*, antennis fuscis. Ent. syst. 2. 75. 5.
Oedemera cyanea. Oliv. Inf. 50. tab. 1. fig. 5.
 Habitat in nova Hollandia. Mus. D. Banks.
- marginata.* 6. *D. rufa*, elytris fuscis: marginibus lineaque media rufis. Ent. syst. 2. 76. 6. *
Oedemera marginata. Oliv. Inf. 50. tab. 1. f. 7.
 Habitat in America meridionali. Mus. Dr. Hunter.
- vittata.* 7. *D. rufa*, elytris vittâ abdominisque apice fuscis.
Oedemera vittata. Oliv. Inf. 50. tab. 1. fig. 6.
 Habitat in Americae Insulis. D. v. Rohr.
- striata.* 8. *D. cyanea*, thorace rufo, elytris margine striaque albidis.
 Habitat in Americae Insulis. Mus. D. Lund.
 Statura omnino *D. rufifrons*, at paullo maior.
 Caput cyaneum, antennis palpisque fuscis.
 Thorax laevis, rotundatus, rufus, immaculatus.
 Elytra cyanea, margine, futura striaque media, tenuissima, albidis. Corpus et pedes cyanea.
- rufifrons.* 9. *D. cyanea*, capite thoraceque rufis. Ent. syst. 2. 76. 8. *
 Habitat in America boreali.

105. **LAGRIA.** *Palpi* inaequales;
anteriores securiformes,
posteriores extrorsum crassiores.

Ligula membranacea, integra.

Antennae filiformes.

. *L. ovata*, glabra, atra, elytris tuberculatis. Ent. *tuberculata*
 syst. 2. 78. 1. *

Habitat in Cayenna. D. v. Rohr.

. *L. villosa*, atra, elytris viridibus. Ent. syst. suppl. *viridipennis*.
 108. 1. *

Habitat in Tanager. D. Schousboe.

. *L. villosa*, atra, thorace elytrisque viridibus. Ent. *villosa*.
 syst. 2. 79. 2. *

Oliv. Inf. 48. tab. 1. fig. 1.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

. *L. villosa*, fusca, abdominis margine rubro. *marginata*.
 Habitat in noua Cambria. D. Billardiere.

Statura et magnitudo omnino praecedentium.

Corpus totum villosum, fuscum, abdominis
 margine solo rufescente.

. *L. villosa*, nigra, thorace rugoso. *rugosa*.

Habitat in Sumatra. D. Daldorff.

Praecedentibus duplo minor. Caput nigrum. Tho-
 rax

LAGRIAE corpus oblongum, hirtum, immarginatum, tardum;
capite ovato inserto; *oculis* oblongis, transversis, marginalibus;
antennis distantibus, sub oculos insertis, longitudine thoracis;
thorace breui, angusto, rotundato; *scutello* paruo, orbiculato;
elytris molliusculis, fornicatis, longitudine abdominis;
pedibus tenuibus, cursoriis; *tarsis* quadriarticulatis;
colore vario, obscuro.

- rax rotundatus, villosus, rugosus, niger. Elytra nigra, coeruleo parum micantia.
- pubescens.* 6. *L. villosa*, nigra, thorace tereti: puncto medio impresso, elytris testaceis. Ent. syst. 2. 79 3
Chrysomela pubescens. Linn. syst. Nat. 2. 603
 122. *Max L. hirtae.*
 Habitat in Europae plantis.
- lata.* 7. *L. villosa*, atra, elytris rugosis, testaceis.
 Habitat in Mauritania. D. Schousboe. Mus. D
 Lund. *Eustacia*
 Maior *L. pubescenté* et alia. Caput et thorax villosa, nigra. Elytra valde rugosa, pallida, testacea, immaculata. Corpus atrum.
- hirta.* 8. *L. villosa*, nigra, thorace tereti: elytris pallidis
 Ent. syst. 2. 79. 4.
Chrysomela hirta. Linn. syst. Nat. 2. 602. 119
 Fn. Sv. 578.
Tenebrio villosus. Degeer Inf. 5. 44. 6. tab. 2
 fig. 23. 24.
 Payk. Fn. Sv. 2. 155. 1. *facm. L. pubesc.*
 Oliv. Inf. 48. tab. 1. fig. 2. *centis*
 Geoff. Inf. 1. 344. 6.
 Habitat in Europae Saponariis. Mus. D. Lund.
- tomentosa.* 9. *L. villosa*, cyanea, abdomine femoribusque rufis
 Ent. syst. 2. 79. 6. *
 Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.
 Forte potius *Melyris*, mihi haud rite nota.
- obscura.* 10. *L. villosa*, cuprea, elytris nigris. Ent. syst. 2
 79. 7. *
 Habitat in Guinea. D. Isert.
- tristis.* 11. *L. subvillosa*, obscura, elytris punctatis, antennis nigris.
 Habitat Tranquebariae. D. Daldorff. Mus. D. d
 Schestedt.

Statura et magnitudo *L. lugubris*, tota obscura, minime nitida. Antennae nigrae. Tibiae testaceae.

12. *L. glabra*, aenea, elytris striatis, nitidis, cupro-nitidula striatis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muf. D. Lund.

Media. Caput et thorax obscure aenea, vix pubescentia, antennis nigris. Elytra nitida, aenea, cupro-lineata. Corpus aeneum, pedibus cupreis.

13. *L. glabra*, ferruginea, capite thoraceque obscurioribus, antennis apice nigris. Ent. syst. 2. 80. 8. *

Habitat in Guinea. D. Ifert.

14. *L. livida*, pedibus flavescentibus. Ent. syst. suppl. *livida*.

~~108 15~~ 119, 15.
Habitat in Germania.

106. DASYTES. Palpi inaequales, filiformes.

Maxilla videntata.

Ligula membranacea, subemarginata.

Antennae ferratae.

1. *D. hirtus*, ater.

ater.

La-

Dasytæ corpus paruum, elongatum, immarginatum, saepius hirtum, tardum; capite paruo, ovato, inserto; oculis rotundatis, marginalibus, prominulis; antennis distantibus, thorace longioribus, ante oculos insertis; thorace conuexo, vix marginato, fere latitudine elytrorum; scutello rotundato, breui; elytris mollifculis, fornicatis, longitudine abdominis; pedibus tenuibus, longiusculis, cursoriis; tarsis quinquearticulatis; colore vario, interdum nitido.

Lagria atra. Ent. syst. 2. 80. 10.

Dermeestes hirtus. Linn. syst. Nat. 2. 563. 14.

Melyris atra. Oliv. Inf. 21. tab. 2. fig. 8.

~~Page from Gen. 4. tab. 9.~~

Habitat in Europae australioris Triticis.

Os maxillis palpisque. *Pulpi* quatuor, inaequales, filiformes: articulo ultimo obtuso, subtruncato, *anteriores* paullo longiores, quadriarticulati, articulo secundo longiore, adhaerentes maxillae dorso, *posteriores* breviores, triarticulati: articulis subaequalibus, adnati ligulae basi laterali. *Mandibula* cornea, arcuata, edentula, acuta. *Maxilla* membranacea, rotundata, videntata. *Ligula* membranacea, plana, subemarginata. *Labium* breve, corneum, transversum, integrum.

scutellaris. 2. *D. niger*, cinereo-hirtus, scutello albo.

Lagria scutellaris. Ent. syst. 2. 80. 9. *

Habitat in Hispania. *D. Prof.* Vahl.

haemorrhoidalis. 3. *D. hirtus*, ater, elytris macula apicis rufa.

Lagria haemorrhoidalis. Ent. syst. suppl. 118. 10. *

Habitat in Tanger. *D. Schousboe.*

niger. 4. *D. pilosus*, niger, elytris laeviusculis.

Lagria nigra. Ent. syst. 2. 80. 11.

Dasytes niger. Payk. Fn. Sv. 2. 156. 1.

VIII. 24.

Melyris nigra. Illig. Col. Bor. 1. 309. 2.

Melyris villosa. Oliv. Inf. 21. tab. 2. fig. 10.

Habitat in Europae floribus.

lineatus. 5. *D. pilosus*, niger, elytris lineis sesquitertiis rufis.

Lagria lineata. Ent. syst. 2. 80. 12. *

Melyris lineata. Oliv. Inf. 21. tab. 1. fig. 6.

Habitat in Brasilia. *Muf.* *D. Banks.*

6. *D.*

7. *D. villosus, nigricans, antennarum basi pedibusque flavipes, testaceis.*

Lagria flavipes. Ent. syst. 2. 80. 13. *

Dasytes flavipes. Payk. Fn. Sv. 2. 158. 4.

~~Panz. Fn. Germ. 6. tab. 11. Melyris polumbica~~

Habitat in Europa boreali. Dr. Schulz. *Illig. K. Pr.*

8. *D. subvillosus, cyaneus, antennis nigris.*

coeruleus

Lagria coerulea. Ent. syst. 2. 81. 14.

~~*Melyris coerulea.* Oliv. Inf. 21. tab. 2. fig. 9.~~

Melyris coerulea. Illig. Col. Bor. 1. 308. 1.

Dasytes coeruleus. Payk. Fn. Sv. 2. 157. 2. VIII. 24.

~~*Cicindela.* Geoff. Inf. 1. 177. 14.~~

Habitat in Europa australiori.

9. *D. hirtus, obscure aeneus.*

metallicus.

Lagria metallica. Ent. syst. 2. 81. 15. *

Habitat in Barbariae floribus compositis. D. Vahl.

10. *D. villosus, aeneus, antennis pedibusque nigris.* *aeneus.*

Lagria aenea. Ent. syst. suppl. 419. 15. *

Habitat in Tanger. D. Schousboe.

11. *D. hirtus, aeneus, nitidus, antennis nigris, tibia nigricornis, testaceis.*

Lagria nigricornis. Ent. syst. 2. 81. 16. *

Dasytes nigricornis. Payk. Fn. Sv. 2. 158. 3.

Habitat in Suecia. Dom. de Paykull.

12. *D. obscurus, thorace rotundato, canaliculato.* *linearis.*

Dasytes linearis. Payk. Fn. Sv. 3. App. 454. 2.

~~*Tigridus filiformis.* Creutz. Inf. 121. tab. 3. f. 25.~~

Habitat in Suecia. Mus. D. Lund.

VI. 16

Corpus paruum, elongatum, filiforme, totum obscurum, antennis pedibusque nigris. Thorax magis rotundatus, quam in reliquis, linea dorsali impressa.

12. D.

- minutus.* 12. *D. subvillosus*, niger, thorace elytrisque cyaneis
Lagria minuta. Ent. syst. 2. 81. 17. *
 Habitat in noua Zelandia. Mus. D. Banks.

107. CEROCOMA. *Palpi* aequales, filiformes
Maxilla linearis, integra
Ligula membranacea, bifida.

Antennae moniliformes
 irregulares.

- Schaefferi.* 1. *C. viridis*, antennis pedibusque luteis. Ent. syst.
 2. 81. 1.

Meloe Schaefferi. Linn. syst. Nat. 2. 681. 12

Cerocoma Geoff. Inf. 1. 358. 1.

Schaeff. Elem. tab. 37.

VIII-24,

- - Icon. tab. 53. fig. 8. 9.

Oliv. Inf. 48. tab. 1. 1. fig. 1.

Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 13.

Habitat in Europa australi.

- Vahl.* 2. *C. viridis*, antennis pedibusque nigris. Ent. syst.
 2. 82. 2. * *Est facm. C. Syriaci*

Habitat in Barbariae vmbellatis. D. Vahl.

- Schroberi.* 3. *C. viridis*, antennis, pedibus abdominisque segmentis tribus flauis. Ent. syst. 2. 82. 3. *

Oliv. Inf. 48. tab. 1. fig. 2.

Habitat in Europa australi.

IC

Cerocomae corpus oblongum, laeue, pubescens, immarginatum, tardum; *capite* ovato, promiuvulo, inflexo; *oculis* ovatis, marginatis; *antennis* approximatis, thorace brevioribus, inter oculos insertis; *thorace* breui, ovato, supra plano; *scutello* breuissimo, rotundato; *elytris* incumbentibus, molliusculis, longitudine abdominis; *pedibus* tenuibus, cursoriis; *tarsis* anticis quinque-, posticis quadarticulatis; *colore* aeneo.

108. PAVSSVS. *Pespi* quatuor, inaequales.
Antennae biarticulatae: articulo ultimo maximo.

1. *P. antennis* biarticulatis: clava irregulari dentata maxima, corpore fusco. *microcephalus.*

Cerocoma microcephala. Ent. syst. 2. 82. 4.

Pauffus microcephalus. Linn. Diff. Big. Inf. tab. 1. fig. 6-10.

Pauffus microcephalus. Thunb. Act. Sv. 1781. 170. 1.

Pauffus microcephalus. Afzel. Act. Soc. Linn. 4. 18. tab. 22.

Habitat in Africa, Mus. D. Banks.

Nouum genus et distinctum, at mihi haud rite examinatum, nec mihi satisfacit character generis a D. Afzelio in Act. Soc. Linn. datus, sed e nouo conficiendus.

2. *P. antennis* biarticulatis: clava elongata integra, lineatus. fuscus, elytris linea nigra. *lineatus.*

Cerocoma lineata. Ent. syst. 2. 82. 5. *

Pauffus lineatus. Thunb. Act. Soc. Suec. 1781. 170. 3. tab. 1. fig. 4. 5.

Habitat ad Cap. Bon. Spei.

3. *P. antennis* biarticulatis: clava elongata integra, ruficollis. niger, thorace elytrorumque striga ferrugineus. *ruficollis.*

Cerocoma ruficollis. Ent. syst. 2. 83. 6. *

Habitat - - Mus. D. Lund.

4. *P. antennarum* articulo primo incuruo, secundo flavicornis. rotundato, compresso, flauis; corpore nigro.

Habitat in Iana, Mus. D. de Sehestedt.

Animalculum singulare vix huius generis. Corpus paruum, nigrum. Caput et thorax cinereo-villosa. Antennae articulo primo, incuruo, elongato,

gato, secundo magno, compresso, flavis, reliquis brevibus, filiformibus, nigris. Elytra cyanea, nitida.

rog. LYTTA. *Palpi* quatuor, inaequales; *posteriores* clauati.
Maxilla bifida.
Labium truncatum.
Antennae filiformes.

- vesicatoria.* 1. *L. viridis*, antennis nigris. Ent. syst. 2. 83. 1.
Meloe vesicatorius. Linn. syst. Nat. 2. 679. 3.
 Fn. Sv. 827.
Cantharis vesicatoria. Oliv. Inf. 46. tab. 1. f. 1.
 Geoff. Inf. 1. 341. 1. tab. 6. fig. 5.
 Degeer. Inf. 4. 12. 2. tab. 1. fig. 9.
 Schaeff. Icon. tab. 47. fig. 1.
 IV. 54. Panz. Fn. Germ. 41. tab. 4.
 Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 55.
 Habitat in Europae Ligustro, Fraxino, Sambuco.
 Officialis pro vesicatoriis.
- segetum.* 2. *L. aurea*, elytris viridibus. Ent. syst. 2. 84. 2. *
 Habitat in Barbariae segete. Mus. D. Desfontaines.
- nitidula.* 3. *L. viridi-aenea*, elytris testaceis. Ent. syst. 2.
 84. 3. *
 Oliv. Inf. 46. tab. 2. fig. 15.
 Habitat ad Cap. Bon. Spei.

* L.

Lyttæ corpus oblongum, laeve, glabriusculum, immarginatum, tardum; *capite* magno, exserto, ovato, thorace latiore; *oculis* rotundatis, lateralibus; *antennis* distantibus, cantho inferiori oculorum insertis; *thorace* subcylindrico; *scutello* minuto; *elytris* molliusculis, sornicatis, longitudine abdominis; *pedibus* elongatis, tenuibus, cursoriis; *scarsis* anticis quinque-, posticis quadriarticulatis; *colori* vario, nitido.

- L. atra*, vertice, thorace pedibusque ferrugineis, *collaris*.
 elytris cyaneis. Ent. syst. 2. 84. 4. *
 Oliv. Inf. 46. tab. 2. fig. 12.
 Pall. Inf. Sib. 96. tab. E. fig. 27.
 Habitat in Rossia meridionali. D. Boeber.
- L. cyanea*, pectore ferrugineo. Ent. syst. 2. 84. 5. * *Gigas*.
 Oliv. Inf. 46. tab. 1. fig. 9.
 Habitat in Guinea. D. Isert.
- L. aeneo-villosa*, elytrorum marginibus albis. *villosa*.
 Ent. syst. suppl. 119. 15. *
 Habitat in Guinea. Mus. D. Lund.
- L. testacea*, elytris coccineis. *coccinea*.
 Habitat in Guinea. Mus. D. de Sehestedt.
 Statura magna praecedentis. Caput testaceum,
 antennis nigris: articulo primo testaceo. Tho-
 rax testaceus. Elytra laevia, coccinea, imma-
 culata. Corpus testaceum, pedibus apice ni-
 gris.
- L. villosa*, viridi - coerulea, thorace rotundato, *Syriaca*.
 ferrugineo. Ent. syst. 2. 84. 6. *
Melne Syriacus. Linn. syst. Nat. 2. 680. 4.
 Mus. Lud. Vlr. 102.
Cantharis Syriaca. Oliv. Inf. 46. tab. 1. fig. 5.
 Panz. Fn. Germ. 41. tab. 5.
~~Herbst Arch. tab. 30. fig. 1.~~
 Habitat in Europa australiori frequens.
- L. cinereo-villosa*, capite maximo atro, thorace *melanoc-*
rufa. *phala*.
 Habitat in Guinea. D. Meier. Mus. D. Lund.
 Maior *L. ruficollis*. Caput magnum, laeve, gla-
 brum, atrum. Thorax antice attenuatus, lae-
 vis, rufus. Elytra et corpus villis parvis cine-
 reis tecta. Pedes obscuri.

apiculata. 10. L. atra, capitis vertice thoracisque maculis duobus rufis.

Habitat in Guinea. Mus. D. de Sehestedt.

Statura praecedentium. Antennae breves, crassae, ferratae. Caput atrum, ore verticeque late rufis. Thorax subrotundus, in medio parum canaliculatus, ater, vtrinque macula magna, rufa. Elytra subrugosa, atra. Corpus nigrum.

rufa.

11. L. nigra, capitis vertice, thoracis maculis duobus elytrisque rufis: vitta abbreviata nigra.

Habitat in Guinea. Mus. D. Lund.

Statura omnino praecedentis. Antennae breves, crassae, atrae. Caput nigrum, vertice late rufo. Thorax subrotundatus, niger, maculis duobus rufis. Elytra subrugosa, rufa: vitta nigra quae tamen nec basin nec apicem attingit. Corpus nigrum.

Afzaliana. 12. L. thorace testaceo: maculis quatuor, elytrorum macula, vitta abbreviata apiceque nigris.

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Magna. Caput testaceum, ore antennisque nigris. Thorax laevis, testaceus, vtrinque lunula antica punctisque duobus dorsalibus nigris. Elytra laevis, testacea; macula magna basos ad futuram, vitta magna postica dilatata, quae cum apice nigro coit. nigris. Corpus nigrum, marginibus segmentorum abdominis testaceis.

ruficollis.

13. L. glabra, viridi-aurea, thorace antice attenuato rufo, Ent. syst. 2. 85. 7. ♀

Cantharis ruficollis. Oliv. Inf. 46. tab. 1. f. 6.

~~Pall. Inf. 3. tab. E. fig. 85.~~

~~Herbit. Arch. tab. 48. fig. 4.~~

Habitat in India orientali. D. Olivier.

13. L.

14. L.

14. *L. supra testacea, elytris macula magna, apicis testacea.*
 oblonga, nigra. Ent. syst. 2. 85. 8. *
 Oliv. Inf. 46. tab. 2. fig. 13.
 Habitat Tranquebariae. Mus. D. de Sehestedt.
15. *L. viridi-aenea, nitida, elytris testaceis: macula festiva.*
 lis viridi-aeneis. Ent. syst. 2. 85. 9. *
 Oliv. Inf. 46. tab. 2. fig. 14.
 Pall. Iter. 2. 721. 54.
 Habitat in Sibiria. Mus. D. Banks.
16. *L. atrata, elytrorum marginibus cinerascens: marginata.*
 Ent. syst. 2. 85. 10. *
Meloe cinereus. Forst. non. sp. Cent. 1. 62. 62.
Cantharis marginata. Oliv. Inf. 46. tab. 1. f. 2.
 Habitat ad Cap. Bon. Spei.
17. *L. testacea, thorace vittis duabus, elytris tribus lemniscata.*
 atris.
 Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.
 Medix. Antennae obscurae. Caput testaceum,
 punctis duobus nigris. Thorax rotundatus, testaceus,
 vittis duabus nigris. Elytra villosa, testacea,
 vittis tribus atris, quae tamen apicem
 haud attingunt. Corpus aureo-villosum, pedibus
 testaceis.
18. *L. elytris nigris: vitta marginibusque flavis. vittata.*
 Ent. syst. 2. 86. 11. *
Cantharis vittata. Oliv. Inf. 46. tab. 1. fig. 3.
 Pall. Inf. tab. E. fig. 53.
 Habitat in Americae Solano tuberoso, folia depa-
 scens, destruens.
19. *L. corpore atro, immaculato. Ent. syst. 2. 86. atrata.*
 12. *
Meloe Pennsylvanicus. Degeer Inf. 5. 16. 1.
 tab. 13. fig. 1.
 Oliv.

Oliv. Inf. 46. tab. 2. fig. 19.

Habitat in Barbaria. D. Prof. Vahl.

cinerea.

20. L. corpore nigro, cinereo, tomentoso. Ent. syst. suppl. 119. 15. *

Cantharis sericea. Oliv. Inf. 46. tab. 1. fig. 8.

Habitat in America. D. Hybner.

erythrocephala.

21. L. atra, capite testaceo, thorace elytrisque cinereo-lineatis. Ent. syst. 2. 86. 13. *

Meloë erythrocephalus. Pall. Iter. 1. 466. 46

Oliv. Inf. 46. tab. 2. fig. 16.

~~Panz. Fa. Germ. 31. tab. 6.~~

Herbst. Arch. tab. 30. fig. 2.

Scopol. Ann. Hist. natur. 5. 103. 81.

Habitat in Austria. Mus. Dr. Schütz. *P. 11/11*

oculata.

22. L. nigra, puncto calloso, flavo pone oculos. Ent. syst. 2. 86. 14. *

Habitat in Guinea. D. Isert.

dubia.

23. L. atra, capitis vertice fulvo, thorace elytrisque immaculatis. Ent. syst. 2. 86. 15. *

~~*Meloë Algericus* Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 12.~~

~~Oliv. Inf. 46. tab. 1. fig. 7.~~

~~Pall. Iten. tab. E. fig. 29.~~

Habitat in Sibiria. Mus. D. Banks.

Afra.

24. L. nigra, thorace rufo. Ent. syst. 2. 87. 16. *

Meloë Afra Linn. syst. Nat. 2. 680. 10.

Cantharis Afra. Oliv. Inf. 46. tab. 1. fig. 4.

~~Roß. Fa. Ent. 240. 394. tab. 3. fig. 1. 3.~~

Habitat in Africa.

crassicornis. 25. L. atra, thorace elytrisque testaceis, antennis incrassatis.

Habitat in Austria. Mus. D. Lund.

Statura omnino præcedentium. Antennæ bre-

ves. crassæ, nigrae. Thorax et elytra laevia, testacea, immaculata. Corpus atrum.

26. L.

6. *L. coeruleo-nigricans*, abdomine postice rufo. *haemorrhoidalis*.
 Ent. syst. 2. 87. 17. ⁹
 Habitat ad Cap. Bon. Spei. D. de P. ykull.

110. MYLABRIS. *Palpi* filiformes.
Maxilla cornea, compressa, bifida.
Ligula membranacea, subemarginata.
Antennae moniliformes.

1. *M. nigra*, elytris fascia media flava. Ent. syst. 2. *fasciata*.
 87. 1.

Habitat in Indiis. Dr. Torstenfon.

1. *M. nigra*, elytris flavis: fasciis tribus nigris. Ent. *Cichorei*.
 syst. 2. 88. 2.

Meloë Cichorei. Linn. syst. Nat. 2. 680. 5. *III*. 41.

Mus. Lud. Vlr. 103.

Mylabris Eyeslini. Panz. Fn. Germ. 31. tab. 18.

Oliv. Inf. 47. tab. 1. fig. 1.

~~Suls. Hist. Inf. tab. 7. fig. 111~~

Degeer Inf. 5. 17. 2. tab. 13. fig. 2.

Pall. Icon. tab. E. fig. 7.

Habitat in totius Orientis Cichoreis, in China officinalis.

3. M.

Mylabridis corpus oblongum, laeve, subpubescens, immarginatum, tardum; *capite* magno, exserto, ovato, inflexo; *oculis* rotundatis, marginalibus; *antennis* thorace brevioribus, distantibus, ante oculos insertis; *thorace* rotundato; *scutello* parvo, quadrato; *elytris* rigidiuiculis, fornicatis, abdomine longioribus; *pedibus* longiusculis, cursoriis; *tarsis* anticis quinque-, posticis quadriarticulatis; *colore* obscura.

Antennarum apex in *Mylabridibus*, sicut in *Necrophoris*, probabiliter pro sexu variat.

T. II.

F

3fasciata. 3. *M. atra*, antennis elytrisque flavis, elytris fasciis duabus apiceque nigris.

Mylabris 3fasciata Oliv. Inf. 47. tab. 1. f. 8
Habitat in Guinea. Mus. D. Lund.

Statura *M. Cichorei*. Antennae magnae, flavae apice nigrae. Caput et thorax atra, immaculata. Elytra laevia, flava, fasciis duabus simplicibus apiceque late atris.

lunata.

4. *M. atra*, antennis ferrugineis, elytris flavis: macula fasciisque tribus atris; anticis interruptis

Mylabris lunata. Oliv. Inf. 47. tab. 1. fig. 2.
Fall. Inf. tab. E. fig. 5.

Habitat Tranquebariae. D. Daldorff. Mus. D. d. Sehestedt.

Maior *M. Cichorei*. Caput et thorax villosa, atra immaculata. Antennae apice ferrugineae. Elytra flava, macula communi scutellari, scutellaeque atris. Praeterea fascia baseos futuram haud attingens, at ad marginem anteriorem usque a basin dilatata: macula marginali flava. Fascia secunda pone medium abbreviata, at puncto futurali atro. Apex late ater.

Variat rarius fasciis integris.

praeusta. 5. *M. atra*, elytris apice testaceis: macula atra. Ent. syst. 2. 88. 3. *

Habitat in Barbariae Segete. Mus. D. Desfontaine

marginata. 6. *M. atra*, elytrorum margine sanguineo. Ent. syst. 2. 88. 4. *

Habitat in Barbariae Segete. Mus. D. Desfontaine

Algirica. 7. *M. atra*, elytris testaceis immaculatis. Ent. syst. 2. 88. 5.

Meloë Algiricus Linn. syst. Nat. 2. 651. 11.

Lytta Indica. Herbft. Arch. tab. 30. fig. 3.

Oliv. Inf. 47. tab. 1. fig. 5.

W

Wulf. Inf. Cap. tab. 1. fig. 8.

Cyrill. Ent. Neap. 1. tab. 2. fig. 10.

Habitat in India.

8. *M. nigra*, elytris maculis sex flavis: prima arcuata. Ent. syst. 2. 88. 6. * *Capensis.*

Meloë Capensis. Linn. syst. Nat. 2. 650. 7. Mus. Lud. Vlr. 104.

Oliv. Inf. 47. tab. 2. fig. 12.

Wulf. Inf. Cap. tab. 1. fig. 5.

Habitat ad Cap. Bon. Spei.

9. *M. villosa*, nigra, elytris macula baseos fasciisque duabus dentatis, flavis. Ent. syst. 2. 89. 7. * *Hermannianae.*

Habitat in Guineae Hermannianis. D. Isert.

10. *M. villosa*, nigra, elytris maculis duabus baseos fasciisque duabus dentatis, ferrugineis, antennis nigris. Ent. syst. suppl. 120. 7. * *Sidae.*

Oliv. Inf. 47. tab. 2. fig. 11.

Thunb. nou. sp. Inf. 6. 114. tab. E. fig. 14.

Pall. Inf. tab. E. fig. 3.

Habitat ad Cap. Bon. Spei.

Caput et thorax subvillosa, atra, immaculata.

Elytra punctata, linea vna alteraue eleuata, maculis duabus baseos fasciisque duabus sinuatis flavis.

11. *M. hirta*, nigra, elytris macula baseos fasciisque duabus ferrugineis. *Lavaterae.*

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lund.

Summa affinitas praecedentis, at corpus magis hirtum. Elytra laeuiora, nitidiora, macula tantum vnica baseos fasciisque minus sinuatis.

12. *M. holosericea*, atra, elytris punctis ferrugineis. *atrata.*

Oliv. Inf. 47. tab. 2. fig. 15. at puncta elytrorum plura.

Habitat in America meridionali. Mus. D. de Sehestedt.

Corpus reliquis paullo latius, parum holosericeum, atrum, puncto vno alteroue elytrorum ferrugineis.

punctum. 13. *M. villosa*, atra, elytris fasciis duabus: anteriore flava; puncto nigro, posteriore rufa. Ent. syst. 2. 89. 8. *

Oliv. Inf. 47. tab. 2. fig. 19.

Habitat Tranquebariae. Mus. D. Lund.

10punctata 14. *M. atra*, elytris testaceis: punctis quinque nigris. Ent. syst. 2. 89. 9. *

~~*Meloe apunctatus*. Linn. syst. Nat. 2. 680. 6.~~

~~Oliv. Inf. 47. tab. 1. fig. 4.~~

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

4punctata 15. *M. atra*, elytris testaceis: punctis quatuor nigris. Ent. syst. 2. 89. 10. *

Habitat in Russia. Mus. D. Banks.

6maculata 16. *M. atra*, elytris testaceis: punctis tribus nigris. Ent. syst. suppl. 120. 9. *

Habitat in Russia meridionali. ^{Hungaria} D. Boeber.

flavicornis 17. *M. antennis ferrugineis*, atra, elytris fasciis subtribus maculisque duabus apicis flavis.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. de Sehestedt.

Parua. Antennae fere totae ferrugineae. Caput et thorax villosa, atra. Elytra atra, macula baseos cum fascia anteriore coeunte, fasciis duabus mediis dentatis maculisque duabus apicis flavis.

geminata. 18. *M. atra*, nitida, elytris pallidis: punctis duarum parium fasciaque media nigris. Ent. syst. suppl. 120. 9. *

Habitat in Russia meridionali. D. Boeber.

ruficornis. 19. *M. atra*, antennis ferrugineis, elytris pallidis: pun-

punctis tribus fasciisque duabus atris. Ent. syst. suppl. 121. 10. *

Habitat in Mogador Africae. D. Schousboe.

20. *M. nigra*, coleoptris flavis: fascia punctoque *3 maculata* communi fuscis. Ent. syst. 2. 89. 11. *

Cyrilli Ent. Neap. 1. tab. 3. fig. 7.

Habitat in Oriente. D. Prof. Forstkahl. *Hungaria*

21. *M. hirta*, nigra, elytris, fascia postica punctoque *minuta*. apicis flavis. Ent. syst. suppl. 121. 12. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. D. Weber.

22. *M. villoso-argentea*, elytris maculis flavescentibus: plerisque margine connexis. Ent. syst. 2. 90. 12. *

2. 90. 12. *

Habitat in Senegallia. D. de Paykull.

Parua, antennis ferrugineis.

LII. HORIA. *Palpi* filiformes.

Maxilla videntata.

Ligula bifida: laciniis linearibus, distantibus.

Antennae moniliformes.

H. flavescens, elytris maculis septem nigris. Ent. *maculata*. syst. 2. 90. 1. *

Horia

Horiae corpus elongatum, glabrum, immarginatum, agile; *capite* magno, ovato, plano, exserto, mandibulis palpisque prominulis; *oculis* magnis, oblongis, transuersis, prominulis, marginalibus; *antennis* distantibus, thorace longioribus, ante oculos insertis; *thorace* plano, subquadrato, latitudine fere elytrorum; *scutello* porrecto, tenui; *elytris* rigidiusculis, fornicatis, longitudine abdominis; *pedibus* longiusculis, cursoriis, femoribus posticis interdum incrassatis; *tarsis* auticis quinque-, posticis quadriarticulatis; *color* ~~brunneo~~ *brunneo*.

Horia maculata. Oliv. Inf. 53. tab. 1. fig. 1.

Cucus maculatus. Swed. Act. Holm.

Habitat in Cayenna. D. Olivier.

testacea. 2. *H. rufa*, antennis pedibusque nigris. Ent. fyft. 2
91. 2. *

Oliv. Inf. 53. tab. 1. fig. 2.

Hybn. Naturf. 24. 47. 13. tab. 2. fig. 14-17.

Habitat Tranquebariae.

maxillofa. 3. *H. fanguinea*, antennis pedibusque atris, capite
maximo: mandibulis exsertis, longitudine ca-
pitis.

Horia cephalotes Oliv. Inf. 53. tab. 1. fig. 3.

Habitat in Sumatra. D. Daldorff.

Statura et summa affinitas praecedentis. Antennae breves, atrae. Caput maximum, planum fanguineum, mandibulis exsertis, forficatis, interne ante apicem videntatis longitudine capitis. Thorax transuersus, fanguineus. Elytra fanguinea. Pedes simplices, atrii.

Aliam vidi simillimam, thorace itidem transuerso pedibusque simplicibus, at capite mediocri mandibulisque haud exsertis, an mas?

112. LYMEXYLON. *Palpi anteriores* perfecti: articulo penultimo magno; appendiculo acuto, fisso, ultimo ovato, acuto.
Antennae filiformes.

1. *L. testaceum*, oculis, alis pectoreque nigris. Ent. *dermestoides*.
syft. 2. 91. 1. *

Cantbaris dermestoides. Linn. syft. Nat. 2. 650.
25. Fn. Sv. 702.

Lytta Francofurtana. Herbst. Arch. tab. 30.
fig. 4.

Oliv. Inf. 25. tab. 1. fig. 1. *Ed. foecina* L.
proboscis Sci. III. 31.

Payk. Fn. Sv. 2. 161. 1.

Habitat in Europae ligno.

2. *L. nigrum*, thoracis linea dorsali flava, elytris brevis-*abbreviatum*.
uissimis fornicatis. Ent. syft. 2. 92. 2. *

Necydalis brevicornis. Elytris minutissimis, capite thoraceque fuscis: linea longitudinali flava, antennis brevis-
uissimis crassiusculis. Linn. syft.
Nat. 2. 643. 11.

Habitat in Sierra Leon Africae. Dr. Pflug.

3. *L. nigrum*, elytris testaceis, apice nigris. Ent. syft. *proboscideum*.
2. 92. 3.

mat. L. Jermest.

II. 32.

Oliv.

Lymexyli corpus elongatum, cylindricum, subpubescens, immarginatum, agile; capite rotundato, supra plano, inflexo, inserto, latitudine thoracis; oculis prominulis, rotundatis, marginalibus; antennis distantibus, thorace brevioribus, ante oculos insertis; thorace brevi, transverso, vix marginato; scutello oblongo, apice rotundato; elytris incumbentibus, molliusculis, longitudine abdominis; pedibus brevitibus, cursoriis; tarsis quinquearticulatis; colore obscuro.

Oliv. Inf. 25. 6 5. tab. 1. fig. 5.
Habitat in Germania. D. de Hattorff.

nauale.

4. *L. luteum*, capite, item elytrorum margine apiceque nigris. Ent. syst. 2. 92. 5. *

Oliv. Inf. 25. 5. 4. tab. 1. fig. 4.

Cantharis naualis. Linn. syst. Nat. 2. 650. 26.

II. 31. Fn. Sv. 718. Iter Westgoth. 155. tab. 2.

Frish. Inf. 13. 24. tab. 20.

Schaeff. Icon. tab. 59. fig. 1.

Payk. Fn. Sv. 2. 161. 2.

Habitat in ligno quercus, quod destruit.

flauipes.

5. *L. nigrum*, elytris basi, abdomine apice, pedibusque flavis. Ent. syst. 2. 93. 6. *

II. 32. Habitat in Saxoniae ligno. Dom. Hybner.

Morio.

6. *L. nigrum*, pedibus anticis flavis. Ent. syst. 2. 93. 7. *

II. 31. Schaeff. Icon. tab. 279. fig. 7.

Habitat in Saxoniae ligno. D. Hybner.

variet. L. prodorsalis

113. DIRCAEA. *Palpi* inaequales;

antiores porrecti: articulo ultimo maximo, trilobo.

Antennae filiformes.

barbata.

7. *D. fusca*, antennis tibiisque piceis. Ent. syst. suppl. 121. 1. *Lyme-*

Dircaeae corpus elongatum, cylindricum, glabrum, immarginatum, tardum; *capite* rotundato, inserto; *palpis* prominulis; *oculis* magnis, oblongis, transuersis, marginalibus, vix prominulis; *antennis* distantibus, corpore brevioribus, ante oculos insertis; *thorace* ovato, angulo postico vtrinque prominulo; *scutello* breui, rotundato; *elytris* rigidis, fornicatis, abdomine vix longioribus; *pedibus* curtoris; *tarsis* anticis quadri-, posticis quinquearticulatis; *color* varie obscuro.

Eymexylon barbatum. Ent. syst. 2. 92. 4. *

Mordella barbata. Schall. Act. Hall. 1. 322.
tab. 1. fig. 7.

Serropalpus striatus. Payk. Fn. Sv. 2. 163. 1.
Hellen. in Act. Holm. 1786. 273. tab. 8. fig. 3-5.
Illig. Col. Bor. 1. 130. 7.

Oliv. Inf. 25. 5. 3. tab. 1. fig. 3.

Schaeff. Icon. tab. 66. fig. 1.

Habitat in Germaniae lignis.

Os maxillis palisque. *Palpi* quatuor, inaequales: *anteriores* porrecti, exserti, multo longiores, quadriarticulati: articulis tribus prioribus breuibus, aequalibus, ultimo elongato, compresso, trilobo: lobo inferiori conico, intermedio tenuiori, subulato, incuruo, superiori maiori acuto, adhaerentes maxillae dorso, *posteriores* breues, filiformes, triarticulati: articulis aequalibus adnati ligulae medio. *Man-dibula* breuis, cornea, edentula, incurua. *Maxilla* breuissima, membranacea, bifida: laciniis aequalibus, cylindricis, obtusis. *Ligula* breuis, membranacea, rotundata, integra. *Labium* breue, transuersum, corneum, emarginatum.

2. *D. nigra*, elytris obscure testaceis. Ent. syst. suppl. *discolor*.
121. 2. *

Serropalpus laeuigatus. Illig. Col. Bor. 1. 131. 8.

Xylita buprestoides. Payk. Fn. Sv. 2. 49. 1. II. 33.

~~*Elatér buprestoides*. Ent. syst. 2. 234. 84. IX.~~

Hellen. Act. Sv. 7. 274.

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

3. *D. atra*, elytris maculis quatuor fuluis. Ent. syst. *aguttata*.
suppl. 122. 3. *

Serropalpus 4maculatus. Illig. Col. Bor. 1.
130. 6.

Hy-

- Hypalus aguttatus*. Payk. Fn. Sv. 1. 251. 1.
 Habitat in Suecia. D. de Paykull.
- ruficollis*. 4. D. nigricans, thorace anoque fulvis. Ent. syst. suppl. 122. 4. *
 Habitat sub arborum corticibus Finlandiae.
 De genere haereo; mihi haud rite examinata.
- 2fasciata*. 5. D. ferruginea, capite elytrorumque puncto fusco apiceque nigris.
Notoxus 2fasciatus. Ent. syst. 1. 210. 3. *
Serropalpus 2fasciatus. Illig. Col. Bor. 1. 129. 5
Hypalus quercinus. Payk. Fn. Sv. 1. 252. 2.
 I. 19. Panz. Fn. Germ. 6. tab. 3.
 Habitat in Europa boreali.
- dubia*. 6. D. thorace fusco, elytris ferrugineis: lineola basales fascia media punctoque apicis nigris.
Notoxus dubius. Ent. syst. 1. 211. 4. *
Serropalpus dubius. Illig. Col. Bor. 1. 128. 4.
 I. 19. Panz. Fn. Germ. 11. tab. 13.
 Habitat in Germaniae ligno. D. Smidt.
- fulvicollis*. 7. D. thorace fulvo, elytris fuscis: maculis duabus albis.
 Habitat in Germania. D. Smidt.
 Statura et magnitudo omnino D. dubiae. Caput cum antennis nigrum. Thorax laevis, fulvus immaculatus. Elytra striata, fascia maculis duabus magnis, sublunatis, albidis, et inter maculas lunula parva ad marginem exterio-rem. Corpus nigrum, pedibus fulvis.
- variegata*. 8. D. fusca, elytris pallide testaceis, fusco variis.
Serropalpus variegatus. Act. Hist. Nat. Paris. 1. tab. 10. fig. 2.
 Habitat in Gallia. Mus. D. Bosc.
 Statura omnino et magnitudo D. dubiae. Antennae testaceae. Caput et thorax fusca, immaculata
 Ely.

Elytra laevia, pallide testacea, fusco variegata.
Corpus testaceum.

9. *D. cinereo-pubescens*, nigra, antennis pedibus-*murina*.
que flavescentibus.

Habitat in Carolina Mus. D. Bosc.

Duplo minor *D. 4guttata*. Antennae flavescentes,
apice obscuriores. Thorax gibbus, rotundatus,
niger, tomento tenui, fugaci, cinereo-aureo pa-
rum nitidulo. Elytra substriata, nigra, tomento
eodem fugaci tecta. Pedes flavescentes.

** *saltatoriae*.

10. *D. rufescens*, thorace maculis duabus nigris. *bumeralis*.

Hallomenus bumeralis depressus, rufescens, fe-
riceus, thorace maculis duabus nigris; elytris
substriatis, humeris luteis. Illig. Col. Bor. 1.

134. I.

Hallomenus punctatus. Payk. Fn. Sv. 2. 179. 1.

Chrysomela notata. Quersf. Ign. Inf. sp. 1. 14.

Panz. Fn. Germ. 16. tab. 17.

II. 69

Habitat in Germaniae Fungis.

Proprii generis videtur, at Hallomeni character
adhuc desideratur. A Dom. de Paykull. datus
vix rite elaboratus. Corpus paruum, holoseri-
ceum, vtrinque attenuatum, rufescens. Thorax
maculis duabus magnis nigris. Capitis vertex
nigricat.

11. *D. fusco-holosericea*, antennis extrorsum cras-*micans*.
sioribus.

Hallomenus micans. Illig. Col. Bor. 1. 135. 3. II 70.

Hallomenus micans. Payk. Fn. Sv. 2. 181, 2.

Megatoma picea. Herbst. Col. 4. 97. 5. tab. 39.
fig. 5.

Panz. Fn. Germ. 17. tab. 17.

Ha-

Habitat ad Germaniae sepes.

Statura omnino praecedentis, at paullo minor.

Variat interdum colore magis testaceo.

114. CVCVIVS. *Palpi* aequales: articulo ultimo truncato, crassiori.

Ligula brevis, bifida: laciniis linearibus, distantibus.

Antennae moniliformes:

Gigas.

1. C. depressus, ater, elytris bistriatis: macula apicis coccinea.

Habitat in Guinea. Mus. D. de Sehestedt.

Corpus in hoc genere maximum, depressum, haec, atrum, nitidum. Thoracis margo muticus.

Elytra glabra, atra, striis duabus distantibus, impressis, et inter has strias, versus apicem, macula magna rufa.

beros.

2. C. depressus, ater, femoribus rufis.

Habitat in Sumatra. D. Daldorff. Mus. D. Lund.

Statura et magnitudo omnino praecedentis. Antennae breves, crassae, moniliformes, in altero sexu, articulis subtus prominulis, ferratae. Caput mandibulis crassis, porrectis fronteque bifurcata. Thorax planus, ater, stria vtrinque impressa. Elytra atra, immaculata, inaequaliter striata. Corpus nigrum, femoribus rufis.

3. C.

Cucuii corpus oblongum, depressum, planum, glabrum, immarginatum, agile; capite magno, ovato, inserto, angulo postico interdum prominulo; antennis distantibus, thorace longioribus, pone mandibulas insertis; oculis parvis, rotundatis, prominulis, marginalibus; thorace submarginato: margine saepius dentato; scutello brevi rotundato; elytris rigidis, includentibus, longitudine abdominis; pedibus brevibus, validis, cursoriis, femoribus subclavatis; tarsis quadriarticulatis; colore vario.

3. *C. ater*, elytris ferrugineis. *rufipennis*.
 Habitat in Sumatra. D. Daldorff. Mus. D. de Sehestedt.
 Statura omnino praecedentis, at duplo fere minor, et totus ater, elytris solis ferrugineis.
4. *C. thorace denticulato elytrisque rufis, pedibus depressus*.
 simplicibus nigris. Ent. syst. 2. 93. 1.
Cantbaris sanguinolenta. Linn. syst. Nat. 2. 646. 19.
 Frisb. Inf. 12. tab. 7. fig. 1. VIII. 25.
 Payk. Fn. Sv. 2. 165. 1.
 Habitat in Germania rarius.
5. *C. thorace fulcato, niger, elytris crenato-striatis. fulcatus*.
 Habitat in Croatiae ligno putrescente. D. Saldoner.
6. *C. depressus, rufus, elytris striatis*. Ent. syst. *rufus*.
 suppl. 123. 2. *
 Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.
7. *C. thorace fulcato, elytris punctatis, ater, antennis pedibusque ferrugineis. rufipes*.
 Ent. syst. 2. 94. 3. *
 Habitat in Barbariae ligno. Mus. D. Desfontaines.
8. *C. niger, thorace elytrisque abbreviatis rufis, maxillofus*
 mandibulis exsertis, dentatis.
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.
 Statura omnino *C. spinosi*, paullo minor. Antennae magis moniliformes, pilosae. Caput atrum, nitidum, mandibulis crassis, exsertis, dentatis. Thorax planus, rufus, linea dorsali impressa. Elytra brevia, laevissima, ferruginea, apice nigra. Corpus atrum, femoribus compressis.
9. *C. depressus, thorace elytrisque abbreviatis rufis, spinosus*.
 capite bispinoso.

Habi-

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Medius. Antennae longitudine corporis, filiformes. pilosae: articulis cylindricis. Caput atrum, nitidum, inter antennas spinis duabus porrectis, validis, acutis. Thorax planus, laevis, rufus, basi vtrinque impresso. Elytra valde abbreviata, striata, rufa. Corpus atrum. Pedes breues, nigri, femoribus incrassatis, rufis.

oblongus. 10. C. thorace integro, bifulcato, niger, elytris striatis fuscis.

Habitat in America boreali. Mus. D. de Sehestedt.
Corpus reliquis longius, angustius. Caput nigrum, punctis duobus impressis, oblongis. Thorax integer, sulcis duobus abbreviatis, dorsalibus, impressis. Elytra striata, fusca. Pedes breues, femoribus compressis.

planus. 11. C. planus, testaceus, thorace punctis duobus baseos impressis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Corpus paruum, planum, testaceum, immaculatum. Thorax punctis duobus baseos impressis. Elytra vix striata.

dermestoides. 12. C. thorace sulcato, fuscus, elytris laeuiibus testaceis. Ent. syst. 2. 96. 10. *

I. 35 Panz. Fn. Germ. 3. tab. 13.

Habitat in Germania. D. Smidt.

muticus. 13. C. thorace mutico, nigro: puncto vtrinque impresso, elytris striatis fuscis. Ent. syst. 2. 96. 12. *

VIII. 25. Payk. Fn. Sv. 2. 169. 6.

Habitat in Germania. D. de Hattorff.

14. C

14. *C. thorace mutico, niger, thoracis margine elytrorumque macula ferrugineis. Ent. syst. 2.*

96. 13. *

Payk. Fn. Sv. 2. 169. 7.

I. 35.
36

Panz. Fn. Germ. 4. tab. 12

Habitat in Germania.

15. *C. thorace mutico, ater, nitidus, elytris laeuiffimis, pallidis.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Statura omnino *C. monilis*, at duplo minor. Caput et thorax laeuia, atra, nitida. Elytra laeuiffima, pallida, immaculata.

115. PYTHO. *Palpi sex extrorsum crassiores. Ligula brevis, membranacea, quadrata, emarginata. Antennae filiformes.*

1. *P. thorace fulcato, niger, elytris striatis, coeruleis, abdomine rufo.*

Cucuius coeruleus Ent. syst. 2. 94. 4.

Pytho. Latreille Inf. 50. 75.

Tenebrio lignarius. Degeer Inf. 5. 38. 4. tab. 2. fig. 13.

VIII. 25.

Tenebrio depressus. Linn. syst. Nat. 2. 677. 24.

Payk. Fn. Sv. 2. 166. 2.

Habitat in Germania. D. Schneider.

2. P.

Pythonis corpus oblongum, depressum, planum, immarginatum, glabrum, tardum; capite ouato, thoraci angustiore, inserto; oculis paruis, rotundatis, prominulis, marginallibus; antennis distantibus, vix longitudine thoracis, pone mandibulas insertis; thorace rotundato, plano; scutello breui, rotundato; elytris rigidis; tegentibus, longitudine abdominis; pedibus breuibus, cursoriis; tarsis anticis quinque-, posticis quadriarticulatis; colore obscuro.

festivus. 2. P. thorace sulcato, niger, elytris striatis coerule
abdominis margine tibiisque rufis.

Cucuius festivus Ent. syst. 2. 95. 5. *

Habitat in Germania. D. Smidt.

A praecedente diuersus videtur.

castaneus. 3. P. thorace sulcato, niger, elytris striatis fusc
abdominis margine pedibusque testaceis.

Cucuius testaceus Ent. syst. 2. 95. 6. *

Payk. Fn. Sv. 2. 166. 2. β.

VIII. 26.

Habitat in Germania. D. Smidt.

Os maxillis palpisque. *Palpi* sex inaequales, extrorsum crassiores, *anteriores* breues, biarticulati: articulis aequalibus: ultimo paullo crassiori, adhaerentes maxillae dorso, *intermedii* multo longiores, exserti, quadriarticulati: articulo primo breui, globoso, secundo longior, obconico, tertio quartoque aequalibus, paullo crassioribus, apice obtusis, ad anteriorem inferti, *posteriores* breuiores, extrorsum crassiores, triarticulati: articulo primo breui, globoso, secundo longiori, obconico, tertio breui crassiore, obtuso, adnati ligulae basi laterali. *Mandibula* cornea, incurua, fornicata, apice parum fissa. *Maxilla* breuis, cornea, cylindrica, obtusa. *Ligula* breuis, membranacea, quadrata, apice late emarginata. *Labium* corneum, rotundatum, integrum.

P. festivus & *castaneus* variae
P. caerulei varietates sunt Ill. III.

16. BRONTES. *Palpi* quatuor aequales, filiformes.

Maxilla bifida.

Antennae elongatae, filiformes: articulo primo longiori, incuruo.

B. thorace denticulato, rufus, elytris nigris.

dubius.

Cucuius dubius. Ent. syst. 2. 95. 7. *

Habitat in America boreali.

B. thorace denticulato, nigro, pedibus flavescen-
tibus. *flavipes.*

Cucuius flavipes. Ent. syst. 2. 95. 8. *

111. 26.

Cerambyx planatus. Linn. syst. Nat. 2. 625. 15.

Payk. Fn. Sv. 2. 167. 3.

Nesiota. Latreille Inf. 50. 76.

Habitat in Europae borealis truncis decorticatis.

Character generis naturalis adhuc desideratur.

Video maxillas palposque. *Palpi* anteriores filiformes, breves, quadriarticulati: articulo primo brevi, secundo longiori, obconico, ultimo acutiusculo, adhaerentes maxillae dorso.

Mandibula brevis, cornea, incurva, edentula, acuta. *Maxilla* brevis, membranacea, bifida: laciniis aequalibus, obtusis. Reliqua haud observavi.

3. B.

Brontae corpus paruum, oblongum, depressum, planum, glabrum, immarginatum, agile; *capite* ovato, inserto; *oculis* globosis, prominulis, marginalibus; *antennis* distantibus, longitudine corporis, post mandibulas insertis; *thorace* subquadrato, vix marginato: angulo antico prominulo, acuto, postico rotundato; *scutello* parvo, rotundato; *elytris* rigidis, tegentibus, longitudine abdominis; *pedibus* brevibus, validis, cursoriis; *tarsis* quadriarticulatis; *colore* obscure.

T. II.

G

pallens.

3. B. thorace ferrato, obscuro, elytris striatis, abd
mine pedibusque testaceis.

Cucuius pallens. Ent. syst. 2. 96. 9. *

Cucuius flavipes. Payk. Fn. Sv. 2. 167. 3. β.

Habitat in Germania. D. Smidt.

*praecedenti
varietat. Ill. 3.*

testaceus.

4. B. thorace subquadrato mutico, testaceus, fem
ribus compressis.

Cucuius testaceus. Ent. syst. 2. 96. 11. *

Habitat sub Betulae cortice. Mus. D. Romani.

minimus.

5. B. thorace mutico, ferrugineus, elytris laeuif
mis, pallidis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mu
D. Lund.

Minutus et praecedentibus triplo adhuc mino
Corpus planum, ferrugineum, elytris pallidis.

117. COSSYPHVS. *Palpi inaequales,
anteriores securiforme
Maxilla bifida,
Antennae claua perfoliat*

depressus.

1. C. antennis clypeo brevioribus. Ent. syst. 2. 91

I. *

Cossyphus depressus. Oliv. Inf. 44. tab. 1. fig.

~~Herbst. Arch. tab. 46. fig. 7. of Lusitania~~

Ill. 3. Habitat in India orientali et Mauritania.

planus.

2. C. antennis clypeo longioribus.

≠ Habitat Tranquebariae. Mus. D. de Sehested.

Praecedenti nimis affinis, et forte mera eius v
rietas maior.

+ Herbst. Coleopt. 7. 229. tab. 109. fig. 13
Cos. Hoffmannseggii

≠ Herbst. 7. 228. tab. 109. fig. 12
Cos. depressus. 1

118. LAMPYRIDÆ. *Palpi* quatuor, subclauati.
Maxilla bifida.
Labium corneum, integrum.
Antennæ filiformes.

* corpore angusto oblongo.

1. *L. oblonga*, fusca, clypeo cinereo. Ent. syst. 2. *noctiluca*.

98. 1.

Lampyrus noctiluca. Linn. syst. Nat. 2. 643. 1.

Fn. Sv. 699.

Oliv. Inf. 28. tab. 1. fig. 2.

Panz. Fn. Germ. 41. tab. 9.

IV. 55.

Degear Inf. 4. 31. 1. tab. 1. fig. 19. 20.

Payk. Fn. Sv. 2. 170. 1.

Habitat in Europae borealis Iuniperetis.

2. *L. oblonga*, fusca, clypeo apice hyalino. Ent. *splendidula*
 syst. 2. 98. 2.

Lampyrus splendidula. Linn. syst. Nat. 2. 644. 3.

Oliv. Inf. 28. 11. 1. tab. 1. fig. 1.

Geoff. Inf. 1. 166. 1.

Bradl. nat. tab. 26. fig. 3.

IV. 55

Panz. Fn. Germ. 41. tab. 8.

Payk. Fn. Sv. 2. 171. 2.

Habitat in Europae syluaticis, tempestate pluuiosa
 lucem viuacissimam spargens.

3. *L.*

Lampyridis corpus oblongum, glabrum, marginatum, tardum;
capite paruo, rotundato, sub thoracis clypeo recondito;
oculis magnis, globosis, approximatis, lateralibus; *antenna*
is approximatis, thorace breuioribus, supra oculos in-
 sertis; thoracis *clypeo* marginato, dilatato, caput tegente;
scutello rotundato; *elytris* molliusculis, incumbentibus,
 longitudine abdominis saepius phosphorescentis; *pedibus*
 breuibus, cursoriis; *tarsis* quinquearticulatis; *colore* ob-
 scuro.

G 2

corrusca.

3. *L. obscure nigra*, clypeo vtrinque lunula rosea.
Ent. syst. 2. 98. 3. *
Lampyris corrusca. Linn. syst. Nat. 2. 644. 2.
Oliv. Inf. 28. tab. 2. fig. 14.
Habitat in America. D. Blackburn.

analis.

4. *L. fusca*, clypeo elytrorumque margine flavis, abdomine apice albissimo, antennis compressis.
Habitat in China. Mus. D. Lund.
Magna. Antennae valde compressae, obscurae.
Thoracis clypeus rotundatus, flavus, immaculatus. Pectus et abdominis basis fusca. Ultima abdominis segmenta albissima. Pedes testacei.

obscura.

5. *L. nigra*, clypeo vtrinque macula rufa. Ent. syst. 2. 99. 4. *
Oliv. Inf. 28. tab. 2. fig. 13.
Habitat in Terra del Fuego. Mus. D. Banks.

bicolor.

6. *L. supra testacea*, subtus atra, abdominis segmentis duobus penultimis, striga abbreviata albissima.
Habitat in nova Cambria. D. Billardiere.
Magna in hoc genere. Antennae compressae, serratae. Clypeus et elytra laevia, testacea, immaculata. Corpus totum atrum, segmentis duobus penultimis striga abbreviata pellucida.

laticornis.

7. *L. ovata*, atra, clypei margine rufo, antennis compressis. Ent. syst. 2. 99. 5. *
Lampyris atra. atra, thoracis margine rufo. Ent. syst. 2. 101. 17. *
Oliv. Inf. 28. tab. 3. fig. 28.
Habitat in America boreali.

8. *L.*

Lampyrides plantis victitant, in tenebris lucem phosphoreum spargunt. Feminae apterae.

8. *L. clypeo* rufo, medio nigro, elytris nigris: marginibus abdomineque albis. Ent. fyft. 2. 99. 6. *
Lampyris pyralis. Linn. fyft. Nat. 2. 644. 4.
 Muf. Lud. Vlr. 78.
 Oliv. Inf. 28. tab. 2. fig. 11.
 Degeer Inf. 4. 52. 7. tab. 17. fig. 7.
 Habitat in America meridionali.
9. *L. fusca*, thorace, elytrorum margine abdominisque apice fulvis. Ent. fyft. 2. 99. 7. *
Lampyris cincta. Oliv. Inf. 28. tab. 3. fig. 22.
 Habitat in Poulicandor. Muf. D. Banks.
10. *L. nigra*, thoracis elytrorumque margine omni, scutello abdominisque poftico flavis. Ent. fyft. 2. 100. 8. *
Lampyris marginata. Linn. fyft. Nat. 2. 644. 5.
 Oliv. Inf. 28. tab. 2. fig. 16.
 Naturf. 24. 31. 43. tab. 1. fig. 43.
 Habitat in America.
11. *L. atra*, clypeo, lateribus, bafi exteriori, elytrorum abdominisque apicibus albis, antennis pectinatis. Ent. fyft. 2. 100. 9. *
Lampyris pectinata. Linn. fyft. Nat. 2. 649. 17.
 Degeer. Inf. 4. 51. 11. tab. 17. fig. 13.
 Habitat in America.
12. *L. elytris* fufcis: margine exteriori luteo, abdomine flauo. Ent. fyft. 2. 101. 13. *
Lampyris lucida. Linn. fyft. Nat. 2. 645. 8.
 Oliv. Inf. 28. tab. 2. fig. 19.
 Degeer Inf. 4. 51. 5. tab. 17. fig. 5.
 Sulz. Hift. Inf. tab. 5. fig. 22.
 Habitat in America meridionali.
13. *L. nigra*, clypeo elytrisque bafi testaceis, abdomine punctis duobus albiffimis.

Habi-

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.

Media, oblonga. Caput cum antennis nigrum; ore
testaceo. Clypeus rotundatus, integer, testa-
ceus: linea media impressa. Elytra vix stri-
ata, fusca, basi testacea. Corpus atrum, abdomi-
nis segmento penultimo et antepenultimo ma-
cula media albissima. Femora rufescentia.

beatica.

14. L. testacea, thoracis disco fusco, abdomine pal-
lido.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Statura L. lucidae. Clypeus rotundatus, fuscus:
margine pallide testaceo. Elytra holosericea,
pallide testacea, margine concolore. Corpus
obscurum, abdomine flavo.

nitidula.

15. L. fusca, thorace flavescente: macula media ni-
gra, abdominis apice maculis duabus flavis.
Ent. syst. 2. 101. 14. *

Oliv. Inf. 28. tab. 2. fig. 15.

Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. D. Banks.

phosphorea. 16. L. subtestacea, abdomine atro, postice flavissimo.
Ent. syst. 2. 101. 15. *

Lampyris phosphorea. Linn. syst. Nat. 2. 645. 9.

Degeer Inf. 4. 51. 6. tab. 17. fig. 6.

Habitat in America meridionali.

Antennae nigrae.

Japonica. 17. L. flava, segmento abdominis antepenultimo ni-
gro. Ent. syst. 2. 101. 16. *

Thunb. non. sp. Inf. 4. 79.

Oliv. Inf. 28. tab. 2. fig. 18.

Habitat in Iaponia; mense Maii et Junii copiosissi-
ma, vesperi lumine phosphoreo e vesiculis binis
caudalibus aëra replens. Thunberg.

18. L.

18. *L. thorace rufo, medio nigro, elytris nigris: compressis*
margine omni pallido, antennis planis compressis. *cornis.*

Habitat in America meridionali. Mus. D. de Sehestedt.

Statura et magnitudo praecedentium. Antennae longitudine corporis, compressae, planae, ferratae. Clypeus rotundatus, pallidus: medio late nigro. Elytra nigra, margine futuraeque parum pallidis. Corpus nigrum, ano pallido.

19. *L. pallida, abdominis segmento quarto albissimo.* *pallens.*
 Ent. syst. suppl. 124. 15. *

Brown. Jamaic. tab. 44. fig. 9.

Habitat in Americae meridionalis Insulis. Mus. D. Lund,

20. *L. pallida, capite, scutello elytrorumque vitta striata.*
marginali nigris, abdomine apice albissimo.

Habitat in Insulis maris pacifici. D. Billardiere.

Statura omnino *L. Capensis*. Caput atrum. Clypeus transversus, caput vix tegens, vti in *L. Italica*, *Capensi*, *vespertina*, pallidus, linea dorsali nigra. Scutellum maculaeque elytrorum ad scutellum nigra. Elytra striata, pallida, vitta marginali, nigra. Corpus pallidum, segmentis duobus ultimis albissimis. Pedes pallidi, plantis fuscis.

21. *L. livida, thorace flavescente, abdomine postice Capensis.*
flavissimo. Ent. syst. 2. 102. 18. *

Oliv. Inf. 28. tab. 2. fig. 17.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

22. *L. testacea, elytris apice nigris, abdomine apice vespertina.*
albissimo.

Habitat in India orientali. D. Daldorf.

Media. Caput nigrum, oculis magnis, globosis.

Cly-

peus rotundatus, testaceus, immaculatus. Elytra laevia, testacea, apice nigra. Corpus testaceum, abdominis apice albissimo.

aesivalis. 23. *L. flavicans*, capite elytrisque fuscis, abdominis apice albissimo. Ent. syst. 2. 102. 19. *
Habitat in nova Hollandia. Mus. D. Banks.

thoracica. 24. *L. clypeo rufo*, elytris atris, abdomine fusco puncto medio albissimo.
Lampyris thoracica Oliv. Inf. 28. tab. 3. f. 16.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Media. Antennae ferratae, nigrae. Clypeus rotundatus, integer, ferrugineus, margine pallidiore. Scutellum ferrugineum. Elytra atra immaculata. Pectus flavescens. Abdomen fuscum, puncto parvo, medio, albissimo.

planicornis. 25. *L. clypeo flavescente*, elytris nigris, antennis apice albis.
Habitat in America meridionali, D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Statura omnino praecedentis paullo minor. Antennae compressae, nigrae: articulis ultimis duobus albis. Thorax rotundatus, rufescens. Elytra laevia, nigra. Corpus flavescens, abdomine fusco; ano albissimo.

italica. 26. *L. nigra*, thorace transverso pedibusque rufis abdomine apice albissimo. Ent. syst. 2. 102. 20. *

Lampyris italica, Linn. syst. Nat. 2. 645. 11.
Oliv. Inf. 28. tab. 2. fig. 12.
Degeer. Inf. 4. 53. 9. tab. 17. fig. 9. 10.
Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 3.
Habitat in Italiae arboribus.

27. *L. nigra*, thoracis clypeo rufo: margine palli- *Caiennensis.*
scente, antennis flabellatis.

Habitat in Cayenna. D. Richard.

Magnitudo *L. Italicae*, et omnino distincta. Antennae flabellatae, nigrae, articulo primo pallido. Clypeus rotundatus, rufus, margine hyalino. Elytra atra. Pedes antici testacei. Abdomen deest.

28. *L. rufa*, elytris nigris: margine omni vittaque *vittata.*
media abbreviata flavis. Ent. syst. 2. 102.
21. *

Oliv. Inf. 28. tab. 3. fig. 20.

Habitat in Insula Guadeloupe. D. de Badier.

29. *L. nigra*, thorace maculato, elytris margine vit- *versicolor.*
taque media flavescentibus, abdomine apice albissimo. Ent. syst. suppl. 123. 21. *

Habitat in America boreali. D. Herschel.

30. *L. elytris* lividis, corpore flavo. Ent. syst. 2. *mauritanica.*
103. 22.

Lampyrus mauritanica. Linn. syst. Nat. 2. 645.
10.

Oliv. Inf. 28. tab. 1. fig. 5.

Habitat in Africa.

31. *L. nigra*, elytris abbreviatis, capite rufo: fascia *erythrocephala.*
oculari atra.

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Antennae magnae, nigrae, valde serratae et fere flabellatae. Caput rufum, fascia magna inter oculos. Thorax planus, submarginatus. Elytra corpore dimidio breviora. Abdomen planum, atrum. Pedes atrii.

32. *L. fulvus*, antennis pectinatis fascis, elytris ab- *plumosa.*
bruevatis, attenuatis.

Lam.

- Lampyrus plumosa*. Oliv. Inf. 28. tab. 27. fig. 27.
Habitat in America boreali.
Elytra brevissima, attenuata, fulva, immaculata.
- bemiptera*. 33. L. nigra, elytris brevissimis. Ent. syst. 2. 103.
23. *
Geoff. Inf. 1. 108. 2.
Oliv. Inf. 28. tab. 3. fig. 25.
Habitat in Gallia. Mus. D. Bose.
in Silesia - Gnadenberg
** corpore latiori, ovato.
- maculata*. 34. L. ovata, pallide testacea, elytris maculis duabus marginalibus nigris. Ent. syst. suppl. 125. 21. *
Oliv. Inf. 28. tab. 1. fig. 3.
Habitat Surinami.
- lateralis*. 35. L. ovata, livida, elytris macula marginali pallida. Voet. Col. 1. tab. 48. fig. 3.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.
Statura et magnitudo præcedentis. Clypeus rotundatus, lividus medio obscuriore. Elytra laevia, livida: macula magna, pallida ad marginem exteriorem. Abdomen lividum, ano bifido.
- flabellata*. 36. L. ovata, nigra, clypeo apice elytrisque fuscis duabus testaceis, antennis flabellatis. Voet. Col. 1. tab. 48. fig. 5.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.
Statura et magnitudo L. maculatae. Antennae magnae, flabellatae, atrae. Clypeus rotundatus, basi niger, apice testaceus. Elytra laevia nigra.

nigra, fasciis in ipsa basi mediaque testaceis.
Corpus testaceum, pedibus atris.

Variat elytris testaceis, macula marginali apiceque nigris.

37. *L. ouata*, atra, clypeo apice testaceo, antennis *guttata* flabellatis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Nimis affinis *L. flabellatae*. Antennae valde flabellatae, atrae. Clypeus valde dilatatus, rotundatus, integer, niger, apice testaceus. Elytra laevia, nigra, basi parum punctoque vno, altero testaceis. Corpus atrum.

38. *L. ouata*, nigra, clypeo ante marginem, elytris *flabellatis* lineola marginali baseos abdomineque apice albis. Ent. syst. 2. 100. 10. *

Oliv. Inf. 28. tab. 3. fig. 26.

Habitat in Brasilia. Mus. D. Banks.

39. *L. ouata*, elytris fuscis: macula marginali triangulari flava. Ent. syst. 2. 100. 11. * *bespera*.

Lampyris bespera. Linn. syst. Nat. 2. 644. 6.

Oliv. Inf. 28. tab. 1. fig. 6.

Degeer Inf. 4. 49. 2. tab. 17. fig. 1.

Habitat in America.

40. *L. ouata*, elytris fuscis: macula marginali ovata *ignita* lutea. Ent. syst. 2. 100. 12.

Lampyris ignita. Linn. syst. Nat. 2. 645. 7.

Oliv. Inf. 28. tab. 1. fig. 7.

Degeer Inf. 4. 49. 2. tab. 17. fig. 2.

Habitat in America meridionali.

Nimis affinis videtur *L. laterali*.

119. OMALYSVS. *Palpi* aequales, extror-
trorsum crassiores.

Maxilla membranacea,
bifida.

Ligula membranacea, e-
marginata.

Antennae filiformes.

suturalis. I. OMALYSVS.

Omalysus. Geoff. Inf. I. 180. I. tab. 2. fig. 9.

Omalysus suturalis. Oliv. Inf. 24. 14. I. tab. 1
fig. 1.

Fourcroy Ent. I. 64. I.

Habitat in Gallia. Muf. D. Olivier.

S. 210

120. PYROCHROA. *Palpi* subfiliformes.

Maxilla integra.

Ligula lata, bifida: laci-
niis aequalibus, rotun-
datis.

Antennae filiformes.

coccinea.

I. P. nigra, thorace elytrisque sanguineis immacula-
tis. Ent. syst. 2. 104. I.

Lumpyris coccinea. Linn. syst. Nat. 2. 646. 18.
Fn. Sv. 705.

Pyrochroa. Geoff. Inf. I. 338. I. tab. 6. fig. 4
Oliv.

Pyrochroae corpus oblongum, planum, depressiusculum, la-
marginatum, tardum; *capite* ovato, exserto; *oculis* rotun-
datis, prominulis, marginalibus, *antennis* fixatis, supra
longioribus, sub oculos insertis; *abscissa* rotundato, pla-
no; *scutello* minuto, rotundato; *elytris* rigidiusculis, for-
nicatis, longitudine abdominis; *pedibus* longiusculis, ni-
nibus, curseriis; *tarsis* anticis quinque-, posticis qua-
drarticulatis; *colore* rubro nigroque, nitidiusculo.

- Oliv. Inf. 53. tab. 1. fig. 1.
 Schaeff. Icon. tab. 90. fig. 4.
 Degeer Inf. 4. 47. 4.
 Panz. Fn. Germ. 13. tab. 11. II. 34.
 Payk. Fn. Sv. 2. 172. 1.
 Habitat in Europae sepibus.
Mundibula magna, crassa, ap. ce attenuata, incurva; subulata, acuta. *Ligula* elongata, membranacea, lata, fere ad basin fissâ: laciniis aequalibus; rotundatis. *Labium* corneum, integrum.
- P. nigra*, capite, thorace elytrisque sanguineis *rubens*.
 immaculatis. Ent. syst. 2. 105. 2. *
Lampyrus rubens. Act. Hall. 1. 301.
 Oliv. Inf. 53. tab. 1. fig. 2. VIII. 26.
 Habitat in truncis putrescentibus Salicis.
~~Vix a praecedente satis distincta.~~
- P. coccinea*, antennis elytrisque nigris. Ent. syst. *flabellata*.
 2. 105. 3. *
 Oliv. Inf. 53. tab. 1. fig. 3.
 Habitat in America. Mus. Dr. Hunter.
- P. atra*, thorace elytrisque testaceis, antennis *pectinicornis*.
 Ent. syst. 2. 105. 4. *
Cantharis pectinicornis. Linn. syst. Nat. 2. 650.
 20. Fn. Sv. 713.
 Oliv. Inf. 53. tab. 1. fig. 4. II. 34.
 Panz. Fn. Germ. 13. tab. 12.
 Habitat in Germania. D. Hybner.
- P. rufa*, elytris striatis nigris: maculis quinque *tomacula*.
 rubris, thorace vtrinque trituberculato. Ent. *sa*.
 syst. 2. 105. 5. *
 Habitat in Cayenna. Mus. D. Gigot d'Orcey.

121. LYCVS. *Os* rostro cylindrico, incurvo.
Palpi quatuor: articulo ultimo
 crassiori truncato.
Antennae filiformes.

latissimus. 1. *L. flavus*, elytris macula marginali posticeque
 nigris: margine laterali maximo dilatato. Ent. syst. 2. 106. 1. *

Lampyris latissima Linn. syst. Nat. 2. 646. 14.
 Oliv. Inf. 29. tab. 1. fig. 2.

Habitat in Sierra Leon Africae. D. Drury.

palliatu. 2. *L. elytris coriaceis latissimis testaceis, apice nigris.* Ent. syst. 2. 106. 2. *

Oliv. Inf. 29. tab. 1. fig. 3.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

rostratus. 3. *L. niger*, thoracis lateribus elytrisque dilatatis
 flavis, antice posticeque nigris. Ent. syst. 2.
 106. 3. *

Lampyris rostrata. Linn. syst. Nat. 2. 646. 19.
 Mus. Lud. Vlr. 78.

Oliv. Inf. 29. tab. 1. fig. 4.

Degeer Inf. 7. 622. 19. tab. 46. fig. 11.

Habitat in Africa.

marginatus. 4. *L. ater*, thorace marginato rufo: medio nigro
 maculis tribus pallidis, elytris rufis, apice nigris.

Habitat in Sumatra. D. Daldorff.

Magnus

Lyci corpus oblongum, glabrum, tardum; capite parvo, rotundato, sub thoracis clypeo recondito, ore porrecto, cylindrico, rostrato; oculis parvis, globosis, marginibus; antennis approximatis, ferratis, thorace longioribus, ant oculos inferis; thoracis clypeo plano, marginato, dilatato, caput tegente; scutello minuto, rotundato; elytris sexgilibus, dilatatis, abdomine latioribus; pedibus brevibus, curvatis; tarsi quinquearticulatis; colore vario.

Magnus. Antennae compressae; nigrae. Thorax rufus, margine valde elevatus et postice fere emarginatus. Discus niger, maculis tribus baefeis pallidis. Elytra fulcata, rufa; apice nigra. Corpus atrum.

5. L. niger, thoracis lateribus elytrisque flavis, ~~postice nigris~~ *proboscideus*. Ent. syst. 2. 107. 5. *
Oliv. Inf. 29. tab. 1. fig. 6.
Habitat in Africa aequinoctiali.

6. L. niger, thorace elytrisque rufescentibus, elytris *serratigoriis*. Ent. syst. 2. 107. 5. *
Oliv. Inf. 29. tab. 1. fig. 14.
Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

7. L. ater, thoracis margine elytrorumque basi rufis, *dimidiatus*. Antennis flabellatis.
Habitat in Carolina. Mus. D. Bose.

Medius. Antennae atrae, dentibus longioribus, compressis flabellatae. Thorax in medio carinatus, ater, marginatus: margine rufo. Elytra fulcata: fulcis rugosis, basi rufa, scutello et ad scutellum nigra, apice atra. Corpus atrum.

8. L. ater, thoracis margine flavescente, elytris *fasciatus*. fascia lata alba. Ent. syst. 2. 107. 7. *

Cantbaris tropica, thorace marginato: lateribus rubris, elytris nigris: fascia alba, antennis pectinatis. Linn. syst. Nat. 2. 649. 19.

Oliv. Inf. 29. tab. 1. fig. 8.

Habitat in Cayenna. D. v. Rohr.

9. L. ater, thoracis margine flauo, elytris flavis, *fasciatus* fascia apiceque nigris. Ent. syst. 2. 107. 8. *

Oliv. Inf. 29. tab. 1. fig. 7.

Habitat in America boreali.

10. L. ater, thoracis limbo elytrorumque margine *humeralis*. humerali rufis.

Habi-

Habitat in Carolina. Mus. D. Bost.

Medius. Caput cum antennis atrum. Thorax inaequalis, marginatus, ater, margine omnè rufo. Elytra fulcata: fulcis rugosis, atra, margine baseos, siue humerali rufo. Corpus atrum.

ferratus.

11. *L. flavescens*, elytris striatis: fasciis tribus nigris.

Cantharis ferrata. Linn. syst. Nat. 2. 649. 18.

Oliv. Inf. 29. tab. 1. fig. 5.

Degeer Inf. 4. tab. 1. fig. 12.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Magnitudo et statura praecedentium. Antennae compressae, ferratae, nigrae. Caput flavescens. Thorax flavescens, linea dorsali nigra, margine reflexo. Elytra striata, flava: fasciis tribus nigris; baseos abbreviata, apicis latiore. Corpus flavescens.

inaequalis. 12. *L. ater*, thorace immarginato, inaequali, elytris-
que rufis, his apice nigris.

Habitat in Sumatra. D. Daldorff.

Praecedente paullo minor. Caput atrum, antennis compressis, ferratis. Thorax haud marginatus, at lineis variis elevatis, inaequalis, rufus, im-maculatus. Elytra fulcata, rufa, apice nigra. Corpus atrum.

*ferrugi-
neus.* 13. *L. niger*, thoracis lateribus elytris-
que striatis rufis. Ent. syst. 2. 125. 4. *

Habitat in India orientali. Mus. D. de Sehestedt.

praecustus. 14. *L. ferrugineus*, elytris apice nigris. Ent. syst. 2. 107. 6. *

Habitat Tranquebariae. Mus. D. de Sehestedt.

tricolor. 15. *L. testaceus*, elytris nigris: fascia media testa-
cea.

Ly.

Lycus tricolor. Oliv. Inf. 29. tab. 1. fig. 10.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Statura et magnitudo *L. praeufsi*. Antennae compressae, atrae. Thorax testaceus, linea media margineque parum eleuatis. Elytra striata, basi fusca, in medio testacea, apice nigra. Corpus testaceum.

Variat colore baseos elytrorum magis et minus diluto.

6. *L. sanguineus*, elytris postice violaceis. Ent. syst. *bicolor*.
2. 108. 9. *

Lampyris bicolor. Linn. syst. Nat. 2. 646. 16.

Cantharis bicolor. Linn. Amoen. acad. 6. 395.
21.

Oliv. Inf. 29. tab. 1. fig. 9.

Habitat in Africa.

7. *L. ater*, immaculatus, antennis flabellatis.

atrasus.

Habitat in Oceani pacifici Insulis. D. Billardiere.
Magnitudo praecedentium, at totus ater, immaculatus.

8. *L. ater*, elytris apice rufis.

baemorboidalis.

Habitat in Oceani pacifici Insulis. D. Billardiere.
Statura praecedentis, at antennarum articuli haud flabellati, sed compressi obconici. Os vix porrectum palpis, vti mihi videtur, subsecuriformibus. Thorax vix marginatus, inaequalis, niger. Elytra sulcata, atra, apice rufa.

Vix huius generis os haud porrectum, et palpi anteriores subsecuriformes.

9. *L. ater*, elytrorum margine omni rufo.

cinctus.

Habitat in maris pacifici Insulis. D. Billardiere.
Statura et affinitas praecedentium, at margo elytrorum et sutura rufa. Antennae flabellatae.

T. II.

H

20. L.

- rufipennis.* 20. *L. ater*, elytris striatis rufis.
Habitat in Oceani pacifici Insulis. D. Billardiere
Omnino distinctus. Antennae flabellatae, tota
atrae.
- linearis.* 21. *L. thorace inaequali*, ferrugineo: macula basae
nigra, elytris linearibus ferrugineis, apice atris
Habitat in Guinea. Mus. D. Lund.
Reliquis longior. Antennae atrae. Thorax sub
marginatus, inaequalis, rufus, macula basae
nigra. Elytra valde linearia, elongata, fulcata
fulcis punctatis, apice atra. Corpus atrum.
- cruentus.* 22. *L. ater*, thorace marginato elytrisque fanguineis
his apice atris.
Habitat in Sumatra. Mus. D. de Sehestedt.
Omnino distinctus a *L. inaequali*, et duplo minor
Antennae compressae, atrae. Thorax valde mar
ginatus, fanguineus, immaculatus. Elytra stria
ta, fanguinea, apice atra. Corpus atrum.
- galeatus.* 23. *L. ater*, thoracis limbo, elytrorum basi, macula
cristata fasciaque media flavis.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus
D. Lund.
Statura et magnitudo omnino *L. cristati*. Anten
nae compressae, nigrae: articulo ultimo flavo
Thorax magis planus et laevis quam in reli
quis, niger, margine omni flavo. Elytra laevis
atra, ad basin macula parua, et in hac crista
parua eleuata, compressa. In medio fascia lata
flaua. Corpus atrum.
- cristatus.* 24. *L. elytris striatis ferrugineis*, apice nigris: basi
crista eleuata compressa.
Habitat in Guinea. Mus. D. de Sehestedt.
Paullo minor *L. bicolore*. Antennae totae atrae
Thorax marginatus, rufus, linea media lata
atra

atra. Elytra striata, rufa, apice nigra, et basi crista magna eleuata, compressa, marginem fere tegente. Corpus atrum.

15. *L. ater*, thoracis limbo elytrisque reticulato-striatis: macula baseos fasciaque media flauis. *limbatus.*
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

L. ferrato duplo fere minor. Antennae compressae, atrae. Thorax limbo eleuato, flauo. Elytra fulcata, sulcis lineolis transuersis reticulata, macula baseos ad marginem exteriorem fasciaque media flauis. Corpus atrum, pedum geniculis flauis.

16. *L. niger*, thoracis margine flauo, elytris linearibus basi macula cristata flaua. *compressus*
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Söhestedt.

Statura praecedentium. Antennae compressae, nigrae. Thorax ater, limbo deflexo, flauo. Elytra linearia, laeuis, atra, macula parua baseos flaua, et in hac crista parua, compressa, eleuata. Corpus atrum, pedibus fuscis: femoribus flauis.

17. *L. niger*, thoracis margine flauo, elytris striatis fasciis: punctis impressis pellucidis. *diapbanus.*
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Distinctus omnino a reliquis. Antennae compressae, atrae. Thorax niger, limbo omni lineaque dorsali eleuatis rufis. Elytra striata, fusca: sulcis punctis pellucidis striata. Corpus nigrum, femoribus basi flauis.

18. *L. ater*, thoracis limbo ferrugineo, elytris subtilissime striatis. *discoideus.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. M.
D. de Sehestedt.

Paullo minor L. Aurora. Antennae compressae
atrae. Thorax niger, limbo eleuato, ferrugine
Elytra subtilissime striata, atra, immaculata
Pedes atri, femoribus basi rufis.

Variat forte sexu antennis flabellatis.

sanguineus 29. L. niger, thoracis lateribus elytrisque glabri
sanguineis. Ent. syst. 2. 108. 10.

Lampyris sanguinea. Linn. syst. Nat. 2. 846. 1.
Fn. Sv. 704.

Geoff. Inf. 1. 168. 3.

IV. 55 Panz. Fn. Germ. 41. tab 9.

Oliv. Inf. 29. tab. 1. fig. 1.

Frisch. Inf. 12, tab. 3.

Schaeff. Icon. tab. 24. fig. 1.

Satz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 4.

Degeer Inf. 4. 45. 2. tab. 2. fig. 2.

Payk. Fn. Sv. 2. 174. 1.

Habitat in Europae lapidosis.

aurora. 30. L. niger, thoracis lateribus elytrisque reticulato-
striatis rufis.

Panz. Fn. Germ. 41. tab. 10.

Herbst. Arch. tab. 5. 105. 4.

Voet. Col. 2. tab. 47. fig. 9.

Varietas thorace toto atro, vix differt.

nigripes. 31. L. sanguineus, antennis pedibusque nigris. Ent.
syst. 2. 108. 12. *

Lycus nigripes. Oliv. Inf. 29. tab. 1. fig. 12.

Habitat in Siam. Mus. D. Banks.

flabellicornis. 32. L. niger, thoracis margine testaceo, antennis fe-
ratis. Ent. syst. 2. 109. 14. *

Habitat in Cayenna. D. de Paykull.

3. *L. ater*, thoracis margine antennarumque ultimo articulo rufis. *pectinatus*.

Cantharis pectinata. atra, clypei lateribus, basi exteriori elytrorum latius rufo, antennis ~~pectinatis~~. Linn. syst. Nat. 2. 649. 17.

Degeer Inf. 4. tab. 17. fig. 13.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Minor. Antennae compressae, nigrae, articulo ultimo rufo. Elytra striata, sulcis lineolis transversis, subreticulatis, nigra, margine baseos rufescente.

4. *L. ater*, antennarum apicibus elytrisque sanguineis. Ent. syst. 2. 108. 13. *

Oliv. Inf. 29. tab. 1. fig. 13.

Panz. Fa. Germ. 41. tab. II.

Panz. Naturf. 24. 31. 45. tab. 1. fig. 44.

Payk. Fn-Sv. 2. 176. 4.

Degeer Inf. 5. 47. 3.

Habitat in Europa boreali. Mus. D. Lund.

5. *L. ater*, thoracis margine elytrorumque lineola baseos ferrugineis, elytris laevibus. *laevigatus*.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Corpus paruum. Antennae compressae, totae nigrae. Caput et thorax nigra, thoracis margine ferrugineo. Elytra laevia, atra, basi lineola parva, ferruginea. Corpus atrum.

36. *L. ater*, thorace rufo, antennis simplicibus. Ent. syst. 2. 109. 15. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. de Paykull.

37. *L. cyaneus*, thorace rufo, antennis flabellatis. *thoracicus*

Habitat in Australasia. D. Billardiere.

Affinis videtur praecedenti, at maior. Antennae com-

compressae, flabellatae. Thorax rufus. Elytra cyanea, fulcata: fulcis rugosis.

*marginel-
lus.*

38. *L. ater*, thoracis margine rufo, elytris fulcatis: fulcis rugosis.

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Paruus. Antennae simplices, atrae. Thorax marginatus, niger, margine late rufo. Elytra fulcata, fulcis rugosis. Corpus atrum.

122. RIIPIPHORVS. *Palpi* filiformes.

Maxilla brevissima, ovata.

Labium acutum.

Antennae flabelliformes.

*subdipte-
rus.*

1. *R. elytris* brevissimis, ovatis, fornicatis, pallefcentibus. Ent. syst. 2. 109. 1. *

Habitat in Galloprovincia. Mus. D. Bosc.

*IX
ferrugi-
neus.*

2. *R. rufus*, pectore, ano pedibusque nigris. Ent. syst. 2. 110. 2. *

Habitat in India orientali. Dr. Koenig.

nasutus.

3. *R. corpore* atro, immaculato. Ent. syst. 2. 110. 3. *

Mordella nasuta. Thunb. nou. sp. Inf. 3. 66. fig. 77.

Habitat in Iaponia.

4. *R.*

Ripiphori corpus paruum, oblongum, compressum, gibbum, immarginatum, agile; *capite* ovato, adscendente, exserto; *oculis* ovatis, marginalibus; *antennis* brevibus, distantibus, cantho oculorum insertis; *thorace* gibbo, antice attenuato, postice trilobo; *scutello* nullo; *elytris* rigidis, attenuatis, abdomine breui, obtuso, sublongioribus; *pedibus* tenuibus, compressis; *tarsis* anticis quinque-, posticis quadriarticulatis; *colore* obscuro.

4. *R. ater*, elytris basi flavis, thorace postice dente *spinifus*.
 compresso, recumbente. Ent. syst. suppl. 126.
 3. *
 Habitat in Americae meridionalis Insulis. Dom.
 v. Rohr.
5. *R. rufus*, elytris nigris. Ent. syst. 2. III. 4. * *pectinatus*.
 Habitat in America. D. Drury.
6. *R. niger*, thoracis lateribus elytrisque testaceis. *paradoxus*
 Ent. syst. 2. III. 5.
Mordella paradoxa. Linn. syst. Nat. 2. 682. 1.
 Fn. Sv. 831.
 Ross. Fn. Etr. 1. 244. 603.
 Paus. Fn. Germ. 26. tab. 14. *III. 41.*
 Payk. Fn. Sv. 2. 177. 1. *variat elytris nigris*
 Habitat in Europae floribus.
7. *R. testaceus*, ore, pectore abdominisque dorso *flabellatus*
 atris. Ent. syst. 2. III. 6. *
 Cyrill. Ent. Neap. 1. tab. 4. fig. 1. *flavus*
 Habitat in Italia. Dr. Allioni.
8. *R. niger*, thorace rufo, elytris testaceis, apice ob-*bumeratus*
 scurioribus.
 Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.
 Magnus. Caput nigrum, antennis flabellatis. Tho-
 rax subpunctatus, rufus. Elytra abdomine lon-
 giora, acuta, testacea, apice nigra. Corpus
 atrum.
9. *R. ater*, elytris maculis duabus fanguineis. *tristis*.
 Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.
 Paruus in hac familia, totus ater nitidus, elytris
 folis maculis duabus fanguineis.
10. *R. rufus*, nitidus, abdominis basi elytrisque atris. *nigricor-*
 nis.
 Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.
 Paruus. Caput rufum, nitidum, antennis ferratis,
 atris.

atris. Thorax laevis, rufus, nitidus, postice loco scutelli porrectus. Elytra laevis, atra, immaculata. Corpus rufum, abdominis basi pedibusque nigris.

- punctatus*. 11. R. thorace testaceo, nigro-punctato, elytris nigris: margine testaceo. Ent. syst. 2. 111. 7.*
Habitat in Cayenna. D. v. Rohr.
- 6maculatus*. 12. R. ater, thorace ferrugineo, elytris testaceis: macula nigra. Ent. syst. 2. 111. 8.*
Habitat in America. Mus. D. Banks.
- ventralis*. 13. R. ater, abdomine sanguineo.
Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.
Statura omnino, nigricornis, at totus ater R. nitidus, abdomine solo sanguineo.
- lituratus*. 14. R. capite thoraceque ferrugineis, elytris testaceis: litura baseos punctoque apicis atris. Ent. syst. suppl. 127. 8.*
Habitat in *Germania australi*. *sequens variet.*
- 2maculatus*. 15. R. ferrugineus, pectore atro, elytris testaceis: macula nigra. Ent. syst. 2. 112. 9.*
Habitat in Hungaria. D. Saldoner.
- dimidiatus*. 16. R. ater, elytris basi flavis. Ent. syst. 2. 112. 10.*
Habitat in America boreali. Mus. D. Yeats.
- 2punctatus*. 17. R. niger, elytris testaceis: macula apiceque nigris.
Habitat Tranquebariae. Mus. D. Lund.
Statura praecedentium. Caput atrum, antennis flabellatis, flavis. Thorax holosericeo-nitens, niger. Elytra laevis, testacea, macula media apiceque nigris. Corpus nigrum.
- tarsatus*. 18. R. ater, pedum tarsis niueis: articulis apice nigris.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Sta-

Statura praecedentium. Corpus totum laeve, atrum, nitidum, solis pedum quatuor posteriorum tarsis niueis: articulis apice nigris. Antennae flabellatae.

19. R. ferrugineus, vertice thoracis disco elytrisque *limbatus*.
 atris. Ent. syst. 2. 112. 11. *

Habitat - - Mus. D. Yeats.

20. R. niger, elytris testaceis: fasciis tribus nigris; *populneus*.
 prima annulari. Ent. syst. 2. 112. 12. *

Habitat in Germaniae Populo. D. Smidt.

123. MORDELLA. Palpi inaequales:
 anteriores clauati,
 posteriores filiformes.
 Maxilla bifida.
 Ligula bifida.
 Antennae moniliformes.

1. M. ano aculeato, corpore atro immaculato. Ent. *aculeata*.
 syst. 2. 113. 1.

Mordella aculeata. Linn. syst. Nat. 2. 682. 2.

Fn. Sv. 532.

Geoff. Inf. 1. 353. 1.

Schaeff. Elem. tab. 84.

Sulz. Inf. tab. 7. fig. 46.

Schaeff. Icon. tab. 127. fig. 7.

Payk. Fn. Sv. 2. 185. 3.

Degeer.

Mordellae corpus paruum, oblongum, compressum, gibbum, immarginatum, agile; capiti rotundato, inflexo, exserto; oculis ovatis, marginalibus; antennis longitudine thoracis, distantibus, sub oculis insertis; thorace gibbo, transverso; scutello minuto; elytris rigidis, attenuatis, longitudine abdominis, feminae saepius aculeati; pedibus validis, cursoriis; tarsis anticis quinque-, posticis quadriarticulatis; colore minus nitido.

Dégeer. Inf. 5. 28. 1.

Habitat in Europae floribus semiflosculosis, umbellatis.

E Carolina duplo maior, simillima, vix distincta in Mus. D. Bosc.

~~mixta.~~

2. M. ano aculeato, cinereo atroque varia, elytris fascia rufa.

Habitat in noua Cambria. D. Billardiere.

Magna in hoc genere. Caput cinereo-pubescens, macula magna, frontali, atra. Thorax cinereo-pubescens, linea dorsali lata maculaque vtrinque atris. Coleoptra basi cinerea maculis quinque atris 2. 1. 2, media communi, in medio rufa, apice atra, lunulis duabus cinereis. Corpus cinereo atroque varium.

~~fasciata.~~

3. M. ano aculeato, nigra, elytris fasciis duabus cinereis. Ent. syst. 2. 113. 2. *

Geoff. Inf 1. 354. 2.

Habitat in Europae australioris Vrtica.

~~hamata.~~

4. M. ano aculeato, nigra, thorace lineolis duabus hamatis lunulisque duabus, baseos cinereis, elytris lineatis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Statura et magnitudo M. variegatae. Caput ferrugineo-villosum. Thorax niger lineis duabus dorsalibus, antice hamatis, vtrinque lunula baseos cinereis. Elytra nigra lineis abbreviatis, baseos cinereis. Corpus atrum, cinereo-villosum.

- variegata.* 5. M. ano aculeato, atra, thorace rufo: macula nigra, elytris basi macula rufa. Ent. syst. suppl.

II. 25. 127. 3. *

Habitat Parisiis. Mus. D. Bosc.

6. M.

6. *M. ano aculeato*, atra, capite thoraceque cinereo-~~logustata~~.
variegatis, elytris punctis quinque albis.
Habitat in Insula Iaua.
Maior *M. aculeata*. Caput et thorax valde varie-
gata. Elytra atra: punctis quinque 3. oblique
positis. 1. 1. Corpus atrum, abdomine ftriis
tribus punctorum alborum. Aculeus ani valde
prominet.
7. *M. ano aculeato*, griseo-pubescent, thorace ma-~~pubescens~~.
cula dorsali, elytris puncto baseos fasciisque
duabus atris. Ent. syst. suppl. 127. 3. *
Habitat in America. Dom. Hybner.
8. *M. ano aculeato*, elytris nigris: punctis quatuor ~~spunctata~~.
flavis; primo lunato. Ent. syst. 2. 114. 3. *
Habitat in America septentrionali. Mus. D. Banks.
9. *M. atra*, elytris testaceis: marginibus nigris. ~~testacea~~.
Ent. syst. 2. 114. 4. *
Habitat in Africae Dauco. D. Prof. Vahl.
10. *M. ano aculeato*, ferruginea, elytris nigris. Ent. ~~nigripennis~~.
syst. suppl. 127. 3. *
Habitat in America. Dom. Hybner.
11. *M. testacea*, thorace maculis duabus nigris. Ent. ~~2maculata~~
syst. 4. Append. 443. 4. *
Habitat in Germania. D. Schneider.
12. *M. ano aculeato*, atra, elytris atomis numerosis ~~atomaria~~.
albidis. ~~Guttata, Payk~~
Habitat Viennae. D. Scheidler. ~~(Curt. Germ.)~~
Statura omnino praecedentium, tota atra, elytris
solis punctis plurimis, albidis, micantibus.
13. *M. ano aculeato*, atra, scutello aculeisque basi ~~scutellaris~~.
holosericeo-argenteis.
Habitat in America meridionali. Mus. D. de-Se-
hestedt.

Paullo

Paullo maior *M. aculeata*. Caput et thorax ferrugineo paullo nitidula. Scutellum argenteum. Elytra atra. Aculeus elongatus, ater, basi holosericeo-argenteus. Corpus atrum, macula vtrinque ad basin abdominis holosericeo-argentea, nitida.

vittata.

14. *M. ano aculeato*, atra, thorace elytrorumque vitta abbreviata, griseo-pubescentibus.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Statura omnino praecedentium. Caput et thorax nigra, pube tenuissima grisea tecta. Elytra nigra vitta ad futuram griseo-pubescente, quae tamen apicem haud attingit. Corpus nigrum, griseo-nitidulum, femoribus anticis interdum rufescentibus.

*haemor-
rhoidalis.*

15. *M. ano aculeato*, fusca, elytris apice ferrugineis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Statura praecedentium. Corpus totum nigrum, ferrugineo parum nitidulum. Elytra apice late ferruginea. Pedes nigri, femoribus apice ferrugineis.

fasciata.

16. *M. ano aculeato*, atra, elytris fasciis duabus rufis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Praecedentibus minor, tota atra, elytrorum fasciis duabus late rufis.

ferruginea

17. *M. ano aculeato*, corpore testaceo immaculato.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Statura parva praecedentis. Corpus totum testaceum, holosericeo paullo micans, immaculatum.

18. *M.*

18. *M. ano aculeato*, testacea, antennis, elytrorum *brunnea*.
apicibus aculeoque nigris.
Habitat in Austria. D. de Meyerle. III. 42
Statura omnino praecedentium. Caput et thorax
testacea, immaculata. Antennae apice nigrae.
Elytra laevia, testacea, apice obscura. Abdomen
obscurum, aculeo nigro. Pedes testacei.
19. *M. ano aculeato*, atra, abdomine fuluo. Ent. *ventralis*.
Syst. 2. 114. 5. *
Habitat in Germania. D. Smidt.
20. *M. ano aculeato*, nigra, thorace abdomineque *abdominalis*.
fulvis. Ent. Syst. 2. 114. 6.
Mordella abdominalis. Payk. Fn. Sv. 2. 186. 5.
Mordella bicolor. Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 15.
Habitat in Germania. D. de Hattorff.
21. *M. atra*, elytris basi flavescentibus. Ent. Syst. 2. *bumeralis*.
114. 7.
Mordella bumeralis. Linn. Syst. Nat. 2. 682. 3.
Fn. Sv. 833.
~~Anaspis Geoff. Inf. 1. 356. 2.~~ VI. 16
Payk. Fn. Sv. 2. 187. 6.
Habitat in Europae floribus.
22. *M. ano aculeato*, nigra, thorace cinereo-nitidulo, elytris vnco baseos cinereo apice subtestaceis *marmbrata*.
Habitat in America meridionali. Mus. D. de Sehestedt.
Corpus paruum. Caput et thorax nigra, cinereo-nitidula. Elytra laevia, nigra, basi vnco cinereo, apice obscura late testacea.
23. *M. atra*, ore, thoracis lateribus pedibusque testaceis. Ent. Syst. 2. 114. 8. *
Habitat in Holsatiae floribus.
24. *M. atra*, fronte pedibusque flavescentibus. Ent. *frontalis*.
Syst. 2. 114. 9.
Linn.

Linn. syst. Nat. 2. 682. 4. Fn. Sv. 834.

II. 35. Panz. Fn. Germ. 13. tab. 13.

Payk. Fn. Sv. 2. 183. 1.

Habitat in Europae borealis floribus.

atra.

25. *M. atra*, immaculata, ano inermi. Ent. syst. 2.

115. 10.

Habitat in Dania. Mus. D. de Sehestedt.

thoracica. 26. *M. atra*, capite thoraceque flavis. Ent. syst. 2.

115. 11.

Linn. syst. Nat. 2. 682. 8. Fn. Sv. 835.

variet. flavus

Payk. Fn. Sv. 2. 184. 2.

Habitat in Europae borealis floribus.

ruficollis. 27. *M. atra*, ore, thorace pedibusque flavis. Ent. syst. 2. 115. 12. *

Anaspis. Geoff. Inf. 1. 356. 3.

Habitat in Gallia. Mus. D. Bosc.

flava.

28. *M. flava*, elytrorum apicibus nigris. Ent. syst. 2.

115. 13.

Linn. syst. Nat. 2. 682. 6. Fn. Sv. 836.

II 35.

Panz. Fn. Germ. 13. tab. 14.

Payk. Fn. Sv. 2. 185. 2. β.

Habitat in Europae floribus frequens.

124. DONACIA. *Palpi filiformes.*

cf. Illig. Mag. W. 176. 177. *Maxilla videntata.*

Ligula integra.

Antennae setaceae.

crassipes. 1. *D. plana*, obscura, elytris striatis viridi-nitidulis, abdomine argenteo-villoso, femoribus posticis

III. 44. dentatis. Ent. syst. 2. 115. 1. *

D. micans Kopp

Lepta.

Donaciae corpus depressiusculum, planum, glabrum, immarginatum, tardum; capite parvo, rotundato, inserto; oculis globo-

Leptura aquatica. Linn. syst. Nat. 2. 687. 1.

Fn. Sv. 67 *var. B*

Degeer. Inf. 5. 140. 18. tab. 4. fig. 14. 15.

Geoff. Inf. 1. 229. 12.

Frisch. Inf. 12. tab. 6. fig. 2.

Payk. Fn. Sv. 2. 191. 4.

Habitat in plantis aquaticis, Nymphæis.

2. *D. nigra*, thorace elytrisq. pallidis, elytris vni-*equiseti*.
spinosis. Ent. syst. suppl. 128. 2. *

Donacia appendiculata. Panz. Fn. Germ. 24. II. 36
tab. 17. *D. mucronata Hoppe*

Habitat in Franconiae Equiseto limoso. D. Hoppe.

3. *D. thorace rufo*, nigro, bimaculato, elytris fuscis *zosteræ*,
rufo-friatis, apice bidentatis.

Rbagium muticum. Ent. syst. 2. 306. II. * *variet. præceden-*
ti

Habitat in Sueciae plantis aquaticis. Mus. D. Lund.

4. *D. coeruleo-nigra*, femoribus posticis incrassatis *festucae*.
dentatis. Ent. syst. 2. 116. 2. *

Panz. Fn. Germ. 29. tab. 2.

Habitat in Germaniae festuca aquatica. D. Smidt. *III. 42*
J. Illig. III. 119

5. *D. violacea*, nitida, femoribus posticis, incrassatis, *violacea*
dentatis.

Habitat in Germaniae aquosis.

Affinis certe *D. Festucae*, at *violacea*, nitida.

6. *D. aenea*, elytris cupreis: margine omni viridi, fe-*dentipes*.
moribus posticis dentatis. Ent. syst. 2. 116. 3. *

Panz. Fn. Germ. 29. tab. 5.

Payk. Fn. Sv. 2. 195. 8. *D. fasciata Hoppe* *III. 42*

Habitat in Germaniae aquis. D. Smidt.

7. D.

globosis, prominulis, marginalibus; *antennis* approxima-
tis, thorace longioribus, inter oculos insertis; *thorace*
angustato, cylindrico; *scutello* paruo, rotundato; *elytris*
rigidis, fornicatis, longitudine abdominis, saepius fericeis;
pedibus longiusculis, rotundatis, saepius femoribus clana-
tis; *tarsis* quadriarticulatis; *colore* saepius nitidulo.

Nymphaeae 7. D. thorace elytrisq. cupreis, corpore cinereo-villoso, femoribus posticis dentatis. Ent. syst.

2. 116. 4. *

Payk. Fn. Sv. 2. 195. 9.

III. 45. Panz. Fn. Germ. 29. tab. 6.

Habitat in Nymphaeae foliis.

Sagittariae 8. D. supra aenea, elytris submicantibus, subtus villosa-aurea, femoribus posticis dentatis. Ent.

III. 43. syst. 2. 117. 5. *

Panz. Fn. Germ. 29. tab. 7.

Habitat in Germaniae plantis aquaticis. D. Smidt.

nigra. 9. D. nigra, elytris substriatis, abdomine pedibusque rufis. Ent. syst. 2. 117. 6. *

Payk. Fn. Sv. 2. 196. 10.

~~Panz. Fn. Germ. 29. tab. 2. 3.~~

III. 46.

Habitat ad Germaniae aquas. D. Smidt.

Variet magis aenea, Donacia discolor. Hoppe Monogr.

Lemnae. 10. D. obscure aenea, elytris vitta submarginali, cuprea.

Donacia limbata. Panz. Fn. Germ. 29. tab. 12.

III. 47. Habitat in Germaniae aquosis. D. Smidt.

Media. Caput canaliculatum, cinerascens. Thorax canaliculatus, obscure aeneus. Elytra punctato-striata, obscure aenea: vitta lata, submarginali, cuprea. Pedes nigri, femoribus posticis elongatis, subclauatis, muticis.

clauipes. 11. D. aenea, abdomine argenteo-villoso, femoribus posticis clauatis, muticis. Ent. syst. 2. 117.

7. *

~~Panz. Fn. Germ. 29. tab. 13.~~

Payk. Fn. Sv. 2. 190. 3.

Habitat in Germaniae plantis aquaticis. D. Smidt.

12. D.

12. *D. nigra*, pedibus posticis elongatis: tibiis apice *fasciculata* fasciculatis. Ent. syst. 2. 117. 8. *

Habitat in Cayenna. Mus. D. Bosc.

13. *D. aenea*, nitidula, elytris ad futuram cupreis. *simplex*.

Ent. syst. 2. 118. 9. *

~~Panz. Fn. Germ. 29. tab. 15.~~

III. 47.

Habitat in Europae plantis aquaticis.

Confer. *Donacia semicuprea*: Panz. Fn. Germ.

29. tab. 14. quae vix differt.

14. *D. aenea*, nitida, capite abdomineque cinereo-villosis. *Menyan-*
tibidis

Donacia simplex. Payk. Fn. Sv. 2. 189. 2.

Habitat in Germaniae plantis aquaticis. D. Smidt.

III. 43

Magnitudo *D. Hydrochaeridis*. Antennae rufescentes. Caput cinereo-tomentosum. Thorax viridi-aeneus, nitidus. Elytra punctato-friata, aenea, nitida. Corpus cinereo-tomentosum, pedibus rufescentibus, muticis.

15. *D. cinerascens*, subtus argenteo-villosa, pedibus *Hydro-*
chaeridis.

muticis. Ent. syst. 2. 118. 10. *

Panz. Fn. Germ. 29. tab. 17.

Payk. Fn. Sv. 2. 189. 1.

III. 44.

Habitat in plantis aquaticis.

Thorax vtrinque tuberculo obtuso. Elytra pun-

ctato-friata. *Trinerea Horni*

15

125. TRICHIVS. *Palpi* filiformes.
Maxilla bifida.
Antennae clauata lamella
 tae.

Eremita. 1. *T. aeneo-ater*, thorace inaequali, scutello sulco longitudinali. Ent. syst. 2. 118. 1.

Scarabaeus Eremita. Linn. syst. Nat. 2. 556. 74

Oliv. Inf. 1. 6. 53. 71. tab. 3. fig. 17.

Roef. Inf. 2. scarab. 1. tab. 3 fig. 6.

Schaeff. Icon. tab. 26. fig. 1.

Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 22.

17. 261 Panz. Fn. Germ. 41. tab. 12.

Voet. Scarab. tab. 3. fig. 21.

Herbst. Col. 3. tab. 27. fig. 9.

Payk. Fn. Sv. 2. 198. 1.

Habitat in truncis putrescentibus Pyri, Salicis.

nobilis.

2. *T. auratus*, abdomine postice albo punctato, elytris rugosis. Ent. syst. 2. 119. 2.

Scarabaeus nobilis. Linn. syst. Nat. 2. 558. 81.

Fn. Sv. 401.

Geoff. Inf. 1. 73. 6.

Oliv. Inf. 6. 59. 72. tab. 3. fig. 10.

Roef. Inf. 2. scarab. 1. tab. 3. fig. 1-5.

Schaeff. Icon. tab. 66. fig. 5.

17. 271 Panz. Fn. Germ. 41. tab. 13.

Voet. scarab. tab. 4. fig. 28.

Degeer

Trichii corpus onatum, depressiusculum, hirtum, immarginatum, tardum; capite ovato, inferto, labio prominulo; elytris ovatis, marginalibus, vix prominulis; antennis thoracis brevioribus, distantibus, super oculos infertis; thorace antice angustato, hirtio; scutello paruo, triangulo; elytris rigidis includentibus, abdomine brevioribus; pedibus brevibus validis; tibiis anticis dematis; tarsis quinquearticulatis colore variegato.

Degeer Inf. 4. 297. 26.

Herbst. Col. 3. tab. 27. fig. 6.

Payk. Fn. Sv. 2. 199. 3.

Habitat larua in ligno putrescente, imago in floribus, praesertim ymbellatis.

Mandibula minuta, edentula, *Ligula* late emarginata.

T. niger, thorace vtrinque puncto baseos elytris *Spunctatus*
que duobus flavis. Ent. syst. 2. 119. 3.

Scarabaeus variabilis. Linn. syst. Nat. 2. 358.

79.

Oliv. Inf. 1. 6. 60. 73. tab. 4. fig. 27.

Voet. Col. tab. 5. fig. 41. 42.

Panz. Fn. Germ. 41. tab. 14.

Herbst. Col. 3. tab. 27. fig. 7.

Payk. Fn. Sv. 2. 198. 2.

Habitat in Germaniae truncis putrescentibus.

T. niger, tomentoso-flavus, elytris fasciis tribus *fasciatus*
abbreviatis nigris, Ent. syst. 2. 119. 4.

Scarabaeus fasciatus. Linn. syst. Nat. 2. 556.

70. Fn. Sv. 395.

Geoff. Inf. 1. 80. 16.

Oliv. Inf. 1. 6. 1. 74. tab. 9. fig. 84.

Drury Inf. 1. tab. 36. fig. 2.

Schaeff. Icon. tab. 1. fig. 4.

Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 19.

Act. Nidros. 4. tab. 16. fig. 2.

Voet. Scarab. tab. 5. fig. 43.

Herbst. Col. 3. tab. 27. fig. 10.

Payk. Fn. Sv. 2. 200. 4.

Habitat imago in Europae borealis floribus ymbellatis.

Larua alba, brunneo-pilosa, capite brunneo, in truncis putrescentibus Betulae.

fasciatus. 5. *T. niger*, tomentoso-cinereus, elytris nigris; fasciis duabus flavis. Ent. syst. 2. 120. 5. *
Pall. Icon. tab. A. fig. 19.
Habitat in Germania. D. Hybner.

Indus.

6. *T. thorace hirsuto*, elytris lividis, fusco-maculatis. Ent. syst. 2. 120. 6. *
Scarabaeus Indus. Linn. syst. Nat. 2. 556. 61.
Mus. Lud. Vlr. 27.
Oliv. Inf. 6. tab. 6. fig. 49.
Habitat in Indiis.

2punctatus.

7. *T. capite thoraceque glabris*, viridi-aeneis, elytris testaceis, abdominis ultimo segmento prominente, bipunctato. Ent. syst. 2. 120. 7. *
Melolontha 2punctata. Oliv. Inf. 1. 5. tab. 6. fig. 69.
Habitat in America. Mus. D. Banks.

bibens.

8. *T. capite thoraceque viridi-aeneis*, elytris testaceis, viridi-nitentibus. Ent. syst. 2. 121. 8. *
Oliv. Inf. 6. tab. 10. fig. 87.
Habitat in America. Mus. D. Tunstall.

hemipterus.

9. *T. thorace tomentoso*: rugis duabus longitudinalibus, elytris abbreviatis. Ent. syst. 2. 121. 9. *

Scarabaeus hemipterus. Linn. syst. Nat. 2. 555. 63.

Geoff. Inf. 1. 78. 12.

Oliv. Inf. 1. 6. tab. 9. fig. 83.

tab. 11. fig. 103.

Schaeff. Icon. tab. 46. fig. 10. 11.

Voet. Col. tab. 10. fig. 88-90.

Habitat in Europae ligno putrescente.

Femina aculeo ani elongato, nigro.

canaliculatus.

10. *T. fusco-testaceus*, cinereo-maculatus, thorace canaliculato. Ent. syst. 2. 121. 10. *

Oliv.

Oliv. Inf. 1. 6. tab. 10. fig. 89.
Habitat in America boreali. D. Lee.

1. *T. glaber, cyanens, elytris lunulis duabus albis.* lunulatus. —

Ent. syst. 2. 121. 11. *

Oliv. Inf. 1. 6. tab. 10. fig. 88.

Habitat in Carolina.

2. *T. viridis, pubescens, ano albo, bimaculato.* Ent. viridulus.

syst. 2. 122. 12. *

Oliv. Inf. 6. tab. 9. fig. 86.

Habitat in India. Mus. Dr. Hunter.

3. *T. capite thoraceque aeneis, villosis, elytris testaceis, albo maculatis.* Ent. syst. 2. 122. 13. *

Oliv. Inf. 6. tab. 7. fig. 54.

Habitat in Marylandia.

4. *T. thorace nigro: triangulo albo, elytris testaceis: puncto fusco.* Ent. syst. 2. 122. 14. *

Oliv. Inf. 6. tab. 11. fig. 107.

Forst. Cent. Inf. 1. 7. 7.

Drury Inf. 2. tab. 30. fig. 1. 2.

Habitat in America boreali.

5. *T. pubescens, thorace fulvo nigro-lineato, elytris testaceis: sutura fulva.* Ent. syst. 2. 122.

15. *

Scarabaeus quadratus. Degeer Inf. 7. 645. 48.
tab. 48. fig. 10. 11.

Oliv. Inf. 6. tab. 7. fig. 63.

~~Voet. Gok.~~ tab. 10. fig. 3.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

6. *T. ater, nitidus, elytris frigidis duabus approximatis flavis, tibiis posticis compressis.* retusus.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

T. Delta minor. Caput laeve, atrum, nitidum.

Tho-

Thorax ater, nitidus, antice utrinque retusus
Elytra striata, atra, ante medium strigis du-
bus macularibus, approximatis, flavis. Pedes
incrassati, atri: unguibus magnis, arcuatis. Tibi-
ae posticae magnae, compressae, subdentatae.

- nigripes.* 17. *T. hirtus*, fuscus, elytris testaceis: margini
apicis cinerascete. Ent. syst. 2. 123. 16. *
Oliv. Inf. 6. tab. 9. fig. 85.
~~Vest. Col. tab. 10. fig. 83.~~
Degeer Inf. 1. tab. 48. fig. 9-
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.
- maculatus.* 18. *T. supra glaber*, cinereo-maculatus, capite tho-
raceque nigris, elytris piceis. Ent. syst. 2. 123.
17. *
Cetonia crassipes. Oliv. Inf. 6. 68. 83. tab. 7.
fig. 62.
~~Degeer Inf. 7. tab. 48. fig. 12.~~
Habitat ad Cap. Bon. Spei.
- hirtus.* 19. *T. hirtus*, supra niger, subtus albidus. Ent. syst.
suppl. 128. 17. *
Habitat ad Cap. Bon. Spei. D. Daldorff.
- pilosus.* 20. *T. hirtus*, subtestaceus, capite thoraceque nigris
elytris piceis. Ent. syst. suppl. 128. 17. *
Habitat ad Cap. Bon. Spei. D. Daldorff.
- minutus.* 21. *T. thorace cinereo*, elytris testaceis, cinereo
maculatis.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Schéstedt.
Parvus, Corpus cinereo-villosum, Elytra testa-
cea, cinereo-maculata.

126. CETONIA. *Maxilla* apice setosa.
Ligula emarginata, palpos
 tegens.
Antennae lamellatae.

1. C. thorace piceo, albo, lineato, elytris glaucis, *goliatu*.
 clypeo porrecto, bifido. Ent. syst. 2. 124. 1. *

Scarabaeus goliatu. Linn. Mant. 5. 30.

Cetonia goliatu. Oliv. Inf. 6. 7. 1. tab. 5. f. 33.
 tab. 9. f. 33.

Drury Inf. 1. tab. 31. fig. 3.
 tab. 40. fig. 1.

Iabl. Col. 1. tab. 10. fig. 4.

Sulz. Hist. Inf. tab. 1. fig. 2.

Habitat in Africa. Mus. Dr. Hunter.

2. C. thorace flavescente, nigro-lineato, elytris al- *Cactus*.
 bidis, nigro-maculatis, clypeo porrecto, bifido.

Ent. syst. 2. 124. 2. *

Oliv. Inf. 6. 8. 2. tab. 3. fig. 22.

Iabl. Col. 1. tab. 11. fig. 2.

Voet. Col. tab. 21. fig. 51.

Habitat in America meridionali.

3. C. obscure aenea, elytris fuscis, albo irroratis, cly- *bifrons*.
 peo porrecto bifido, vertice hastato. Ent. syst.

2. 124. 3. *

Cetonia bifrons. Oliv. Inf. 6. tab. 6. fig. 117.

Habi-

Cetoniae corpus oblongum, laeve, immarginatum, tardum;
 capite ovato, inserto; clypeo prominente: margine in-
 crassato; oculis globosis, marginalibus; antennis distanti-
 bus, thorace brevioribus, sub oculis insertis; thorace an-
 tice angustato, elevato: scutello longiori, triangulo; ely-
 tris rigidis, formatis, vix abdomine brevioribus; pedibus
 brevibus, validis, tibiis dentatis; tarsis quinquearticula-
 tis; colore saepius nitido.

- Habitat in America meridionali. Mus. D. Gigot d'Orcy.
- Polypbe-*
mus. 4. *C. viridis*, albo-lineata, capite tricorni: cornu medio porrecto bifido. Ent. syst. 2. 125. 4.*
Oliv. Inf. 1. 6. 9. 3. tab. 8. fig. 61.
Habitat in Africa. Mus. D. Banks.
- Ynca.* 5. *C. thorace atro*, albo-lineato, elytris brunneis, albo-irroratis, clypeo bipartito.
Cetonia Ynca. Web. Inf. 66. 1.
Habitat in Peru.
C. goliata duplo minor.
- mitans.* 6. *C. viridis*, nitens, clypeo porrecto, recurvo, bifido, tibiis anticis ferratis. Ent. syst. 2. 125. 5.*
Oliv. Inf. 1. 6. 10. 4. tab. 1. fig. 2.
Drury Inf. 1. tab. 32. fig. 3.
Habitat in Africa.
Hae priores sex species singulares, clypeo valde elongato, recurvo, bifido, forte proprii generis, mihi haud rite examinatae.
- Cbinensis.* 7. *C. aenea*, clypeo emarginato, subspinoso, thorace postice lobato, elytris acuminatis. Ent. syst. 2. 126. 6.*
Oliv. Inf. 1. 6. 11. 5. tab. 2. fig. 5.
Forst. Cent. Inf. 1. 2. 2.
Voet. Col. tab. 5. fig. 40.
Habitat in China. Mus. D. Banks.
- nigrita.* 8. *C. glabra*, atra, clypeo emarginato, subspinoso, thorace postice lobato. Ent. syst. 2. 126. 7.*
Oliv. Inf. 1. 6. 11. tab. 10. fig. 92.
Petiv. Gazoph. tab. 28. fig. 3.
Hermannu. Mus. 17. 257.
Habitat Ceyloniae. Mus. Britann.

9. *C. aurata*, segmento abdominis primo lateribus *aurata*.
vnicdentato, elytris lineolis transuersis albis.
Ent. fyft. 2. 127. 8.

Scarabaeus auratus. Linn. fyft. Nat. 2. 557. 78.

Fn. Sv. 400.

Geoff. Inf. 1. 73.

Frish. Inf. 12. 25. tab. 3. fig. 1.

Roef. Inf. 2. scarab. 1. tab. 2.

Oliv. Inf. 1. 6. 12. 7. tab. 1. fig. 1.

Voet. scarab. tab. 1. fig. 1.

Schaeff. Icon. tab. 26. fig. 2. 3. 7.

Drury Inf. 1. tab. 33. fig. 1.

Panz. Fn. Germ. 41. tab. 15.

Degeer Inf. 4. tab. 11. fig. 1.

Herbst. Col. 3. tab. 29. fig. 2.

Payk. Fn. Sv. 2. 202. 2.

Habitat larua in Europae ligno putrescente, in
formicarum aceruis. Imago in floribus.

10. *C. aenea*, nitidissima, immaculata. Ent. fyft. 2. *fastuosa*.
127. 9. *

Cetonia speciosissima. Ross. Fn. Etr. 1. 25. 57.

Scopol. Del. Inf. 1. tab. 21. fig. A.

Roef. Inf. 2. scarab. 1. tab. 2. fig. 6.

Panz. Fn. Germ. 41. tab. 16.

Voet. Col. tab. 1. fig. 2.

Schaeff. Icon. tab. 66. fig. 4.

Habitat in Europa australiori.

11. *C. aenea*, thorace elytrisque atomis numerosis, *marmorata*.
albis, sparsis. Ent. fyft. 2. 127. 10. * ta.

Voet. Col. tab. 1. fig. 3.

Panz. Fn. Germ. 41. tab. 17.

Herbst. Col. 3. tab. 29. fig. 3.

Payk. Fn. Sv. 2. 201. 1.

Habitat in Germaniae quercu.

12. C.

- viridis*. 12. *C. viridis*, opaca, subtus nitidior, elytris albo-maculatis. Ent. syst. 2. 128. 11. *
- Cetonia Hungarica*. Herbst. Arch. tab. 29. f. 7.
- IV. 543 Panz. Fn. Germ. 41. tab. 18.
- Habitat in Italia. Dr. Allioni.
- recurva*. 13. *C. aenea*, nitida, sterno cornuto, recurvo. Habitat in Guinea. D. Isert. Mus. D. Lund. Statura et magnitudo *C. metallica*, tota aenea, nitida, immaculata, sterno magno, porrecto, cornuto, recurvo.
- metallica*. 14. *C. aenea*, opaca, immaculata, subtus cuprea. Ent. syst. 2. 128. 12. *
- IV. 543 Panz. Fn. Germ. 41. tab. 19.
- Habitat in Italia. Dr. Allioni.
- pubescens*. 15. *C. obscure aenea*, thoracis segmentorumque margine albo; bipunctato. Ent. syst. 2. 128. 13. *
- Cetonia pubescens*. Oliv. Inf. 1. 6. 21. 18. tab. 11. fig. 100.
- Habitat ad Cap. Bon. Spei. D. Olivier.
- opaca*. 16. *C. viridis*, opaca, capitis clypeo reflexo. Ent. syst. 2. 128. 14. *
- Habitat in Africae floribus compositis. D. Vahl.
- Morio*. 17. *C. nigra*, obscura, corpore subtus nitidior. Ent. syst. 2. 129. 15. *
- Cetonia Morio*. Oliv. Inf. 1. 6. 27. 27. tab. 2. fig. 3.
- Scarabaeus lugubris*. Voet, Col. tab. 2. fig. 14.
- Habitat in Europa australi. Dr. Allioni.
- cuspidata*. 18. *C. nigra*, capitis clypeo porrecto, basi utrinque sinuato, thoracis limbo elytrorumque margine cinereis. Ent. syst. 2. 129. 16. *

Herbst.

Herbst. Col. tab. 27. fig. 8.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lund.

19. *C. atra, nitida, capitis clypeo cordato.* Ent. syst. *cordata.*
2. 129. 17.*

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lund.

20. *C. nigra, thorace punctis quatuor albis.* Ent. *4punctata.*
syst. 2. 129. 18.*

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

21. *C. nigra, ano bipunctato, pedibus rufis: tibiis rufipes.*
posticis spinis annulatis. Ent. syst. 2. 129. 19.*

Cetonia 4punctata. Oliv. Inf. 1. 6. 80. 101. tab.
10. fig. 93.

Habitat in India. Mus. Dr. Hunter.

22. *C. thorace postice lobato, atra, holosericea, ely- holosericea.*
tris maculis tribus marginalibus, flavis. Ent.
syst. 4. App. 449. 19.*

Cetonia holosericea. Oliv. Inf. 6. tab. 12. fig.
125?

Voet. Col. tab. 2. fig. 10.

Herbst. Col. tab. 28. fig. 7.

Habitat Surinami.

23. *C. thorace postice lobato, nigra, thorace lineo- strigosa.*
lis, elytris strigis abbreviatis, inordinatis, fer-
rugineis. Ent. syst. 4. App. 449. 19.*

Cetonia strigosa. Oliv. Inf. 2. 6. tab. 12. f. 124.

Voet. Col. tab. 3. fig. 19.

Herbst. Col. tab. 31. fig. 9.

Habitat ad Cap. Bon. Spei.

24. *C. thorace postice lobato, capite spina incumbente, sterno cornuto.* Ent. syst. 2. 130. 20. *nitida.*

Scarabaeus nitidus. Linn. syst. Nat. 2. 552. 52.

Mus. Lud. Vlr. 26.

Oliv.

Oliv. Inf. 1. 6. 18. 14. tab. 3. fig. 16.
tab. 7. fig. 56.

~~Roef. Inf. 2. foerab. 1. tab. B. fig. 4.~~

Drury Inf. 1. tab. 33. fig. 5. 6.

Voet. Col. tab. 3. fig. 2. 3.

Degeer. Inf. 4. tab. 19. fig. 8. 9.

Habitat in America; praesertim Carolina.

lobata.

25. *C. nigra*, nitida, thorace postice lobato, clypeo emarginato, sterno cornuto. Ent. syst. 2. 130. 21. *

Cetonia lobata. Oliv. Inf. 1. 6. 23. 21. tab. 4. fig. 26.

Voet. Col. tab. 3. fig. 20.

Habitat in America meridionali. Mus. D. Olivier.

Carymelita.

26. *C. nigro-viridis*, thorace elytrisque testaceis, ano albo bipunctato. Ent. syst. 2. 131. 22. *
Habitat in Africa. D. Saldoner.

fulcata.

27. *C. viridi-aenea*, nitida, elytris fulcatis. Ent. syst. 2. 131. 23. *

Cetonia fulcata. Oliv. Inf. 1. 6. 36. 39. tab. 5. fig. 32.

Habitat in Brasilia. Mus. D. Banks.

Cbrysis.

28. *C. scutello elytris dimidio breuiore*, sterno porrecto, corpore viridi, subtus cupreo. Ent. syst. 2. 131. 24. *

Scarabaeus Cbrysis. Linn. syst. Nat. 2. 591. 49.
Mus. Lud. Vlr. 21.

Gronov. Zooph. 423. tab. 15. fig. 1.

Oliv. Inf. 1. 6. 76. 96. tab. 4. fig. 19.

Sulz. Hist. Inf. tab. 1. fig. 10.

~~Voet. Col. tab. 8. fig. 63.~~

Degeer Inf. 4. tab. 19. fig. 4.

Habitat in America meridionali.

29. *C.*

29. *C. scutello elytris dimidio brevior, viridis, thorace vtrinque macula postica, liuida. virpens.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Statura omnino *C. Chryfidis*, at duplo minor, viridis, parum nitida. Macula thoracis vtrinque magna, liuida; micans, postica ad marginem exteriorem.

30. *C. cyanea, thoracis margine elytrisque testaceis. splendida.*
Ent. syst. 2. 141. 57. ♀

Cetonia splendida. Oliv. Inf. 1. 6. 75. 95. tab. 4.
fig. 21.

Voet. Col. tab. 8. fig. 62.

Habitat in America meridionali.

Variat maior, viridis, nitens, thoracis margine elytrisque testaceis.

31. *C. scutello elytris dimidio brevior, sterno porrecto, corpore aeneo, nitido. lucida.*
Ent. syst. 2. 131. 25. ♀

Cetonia liuida. Oliv. Inf. 1. 6. 75. 94. tab. 7.
fig. 64.

Habitat in Insula Guadeloupe. D. Olivier.

32. *C. obscure viridis, thoracis margine flavescente. francisca.*
Ent. syst. suppl. 129. 25. ♀

Habitat in India. D. Daldorff.

33. *C. picea, thoracis margine flavescente, sterno porrecto. capucina.*
Ent. syst. 2. 132. 26. *

Habitat in India. D. Daldorff.

34. *C. excutellata, liuida, thorace punctis duobus, Lanus.*
elytris maculis plurimis nigris, sterno antice cornuto. Ent. syst. 2. 132. 27.

Cetonia Lanus. Oliv. Inf. 1. 6. 19. 15. tab. 2.
fig. 4.

Voet. Col. tab. 4. fig. 44.

Drury

Drury Inf. 1. tab. 33. fig. 8.

Sloan. Jamaic. tab. 237. fig. 7. 8.

Habitat in America meridionali.

bajula.

35. *C. excutellata*, liuida, thorace elytrisq̄ fusc
variis, sterno antice cornuto.

Cetonia bajula. Oliv. Inf. 1. 6. tab. 12. fig. 126

Habitat in America meridionali. Mus. D. de Sehe
stedt.

Statura et summa affinitas *C. Lanii*, at thorax e
elytra fusco-variegata.

flavola.

36. *C. excutellata*, liuida, capite thoracisque antice
flavis, elytris nigro-variegatis, apice acuminatis

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus
D. Lund.

Statura et magnitudo omnino praecedentium

Caput flavum, apice liuidum. Thorax antice

flavus, productus, postice liuidus. Elytra ni

gro liuidoque variegata, apice ad futuram acu

minata. Pectus liuidum, nigro-punctatum,

sterno gibbo.

graculus.

37. *C. excutellata*, obscure liuida, thorace elytris
que nigro-maculatis. Ent. syst. 2. 132. 28.

Cetonia maculosa. Herbst. Col. 3. tab. 32. f. 1.

Oliv. Inf. 6. tab. 12. fig. 120.

Voet. Col. tab. 3. fig. 22.

Habitat in America. Mus. D. Banks.

liturata.

38. *C. excutellata*, obscura, capite thoracisque mar
gine liuidis, nigro-irroratis, elytris acuminatis:
litureis flavescentibus.

Cetonia liturata. Oliv. Inf. 1. 6. tab. 12. f. 121.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.

D. Lund.

Paullo minor *C. graculo*. Capitis clypeus liuidus,
nigro-irroratus, margine incrassato. Thorax

postice

postice productus, obscurus, margine livido, nigro-irrorato. Elytra acuminata, obscura, licturis variis flavescentibus. Sternum vix porrectum.

39. *C. scutellata* rubra, elytris nigro-maculatis. *carnifex*.
Ent. syst. 2. 132. 29.

Scarabaeus Lanius. Linn. syst. Nat. 2. 557. 77.

Oliv. Inf. 1. 6. 29. 16. tab. 6. fig. 43.

Roef. Inf. 2. scarab. 1. tab. B. fig. 3.

Voet. Col. tab. 2. fig. 16.

Herbst. Col. 3. tab. 31. fig. 7.

Habitat in America meridionali.

40. *C. testacea*, nitida, sterno antice porrecto, obtu-*glabrata*.
fo. Ent. syst. 2. 133. 30. *

Cetonia glabrata. Oliv. Inf. 1. 6. 70. 86. tab. 9.
fig. 80.

Habitat in Indiis. Mus. Britann.

41. *C. nigra*, obscura, elytris obsolete rufo-maculatis. *rauca*.
Ent. syst. 2. 133. 31. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. D. Vahl.

42. *C. nigra*, obscura, immaculata, thorace margine *cornuta*.
antico subcornuto. Ent. syst. 2. 133. 32. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. D. Vahl.

43. *C. nigra*, albo-maculata, abdominis segmentis *tristis*.
margine albis, clypeo emarginato, sterno cornuto. Ent. syst. 2. 133. 33. *

Cetonia tristis. Oliv. Inf. 1. 6. 22. 20. tab. 18.
fig. 91.

Habitat in America. Mus. Dr. Hunter.

44. *C. ferrugineo-flavescens*, elytris virescentibus, *smaragdula*.
sterno cornuto. Ent. syst. 2. 134. 34. *

Cetonia smaragdula. Oliv. Inf. 1. 6. 73. 91.
tab. 10. fig. 90.

Drury

Drury Inf. 2. tab. 30. fig. 3.

Habitat in America. Mus. Dr. Hunter.

fascicularis.

45. *C. thorace lineis quatuor albis, elytris viridibus, abdominis incisuris barbatis.* Ent. syst. 2. 134.

35.

Cetonia fascicularis. Oliv. Inf. 1. 6. 16. 12. tab. 11. fig. 108.

Scarabaeus fascicularis. Linn. syst. Nat. 2. 575. 75. Mus. Lud. Vlr. 26.

Drury Inf. 1. tab. 33. fig. 2.

Voet. Col. tab. 3. fig. 17.

Wulf. Inf. Cap. tab. 1. fig. 1.

Habitat in Africa.

aulica.

46. *C. viridis, nitida, thoracis margine elytrorumque maculis albis.* Ent. syst. 2. 134. 36. *

Cetonia aulica. Oliv. Inf. 1. 6. 16. 11. tab. 2. fig. 6. 7.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

purpurascens.

47. *C. glabra, nigra, thorace elytris que purpurascens.* Ent. syst. 2. 135. 37. *

Cetonia thoracica, nigra, thorace ferrugineo, elytris nigris purpurascens. Ent. syst. 2. 138. 47. vix differt.

Cetonia aurantia. Herbst. Col. 3. tab. 30. fig. 7.

Voet. Col. tab. 1. fig. 6.

Oliv. Inf. 1. 6. tab. 3. fig. 11.

Habitat in India orientali. D. Prof. Abildgaard.

Capensis.

48. *C. hirta, rufa, albo-punctata.* Ent. syst. 2. 135. 38.

Cetonia Capensis. Oliv. Inf. 1. 6. 27. 28. tab. 6.

Scarabaeus Capensis. Linn. syst. Nat. 2. 556. 73.

Mus. Lud. Vlr. 30.

Drury Inf. 1. tab. 33. fig. 3.

Voet. Col. tab. 2. fig. 11.

Roel.

Roef. Inf. 2. scarab. 1. tab. B. fig. 6.

Degeer Inf. 7. 640. 40. tab. 48. fig. 2.

Wulf. Inf. Capenf. tab. 1. fig. 2.

Habitat in Africa.

9. *C. thorace nigro; margine albo, elytris testaceis; futura marginique nigris.* Ent. syst. 2.

135. 39. *

Cetonia signata. Oliv. Inf. 1. 6. 28. 29. tab. 5.
fig. 35.

Voet. Col. tab. 2. fig. 13.

Herbst. Col. 3. tab. 23. fig. 8.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

10. *C. glabra, atra, thoracis elytrorumque marginibus rufis.* Ent. syst. 2. 136. 40. *

Cetonia marginata. Oliv. Inf. 1. 6. 26. 26. tab. 5.
fig. 34.

Scarabaeus marginatus. Degeer Inf. 4. tab. 19.
fig. 10.

Drury Inf. 2. tab. 32. fig. 1.

Voet. Col. tab. 1. fig. 4.

Habitat in Guineae Iatropa Gorcas.

11. *C. glabra, obscure purpurascens, thorace elytrorumque margine sinuato, testaceo.* Ent. syst. 2.

136. 41. *

Habitat in Guinea. D. Isert.

12. *C. viridis, thoracis elytrorumque margine ferruginea.* Ent. syst. 2. 136. 41. *

Habitat in Sierra Leon. D. Tunstall.

13. *C. nigra, lineola flava a capite ad scutellum ducta.* Ent. syst. 2. 137. 43. *

Cetonia lineola. Oliv. Inf. 1. 6. 77. 98. tab. 5.
fig. 28.

Scarabaeus lineola. Linn. syst. Nat. 2. 552. 53.

K

Roef.

Roef. Inf. 2. scarab. 1. tab. B. fig. 7.

Degeer Inf. 4. tab. 19. fig. 5.

Cetonia ephippium, nigra, thoracis margine linea dorsali, elytris macula difformi ferruginea

Mant. Inf. 1. 29. 31.

Oliv. Inf. 1. 6. 78. 98. tab. 11. fig. 106.

Voet. Col. tab. 9. fig. 81.

Drury Inf. 3. tab. 44. fig. 3. ^{in montibus}

Habitat in America meridionali. ^{pyrenaeis}

Conf. *Scarabaeus Surinamensis*. Linn. syst. Nat. 2. 552. 54.

Oliv. Inf. 1. 6. 79. 99. tab. 11. fig. 104. v. differt.

Scutellata. 54. *C. atra*, thoracis margine linea dorsali impressa scutelloque albis.

Habitat in Guinea. D. Meyer. Mus. D. de Sebestedt.

Magnitudo et statura omnino *C. lineolae*. Caput atrum, linea basi dentata, alba, clypeoque apice reflexo. Thorax ater, nitidus, margine laterali albo. Linea dorsalis impressa, alba, quae tamen nec anticum, nec posticum marginem attingit. Scutellum paruum, album. Elytra laevia, atra, immaculata. Abdominis ultimum segmentum prominet macula magna alba. Subtus atra, margine albo maculato.

Striata. 55. *C. glabra*, atra, nitida, thoracis margine testaceo: puncto nigro, clypeo emarginato. Ent. syst. 2. 137. 44. *

Cetonia striata. Oliv. Inf. 1. 6. 79. 100. tab. 11. fig. 102.

Habitat in Insula Guadeloupe. D. Isert.

Fluomaculata. 56. *C. obscure brunnea*, thorace punctis quatuor atris, elytris macula flexuosa flava. Ent. syst. Suppl. 129. 44. *

Degeer

Degeer. Inf. 7. tab. 47. fig. 19.

Oliv. Inf. 1. 6. tab. 7. fig. 52.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lund.

57. *C. fusca*, thorace elytrisq[ue] margine et punctis *sinuata*.
duobus flavis. Ent. syst. 2. 138. 45. *

Cetonia sinuata. Oliv. Inf. 1. 6. 25, 24. tab. 8.
fig. 78.

Scarabaeus punctato-marginatus. Degeer. Inf.
7. 639. 38. tab. 47. fig. 20.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

58. *C. nigra*, thoracis margine elytrisq[ue] testaceis, *fasciata*.
elytris sutura fasciaque dentata nigris. Ent.
syst. 2. 138. 46. *

Habitat Alexandriae. D. Prof. Forskahl.

59. *C. testacea*, thorace lineis punctisque duobus, *olivacea*.
elytris maculis quatuor transversis nigris. Ent.
syst. 2. 138. 48. *

Cetonia olivacea. Oliv. Inf. 1. 6. 37. 41. tab. 8.
fig. 69.

Scarabaeus cordatus. Drury Inf. 2. tab. 32.

Voet. Col. 1. tab. 1. fig. 7.

Habitat in Sierra Leon Africae. Mus. D. Tünstall.

60. *C. thoracis* margine lineaque dorsali, elytrorum *interrupta*
fasciis interruptis testaceis. Ent. syst. 2. 139.
49. *

Cetonia interrupta. Oliv. Inf. 1. 6. 35. 42. tab.
8. fig. 70.

Habitat in Senegallia. Mus. D. Olivier.

61. *C. nigra*, thorace quinquelineato, elytris acumi-*picta*.
natis, albo-maculatis. Ent. syst. 2. 139.
50. *

Habitat in Oriente. D. Prof. Forskahl.

62. *C. nigra*, thorace lineis tribus albis, elytris fa-*trilineata*.
scia

scia flexuosa scutelloque albis. Ent. syst. :
139. 51. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. D. Lee.

elata.

63. *C. atra*, thorace lineis tribus albis, elytris olivaceis: margine atro albo-punctato. Ent. syst. 2. 139. 52. *

Habitat in Guinea. D. v. Rohr.

semipunctata.

64. *C. viridis*, nitida, thorace quadrilineato, elytris basi lineatis, apice punctatis. Ent. syst. 2. 139. 53. *

Herbst. Col. 3. tab. 30. fig. 11.

Voet. Col. tab. 22. fig. 152.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. D. Boeber.

lineata.

65. *C. nigra*, thorace quinquelineato, elytris albis maculatis, clypeo reflexo spinaque incumbentem. Ent. syst. 2. 104. 54. *

Cetonia lineata. Oliv. Inf. 1. 6. 56. 36. tab. 1. fig. 76.

Habitat in India. Mus. D. Banks.

atromaculata.

66. *C. nigra*, nitida, elytris atro-maculatis, maculae postica alba. Ent. syst. 2. 141. 55. *

Habitat Tranquebariae. Mus. D. de Sehestedt.

limbata.

67. *C. nigra*, thoracis margine ferrugineo. Ent. syst. 2. 141. 56. *

Habitat in Aegypto. D. Prof. Forstkahl.

trigona.

68. *C. viridis*, nitida, thoracis margine scutellique triangulo flavis.

Cetonia trigona. Herbst. Col. tab. 26. fig. 12.

Voet. Col. tab. 10. fig. 84.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Statura et magnitudo *C. Chrysidis*. Caput viridius nitidum, margine postico parum flavescens

Th

Thorax aeneus, nitidus, margine laterali et postico flavo. Scutellum elongatum, triangulum, viride; triangulo ante marginem flavo. Elytra laevia, nigra. Corpus ferrugineum.

69. *C. viridis*, nitidissima, elytrorum futura punctoque apicis atris. Ent. syst. 2. 142. 58. *

Cetonia elegans. Oliv. Inf. 1. 6. 29. 30. tab. 4. fig. 25.

Habitat in Coromandel. Mus. D. Banks.

70. *C. viridis*, fulvo micans, elytris maculis duabus nigris, sterno obtuso. Ent. syst. 2. 142. 59. *

Cetonia maculata. Oliv. Inf. 1. 6. 30. 31. tab. 8. fig. 73.

Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. D. Banks.

71. *C. viridis*, nitida, thorace elytrisque punctis duobus nigris, elytris punctis nigris striatis.

Habitat in Sumatra. D. Daldorff. Mus. D. de Sehestedt.

Maior praecedente. Antennae nigrae. Caput viride, clypeo apice reflexo, emarginato. Thorax viridis, nitidus, punctis nigris, numerosis, minutis impressis; maculisque duabus atris. Elytra viridia, nitida, striis e punctis nigris impressis maculisque duabus atris, altera ad scutellum, altera versus apicem. Corpus viride, nitidum, punctis nigris impressis abdominisque segmentis, apice atris, sterno porrecto.

72. *C. cuprea*, nitida, thorace, scutello elytrisque viridibus. Ent. syst. 2. 142. 60. *

Habitat Surinami. Mus. D. Tunstall.

73. *C. aenea*, nitens, capitis spina incumbente, sterno porrecto, elytris punctis nigris striatis. Ent. syst. 2. 142. 61. *

Ceto-

Cetonia Africana. Oliv. Inf. 1. 6. 31. 32. tab. 8. fig. 70.

Scarabaeus Africanus. Drury Inf. 2. tab. 30. fig. 3.

Voet. Col. tab. 4. fig. 25.

Habitat in Africa, Sierra Leon.

laeta.

74. *C. viridis*, nitidissima; thorace punctato, elytris punctis nigris friatis.

Habitat in India orientali. Mus. D. Lund.

Nimis affinis videtur *C. Africanae*, at clypeus reflexus et omnino absque spina, et thorax punctis nigris impressus. Abdominis ultimum segmentum prominet lineolis numerosis, transversis, undatis, nigris. Sternum valde porrectum.

futuralis.

75. *C. thorace nigro*: margine rufo, elytris aeneo-nitidis: futura nigra. Ent. syst. 2. 143. 62. *

Cetonia futuralis. Oliv. Inf. 1. 6. 32. 34. tab. 8. fig. 74.

Habitat in Africa. D. Drury.

vittata.

76. *C. hirta*, viridi-aenea, elytris testaceis: vitta media nigra futuraque aenea. Ent. syst. 2. 143. 63. *

Melolontha Zebra. Oliv. Inf. 1. 5. 54. 73. tab. 7. fig. 75.

Voet. Col. tab. 7. fig. 60.

Habitat in Africa. Mus. D. Banks.

fulgida.

77. *C. aenea*, nitidissima, abdominis ultimo segmento prominente, quadripunctato. Ent. syst. 2. 144. 64. *

Cetonia fulgida. Oliv. Inf. 1. 6. 33. 35. tab. 8. fig. 75.

Voet. Col. tab. 3. fig. 24.

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

78. *C.*

78. *C. viridis*, nitidissima, fusco micans. Ent. syst. 2. *Iris*.
144. 65. *
Cetonia Iris. Oliv. Inf. 1. 6. 31. 33. tab. 8.
fig. 77.
Voet. Col. tab. 4. fig. 25.
Habitat Surinami. Mus. D. Banks.
79. *C. atra*, nitida, clypeo truncato, reflexo, sterno *Gagates*.
obtusum. Ent. syst. 2. 144. 66. *
Cetonia Gagates. Oliv. Inf. 1. 6. 25. 25. tab. 4.
fig. 20. tab. 11. fig. 20.
Scarabaeus carbonarius. Degeer Inf. 4. 824. 18.
Forst. Cent. Inf. 6. 6.
Habitat in Sierra Leon. Mus. D. Banks.
80. *C. atra*, scutello elytris dimidio brevioribus, pedibus triunguiculatis: pollice fixo. Ent. syst. 2. *tetradactyla*.
144. 67. *
Cetonia tetradactyla. Oliv. Inf. 1. 6. 74. 93.
tab. 2. fig. 8. tab. 7. fig. 53.
Scarabaeus tetradactylus. Linn. Mant. 530.
Drury Inf. 1. tab. 33. fig. 7.
Sloan. Carn. 2. 237. fig. 2.
Habitat in America meridionali.
81. *C. viridi-cuprea*, nitida, elytris testaceis, sterno *clauata*.
antice cornuto. Ent. syst. 2. 145. 68. *
Oliv. Inf. 1. 6. 72. 89. tab. 8. fig. 58.
Habitat in America meridionali. Mus. D. Banks.
82. *C. atra*, nitida, thoracis margine omni elytrorumque vittis duabus flavis. Ent. syst. 2. 145.
69. *
Cetonia vittata. Oliv. Inf. 1. 6. 92. 7. tab. 8.
fig. 65.
Drury Inf. 3. tab. 44. fig. 4.
Habitat in America meridionali. Mus. D. Banks.

- lurida.* 83. *C. nigro-aenea*, elytris lineis duabus elevatis alboque maculatis. Ent. syst. 2. 145. 70. *
Cetonia lurida. Oliv. Inf. 1. 6. 43. 50. t. 9. f. 81
 Habitat in Brasilia. Mus. D. Banks
- mixta.* 84. *C. obscura*, cinereo variegata, scutello margine albo.
Cetonia mixta. Web. Inf. 69. 5.
 Habitat in Sumatra. D. Daldorff.
 Statura et magnitudo omnino *C. acuminatae*, alia et distincta. Corpus supra fuscum, obscurum, vndique atomis cinereis variegatum. Scutellum margine albo. Elytra obtusa.
- lunulata* 85. *C. thorace obscure viridi*: margine albo, elytris acuminatis testaceis, macula nigra lunulisque albis
Cetonia ciliata. Oliv. Inf. 1. 6. tab. 12. fig. 12.
 Web. Inf. 70. 7.
 Habitat in Sumatra. D. Daldorff.
 Statura praecedentium. Caput obscure viride. Thorax obscure viridis, margine late albo: puncto minuto viridi. Scutellum obscure viride. Elytra obscure testacea, macula vna alteraue nigra lunulisque albis. Corpus lanugine albida tectum.
- aurichalcea.* 86. *C. cuprea*, nitida, elytris acuminatis, albo-maculatis. Ent. syst. 2. 146. 71. *
Cetonia aurichalcea. Oliv. Inf. 1. 6. 42. 49. tab. 9. fig. 78.
 Habitat ad Suratta Indiae. Mus. Britann.
- nitidula.* 87. *C. viridis*, testaceo-nitida, clypeo emarginato, elytris acuminatis. Ent. syst. 2. 146. 72. *
 Habitat in Africa. D. Lee.
- Philippensis.* 88. *C. aenea*, nitida, thorace margine punctisque dnobus albis, elytris acuminatis, maculatis.
 Ent. syst. 2. 146. 73. *

Ceto-

Cetonia Philippensis. Oliv. Inf. 1. 6. 34. 37.
tab. 10. fig. 97.

Petiv. Gazoph. tab. 26. fig. 9.

Habitat in Insulis Philippinis. Mus. Britann.

89. *C. viridi-fusca*, thorace margine punctisque, *stolata*.
elytris acuminatis: fascia media maculisque ni-
veis. Ent. syst. 2. 146. 74. *

Cetonia stolata. Oliv. Inf. 1. 6. 43. 51. tab. 7.
fig. 59.

Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

90. *C. obscure viridis*, albo-irrorata, elytris acu- *atomaria*.
minatis, testaceo-lineatis.

Habitat in China. Mus. D. Lund.

Statura et magnitudo *C. festiuae*. Caput, thorax,
elytra obscure viridia, atomis numerosissimis,
albis irrorata. Elytra apice ad futuram in spi-
nam acutam, compressum excurrunt. Pectus
albo-villosum. Abdomen aeneum, albo-mac-
culatum.

91. *atra*, albo-maculata, elytris acuminatis: vitta *festiua*.
lata, testacea. Ent. syst. 2. 147. 75. *

Habitat Tranquebariae. Mus. D. Lund.

92. *C. atra*, nitida, coleoptris fascia lata, interrupta, *abbreviata*.
flava. Ent. syst. 2. 147. 76. *

Habitat in Senegallia. Mus. D. Geoffroy.

93. *C. aenea*, nitida, thorace vtrinque macula elytris *maculata*.
plurimis albis, sterno obtuso. Ent. syst. 2. 147.
77. *

Cetonia maculata. Oliv. Inf. 1. 6. 36. 40. tab.
7. fig. 66.

Voet. Col. tab. 1. fig. 8.

Habitat in Coromandel. Mus. D. Banks.

- difformis*. 94. *C. cyanea*, thorace vtrinque macula vna difformi, elytris plurimis albis.
Habitat in India orientali. Muf. D. de Seheftedt.
Vix a *C. maculata* fatis distincta. Differt tamen colore cyaneo elytris que nullo modo acuminatis.
- acuminata* 95. *C. obscure aenea*, pallido maculata, elytris acuminatis. Ent. syst. 2. 148. 78. *
Cetonia acuminata. Oliv. Inf. 1. 6. 42. 48. tab. 8. fig. 72.
Voet. Col. tab. 5. fig. 37.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Muf. D. Banks.
- mandarina* 96. *C. atra*, thorace elytris que acuminatis, albo-maculatis.
Cetonia mandarina. Web. Inf. 68. 4.
Habitat in Sumatra. D. Daldorff.
Nimis affinis *C. acuminatae*, at distincta, colore toto atro.
- haemorrhoidalis*. 97. *C. nigra*, elytris viridibus, nitidis, thoracis margine anoque rufis. Ent. syst. 2. 148. 79. *
Cetonia haemorrhoidalis. Oliv. Inf. 1. 6. 55. 66. tab. 4. fig. 24. tab. 11. fig. 24.
Degeer. Inf. 7. 642. 43.
Herbst. Arch. tab. 43. fig. 8.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Muf. Dr. Hunter.
- aspera*. 98. *C. ferruginea*, elytris viridibus, albo-punctatis. Habitat ad Cap. Bon. Spei. Muf. D. de Seheftedt.
Statura parua *C. haemorrhoidalis*. Caput et thorax obscure rufa, albo-punctata. Elytra striata, viridia, albo-punctata, margine vitta que ferrugineis. Corpus ferrugineum.
- creata*. 99. *C. nigra*, pubescens, elytris disco rufo. Ent. syst. 2. 148. 80. *

Cetonia areata. Oliv. Inf. 1. 6. 48. 58. tab. 9.
fig. 82.

Habitat in Virginia. Mus. Britann.

100. *C. nigricans*, hirta, elytris pallido-maculatis, hirta.
thorace carinato. Ent. syst. 2. 148. 81.

Cetonia hirta. Oliv. Inf. 1. 6. 52. 63. tab. 8.
fig. 36. 44.

Scarabaeus hirtellus. Linn. syst. Nat. 2. 556. 69.

Panz. Fn. Germ. 1. tab. 3.

Schaeff. Icon. tab. 198. fig. 8.

TV 263.

Voet. Col. tab. 4. fig. 34.

β. *Scarabaeus squalidus*. Linn. syst. Nat. 2. 556.
68.

Voet. Col. tab. 4. fig. 33.

Habitat in Europa australiori.

101. *C. glabra*, nigra, thorace elytrisque albo-pun-funesta.
ctatis. Ent. syst. 2. 149. 82. *

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

102. *C. clypeo emarginato*, nigra, albo-maculata, stictica.
abdomine subtus punctis quatuor albis. Ent.
syst. 2. 149. 83.

Cetonia stictica. Oliv. Inf. 1. 6. 53. 64. tab. 7.
fig. 57.

Scarabaeus sticticus. Linn. syst. Nat. 2. 552. 54.

Geoff. Inf. 1. 79. 14.

Herbst. Arch. tab. 19. fig. 27.

Voet. Col. tab. 22. fig. 82.

TV 264

Panz. Fn. Germ. 1. tab. 4.

Payk. Fn. Sv. 2. 205. 4.

Degeer. Inf. 4. 301. 29. tab. 10. fig. 22.

~~Herbst. Col. tab. 80. fig. 5.~~

Habitat in Europa Carduis frequens.

103. *C. thorace ferrugineo*; punctis quatuor ni-albo-pun-
gris, ctata.

gris, elytris ferrugineis: limbo atro, albo-punctatis. Ent. syst. suppl. 129. 89. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lund.

cinerascens 104. C. thoracis dorso atro: linea cinerascens, elytris cinereis nigro-maculatis. Ent. syst. suppl. 129. 89. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lund.

irrorata. 105. C. nigra, elytris striatis, ferrugineis, nigro-maculatis. Ent. syst. suppl. 130. 89. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. de Sehestedt.

furcata. 106. C. thorace elytrisque testaceis, nigro-punctatis. Ent. syst. suppl. 130. 89. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. de Sehestedt.

sepulcralis. 107. C. clypeo reflexo, integro, tomentosa, fusca, elytris albo-maculatis.

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Statura et magnitudo omnino C. ficticiae, at omnino distincta. Clypeus reflexus, integer. Caput et thorax tomentosa, fusca, immaculata. Elytra substriata, fusca, albo obscuro maculata. Abdomen obscure aeneo-nitidulum, maculis aliquot albis, lateralibus.

punctulata 108. C. cinerea, elytrorum striis albo-punctatis. Ent. syst. 2. 149. 84. *

Cetonia punctata. Oliv. Inf. 1. 6. 54. 64. tab. 6. fig. 47.

Habitat in Senegallia. Mus. D. Geoffroy.

floralis. 109. C. glabra, nigra, thoracis, elytrorum abdominisque margine albo. Ent. syst. 2. 149. 85. *

Habitat in Africae floribus compositis. D. Prof. Vahl.

maculata 110. C. capite thoraceque aureis, elytris punctis quatuordecim albis. Ent. syst. 2. 150. 86. *

Habitat - - Mus. D. Lee.

111. *C. nigra*, thorace rufo, nigro-maculato, elytris nigris, albo-punctatis: dorso rufo. Ent. versicolor.
 Syst. 2. 150. 87. *

Cetonia versicolor. Oliv. Inf. 1. 6. 46. 54. tab. 4. fig. 23.

Scarabaeus cruentus. Pall. Icon. tab. B. fig. 24.

Herbst. Arch. tab. 19. fig. 28.

Acta Berol. tab. 1. fig. 8.

Habitat in Aegypto. D. Prof. Forstkahl,

112. *C. atra*, thorace, margine elytrisque maculis variegata.
 albis sparsis. Ent. Syst. 2. 151. 88. *

Cetonia variegata. Oliv. Inf. 1. 6. 47. 56. tab. 5. fig. 30. 31. b.

~~*Scarabaeus albellus.*~~ Pall. Icon. 1. 17. tab. A. fig. 18.

Herbst. Arch. tab. 19. fig. 29.

Habitat Tranquebariae. Dr. Koenig.

113. *C. atra*, thoracis margine postico sanguineo, elytris flavo-maculatis, torquata.

Habitat - - - Dr. Pflug. Mus. D. Lund.

Statura depressa *C. aequinoctialis*. Caput atrum, clypeo emarginato. Thorax ater, margine postico late sanguineo. Scutellum laeve, angustum. Elytra substriata, atra; punctis duobus parvis, approximatis, ad basin maculisque duabus pone medium flavis. Corpus nigrum, ferrugineo flavoque maculatum.

114. *C. atra*, thoracis margine albo, coleoptris testaceis: macula scutellari apiceque atris. Ent. aequinoctialis.
 Syst. 2. 151. 89. *

Cetonia aequinoctialis. Oliv. Inf. 1. 6. 50. 60. tab. 6. fig. 42.

Habitat in Senegallia. Mus. D. Olivier.

- sanguinolenta.* 115. *C. atra*, elytris acuminatis: macula magna marginali fulva. Ent. syst. 2. 151. 90. *
Cetonia sanguinolenta. Oliv. Inf. 1. 6. tab. 6. fig. 41.
 Habitat in Senegallia. Mus. D. Geoffroy.
- discoidea.* 116. *C. atra*, elytris fulvis: macula scutellari apiceque atris, fascia mediaque purpurea. Ent. syst. 2. 151. 91. *
 Habitat in Bengalia. D. de Paykull.
- lugubris.* 117. *C. glabra*, atra, elytris macula laterali anoque albis. Ent. syst. 2. 152. 92. *
Cetonia lugubris. Oliv. Inf. 1. 6. 44. 52. tab. 7. fig. 60.
 Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.
- bifrio.* 118. *C. testacea*, capite thoracis lineis duabus, elytrorum futura maculisque tribus nigris. Ent. syst. 2. 152. 93. *
Cetonia bifrio. Oliv. Inf. 1. 6. 45. 53. tab. 10. fig. 94.
 Habitat in Aegypto. D. Prof. Forstkahl.
- modesta.* 119. *C. supra viridis*, opaca, albo-punctata, capite emarginato atro. Ent. syst. 2. 152. 94. *
 Habitat Tranquebariae. Mus. D. de Sehestedt.
- gloriosa.* 120. *C. testacea*, nitida, lineis abbreviatis nigris. Ent. syst. 2. 153. 95. *
Melolontha Dorcyi. Oliv. Inf. 1. 5. 34. 38. tab. 4. fig. 41.
 Habitat in Infula St. Domingo.
- macra.* 121. *C. depressa*, atra, thorace postice punctis duobus impressis.
 Habitat in Guinea. Mus. D. Lund.
 Statura elongata, depressa *C. hottentottae*. Caput nigrum, clypeo obtuso. Thorax planus, subpuncta-

punctatus, ater, postice punctis duobus impressis. Elytra substriata, nigra, nitida. Corpus nigrum, sterno haud porrecto.

Statura omnino *C. hottentottae*; forte proprii generis, mihi haud rite examinata.

122. *C. atra*, glabra, elytris postice punctis duobus *hottentotta*
albis. Ent. syst. 2. 153. 96. *

Cetonia hottentotta. Oliv. Inf. 1. 6. 56. 68. tab. 7. fig. 55.

Habitat ad Cap. Bon: Spei. Mus. D. Banks.

123. *C. atra*, thorace elytrisque sulcis villosis albis. *regia*.
Habitat in Sumatra, D. Daldorff. Mus. D. de Sehestedt.

Media, reliquis magis oblonga, antice posticeque attenuata. Caput nigrum, clypeo apice emarginato antennisque testaceis. Thorax planus, punctatus, ater, sulcis tribus dorsalibus, villosis-albis: lateralibus parum abbreviatis. Scutellum impressum, villosis-album. Elytra plana, sulcis duobus baseos, longiore ad futuram, versus apicem incurvo, maculaque pone medium impressis, albo-villosis. Puncta praeterea quatuor in margine. Corpus atrum, lateribus flavo-villosis. Pedes rufi.

124. *C. glabra*, atra, thorace postice maculis duabus *cruenta*.
elytrisque sanguineis. Ent. syst. 2. 153. 97. *

Cetonia cruenta. Oliv. Inf. 1. 6. 57. 69. tab. 6. fig. 37. tab. 7. fig. 58.

Habitat - - Mus. D. Banks.

127. MELOLONTHA. *Maxilla* brevis, cornea,
apice multidentata:
dentibus simplici-
bus, acutis.

Antennae lamellatae.

Stigma.

1. *M. fusco* - ferruginea, elytris stigmate oblongo
apicis albo. ~~Ent. fyft. suppl. 131. 1. *~~
~~Drury Inf. 3. tab. 44. fig. 1.~~
~~Herbst. Col. 3. tab. 28. fig. 1.~~
Habitat in Iava.

albu.

2. *M. farinoso* - albida.
~~*Melolontha alba.* Oliv. Inf. 1. 5. 10. 2. tab. 3.
fig. 1.~~
~~*Scarabaeus albus.* Pall. Icon. 1. tab. B. fig. 25.~~
Melolontha alba. Web. Inf. 71. 1.
Habitat in Sumatra. D. Daldorff.
Statura omnino praecedentis, tota albido-farino-
sa, immaculata.

Fullo.

3. *M. testacea*, albo-maculata, scutello macula du-
plici, antennis heptaphyllis. Ent. fyft. 2. 154. 1.
Scarabaeus Fullo. Linn. fyft. Nat. 2. 553. 57.
Geoff. Inf. 1. 69. 2.
Oliv. Inf. 1. 5. 9. 1. tab. 3. fig. 28.
Schaeff. Icon. tab. 23. fig. 2.
Petiv. Gazoph. tab. 138. fig. 1.
Voet. Scarab. tab. 6. fig. 48. 49.
Petagna Inf. Calabr. 3. 11. tab. 1. fig. 1.

18. 4

Frish.

Melolonthae corpus oblongum, gibbum, tomentosum, laeve,
immarginatum, tardum, *capite* ovato, inserto, labio ro-
tundato; *oculis* globosis, marginalibus; *antennis* disantibus,
thorace breuioribus, subter oculos insertis; *thorace* trans-
uerso; *scutello* rotundato; *elytris* rigidis, fornicatis, lon-
gitudine abdominis; *pedibus* breuibus, validis; *tibiis* den-
tatis; *tarsis* quinquearticulatis; *colore* variegato.

- Frish. Inf. 11. 22. tab. 1. fig. 1.
 Roef. Inf. 4. tab. 30.
 Aub. Miscell. tab. 16. fig. med.
 Payk. Fn. Sv. 2. 206. 1.
 Degeer Inf. 4. 272. 19. tab. 10. fig. 14.
 Herbst. Col. 3. tab. 22. fig. 1. 2.
 Habitat in Europae sylvis arenosis.
4. *M. fusca*, atomis numerosissimis griseis. *rorida.*
Melolontba rorida. Web. Inf. 71. 2.
 Habitat in Sumatra. D. Daldorff.
 Paulo minor, quam *M. Fullo*. Corpus totum fuscum, obscurum, punctatum, et in singulo puncto pilus breuissimus, griseus, vnde corpus punctis numerosissimis griseis irroratum videtur. Pili saepius detriti, et tunc totum corpus fuscum apparet.
5. *M. obscure testacea*, clypeo emarginato, thoracis *serrata*.
 margine serrato. Ent. syst. 2. 155. 2.
Melolontba serrata. Oliv. Inf. 1. 5. 11. 4. tab. 1. fig. 5.
 Habitat in Coromandel. Mus. D. Banks.
6. *M. testacea*, thorace villoso, incisuris abdominis *vulgaris*.
 albis. Ent. syst. 2. 155. 3.
Scarabaeus Melolontba. Linn. syst. Nat. 2. 554.
 60. Fn. Sv. 392.
 Geoff. Inf. 1. 70. 1.
 Oliv. Inf. 1. 5. 12. 5. tab. 1. fig. 1.
 Petiv. Gazoph. 29. tab. 19. fig. 2.
 Roef. Inf. 2. scarab. 1. tab. 1.
 Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 14.
 Voet. Scarab. tab. 6. fig. 45. 46.
 Schaeff. Icon. tab. 93. fig. 1. 2.
 tab. 102. fig. 3. 4.
 Habitat in Europae borealis graminosis.

L

Ant. 272. 4.

2. VI

*J. Schaeff. 1744
 no. 102. 2. 2.
 tab. 102. 3. 4.*

Va.

2. VI

Variat thorace rufo et nigro, et utraque varietas alternat quotannis.

Animalculum inter omnia nostratia maxime fatale.

Larua mollis, grisea, capite pedibusque testaceis, per plures annos sub terra degit, et deuorat radices vegetabilium, agros prataque desolans.

Imago vesperi volitans cum susurro deuastat folia arborum, tilia intacta.

Deuoratur a suis, coruis, cornicibus, picis, galinis, meleagridibus, carabis maioribus. Per diem arboribus concussis facillime colligitur a pueris.

Hippocastani.

7. *M. nigra*, thorace villoso, elytris testaceis, abdomine maculis marginalibus alba.

~~*Melolontha Hippocastani.* Oliv. Inf. 1. 5. 13. tab. 1. fig. 3. a. b. c.~~

Habitat in Aesculo hippocastano Europae australioris.

Nimis affinis *M. vulgari*. Caput nunc nigrum, nunc rufum, villosum, reflexum. Thorax villosus, nunc niger, nunc rufus. Elytra testacea. Corpus nigrum, abdomine maculis magnis, marginalibus, triangularibus, albis. Pedes nunc albi, nunc nigri.

villosa.

8. *M. testacea*, clypeo marginato, reflexo, corpore subtus lanato, scutello albo. Ent. syst. 2. 156.

4. *

Scarabaeus sepicola. Linn. syst. Nat. 2. 156. 17.

Scarabaeus cerealis. Scopoli Flor. Inf. 1. 49. tab. 21. fig. B.

Oliv. Inf. 1. 5. 13. 6. tab. 1. fig. 4.

Panz. Fn. Germ. 31. tab. 19.

~~Herbst. Col. 3. tab. 22. fig. 8. (*pilosa*)~~

Habitat in Europa australiori. Dr. Allioni.

pilosa.

9. *M. villosa*, nigricans, clypeo reflexo, submarginato, antennis ferrugineis. Ent. syst. 2. 156. 5.

Panz.

Panz. Fn. Germ. 31. tab. 20.

Habitat in Hungaria. Mus. D. de Schestedt.

10. *M. thorace pubescente, testacea, elytris lineis quatuor niveis.* Ent. syst. 2. 156. 6. * *occidentalis.*

~~*Scarabaeus occidentalis.* Linn. syst. Nat. 2. 535.~~

~~64.~~

Oliv. Inf. 1. 5. 24. 7. tab. 1. fig. 7.

~~Drury Inf. 2. tab. 32. fig. 2.~~

Habitat in Europa australiori.

11. *M. glabra, testacea, clypeo emarginato.* Ent. *feruida.* -
syst. 2. 156. 7. *

~~Oliv. Inf. 1. 5. 24. 21. tab. 9. fig. 209.~~

Habitat in America septentrionali.

12. *M. villosa, testacea, clypeo reflexo: linea media eleuata transuersa.* *transuersa.*

Habitat in Austria. Dom. de Meyerle.

Statura et magnitudo *M. feruida*. Corpus supra testaceum, subtus villosum, pedibus ferrugineis. Clypeus reflexus, submarginatus, in medio linea transuersa, eleuata, vti in *Scarabaeis femininis*.

13. *M. glabra, testacea, clypeo reflexo.* Ent. syst. 2. *reflexa.*
156. 8. *

~~Oliv. Inf. 1. 5. 24. 22. tab. 4. fig. 32.~~

Habitat in Africa. Mus. D. Banks.

14. *M. fuluo-hirta, clypeo reflexo emarginato, elytris glabris nigris.* Ent. syst. 2. 157. 9. * *Aloper.*

Melolomba Aloper. Oliv. Inf. 1. 5. 18. 9. tab.

4. fig. 35.

~~*Scarabaeus vortumnus.* Path. Itin. 2. 10. 28.~~

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lund.

15. *M. cinereo-hirta, elytris nigris, clypeo reflexo, tomentosa.*
integro. Ent. syst. 2. 157. 10. *

Habitat in India orientali. D. Lee.

L 2 10 26. M.

folstitialis. 16. *M. testacea*, thorace villoso, elytris luteo-pallidis: lineis tribus pallidioribus. Ent. syst. 2.

157. 11.

Scarabaeus folstitialis. Linn. syst. Nat. 2. 554.

61. Fn. Sv. 323.

Oliv. Inf. 1. 5. 16. 10. tab. 2. fig. 8. 11.

Frish. Inf. 9. 30. tab. 15. fig. 3.

Schaeff. Icon. tab. 93. fig. 3.

Voet. Scarab. tab. 6. fig. 51. 52.

Deger. Inf. 4. tab. 10. fig. 15.

Payk. Fn. Sv. 2. 208. 3.

Herbst. Col. 3. tab. 22. fig. 9.

Habitat in Europae arboretis.

bidens.

17. *M. atra*, antennis pedibusque testaceis, clypeo bidentato, elytris striatis.

Habitat in Carolina.

Paullo maior *M. atra*. Caput nigrum, clypeo bidentato. Antennae testaceae. Thorax punctatus, ater. Elytra crenato-striata, nigra. Pectus ferrugineo-hirtum. Pedes ferruginei.

candida.

18. *M. clypeo rotundato, corpore villoso, albo*. Ent. syst. 2. 157. 12.

Melolontha candida. Oliv. Inf. 1. 5. 15. 8. tab. 8. fig. 28.

Habitat in India orientali. D. Lee.

atra.

19. *M. clypeo reflexo, villosa, nigra, antennis ferrugineis*. Ent. syst. 2. 158. 13.

Melolontha atra. Herbst. Arch. tab. 24. fig. 1.

IV. 59. 6. *Melolontha fusca*. Oliv. Inf. 1. 5. 99. 13. tab. 2. fig. 10.

Habitat in Europa australiori. D. Prof. Vahl.

aegyoctialis.

20. *M. villosa, testacea, clypeo subreflexo*. Ent. syst. 2. 158. 14.

Melolontha aegyoctialis. Herbst. Arch. tab. 22. fig. 11. Col. 3. 62. 10. I. Melo.

~~Melolontha castanea~~ Oliv. Inf. 1. 5. tab. 2. fig.

Habitat in Hungaria. D. Prof. Helwig.

21. *M. nigra*, clypeo, thoracis lateribus, elytris pedibusque pallidis. Ent. syst. 2. 158. 15. * *Pini.*

Melolontha Pini Oliv. Inf. 1. 5. tab. 2. fig. 9. ab.

Habitat in Barbaria. Mus. D. Desfontaines.

22. *M. oblonga*, glabra, testacea, thorace vtrinque *maculata*
macula abdomineque flavis. Ent. syst. 2. 158.
16. *

Oliv. Inf. 1. 5. 33. tab. 5. fig. 45.

Habitat in China. Mus. D. Banks.

23. *M. oblonga*, villosa, pallida, elytris futura apiceque nigris, clypeo reflexo. Ent. syst. 2. 159.
17. *

Oliv. Inf. 1. 5. 28. 28. tab. 8. fig. 99.

Habitat in Barbariae Atriplice humifolia. Prof. Vahl.

24. *M. oblonga*, glabra, nigra, elytris obsolete striatis. Ent. syst. 2. 159. 18. * *oblonga.*

~~Scarabaeus oblongus~~ Scopot. Carn. 16.

Oliv. Inf. 1. 5. 19. 14. tab. 4. fig. 34. * *M. Friesii*

Habitat in Germania. *col. variol. nigra*

25. *M. villosa*, fusca, elytris testaceis, abdomine albicante. Ent. syst. 2. 159. 19. * *ruficornis.*

Voet. Scarab. tab. 6. fig. 50. *marginata, Hordl.*

Habitat in Germania. D. de Hattorff. *tab. 24. f. 2*

26. *M. subtus lanata*, capite thoraceque aureis, elytris luteis. Ent. syst. 2. 159. 20. * *lanigera.*

Scarabaeus laniger. Linn. syst. Nat. 2. 555. 67.

Mus. Lud. Vlr. 29.

Oliv. Inf. 1. 5. 21. 17. tab. 4. fig. 39.

Drury Inf. 1. tab. 24. fig. 6.

Voet. Col. tab. 7. fig. 59.

Habitat in India.

27. M.

- longicornis.* 27. *M. supra* glabra, nigra, elytris ferrugineis, antennarum clava elongata. Ent. syst. 2. 160. 21. ¹
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lund.
- punctata.* 28. *M. testacea*, elytris punctis tribus fuscis, distan-
tibus. Ent. syst. 2. 160. 22.
Scarabaeus punctatus. Linn. syst. Nat. 2. 557.
76. Mus. Lud. Vlr. 23.
Oliv. Inf. 1. 5. 22. 18. tab. 1. fig. 6.
Drury Inf. 1. tab. 34. fig. 6-5
Gronov. Gazoph. 438.
Voet. Scarab. tab. 8. fig. 65.
Habitat in America.
- viridis.* 29. *M. glabra*, supra viridis, subtus aurea. Ent. syst.
2. 160. 23. *
Oliv. Inf. 1. 5. 29. 31. tab. 3. fig. 21. b.
fig. 18.
Habitat in India orientali. Mus. D. Banks.
- aenea.* 30. *M. glabra*, aenea, abdominis lateribus albis, ely-
tris acuminatis. Ent. syst. 2. 160. 24. *
Habitat in nova Hollandia. Mus. D. Banks.
- futuralis.* 31. *M. viridis*, elytrorum futura flavescente. Ent.
syst. 2. 161. 25. *
Oliv. Inf. 1. 5. 31. 34. tab. 7. fig. 85.
Habitat in nova Zelandia. Mus. D. Banks.
- bicolor.* 32. *M. glabra*, viridis, subtus testacea, pedibus spi-
ce aureis. Ent. syst. 2. 161. 26. *
Oliv. Inf. 1. 5. 30. 33. tab. 7. fig. 86.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.
- geminata.* 33. *M. glabra*, atra, thorace punctato, elytris pun-
ctatis: striis geminatis.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Schefstedt.
Statura omnino *M. barbatae*, Caput laeve, atrum,
niti-

nitidum. Thorax punctatus, ater. Elytra punctata, striisque per paria approximatis notata. Corpus atrum.

34. *M. glabra*, nigra, nitida, abdominis ultimo segmento prominulo, barbato. Ent. syst. 2. 161, 27. *

Habitat in India orientali.

35. *M. glabra*, atra, thorace punctato, elytris sub-striatis. Ent. syst. suppl. 131. 27. * *Melano-*
testacea

Habitat in Nymphaee floribus Indiae orientalis. Mus. D. Lund.

36. *M. glabra*, nitida, castanea; elytris laevibus, testaceis. *castanea.*

Melolontha castanea. Oliv. Inf. 1. 5. tab. 10. fig. 124.

Habitat in America meridionali. Mus. D. de Sehestedt.

Statura omnino *M. barbatae*. Corpus totum castaneum, nitidissimum, elytris laevibus, testaceis. Pedes antici parum elongati, vngue validissimo.

Variat corpore atro, nitidissimo.

37. *M. glabra*, atra, thorace punctato, elytris punctato-striatis, ferrugineis. *rufipennis.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Praecedentibus affinis. Thorax punctatus, ater, nitidus. Elytra punctato-striata, ferruginea.

38. *M. glabra*, testacea, capite elytrorum sutura tibisque posticis nigris, clypeo reflexo. Ent. syst. 2. 161. 28. *

Habitat Tranquebariae. Mus. D. de Sehestedt.

39. *M.*

- dorsalis.* 39. *M. glabra, testacea, capite, thoracis coleoptro-
rumque dorso nigris.* Ent. syst. 2. 162. 29. *
Herbst. Arch. tab. 22. fig. 12.
Habitat Tranquebariae. Dr. Koenig.
- glacialis.* 40. *M. glabra, picea, antennis pedibusque testaceis.*
Ent. syst. 2. 162. 30. *
Oliv. Inf. 1. 5. 78. 46. tab. 6. fig. 61.
Habitat in Terra del Fuego. Mus. D. Banks.
- lurida.* 41. *M. thorace nigro: margine pallido, elytris gri-
seis, nigro-punctatis.* Ent. syst. 2. 162. 31. *
Habitat - - Mus. D. Tunstall.
- friata.* 42. *M. glabra, aenea, elytris striatis: futura lineis-
que quatuor cupreis.* Ent. syst. 2. 162. 32. *
Oliv. Inf. 1. 5. 39. 49. tab. 6. fig. 65.
Habitat in Terra del Fuego. Mus. D. Banks.
- tristis.* 43. *M. thorace villoso, obscuro, elytris laevibus, te-
staceis, scutello albo.* Ent. syst. 2. 162. 33. *
Habitat in America boreali. Mus. D. Blackburn.
- testacea.* 44. *M. glabra, testacea, capite obscuriore, elytris
striatis.* Ent. syst. 2. 163. 34. *
Oliv. Inf. 1. 5. 39. 47. tab. 5. fig. 49.
Habitat in Terra del Fuego. Mus. D. Banks.
- hirticollis.* 45. *M. hirta, nigra, elytris punctatis, glabris, rufis.*
Ent. syst. 2. 163. 35. *
Habitat in Africa. D. Prof. Vahl.
- pallida.* 46. *M. glabra, testacea, capite elytrorumque futura
nigris.* Ent. syst. 2. 163. 36. *
Melolontha spinipes. Herbst. Arch. 13. 4. tab.
19. fig. 21.
~~Oliv. Inf. 1. 5. 25. 24. tab. 9. fig. 103.~~
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.
Variat minor elytris striatis.

47. *M. glabra, punctata, ferruginea, elytris testaceis, rufisollis.*
 Ent. syst. 2. 163. 37. *
 Oliv. Inf. 1. 5. 27. 26. tab. 9. fig. III.
 Habitat in Coromandel. Dr. Koenig.
48. *M. glabra, obscura, elytris testaceis, clypeo quadridentato. quadridens.*
 Ent. syst. suppl. 131. 37. *
 Habitat in India orientali. D. Hybner.
49. *M. villosa, nigra, thorace elytrisque variolosis. variolosa.*
 Ent. syst. 2. 164. 38. *
 Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lee.
50. *M. testacea, supra albo-villosa, elytris lineis lanata.*
 tribus eleuatis.
 Habitat in Isle de France. D. Daldorff. Mus. D. de Sehestedt.
 Statura et magnitudo omnino *M. signatae*. Capitulum clypeus rotundatus, integer, albo-villosus. Thorax testaceus, albo-villosus: linea dorsali eleuata. Elytra albo-villosa, lineis tribus eleuatis. Corpus testaceum.
51. *M. glabra, pallida, thorace lineis duabus, elytris signata.*
 maculis tribus nigris. Ent. syst. 2. 164. 39. *
Scarabaeus nigrocephalus. Degeer Inf. 4. tab. 19. fig. 6.
~~Oliv. Inf. 1. 5. tab. 4. fig. 33.~~
 Voet. Col. tab. 9. fig. 77.
 Sloane Jamaica. 206. tab. 237. fig. 38.
 Habitat in Jamaica. Mus. D. Banks.
Variat thorace immaculato, aut elytris punctis duobus, aut nullis.
52. *M. glabra, aenea, elytris testaceis: futura marginatae.*
 gineque aeneis. Ent. syst. 2. 164. 40. *
 Habitat in America meridionali. Mus. D. Banks.
53. *M. glabra, coeruleo-nigra, elytris testaceis: futura cyanocephala.*
 ferruginea. *M. coeruleocephala.* Ent. syst. 2. 164. 41. *
 Oliv.

Oliv. Inf. 1. 5. 36. 43. tab. 6. fig. 39.
Habitat - - Mus. D. Banks.

- brunnea.* 54. *M. glabra*, testacea, elytris striatis, thorace vtrinque puncto notato. Ent. syst. 2. 165. 42. *
Scarabaeus brunneus. Linn. syst. Nat. 2. 556. 72.
Oliv. Inf. 1. 5. 43. 55. tab. 4. fig. 33.
Geoff. Inf. 1. 83. 22.
Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 17.
Ross. Fn. Etr. 1. 22. 50.
Voet. Scarab. tab. 7. fig. 53. 54.
~~Suiz. Hist. Inf. tab. 1. fig. 9.~~
Payk. Fn. Sv. 2. 209. 4.
Herbst Col. 3. tab. 24. fig. 3.
Habitat in Europae Arboretis.
Larva mollis, albida, capite pedibusque testaceis, deuorat radices, *imago* folia.

- melanocephala.* 55. *M. glabra*, rufescens, capite nigro, elytris pallidis. Ent. syst. 2. 165. 43. *
~~Oliv. Inf. 1. 5. 43. 55. tab. 7. fig. 83.~~
Voet. Scarab. tab. 9. fig. 80.
Habitat in Brasilia. Mus. D. Banks.

- ferruginea nigricaps* 56. *M. glabra*, punctata, rufa, capite nigro. Ent. syst. suppl. 131. 43. *
Habitat in Cayenna. D. Richard.

- pallens.* 57. *M. glabra*, pallida, capitis basi thoracisque punctis duobus nigris. Ent. syst. suppl. 131. 44. *
Habitat in Cayenna. D. Richard.

- erythrocephala.* 58. *M. glabra*, pallida, capite rufo, basi nigro. Ent. syst. 2. 165. 44. *
Oliv. Inf. 1. 5. 41. 51. tab. 7. fig. 80.
Habitat in Coromandel. Mus. D. Banks.

- tridentata.* 59. *M. glabra*, testacea, thorace rufo, clypeo tridentato.

Habi-

Habitat in Insula Guadeloupe. Mus. D. Lund.

Statura et summa affinitas *M. melanocephalae*.

Caput rufum, basi magis obscurum, clypeus paruo, tridentato. Thorax punctatus, rufus, lateribus pallidioribus. Elytra et corpus testacea.

60. *M. nigricans*, thorace pallido: punctis duobus *nigris*.
nigris. Ent. syst. 2. 165. 45. *

Habitat in Africa aequinoctiali. D. Lee.

61. *M. obscure picea*, immaculata, pilis brevissimis, *obscura*.
erectis, albis. Ent. syst. 2. 166. 46. *

Oliv. Inf. 1. 5. 42. 53. tab. 6. fig. 64.

Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. D. Banks.

62. *M. glabra*, rufescens, elytris testaceis, clypeo *rufa*.
quinquedentato. Ent. syst. 2. 166. 47. *

Oliv. Inf. 1. 5. 4. 3. tab. 7. fig. 29.

Voet. Col. tab. 9. fig. 70.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

63. *M. supra glabra*, viridis, thorace linea dorsali, *festiva*.
elytris sutura nigris. Ent. syst. 2. 166. 48. *

Oliv. Inf. 1. 5. 47. 62. tab. 5. fig. 48.

Habitat in noua Zelandia. Mus. D. Banks.

64. *M. supra glabra*, aurea, thoracis linea dorsali *lata*.
scutelloque sanguineis. Ent. syst. 2. 166. 49. *

Oliv. Inf. 1. 5. 48. 63. tab. 6. fig. 56.

Habitat in noua Zelandia. Mus. D. Banks.

65. *M. supra viridis*, holosericea, subtus cuprea, ely- *bolosericea*.
tris lineis elevatis quatuor. Ent. syst. 2. 167.
50. *

Habitat in Russia australiori. Mus. D. Boeber.

66. *M. viridi-aenea*, elytris substriatis, obscuris. Ent. *Iulii*.
syst. 2. 167. 51. * Voet. Col. tab. 7. fig. 58.

Melolontha dubia. Herbit. Col. 3. tab. 25, f. 9. *Pl. 7*

Payk.

Payk. Fn. Sv. 2. 210. 5.

Habitat in Germania. D. Smidt.

nigrita.

67. *M. glabra, nigra, clypeo reflexo, elytris obsolete striatis.* Ent. syst. 2. 167. 52. *

Habitat in America.

Frischii.

68. *M. nigro-aenea, nitida, elytris testaceis.* Ent. syst. 2. 167. 53. *

Scarabaeus vitis. Frish. Inf. 4. 29. tab. 14.

Oliv. Inf. 1. 5. 35. tab. 2. fig. 29.

H. IV. 6.

Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 16.

Schaeff. Icon. tab. 23. fig. 3. 7.

Habitat in vite, rosa, Germaniae.

vitis.

69. *M. viridis, thoracis lateribus flavis.* Ent. syst. 2. 167. 54.

Oliv. Inf. 1. 5. 34. 39. tab. 2. fig. 12.

Schaeff. Icon. tab. 259. fig. 6.

H. IV. 7.

Petagn. Inf. Calabr. 5. 19.

~~Voet. Scarab. tab. 6. fig. 56. 57.~~

~~Sulz. Hist. Inf. tab. 1. fig. 11.~~

Habitat in Europae et Americae vite, rosa.

aurata.

70. *M. viridis, nitida, elytrorum margine tenuissime purpurascente, clypeo submarginato.*

Habitat in Carneolia. D. de Meyerle.

Maior *M. Frishii*, at affinis. Caput et thorax laevia, viridia, nitida.

cardui.

71. *M. glabra, viridi-aenea, abdomine rufo, cinereo-villoso.* Ent. syst. 2. 167. 55. *

Melolontha maura. Oliv. Inf. 1. 5. 38. 45. tab. 8. fig. 90.

Scarabaeus maurus. Linn. syst. Nat. 2. 548. 304.

Habitat in Carduo pycnocephalo Africae. Dom. Vahl.

72: *M. villosa, viridis, elytris ferratis acuminatis, ferratulae.*
femoribus posticis incrassatis. Ent. syst. 1. 168.
56. *

Habitat in Barbaria. Mus. D. Desfontaines.

73. *M. viridi-aenea, nitida, elytris vittis duabus a-*
reis. Ent. syst. 2. 168. 57. *

Melolontha Leci. Oliv. Inf. 1. 5. 30. tab. 8,
fig. 87.

Scarabaeus Leci. Sweder. Act. Holm. 1787.
188. 4.

Habitat in India orientali. D. Lee.

74. *M. testacea, thorace maculis duabus nigris, pe-*
dibus rufis. Ent. syst. 2. 169. 58. errata.

Oliv. Inf. 1. 5. 45. 58. tab. 8. fig. 92.

Habitat in Anglia. Mus. D. Tunstall.

75. *M. thorace aeneo-nitido: margine pallido, ely-*
tris testaceis, nigro-punctatis. varians.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Parva. Caput viridi-aeneum, clypeo subreflexo
rufescente. Thorax viridi-aeneus, nitidus,
margine pallido, interdum puncto viridi. Ely-
tra striata, obscure testacea: punctis plurimis
nigris, sparsis. Corpus testaceum.

Variat elytris nigro-varis.

76. *M. subtestacea, griseo-villosa, pedibus testaceis.* umbrosa.
Ent. syst. 2. 169. 59. *

Habitat in Guinea. D. Isert.

77. *M. villosa, virefcens, capite nigro.* Ent. syst. 2. rupicola.
169. 6b.

Oliv. Inf. 1. 5. 68. 92. tab. 6. fig. 70.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

78. *M. glabra, nigra, thoracis margine, abdomine, innaba.*
femoribusque testaceis. Ent. syst. 2. 169. 61. *

Melo-

- Melolontha innuba*. Oliv. Inf. 1. 5. 46. 59. tab. 3. fig. 93.
Habitat in India. Mus. Dr. Hunter.
- elongata*. 79. M. capite thoraceque nigris, elytris nitidulis, corpore testaceo. Ent. syst. 2. 170. 62. *
Habitat - - D. Lee.
- varca*. 80. M. clypeo reflexo, thorace elytrisque punctatis nigro-aeneis. Ent. syst. 2. 170. 63.
Oliv. Inf. 1. 5. 41. 56. tab. 6. fig. 62.
Habitat in Coromandel. Mus. D. Banks.
- ferruginea* 81. M. rufa, thorace elytrisque vage punctatis. Ent. syst. 2. 170. 64. *
Oliv. Inf. 1. 5. 44. 56. tab. 7. fig. 82.
Habitat in Coromandel. Mus. D. Banks.
- macrens*. 82. M. rufa, elytris testaceis, pectore nigro. Ent. syst. suppl. 132. 64. *
Habitat in America boreali. D. v. Rohr.
- splendida*. 83. M. atra, elytris vitta abbreviata, aurea. Ent. syst. 2. 170. 65. *
Oliv. Inf. 1. 5. 49. 65. tab. 5. fig. 50.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.
- aulicola*. 84. M. cuprea, nitida, clypeo emarginato. Ent. syst. 2. 170. 66. *
Oliv. Inf. 1. 5. 49. tab. 7. fig. 81.
Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. D. Banks.
- lucicola*. 85. M. glabra, nigra, thoracis margine elytrisque testaceis. Ent. syst. suppl. 132. 66. *
Habitat in America boreali. D. v. Rohr.
- atrata*. 86. M. glabra, atra, elytris striatis. Ent. syst. suppl. 132. 66. *
Habitat in America boreali. D. v. Rohr.
- arboricola* 87. M. nigra, hirta, elytris striatis, testaceis. Ent. syst. 2. 171. 67. *

Melolontha nitidula. Oliv. Inf. 1. 5. 46. 60. tab.

9. fig. 102.

Habitat in America.

8. *M. capite thoraceque coeruleo-pilosis, elytris horticola*.
testaceis, pedibus nigris. Ent. syst. 2. 171. 68.

Scarabaeus horticola, Linn. syst. Nat. 2. 554.

Fn. Sv. 391.

Geoff. Inf. 1. 75. 8.

Oliv. Inf. 1. 5. 26. tab. 2. fig. 17.

Schaeff. Icon. tab. 32. fig. 4.

Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 18.

Payk. Fn. Sv. 2. 211. 6.

Herbst. Col. tab. 25. fig. 1.

Habitat in Europae horticis.

Larva devastat radices Brassicae Botrydis et capitatae, intactis viridis et savoyae, *imago* Pomonam intacto Pyro communi.

19. *M. thorace punctato-viridi: margine cupreo, nitidula*.
elytris striatis, testaceis.

Habitat in America boreali. Mus. D. Bosc.

Statura et magnitudo omnino *M. horticolae*. Caput nigrum, clypeo parum reflexo, Thorax punctatus, viridis, nitidulus, margine exteriori et postico cupreis. Scutellum nigrum, viridum nitidulum. Elytra crenato-striata, testacea. Corpus nigrum.

10. *M. capite thoraceque coeruleo-pilosis, elytris abdominalis*.
testaceis, abdomine villosa, albo. Ent. syst. 2. 171. 69. *

171. 69. *

[*Abdominalis abdominalis*]

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

11. *M. cyanea, nigra, glabra, elytris rufis, abdomine floricola*.
punctis fasciculatis, albis, clypeo reflexo. Ent.

syst. 2. 171. 70. *

Melo-

~~Melolontha aegyptiaca~~. Herbst Arch. tab. 20. f. 8.
Habitat in Africa. D. Prof. Vahl.

arvicola. 92. *M. hirta*, capitis clypeo reflexo, thorace coerule-
lescente, corpore nigro. Ent. syst. 2. 172. 71. *
Oliv. Inf. 1. 5. 6. 4. tab. 7. fig. 84.
Habitat in Russiae regionibus australioribus.

praticola. 93. *M. thorace subpiloso, nigro flauoque vario, ely-*
tris testaceis. Ent. syst. 2. 172. 72. *
Oliv. Inf. 1. 5. 60. 83. tab. 7. fig. 74.
Habitat in Sibiria. Mus. D. Banks.

fruticola. 94. *M. capite thoraceque coeruleo-pilosis, elytris*
liuidis, clypeo apice reflexo. Ent. syst. 2. 172.
73.

~~Oliv. Inf. 1. 5. 56. 56. tab. 2. fig. 13.~~

~~Petagn. Inf. Calabr. tab. 1. fig. 2.~~

Schaeff. Icon. tab. 63. fig. 1.

Herbst. Arch. 15. 11. tab. 19. fig. 24.

~~16. 12. tab. 19. fig. 26.~~

Voet. Col. tab. 8. fig. 67.

Habitat in Europae spicis secalinis.

Femina macula quadrata coleopterorum, nigra,
scutellum cingente.

agricola. 95. *M. thorace villoso, elytris liuidis; limbo fascia-*
que nigris, clypeo apice reflexo. Ent. syst. 2.
173. 74. *

W. G. 8 *Scarabaeus agricola.* Linn. syst. Nat. 2. 553. 58.
Oliv. Inf. 1. 5. 61. 84. tab. 2. fig. 19.

Habitat in Germaniae Graminibus.

lineata. 96. *M. villosa, capite thoraceque obscure aeneis,*
elytris testaceis; marginibus lineolisque dua-
bus nigris. Ent. syst. suppl. 133. 75. *

Habitat in Africae borealis arboribus. D. Schousboe.

viricola. 97. *M. atra, fericea, elytris rufis; margine omni-*
naso. Ent. syst. 2. 173. 75.

nigro

Geoff.

Geoff. Inf. 1. 80. 15.

Oliv. Inf. 1. 5. 52. 71. tab. 3. fig. 25.

Panz. Naturf. 24. tab. 1. fig. 10.

Herbst. Arch. tab. 43. fig. 7.

Habitat in Europæ graminosis. D. Lee.

98. *M. albo-farinosa*, thoracæ canaliculato atro, ely- *atomaria*.
tris fascis, abdomine albo: punctis lateralibus
atris. Ent. syst. 2. 173. 76. *

Oliv. Inf. 1. 5. 71. 98. tab. 5. fig. 52.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Muf. D. Banks.

99. *M. supra coeruleo-*, subtus argenteo-*squamosa*, *farinosa*.
nitens, clypeo integro. Ent. syst. 2. 173. 77. *

~~*Scarabæus farinosus*. Linn. syst. Nat. 2. 555. 64.~~

~~Fn. Sv. 399.~~

Geoff. Inf. 1. 79. 13.

Drury Inf. 2. tab. 32. fig. 4.

Oliv. Inf. 1. 5. 66. 90. tab. 2. fig. 14. a. c.

Panz. Fn. Germ. 28. tab. 16.

Voet. Col. tab. 9. fig. 73.

Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 23.

Habitat in Europa australiori.

100. *M. supra viridi-squamosa*, subtus pallido-*ni-squamosa*.
tens, capite fusco. Ent. syst. 2. 174. 78.

~~*Melolontha minuta*. Panz. Naturf. 24. 9. 11.
tab. 1. fig. 11.~~

Melolontha argentea. Laichart. 1. 42. 7.

Oliv. Inf. 1. 5. 65. 89. tab. 2. fig. 14. b.

Herbst. Arch. tab. 20. fig. 6.

Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 23.

Panz. Fn. Germ. 28. tab. 17.

Voet. Col. tab. 9. fig. 71. 72.

Payk. Fn. Sv. 2. 212. 7.

Habitat in Germania. Dom. Hybner.

bilineata. 101. *M. supra viridi-squamosa, capite thoracis lineis duabus pedibusque fuscis.*

Habitat in Tanger. Mus. D. de Sehestedt.

Statura et summa affinitas *M. squamosae*. Caput fuscum clypeo reflexo. Thorax virescens lineis duabus latis fuscis. Elytra viridia. Corpus subtus viridi-squamosum, pedibus apice nigricantibus.

In hac et praecedentibus speciebus articulus ultimus palporum anteriorum magis incrassatus, at vix tamen proprii generis.

regia. 102. *M. squamosa, supra lutea, capite nigro, subtus cinerea. Ent. syst. 2. 174. 79.**

Scarabaeus aulicus. Linn. syst. Nat. 2. 555. 65.

Oliv. Inf. 1. 5. 44. 88. tab. 9. fig. 106.

Habitat in Africa. D. Prof. Vahl.

glabrata. 103. *M. atra, nitida, elytris striatis, flauo-maculatis.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Paullo maior, quam *M. argentea*. Caput et thorax laevis, atra, immaculata. Elytra abbreviata, atra, flauo-maculata. Pedes simplices, picei.

videns. 104. *M. atra, nitida, elytris striatis testaceis.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Affinis praecedenti, at paullo minor, et elytra minus striata, testacea, sutura nigra.

argentea. 105. *M. clypeo marginato, nigra, subtus argenteo-nitens, elytris testaceis. Ent. syst. 2. 174. 80.**

Scarabaeus argenteus. Scopol. Carn. 9.

11. 10. Oliv. Inf. 5. 67. 91. tab. 8. fig. 22.

~~11. 10. Oliv. Inf. 5. 67. 91. tab. 8. fig. 22.~~
Panz. Fa. Germ. 28. tab. 19.

11. 10. Oliv. Inf. 5. 67. 91. tab. 8. fig. 22.
11. 10. Oliv. Inf. 5. 67. 91. tab. 8. fig. 22.
11. 10. Oliv. Inf. 5. 67. 91. tab. 8. fig. 22.

Voet.

Voet. Icones. tab. 8. fig. 68.

Habitat in Angliae floribus frequens.

106. *M. argenteo-squamosa*, clypeo reflexo. Ent. *gramini-*
syst. 2. 175. 81. * *cola.*

Melolontha farinosa. Herbit. Arch. tab. 25. f. 3.

Panz. Fa. Germ. 28. tab. 19.

Habitat in Germania. D. Prof. Helwig.

~~III. 19. 11/10~~

107. *M. glabra*, atra, elytris basi maculaque media *pygmaea*
pallidis. Ent. syst. suppl. 133. 81. *

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

108. *M. subrotunda*, pubescens, obscure ferruginea, *chrysome-*
antennis pedibusque testaceis. Ent. syst. 2. *lin.*
175. 82.

~~*Scapharatus chrysomeleides*. Schrank. Ent. 16.~~
25.

Panz. Fa. Germ. 34. tab. 11.

Habitat in Austria. D. Prof. Helwig.

109. *M. supra nigro-*, subtus albo-hirta, clypeo *capicola*
bifido.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. D. Daldorff.

Statura et magnitudo omnino *M. argenteae*. Ca-
pitis clypeus porrectus, bifidus. Corpus supra
nigrum, pilis nigris, subtus pilis albis densissi-
mis hirtum.

110. *M. nigro-stesa*, nitida, elytris brunneis: mar- *cinata*.
gine nigro. Ent. syst. 2. 175. 83. *

Melolontha marginata. Oliv. Inf. 1. 5. 70. 96.
tab. 3. fig. 23.

Habitat in Insula Guadeloupe. Mus. D. Olivier.

111. *M. clypeo porrecto subreflexo*, hirta, nigra, *probosci-*
elytris testaceis: margine nigro. Ent. syst. 2. *da.*
175. 84. *

~~Oliv. Inf. 1. 5. 99. 81. tab. 3. fig. 96.~~

Habitat in India, in Africae floribus. D. Prof. Vahl.

spiripes.

112. *M. nigra*, immaculata, pedibus posticis elongatis, femoribus basi unispinosis. Ent. syst. 2. 176. 85. *

Oliv. Inf. 1. 5. 72. 100. tab. 6. fig. 63.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

denticipes.

113. *M. nigra*, elytris testaceis, clypeo quadridentato, femoribus tibiisque posticis spinosis. Ent. syst. 2. 176. 86. *

Oliv. Inf. 1. 5. 73. 102. tab. 6. fig. 66.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

podagrica.

114. *M. nigra*, clypeo tridentato, femoribus tibiisque posticis dentatis. Ent. syst. 2. 176. 87. *

Oliv. Inf. 1. 5. 75. 104. tab. 5. fig. 51.

Habitat in Coromandel. Mus. D. Banks.

arbitrica.

115. *M. nigra*, elytris griseis, clypeo tridentato, femoribus tibiisque posticis incrassatis, subimembris. Ent. syst. 2. 176. 88. *

Oliv. Inf. 1. 5. 75. 104. tab. 5. fig. 44.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

gonnyra.

116. *M. grisea*, pedibus rufis: femoribus posticis incrassatis muticis. Ent. syst. 2. 177. 89. *

Oliv. Inf. 1. 5. 64. 103. tab. 6. fig. 68.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

crassipes.

117. *M. atra*, albo-maculata, pedibus elongatis crassissimis. Ent. syst. 2. 177. 90. *

Oliv. Inf. 1. 5. 72. 99. tab. 5. fig. 13.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

calcarata.

118. *M. nigra*, elytris flavis: fascia atra, femoribus tibiisque posticis spinosis rufis. Ent. syst. suppl. 133. 89. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lund.

119. *M.*

119. *M. atra, albo-irrorata, femoribus posticis elongatis crassissimis, apice spinosis, tibiis unidentatis.* Ent. syst. 2. 177. 91. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lee.

120. *M. thorace nigro: margine albo, elytris testaceis.* Ent. syst. 2. 178. 92. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lee.

121. *M. corpore polline virescenti-argenteo, elytris pedibusque testaceis.* Ent. syst. 2. 178. 93. *

Oliv. Inf. 1. 5. 69. 49. tab. 7. fig. 78.

Panz. Fn. Germ. 28. tab. 20.

Herbst. Arch. tab. 25. fig. 7.

Sulz. Hist. Inf. tab. 1. fig. 7.

Habitat in Germania.

argentea Panz.

no. 14. 11.

113

122. *M. hirta, atra, clypeo reflexo.* Ent. syst. 2. 178. 94. *

Habitat in Barbaria. Mus. D. Desfontaines.

123. *M. clypeo reflexo integro, corpore glabro nigro.* Ent. syst. 2. 178. 95. *

Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

124. *M. flauescens, pedibus rufis, thorace subspinoso.* Ent. syst. 2. 178. 96. *

Melolontha elongata. Herbst. Arch. tab. 26. f. 3.

Oliv. Inf. 1. 5. 70. 97. tab. 7. fig. 73.

Habitat in Americae meridionalis Insulis.

125. *M. capite thoraceque atris, elytris villosis pedibusque testaceis, abdomine breui retuso.* Ent. syst. 2. 178. 97. *

Oliv. Inf. 1. 5. 76. 106. tab. 7. fig. 79.

Habitat - - Mus. D. Banks.

cap. bon. spei

126. *M. villosa, nigra, clypeo tridentato, elytris abbreviatis breuiatis testaceis.* Ent. syst. 2. 178. 98. *

Oliv.

Oliv. Inf. 1. 5. 75. 105. tab. 5. fig. 54.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

minuta.

127. *M. nigra*, elytris griseis, pedibus testaceis, femoribus posticis acute dentatis. Ent. syst. 2. 179. 99. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lee.

mutabilis.

128. *M. atra*, tomento cinereo villosa. Ent. syst. 2. 179. 100. *

Oliv. Inf. 1. 5. 61. 69. tab. 3. fig. 24.

Voet. Col. tab. 9. fig. 75.

Habitat Tranquebariae. Dr. Koenig.

variabilis.

129. *M. nigricans*, elytris cinereo-nitentibus, antennis pedibusque testaceis. Ent. syst. 2. 180. 101. *

Geoff. Inf. 1. 74. 25.

Laichart. 1. 31. 4.

Fyssl. Helvet. 35.

Harrer tab. 21. fig. 24.

Oliv. Inf. 1. 5. 52. 70. tab. 21. fig. 37.

Habitat in Germaniae et Americae ligno patrescente.

Varietas Americana tomento aureo tuta.

versicolor.

130. *M. obscure aenea*, elytris tomento cinereo nitidulis. Ent. syst. 2. 180. 102. *

Oliv. Inf. 1. 5. 51. 68. tab. 9. fig. 105.

Habitat in Sierra Leon Africae. Mus. D. Banks.

splendidula

131. *M. viridi-aenea*, rufo-micans, elytris striatis obscurioribus: basi macula ferruginea.

Habitat in Sumatra. D. Daldorf. Mus. D. de Sehestedt.

Statua et magnitudo *M. variabilis*. Antennae nigrae. Caput et thorax laevis, viridia, rufoparum micantia. Elytra striata, obscuriora, magis

gis rufò - micantia maculaque distincta, baseos rufa. Corpus obscurum, abdomine subtus rufo.

132. *M. rufa*, elytris obscuris auro - cyaneoque micantibus. *micans.*

Habitat in Amboina. D. Billardiere.

Statura omnino praecedentium. Caput et thorax rufa, immaculata. Elytra striata, cyaneo auroque micantia. Corpus ferrugineum.

133. *M. glabra*, ferruginea, elytris striatis. Ent. syst. *picea.*
2. 180. 103.

Oliv. Inf. 1. 5. 47. 61. tab. 5. fig. 43.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

134. *M. gibba*, nigra, thoracis macula laterali elytrorumque disco ferrugineo. *discoidea.*

Habitat in Guinea. D. Meier. Mus. D. de Sehestedt.

Statura et magnitudo *M. piceae*. Caput nigrum, minime nitidum, antennis ferrugineis. Thorax niger, macula magna, laterali, ferruginea: puncto paruo, nigro. Elytra vix striata, nigra, disco vel potius vitta lata ferruginea, quae apicem haud attingit. Corpus gibbum, nigrum.

135. *M. clypeo subreflexo*, flavescens, elytris ferrugineis, fusco - subfasciatis. Ent. syst. 2. 181. 104. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lee.

136. *M. obscure virescens*, elytris lineis duabus rufis. Ent. syst. 2. 181. 105. *

Oliv. Inf. 1. 5. 49. 66. tab. 6. fig. 68.

Habitat in Sierra Leon Africae. Mus. D. Banks.

137. *M. gibba*, testacea, tomento cinerascens, nitidula. Ent. syst. 2. 181. 106. *

Oliv. Inf. 1. 5. 50. 67. tab. 6. fig. 67.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

137. M.

- monticola*. 138. *M. clypeo integro, reflexo, glabra, testacea capite atro.* Ent. syst. 2. 181. 107. *
Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.
- bumeralis*. 139. *M. atra, elytris basi punctoque medio pallidis*
Ent. syst. 2. 181. 108.
Oliv. Inf. 1. 5. 53. 72. tab. 3. fig. 26.
Panz. Fn. Germ. 34. tab. 10.
Habitat in Europa. Mus. D. Tunstall.
- versus*. 140. *M. hirsutissima, atra, pedibus quatuor antice testaceis.* Ent. syst. 2. 182. 9. *
Oliv. Inf. 1. 5. 58. 79. tab. 8. fig. 88.
Wulf. Insect. Capens. tab. 2. fig. 19.
Voet. Col. tab. 9. fig. 74.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks,
Variat pedibus omnibus nigris.
- bombyli-*
formis. 141. *M. hirsutissima, atra, elytris testaceis.*
Melolontha bombyliformis. Pall. Icon. tab. A.
fig. 17.
Habitat in Sibiria. Mus. D. Lund.
Statura omnino et summa affinitas *M. versus*. Dif-
fert tamen elytris glabris, testaceis. Pedes
omnes nigri.
- Lynx*. 142. *M. hirta, nigra, elytrorum margine aureo.* Ent.
syst. 2. 182. 110. *
Oliv. Inf. 1. 5. 58. 80. tab. 9. fig. 101.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lee.
- crinita*. 143. *M. hirta, supra viridis, subtus nigra.* Ent. syst.
2. 182. III.
Scarabaeus longipes Linn. syst. Nat. 2. 555-66.
Mus. Lud. Vlr. 20.
Oliv. Inf. 1. 5. 57. tab. 2. fig. 16.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lee.
- cyanipen-*
nis. 144. *M. cinereo-hirta, elytris cyanis.*
Habitat in Tanger. D. Schousboe. Mus. D. Lund.
Statu-

Statura omnino præcedentium, at distincta videtur. Caput et thorax cinereo-hirta. Elytra glabra, cyanea.

145. *M. hirta*, capite thoraceque viridibus, elytris *hirta*.

fuscis: Ent. syst. 2. 183. 112. *

Scarabæus Alopecius. Pall. Icon. tab. A. f. 15.

Oliv. Inf. 1. 5. 56. 76. tab. 7. fig. 77.

Habitat in Sibiriae Leontodon Taraxaco.

146. *M. aurea*, fulvo-hirta, abdomine ferrugineo. *vulpes*.

Ent. syst. 2. 183. 113. *

Oliv. Inf. 1. 5. 55. tab. 7. fig. 76.

Habitat in Sibiriae Leontodon Taraxaco.

Varietas præcedentis observante D. Boeber.

147. *M. fulva*, hirta, elytris abbreviatis atris, abdomine ferrugineo. Ent. syst. 2. 183. 114. *

Habitat in Barbaria. Mus. D. Desfontaines.

148. *M. pilosa*, nigra, cinereo-hirta, elytris testaceis: lineis tribus apicis albidis. Ent. syst. 2. *Bomby-*

184. 115. * *lius*.

Habitat in Africae plantis. Mus. D. Vahl.

149. *M. pilosa*, cyanea, elytris testaceis: lineis tri-

bus albicantibus. Ent. syst. 2. 184. 116. * *vittata*.

Scarabæus acuminatus. Lepech. Itin. 1. 508.

tab. fig. 9.

Scarabæus oxypterus. Pall. Itin. 1. 462. 26.

Oliv. Inf. 1. 5. 55. 74. tab. 8. fig. 94.

Pall. Icon. 1. 14. tab. A. fig. 14.

Degeer. Inf. 7. 644. 40. tab. 48. fig. 8.

Petiv. Gazoph. tab. 2. fig. 12.

Voet. Scarab. tab. 5. fig. 35.

Habitat in India.

128. BUPRESTIS. *Palpi filiformes: articulo ultimo obtuso, truncato.*

Maxilla obtusa, unidentata.

Ligula cylindrica, acuminata.

Antennae ferratae.

unidentata 1. *B. elytris unidentatis aeneis: margine aureo.* Ent. syst. 2. 185. 1. *

Buprestis unidentata. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 8. fig. 86.

Habitat - - Mus. D. Banks.

bicolor.
barbara 2. *B. elytris acuminatis viridi-aeneis: macula flava, pectore abdomineque flavis.* Ent. syst. 2. 185. 2. *

Buprestis bicolor. Oliv. Inf. 2. 32.

Habitat in America. D. Drury.

dentata. 3. *B. elytris acuminatis obscuris, corpore aeneo-nitido, ano quadridentato.* Ent. syst. 2. 186. 3. *

Habitat - - Mus. D. Banks.

vittata. 4. *B. elytris acuminatis punctato-striatis obscuris: vittis duabus flavis.*

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. de Sehestedt.

Parua. Caput nigrum, punctis quatuor parvis obscure

Buprestis corpus oblongum, depressiusculum, rarius cylindricum, immarginatum, tardum; capite rotundato, inserto, obtuso; oculis magnis, oblongis, vix prominulis, marginalibus; antennis ferratis, approximatis, thorace brevioribus, subter oculos insertis; thorace transverso, saepius fuscato; elytris rigidis, fornicatis: margine saepius dentato, longitudine abdominis; scutello parvo, rotundato; pedibus brevibus, validis; tarsis quinqueartulatis; colore vario.

obscuræ flavescentibus. Thorax punctatus; punctis aliquot lineolaque marginali baseos obscuræ flavis. Elytra striata: striis punctatis obscuræ, vittis duabus tenuibus, apicem haud attingentibus, flavis, apice valde acuminata. Corpus cyaneum, abdominis margine partim flavicante.

6. B. elytris acuminatis, nigra, glabra, ano bidentata. ~~regalis~~
to. Ent. syst. suppl. 134. 3. * *nigrita*
Habitat in Tanger. D. Schousboe. Mus. D. Lund.

7. B. elytris bidentatis rugosis, thorace laevi, cor- *gigantea*.
pore insurato. Ent. syst. 2. 186. 4. *

Linn. syst. Nat. 2. 659. 1. Mus. Lud. Vlr. 85.

Oliv. Inf. 2. 32. tab. 1. fig. 1.

Degeer. Inf. 4. 134. 1.

Grew. Mus. 165. tab. 13.

Sloan. Jam. 2. tab. 236. fig. 1. 2.

Petiv. Gazoph. 147. fig. 16. 17.

Sulz. Inf. tab. 6. fig. 38.

Menon Surin. tab. 30. fig. inf.

Seb. Mus. 3. tab. 48. fig. 12.

Herbst. Arch. tab. 28. fig. 1.

Habitat in America et Asia.

Varietas in Mus. D. Lund. thorace nigro-bimaculato et elytris ferratis apice bidentatis, vix distincta.

7. B. elytris bidentatis punctatis: lineis quatuor *vittata*.
elevationis viridi-aeneis vittaque lata aurea. Ent.
syst. 2. 186. 5. *

Buprestis vittata. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 3. f. 17.

Sulz. Hist. Inf. tab. 4. fig. 14.

Habitat in India. Mus. D. Banks.

8. B. elytris bidentatis, punctato-striatis viridibus: *fastuosa*.
dorso aureo. Ent. syst. 2. 187. 6.

Oliv.

- Oliv. Inf. 2. 32. tab. 8. fig. 81.
 Habitat in America septentrionali. Mus. D. Banks.
- regalis.* 9. *B. elytris bidentatis fuscis: fasciis duabus flavo-
 xueis lineolisque duabus remotis viridibus.*
 Ent. syst. 2. 187. 7. *
 Habitat in Cayenna. Mus. D. Geoffroy.
- collaris.* 10. *B. elytris bidentatis viridi-aureis, thorace fusco
 nitido: strigis duabus aureis, sterno cupreo.*
 Ent. syst. 2. 187. 8. *
 Oliv. Inf. 2. 32. tab. 2. fig. 9.
 Habitat in Cayenna. Mus. D. Olivier.
- attenuata.* 11. *B. elytris bidentatis attenuatis striatis, viridi
 aenea: sutura cuprea.* Ent. syst. 2. 187. 9.
 Habitat in Rio Janeiro. Mus. D. Banks.
- punctatissima.* 12. *B. elytris bidentatis cupreis: punctis numerosis
 violaceis.* Ent. syst. 2. 188. 10. *
Buprestis punctatissima. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 7.
 fig. 76.
 Habitat in Sierra Leon Africae. Mus. D. Banks.
- rufipes.* 13. *B. elytris striatis cyaneis: maculis quatuor flavis,
 corpore viridi-aeneo-nitido.* Ent. syst. 2.
 188. 11. *
Buprestis rufipes. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 7. f. 73.
 Petiv. Gazoph. tab. 2. fig. 2.
 Habitat in Marylandia. Mus. Britan.
- Berolinensis.* 14. *B. elytris bidentatis, viridi nigroque variis, antennis
 tridentato.* Ent. syst. 2. 188. 12. *
Buprestis Berolinensis. Herbit. Arch. tab. 28.
 fig. 5.
 172. 16. Schaeff. Icon. tab. 53. fig. 7.
 Habitat in Germania.
- calcarata.* 15. *B. elytris bidentatis aeneis: punctis elegantibus
 atris, sibiis intermediiis dentatis.*

Habi-

Habitat in Austria. D. Scheidler.

Summa affinitas B. Berolinensis, cuius forte varietas sexus. Corpus supra punctatum æneum, elytris punctis elevatis, atria, scabris, sulcus cupreum, tibiis intermediis, dente valido armatis.

16. B. elytris bidentatis striatis, fusca, subtus cuprea; albo-irrorata. *B. aenea* Linn. *carniolica.*

Buprestis subrugosa: Payk. Fn. Sv: 2. 218. 5.

Habitat in Austria. D. de Meyere.

Statura et magnitudo B. Berolinensis. Caput et thorax punctata, obscura, cupro parum nitidula. Elytra striata, obscura, apice bidentata. Corpus et pedes cuprea, nitida, punctis albis numerosissimis irrorata.

17. B. elytris bidentatis, aenea, nitidissima, elytris apice abdomineque aureis. Ent. syst. 2. 183. *corrusca.*
13. *

Buprestis corrusca. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 9. f. 99.

Buprestis tereticollis. Pall. Icon. tab. D. fig. 18.

Habitat in Iamaica. Mus. D. Banks.

18. B. elytris bidentatis striatis aeneis coeruleo-micantibus: margine aureo. Ent. syst. 2. 183. *micans.*
14. *

Habitat in Italia, D. de Slanbusch; Hafniae. Mus. D. Lund.

19. B. elytris truncatis, bidentatis, viridibus: vittis coerulescente marginibusque aureis. Ent. syst. 2. 183: 15. *decora.*

Buprestis decorata. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 8. f. 82.

Habitat in America. Mus. D. Banks.

20. B. elytris bidentatis, sulcatis, viridibus, auro variegatis. *regis.*

Bupre-

Buprestis equestris. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 9. f. 10
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. M.
 D. Lund.

Statura omnino *B. funestae*. Caput punctatum viridi-aeneum. Thorax viridis, nitidus: punctis impressis aureis. Maculae praeterea tres basales impressae: intermedia maiore. Elytra bidentata, sulcata viridi auroque variegata. Corpus aureum, tarsis cyaneis.

funesta.

21. *B. elytris bidentatis*, obscura aenea, thorax punctato, cupreo, nitido, elytris striatis. Ent. syst. 2. 189. 16. *

Habitat in Guinea. D. Isert.

variolosa.

22. *B. elytris bidentatis*, punctata aenea, nitida, tarsis cyaneis.

Habitat in Insula Trinidad. Dr. Pflug. Mus. D. de Sehestedt.

Magnitudo et statura *B. funestae*. Caput retusum viridi-aeneum, nitidum. Thorax punctatus viridi-aeneus, nitidus. Elytra apice bidentata viridi-aenea, nitida, punctis variolosis, impressis. Corpus aeneum, nitidum, tarsis cyaneis.

umbrosa.

23. *B. elytris bidentatis*, striatis, nigro-aeneis vitta marginali nitidior. Ent. syst. 2. 189. 17. *

Habitat in Guinea. D. Isert.

lurida.

24. *B. elytris bidentatis*, obscura, ano tridentato. Ent. syst. 2. 190. 18.

Oliv. Inf. 2. 32. tab. 8. fig. 83.

Habitat in America boreali. Mus. D. Banks.

obscura.

25. *B. elytris bidentatis*, obscura aenea: punctis elevatis obscurioribus. Ent. syst. 2. 190. 19.

Habitat in America boreali. Mus. D. Blackburn.

26. B.

B. elytris bidentatis, aeneo-nigra, thorace punctato, elytris striatis. Ent. syst. suppl. 134. 20. * *melanobolice*.
Habitat in India. Mus. D. de Sehestedt.

B. elytris subbidentatis, striatis, aenea, capite abdomineque testaceo-maculatis. Ent. syst. 2. 190. 20. * *punctata*.

Buprestis punctata. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 10. fig. 114.

Habitat in Barbaria. D. Prof. Vahl.

B. elytris bidentatis, striatis, viridibus: maculis sex testaceis. *maculata*.

Habitat in Iaua. D. Billardiere.

Media. Caput punctatum, canaliculatum, viridi-aeneum, nitidum, antennis nigris. Thorax puncto vtrinque impresso, punctatus, nitidus. Elytra viridia, obscuriora, striata, apice bidentata, maculis sex testaceis, 2 interiore maiore, antice lunata, exteriori marginali, 2 exteriori marginali, 1 transuersa, flexuosa, 1 marginali, lineari.

B. elytris bidentatis, striatis, nigris: punctis numerosis impressis albis. Ent. syst. 2. 190. 21. * *morbillosa*.

Buprestis morbillosa. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 8. fig. 84.

Habitat in America meridionali. Mus. D. Banks.

B. elytris bidentatis, viridibus: maculis numerosis, aureis, impressis, pedibus cyaneis. Ent. syst. 2. 191. 22. * *aurifera*.

Buprestis aurifer. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 9. f. 95.
Habitat in Cayenna. Mus. D. Olivier.

B. elytris bidentatis, viridi-aeneis, apice cyaneis: fasciis duabus ferrugineis. Ent. syst. 2. 191. 23. * *fasciata*.

Bupre-

- Buprestis fasciata*. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 9. f. 9a.
Habitat in America boreali. Mus. Dr. Hunter.
- lucidula*. 32. B. elytris bidentatis, aenea nitidissima: vittis abbreviata abdomineque fulvo aeneis. Ent. syst. 2. 191. 24. *
Habitat Surinami. Mus. D. Bosc.
- rauca*. 33. B. elytris bidentatis, substriatis, corpore obscuro aeneo, immaculato. Ent. syst. 2. 191. 25. *
Habitat in Barbaria. D. Prof. Vahl.
- striata*. 34. B. elytris truncatis, subbidentatis, cupreis: foveis eleuatis quatuor. Ent. syst. 2. 191. 26. *
Buprestis striata. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 7. f. 77.
Habitat in Pensylvania. Mus. D. Banks.
- rutilans*. 35. B. elytris tridentatis ferratisque viridibus, nigro-maculatis: margine aureo. Ent. syst. 2. 191. 27. *
Buprestis rutilans. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 5. f. 45.
Buprestis fastuosa. Jacqu. Miscell. 2. tab. 23. f. 2.
Schaeff. Icon. tab. 35. fig. 6.
Pall. Icon. tab. D. fig. 12.
Habitat in Austria. Dr. Schulz.
- ignita*. 36. B. elytris tridentatis, thorace impresso, corpore inaurato. Ent. syst. 192. 28. *
Buprestis ignita. Linn. syst. Nat. 2. 669. 3.
Oliv. Inf. 2. 32. tab. 4. fig. 33.
Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 14.
Petiv. Gazoph. tab. 26. fig. 8.
Paempf. Japonens. 1. tab. 10. fig. 7.
Habitat in India orientali.
- lineata*. 37. B. elytris truncatis, subtridentatis, nigro-aeneis vittis duabus fulvis. Ent. syst. 2. 192. 29. *
Buprestis lineata. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 8. f. 8a.
Habitat in America. Mus. D. Banks.

38. *B. viridi-nitens*, elytris tridentatis: maculis ocellata.
duabus aureis ocellarique flava. Ent. syst. 2.

193. 30. *

Buprestis ocellata, Oliv. Inf. 2. 32. tab. 1. fig. 3.

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 15.

Degeer Inf. 7. 633. 30. tab. 47. fig. 12.

Habitat in India orientali.

39. *B. elytris tridentatis*, corpore aeneo immacu- aenea.
lato. Ent. syst. 2. 193. 31. *

Buprestis tricuspidata, Oliv. Inf. 2. 32. tab. 8.
fig. 87.

Habitat in Coromandel. Mus. D. Banks.

40. *B. elytris tridentatis* cyaneis flavo- maculata.
maculatis. Ent. syst. 2. 193. 32. *

Buprestis maculata, Oliv. Inf. 2. 32. t. 6. f. 61.
t. 10. f. 61.

Habitat in Sibiria. Mus. D. Banks.

41. *B. elytris truncatis*, dentatis, striatis nigris: ma- flavoma-
culis quatuor flavis. Ent. syst. 2. 193. 33. * culata.

Buprestis flavomaculata, Degeer Inf. 4. 129.
I. 2.

Herbst. Arch. tab. 28. fig. 8.

Payk. Fn. Sv. 2. 213. 1.

Habitat in Suecia. D. de Paykull.

42. *B. elytris subtridentatis* nigris: lineis tribus interrupta
baseos unicaque apicis interrupta impressis al-
bis. Ent. syst. 2. 194. 34. *

Buprestis interrupta, Oliv. Inf. 2. 32. tab. 4.
fig. 28.

Habitat in Senegallia. Mus. D. Olivier.

43. *B. elytris ferrato-tridentatis*: punctis cinereis sternicor-
impressis, sterno porrecto conico. Ent. syst. 2. nis.
194. 35. *

N

Bu-

Buprestis sternicornis. Linn. syst. Nat. 2. 660. 5.
Muf. Lud. Vlr. 88.

Oliv. Inf. 2. 32. tab. 6. fig. 52.

Herbst Arch. tab. 46. fig. 2.

Grew Muf. 167. tab. 13.

Habitat in India orientali.

Variat punctis elytrorum consolidatis, excepto puncto latiori baseos.

Cbrysis.

44. *B. elytris ferrato-tridentatis castaneis, sterno conico porrecto*. Ent. syst. 2. 194. 36. *

Buprestis sternicornis. Linn. syst. Nat. 2. 660.
5. β. Muf. Lud. Vlr. 88. β.

Buprestis Cbrysis. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 2. f. 8.

Degeer Inf. 4. 136. 2. tab. 17. fig. 25.

Herbst. Arch. tab. 28. fig. 2.

Habitat in India orientali.

castanea.

45. *B. elytris ferrato-tridentatis, castaneis: puncto baseos ferrugineo impresso, thorace atro, ferrugineo-reticulato*. Ent. syst. 2. 195. 37. *

Buprestis castanea. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 2. fig. 3. b.

Habitat in Senegallia. Muf. D. Banks. 3

violacea.

46. *B. elytris truncato-quadridentatis, violaceis, corpore elongato cyaneo*. Ent. syst. 2. 195. 38. *

Habitat in Sierra Leon Africae. Dr. Pflug.

equestris.

47. *B. elytris ferratis cyaneis: fascia postica testacea*. Ent. syst. 2. 195. 39. *

Oliv. Inf. 2. 32. tab. 10. fig. 109.

Habitat in Brasilia. Muf. D. Lee.

depressa.

48. *B. elytris ferratis sulcatis, corpore depresso obscuro*. Ent. syst. 2. 195. 40. *

Habitat in Oriente. D. Prof. Forstkahl.

49. B.

19. *B. elytris ferratis, longitudinaliter rugosis: maculiculis duabus impressis, thorace sulcato. Ent. sylv. 2. 195. 41. **

Buprestis mariana. Linn. syst. Nat. 2, 660. 6.

Fn. Sv. 754. Mus. Lud. Vlr. 89.

Oliv. Inf. 2. 32. tab. 1. fig. 4.

Herbst. Arch. tab. 28. fig. 4.

Drury Inf. 1. tab. 30. fig. 3.

Schaeff. Icon. tab. 49. fig. 1.

tab. 128. fig. 3.

Pl. IV. 12

Payk. Fn. Sv. 2. 220. 7.

Habitat in Europa boreali.

20. *B. elytris ferratis viridibus: sulco abbreviato futurali impressa. Mant. Inf. 1. 178. 28. **

Ent. syst. 2. 196. 42. *

Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

21. *B. elytris ferratis, viridibus punctatis, thorace aeneo: sulco maculisque aureis impressis. Ent. sylv. 2. 196. 43. **

syst. 2. 196. 43. *

Buprestis ventricosa. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 6. fig. 63.

Habitat in Madagafcar. Mus. D. Banks.

22. *B. elytris ferratis, viridi-aenea, thorace vtrinque macula impressa aurea. Ent. sylv. 2. 196. 44. **

44. *

Buprestis smaragdula. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 1. fig. 2.

Habitat in India orientali. Mus. D. Olivier.

23. *B. elytris ferratis, aenea nitidissima, elytris apice aureis. Ent. sylv. 2. 196. 45. **

45. * *Ind. orient.*

Habitat in Indiis. Mus. D. Zschuck.

24. *B. elytris ferratis viridi-aenea: sutura cyanea apice aureis. futuralis.*

Habitat in India.

Statara et magnitudo omnino praecedentis, omnino distincta. Caput retusum, aeneum. Thorax aeneus, medio canaliculatus lateribusque depressis. Elytra punctato-friata, viridi apice quinquedentata, aurea suturaeque cyaneae. Corpus aeneum, nitidum, ano concolore.

cyanipes. 55. B. elytris ferratis friatis, viridi-aeneis, thorace plano coeruleo. Ent. syst. 2. 196. 46.

Buprestis cyanipes. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 7. fig. 104.

Habitat in America meridionali. Mus. Dr. Hunter.

modesta. 56. B. elytris ferratis, corpore obscurioribus: maculis tribus impressis aureis. Ent. syst. 2. 197. 47. *

Buprestis modesta. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 7. f. 72. Habitat in Brasilia. Mus. D. Banks.

blanda. 57. B. elytris ferratis, attenuatis, fulcatis, viridi-aeneis, fulcibus cupreis. Ent. syst. 2. 197. 48. *

Buprestis blanda. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 9. f. 94. Habitat in America meridionali. Mus. Dr. Hunter.

aurata. 58. B. elytris ferratis, aurea, thorace aeneo. Ent. syst. 2. 197. 49. *

Buprestis aurata. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 9. f. 93. Habitat in America. Mus. Dr. Hunter.

testacea. 59. B. elongata, elytris ferratis, friatis testaceis punctis duobus fuscis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Statara valde elongata, magnitudine praecedentis. Caput fuscum, subretusum. Thorax laevis, testaceus, maculis duabus approximatis dorsalibus nigris. Elytra ferrata, striata, testacea, punctis duobus remotis, fuscis. Pectus testa-

testaceum. Abdomen atro-cyanenum, nitidum, segmentis abdominis testaceis. Pedes atrii.

60. *B. elytris ferratis viridi-aenea*, thorace vittis *fulgida*. duabus, elytris vnica rufo-cupreis. Ent. fyft.

2. 197. 50. *

Buprestis fulgida. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 11, fig. 124. *Linea, Costula*

Habitat in India orientali. Mus. D. Geoffroy.

61. *B. elytris acute ferratis*, aenea, nitida, elytris *cyaniceps*. vitta aurea.

Habitat in Sumatra. D. Daldorff.

Maior. Antennae cyanae, apice nigrae. Caput cyaneum, valde canaliculatum, canali viridi. Thorax punctatus, canaliculatus, viridi-aeneus. Elytra valde et acute ferrata, punctato-substriata, viridi-aenea: vitta media lata, aurea. Corpus aeneum, fuluo-puluerulentum.

62. *B. elytris ferratis striatis cupreis: punctis tri-* *3punctata*. *bus impressis aurcis*. Ent. fyft. 2. 198. 51. *

Buprestis 3punctata. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 2. fig. 16.

Habitat in America meridionali. Mus. Dr. Hunter.

63. *B. elytris ferratis*, aenea, nitida, thorace lineis *elegans*. duabus elytrorumque vnica aureis. Ent. fyft.

2. 198. 52. *

Buprestis elegans. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 8. f. 89.

Habitat ad Cap. Bon. Spel. Mus. D. Banks.

64. *B. elytris ferratis*, nigro-aenea, pubescens, ely- *trifasciata* tris fasciis tribus flavis: anteriore margine di- latata. Ent. fyft. 2. 198. 53. *

Habitat in America meridionali.

65. *B. elytris ferratis*, nigra, fronte puncto vnico, *9maculata* thorace duobus elytris tribus flavis. Ent. fyft.

2. 198. 54. *

Bupre- IV. 17.

- Buprestis maculata*. Linn. syst. Nat. 2. 662. 17.
 Oliv. Inf. 2. 32. tab. 4. fig. 30.
 Panz. Naturf. 24. 33. 47. tab. 1. fig. 48.
 Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 17.
 Habitat in Europa australi. Mus. D. Zschuck.
- porcata*. 66. *B. elytris ferratis porcatas*, thorace angulato,
 corpore fusco nitido. Ent. syst. 2. 199. 55. *
Buprestis depressa. Linn. Mant. 2. 583.
 Oliv. Inf. 2. 32. tab. 2. fig. 15.
 Habitat in Oriente. D. Prof. Forskahl.
- dorsata*. 68. *B. elytris ferratis*, obscure aenea, ano bidentato,
 femoribus anticis incrassatis videntatis.
 Ent. syst. 2. 199. 56. *
 Habitat in America meridionali.
 Femora antica valde incrassata, acute videntata.
- corysto-*
stigma. 69. *B. elytris ferratis*, longitudinaliter sulcatis: maculis
 duabus aureis impressis, thorace punctato. Ent. syst. 2. 199. 57. *
Buprestis corystostigma. Linn. syst. Nat. 2. 660.
 7. Fn. Sv. 755.
 Geoff. Inf. 1. 125. 1. *Get. Juleka part.*
 Degeer Inf. 4. 129. 3. *ad. B. afflu.*
 Oliv. Inf. 2. 32. tab. 6. fig. 54.
 Herbst. Arch. tab. 28. fig. 6.
 Schaeff. Elem. tab. 31. fig. 1. 2.
 Sulz. Inf. tab. 6. fig. 39.
 Payk. Fn. Sv. 2. 221. 8.
 Habitat in Europae nemoribus.
- impressa*. 70. *B. elytris ferratis*, laevibus, aeneis: punctis tribus
 impressis, Ent. syst. 2. 200. 58.
Buprestis impressa. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 5.
 fig. 42.
 Habitat in India. Mus. D. Bernoulli.

71. *B. elytris subferratis*, laevibus, nigris: punctis *affinis*.
tribus impressis aureis. Ent. syst. 4. App. 449.
58. *
- Habitat in Germania. D. Schneider.
72. *B. elytris ferratis nigris*: maculis sex viridibus, *frontalis*.
fronte impressa. Ent. syst. 2. 200. 59. *
- Buprestis frontalis*. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 5. f. 44.
Habitat in Carolina australiori. Mus. D. d'Orcy.
73. *B. elytris ferratis*, obscuris, albo-maculatis. *ornata*.
Ent. syst. 2. 200. 60. *
- Buprestis ornata*. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 7. f. 67.
Habitat in Pennsylvania. Mus. D. Banks.
74. *B. elytris ferratis*, supra nigricans, thorace lineis *spunctata*.
tribus, elytris punctis quatuor impressis viri-
dibus.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.
Magnitudo *B. ferratae*. Caput canaliculatum, ob-
scurum. Thorax niger, lineis tribus impressis,
viridibus. Elytra ferrata, laevia, nigra, pun-
ctis quatuor impressis, 1. 1. 2. Corpus aeneum,
tarsis cyaneis.
75. *B. elytris ferratis*, aenea, fronte tuberculo trans-*ferrata*.
verso eleuato, abdomine ferrato. Ent. syst. 2.
200. 61. *
- Habitat in Guinea. D. Isert.
76. *B. elytris ferratis*, cinereo-villosa, elytris ni-*taeniata*.
gris: fasciis duabus ferrugineis. Ent. syst. 2.
201. 62. *
- Buprestis blanda*. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 5. fig.
41. 49. 14. 13.
VIII-16.
- Roff. Fn, Etr. 1. 191. 474.
Pill. It. Pof. Sci. 84. tab. 7. fig. 12.
Habitat in Hyperici floribus Europae australioris.
77. B.

- elongata.* 77. *B. elytris ferratis, virescentibus, corpore elongato cupreo.* Ent. syst. 2. 201. 63. *
Buprestis elongata. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 9. fig. 102.
 Habitat in Barbaria. Mus. D. Olivier.
- pulcra.* 78. *B. elytris ferratis: fasciis tribus sanguineis abbreviatis, corpore atro.* Ent. syst. 2. 201. 64. *
 Habitat in Marocco. Mus. D. de Sehestedt.
- gibbosa.* 79. *B. elytris ferratis, striatis, basi gibbis, viridi-aenea, thorace canaliculato.* Ent. syst. 2. 201. 65. *
Buprestis gibbosa. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 6. f. 59.
 Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.
- nobilis.* 80. *B. elytris ferratis, viridi-aenea, capite thoraceque fusco-maculatis, elytris atris: fasciis tribus lineolaque apicis viridibus.* Ent. syst. 2. 202. 66. *
Buprestis nobilis. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 5. f. 43.
 Habitat in Cayenna. D. v. Rohr.
- cylindrica.* 81. *B. elytris ferratis, striatis, thorace villoso, corpore cylindrico nigro.* Ent. syst. 2. 202. 67. *
 Habitat in Oriente. D. Prof. Forstkahl.
- voluulus.* 82. *B. elytris ferratis, flavo-maculatis, thorace inaequali, villoso, corpore cylindrico, villoso.* Ent. syst. 2. 202. 68. *
 Habitat in Americae meridionalis Insulis.
- tubulus.* 83. *B. elytris ferratis, crenato-striatis, flavo-maculatis, thorace punctato, corpore cylindrico nigro.*
 Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.
 Statura omnino *B. voluuli*, at duplo minor. Caput et thorax punctata, nigra, immaculata. Elytra glabra, crenato-striata, nigra: punctis

ctis flauis 2. 2. 1. transuerso, maiori 1. Corpus atrum.

84. *B. elytris integris, fronte fulcata, corpore sca-scabra.*
bro-aureo. Ent. syst. 2. 202. 69. *

Buprestis scabra. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 3. f. 25.

Habitat in India. Dr. Mallet.

85. *B. elytris integris, eleuato-striatis fuscis: punctis quinque flauis.* Ent. syst. 2. 203. 71. *

Panz. Fn. Germ. 29. tab. 18. 19.

Habitat in Austria. D. Saldoner.

Variat punctis adhuc duobus ad basin elytrorum.

86. *B. elytris integris: maculis quatuor albis, corpore coeruleo.* Ent. syst. 2. 203. 72.

Buprestis sguttata. Linn. syst. Nat. 2. 659. 2.

Fn. Sv. 753.

Oliv. Inf. 2. 32. tab. 4. fig. 36.

Geoff. Inf. 1. 126. 2.

Degeer Inf. 4. 132. 5. tab. 4. fig. 20.

Herbst Arch. tab. 28. fig. 7.

Schaeff. Icon. tab. 204. fig. 4.

Payk. Fn. Sv. 2. 215. 2.

Habitat in Europae nemoribus.

87. *B. elytris integris, obscure cuprea, elytris fulciscis quatuor albo-villosis.* *Andreas.*

Oliv. Inf. 2. 32. tab. 1. fig. 6.

Habitat in Persia. Mus. D. Bosc.

Magna. Caput et thorax scabra, obscura, hinc inde cupreo nitidula. Elytra variolosa, et praeterea fulcis quatuor albo-villosis, quorum secunda nec basin nec apicem attingit. Corpus viride, minime nitens.

88. *B. elytris integris striatis: punctis fasciculato-pilosis, corpore hirsuto inaurato.* Ent. syst. 2. 203. 73. *vis.*

Bupre-

Buprestis fascicularis. Linn. syst. Nat. 2. 661.

12. Mus. Lud. Vlr. 90.

Oliv. Inf. 2. 32. tab. 4. fig. 38.

Seb. Mus. 2. tab. 20. fig. 5.

Sulz. Inf. tab. 6. fig. 4.

Degeer Inf. 7. tab. 47. fig. 6.

Herbst. Arch. tab. 28. fig. 9.

Wulf. Inf. Cap. tab. 1. fig. 12.

Habitat ad Cap. Bon. Spei.

masipularis. 89. *B. elytris* integris violaceis: strigis duabus e punctis fasciculatis albis. Ent. syst. suppl. 134. 73.

Habitat in Tanager. Mus. D. Lund.

variolaris. 90. *B. elytris* integris obscuris: punctis impressis numerosis, thorace carinato. Ent. syst. 2. 204. 74. *

Buprestis variolaris. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 8. fig. 85.

Pall. Icon. tab. D. fig. 2.

Habitat in Onopordine et Echinope Russiae.

Onopordinis. 91. *B. elytris* integris, obscure aeneis: sulcis albivillofis, thorace scabro. Ent. syst. 2. 204. 75. *

Habitat in Barbariae Onopordine. D. Prof. Vahl.

Varietas paullo maior vix distincta, elytris magis glabris, sulco tantum unico alterone albivilloso in Mus. D. de Sehestedt.

pilosa. 92. *B. elytris* integris, aenea, hirta, pedibus concoloribus. Ent. syst. suppl. 134. 75. *

Habitat in Marocco. Mus. D. Lund.

hirta. 93. *B. elytris* integris, pedibus ferrugineis, corpore hirto. Ent. syst. 2. 204. 76. *

Buprestis hirta. Linn. syst. Nat. 2. 661. 13.

Mus. Lud. Vlr. 91.

Oliv. Inf. 2. 32. tab. 3. fig. 18. 19.

Habitat in Africa, Barbaria.

94. B.

94. *B. elytris integris, supra obscura, thorace vtfim-* *scutellaris.*
que macula bascos aurea, scutello porrecto
subulato.

Buprestis scutellaris. Web. Inf. 72. 1.

Habitat in Sumatra. D. Daldorff.

Affinis videtur *B. canaliculatae*. Antennae ferratae, nigrae. Caput obscure viride. Thorax obscurus, postice vtrinque ante angulum lunula impressa angulo ipso aureo, nitidissimo. Scutellum singulare, elongatum, subulatum. Elytra subpunctata, obscura, lineis quatuor elevatis, ante apicem coeuntibus. Corpus viridi-aeneum.

95. *B. elytris integris aeneis: macula aurea, apice stigma.*
fulcis, scutello elongato triangulari.

Buprestis stigma. Web. Inf. 73. 2.

Habitat in Sumatra. D. Daldorff.

Statura omnino praecedentis, at minor. Caput obscurum orbita oculorum viridi. Thorax punctatus, aeneus, nitidus, lunula vtrinque magna impressa. Scutellum elongatum, subulatum, aeneum. Elytra punctata lineisque quatuor elevatis, ante apicem coeuntibus, basi aenea, in medio macula aurea, nitida, apice obscura. Alae cyanae. Corpus aeneum, nitidum.

96. *B. elytris integris, fulcatis aeneis, capite tho-* *austriaca.*
raceque viridibus. Ent. syst. 2. 204. 77.

Buprestis austriaca. Linn. syst. Nat. 2. 661. 9.

Oliv. Inf. 2. 32. tab. 10. fig. 113.

Habitat in Austria. D. Scopoli.

97. *B. elytris integris atris: vittis duabus impres-* *sibirica.*
fis, cinereo-tomentosis. Ent. syst. 2. 204. 78. *

Oliv. Inf. 2. 32. tab. 8. fig. 79.

Herbst.

Herba Atch. tab. 28. fig. 11.

Habitat in Sibiria. Mus. D. Banks.

imperialis. 98. B. elytris integris, atra, thorace margine elytris fasciis abbreviatis testaceis.

Habitat in noua Hollandia. D. de Meyerle.

Magna. Caput nigrum. Thorax punctatus, subcanaliculatus, ater, margine testaceo. Scutellum vix vllum. Elytra punctato-striata, atra, nitida, fasciis quatuor testaceis, bases interrupta, dentata, secunda firmata, futuram haud attingente, tertia tenuiore abbreviata, quarta breuissima. Margo apicis testaceus. Corpus nigrum, albo-villosum.

Splendens. 99. B. elytris integris viridibus: margine omni aureo lineisque tribus eleuatis. Ent. syst. 2. 205. 79. *

Habitat in China.

fusca. 100. B. elytris integris, obscure fuscis, subtus aenea, abdomine punctis lateralibus fuluis. Ent. syst. 2. 205. 80. *

Buprestis fusca. Oliv. Inf. 4. 32. tab. 8. fig. 88.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

rustica. 101. B. elytris emarginatis striatis, obscure aeneis. Ent. syst. 2. 205. 81. *

Buprestis rustica. Linn. syst. Nat. 2. 660. 8.

Fn. Sv. 756.

Geoff. Inf. 1. 126. 3.

Degeer Inf. 4. 130. 4. tab. 4. fig. 10.

Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 1.

Oliv. Inf. 2. 32. tab. 3. fig. 22.

Payk. Fn. Sv. 2. 216. 3.

Habitat in Europae nemoribus.

canaliculata. 102. B. elytris integris, obscura, abdomine subtus cana-

canaliculato: ano quadridentato. Ent. syst. 2.
205. 82.

Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. D. Banks.

103. B. elytris integris elongato-attenuatis truncatis, aenea, thorace elytrisque reticulato-punctatis. Ent. syst. suppl. 135, 82. * *reticulata.*

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

104. B. elytris integris attenuato-acuminatis obscuris, corpore cupreo. Ent. syst. 2. 206. 83. * *acuminata*

Buprestis acuminata. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 5.
fig. 46.

Degeer Inf. 4. 128. tab. 4. fig. 18.

Petiv. Gazoph. tab. 2. fig. 2.

Pall. Icon. tab. D. fig. 10.

Habitat in Russia meridionali. D. Boeber.

105. B. elytris integris, nigra, obscura, thorace macula basica vtrinque impressa. Ent. syst. 2. 206. 84. * *excavata.*

Buprestis excavata. Oliv. Inf. 2. 32. tab. fig.

Habitat Tranquebariae. Dr. Pflug.

106. B. elytris integris truncatis, supra obscura, subtus cuprea, thorace rugoso. Ent. syst. 2. 206. 85. * *moesta.*

Habitat in Saxonia. D. Hybner.

107. B. elytris integris striatis, obscuris, nigro-fuscis, corpore subtus cupreo. Ent. syst. 2. 206. 86. * *lugubris.*

Buprestis lugubris. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 10.
fig. 106. *Herbol. Col. 9. 47. 29. 8. 100. 10 IV. 27 15*

Buprestis alyptera. Pall. Icon. tab. D. fig. 11. 1.
Panz. Fn. Germ. 1. tab. 21.

Habitat in Europa australiori. D. Schulz.

108. B. elytris integris, atra, antennis albis, thorace varioloso. Ent. syst. 2. 207. 87. * *cariosa.*

Bupre-

Buprestis cariosa. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 7. f. 68.

Buprestis Brutia. Petagn. Spec. Inf. Cal. inf. 22.
108. tab. 1. fig. 20.

Habitat in Russia australiori. D. Boeber.

vndata. 109. B. viridi-aenea, elytris integris, apice obscuris: frigidis vndatis albis. Ent. syst. 2. 207.
88. *

III 152

Habitat in Germania. Mus. Dr. Schulz.

sanguinea. 110. B. elytris integris striatis coerulesco-maculatis, corpore rufo. Ent. syst. suppl. 135. 88. *

Habitat in Mogodor. D. Schousboe. Mus. D. Lund.

6punctata. 111. B. elytris integris, exscutellata, aenea, elytris obscurioribus: punctis tribus impressis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Statura et magnitudo *B. chrysofigmae*. Caput aeneum, impressum. Thorax vix punctatus, aeneus, nitidus: punctis duobus dorsalibus, impressis, postice productus absque scutello. Elytra integra, laevis, obscuriora: punctis tribus impressis. Pedes aenei, tarsis cyaneis.

tenebricosa 112. B. elytris integris substriatis, obscura, abdomine subtus cyaneo, auro-punctato. Ent. syst. 2. 207. 89. *

Buprestis tenebricosa. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 5. fig. 48.

Buprestis Tenebrionis. Ross. Fn. Etr. 1. 184. 459.

Habitat in Gallia meridionali. Mus. D. Olivier.

Tenebrionis. 113. B. elytris integris truncatis, atra, thorace dilatato varioloso. Ent. syst. 2. 207. 90. *

Buprestis Tenebrionis. Linn. syst. Nat. 2. 661. 11. Suls. Hist. Inf. tab. 6. fig. 16.

Oliv. Inf. 2. 32. tab. 6. fig. 16.

Herbst.

Herbst. Arch. tab. 28. fig. 15.

Cyrilli Ent. Neapol. 1. tab. 1. fig. 13.

Habitat in Europa, Africa.

114. *B. elytris integris, viridi-aenea, thorace punctatissimo punctata*
ctis duobus, elytris quinque atris. Ent. syst.
suppl. 136. 90. *

Habitat in Galliae Alpibus. D. Brogniard.

115. *B. elytris integris, fasciis cinereis vndatis, Rubi.*
corpore cylindrico nigro. Ent. syst. 2. 208.
91. *

Buprestis Rubi. Linn. syst. Nat. 2. 602. 14.

Oliv. Inf. 2. 32. tab. 4. fig. 29.

Panz. Fn. Germ. 29. tab. 20.

Habitat in Europae Rubo.

III. 16.

116. *B. elytris integris: basi fasciisque vndatis cinereis, corpore aeneo cinereo-villoso.* *angulata.*
Ent. syst.
suppl. 136. 91. *

Habitat in India. Mus. D. de Sehestedt.

117. *B. elytris integris: margine aureo, supra obscure viridis, subtus cuprea.* *aurulenta.*
Ent. syst. 2. 208.
92. *

~~*Buprestis aurulenta.* Oliv. Inf. 2. 32. tab. 5.
fig. 51.~~

Habitat Halae Saxonum. D. Hybner.

IX. 16

118. *B. elytris integris, viridis, thorace punctato, tetrifata.*
pedibus apice cyaneis. Ent. syst. 2. 208. 93. *

Habitat in Marocco. Mus. D. de Sehestedt.

119. *B. elytris integris, obscure viridibus, thorace lineis duabus obscurioribus, antennis coeruleis.* *cyanicornis.*
Ent. syst. 2. 208. 94. *

Buprestis Trochilus, elytris integris, aurea nitidissima, thoracis dorso, elytris pedibusque viridibus. Ent. syst. 2. 205. 70. * vix differt.

III. 16.

Bupre-

Buprestis cyanicornis. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 2.
fig. 11. tab. 3. fig. 20.

Buprestis Stephanelli. Petagn. Spéc. Inf. Cal. 23.
110.

Buprestis femorata. Vill. Ent. 1. 338. 34. tab.
1. fig. 40.

Panz. Fn. Germ. 29. tab. 21.

Habitat in Gallia meridionali. Mus. D. Olivier.

2maculata 120. B. elytris integris striatis: macula rubra, corpore fusco-viridi. Ent. syst. 2. 209. 95. *

Buprestis 2maculata. Linn., syst. Nat. 2. 662. 16.
Mus. Lud. Vlr. 92.

Oliv. Inf. 2. 32. tab. 12. fig. 140.

Sulz. Hist. Inf. 57. tab. 6. fig. 15.

Habitat in India.

4maculata 121. B. elytris integris, viridis, thorace postice elytrisque maculis duabus aureis. Ent. syst. 2. 209. 96. *

Buprestis 4maculata. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 10.
fig. 110.

Habitat in India. Dr. Fothergill.

femorata. 122. B. elytris integris, obscura, elytris maculis duabus aureis impressis confluentibus, femoribus anticis videntatis.

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Statua omnino B. chrysofigmae. Caput obscurum, aeneo parum nitidulum. Thorax punctatus, canaliculatus, concolor. Elytra substriata, obscura: maculis aliquot obscure aeneis impressa. Corpus obscure metallicum, nitidulum. Femora antica incrassata, videntata.

tristis. 123. B. elytris integris marginatis, corpore cupreo, abdomine punctis decem nigris. Ent. syst. 2. 209. 97. *

Bupre-

Buprestis tristis. Linn. syst. Nat. 2. 662. 18.

Mus. Lud. Vlr. 93.

Habitat in Indiis.

124. *B. elytris* integris, thoracis lateribus scabris. *cuprea*.

Scutello tuberculati, corpore cupreo. Ent. syst.

2. 209. 97.

Buprestis cuprea. Linn. syst. Nat. 2. 662. 20.

Mus. Lud. Vlr. 94.

Habitat in America.

125. *B. elytris* integris, nigra, thorace punctis vtrin- *14guttata*.

que tribus marginalibus, elytris septem flave-

scensibus. Ent. syst. suppl. 136. 98. *

Habitat - - D. Weber.

126. *B. elytris* integris, purpurascensibus: punctis *hybernata*.

quinque viridibus impressis viuacissimis.

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Statura *B. candentis*, at maior. Caput et thorax

punctata, obscure purpurascens, minime ni-

tida. Elytra punctata, laetius purpurascens:

punctis quinque 1. baseos, 2. 2. impressis, vi-

ridibus, nitidis. Corpus obscure purpurascens.

127. *B. elytris* integris, substriatis, corpore aeneo, *metallica*.

immaculato. Ent. syst. 2. 210. 100. *

Habitat in Gallia meridionali.

128. *B. elytris* integris: strigis duabus inauratis, *nobilitata*.

vndatis, corpore fusco. Ent. syst. 2. 210. 101. *

Habitat in Indiis.

129. *B. elytris* integris, substriatis, subtus aenea, su- *bicolor*.

pra cuprea. Ent. syst. 2. 210. 103. *

Buprestis barbara. Oliv. Inf. 2. 32. tab. fig.

Habitat in Barbaria. D. Prof. Vahl.

Puncta duo minuta, approximata, thoracis basi

impressa.

O

130. B.

- exaltata.* 130. *B. elytris* integris, supra viridis, thoracis maculae corporeque subtus aureis. Ent. syst. supp. 137. 98.
Habitat in Cayenna.
- umbellatarum.* 131. *B. elytris* integris laevibus, corpore obscurcupreo, immaculato. Ent. syst. 2. 210. 104.
Buprestis umbellatarum. Oliv. Inf. 2. 32. tab. fig. 23.
Habitat in Barbariae floribus umbellatis. D. Pro Vahl.
- aspera.* 132. *B. elytris* integris laevibus, ferrugineo-irratatis, corpore nigro obscuro. Ent. syst. supp. 137. 103. *
Habitat in Africa. Mus. D. de Sehestedt.
- Morio.* 133. *B. elytris* integris laevibus, corpore nigro, immaculato. Ent. syst. 2. 210. 105. *
Buprestis appendiculata, elytris integris subacuminatis, corpore laevi atro, immaculato. Ent. syst. 2. 210. 102. *
Payk. Fn. Sv. 2. 230. 17.
Habitat Hafniae. Mus. D. Lund.
- apunctata.* 134. *B. elytris* integris punctatis, thorace punctis quatuor impressis, corpore obscuro. Ent. syst. 2. 211. 106.
Buprestis apunctata. Linn. syst. Nat. 2. 662. 25.
Fn. Sv. 759.
Degeer Inf. 4. 134. 8.
Oliv. Inf. 2. 32. tab. 10. fig. 117.
Herbst. Arch. tab. 28. fig. 17.
Payk. Fn. Sv. 2. 230. 18.
Habitat in *Calthae palustris* floribus frequens.
- uciata.* 135. *B. elytris* integerrimis aureis: punctis dorsibus cruceque postico nigris. Ent. syst. 2. 211. 107. *
Buprestis

Buprestis craciata. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 7. f. 74.

Habitat in nova Hollandia. Mus. D. Banks.

136. *B. elytris* integris substriatis, obscure aenea, *lineata*.
thorace striis impressis albidis. Ent. syst. 2. 211. *Striola*
108. *

Habitat in Barbaria. Mus. D. Desfontaines.

137. *B. elytris* integris obscuris, thorace aureo: *manca*.
striis duabus nigris. Ent. syst. 2. 211. 110. *

Buprestis manca. Linn. syst. Nat. 2. 1067. 10.

Geoff. Inf. 1. 127. 4.

Oliv. Inf. 2. 32. tab. 2. fig. 12.

Herbst. Arch. tab. 28. fig. 18.

D. 37.

Habitat in Europae nemoribus.

138. *B. elytris* integris fusco-nitidis, capite thora- *medita*-
ceque cupreis, corpore aureo. Ent. syst. 2. *bunda*.
212. 112. *

Buprestis meditabunda. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 10.
fig. 107.

Habitat in America boreali. Mus. Dr. Hunter.

139. *B. elytris* integris, cylindrica atra, thorace *ignara*.
vtrinque impresso aureo.

Habitat in America. Mus. D. Bosc.

Maghitudo *B. mancae*, at tota cylindrica. Caput
canaliculatum. Thorax vtrinque impressus, ob-
scure aureus, antice parum nigricans. Elytra
laevia, atra, obscura. Corpus atrum.

140. *B. elytris* integris linearibus: linea media ele- *atomaria*.
uata, corpore aeneo: atomis numerosis cine-
rascentibus. Ent. syst. 2. 212 13. *

Habitat in Surinamo. Mus. D. Bosc.

141. *B. elytris* integris linearibus: lineis duabus *plana*.
elevatis, thorace inaequali, corpore atro. Ent.
syst. suppl. 137. 113. *

Habitat in Senegallia. Mus. D. de Sehestedt.

- cyanoptera*. 142. *B. elytris integris linearibus, basi impressis cyaneis, capite thoraceque obscure viridibus.*
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.
 Statura elongata *B. viridis*. Antennae ferratae, nigrae. Caput valde canaliculatum, viride, obscurum. Thorax obscure viridis, linea dorsali maculaque magna, laterali impressis. Elytra linearia, cyanea, basi valde impressa. Corpus cyaneum, pedibus nigris.
- viridis*. 143. *B. elytris integris linearibus punctatis, corpore elongato viridi.* Ent. syst. 2. 213. 114.
Buprestis viridis. Linn. syst. Nat. 2. 663. 25.
 Fn. Sv. 762.
 Geoff. Inf. 1. 127. 5.
 Degeer Inf. 4. 133. 6. tab. 5. fig. 1.
 Oliv. Inf. 2. 32. tab. 11. fig. 124.
 Herbst. Arch. tab. 28. fig. 21.
 Payk. Fn. Sv. 2, 225. 12.
Habitat in Europae Betula alba.
Variat corpore obscuriore et cupreo.
- guttata*. 144. *B. elytris integris linearibus viridibus: puncto albo, abdomine cyaneo: punctis vtrinque tribus albis.* Ent. syst. 2. 213. 115. *
 Oliv. Inf. 2. 32. tab. 7. fig. 75.
 Ross. Ph. Etr. 191. 473.
 Herbst. Arch. tab. 28. fig. 22.
 Payk. Fn. Sv. 2. 224. 11.
 Schaeff. Icon. tab. 279. fig. 6.
Habitat in Anglia. D. Yeats.
- deplana*. 145. *B. elytris integris linearibus, corpore depresso, piano obscuro.*
Habitat in Amboina. D. Billardiere.
 Corpus totum depressum, planum, obscure fuscum.
146. *B.*

146. *B. elytris integris linearibus viridibus, capite linearis.*
thoraceque obscure aureis. Ent. syst. 2. 213.

116. °

Payk. Fn. Sv. 2. 226. 13.

11. 18

Habitat in Dania. Mus. D. de Sehestedt.

147. *B. elytris integris linearibus, corpore elongato atra.*
atro. Ent. syst. 2. 213. 117. °

Buprestis atra. Linn. syst. Nat. 2. 663. 26.

Habitat in Germania.

148. *B. elytris linearibus apice spinosis, corpore obscure aeneo.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

A *B. spinosa* omnino differt. Corpus magnitudine
B. biguttatae, obscure aeneum, minime nitidum.
Caput valde retusum; Thorax canaliculatus,
lateribus depressis.

149. *B. elytris integris linearibus, corpore elongato aeneo-nitido.* *elata.*
Ent. syst. 2. 213. 118. °

Buprestis Hyperici. Creutz. Inf. 122. 14. tab. III. 12
3. fig. 26.

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

150. *B. elytris integris linearibus, coerulesco-fusca, subtus aenea.* *parvula.*
Ent. syst. 2. 214. 119. °

Habitat - - Mus. D. de Sehestedt.

151. *B. elytris integris linearibus, atra, capite sulcato.* *emarginata.*
Ent. syst. 2. 214. 120. °

Habitat in Gallia. Mus. D. Bosc.

152. *B. elytris integris linearibus, nigra, thorace cupreo.* *ruficollis.*
Ent. syst. 2. 214. 121. °

Buprestis ruficollis. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 9.
fig. 101.

Habitat in America. Mus. Dr. Hunter.

153. B.

innubis.

153. *B. elytris integris, nigra, capite thoraceque obscure aeneis.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Parua, vix linearis. Caput obscure aeneum, nitidulum, in medio canaliculatum. Thorax obscure aeneus, nitidulus, vtrinque impressus. Elytra integra, vix striata, nigra, immaculata. Corpus nigrum.

capitata.

154. *B. elytris integris, atra, capite thoracisque margine aeneis nitidis.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Statura parua *B. innubae*. Caput viridi-aeneum, nitidum. Thorax laevis, ater, margine laterali, aeneo, nitido. Elytra laevis et corpus atra.

armata.

155. *B. elytris integris sublinearibus, apice spinosis, corpore cyaneo.*

Web. Inf. 74. 4.

Habitat in Sumatra. D. Daldorff.

Affinis certe *B. spinosae*, at paullo maior et corpus totum cyaneum, nitidum. Forte mera sexus varietas.

spinosa.

156. *B. elytris integris sublinearibus viridibus, apice spinosis.*

Habitat in Amboina. D. Billardiere.

Parua, sublinearis. Caput sulco impresso obscure aeneum. Thorax obscure aeneus, maculis tribus baseos impressis. Elytra punctata, viridia, apice spina, valida, armata. Corpus obscure aeneum, nitidum.

festiva.

157. *B. elytris integris: maculis sex coeruleis, corpore elongato viridissimo. Ent. syst. 2. 214. 122. **

Bupre.

Buprestis festiva. Linn. syst. Nat. 2. 663. 27.

Oliv. Inf. 2. 51. tab. 9. fig. 100.

Habitat in Africa.

158. *B. elytris* integris, thorace marginato vtrinque *nitens*.
 impresso, corpore supra viridi, subtus atro.

Buprestis luoidula. Ent. syst. 4. App. 451. 128. *

Habitat Kiliae.

159. *B. elytris* integris, thorace submarginato, ob-*sepulchra-*
 scura, antennis pedibusque nigris. *lis*

Habitat in Germania.

Corpus paruum obscurum, aeneo-paullo nitidulum. Thorax submarginatus, nullo modo canaliculatus. Antennae et pedes nigri.

160. *B. elytris* integris, thorace marginato vtrinque *nitidula*.
 depresso, corpore viridi nitido. Ent. syst. 2.

214. 123.

Buprestis nitidula. Linn. syst. Nat. 2. 662. 21.

Fn. Sv. 757.

Oliv. Inf. 2. 32. tab. 11. fig. 122.

Schaeff. Icon. tab. 50. fig. 7.

Herbst. Arch. tab. 28. fig. 20.

Payk. Fn. Sv. 2. 231. 19.

Habitat in Europae plantis.

161. *B. thorace* laevi, fusco, bimaaculato, corpore *millefolii*.
 viridi.

Habitat in Austria. D. de Meyerle.

Varietatem *B. nitentis* credidi, at distincta videtur. Corpus totum subpunctatum, viride.

Thorax maculis duabus dorsalibus nunc maioribus nunc minoribus.

162. *B. elytris* integris viridibus, capite thoraceque *laeta*.
 aureis. Ent. syst. 2. 214. 124. *

Buprestis laeta. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 5. fig. 50.

Payk. Fn. Sv. 2. 232. 19. β.

Habi-

Habitat Halae. D. Schaller.

Forte praecedentis mora varietas.

salicis.

163. *B. elytris integris, viridis, nitens, coleoptris aureis, basi viridibus.* Ent. syst. 2. 215. 125. *

Oliv. Inf. 2. 32. tab. 2. fig. 13.

Panz. Fn. Germ. 1. tab. 12.

1720.

Herbst. Arch. tab. 46. fig. 5.

Schaeff. Icon. tab. 31. fig. 12.

Habitat in Europae Salice. Dr. Schulz.

~~*Buprestis nitida* Ross. Fn. Etr. vix differt.~~

Sophorae.

164. *B. elytris integerrimis, supra viridibus, subtus nigra, abdomine supra aureo.* Ent. syst. 2. 215. 126. *

Habitat in Guineae Sophora occidentali. Dr. Isert.

discoidea.

165. *B. elytris integris, aenea, villosa, elytrorum disco testaceo.* Ent. syst. 2. 215. 127. *

Oliv. Inf. 2. 32. tab. 7. fig. 65. tab. 10. fig. 65.

Habitat in Barbariae plantis umbellatis. D. Prof. Vahl.

quercata.

166. *B. elytris integris, viridis, thorace macula elytris vitta fuscis.*

Habitat in Carolinae Quercu. Muf. D. Bosc.

Parua, viridis. Thorax macula nunc maiore, nunc minore media, fusca. Elytra laevis, viridia, vitta nunc latiore, nunc angustiore, fusca.

parvaula.

167. *B. elytris integris substriatis, cuprea, thorace cylindrico.* Ent. syst. suppl. 137. 127. *

Habitat in Tanger. D. Schousboe. Muf. D. de Sehestedt.

cyanea.

168. *B. elytris integris rugosis, corpore cyaneo.* Ent. syst. 2. 215. 128. *

1720. *Buprestis tarda.* Ent. syst. 2. 209. 99. *

Habitat Halae Saxonum. D. Schaller.

169. B.

169. *B. elytris integris*, viridi-aenea, coleoptris ~~purpurascens.~~
aureis, maculis septem viridibus.

Habitat in noua Cambria. D. Billardiere.

Statura et magnitudo omnino *B. candentis*. Caput viridi-aeneum. Thorax aeneus, lineis duabus latis, fuscis. Elytra aurea, nunc purpurascens, nunc rufo-aurea, maculis viridibus: duabus bascos linearibus; interiore communi, media transuersa, tertia lineasi.

170. *B. elytris integris obscuris*: maculis tribus viridibus impressis. Ent. syst. suppl. 138. 128.*

Habitat in Insula St. Thomas Americae. Mus. D. Lund.

171. *B. elytris integris*, cyanea, thorace canaliculato, elytris aureis: taenia suturali bascos cyanea, Ent. syst. 4. App. 451. 128.*

Buprestis candens. Panz. Fn. Germ. 1. tab. 9.

Habitat in Germania. Dr. Panzer.

172. *B. elytris integris nigris*: fasciis tribus cupreis, ~~tricolorata.~~
capite thoraceque cupreis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Minuta. Caput et thorax laeuia, cuprea, immaculata. Elytra laeuia, nigra, fasciis tribus cupreis, bascos abbreviata, secunda in medio, vltima apicis. Corpus atrum.

129. TRACHYS. *Palpi* quatuor breuissimi, aequales.
Maxilla bifida.
Antennae moniliformes.

tessellata.

1. *T. nigra*, elytris albo-tessellatis.

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Os maxillis palpisque. *Palpi* quatuor breuissimi, aequales, filiformes, *anteriores* vix longiores, quadriarticulati; articulis subaequalibus, adhaerentes maxillae dorso, *posteriores* triarticulati; articulis aequalibus, adnati ligulae medio exteriori. *Mandibula* brevis, cornea, edentula, acuta. *Maxilla* membranacea, bifida: laciniis aequalibus, obtusis. *Ligula* brevis, membranacea, integra. *Labium* breue, cornutum, transuersum, integrum.

Maior quam *T. pygmaea*. Color capitis thoracisque variat, nunc niger, nunc obscure aurulentus. Elytra substriata saepius concolora, albo-tessellata. Corpus atrum, nitidum.

ephippium.

2. *T. cuprea*, coleoptris macula dorsali ovata, atra.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Statura et magnitudo *T. pygmaeae*. Caput et thorax laeuis, glabra, cuprea. Scutellum atrum.

Elytra

Trachydis corpus paruum, oblongum, depressum, immarginatum: *capite* paruo, retuso sine canaliculato, obtuso, inserto; *oculis* magnis, oblongis, prominulis, submarginalibus; *antennis* thorace breuioribus, distantibus, reconditis, subter oculos insertis; *thorace* subtrilobo: margine deflexo; *scutello* paruo, rotundato; *elytris* rigidis, ante medium coarctatis, apice angustatis, longitudine abdominalis; *pedibus* breuibas, validis; *tarsis* quinquearticulatis; colore obscuro.

Elytra laevia, cuprea: macula magna, communi atra, quae basin at haud apicem attingit.

. T. aenea, nitida, elytris cyaneis.

Buprestis pygmaea. Ent. syst. 2. 211. 110.

Oliv. Inf. 2. 32. tab. 4. fig. 34.

Habitat in Barbariae umbellatis. D. Prof. Vahl.

pygmaea.

. T. nigra, elytris rugoso - impressis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.

D. Lund.

Statura et magnitudo T. minutae, tota nigra, obscura, at distincta, elytris rugis plurimis, inaequalibus impressis.

rugosa.

. T. nigra, elytris rugis, transversis, albidis, thorace subtrilobo, laevia. minuta.

Buprestis minuta. Ent. syst. 2. 212. 111.

Linn. syst. Nat. 2. 663. 24. Fn. Sv. 760.

Geoff. Inf. 1. 128. 6.

Oliv. Inf. 2. 32. tab. 2. fig. 14.

Herbst. Arch. tab. 28. fig. 19.

Payk. Fn. Sv. 2. 232. 20.

Habitat in Europae Corylo.

III: 29 IV. 21

. T. nigra, elytris cyaneis, apice aureis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.

D. de Sehestedt.

Statura et summa affinitas T. exiguae. Caput et thorax laevia, nigra, aeneo-nitida. Elytra cyanea, apice aurea, nitida.

terminalis.

. T. elytris nigris, immaculatis, capite thoraceque atris, nitidulis. *fastigiata.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.

D. de Sehestedt.

Statura omnino T. exiguae, at postice magis attenuata. Caput et thorax atra, nitida. Elytra nigra, immaculata.

8. T.

pulchella. 8. T. capite thoraceque viridibus, elytris cyaneis: maculis duabus viridibus impressis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Statura parva T. minutae. Caput et thorax laevia, viridia, nitida. Elytra laevia, cyanea, maculis duabus magnis impressis, viridibus. Corpus nigrum.

exigua. 9. T. capite thoraceque viridi-aeneis, elytris cyaneis immaculatis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Praecedenti affinis, at elytra cyanea, omnino immaculata. Corpus atrum.

pufilla. 10. T. aenea, elytris strigis cinereis.

Habitat Tranquebariae. D. Daldorff. Mus. D. Lund.

Statura omnino T. minutae, at duplo adhuc minor; tota aenea, strigis aliquot elytrorum vndatis cinereis.

nana. 11. T. atra, nitida, elytris punctatis, thorace subtrilobo.

Buprestis nana. Payk. Fn. Sv. 2. 233. 21.

Buprestis pufilla. Oliv. Inf. 2. 32. tab. 12. f. 133.

Habitat in Europae borealis Corylo.

T. minuta duplo minor, tota atra, nitida. Frons valde retusa. Elytra punctata, immaculata.

30. ELATER. *Palpi securiformes.*
Maxilla videntata, obtusa.
Ligula bifida.
Antennae filiformes.

1. *E. fuscus*, elytris fulcatis; sulcis rugosis, antennis flabelliformibus.

Habitat in Guinea. D. Meier. Mus. D. Lund.

Maximus in hoc genere et forte proprii generis.

Palpi haud securiformes, nec sternum porrectum. Corpus elongatum, subcylindricum.

Antennae flabellatae. Caput impressum. Thorax niger, punctis duobus dorsalibus impressis anguloque postico subspinoso. Elytra fusca, fulcata: sulcis lineolis elevatis transversis, rugosis. Corpus fuscum.

2. *E. fuscus*, antennarum fasciculo flabelliformi. *flabellicornis.*
 Ent. syst. 2. 216. 1. *

Elater flabellicornis. Linn. syst. Nat. 2. 651. 1.

Oliv. Inf. 2. 31. tab. 3. fig. 28.

Drury Inf. 3. tab. 47. fig. 1.

Voet. Cod. 1. tab. 45. fig. 34.

Habitat in India.

Femina major, antennis tantum ferratis.

3. E.

Elateris corpus elongatum, subcylindricum, immarginatum, tardum; capite paruo, rotundato, inserto; oculis globosis, marginalibus, vix prominulis; antennis longitudine thoracis, ferratis, distantibus, subter oculos insertis; thorace plano: angulo postico vtriuque prominulo, acuto, pectorisque dente e fovea abdominis resiliente; scutello paruo, rotundato; elytris rigidis, fornicatis, longitudine abdominis; pedibus brevibus, validis; tarsis quinquearticulatis; colore saepius obscura.

- fascicularis.* 3. *E. thorace* ~~nigro~~ *nigro*, elytris pallidis fusco-vndatis antennarum fusciculo flabelliformi. Ent. syst. 2. 216. 2. *
- Elater fascicularis.* Oliv. Inf. 2. 31. tab. 5. f. 56.
Habitat in America. Mus. Dr. Hunter.
- speciosus.* 4. *E. albus*, nigro-maculatus. Ent. syst. 2. 216. 3. *
- Elater speciosus.* Linn. syst. Nat. 2. 652. 2.
Voet. Col. tab. 45. fig. 32.
Oliv. Inf. 2. 31. tab. 7. fig. 70.
Habitat in India.
- luridus.* 5. *E. cinereo-tomentosus*, elytris substriatis, plan-
tis fuscis. Ent. syst. 2. 217. 4. *
- Elater luridus.* Oliv. Inf. 2. 31. tab. 5. fig. 57.
Habitat in Coromandel. Mus. D. Banks.
- tomentosus.* 6. *E. niger*, ferrugineo-tomentosus, elytris striatis.
Ent. syst. suppl. 138. 4. *
- Habitat in India orientali.
- foveatus.* 7. *E. niger*, thorace punctis duobus impressis albis,
elytris striatis. Ent. syst. 2. 217. 5. *
- Habitat in Guinea. D. Isert.
- myops.* 8. *E. thorace* ocellis duobus atris, corpore fusco ci-
nereoque variegato.
Habitat in Carolina. Mus. D. Bose.
Statura magna *E. oculati* et affinis, at magis ob-
longus. Ocelli thoracis magis oblongi et cor-
pus totum fusco cinereoque rarium.
- oculatus.* 9. *E. thorace* ocellis duobus atris, corpore nigro
albo-maculato. Ent. syst. 2. 217. 6.
Elater ocellatus. Linn. syst. Nat. 2. 651. 3.
Oliv. Inf. 2. 31. tab. 3. fig. 34.
Petiv. Gazoph. tab. 10. fig. 4.
Act. Angl. 246. 396. 13. et 271. 841. 32.
Voet. Col. 1. tab. 45. fig. 33.

Degeer

Degeer Inf. 4. 159. 1. tab. 17. fig. 18.

Habitat in Americae meridionalis Quersu.

10. *E. thorace ocellis duobus atris, corpore nigro luscus.*
immaculato. Ent. syst. 2. 217. 7. *

Elater luscus. Oliv. Inf. 2. 31. tab. 6. fig. 64.

Habitat in America. D. Drury.

11. *E. ater, thorace maculis duabus ocellaribus, coecus.*
elytris strigis duabus arcuatis punctoque postico ferrugineis. Ent. syst. 2. 217. 8. *

Habitat in Africa. D. Lee.

12. *E. ater, thorace elytrisque rufis lineatis. Ent. lineatus.*
syst. 2. 218. 9. *

Elater lineatus. Oliv. Inf. 2. 31. tab. 6. fig. 63.

Habitat in Brasilia. Mus. Gallic.

13. *E. thoracis lateribus, macula flava glabra. Ent. noctilucus.*
syst. 2. 218. 10.

Elater noctilucus. Linn. syst. Nat. 2. 657. 4.

Mus. Lud. Vlr. 82.

Oliv. Inf. 2. 31. tab. 2. fig. 14.

Degeer. Inf. 4. 160. 2. tab. 13. fig. 1.

Brown. Jamaic. 432. tab. 44. fig. 10.

Sloan. Jamaic. 2. 206. tab. 237. fig. 1.

Voet. Coleopt. 1. tab. 43. fig. 16.

Habitat in Americae meridionalis Insulis.

14. *E. thorace postice maculis duabus glabris, flavo phosphoreus.*
nis. Ent. syst. 2. 218. 11.

Elater phosphoreus. Linn. syst. Nat. 2. 652. 5.

Oliv. Inf. 2. 31. tab. 2. fig. 20. tab. 2. fig. 14.

Degeer. Inf. 4. 161. 3. tab. 18. fig. 2.

Habitat in Americae Insulis.

15. *E. fuscus, thorace nigro: margine flavo. Ent. ignitus.*
syst. 2. 218. 12. *

Elater ignitus. Oliv. Inf. 2. 31. tab. 8. fig. 78.

Ela-

- Elater Indicus*. Herbst. Arch. tab. 27. fig. 3.
Voet. Col. 1. tab. 43. fig. 18.
Habitat in Cayenna. D. v. Rohr.
- lambens*. 16. *E. fuscus*, ferrugineo-tomentosus, thorace punctato, elytris striatis.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.
Affinis certe *E. ignito*, at margo thoracis concolor. Corpus totum obscurum tomento tenerimo, ferrugineo tectum.
- fuscipes*. 17. *E. ater*, antennis pedibusque fuscis. Ent. syst. 2. 218. 13. *
Elater fuscipes. Oliv. Inf. 2. 31. tab. 3. fig. 21.
Habitat in India orientali. Dr. Koenig.
- 4maculatus*. 18. *E. cinereus*, thorace punctis quatuor, elytris fasciis duabus nigris. Ent. syst. 2. 219. 14. *
Elater quadrimaculatus. Oliv. Inf. 2. 31. tab. 8. fig. 79.
Elater fasciatus. Drury Inf. 3. tab. 47. fig. 2.
Habitat in Africa aequinoctiali.
- rubiginosus*. 19. *E. nigricans*, griseo-maculatus, thoracis limbo elytrorumque macula magna pallida. Ent. syst. 2. 219. 15. *
Habitat in Sierra Leon Africae. Dr. Pflüg.
- ligneus*. 20. *E. ferrugineus*, elytris mucronatis, antennis nigris. Ent. syst. 2. 219. 16. *
Elater ligneus. Linn. syst. Nat. 2. 652. 7. Amoen. acad. 6. 395. 24.
Oliv. Inf. 2. 31. tab. 2. fig. 15.
Drury Inf. 3. tab. 47. fig. 4.
Voet. Col. 1. tab. 42. fig. 9.
Habitat in America meridionali.
- lacunosus*. 21. *E. niger*, thorace punctato quinquasemito, elytris striatis. Habi-

Habitat in Carolina. Muf. D. Bosc.

Magnitudo fere *E. rufi*. Caput et thorax punctata, nigra, immaculata. Thorax praeterea fo-ueolis quinque dorsalibus, impressis: 2. 1. 2: intermedio maiore. Elytra striata, nigra. Plan-
tae parum ferrugineae.

22. *E. ater*, elytris striatis, scutello griseo. Ent. syst. *Morio*.
suppl. 138. 16. *

Habitat in America. D. Hybner.

23. *E. ater*, nitidus, antennis pedibusque fuscis, ely-
tris laevissimis. Ent. syst. suppl. 138. 16. *

Habitat in America. D. Hybner.

24. *E. ferrugineus*, capite thoraceque obscurioribus. *rufus*.
Ent. syst. 2. 219. 17. *

Panz. Fn. Germ. 10. tab. 10. //

Elater rufus. Payk. Fn. Sv. 3. 1. 1. IK 22 22

Degeer Inf. 4. tab. 5. fig. 13.

Habitat in Germania. D. Smidt.

25. *E. thorace elytrisque ferrugineis, thoracis mer-* *ferrugi-*
gine postico corporeque nigris. Ent. syst. 2. *neus*.
220. 18. *

Elater ferrugineus. Linn. syst. Nat. 2. 654. 20.

Fn. Sv. 729.

Geoff. Inf. 1. 130. 1. tab. 2. fig. 4.

Panz. Fn. Germ. 10. tab. 11. IV 22 22

Oliv. Inf. 2. 31. tab. 3. fig. 35.

Schaeff. Icon. tab. 19. fig. 1.

Habitat in Europa.

26. *E. viridi-aeneus*, elytris fulcatis: fulcis villo-
porcatus. fo-albis. Ent. syst. 2. 220. 19.

Elater porcatus. Linn. syst. Nat. 2. 652. 6.

Oliv. Inf. 2. 31. tab. 7. fig. 74.

Drury Inf. 3. tab. 47. fig. 6.

T. II.

P

Sulz.

- Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 7.
Habitat in America meridionali.
- fulcatus.* 27. *E. villoso-albidus*, elytris striis tribus elevatis glabris. Ent. syst. 2. 220. 20. *
Elater fulcatus. Oliv. Inf. 2. 31. tab. 2. fig. 10.
Habitat in America meridionali. D. Spengler.
- striatus.* 28. *E. nigricans*, opacus, elytris striatis: striis albo-pubescentibus.
Elater striatus. Linn. syst. Nat. 2. 652. 8.
Habitat in America meridionali. Mus. D. Lund.
Affinis *E. virenti*, at distinctus videtur. Elytra striis novem, villis albis tectis.
- virens.* 29. *E. villosus*, nigro-viridis, antennis nigris. Ent. syst. 2. 220. 21. *
Elater virens. Oliv. Inf. 2. 31. tab. 2. fig. 19.
tab. 9. fig. 55.
Voet. Col. 1. tab. 42. fig. a.
Habitat in Americae Infulis. Mus. Dr. Hunter.
- fulgens.* 30. *E. cyaneo-nitidus*, subtus cupreus, elytris acuminatis. Ent. syst. 2. 220. 22. *
Elater fulgens. Oliv. Inf. 2. 31. tab. 4. fig. 43
Habitat in India. Mus. Britt.
- inaequalis.* 31. *E. cyaneo-niger*, thorace inaequali, elytris striatis rubris. Ent. syst. 2. 221. 23. *
Oliv. Inf. 2. 31. tab. 5. fig. 47.
Habitat in Italia. Mus. D. Bosc.
- bicornis.* 32. *E. ater*, nitidus, capite bidentato, elytris striatis apice acuminatis.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.
Corpus elongatum, atrum, nitidum. Antenna ferratae. Caput antice dentibus duobus porrectis, acutis. Thorax punctatus: marginibus postice

postico tridentato. Elytra substriata, apice acuminata.

33. *E. obscurus*, thorace rugoso bidentato. *bidens*.
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
 D. Lund.
 Corpus medium, elongatum, nigrum. Antennae
 ferratae. Caput paruum, ferrugineo - pube-
 scens. Thorax strigis transuersis rugosus pone
 marginem anticum, dentibus duobus eleuatis,
 acutis. Elytra rugosa, obscura, nigra, griseo
 parum mixta.
34. *E. thorace atro nitido, elytris striatis nigris. aterrimus*.
 Ent. syst. 2. 221. 24.
Elater aterrimus, Linn. syst. Nat. 2. 653. 17.
 Fn. Sv. 726.
 Geoff. Inf. 1. 136. 73. ~~IV. 22~~
 Oliv. Inf. 2. 31. tab. 5. fig. 53.
 Habitat in Europae hortis.
35. *E. niger*, opacus, elytris striatis, antennis pedi- *niger*.
 busque concoloribus. Linn. syst. Nat. 2. 221,
 25. *
Elater niger. Linn. syst. Nat. 2. 656. 36. Fn.
 Sv. 743. ~~IV. 25~~
 Oliv. Inf. 2. 31. tab. 6. fig. 65.
 Habitat in Europae hortis.
36. *E. nigricans, cinereo varius, thorace canalicu- marmorata-*
 lato. *tus*.
 Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.
 Statura omnino *E. murini*, at maior. Caput et
 thorax punctata, nigra, cinereo maculata, tho-
 race in medio canaliculato. Antennae ferratae,
 piceae. Scutellum cinerem. Elytra substriata,
 nigro cinereoque varia. Corpus cum pedibus
 nigricans.

- murinus.* 37. *E. thorace* obscure cinereo, *elytris* cinereo-nebulosis, *plantis* rufis. Ent. *fyft.* 2. 221. 26.
Elater murinus. Linn. *fyft. Nat.* 2. 655. 22. Fn. Sv. 738.
 Oliv. *Inf.* 2. 31. tab. 2. fig. 9.
 Schaeff. *Icon.* tab. 4. fig. 6.
 Voet. *Col.* 1. tab. 44. fig. 26.
 Payk. *Fn. Sv.* 3. 34. 38.
 Degeer *Inf.* 4. 150. 10.
 Habitat in Europae hortis frequens.
- pulverulentus.* 38. *E. niger*, *atomis* numerosissimis cinereis, *pedibus* testaceis.
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. *Mus.* D. de Sehestedt.
 Statura *E. murini* paullo minor. Caput, thorax, *elytra*, corpus nigra, pileis rarioribus, cinereis, vti *atomis* irrorata. *Pedes* testacei. Caput impressum. Thorax postice retusus.
- bolosericus.* 39. *E. obscurus*, *thorace* *elytris*que cinereo fuscoque nebulosis subholosericeis. Ent. *fyft.* 2. 222. 27. *
 Oliv. *Inf.* 2. 31. tab. 3. fig. 33.
 tab. 7. fig. 69.
 Geoff. *Inf.* 1. 135. 9.
 Voet *Col.* tab. 44. fig. 27.
 Payk. *Fn. Sv.* 3. 35. 39.
 Habitat in Germania. D. Smidt.
- fuscus.* 40. *E. villosus*, fuscus, *thorace* punctato, *elytris* orenato-striatis.
 Habitat in Aethiopia. D. Billardiere.
 Statura et magnitudo *E. murini rusticus*, totus obscurus, villosus, fuscus. *Pedes* rufo parum nitenti.

11. E. elytris aeneis: maculis pallidioribus confertis, vnguibus rubris. Ent. syst. 2. 222. 28. *

Elater tessellatus. Linn. syst. Nat. 2. 659. 22.

Fn. Sv. 738.

Oliv. Inf. 2. 31. tab. 3. fig. 22.

Herbst Arch. tab. 27. fig. 5.

Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 7.

Vqet. Col. 1. tab. 44. fig. 27.

Payk. Fn. Sv. 3. 7. 9.

Degeer Inf. 4. 148. 7.

Habitat in Europae hortis.

12. E. corpore atro, atomis numerosissimis albis. *atomarius*.

Ent. syst. suppl. 139. 28. *

Elater atomarius. Linn. syst. Nat. 2. 655. 28. 14. 23.

Fn. Sv. 739.

Elater carbonarius. Oliv. Inf. 2. 31. tab. 2. f. 11.

Elater pulverulentus. Panz. Fn. Germ. VII. 28

Habitat in Germania. Dr. Panzer.

13. E. thorace nigro pallidoque vario, elytris nigri-fasciatus. cantibus: fascia vndata alba. Ent. syst. 2. 222.

29.

Elater fasciatus. Linn. syst. Nat. 2. 655. 27.

Fn. Sv. 737.

Oliv. Inf. 2. 31. tab. 5. fig. 46.

Panz. Naturf. 24. 32. 45. tab. 1. fig. 46.

Payk. Fn. Sv. 3. 15. 18.

Habitat in Europae hortis.

14. E. niger, thoracis margine elytrorumque basi fasciaque postica villoso-flavescentibus. Ent.

syst. 2. 222. 30. *

Elater varius. Oliv. Inf. 2. 31. tab. 3. fig. 26.

tab. 2. fig. 68.

Herbst. Arch. tab. 27. fig. 11.

Habitat Parisiis. Mus. D. Bosc.

45. E.

- lacteus.* 45. *E. albo-villosus*, thorace punctis; elytris maculis nigris.
 Habitat in Sumatra. D. Daldorff. Mus. de Scheffedt.
 Statura et magnitudo *E. fasciati*. Corpus totum albo-villosum, thorace punctis, elytris laevibus, maculis aliquot nigris. Elytra apice emarginata.
- excavatus.* 46. *E. thoracis dorso foveato, nigro, cinereo hinc inde pubescente.*
 Habitat in Guinea. Mus. D. Lund.
 Statura et magnitudo omnino *E. fasciati*. Antennae ferratae, nigrae. Caput nigrum, cinereo-villosum. Thorax niger, cinereo-villosus: fovea lata, quae tamen nec basin, nec apicem attingit. Elytra striata, subcrenata, nigra, basi utrinque ad scutellum retusa. Corpus nigrum,
- aeneus.* 47. *E. thorace elytrisque aeneis, antennis simplicibus nigris.* Ent. syst. 2. 223. 31.
Elater aeneus. Linn. syst. Nat. 2. 655. 31. Fn. Sv. 740.
 Oliv. Inf. 2. 31. tab. 8. fig. 83.
 Degeer Inf. 4. 149. 8.
 Payk: Fn. Sv. 3. 16. 19.
 β. *Elater germanus*, thorace elytrisque atrocoeruleis, corpore toto pedibusque nigris.
 Linn. syst. Nat. 2. 655. 30. Fn. Sv. 730.
 Oliv. Inf. 2. 31. tab. 2. fig. 12.
 Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 8.
 Habitat in Europae hortis.
- impresus.* 48. *E. pubescens, niger, thorace linea dorsali punctisque duobus impressis, elytris striatis, aeneo nitidulis.* Ent. syst. 2. 223. 32. *
Elater impresus. Payk. Fn. Sv. 3. 18. 21.
 Habitat in Suecia. D. Schneider.

49. *E. thorace elytrisque aeneis, antennis mares pectinicornis*.
 pectinatis. Ent. syst. 2. 223. 33. nis.
Elater pectinicornis. Linn. syst. Nat. 2. 655. 42.
 Fn. Sv. 741.
 Geoff. Inf. 1. 133 7.
 Oliv. Inf. 2. 31. tab. 1. fig. 4. tab. 6. fig. 4.
 Sulz. Inf. tab. 5. fig. 36.
 Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 4. VH. 29 IV. 75
 Payk. Fn. Sv. 3. 9. 11.
 Degeer Inf. 4. 145. 2. tab. 5. fig. 3.
 Habitat in Europae hortis frequens.
50. *E. subpubescens, obscure cupreus, scutello pal- ueruginoso-*
 lido. Ent. syst. suppl. 139. 33. * Jus.
Elater ueruginosus. Oliv. Inf. 2. 31. tab. 8. f. 76.
 Habitat in Gallia. Mus. D. Bosc.
Variat elytris concoloribus et aeneis.
51. *E. thorace ferrugineo: linea dorsali nigra, co- furcatus.*
 leoptris testaceis attenuatis: striis quinque ni-
 gris, capite furcato. Ent. syst. 2. 224. 34.
 Habitat in India. Mus. Britt.
52. *E. thorace vtrinque videntato ferrugineo: li- futuralis.*
 nea dorsali nigra, coleoptris testaceis: vittis
 tribus atris. Ent. syst. 2. 224. 35. * S.N.I.
Elater futuralis. Oliv. Inf. 2. 31. tab. 1. fig. 3.
Elater angulatus. Drury Inf. 3. tab. 47. fig. 5.
 Habitat in Senegallia. Mus. D. Olivier.
53. *E. fuscus, elytrorum vitta pedibusque testaceis. vittatus.*
 Ent. syst. 2. 224. 36. * # IV. 66
 Habitat in Germania. D. Smidt.
54. *E. cupreus, elytris dimidiato-flauis. Ent. syst. cupreus.*
 2. 225. 37. * VI
Elater cupreus. Oliv. Inf. 2. 31. tab. 5. fig. 50.
 Schaeff. Icon. tab. 38, fig. 2. VH 28
 Habitat in Anglia. 55. E.

cruciatus. 55. E. thorace nigro: lateribus ferrugineis, coleoptris flavis: margine cruceque nigris. Ent. fyft. 2. 225. 38.

Elater cruciatus. Linn. fyft. Nat. 2. 653. 12.
Fn. Sv. 722.

Oliv. Inf. 2. 31. tab. 4. fig. 40.

Geoff. Inf. 1. 133. 6.

Degeer Inf. 4. 149. 9.

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 10.

Voet. Col. 2. tab. 43. fig. 12.

Payk. Fn. Sv. 3. 36. 11.

Habitat in Europae hortis.

Syriacus. 56. E. thorace rufo, elytris fascia duplici alba, corpore nigro. Ent. fyft. 2. 225. 39.

Elater Syriacus. Linn. fyft. Nat. 2. 653. 11.
Muf. Lud. Vlr. 83:

Habitat in Oriente.

castaneus. 57. E. thorace testaceo pubescente, elytris flavis: apice nigris, corpore nigro. Ent. fyft. 2. 225. 40.

Elater castaneus. Linn. fyft. Nat. 2. 654. 18.

Fn. Sv. 727.

Geoff. Inf. 1. 132. 4.

Oliv. Inf. 2. 31. tab. 3. fig. 25. tab. 5. fig. 51.

Degeer Inf. 4. 153. 15.

Schaeff. Icon. tab. 11. fig. 9. tab. 31. fig. 4.

Habitat in Europae campis.

latus. 58. E. ovatus, obscure griseus, elytris striatis.

Habitat in Austria. D. Scheidler.

Reliquis omnibus latior et breuior. Corpus totum obscure aeneum, pilis griseis pubescens. Elytra striata.

liuens. 3 59. E. niger, thorace glaberrimo rubro, elytris testaceis. Ent. fyft. 2. 225. 41. *

Ela-

Elater liuens. Linn. syst. Nat. 2. 654. 19. Fn.
Sv. 728.

Elater dispar. Payk. Fn. Sv. 2. 37. 42.

Oliv. Inf. 2. 31. tab. 5. fig. 52.

Degeer Inf. 4. 154. 17.

Schaeff. Icon. tab. 11. fig. 8.

Habitat in Europae hortis.

o. E. thorace elytrorumque margine ferrugineis, *mesomelas*
corpore elytrisque nigris. Ent. syst. 2. 226. 42.

Elater mesomelas. Linn. syst. Nat. 2. 653. 16.

Fn. Sv. 725.

Oliv. Inf. 2. 31. tab. 5. fig. 54.

Habitat in Europae Quercu.

IV. 25

Mas praecedentis teste D. de Paykull.

Larva hexapoda, filiformis, duriuscula, candae
scuto corneo: lateribus dentatis, subtus tuberculo
conico, tubuloso, pediformi.

1. E. linearis, ater, thorace elytrisque rufis. Ent. *denticollis.*
syst. 4. App. 451. 42. *

Habitat in Germaniae Quercu. } D. Prof. Helwig.

IX. 29

2. E. thorace rufo: medio fusco, elytris linearibus *linearis.*
testaceis. Ent. syst. 2. 226. 43. *

Elater linearis. Linn. syst. Nat. 2. 655. 15. Fn.

Sv. 723.

Lepturoides linearis. Herbst. Arch. 4. 103.

Oliv. Inf. 2. 31. tab. 7. fig. 67.

Degeer. Inf. 4. 154. 17.

Payk. Fn. Sv. 3. 3. 4.

Habitat in Europa boreali.

Variat elytrorum futura nigra.

IX. 28

3. E. piceus, thorace elytrisque obscure nigris. *obscurus.*
Ent. syst. 2. 226. 44. *

Elater obscurus. Linn. syst. Nat. 2. 655. 25.

Fn. Sv. 735.

Oliv.

.. Oliv. Inf. 2, 31. tab. 8. fig. 76.

Schaeff. Icon. tab. 19. fig. 2.

Habitat in Europae hortis.

bicolor.

64. *E. ferrugineus*, elytris striatis nigris.

Habitat in Tanger. D. Schousboe. Mus. D. de Sehestedt.

Paullo maior *E.* obscuro. Caput fuscum, antennis ferrugineis. Thorax punctatus, ferrugineus, immaculatus. Elytra striata, nigra. Corpus ferrugineum.

punctatilis.

65. *E. niger*, thorace punctato, elytris crenato-striatis, antennis tibiisque testaceis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Statura omnino et magnitudo *E. flavipedis*, at distinctus. Caput et thorax punctata, nigra. Elytra crenato-striata, parum pubescentia, colorata. Antennae valde ferratae et pedes ferruginea.

flavipes.

66. *E.* thorace obscure nigro, elytris striatis fuscis, pedibus testaceis. Ent. syst. 2. 226. 45. *

Elytra flavipes. Oliv. Inf. 2. 31. tab. 2. fig. 17.

Habitat in America. D. v. Rohr.

rufidens.

67. *E.* thorace fusco: angulis posticis rufis, elytris pubescentibus striatis, obscure rufis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Statura et magnitudo *E. castanipedis*. Caput et thorax fusca, obscura, angulis posticis acutis, rufis. Elytra pubescentia, striata, obscure rufa. Corpus fuscum, pedibus rufis.

castanipes. 68. *E. fuscus*, cinereo-subvillosus, antennis tibiisque testaceis.

Ela

Elater castaneus. Ent. syst. 2. 226. 46. *

Habitat in Insula Guadeloupe. Mus. D. de Sehestedt.

69. *E. ferrugineus*, elytris nigro-punctatis. Ent. *maculatus*
syst. 2. 227. 47. *

Elater maculatus. Oliv. Inf. 2. 31. tab. 2. f. 18.

Habitat in America meridionali.

70. *E. ater*, thorace rufo, antennarum articulo ter-
tio basi spinoso. *spinicornis*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.

D. de Sehestedt.

Animalculum singulare, *E. ruficollis* paullo maius.

Caput nigrum, antennis ferratis: articulo primo longiori, subincuruo, secundo breui, rotundato, tertio paullo longiori; basi dente valido exserto. Thorax gibbus, rufus. Elytra striata, atra. Corpus fuscum.

71. *E. fuscus*, obscurus; elytris striatis, piceis, ab-
dominis margine ferrugineo. *baemor-
rboidalis*.

Habitat in Austria. D. Scheidler.

Statura et magnitudo *E. filiformis*. Caput et thorax subpunctata, fusca, obscura. Elytra striata, picea. Abdomen piceum, margine segmentorumque marginibus ferrugineis. Pedes nigri.

72. *E. villosus*, cinereo-fuscus, immaculatus. Ent. *filiformis*.
syst. 2. 227. 48. *

Elater filiformis. Oliv. Inf. 2. 31. tab. 4. f. 41.

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

73. *E. ferrugineus*, thorace lineis duabus, elytris *2lineatus*.
margine nigris.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.

D. Lund.

Corpus medium; ferrugineum. Caput immaculatum. Thorax punctatus: lineis duabus; marginem anticum haud attingentibus, nigris. Scutellum

tellum nigrum: Elytra striata, ferruginea: margine exteriori nigro. Sutura in medio parum nigricat.

Alopex.

74. *E. fusco-ferrugineus*, fulvo-tomentosus, elytris striatis: macula baseos obsoleta, rufa.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Statura praecedentis, paullo minor. Corpus totum obscure ferrugineum, tomento fulvo tectum. Elytra striata, basi parum rufa.

tristis.

75. *E. thorace atro-nitido*, elytris basi margineque exteriori liuidis. Ent. syst. 2. 227. 49. °

Elater tristis. Linn. syst. Nat. 2. 655. 26. Fn. Sv. 736.

Oliv. Inf. 2. 31. tab. 4. fig. 39.

Schaeff. Icon. tab. 194. fig. 1.

Payk. Fn. Sv. 3. 29. 33.

Degeer Inf. 4. 158. 20.

Habitat in Europae ligno putrescente.

marginatus.

76. *E. thorace fusco*, elytris testaceis: margine vndique nigro. Ent. syst. 2. 227. 50.

Elater marginatus. Linn. syst. Nat. 2. 655. 26. Fn. Sv. 736.

Oliv. Inf. 2. 31. tab. 8. fig. 29.

Act. Nidros. 3. 16. tab. 6. fig. 6.

Payk. Fn. Sv. 3. 5. 6.

Habitat in Europae plantis.

thoracicus

77. *E. niger*, thorace rufo. Ent. syst. 2. 227. 51.

Geoff. Inf. 1. 132. 5.

Oliv. Inf. 2. 31. tab. 3. fig. 24.

Voet. Col. 1. tab. 42. fig. 6.

IV. 29.

Schaeff. Icon. tab. 31. fig. 3.

Habitat in Anglia et Gallia.

78. *E. niger*, thorace postice rubro, nitido. Ent. *ruficollis*.
 Syst. 2. 227. 52.
Elater ruficollis. Linn. Syst. Nat. 2. 655. 14.
 Fn. Sv. 724.
 Oliv. Inf. 2. 31. tab. 6. fig. 61.
 Degeer Inf. 4. 153. 16.
 Payk. Fn. Sv. 3. 38. 43.
 Habitat in Europae graminosis.
79. *E. thorace rufo: medio nigro, elytris corpore-brunneus.*
 que ferrugineis. Ent. Syst. 2. 228. 53.
Elater brunneus. Linn. Syst. Nat. 2. 653. 10.
 Fn. Sv. 721.
 Oliv. Inf. 2. 31. tab. 3. fig. 30.
 Schaeff. Icon. tab. 151. fig. 5. 6.
 Herbst. Arch. tab. 27. fig. 6.
 Degeer Inf. 4. 158. 19.
 Payk. Fn. Sv. 3. 28. 32.
 Habitat in Europae plantis.
80. *E. capite thoraceque nigris, fugaci-aureis, ely-fugax.*
 tris striatis castaneis.
 Habitat in Austria. D. Scheidler.
 Statura et magnitudo *E. brunnei*. Caput et thorax nigra, tomento fugaci, aureo, tecta. Elytra striata, testacea. Pedes testacei, femoribus nigris.
81. *E. niger*, thorace pubescente fulvo, elytris striatis sanguineis. Ent. Syst. 2. 228. 54. * *baematodes.*
Elater baematodes. Oliv. Inf. 2. 31. tab. 1. f. 6.
Elater purpureus. Herbst. Arch. tab. 27. fig. 10.
Elater sanguineus. Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 9.
 Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 6. 1744. 30. 16. 11
 Habitat in Germania.
82. *E. niger*, thorace elytrisque fulvis. *pyrrhopterus.*
Elater pyrrhopterus. Oliv. Inf. 2. 31. tab. 7. f. 66, rus.
 Habi-

Habitat in Gallia. Mus. D. Bosc.

Statura et magnitudo omnino E. haematodae.

Caput atrum. Thorax punctatus, canaliculatus, fulvus. Scutellum nigrum. Elytra striata, fulva. Corpus nigrum.

sanguineus 83. E. ater, elytris striatis, sanguineis, immaculatis.
Ent. syst. 2. 228. 53.

Elater sanguineus. Linn. syst. Nat. 2. 654. 21.

Fn. Sv. 731.

Geoff. Inf. 1. 131. 2.

Oliv. Inf. 2. 31. tab. 1. fig. 7. tab. 5. fig. 48.

Degeer Inf. 4. 151. 13.

IV. 29. 31 Schaeff. Icon. tab. 31. fig. 7.

Panz. Fn. Germ. 5. tab. 13.

Payk. Fn. Sv. 3. 33. 37.

Habitat in Europae hortis.

Varietas maior, thorace magis fulvo pubescente, elytris magis coloratis lituraque obsoleta basios nigras; vix differt.

ephippium. 84. E. ater, elytris striatis sanguineis: macula communi dorsali nigra. Ent. syst. 2. 228. 54.*

Oliv. Inf. 2. 31. tab. 5. fig. 48. b.

Herbst Arch. tab. 27. fig. 9.

IV. 29. 31 Schaeff. Icon. tab. 31. fig. 5.

Voet. Col. tab. 43. fig. 11.

Panz. Fn. Germ. 5. tab. 14.

Habitat in Germaniae Pinis putrescentibus.

Varietatem praecedentis credit D. de Paykull.

praeustus. 85. E. ater, elytris striatis sanguineis, apice nigris.
Ent. syst. 2. 229. 57.*

IV. 30. 31 *Elater sanguineus*. Payk. Fn. Sv. 3. 33. 37. 3.

IV. 31 Habitat in Germaniae Pinis putrescentibus. Dom. Smidt.

testaceus. 86. E. niger, elytris striatis pedibusque testaceis.
Ent. syst. 2. 229. 58.*

Ela

Elater testaceus. Payk. Fn. Sv. 3. 15. 16.

Habitat in Germania. D. Schneider.

87. *E. ater*, capite thoracisque lateribus aureis.

Habitat in Carolina. Muf. D. Bosc.

Statura et magnitudo praecedentium. Caput aureum, nitidum, antennis ferratis, nigris. Thorax canaliculatus, ater, lateribus late aureis. Elytra crenato-friata, atra, immaculata.

penicillatus.

88. *E. elytris antice dimidiato rufis, corpore nigro*. *balteatus*.

Ent. fyft. 2. 229. 59.

Elater balteatus. Linn. fyft. Nat. 2. 654. 22.

Fn. Sv. 732.

Oliv. Inf. 2. 31. tab. 8. fig. 77.

Degeer Inf. 4. 152. 14.

Schaeff, Icon. tab. 77. fig. 2.

Voet. Col. 1. tab. 43. fig. 10.

Payk. Fn. Sv. 2. 31. 35.

Habitat in Europae hortis.

1732 (H. 76)

89. *E. niger, obscurus, elytris friatis: macula ob-lateralis*.

longa marginali baseos flauicante. Ent. fyft. 4.

App. 452. 59.*

Habitat in Germania. D. Schneider.

90. *E. ater, elytris testaceis, apice nigris*. Ent. fyft. *elongatulus*.

2. 229. 60.*

Elater elongatulus. Oliv. Inf. 2. 31. tab. 6. f. 58.

Habitat in Austria. D. Saldoner.

91. *E. fanguineus, capite thoracis linea dorsali elytrorumque apicibus nigris*. Ent. fyft. 2. 229. *melanocephalus*.

61.*

Elater melanocephalus. Oliv. Inf. 2. 31. tab. 4. fig. 36.

Thunb. nou. sp. Inf. 3. 63.

Habitat in Coromandel. Muf. D. Banks.

92. *E.*

- vespertinus* 92. *E. testaceus*, thorace vittis duabus, elytris margine futuraque nigris.
 Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.
 Magnitudo *E. sputatoris*. Caput fuscum, antennis rufis. Thorax vix punctatus, testaceus: vittis duabus dorsalibus, latis, nigris. Elytra striata, testacea, margine futuraque nunc latius, nunc angustius nigris. Corpus testaceum.
- discoideus*. 93. *E. ater*, coleoptris striatis: limbo albo.
 Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.
 Medius. Caput et thorax punctata, atra, immaculata. Elytra striata, atra, margine baseos laterali que late albo. Sutura atra. Corpus atrum.
- sputator*. 94. *E. thorace fusco*, nitido, elytris cinereis, corpore nigro. Ent. syst. 2. 230. 62.
Elater sputator. Linn. syst. Nat. 2. 654. 24.
 Fn. Sv. 734.
 Oliv. Inf. 2. 31. tab. 4. fig. 31.
 Degeer Inf. 4. 151. 11.
 Schaeff. Icon. tab. 19. fig. 2.
 Payk. Fn. Sv. 3. 20. 23.
 Habitat in Europae hortis.
- analis*. 95. *E. niger*, elytris, ano pedibusque testaceis. Ent. syst. 2. 230. 63. *
 Habitat in Germania.
- elegans*. 96. *E. niger*, thoracis marginibus, elytrorum vitta pedibusque testaceis. Ent. syst. 2. 230. 64. *
 Habitat in Americae meridionalis Insulis. Dom. Smidt.
- filum*. 97. *E. filiformis*, niger, antennis pedibusque testaceis.
 Habitat in Austria. D. de Meyerle.
 Statura et magnitudo *E. elegantis*, at omnino filiformis. Thorax vix canaliculatus, niger, obscurus. Elytra striata, nigra, immaculata.

98. *E.*

98. *E. thorace fusco - obscuro, elytris striatis testaceis.* Ent. syst. 2. 230. 65. *

Elater variabilis Payk. Fn. Sv. 3. 26. 30.

Elater obtusus. Degeer Inf. 4. 147. 5. tab. 5. fig. 19.

Habitat in Europae truncis emortuis. D. Smidt.

99. *E. fuscus, cinereo-subvillosus, elytris striatis pilosus.*

Ent. syst. 2. 231. 66. *

Elater pilosus. Leske Itiner. 1. 11. 1. tab. A. fig. 1.

Payk. Fn. Sy. 3. 25. 29.

IV. 02 1711. 36.

Habitat in Lusatiae montibus. D. Prof. Leske.

100. *E. ater, elytris striatis, obscure aeneis.* Ent. *melancholicus.* syst. suppl. 139. 66. *

IV. 32

Elater melancholicus. Payk. Fn. Sv. 3. 17. 20.

Habitat in Dalecarliae Alpibus. D. de Paykull.

101. *E. tomentosus, liuens, thorace elytrisque obscurioribus.* Ent. *longicollis.* syst. 2. 231. 67. *

Elater longicollis. Oliv. Inf. 2. 31. tab. 8. f. 81.

III. 01. IV. 33

Habitat in Gallia.

102. *E. fuscus, elytris striatis, antennis pedibusque pallidis.* Ent. syst. 2. 231. 68. *

Habitat Tranquebariae. Dom. Hybner.

103. *E. niger, elytris fuscis.* Ent. syst. 2. 231. 69. * *striatus.*

Elater striatus. Payk. Fn. Sv. 3. 27. 31.

Elater fuscus. Act. Holm. 1774. 4. 254. f. 1-3.

Elater lineatus. Oliv. Inf. 2. 31. tab. 3. fig. 32.

III. 01. IV. 33

Habitat larva in radicibus segetis, agros devastans. D. de Paykull.

104. *E. nigricans, fulvo-tomentosus, capite elytrorumque maculis duabus ferrugineis.* *erythrocephalus.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muf.

D. Lund.

T. II.

Q

Me-

Medius. Caput nigrum, antennis fuscis. Thorax punctatus, fulvo-tomentosus, nigricans. Elytra substriata, tomentosa, nigricantia: maculis duobus magnis, ferrugineis. Pedes ferruginei.

- rufipes.* 105. *E. ater*, thorace nitido, elytris striatis, pedibus rufis. Ent. syst. 2. 231. 70. *
- Elater rufipes.* Oliv. Inf. 2. 31. tab. 7. fig. 72.
 Geoff. Inf. 1. 136. 14.
 Payk. Fn. Sv. 3. 39. 45.
 Habitat Halae Saxonum. D. Hybner.
- minutus.* 106. *E. thorace* atro nitido, elytris pedibusque nigris. Ent. syst. 2. 231. 71. *
- Elater minutus.* Linn. syst. Nat. 2. 656. 34.
 Fn. Sv. 744.
 Oliv. Inf. 2. 31. tab. 6. fig. 62.
 Payk. Fn. Sv. 3. 40. 46.
 Degeer. Inf. 4. 159. 21.
 Habitat in Europa.
- tridentatus.* 107. *E. cinereus*, thorace postice tridentato. Ent. syst. suppl. 139. 71. *
- Habitat Tranquebariae. D. Daldorff. Mus. D. de Sehestedt.
- pallens.* 108. *E. ater*, elytris striatis pedibusque testaceis. Ent. syst. 2. 233. 72. *
- Geoff. Inf. 1. 139. 19.
 Habitat in Gallia. Mus. D. Bosc.
- limbatus.* 109. *E. thorace* atro-nitido, elytris testaceis: limbo nigro. Ent. syst. 2. 232. 73. *
- Elater limbatus.* Thunb. nov. sp. Inf. 3. 64.
 Oliv. Inf. 2. 31. tab. 7. fig. 73.
 Payk. Fn. Sv. 3. 43. 49.
 Habitat Kiliae, Mus. D. Lund.

110. *E. nigro-aeneus*, elytris striatis, pedibus rufis. *riparius*.

Ent. syst. 2. 232. 74. *

Elater politus, ater, nitidus, elytris striatis, pedibus anticis pallidis. Ent. syst. 2. 234. 82. * *III 5034*
vix differt.

Elater riparius. Payk. Fn. Sv. 3. 41. 47.

Panz. Fn. Germ. 34. tab. 12.

Habitat ad ripas Sueciae boreales. D. de Paykull.

111. *E. nigro-aeneus*, thorace nitido, antennis pedibusque nigris. *Bructeri*.

Panz. Fn. Germ. 34. tab. 13.

Habitat in Austriae montibus. D. de Meyerle. *III 434*

Magnitudo *E. riparii*, at magis oblongus. Thorax punctatus, nitidulus. Elytra striata, obscuriora. Pedes nigri.

112. *E. ater*, elytris striatis pedibusque obscure cinereis. *aduena*.
Ent. syst. 2. 232. 75. *

Habitat ad Bizertam in Hispania. D. Prof. Vahl.

113. *E. elytris striatis*: maculis duabus, antennis nitidulus.
pedibusque flavis. Ent. syst. 2. 232. 76.

Habitat in Cayenna. D. v. Rohr.

114. *E. capite thoraceque atris*, elytris nigris: maculis flavescentibus, pedibus flavis. *pulchellus*.
Ent. syst. 2. 233. 77. *

Elater pulchellus. Linn. syst. Nat. 2. 656. 35.

Fn. Sv. 745.

Oliv. Inf. 2. 31. tab. 4. fig. 38. *IV# 35*

Herbst. Arch. tab. 27. fig. 7.

Payk. Fn. Sv. 3. 22. 25.

Habitat in Europae hortis.

115. *E. ferrugineus*, thoracis dorso, elytrorum macula fasciaque nigris. *angulatus*.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muf.

D. Lund.

Parvus. Caput nigrum. Thorax vix punctatus niger, margine laterali et postico testaceis. Elytra striata, ferruginea. Macula ante medium oblonga fasciaque postica vtrinque dilatata nigris. Corpus ferrugineum.

scriptus.

116. *E. ferrugineus*, thoracis linea elytrorum fasciis tribus angulatis atris.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Statura et magnitudo omnino praecedentis. Caput nigrum, antennis ferrugineis. Thorax vix punctatus, rufus margine tenuissimo lineaque dorsali latiore nigris. Elytra striata, ferruginea: fasciis tribus nigris, anticis vngulatis, vltima apicis.

V nigrum. 117. *E. ferrugineus*, thoracis linea dorsali elytrorumque V nigris.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Statura praecedentium, at paullo minor. Caput ferrugineum. Thorax ferrugineus, nitidus, linea dorsali atra. Elytra striata, ferruginea, pone medium V nigro-notata. Corpus ferrugineum.

2guttatus. 118. *E. niger*, elytris striatis: macula media rufa. Ent. syst. 2. 233. 78. *

Elater 2guttatus. Oliv. Inf. 2. 31: tab. 6. fig. 59
Habitat in Gallia meridionali. Mus. D. Olivier.

equestris. 119. *E. ater*, nitens, elytris fascia lata fulva. Ent. syst. suppl. 140. 78. *

Elater merdelloides. Jaqu. Miscellan.

Lin. 536

Elater cinctus. Panz. Fn. Germ.

Habitat in Germania. Dom. Mauerhoff.

120. *E. niger*, elytris testaceis: punctis duobus nigris. Ent. syst. suppl. 140. 78. * *2punctatus*
 Habitat in Tanager. Dom. Schousboe. Mus. D. Lund.
121. *E. niger*, elytris testaceis, apice nigris: puncto albo. Ent. syst. 2. 233. 79. * *2maculatus.*
Elater maculatus. Oliv. Inf. 2. 31. tab. 5. fig. 10.
 Ross. Fn. Etr. 1. tab. 3. fig. 10. *178. 36.*
 Habitat in Gallia meridionali. Dom. Olivier.
122. *E. ater*, nitidus, elytris testaceis, apice atris. *melanurus*
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.
 Statura parva praecedentium. Caput et thorax atra, nitida, immaculata. Elytra laevia, testacea: margine exteriori apiceque late atris. Corpus atrum.
123. *E. niger*, elytris striatis, testaceis: maculis tribus nigris. Ent. syst. 2. 233. 80. * *3maculatus.*
 Habitat-Halae Saxonum. Dom. Hybner.
124. *E. supra niger*, thoracis limbo maculisque duobus elytrorum testaceis. Ent. syst. 2. 233. 81. * *6bis 2maculatus.*
 Habitat in Italia. Dr. Allioni.
125. *E. ferrugineus*, nitidus, elytris striatis: fascia media nigra. *unifasciatus.*
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.
 Corpus parvum, ferrugineum. Elytra striata, fascia media ad marginem exteriorem dilatata, nigra. Antennae et pedes ferruginea.
126. *E. laevis*, ater, elytris punctis tribus albis. Ent. syst. 2. 234. 83. * *6guttatus.*
Elater sexguttatus. Thunb. nou. sp. 3. 65. fig. 75.
 Habitat ad Cap. Bon. Spei. 127.

Alni.

127. *E. ater*, nitidus, elytris striatis rufis: macula postica oblonga nigra.

Habitat in Suecia. Dom. de Gyldenhal. Mus. D. Lund.

Paruus. Caput et thorax atra, nitida, immaculata. Elytra striata, rufa, pone medium macula oblonga, lineari, nigra. Corpus nigrum, antennis pedibusque rufis.

pufillus.

128. *E. ater*, elytris testaceis: sutura atra.

Habitat in Germania. D. Prof. Helwig. Mus. D. de Sehestedt.

Paruus. Caput et thorax atra, nitida, laevia. Elytra vix striata, flava: sutura atra.

pygmaeus. 129. *E. niger*, obscurus, tibiis piceis. Ent. syst. 2. 234. 84.*

Elater pygmaeus. Payk. Fn. Sv. 3. 42. 48.

Habitat in Germaniae truncis putrescentibus. Dom. Smidt.

variegatus 130. *E. ater*, thorace elytrisque cinereo-variegatis. Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. Dom. Lund.

Corpus paruum, latiusculum. Thorax lateribus lineaque dorsali duplicata cinereis. Elytra basi parum, fascia media lata: puncto nigro, apiceque cinereis. Pedes nigri.

3fasciatus. 131. *E. cinereus*, thoracis dorso elytrorum sutura fasciisque tribus nigris.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. de Sehestedt.

Corpus minutum. Caput cinereum, immaculatum. Thorax fuscus, margine cinereo. Elytra substriata, cinerea, sutura fasciisque tribus nigris, quarum prima abbreviata.

132. *E. thorace rufo*: nigro bimaculato, elytris basi *notatus*.
rufis, apice nigris. Ent. syst. 2. 234. 86. *

Elater notatus. Oliv. Inf. 2. 31. tab. 4. fig. 37.

Habitat in Coromandel. Mus. Dom. Banks.

133. *E. thorace ferrugineo*, elytris atris: fasciis *festivus*.
duabus flavis. Ent. syst. 2. 235. 87. *

Elater festivus. Thunb. nov. sp. 3. 64. fig. 74.

Habitat in Aegypto. Prof. Forstkahl.

134. *E. niger*, nitidus, elytris puncto baseos rubro. *2pustulatus*
Ent. syst. 2. 235. 88. *

Elater 2pustulatus. Linn. syst. Nat. 2. 642. 9.

Geoff. Inf. 1. 136. 15.

Oliv. Inf. 2. 31. tab. 2. fig. 13.

Schaeff. Icon. tab. 104. fig. 6.

177. 37.

Herbst. Arch. tab. 27. fig. 8.

Voet. Coleopt. 1. tab. 44. fig. 22.

Payk. Fn. Sv. 3. 30. 34.

Habitat in Germaniae nemoribus.

135. *E. niger*, elytris striatis: puncto albo. *2notatus*.

Elater binotatus. Ross. Fn. Estr. Mant. 59. 144.

Habitat in Italia. Mus. D. Lund.

Statura parva *E. 2pustulati*. Caput et thorax fusca, immaculata. Elytra striata, puncto medio albo. Antennae et pedes ferruginea.

Variat puncto altero baseos rufo.

136. *E. thorace ferrugineo*: dorso atro, elytris striatis nigris: maculis duabus posticis rufis. *4punctatus*

Habitat in India. D. Daldorff. Mus. D. Lund.

Statura parva praecedentium. Caput atrum, antennis ferrugineis. Thorax laevis, rufus, dorso late atro. Elytra striata, nigra: maculis duabus pone medium rufis. Corpus nigrum, pedibus rufis.

*† pustula-
tus.*137. *E. niger*, elytris striatis: punctis duobus testaceis. Ent. syst. 2. 235. 89. **Elater pustulatus*. Payk. Fn. Sv. 3. 44. 51.

Habitat Halæ Saxonum. Dom. Hybner.

Minutus, distinctus, maculis duobus elytrorum testaceis.

131. LVCANVS. *Ligula bifida*, penicillata.*Antennae* pectinato-fissiles.*Alces.*1. *L. mandibulis* exsertis apice quadridentatis. Ent. syst. 2. 236. 1. *

Oliv. Inf. 1. 8. 1. tab. 2. fig. 3.

Petiv. Gazoph. tab. 57. fig. 15.

Habitat in Asia.

*Giraffa.*2. *L. mandibulis* exsertis, depressis: dentibus plurimis difformibus, labio rotundato. Ent. syst. 4.

App. 452. 1. *

Lucanus Giraffa. Oliv. Inf. 1. 1. tab. 5. fig. 16.

Habitat in Asia.

*Ceruus.*3. *L. mandibulis* exsertis, unidentatis, apice bifurcatis, labio deflexo: ruga transuersa, eleuata. Ent. syst. 2. 236. 2.*Lucanus Ceruus*. Linn. syst. Nat. 2. 559. 1.

Fn. Sv. 405.

Geoff. Inf. 1. 61. 1. tab. 1. fig. 1.

Roef. Inf. 2. Scarab, 1. tab. 4. 5.

Degeer

Lucani corpus magnum, oblongum, depressum, glabrum, immarginatum, tardum; capite magno, plano, exserto, sere quadrato; mandibulis saepius exsertis, corniformibus; oculis rotundatis, marginalibus; antennis distantibus, subter apicem capitis proeminulum insertis, longitudine thoracis; thorace transuerso, utrinque deflexo, scutello rotundato; elytris rigidis, fornicatis, longitudine abdominis; pedibus validis, cursoriis; tarsis quinquearticulatis; colore nigro.

- Degeer Inf. 4. tab. 12. fig. 1. 7)
- Schaeff. Icon. tab. 133. fig. 11.
- Herbst. Col. 3. tab. 33. fig. 1. 2.
- β. *Lucanus Dercas*. Myll. Zool. Dan. 444.
- Platycerus fuscus*: Geoff. Inf. 1. 60. 2.
- Roef. Inf. 2. tab. 5. fig. 8.
- Schaeff. Icon. tab. 133. fig. 2.
- Oliv. Inf. 1. 8. 1. tab. 2. fig. 3. 6.
- Habitat in Europae ligno putrescente.
- Larva* obesa, albida, capite pedibusque ferrugineis.
4. L. mandibulis exsertis, videntatis, apice bifurcatis, labio deflexo, conico. Ent. syst. 2. 237. 3. * *Elaebus.*
- Oliv. Inf. 1. 12. 4. tab. 3. fig. 7.
- Habitat in Virginia.
5. L. mandibulis exsertis: denticulis mediis difformibus, apice bifurcatis, Ent. syst. 2. 237. 4. * *Capreolus.*
- Lucanus Capreolus*. Linn. syst. Nat. 2. 560. 2.
- Amoen. acad. 6. 391. 4. Mus. Lud. Vlr. 30.
- Lucanus Capra*. Oliv. Inf. 1. 12. 3. tab. 1. fig. 1.
- Voet. Coleopt. tab. 29. fig. 3.
- Sulz. Hft. Inf. tab. 2. fig. 1.
- Herbst. Col. tab. 39. fig. 4.
- Habitat in Germania.
6. L. mandibulis exsertis, intus bidentatis, longitudine capitis. Ent. syst. 2. 237. 5. * *Dama.*
- Degeer Inf. 4. tab. 19. fig. 11. 12.
- Oliv. Inf. 1. 15. 8. tab. 2. fig. 4.
- Habitat in Virginia.
7. L. mandibulis exsertis, tridentatis, niger, femoribus ferrugineis. Ent. syst. 2. 237. 6. * *femoratus.*
- Oliv. Inf. 1. 17. 10. tab. 4. fig. 12.
- Habitat in Cajenna. Mus. Dom. Banks.

Bison.

8. *L. mandibulis* exsertis, multidentatis, thoracis elytrorumque margine rubro. Ent. syst. 2. 238. 7. *

Lucanus Bison. Oliv. Inf. 1. 13. 5. tab. 3. fig. 6.

Voet. Coleopt. tab. 30. fig. 6.

Habitat in America meridionali.

Gazella.

9. *L. mandibulis* intus bidentatis, ater, elytrorum margine testaceo. Ent. syst. 2. 238. 8. *

Lucanus Gazella. Oliv. Inf. 1. 13. tab. 4. fig. 13.

Habitat in Siam. Mus. Dom. Banks.

Lama.

10. *L. mandibulis* exsertis, tridentatis, capite brevioribus, thorace angulato. Ent. syst. 2. 238. 9. *

Lucanus Lama. Oliv. Inf. 1. 14. 17. t. 3. f. 8.

Habitat in India orientali.

fulvialis.

11. *L. mandibulis* exsertis, basi dentatis testaceis: linea dorsali atra. Ent. syst. 2. 238. 10. *

Lucanus dorsalis. Oliv. Inf. 1. 16. 9. tab. 5. fig. 12.

Habitat — —

Saiga.

12. *L. mandibulis* exsertis multidentatis, labio abbreviato emarginato. Ent. syst. 4. Append. 452. 3. *

Lucanus Saiga. Oliv. Inf. 1. tab. 5. fig. 18.

Lucanus Elaphus. Herbst. Col. tab. 33. fig. 6.

Voet. Col. 1. tab. 30. fig. 5.

Habitat in America meridionali.

Taurus.

13. *L. mandibulis* exsertis, longitudine capitis, intus bidentatis, corpore subpunctato.

Habitat in Sumatra. D. Daldorff.

Magnitudo *L.* parallelepipedl. Mandibulae exsertae, intus dentibus duobus validis, approximatis, obtusis. Corpus totum obscurum punctis parvis impressum.

Alter

Alter forte sexus mandibulis capite longioribus,
capiteque antice quadridentato, elytris striatis.

14. *L. mandibulis exsertis videntatis, capite acuminato.*

Habitat in Sumatra. D. Daldorff. Mus. D. de Sehestedt.

Minor *L. Tauro*. Caput planum, punctatum, antice acuminatum, marginēque vtrinque sinuato. Mandibulae porrectae, planae, longitudine capitis, medio interiori videntatae. Thorax brevis, transuersus, punctatus. Elytra striata.

15. *L. mandibulis exsertis lunatis, planis, videntatis, corpore laeni atro.* *Barbarossa*

Habitat in Tanager. D. Schousboe. Mus. D. Lund.

Statura et magnitudo *L. Danae*. Totus glaber, ater. Mandibulae longitudine capitis supra planae et canaliculae, intus videntatae. Abdomen parum rufo-pubescens.

16. *L. mandibulis dente laterali elevato, corpore depresso.* Ent. syst. 2. 239. 11. *parallelepipedus.*

Lucanus parallelepipedus. Linn. syst. Nat. 2. 561. 6.

Geoff. Inf. 1. 62. 3.

Oliv. Inf. 1. 17. 11. tab. 4. fig. 9.

Voet. Col. tab. 30. fig. 7.

Schaeff. Icon. tab. 63. fig. 7.

Degeer. Inf. 4. tab. 12. fig. 9.

Payk. Fn. Sv. 3. 47. 2.

Herbst. Col. 3. tab. 34. fig. 5.

Habitat in Europae sylvis.

17. *L. mandibulis exsertis inermibus, capitis thoracisque lateribus punctatis.* *inermis.*

Habitat in Sumatra. D. Daldorff.

Statura et summa affinitas *L. parallelepipedi*, at mandibulae inermes. Caput punctatum. Tho-

rax

- ...: dorso laeni, nitido, lateribus punctatis.
Elytra subpunctata. Corpus nigrum.
- des.* 18. L. mandibulis incurvis: intus dente inorassato
difformi, elytris punctatis subpubescentibus.
Ent. Syst. 2. 239. 12.
Lucanus cancroides. Oliv. Inf. 1. 18. 12. tab. 4.
fig. 11.
Habitat in Terra Diemenii. Mus. D. Banks.
- lunatus.* 19. L. mandibulis exsertis lunatis: dente baseos acu-
to, elytris striatis.
Lucanus lunatus. Weber Inf. 83. 1.
Habitat in Sumatra. D. Daldorff.
Paruus in hoc genere: Mandibulae exsertae, ca-
pite paullo longiores, lunatae, haud forfica-
tae, acutae, basi interiori dente acuto. Caput
et thorax plana, punctata, atra, nitida. Elytra
striata, atra.
- piceus.* 20. L. mandibulis exsertis videntatis, piceus, fron-
te recta.
Lucanus piceus. Weber Inf. 84. 2.
Habitat in America. D. Weber.
Magnitudo L. lunati. Caput magnum, punctatum,
mandibulis exsertis: dente medio validissimo.
Frons valde retusa. Thorax punctatus, piceus.
Elytra fulcata, picea.
- tenebroides.* 21. L. mandibulis lunatis videntatis, ater, thorace
marginato, elytris substriatis. Ent. Syst. 2. 239.
13.
Lucanus piceus. Bendsdorff. Act. Holm. 1785.
222. 5. tab. 8. fig. a.
Panz. Fn. Germ. 62. tab. 1.
Payk. Fn. Sv. 3. 48. 3.
Herbst. Col. 3. 314. 15.
Habitat in Europa boreali. D. Boeber.

22. *L. mandibulis exsertis videntatis, aser, thorace striatus.*
canaliculato, elytris crenato-striatis.

Lucanus striatus. Oliv. Inf. 1. tab. 4. fig. 14.

Habitat in India orientali.

Statura depressa praecedentium, at *L. parallelepipedo* duplo minor. Caput atrum, mandibulis porrectis, longitudine capitis, intus videntatis. Thorax laevis, nitidus, canaliculatus: canali lato, abbreviato, margine antico in medio parum eleuato. Elytra crenato-striata.

23. *L. coerulescens, mandibulis lunatis, thorace caraboides*
marginato. Ent. syst. 2. 239. 14.

Lucanus caraboides. Linn. syst. Nat. 2. 561. 7.

Fn. Sv. 407.

Geoff. Inf. 1. 63. 4.

Schaeff. Icon. tab. 6. fig. 8.

tab. 75. fig. 7.

Degeer Inf. 4. tab. 12. fig. 11.

Oliv. Inf. 1. 20. 14. tab. 2. fig. 2.

Panz. Fn. Germ. 58. tab. 13.

Voet. Col. tab. 30. fig. 8.

Payk. Fn. Sv. 3. 49. 4.

Herbst. Col. 3. 316. 10. tab. 34. fig. 6. 7.

Habitat in Europae locis suffocatis.

24. *L. virescens, abdomine pedibusque rufis. Ent. rufipes.*
syst. suppl. 139. 16. *

Panz. Fn. Germ. 58. tab. 14.

Herbst. Col. 3. tab. 34. fig. 8.

Schaeff. Icon. tab. 75. fig. 7.

Habitat in Germania.

Nimis praecedenti affinis.

25. *L. mandibulis inermibus, niger, thorace puncta-punctatus.*
to, elytris striatis.

Habitat in Sumatra. D. Daldorff. Mus. D. de Sehestedt,

Paulle

Paullo minor L. rufipede. Mandibulae exsertae breues, planae, acutae, inermes. Caput et thorax punctata, nigra. Elytra striata, nigra. Corpus nigrum, abdominis margine parum rufescente.

132. AESALVS. *Palpi* filiformes, inaequales
Maxilla breuissima, apice
 palpigera.
Antennae lamellatae.

Scarabaeoi. I. AESALVS.

des.

Lucanus scarabaeoides. Panz. Fn. Germ. 26. tab. 15. 16.

Habitat in Austria. D. de Creutzer.

Os maxillis palpisque. *Palpi* quatuor inaequales, filiformes: *anteriores* longiores, quadriarticulati: articulis subaequalibus; ultimo longiori, ovato, obtuso adhaerentes maxillae apici, *posteriores* breuiores, triarticulati: articulis aequalibus; ultimo obtuso, adnati sub labii apice. *Mandibula* breuis, cornea, arcuata, acuta, edentula. *Maxilla* breuissima, cornea, obtusa, apice palpigera. *Ligula* nulla? *Labium* breue, corneum, planum, truncatum, integrum.

VIII. 54.
39.40

Genus singulare ob maxillam breuissimam et vix ullam.

Statura breuis, parua, Scarabaei mobilicornis. *Antennae* nigrae, claua picea. *Mandibulae* maris exsertae, lunatae, superne cornu magno, erecto, compresso, obtuso, mandibula maiore, feminae breues, arcuatae, muticae. *Elytra* nigra, striis eleuatis, holosericeis, interruptis, atris.

133. PAS-

33. PASSALVS. *Palpi filiformes.*

Maxilla cornea, areuata,
dentata, apice acuta.

Antennae arcuato - lamel-
latae.

P. ater, vertice tuberculis tribus eleuatis: inter- *interru-*
medio maiori compresso. Ent. syst. 2. 240. 1. *ptus.*

Lucanus interruptus. Linn. syst. Nat. 2. 560. 4.

Mus. Lud. Vlr. 53.

Oliv. Inf. 1. tab. 3. fig. 5.

Degeer Inf. 4, tab. 19. fig. 13.

Sulz. Inf. tab. 2. fig. 2.

Voet. Coleopt. tab. 29. fig. 1.

Brown Jamaic. 429. tab. 44. fig. 7.

Petiv. Gazoph. tab. 27. fig. 7,

Weber Inf. 78. 1.

Habitat in Americae meridionalis Insulis sub sac-
charo putrescente.

Mandibulae tridentatae.

P. capite inaequali, mandibulis emarginatis, thorace *emargina-*
laeuissimo. *tus.*

Weber Inf. 81. 4.

Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff.

Statura omnino praecedentis, at distinctus. Man-
dibulae magnae, apice truncatae, emarginatae.

Caput inaequale, denticulis vix determinatis,
lateris sinistri maioribus. Thorax laeuis ferius,
ater,

Passali corpus elongatum, depressum, planum, immarginatum;
capite magno, inaequali, transverso, angulo antico promi-
nulo acuto; *oculis* paruis, globosis, marginalibus, vix pro-
minulis; *antennis* distantibus, sub capitis apicem insertis,
thorace brevioribus; *thorace* plano, canaliculato, subtus
tomentoso, ab abdomine remoto; *scutello* nullo; *elytris*
rigidis, planis, longitudine abdominis; *pedibus* validis;
surfis quinquearticulatis; colore nigro, nitido.

ater, nitidus: linea media haud impressa. Elytra striata, atra: margine inprimis baseos rufo barbato. Corpus piceum.

cornatus. 8. P. ater, verticis cornu eleuato incuruo, elytrorum striis omnibus laeuis.

Habitat in Carolina, Mus. Dom. Bosc.

Affinis certe P. interrupto, cuius marem olim credidi, at distinctus videtur paullo minor. Mandibulae crassae, dente laterali valido, apiceque obsoleti tridentatae. Capitis cornu distinctum eleuatum, incuruum. Thorax ater, in medio canaliculatus punctoque vtrinque impresso. Elytrorum striae omnes laeues.

barbatus. 4. P. ater, vertice antice quadridentato, elytris margine baseos rufo-hirtis.

Habitat in Guinea. Mus. D. de Sehestedt.

Nimis certe affinis P. dentato, at distinctus videtur maior. Caput inaequale, denticuli vtrinque duobus breuibus, incumbentibus. Thorax canaliculatus, ater, nitidus, lateribus punctatis, subtus rufo-hirtus. Elytra crenato-striata, basi margine rufo-hirta.

dentatus. 5. P. vertice antice multidentato, thorace sulcato: lateribus punctatis, elytrorum striis lateralibus punctatis. Ent. syst. 2. 241. 2. *

Weber Inf. 82. 5.

Habitat in India orientali.

bicolor. 6. P. depressus, niger, subtus rufus, vertice inaequali, thorace canaliculato.

Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff.

Praecedente duplo minor et magis depressus. Caput inaequale, denticulis plurimis, eleuatis, breuibus. Thorax laeuis, in medio valde canaliculatus. Elytra nigra, piceo-nitidula, crenato-striata. Corpus rufum.

7. *P. ferrugineus*, elytris testaceis. Ent. syst. 2. *minutus*.
241. 3. *

Habitat in Americae meridionalis Insulis. Dom.
Smidt.

Corpus vix pediculo maius.

134. PRIONVS. *Palpi* quatuor, filiformes.
Maxilla cylindrica, integra.
Ligula breuissima, membranacea.
Antennae setosae.

1. *P. thorace* crenato, marginato, videntato, ater, *fuliginosus*
elytris apice crenato-dentatis, thorace canali-
culato. Ent. syst. 2. 242. 2. *

Habitat in America. Mus. Britann.

2. *P. thorace* marginato, videntato, rufo: *mandibulis* inflexis, acutis, sterno spinoso. Ent. syst.
2. 243. 3. *

Prionus rostratus. Oliv. Inf. 2. 66. t. 10. f. 3p

Habitat in Siam. Mus. D. Banks.

3. *P. thorace* marginato, crenato, videntato, niger, *lineatus*.
albo-vittatus, elytris apice crenato-dentatis.
Ent. syst. 2. 243. 4. *

Cerambyx lineatus. Linn. syst. Nat. 2. 624. 14.

Sloan. Jam. 209. tab. 237. fig. 34.

Brown.

Prioni corpus magnum, oblongum, depressum, glabrum, taedum; *capite* magno, transverso, plano, inserto; *oculis* transversis, reniformibus, marginalibus; *antennis* distantibus, elongatis, supra mandibulas insertis; *thorace* plano, marginato: margine saepius dentato; *scutello* rotundato; *elytris* rigidis, fornicatis, immarginatis, longitudine abdominis; *pedibus* longiusculis, cursoriis; *tarsis* quadriarticulatis; *colore* saepius obscuro.

T. II.

R

Brown. Jam. 430. tab. 43. fig. 7.

Herbst. Arch. tab. 32. fig. 1.

Habitat in America. Mus. Britann.

nitidus.

4. P. thorace marginato, crenato, vnidentato, cyaneo, nitidus, elytris cupreis. Ent. syst. 2. 243.

5. *

Prionus nitidus. Oliv. Inf. 3. 66. t. 12. f. 48.

Habitat in Brasilia. Mus. Dr. Hunter.

Faber.

5. P. thorace marginato, vtrique vnidentato, elytris piceis, antennis mediocribus. Ent. syst. 2. 244.

6. *

Cerambyx Faber. Linn. syst. Nat. 2. 622. 6.

Fn. Sv. 646.

IV¹⁷

Panz. Fn. Germ. 9. tab. 5.

Frish. Inf. 13. 22. tab. 17.

Schaeff. Icon. tab. 72. fig. 3.

tab. 111. fig. 1.

Payk. Fn. Sv. 3. 50. 1.

Habitat in Europae ramis.

scabricornis.

6. P. thorace submarginato, vnidentato, subuilloso, nigricans, elytris fuscis: lineis duabus elevatis, antennis mediocribus. Ent. syst. 2. 244. 7. *

IV⁴⁰

Prionus scabricornis. Scopol. Carn. 174.

Cerambyx scabricornis. Oliv. Inf. 66. tab.

fig.

Fuesly Inf. Helv. 13. 241. tab. 1. fig. 3.

Geoff. Inf. 1. 210. 6.

Habitat in Europa australiori. Mus. D. Olivier.

depsarius.

7. P. thorace submarginato, vnidentato, pubescente, corpore nigricante, antennis breuibus rubris.

IV⁴¹

Ent. syst. 2. 244. 8.

Cerambyx depsarius. Linn. syst. Nat. 2. 624. 12.

Panz. Fn. Germ. 9. tab. 7.

Schaeff. Elem. tab. 67. fig. 3.

Payk.

PAYK. FR. SV. 3. 52. 3.

Habitat in Svecia. Mus. Dom. Zschuck.

Stiria

8. E. thorace submarginato, vnidentato, pubescente, *pallens*.
corpore pallido, antennis mediocribus. Ent.
syst. suppl. 141. 8. *

Habitat in Africa. Mus. D. Lund.

9. P. thorace marginato, bidentato, elytris mucrona- *mucrona-*
tis, rufis. Ent. syst. 2. 244. 9. * *tus.*

Habitat in America. Mus. D. Drury.

Corpus tomento aureo villosum.

10. P. thorace bidentato: dentibus arcuatis, niger, *arcuatus*.
elytris obtusis, testaceis. Ent. syst. 2. 245. 10.

Habitat in Terra Diemenii. Mus. Dom. Banks.

11. P. thorace marginato, tridentato, niger, elytris *maculatus*.
cinereo-maculatis. Ent. syst. 2. 245. 11. *

Prionus maculatus. Oliv. Inf. 66. tab. 4.

fig. 14.

Habitat in Senegallia. Mus. Gall.

12. P. thorace marginato, vtrinque tridentato, man- *cervicornis*
dibulis porrectis, extus vnispinosis, antennis
breuibus. Ent. syst. 2. 245. 12. *

Prionus cervicornis. Oliv. Inf. 66. tab. 2. fig. 8.

Cerambyx cervicornis. Linn. syst. Nat. 2. 622.

3. Mus. Lud. Vlr. 65.

Sloan. Jam. 2. tab. 237. fig. 6.

Merian. Sur. tab. 48.

Roef. Inf. 2. scarab. 2. tab. 1. fig. 8.

Brown. Jamaic. tab. 44. fig. 8.

Aubent. Miscell. tab. 90. fig. 3.

Voet. Coleopt. 2. tab. 2. fig. 45.

Habitat in Americae ligno Bombacis.

Larva edulis in deliciis.

*buphtal-
mus.*

13. P. thorace vtrinque tridentato, ater, nitidus, antennis breuibus: articulis vltimis, apice spinosis. Ent. syst. 2. 246. 14. *

Prionus spinicornis. Ent. syst. 2. 245. 13. *

Prionus tranquebaricus. Ent. syst. suppl. 141 10. *

Hussarus Ceylonensis. Voet. Coleopt. 2. tab. 3 fig. 11.

Habitat in India orientali. Mus. D. Lund.

forficatus.

14. P. thorace vtrinque tridentato, ater, elytris ferrugineis, antennis compressis, breuibus, mandibulis elongatis, forficatis, extus unidentatis. Ent. syst. suppl. 141. 15. *

Habitat in Tanger. Dom. Schousboe. Mus. Dom. Lund.

breuicornis.

15. P. thorace marginato, tridentato, atro, nitido, dente postico obtusissimo, antennis breuibus. Habitat in America boreali.

Statura et summa affinitas P. coriarii. Distinctus tamen videtur, paullo maior, antennis aliquantulum breuioribus, thorace latiore, nitido: dente postico obsoleto.

coriarius.

16. P. thorace marginato, tridentato, corpore piceo, antennis breuibus. Ent. syst. 2. 246. 15. *

Prionus coriarius. Oliv. Inf. 66. tab. 1. fig. 1

Geoff. Inf. 1. 198. tab. 3. fig. 9.

Linn. syst. Nat. 2. 622. 7. Fn. Sv. 647.

Degeer Inf. 5. 591. tab. 3. fig. 5.

Roef. Inf. 2. Scar. 2. tab. 1. fig. 1. 2.

Schaeff. Elem. tab. 102.

Icon. tab. 67. fig. 3.

tab. 9. fig. 1.

IV 48

Panz. Fn. Germ. 9. tab. 8.

Frish. Inf. 13. tab. 9.

- Payk. Fn. Sv. 3. 51. 2.
Habitat in Europae Betulis putridis.
17. P. thorace vtrinque bidentato, corpore nigro, *giganteus*.
elytris ferrugineis, antennis breuibus. Ent. syft. 2. 247. 16. *
- Cerambyx giganteus*. Linn. Mant. 1. 531.
Oliv. Inf. 66. tab. 6. fig. 21.
Aubent. Miscell. 1. tab. 64. fig. 2.
Habitat in Cajenna.
18. P. thorace marginato, tridentato, obscurus, pe- *cylindricus*
ctore abdomineque ferrugineis, antennis breui-
bus. Ent. syft. 2. 247. 17. *
- Cerambyx unicolor* Drury. Inf. 1. tab. 37. fig. 1.
Habitat in America boreali. Dom. Blackburn.
19. P. thorace marginato, vtrinque quadridentato, *armillatus*
elytris ferrugineis, nigro-marginatis. Ent. syft.
2. 247. 18. *
- Prionus armillatus*. Oliv. Inf. 66. t. 5. f. 17.
Cerambyx armillatus. Linn. syft. Nat. 2. 622. 4.
Petiv. Gazoph. 525. tab. 15. fig. 6.
Habitat in India.
20. P. thorace marginato, multispinoso, mandibulis *Luzonum*.
porrectis, unidentatis, apice bifidis, pedibus an-
ticis elongatis. Ent. syft. 2. 247. 19. *
- Petiv. Gazoph. tab. 74. fig. 1.
Habitat in Insulis Luzonum. Mus. Britt.
21. P. thorace marginato, multispinoso, mandibulis *ferripes*.
porrectis, apice tridentatis, pedibus spinoso-
ferratis. Ent. syft. 2. 248. 20. *
- Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. D. Banks.
22. P. thorace marginato, multidentato, mandibulis *mandibu-*
porrectis muticis. *laris*.
- Oliv. Inf. 66. tab. 8. fig. 31.

Ha-

Habitat in America meridionali. Dr. Pflug. Mus.
D. Lund.

Magnus in hoc genere. Mandibulae capite thora-
ceque longiores, lunatae, acutae, omnino iner-
mes. Caput canaliculatum, punctatum. Thorax
planus, inaequalis, margine multidentato. Ely-
tra picea, apice mucronata.

damicornis 23. P. thorace marginato, denticulato, mandibulis
porrectis, bidentatis, antennis breuibus. Ent.
fyft. a. 248. 21. *

Cerambyx damicornis. Linn. Mant. I. 532.

Degeer Inf. 5. 97. 2.

Drury Inf. I. tab. 38. fig. 1.

Habitat in America.

bifasciatus 24. P. thorace marginato, denticulato, corpore nigro,
elytris rubris: fasciis duabus, atris, antennis
breuibus. Ent. fyft. 2. 248. 22. *

Cerambyx bifasciatus. Linn. fyft. Nat. 2. 624.
16.

Gron. Zooph. 532. tab. 14. fig. 4.

Habitat in America.

Thomae. 25. P. thorace marginato, crenulato, corpore nigro,
elytris glabris, ferrugineis: margine luteo.
Ent. fyft. 2. 248. 23. *

Cerambyx Thomae. Act. Soc. Berol. 4. tab. 7.
fig. 9.

Habitat in Infula St. Thom. Americae.

bilineatus. 26. P. thorace marginato, albo, bilineato, elytris fer-
rugineis: atomis albis margineque luteo. Ent.
fyft. 2. 249. 24. *

Habitat in America. Dom. v. Rohr.

Vix a praecedente satis distinctus.

Amazonus 27. P. thorace marginato, denticulato, cyaneus, ely-
tris basi fasciaque rufis, apice aeneis.

Voet.

Voet. Col. tab. ^{III} 8. fig. 8.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. de Sehestedt.

Statura parua P. Thomae. Caput canaliculatum, cyaneum. Mandibulae exfertae, apice bifidae. Antennae longitudine corporis, cyaneae. Thorax inaequalis punctatus, cyaneus, magis obscurus margine multidentato. Elytra punctata, cyanea: margine exteriori baseos vsque ad fasciam fasciaque lata pone medium rufis. Elytra pone fasciam aenea, nitida. Corpus cyaneum, nitidum.

28. P. thorace marginato, crenato, capite sub mandibulis spinoso, mandibulis tridentatis. Ent. syst. spinibarbis
2. 249. 25. * J

Cerambyx spinibarbis. Linn. syst. Nat. 2. 624.
4. Mus. Lud. Vlr. 67.

Merian. Surin. 24. tab. 24.

Habitat in America meridionali.

29. P. thoracis lateribus scabris, multidentatis: dentate posteriori palmato, antennis breuibus. Ent. palmatus.
syst. 2. 249. 26. *

Oliv. Inf. 66. tab. 7. fig. 25.

Habitat in Guinea. Mus. D. Banks.

30. P. thoracis lateribus scabris, multidentatis, mandibulis breuibus, hirtis, dentatis. dentatus.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund. 6
+

Statura P. maxillofi, paullo minor. Mandibulae exfertae, capite multo breuiores, latae, intus dentatae, acutae. Caput punctatum, canaliculatum. Thorax minus planus, punctatus, lateribus scabris, multidentatis. Elytra laeuis, picea, apice rotundata.

- maxillofus* 31. P. thorace marginato, crenato, mandibulis porrectis, intus hirsutis, quadridentatis. Ent. fyft. 2. 249. 27. *
- Oliv. Inf. 66. tab. 1. fig. 3.
Drury Inf. 1. tab. 38. fig. 3.
Habitat in America. Mus. Britt.
- canaliculatus.* 32. P. thorace marginato, crenato: canali dorsali albo, villoso, antennis breuibus. Ent. fyft. 2. 250. 28. *
- Habitat in Americae Insulis. Mus. Dr. Hunter.
- cinnamomeus.* 33. P. thorace marginato, denticulato, mandibulis porrectis; tridentatis. Ent. fyft. 2. 250. 28. *
- Cerambyx cinnamomeus.* Linn. fyft. Nat. 2. 623. 10. Mus. Lud. Vlr. 66.
Oliv. Inf. 66. tab. 5. fig. 18.
Drury Inf. 1. tab. 40. fig. 2.
Sulz. Inf. tab. 5. fig. 2.
Merian Surinam. tab. 24.
Habitat in America meridionali.
- melanopus* 34. P. thorace marginato, dentato, mandibulis porrectis, multidentatis, elytris mucronatis. Ent. fyft. 2. 250. 30. *
- Cerambyx melanopus.* Linn. fyft. Nat. 2. 623. 8.
Cerambyx crenulatus. Drury Inf. 1. tab. 38. fig. 2.
Merian Surinam. tab. 24. fig. 1.
Habitat in America meridionali.
- crenatus.* 35. P. thorace marginato, crenato, elytris ferrugineis, capite canaliculato nigro.
Habitat in India. D. Smidt.
Magnus. Antennae nigrae, longitudine corporis. Mandibulae breues, crassae, medio interiori videntatae. Caput valde canaliculatum, nigrum. Thorax planus, marginatus: margine prominulo,

lo, crenato, obscurus, in medio maculis duabus eleuatis, atris. Elytra rugosa, ferruginea. Corpus obscurum.

36. P. thorace multidentato, nigro, elytris vnidentatis, testaceis. Ent. syst. 2. 250. 31. *

Habitat Tranquebariae. Dom. Hybner.

37. P. thorace marginato, integro, mandibulis ferrugineo-hirsutissimis, antennis mediocribus.

Ent. syst. 2. 250. 32. *

Habitat in America meridionali. Mus. D. Banks.

38. P. thorace submarginato, mutico, testaceus, antennis breuibus pectinatis. Ent. syst. 2. 251. 33. *

Oliv. Inf. 66. tab. . fig. .

Habitat in Senegallia. Mus. Dom. Geoffroy.

39. P. thorace submarginato, mutico, piceus, mandibulis exsertis, dentatis, antennis breuibus, simplicibus.

Habitat in America boreali. Mus. Dom. Banks.

Affinis videtur P. pectinicorni. Corpus paruum, totum piceum. Caput punctatum, mandibulis exsertis, medio vnidentatis apiceque emarginatis. Antennae breues, fere moniliformes: articulo primo crassiori, vltimis compressis. Thorax punctatus, vix marginatus, muticus. Elytra punctata.

135. CERAMBYX. *Palpi* quatuor, filiformes.
Maxilla obtusa, videntata.
Ligula bifida.
Antennae setaceae.

longimanus.

1. C. thorace spinis mobilibus, elytris basi videntatis apiceque bidentatis, antennis longis.
Prionus longimanus. Ent. syst. 2. 242. 1.
 Oliv. Inf. 66. tab. 3. fig. 12.
 tab. 4. fig. 12.
 Linn. syst. Nat. 2. 621. 1. Mus. Lud. Vlr. 64.
 Degeer Inf. 5. 102. 6.
 Sloan Jam. 2. 209.
 Grew. Mus. 161. tab. 13.
 Roef. Inf. 2. Scarab. 2. tab. 1. fig. 2.
 Aubent. Miscell. tab. 64. fig. 1.
 Habitat in America meridionali.

- moscbatus*. 2. C. thorace spinoso, viridis, nitens, antennis medio-
 cribus, cyaneis. Ent. syst. 2. 251. 1.
 Linn. syst. Nat. 2. 627. 34. Fn. Sv. 652.
 Oliv. Inf. 67. tab. 2. fig. 7.
 Degeer Inf. 5. 64. 2.
 Geoff. Inf. 1. 103. 5.
 Frisb. Inf. 13. tab. 11.
 Schaeff. Icon. tab. 11. fig. 7.
 tab. 55. fig. 1.

Voet.

Cerambyx corpus oblongum, angustum, depressiusculum, glabrum, immarginatum, tardum; *capite* ovato, inserto; *oculis* parvis, rotundatis, marginalibus; *antennis* elongatis, inter oculos insertis; *thorace* plano, rotundato, inaequali, vtrinque spinoso; *scutello* rotundato; *elytris* rigidis, fornicatis, longitudine abdominis; *pedibus* longiusculis, cursoriis; *femoribus* compressis; *tarsis* quadriarticulatis; *colore* vario, interdum nitido.

Voet. Coleopt. 2. tab. 6. fig. 14.

Habitat in Europae Salice Moschum spirans!

- C. thorace rotundato, spinoso, corpore viridi, *fe. virens*.
moribus rufis. Ent. syst. 2. 252. 2.

Linn. syst. Nat. 2. 627. 38.

Oliv. Inf. 67. tab. 11. fig. 78.

Drury Inf. 1. tab. 40. fig. 1.

Brown Jam. tab. 43. fig. 8.

Habitat Larva in truncis Amyris balsamiferae
Americis,

Imago Eugeniæ Jambos spirat Dr. Schwarz.

Variat antennis corpore longioribus et brevioribus,
femoribus dentatis et muticis, corpore viridi et
cyaneo.

- C. thorace rotundato, spinoso, cyaneus, femoribus *albitarsus*.
dentatis, rufis, tarsis posticis niueis.

Habitat in Isle de France. Dom. Daldorff.

Statura C. nitentis, paullo maior. Caput cyaneum,
nitidum, antennis corpore longioribus, nigris.
Thorax inaequalis, spinosus et elytra cyanea,
nitida, immaculata. Pedes nigri, femoribus den-
tatis, rufis. Tarsi postici niuei.

- C. thorace rotundato, subspinoso, viridi-nitens, *nitens*.
femoribus clauatis: clava anticorum rufa. Ent.
syst. 2. 252. 3. *

Oliv. Inf. 67. tab. 17. fig. 107.

Voet. Coleopt. 2. tab. 6. fig. 15.

Habitat in Africa æquinoctiali. Mus. D. Banks.

- C. thorace spinoso, aureo, viridi-nitens, elytris *micans*.
cyaneis: futura viridi.

Habitat in Guinea. Dom. Meier. Mus. D. Lund.

Statura et magnitudo C. festiui. Caput viride, ni-
tens, antennis corpore longioribus, nigris. Tho-
rax rotundatus, spinosus, aureus, nitidus. Ely-
tra

tra cyanea, futura late viridi. Corpus aeneum, nitidum. Pedes nigri, femoribus quatuor, anticis clauatis, rufis, postici clauati, compressi.

ater.

7. C. thorace rotundato, spinoso, corpore viridi, antennis pedibusque rufis. Ent. syst. 2. 252. 4. *
Linn. Mant. 532.
Drury Inf. 1. tab. 39. fig. 4.
Oliv. Inf. 67. tab. 19. fig. 141.
Habitat in Africa. Dr. Solander.

festivus.

8. C. thorace spinoso, viridi, elytris violaceis basi viridibus, femoribus ferrugineis, videntatis. Ent. syst. 2. 253. 5. *
Oliv. Inf. 67. tab. 7. fig. 44.
tab. 18. fig. 44.
Habitat ad fluvium Gaboon Africae. Mus. Dom. Banks.

vittatus.

9. C. thorace spinoso, viridis, nitens, thorace elytrisque nigro-lineatis. Ent. syst. 2. 253. 6. *
Oliv. Inf. 67. tab. 2. fig. 10.
Voet. Col. 2. tab. 10. fig. 41.
Habitat in Brasilia. Mus. Dom. Banks.

velutinus.

10. C. thorace spinoso, niger, elytris vitta atra. Ent. syst. 2. 253. 7. *
Oliv. Inf. 67. tab. 6. fig. 41.
Voet. Col. 2. tab. 10. fig. 40.
Habitat in America. Dr. Schulz.

sericeus.

11. C. thorace spinoso, holosericeo, ater, elytris, futura vittaque viridibus, femoribus rufis. Ent. syst. 2. 253. 8. *
Oliv. Inf. 67. tab. 5. fig. 37.
Habitat in Brasilia. Mus. Dom. Olivier.

futuralis.

12. C. thorace spinoso, ater, elytris, futura vittaque media aureis. Ent. syst. 2. 254. 9. *
Oliv. Inf. 67. tab. 6. fig. 40.

Voet

Voet. Col. 2. tab. 10. fig. 42. 43.

Habitat in America. Dr. Hunter.

3. *C. thorace spinoso capiteque viridi-aeneis, nitidis, elytris obscuris, antennis longis pedibusque rufis. Ent. syst. 2. 254. 10. **

Oliv. Inf. 67. tab. 5. fig. 35.

Habitat in Americae meridionalis Insulis. Dom. Olivier.

4. *C. thorace subspinoso, atro: macula laterali aurea, elytris cyaneis, atro-lineatis, antennis pedibusque rufis. regius.*

Habitat in Guinea. Dom. Hesse. Mus. D. Lund.

Statura et magnitudo *C. suturalis*. Caput holosericeum, atrum, ore rufo, mandibulis exsertis, dentatis, apice parum nigricantibus. Antennae corpore breviores, rufae. Thorax inaequalis, subspinosus: margine antico elevato, holosericeus, ater, macula magna, laterali, aurea. Elytra cyanea, basi vittis holosericeis, atris, striata. Pedes rufi.

5. *C. thorace spinoso depresso, virescens, elytris cupreis, tibiis compresso-dilatatis. Ent. syst. 2. 254. 11. **

Oliv. Inf. 67. tab. 16. fig. 116.

Deger Inf. 7. 655. bb. tab. 49. fig. 3.

Herbst. Arch. 7. tab. 45. fig. 11.

Habitat ad Cap. Bon. Spei.

6. *C. viridis, nitens, elytris cyaneis, antennis apice albis. albicornis.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Statura *C. longipedis* paullo minor. Antennae nigrae, articulis quatuor ultimis albis. Caput et thorax viridi-aenea, nitida, immaculata. Elytra

tra cyanea, apice acuminata. Corpus virid-aeneum, pedibus cyaneis.

longipes. 17. C. thorace subspinoso cyaneo, viridis, antennis longioribus, femoribus clauatis. Ent. syst. 2. 255. 12. *

Oliv. Inf. 70. tab. 1. fig. 3.

Degeer Inf. 7. tab. 49. fig. 7.

Habitat ad Cap. Bon. Spei.

cyanicornis. 18. C. thorace subspinoso, viridis, nitens, antennis brevibus coeruleis, femoribus anticis clauatis, ferrugineis. Ent. syst. suppl. 142. 12. *

Habitat in Aquapim Guineae. Mus. D. Lund.

interruptus. 19. C. thorace spinoso, ater, elytris maculis tribus linearibus albis, antennis brevibus. Ent. syst. 2. 255. 13. *

Oliv. Inf. 67. tab. 17. fig. 133.

Habitat - - Mus. D. Olivier.

Cerdo. 20. C. thorace spinoso, rugoso, niger, elytris rotundatis, antennis longis. Ent. syst. 2. 255. 14.

Cerambyx Cerdo. Linn. syst. Nat. 2. 629. 39.

^{41. 84.}
^{14. 42} Oliv. Inf. 67. tab. 10. fig. 65.

Geoff. Inf. 1. 201. 2.

Voet. Col. 2. tab. 4. fig. 5.

Habitat in Europa.

beros. 21. C. thorace spinoso rugoso, niger, elytris subspinosis piceis, antennis longis. Ent. syst. 2. 255. 15.

^{41. 84.}
^{14. 42} Oliv. Inf. 67. tab. 1. fig. 1.

Geoff. Inf. 1. 200. 1.

Frish. Inf. 1. 13. tab. 8.

Drury Inf. 1. tab. 49. fig. 1.

Voet. Col. 2. tab. 5. fig. 9.

Roff. Fn. Etr. 1. 141. 358.

Habitat in Europae Quercu.

22. *C. thorace subspinoso, niger, elytris viridibus, spinicornis*
apice spinosis. Ent. syst. 2. 256. 16. *
- Cerambyx torridus*. Oliv. Inf. 67. tab. 14. f. 95.
Habitat in Sierra Leon Africae. Mus. D. Banks.
23. *C. thorace spinoso rugosoque, nigricans, elytris denticornis*
bidentatis, antennis spinosis mediocribus.
Habitat in Guinea. D. Hesse. Mus. D. Lund.
Statura et magnitudo *C. Bati*. Antennae longitudi-
dine corporis, nigrae: articulis apice spinosis.
Caput nigrum. Thorax spinosus, rugosus.
Elytra bidentata, nigra, pube cinerascete mi-
cantia.
24. *C. thorace subspinoso, ater, antennis mediocri-* *ater.*
bus, rufo nigroque annulatis. Ent. syst. 2.
256. 17. *
- Oliv. Inf. 70. tab. 3. fig. 32.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Olivier.
25. *C. thorace rugoso, ater, elytris laevibus biden-* *bidens.*
tatis.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.
Statura omnino *C. Cerdonis*, at duplo minor. An-
tennae corpore breuiore, nigrae, piceo colore
nitentes. Caput atrum. Thorax rotundatus,
muticus, punctato-rugosus. Scutellum cine-
reum. Elytra laevia, nigra, apice bidentata.
Corpus nigrum, piceo micans.
26. *C. niger, thorace spinoso tuberculatoque, elytris tubercula-*
basi scabris apice emarginatis, antennis longis. *tus.*
Ent. syst. suppl. 141. 17. *
- Habitat in Cayenna. D. Cuvier.
27. *C. thorace inermi rugoso, niger, elytris cine-* *volvulus.*
reis, antennis breuibibus.

Ha-

Habitat Tranquebariae. Dom. Daldorff. Mus. D. Lund.

Statura *C. bidentis*, at minor. Antennae breves, nigrae. Caput nigrum. Thorax inermis, rugosus, niger. Elytra subholosericea, nigra. Corpus nigrum, abdomine cinereo-tomentoso.

Batus.

28. *C. thorace rugoso, subspinoso, elytris apice spinosis, antennis longis aculeato-spinosis. Ent. syst. 2. 256. 18.*

Linn. syst. Nat. 2. 615. 20. Mus. Lud. Vlr. 69.

Oliv. Inf. 67. tab. 5. fig. 32.

Mus. Petropol. 652. 154.

Habitat in Americae meridionalis Insulis.

ferrugineus.

29. *C. thorace acute spinoso-rugoso, niger, elytris ferrugineis, antennis longis. Ent. syst. 2. 256. 19. **

Linn. syst. Nat. 2. 626. 25. Mus. Lud. Vlr. 70.

Oliv. Inf. 67. tab. 18. fig. 134.

Habitat in India orientali. D. de Slanbusch.

alpinus.

30. *C. thorace spinoso, coleoptris fascia maculisque quatuor atris, antennis longis. Ent. syst. 2. 257. 20.*

Linn. syst. Nat. 2. 628. 35. Fn. Sv. 654.

Oliv. Inf. 67. tab. 9. fig. 58.

Geoff. Inf. 1. 202. 4.

IV. 42. Scheuchz. Itiner. 1. tab. 1. fig. 5.

Sulz. Inf. tab. 4. fig. D.

Drury Inf. 2. tab. 31. fig. 5.

Voet. Col. 2. tab. 9. fig. 38.

Habitat in Europae montosis.

ocellatus.

31. *C. thorace spinoso, ater: linea dorsali fulva, elytris punctis subocellaribus fulvis, ano bidentato.*

Oliv. Inf. 67. tab. 13. fig. 12. d.

tab. 2. fig. 12. a. b.

Ha-

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.

Statura et magnitudo *C. scalaris*. Antennae corpore triplo longiores, atrae. Caput atrum, macula verticali, fulva. Thorax spinosus, ater, linea dorsali fulva, parum albo-marginata. Elytra atra, punctis plurimis, sparsis, fulvis, annulo albo cinctis. Corpus cinereo-pubescens, linea laterali fulva. Anus bidentatus. Pedes nigri.

32. *C. thorace spinoso, fuscus: linea longitudinali scalaris.*
alba, antennis longis. Ent. syst. 2. 257. 21. *

Voet. Col. 2. tab. 6. fig. 12.

Habitat in America meridionali. Mus. D. Banks.

33. *C. thorace spinoso, viridi-aeneus, elytris testaceulinus.*
ceis, antennis breuibus. Ent. syst. 2. 257. 27. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Dr. Hunter.

34. *C. thorace bispinoso, rugoso, ater, antennis longioribus ferrugineis.* *Morio.*
Ent. syst. 2. 257. 28. *

Habitat in Cayenna. Mus. Dr. Hunter.

35. *C. thorace spinoso, niger, elytris sanguineis: Koebleri.*
macula nigra. Ent. syst. 2. 257. 29. *

Linn. syst. Nat. 2. 631. 50.

Geoff. Inf. 1. 204. 6.

Oliv. Inf. 67. tab. 3. fig. 13.

Schaeff. Icon. tab. 1. fig. 1.

tab. 153. fig. 4.

Herbst. Arch. 9. tab. 24. fig. 6.

β. *Cerambyx badensis*. Panz. Taschenb. 2. 48. 6.

Lamia hungarica. Herbst. Arch. 4. t. 25. f. 6.

Naturf. 19. tab. 4. fig. 1-5.

Habitat in Europa australiori.

36. *C. thorace spinoso, sanguineus, antennis elytrorum apicibus, abdomine pedibusque nigris.* *Lundii.*

Ent. syst. 2. 257. 30. *

T. H.

S

Oliv.

Oliv. Inf. 67. tab. 20. fig. 149.

Habitat Tranquebariae. Mus. D. Lund.

- Desfontainii*. 37. C. thorace spinoso, sanguineo, nigro, maculato, ater, elytris sanguineis, basi apiceque atris, antennis longissimis. Ent. syst. 2. 257. 31. *
Habitat in Barbaria. Mus. Dom. Desfontaines.

- humeralis*. 38. C. thorace spinoso, niger, elytris macula basali sanguinea. Ent. syst. suppl. 143. 26. *
Habitat in America boreali. Dom. Herschel.

- dens*. 39. C. thorace spinoso, ater, thoracis margine elytrisque testaceis, apice nigris.
Oliv. Inf. 67. tab. 19. fig. 144.
Habitat in China. Mus. D. de Sehestedt.

Statura praecedentium. Antennae corpore longiores, atrae. Caput atrum, vertice testaceo, dentibusque quatuor inter antennis: lateralibus testaceis. Thorax lineis tribus, dorsalibus elevatis, niger, lateribus testaceis. Elytra lineis tribus elevatis, testacea, apice atra. Corpus atrum.

- succinctus*. 40. C. thorace bispinoso, rugoso, elytris fascia flava, antennis longioribus, compressis. Ent. syst. 2. 258. 27.

Linn. syst. Nat. 2. 627. 32. Mus. Lud. Vlr. 72.

Degeer Inf. 5. 113. 14. tab. 14. fig. 5.

Oliv. Inf. 67. tab. 7. fig. 43.

Drury Inf. 1. tab. 39. fig. 2.

Voet. Coleopt. 2. tab. 7. fig. 17.

Habitat in America meridionali.

Fascia elytrorum nunc minor, nunc obsoleta, nunc omnino nulla.

- bicornis*. 41. C. thorace bispinoso, tuberculatoque, flavus, elytris nigro-lineatis.

Oliv. Inf. 67. tab. 5. fig. 31.

Voet.

Voet. Col. 2. tab. 6. fig. 11.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Statura omnino et magnitudo *C. striati*. Antennae corpore duplo longiores, basi flavae, articulis apice nigris. Caput flavum, dentibus duobus, elevatis, acutis inter antennas. Thorax bispinosus, spina posteriore minore, flavus, tuberculisque vtrinque duobus, elevatis, acutis, nigris. Elytra costata, flava, linea marginali mediaque nigris. Corpus holosericeo-aureum, abdomine nigro: lateribus aureis. Pedes testacei, postici nigri.

2. *C. thorace subspinoso, rugoso, ferrugineus, elytris flavo-striatis, antennis longis. Ent. syst. 2. 259. 28. **

Oliv. Inf. 67. tab. 10. fig. 71.

Voet. Coleopt. 2. tab. 16. fig. 68.

Habitat in Cayenna. Mus. Dr. Hunter.

3. *C. thorace inaequali, subspinoso, ater, elytris abbreviatis, margine futuraque abbreviatis, nigris, antennis mediocribus.*

Habitat in nova Cambria. Dom. Billardiere.

Praecedentibus minor. Antennae villosae, atrae.

Caput et thorax inaequalia, atra, immaculata.

Elytra rufa, lineis tribus, elevatis, flavescentibus, margine futuraque nigris, qui tamen color abbreviatus, vix ultra medium extenditur. Corpus atrum.

4. *C. thorace bispinoso, rufo, elytris laevibus, nigris, antennis longis. Ent. syst. 2. 259. 29. **

Oliv. Inf. 67. tab. 1. fig. 3.

tab. 13. fig. 89.

Habitat in America meridionali. Mus. Dr. Hunter.

dimidiatus 45. C. thorace bispinose, rugoso, flavus, nigro-punctatus, elytris nigris, basi flavis, antennis mediocribus. Ent. syst. 2. 259. 30. *

Oliv. Inf. 67. tab. 14. fig. 96.

Habitat in Cayenna. Mus. Dr. Hunter.

bicolor. 46. C. thorace bispinose tuberculatoque, ferrugineo, elytris ultra dimidium abdomineque atris. Ent. syst. 2. 260. 31. *

Oliv. Inf. 67. tab. 9. fig. 61.

Voet. Coleopt. 2. tab. 8. fig. 24.

Habitat in Cayenna. Dom. v. Rohr.

depressus. 47. C. thorace multispinosus, depressus, niger, cinereo-variegatus, elytris acuminatis, antennis longis. Ent. syst. 2. 260. 32. *

Oliv. Inf. 67. tab. 5. fig. 30.

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 5.

Voet. Coleopt. tab. 13. fig. 55. 56.

Habitat in Americæ Insulis. Mus. Dom. Banks.

fasciatus. 48. C. thorace spinoso, cyaneus, elytris fascia flavo-antennis mediocribus, ante apicem flavis. Ent. syst. 2. 260. 33. *

Oliv. Inf. 67. tab. fig. 4.

Pall. Icon. Inf. tab. F. fig. 4.

Voet. Coleopt. 2. tab. 11. fig. 49.

Herbst. Arch. 5. tab. 25. fig. 3.

Habitat Tranquebariæ. Dr. Avering.

barbicornis. 49. C. thorace spinoso, antennarum quatuor primis articulis nigro-barbatis, corpore testaceo, nigro, variegato. Ent. syst. 2. 260. 34. *

Linn. syst. Nat. 2. 625. 18.

Oliv. Inf. 67. tab. 7. fig. 48.

Voet. Coleopt. 2. tab. 9. fig. 37.

Habitat in India orientali.

b. *C. thorace mutico, griseo - fuscus, elytris acuminatis: fasciis duabus, punctisque niveis, albofasciatus.*

Habitat in Guinea. Dom. Meier. Mus. D. Lund.
 Corpus paruum. Antennae vix longitudine corporis. Thorax rotundatus, inermis, striis tribus macularibus punctisque aliquot paruis, niveis. Elytra apice acuminata: fasciis duabus, latis, abbreviatis, punctisque aliquot paruis, niveis.

1. *C. thorace spinoso, elytris punctis fasciisque nigris, antennis longis. Ent. syst. 2. 261. 35. nebulosus.*

Linn. syst. Nat. 2. 627. 29. Fn. Sv. 450.

Oliv. Inf. 66. tab. 7. fig. 47.

Panz. Fn. Germ. 14. tab. 13.

Schaeff. Icon. tab. 14. fig. 9.

Voet. Coleopt. 2. tab. 4. fig. 4.

Geoff. Inf. 1. 204. 7.

Degeer Inf. 5. 71. 8.

Sulz. Inf. tab. 4. fig. c.

Habitat in Abietum truncis.

IV. 37 48

2. *C. thorace spinoso, fulvo, villosa, elytris nigris: maculata, postica villosa, fulva, antennis mediocribus. Ent. syst. 2. 261. 36. * obscurus.*

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lund.

3. *C. thorace spinoso, fusco, elytris laevibus: fasciis griseis, nigro-punctatis, antennis longissimis. Ent. syst. 2. 261. 37. * agrifus.*

Panz. Fn. Germ. 14. tab. 14.

Habitat in Germania. Dom. de Loewenkiold.

IV. 27. 48

4. *C. thorace spinoso, griseus, elytris lineis, elevatis, nigropunctatis, apice fuscis, antennis longissimis. Ent. syst. 2. 261. 38. * costatus.*

Habitat in Germania Dom. de Loewenkiold.

5. *C. thorace spinoso, elytris integris: punctis trifasciculatus hispidis, antennis mediocribus, hirtis. Ent. syst. 2. 262. 39. * tus.*

Panz.

IV. 28 49

Panz. Fn. Germ. 14. tab. 15.

Naturf. 24. 26. 34. tab. 1. fig. ³44.

Payk. Fn. Sv. 3. 58. 7.

Degeer Inf. 5. tab. 3. fig. 17.

Habitat in Germania. Dom. Hybner.

bispidus.

56. thorace spinoso, elytris basi albidis, apice bidentatis, antennis mediocribus, hirtis. Ent. syst. 2. 262. 40.

~~Linn. syst. Nat. 2. 627. 30. Fn. Sv. 651.~~

Geoff. Inf. 1. 206. 9.

~~Panz. Fn. Germ. 14. tab. 16.~~

^{IV. 58}
⁴⁴ Oliv. Inf. 67. tab. 11. fig. 77.

Schaeff. Icon. tab. 176. fig. 5.

Frish. Inf. 13. tab. 16.

~~Degeer Inf. 5. 71. 9. tab. 3. fig. 17.~~

Habitat in Europa boreali.

pilosus.

57. C. thorace bispinoso, elytris griseis, apice videntatis, antennis mediocribus, hirtis. Ent. syst. 2. 262. 41.

bispid. Payk

Oliv. Inf. 67. tab. 9. fig. 60.

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

apunctatus.

58. C. thorace spinoso, pilosus, fuscus, capite thoraceque punctis duobus albis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

4. Statura parva praecedentium. Antennae longae ferrugineae: articulis apice fuscis. Caput fuscum, punctis duobus verticalibus, niueis. Thorax spinosus, fuscus, punctis duobus albis. Elytra pilosa, fusca, cinereo-varia. Femora clivata.

balteatus.

59. C. thorace subspinoso, brunneus, elytris, fuscis. Ent. syst. 2. 262. 42. *

Cerambyx balteatus. Linn. syst. Nat. 2. 627. 31. Oli

IV. 44

Oliv. Inf. 67. tab. 17. fig. 124.

Habitat in Lusitania.

50. *C. thorace inermi, rugosissimo, niger, antennis rugicollis. mediocribus, pedibusque piceis. Ent. syst. 2.*

263. 43. *

Habitat Tranquebariae. Dom. Hybner.

Forte potius Gnoma.

51. *C. thorace mutico, rufus, elytris testaceis: macula nigra, antennis breuibus. Ent. syst. 2. 263. tus.*

44. *

Habitat in India orientali. Mus. Dom. Lund.

52. *C. thorace subspinoso, rufus, elytris testaceis, splendidus. basi atro-cyaneis, antennis breuibus. Ent. syst.*

2. 263. 45. *

Habitat Tranquebariae. Mus. D. Lund.

53. *C. thorace subspinoso, niger, antennis albidis, Daldorfii. elytris testaceis, basi apiceque cyaneis, nitidissimis.*

Lamia Daldorfii. Illig.

Habitat in Sumatra. Daldorff. Mus. D. de Sehestedt.

Statura et summa affinitas *C. nitentis*. Antennae villosae, albae: articulo primo ferrugineo, apice obscurae, longitudine corporis. Caput nigrum, immaculatum. Thorax rotundatus, striga media elevata, niger. Elytra substriata, nitida, testacea, basi parum, apice latius, cyanea, nitida. Corpus nigrum. Pedes testacei, femoribus nigris.

54. *C. thorace subspinoso, niger, antennis pedibusque ~~nitentis~~ ^{ignitus} flavescentibus. Elytris testaceis, apice nigris.*

Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff.

Varietatem praecedentis credit Dom. Illiger ac forte rite. Antennae pilosae, flavescentes, longitu-

gitudine fere corporis. Caput nigrum, laevigato
flavescente: fascia media nigra. Thorax sub-
spinulosus, niger, ruga media elevata. Elytra tes-
tacea, nitida, apice nigra. Corpus nigrum, pec-
tore flavescente. Pedes obscuri.

fulgidus. 65. C. thorace subspinuloso, ferrugineus, elytris cyaneis, nitidissimis.

Habitat in Sumatra. Mus. Daldorff.

Statura omnino praecedentium. Antennae pilosae, flavae: articulo primo ferrugineo, apice acutae, longitudine corporis. Caput et thorax ferruginea, ruga thoracis media elevata. Elytra cyanea, nitidissima. Corpus ferrugineum.

longicornis 66. C. thorace inermi: dorso plano, corpore fusco griseoque vario, antennis longissimis. Ent. syst. 2. 263. 46. *

Habitat in Coromandel. Mus. D. Banks.

marginalis 67. C. thorace inermi, elytris subtestaceis: margine omni nigro. Ent. syst. 2. 264. 47. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

breuicornis. 68. C. thorace inermi, viridi, elytris obscuris, antennis brevibus, nigris. Ent. syst. 2. 264. 48. *

Oliv. Inf. 70. tab. 2. fig. 22.

- Habitat in Sierra Leon Africae. Mus. D. Banks.

scriptus. 69. C. thorace inermi, nigro: lineis duabus albis, elytris obscure cyaneis: lineolis fasciaque media abbreviata, compressis, cinereis. Ent. syst. suppl. 143. 49. *

Habitat in Isle de France. Mus. Dom. Bosc.

juvencus. 70. C. thorace inermi, rugoso, elytris acuminatis, nigris lanuginoso-canescens, antennis longissimis. Ent. syst. 2. 264. 49. *

Linn. syst. Nat. 2. 631. 53.

Habitat in America.

71. *C. thorace inermi, rugoso, griseus, elytris vhi- holoseri-*
dentatis, holosericeis, fusco cinereoque mican-
tibus, antennis medioeribus. Ent. syst. 2. 264.
 50. *
 Oliv. Inf. 62. tab. 17. fig. 127.
 Habitat in India orientali. Mus. D. Lund.
72. *C. thorace inermi, subrugoso, cinereus, imma- cinereus.*
culatus, antennis longissimis. Ent. syst. 2. 265.
 31. *
 Habitat Tranquebariae. Mus. D. Lund.

136. LAMIA. *Palpi filiformes.*

Maxilla cornea, bifida.

Ligula cornea, bifida.

Antennae setaceae.

1. *L. thorace acute spinoso, rugoso, elytris cinereis, gigas.*
macula marginali nigra, basi bituberculatis, sca-
*bris, antennis longis. Ent. syst. 2. 265. 1. **
 Oliv. Inf. 67. tab. 23. fig. 91.
 Habitat in Guinea. Mus. Dom. Banks.
2. *L. thorace quadrispinoso, scutello elytrisque spi- tribulus.*
nofis, antennis longioribus. Ent. syst. 2. 266.
 2. *
 Oliv. Inf. 67. tab. 14. fig. 100.
 Habitat ad fluvium Gaboon Africae. Mus. D. Banks. *fronticor-*
3. *L. thorace spinoso, frontis cornu porrecto, apice nis.*
emarginato incurvo, antennis longis. Ent. syst.
*2. 266. 3. **

Lamia corpus cylindricum, rotundatum, glabrum, immarginatum, tardum; *capite* magno, obtuso, declivi, inter antennis canaliculato; *oculis* magnis, rotundatis, marginalibus, prominulis; *antennis* elongatis, approximatis, inter oculos infertis; *thorace* cylindrico, spinoso, inaequali; *scutello* rotundato; *elytris* rigidis, fornicatis, longitudine abdominis; *pedibus* validis, cursoriis; *tarsis* quadrarticulatis; *colore* vario.

- Cerambyx 2punctatus*. Drury Inf. 2. tab. 31.
fig. 2.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.
- pedicornis*. 4. L. thorace elytrisque spinosis, femoribus anticis
cornutis. Ent. syst. 2. 267. 4. *
Oliv. Inf. 67. tab. 16. fig. 119.
Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.
- bystrix*. 5. L. thorace quinquespinoso, elytris fasciculato-pi-
lofis, antennis mediocribus, ferratis. Ent. syst.
2. 267. 5. *
Oliv. Inf. 67. tab. 15. fig. 110.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Dom. Banks.
- crista*. 6. L. thorace acute spinoso, grisea, elytris basi tu-
berculo compresso, tridentato. Ent. syst. 2.
268. 6. *
Oliv. Inf. 67. tab. 14. fig. 101.
Habitat in noua Zelandia. Mus. D. Banks.
- marmorata*. 7. L. thorace acute spinoso, cinereo fuscoque, varia,
elytris basi tuberculatis, antennis longis. Ent.
syst. suppl. 143. 7. *
Habitat in Africa. Mus. Dom. Bosc.
- ambulator* 8. L. thorace antice vtrinque bispinoso, corpore ne-
buloso. Ent. syst. 2. 268. 7. *
Petiv. Gazoph. tab. 37. fig. 6.
Habitat in Insulis Luzonum. Mus. Britann.
- spinipes*. 9. L. thorace vtrinque bispinoso, elytris punctatis,
variegatis, femoribus anticis basi unispinosis.
Habitat in Isle de France. Mus. D. de Sehestedt.
Affinis videtur *L. ambulatori*. Antennae longitu-
dine corporis nigrae, albo variae. Caput villo-
sum, pallide cinereum. Thorax antice bispino-
sus: spina vna, supra alteram, inferiore mai-
ore, acutiore, cinereo castaneoque varius. Ely-
tra punctata, cinereo castaneoque varia, fascia
basos

bases mediaque albis, testaceo-variegatis. Pedes cinerei, anticis spina bases erecta, acuta.

10. L. thorace spinoso, bimaculato, elytris basi scabris, apiceque mucronatis. Ent. syst. 2. 290.

89. *

Cerambyx Rubus. Linn: syst. Nat. 2. 625. 21.

Oliv. Inf. 67. tab. 7. fig. 57.

Degeer Inf. 5. 106. 7. tab. 13. fig. 16.

Habitat in India.

11. L. thorace spinoso, bimaculato, elytris albo-maculatis, basi scabris, mucronatis, apice bidentatis.

Ent. syst. 2. 290. 90. *

Habitat Tranquebariae. Mus. D. Lund.

12. L. thorace spinoso, rugoso, elytris truncatis, griseis, antennis compressis: articulis apice spinosis. Ent. syst. 2. 290. 91. *

Oliv. Inf. 67. tab. 5. fig. 33.

Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. D. Banks.

13. L. thorace spinoso, capiteque albo-lineatis, elytris albo-variis, antennis longis.

Oliv. Inf. 67. tab. 19. fig. 143.

Habitat in India.

Magnitudo L. spinicornis. Caput nigrum, vertice lineis tribus albis inter antennis, in maculam coeuntibus. Thorax scaber, acute spinosus, lineis tribus albis. Elytra basi parum scabra, apice truncata, nigra, albo-nebulosa.

14. L. thorace spinoso, ferruginea, elytris maculis lactatoribus niueis.

Habitat in Guinea. Dom. Meier. Mus. D. de Sehestedt.

Statura et magnitudo L. Sehestedii. Antennae ferrugineae. Mandibulae apice atrae. Caput ferrugineum, macula frontali niuea. Thorax spi-

spinosus, maculis duabus baseos, niueis. Elytra laeua, ferruginea, maculis tribus magnis, nitidis. Corpus ferrugineum, linea laterali lata, niuea, quae ab oculis vsque ad anum extenditur.

- globifera.* 15. L. thorace inermi, rugoso, obscura, elytris punctis eleuatis, globosis, atris.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.
Statura L. scabratoris. Antennae corpore longiores, nigrae. Thorax rotundatus, muticus, rugosus, tuberculis dorsalibus, plurimis, eleuatis, subspinosis. Elytra obscura, punctis plurimis, eleuatis globosis, atris. Corpus obscurum.
- scabrator.* 16. L. thorace spinoso, subtestacea, elytris punctis baseos atris, scabris. Ent. syst. 2. 291. 92. *
Oliv. Inf. 67. tab. 3. fig. 14.
Habitat in India orientali. Mus. D. Banks.
- gladiator.* 17. L. thorace spinoso, elytris testaceo cinereoque reticulatis, basi punctis eleuatis, scabris.
Lamia spinator. Ent. syst. suppl. 145. 92. *
Habitat in India orientali. D. Daldorff.
- Sebestedii.* 18. L. thorace spinoso, elytrisque fuscis: maculis holosericeis, niueis. Ent. syst. suppl. 146. 94. *
Habitat in India orientali. Dom. Daldorff.
- fuscator.* 19. L. thorace bispinoso, tuberculatoque, elytris apice tridentatis, griseis: fascia cinerea. Ent. syst. 2. 291. 94. *
Habitat Tranquebariae. Mus. Dom. Lund.
- barbicornis.* 20. L. thorace spinoso elytrisque fusco nigroque variis albomaculatis: articulo tertio fasciculo pilorum. Ent. syst. suppl. 145. 94. *
Habitat in Guinea. Mus. D. de Sehested.
- tridentata* 21. L. thorace spinoso cristaque duplici grisea, elytris apice tridentatis. Ha-

- Habitat in Guinea. Dom. Hesse. Mus. D. Lund.**
Statura L. barbicornis. Antennae longitudine corporis pilosae, cinereae. Caput canaliculatum, cinereum. Thorax acute spinosus, griseus cristata duplici eleuata, inaequali, obtusa, fusca. Elytra punctata, grisea, fusco-maculata, apice tridentata. Corpus griseum.
22. L. thorace spinoso, elytris conuexis, atris, antennis mediocribus. Ent. syst. 2. 268. 8. * textor.
Cerambyx textor. Linn. syst. Nat. 2. 629. 41. Fn. Sv. 656.
 Geoff. Inf. 1. 201. 3.
 Oliv. Inf. 67. tab. 6. fig. 39.
 Degeer Inf. 5. 64. 3.
 Panz. Fn. Germ. 19. tab. 1. *IV. 38 49*
 Schaeff. Icon. tab. 10. fig. 1.
 Payk. Fn. Sv. 3. 61. 1.
 Habitat in truncis arborum Europae.
23. L. thorace spinoso, rugoso, nigra, elytris emarginatis, ferrugineis, antennis mediocribus. Ent. syst. 2. 268. 9.
 Habitat in India orientali. Mus. Dom. Lund.
24. L. thorace spinoso, nigra, elytris vitta semicirculari punctoque marginali cinereis, antennis longis. Ent. syst. 2. 269. 10. * *crucifera.*
 Oliv. Inf. 67. tab. 10. fig. 68.
 Habitat - - Mus. Dom. Olivier.
25. L. thorace spinoso, nigra, antice fasciis, postice punctis viridibus, elytris basi mucronatis. Ent. syst. 2. 269. 11. * *pulchra.*
Cerambyx pulchra. Drury Inf. 1. tab. 32. fig. 6.
 Oliv. Inf. 67. tab. 1. fig. 6.
 Habitat in Africa. Dom. Drury.

- regalis.* 26. L. thorace spinoso, viridi-fasciato, elytris viridi-irroratis, maculisque tribus fulvis. Ent. syst. 2. 269. 12. *
- Oliv. Inf. 67. tab. 4. fig. 24. a.
Brown. Illustr. tab. 50, fig. 1.
Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. D. Banks.
- imperialis.* 27. L. thorace spinoso, ferrugineo, villosa, viridifasciata, antennis longis, atris.
Oliv. Inf. 67. tab. 4. fig. 24. c.
Habitat in Guinea. Dom. Meier. Mus. D. de Sehestedt.
Nimis affinis L. regali, cuius forte specimen nuper declaratum. Antennae longae, nigrae. Caput villosa-ferrugineum, obscure lineatum orbitaque oculorum viridi. Thorax spinosus, friga media impressa fasciaque postica viridi. Elytra villosa-ferruginea, fasciis duabus, anteriore recta, media e maculis tribus quadratis, concatenatis punctoque postico viridibus. Pedes ferruginei.
- vndata.* 28. L. thorace mutico, cinerea, thorace fascia, elytris duabus vndatis, atris. Ent. syst. 2. 270. 13. *
- Oliv. Inf. 67. tab. 4. fig. 26.
Habitat - - -
- irrorata.* 29. L. thorace spinoso, fusco, ferrugineoque, varia, elytris nigris, ferrugineo-irroratis, antennis mediocribus. Ent. syst. 2. 270. 14. *
- Voet. Coleopt. 2. tab. 7. fig. 18.
Habitat in India orientali. Mus. Dom. Lund.
- nigricornis.* 30. L. thorace mutico, grisea, elytris dorso planis, antennis breuibus nigris. Ent. syst. 2. 270. 15. *
- Habitat in Coromandel. Mus. D. Banks.
- bifidator.* 31. L. thorace spinoso tuberculatoque cinereo: margine lineolisque atris, elytris cinereis: maculis oblongis, atris.
Habitat in America boreali. Mus. Dom. Bosc.

Sta-

Statura et magnitudo omnino *L. aedilis*. Antennae corpore duplo longiores, cinereae, articulis apice fuscis. Caput nigrum. Thorax vtrinque spina valida tuberculisque dorsalibus; cinereus, margine sub spina, lineolis quinque abbreviatis: intermedia solitaria, atris. Elytra basi punctata, cinerea: macula lineari baseos, magna marginali, magnaque oblonga pone medium, antice bifida, postice puncto paruo albedo. Corpus griseum, femoribus clauatis.

32. *L. thorace spinoso: punctis quatuor luteis, elytris obtusis, nebulosis, antennis longis. Ent. fyft.* *aedilis.*

2. 270. 16. *

Cerambyx aedilis. Linn. fyft. Nat. 2. 628. 37. Fn. Sv 653.

Oliv. Inf. 67. tab. 9. fig. 59.

Degeer Inf. 5. 66. 5. tab. 4. fig. 1. 2.

Frish. Inf. 13. tab. 12.

Sulz. Inf. tab. 4. fig. 27.

Schaeff. Icon. tab. 14. fig. 7.

Payk. Fn. Sv. 3. 62. 3.

Habitat in Europae borealis truncis.

33. *L. thorace subspinoso: vtrinque macula ocellari ocellator.*
atra, elytris variegatis, antennis longis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Statura *L. aedilis*, at duplo minor. Antennae longae, ferrugineae, articulis basi pallidis. Thorax spina parua postica; obscurus, antice lineolis duabus paruis, atris et ad latera macula magna atra, annulo albo cincta. Elytra punctata, variegata, pone medium angulo vno alteroue atro punctoque paruo niueo. Femora clauata.

34. *L. thorace spinoso tuberculatoque, cinerea, elytris fusco - variis, punctis eleuatis, nigris,* *atomaria.*
fca- IV. 61.

scabris, antennis longis. Ent. fyft. 2. 271.
17. *

Habitat in Germania. Dom. Smidt.

varia. 35. L. thorace spinoso tuberculatoque, corpore nigro cinereoque vario, femoribus clauatis, antennis mediocribus. Ent. fyft. 2. 271. 18. *

N. Gr. 45

Oliv. Inf. 67. tab. 3. fig. 16.

N. N. III.

Roffi Fn. Etr. 1. 142. 360.

Habitat in Europa australiori. Dom. Zschuck.

antennator 36. L. thorace quadrispinoso, antennis longissimis, tenuibus, ferrugineis, albo-subannulatis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Statura præcedentium, at parua. Antennae longissimae, tenues, ferrugineae, annulo vno alterone albido. Caput fuscum. Thorax tuberculis quatuor, in strigam dispositis; fuscus, linea dorsali albida. Elytra variegata, lituris variis albis. Pedes variegati, femoribus clauatis.

araneiformis.

37. L. thorace spinoso tuberculatoque, elytris porosis; macula marginali fusca, antennis longis. Ent. fyft. 2. 271. 19. *

Cerambyx araneiformis. Linn. fyft. Nat. 2. 625. 22.

Oliv. Inf. 67. tab. 5. fig. 34.

Drury Inf. 2. tab. 35. fig. 4.

Sloan. Jam. 2. tab. 237. fig. 24.

Voet. Col. 2. tab. 9. fig. 33. 34.

Habitat in America meridionali.

punctata. 38. L. thorace spinoso, fusca, albo-punctata. Ent. fyft. 2. 272. 20. *

Oliv. Inf. 67. tab. 6. fig. 42.

Habitat in Cayenna. Mus. Dom. Olivier.

39. *L. thorace spinoso, elytris cinereis, nigro-maculatis, antennis longissimis: articulo tertio apice nodoso.* Ent. syst. 2. 272. 21. *
nodosa.
 Oliv. Inf. 67. tab. 14. fig. 103.
 Habitat in Marylandia. Mus. Britt.
40. *L. thorace multidentato: dorso plano, elytris tibiisque anticis videntatis.* Ent. syst. 2. 272. 22. *
canceriformis.
Cerambyx pustulatus. Drury Inf. 2. t. 35. f. 1.
 Habitat in Jamaica.
41. *L. thorace spinoso tuberculatoque, elytris punctatis spinosisque, antennis longis.* Ent. syst. 2. 273. 23. *
tuberculata.
 Oliv. Inf. 67. tab. 16. fig. 114.
 Habitat in Jamaica. Mus. Dr. Hunter.
42. *L. thorace acute spinoso, cinerea, elytris spinosis, antennis longis.* Ent. syst. 2. 273. 25. *
borrida.
Cerambyx borridus. Oliv. Inf. 67. t. 4. f. 29.
 Habitat in Cayenna, Mus. D. Olivier.
43. *L. thorace quadrispinoso, elytris tuberculato-granulatis, tibiis anticis apice dilatatis.* Ent. syst. 2. 273. 26.
Scorpio.
 Oliv. Inf. 67. tab. 3. fig. 19.
 Habitat in America meridionali. Mus. Dr. Hunter.
44. *L. thorace subspinoso, flavo, lineato, elytris basi scabris, brunneis, flavo-punctatis, apice fuscis, rufo-maculatis.*
decorator.
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.
 Statura præcedentium, at minor. Antennae vix longitudine corporis, atrae, articularibus prioribus longioribus, clauatis. Caput obscurum, lineis utrinque duabus, obliquis, sub oculis. Thorax subspinosus, obscurus: lineis tribus flavis,
 T. II. T late-

lateralibus abbreviatis. Elytra basi scabra, ob-
scura: punctis sparsis, flavis, pone medium ni-
gra: maculis sparsis rufis. Thorax niger, ru-
fo-maculatus. Abdomen nigrum, lineis dua-
bus punctorum alborum. Femora clauata. Ti-
biae ante apicem videntatae.

- mixta.* 45. *L. thorace spinoso, cinereo fuscoque variegata, antennis longis.* Ent. syst. suppl. 144. 26. *
Habitat in America boreali. Dom. v. Rohr.
- obscura.* 46. *L. thorace spinoso, fusca, elytris striatis, apice pallidis, antennis longis.* Ent. syst. suppl. 144. 26. *
Habitat in America boreali. Dom. v. Rohr.
- glauca.* 47. *L. thorace quinquespinoso, glauca, elytris muricatis, latere fasciaque nigris, antennis longis.* Ent. syst. 2. 274. 27. *
Lamia Spengleri. Ent. syst. 2. 291. 93. *
Cerambyx glaucus. Linn. syst. Nat. 2. 626. 28.
Degeer Inf. 5. 7. 13. tab. 14. fig. 4.
Habitat in America.
- bidentata.* 48. *L. thorace subspinoso, elytris bidentatis, scabris cinereo-fuscis.* Ent. syst. 2. 274. 28. *
Voet. Coleopt. 2. tab. 15. fig. 62.
Habitat in America. Dom. v. Rohr.
- scabra.* 49. *L. thorace spinoso tuberculatoque, elytris basi scabris, apice bidentatis, antennis longissimis.* Ent. syst. 2. 274. 29. *
Oliv. Inf. 67. tab. 17. fig. 128.
Habitat - - Mus Brit.
- compressa.* 50. *L. thorace spinoso, grisea, femoribus compressis clauatis, antennis longis.*
Habitat in Guinea. Dom. Hesse. Mus. D. Lund.
Parua in hoc genere. Antennae corpore longio-
rea, nigrae: articulis basi cinereis; primo cla-
uato

nato. Caput cinereo-villosum, canaliculatum. Thorax acute spinosus, cinereus, lineis duabus fuscis. Elytra cinereo fuscoque varia. Pedes breves, femoribus inermibus, clauatis: claua compressa.

51. L. thorace subspinoso, nigro, elytris variegatis, *clauator*.
antennis mediocribus.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.

Parua, Antennae corpore vix longiores, nigrae, articulis basi albis. Caput et thorax nigra, punctata, nigro alboque varia. Pedes pallidi, femoribus clauatis.

52. L. thorace tuberculato, elytris punctatis, cinereis; apice bidentatis, fuscis, antennis longis. *praemorsa*.
Ent. syst. 2. 275. 30. *

Habitat in Americae Insulis. Dom. Badier.

53. L. thorace bituberculato, elytris basi tuberculo *inaequalis*.
compresso, antennis breuibus basi unidentatis.

Habitat Tranquebariae. Dom. Daldorff. Mus. D.
de Sehestedt.

Minuta in hoc genere. Antennae breues, nigrae, basi dente eleuato, acuto. Thorax inermis, rotundatus, niger: dorso albido; tuberculis duobus dorsalibus, compressis. Elytra punctata, basi tuberculo compresso, quod in lineam eleuatam excurrit. Abdomen nigrum, segmentorum marginibus albis.

54. L. thorace bispinoso tuberculatoque grisea, elytris tuberculis duobus eleuatis, acutis. *obscurator*

Habitat in Guinea. Dom. Meier. Mus. D. Lund.

Minor L. grifatore. Antennae vix longitudine corporis. Thorax bispinosus, punctato-tuberculatus. Elytra grisea, basi tuberculis duobus eleuatis, acutis, nigris, vno pone alterum.

- spinifera.* 55. L. thorace spinoso, cinereo, villosa, elytris bidentatis, testaceis, antennis longis. Ent. syst. 2. 275. 31. *
Habitat in America meridionali. Dr. Pflug.
- grifator.* 56. L. thorace mutico, substriato, grisea, elytris subspinosis, basi tuberculis duobus, antennis brevibus, villosis. Ent. syst. 2. 275. 32. *
Habitat Tranquebariae. Dom. de Schlanbusch.
Elytra grisea, lineis spinarum brevissimarum, basi tuberculis duobus compressis, apice litura atra.
- cylindrat.* 57. L. thorace mutico, villosa, grisea, elytris subspinosis, basi tuberculis duobus, apice obscuris.
Habitat in Guinea. Dom. Meier. Mus. D. de Sehestedt.
Statura et summa affinitas L. grifatoris. Antennae breves, villosae, nigrae, albo-punctatae. Caput griseum. Thorax inermis, rotundatus, villosus, cinereus, immaculatus. Elytra grisea, lineis e spinis eleuatis, acutis, basi que tuberculis duobus paruis, eleuatis, apice obscura: litura alba.
- spinator.* 58. L. thorace spinoso, grisea, elytris obscuris, basi scabris, apice bidentatis.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.
Statura L. grifator. Antennae corpore vix longiores; glabrae, basi denticulo paruo, acuto. Caput griseum, macula magna, verticali, ferruginea. Thorax spinosus, griseus: linea dorsali obscuriore. Elytra scabra, obscura, apice cinereo atroque varia, terminantur dentibus duobus validis, obtusis.
- aedificator* 59. L. thorace spinoso tuberculatoque, grisea, elytris basi bituberculatis, antennis mediocribus. Ent. syst. 2. 275. 33. *
Habitat in India orientali. Mus. D. Lund. 60.

60. *L. thorace spinoso, elytris cinereis, nigro-irro- amputator*
 ratis maculisque numerosis testaceis. Ent. syst.
 2. 276. 34. *

Habitat in Americae meridionalis Insulis; ramos
 etiam crassiores abscindere dicitur. Mus. Dom.
 Banks.

61. *L. thorace spinoso, elytris basi porosis, anten- sternutator*
 nis mediocribus. Ent. syst. 2. 276. 35. *

Habitat in Insula Barbados. Dom. Drury.

62. *L. thorace spinoso, elytrisque basi daedaleis api- spinator.*
 ce griseis, antennis mediocribus. Ent. syst. 2.
 276. 36. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Dom. Banks.

Variat ex Guinea elytris magis griseis: maculis
 nigris nunc rarioribus, nunc crebrioribus.

63. *L. thorace spinoso, elytris testaceis, albo-irrom- gutturator*
 tis: basi punctis eleuatis, glabris. Ent. syst. 2.
 276. 37. *

Oliv. Inf. 67. tab. 13. fig. 92.

Habitat in Africa. Mus. Britt.

64. *L. thorace inermi, ferrugineo, nigro, lineato, nebulosa:*
 elytris fusco ferrugineoque variis: macula
 marginati cinerea, antennis mediocribus. Ent.
 syst. 2. 277. 38. *

Oliv. Inf. 67. tab. 3. fig. 15.

Schaeff. Icon. tab. 55. fig. 4.

Habitat in Germania. Mus. D. Banks.

65. *L. thorace inermi, cinerea, elytris macula apicis inermis.*
 fusca, antennis longis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
 Dom. de Sehestedt.

L. nebulosa minor. Antennae corpore longiores,
 cinerae, articulis apice fuscis. Thorax rotun-
 datus, inermis, cinereus. Elytra cinerea, pun-
 ctis

ctis aliquot eleuatis indistinctis, macula magna postica, fusca. Corpus cinereum, femoribus clauatis.

repandator 66. L. thorace spinoso, obscura, elytris fascia postica repanda, albida: basi punctis eleuatis, atris. Ent. syst. 2. 277. 39. *

Habitat in Cayenna. Dom. v. Rohr.

variator. 67. L. thorace spinoso, lineato, elytris fuscis: linea semicirculari, alba. Ent. syst. 2. 277. 40. *

Habitat in Indiis.

sutor.

68. L. thorace spinoso, elytris atris, ferrugineo-maculatis, scutello luteo, antennis longissimis. Ent. syst. 2. 277. 41. *

Cerambyx sutor. Linn. syst. Nat. 2. 628. 38. Fn. Sv. 655.

Oliv. Inf. 67. tab. 3. fig. 20.

Schaeff. Icon. tab. 65. fig. 1.

Degeer Inf. 5. 65. 4.

^{IV. 29.} Panz. Fn. Germ. 19. tab. 2.

₄₅ Sulz. Inf. tab. 5. fig. 4.

Payk. Fn. Sv. 3. 62. 2.

Habitat in Europae fyluis.

sartor.

69. L. thorace spinoso, niger, scutello flauo, elytris immaculatis, antennis longissimis. Ent. syst. 2. 278. 42. *

^{IV. 27.} Panz. Fn. Germ. 19. tab. 3.

₄₆ Habitat Dresdae in Aesculo Hippocastano. Dom. Zschuck.

dentator. 70. L. thorace spinoso, fusco cinereoque varia. Ent. syst. 2. 278. 43. *

Habitat in Carolina.

rusticator. 71. L. thorace acute spinoso, cinereo, scutello albo, elytris punctatis, antennis longis.

Habi-

- Habitat in Sūmatra. D. Daldorff. Mus. D. Lund.
 Minor L. sutore. Antennae corpore parum longiores, cinereae, immaculatae. Caput, thorax, elytra subholosericea, cinerea. Scutellum album. Elytra punctata. Corpus cinereum.
72. L. thorace spinoso, nigra, thorace elytrisque fulvis, thorace nigro-lineato, elytris reticulatis. *reticulator*
 Ent. syst. 2. 278. 44. *
 Oliv. Inf. 67. tab. 12. fig. 83.
 Habitat in India orientali. Mus. D. Banks.
73. L. thorace acute spinoso, atra, elytris strigis numerosis interruptis albis, antennis mediocribus. *scalator*.
 Ent. syst. 2. 278. 45. *
 Habitat in Lusitania. Mus. D. Bosc.
74. L. thorace ^{Lusitania} subspinoso, obscure cinerea, fuscomaculata, elytris apice rufis. *molator*.
 Ent. syst. 2. 279. 46. *
 Oliv. Inf. 67. tab. 14. fig. 99.
 Habitat in Cayenna. Mus. Dom. Hunter.
75. L. thorace spinoso, elytris cinereo, fusco glaucoque nebulosis, antennis longissimis rufis. *titillator*.
 Ent. syst. 2. 279. 47. *
 Oliv. Inf. 61. tab. 15. fig. 109.
 Habitat in Carolina. Mus. Britt.
76. L. thorace spinoso, elytris cinereo-pulverulentis: vittis duabus flavis, nigro-marginatis. *vittator*.
 Ent. syst. 2. 279. 48. *
Cerambyx incanus. Forst. nou. sp. Cent. 1. 38.
 Oliv. Inf. 67. tab. 15. fig. 104.
 Petiv. Gazoph. tab. 24. fig. 6.
 Habitat ad littora sinus Campechiani. Mus. Britt.
77. L. thorace spinoso, nigra, elytris maculis quatuor flavis, subocellaribus, antennis longis. *oculator*.
 Ent. syst. 2. 280. 49. *

Cerambyx oculatus. Degeer Inf. 7. 654. t. 49. f. 1.

Oliv. Inf. 67. tab. 2. fig. 2.

Voet. Col. 2. tab. 7. fig. 21.

Habitat ad Cap. Bon. Spei.

Capensis. 78. L. thorace bispinoso, nigra, elytris fasciis quatuor rufis, antennis mediocribus. Ent. syst. 2. 280. 50.

Cerambyx Capensis. Linn. syst. Nat. 2. 628. 32.

Oliv. Inf. 67. tab. 8. fig. 51.

Drury Inf. 1. tab. 39. fig. 3.

Petiv. Gazoph. tab. 3. fig. 8.

Voet. scarab. 2. tab. 8. fig. 25.

Habitat ad Cap. Bon. Spei.

bottentotta. 79. L. thorace spinoso rufo, elytris nigris: fascia maculisque duabus marginalibus sanguineis. Ent. syst. 2. 280. 51. *

Cerambyx bottentotta. Brown Illustr. 118. tab. 49. fig. 1.

Oliv. Inf. 67. tab. 4. fig. 27.

Voet. scarab. 2. tab. 8. fig. 26.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Dom. Yeats.

2cincta. 80. L. thorace spinoso, nigra, elytris fasciis duabus continuis rufis. Ent. syst. suppl. 146. 51. Habitat in India orientali. D. Daldorf.

ferrugator 81. L. thorace spinoso, obscure ferruginea, elytris obscure virescentibus: striga interrupta sanguinea, antennis longis. Ent. syst. 2. 280. 52. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. D. Spengler.

bumeralis. 82. L. thorace spinoso, elytris flavis nigro-fasciatis antice mucronatis. Ent. syst. 2. 281. 53. * Habitat - - D. Drury.

83. *L. thorace bifpinofo, nigra, elytris fasciis quin- 5 fasciata.*
que rubris, antennis medioeribus. Ent. syst. 2.
281. 54. *
Habitat in Guinea. D. Ifert.
84. *L. thorace fubfpinofo, atra, elytris fasciis tri- 3 fasciata.*
bus flavis, antennis mediocribus. Ent. syst. 2.
281. 55. *
Oliv. Inf. 67. tab. 16. fig. 121.
Herbst. Arch. tab. 45. fig. 10.
Habitat in Sierra Leon Africae. Dr. Solander.
85. *L. thorace fpinofo, poftice finuato, elytris fla- 2 fasciata.*
uis: fasciis duabus maculaque rhombea cya-
neis. Ent. syst. 2. 281. 55. *
Habitat in Iamaica. Mus. Britann.
86. *L. thorace fpinofo atro: margine flauo, elytris nobilis.*
atris: fasciis tribus flavis, punctisque duobus
albis. Ent. syst. 2. 282. 57. *
Habitat in Cayenna. Mus. Dr. Hunter.
87. *L. thorace fpinofo, atra, elytris fasciis duabus Aethiops.*
punctoque apicis luteis, antennis mediocribus.
Ent. syst. 2. 282. 58. *
Oliv. Inf. 67. tab. 1. fig. 2.
Habitat ad Cap. Bon. Spej. Mus. Britann.
88. *L. thorace fpinofo, cinerea, thorace elytris que variegator*
fusco variis, antennis longis. Ent. syst. 2. 282.
59. *
Oliv. Inf. 67. tab. 16. fig. 112.
Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. D. Banks.
89. *L. thorace mutico, fusca, thorace coleoptris que curculio-*
ocellis quatuor atris. Ent. syst. 2. 282. 60. * *noides.*
Cerambyx curculionoides. Linn. syst. Nat. 2.
634. 48. 1V467
Oliv. Inf. 67. tab. 19. fig. 69.

Geoff.

Geoff. Inf. 1. 210. 5.

Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 1.

Payk. Fn. Sv. 3. 63. 4.

Habitat in Europa australiori.

- fusca.* 90. L. thorace spinoso, rugoso, nigra, ferruginea irrorata, elytris basi macula ocellari atra, antennis longissimis. Ent. syst. 2. 283. 61. *
Habitat in Siam. Mus. D. Banks.
- notata.* 91. L. thorace spinoso, obscura, elytris punctis duobus approximatis atris. Ent. syst. 2. 283. 62. *
Habitat in Cayenna. D. v. Rohr.
- lugubris.* 92. L. thorace acute spinoso, nigra, elytris scabris, ferrugineo obsolete punctatis, antennis longissimis. Ent. syst. 2. 283. 63. *
Habitat in Italia. D. de Slanbusch.
- tristis.* 93. L. thorace spinoso, fusca, elytris scabris: maculis duabus atris, antennis medioeribus. Ent. syst. 2. 283. 64. *
Cerambyx tristis. Linn. syst. Nat. 2. 629. 42.
Oliv. Inf. 67. tab. 9. fig. 62.
Herbst. Arch. tab. 25. fig. 7.
Habitat in ligno Cupressi Galliae australioris.
Variat pro sexu, antennis longitudine corporis et duplo longioribus.
- funesta.* 94. L. thorace spinoso, fusca, elytris laevibus: maculis duabus atris, antennis brevibus. Ent. syst. 2. 285. 65. *
Oliv. Inf. 67. tab. 9. fig. 63.
Panz. Naturf. 24. 26. 36. tab. 1. fig. 36.
Ross. Fn. Etr. 1. 145. 366.
Habitat in Galliae Sambuco. D. Broussonet.
- punctator.* 95. L. thorace spinoso, atra, elytris albo-punctatis, antennis longis. Ent. syst. 2. 285. 66. *

Cerambyx punctatiss. Oliv. Inf. 67. tab. 5. f. 40. 50. 6

Cerambyx farinosus. Drury Inf. 2. tab. 31. f. 4.

Cerambyx Cbinensis. Forst. nou. Inf. spec. Cent.

I. 39.

Habitat in China. Dr. Fothergill.

96. L. thorace spinoso, elytris lineis tribus eleuatis *crispa.*
ferrulatis, corpore cinereo, antennis mediocri-
bus. Ent. syst. 2. 284. 67. *

Oliv. Inf. 67. tab. 3. fig. 18.

Habitat ad Cap: Bon. Spei. Mus. D. Lee.

97. L. thorace spinoso hirtoque, elytris punctis pi-*fasciculata*
loso-cristatis. Ent. syst. 2. 284. 68. *

Oliv. Inf. 67. tab. 17. fig. 131.

Habitat in Cayenna. Mus. D. Olivier.

Elytra punctata, nigro ferrugineoque varia, pilis
rarioribus, longioribus, albis.

98. L. thorace spinoso, cinerea, elytris subfasciatis, *rotator.*
antennis mediocribus. Ent. syst. 2. 285. 69. *

Oliv. Inf. 67. tab. 17. fig. 126.

Habitat in India. Mus. D. Banks.

99. L. thorace spinoso, nigra, elytris bicarinatis al-*glycyrrhi-*
bo-lineatis, pedibus ferrugineis, antennis bre-
uibus. Ent. syst. 2. 285. 70. * *286.*

Cerambyx vountus. Sutz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 9.

Oliv. Inf. 67. tab. 16. fig. 115.

Pallas Iter 2. 723. 60.

Habitat in Sibiria. Mus. D. Banks.

100. L. thorace spinoso, nigra, coleoptris cruce me-*cruciata.*
dia alba. Ent. syst. 2. 285. 71. *

Pall. Icon. tab. F. fig. 5.

Habitat in Russia australiori. D. Boeber.

101. L. thorace subspinoso, nigra, elytris cinera-*fulginator*
scentibus, antennis breuibus. Ent. syst. 2. 286.

72.

Linn. *IV. 4246*

Linn. syst. Nat. 2. 539. 43.

Geoff. Inf. 1. 205. 8.

Oliv. Inf. 67. tab. 4. fig. 21.

Frish. Inf. 13. tab. 19.

Degeer Inf. 5. 70. 7.

Voet. scarab. tab. 8. fig. 30.

Habitat in Europa australiori.

Variet aetate tota nigra.

cineraria. 102. L. thorace spinoso, cinerascens, antennis bre-
uibus. Ent. syst. 2. 286. 73. *

Pall. Icon. tab. F. fig. 11.

Habitat in Russia meridionali. Dom. Hybner.

carinata. 103. L. thorace spinoso, nigra, elytris piceis: ca-
rina laterali elevantata albida, antennis brevibus.

Ent. syst. 2. 286. 74. *

Habitat in Sibiria. Mus. D. Banks.

annulata. 104. L. thorace spinoso ferrugineo, fusca, antennis
albo-annulatis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.

D. de Sehestedt.

Minuta in hoc genere. Antennae longitudine cor-
poris, fuscae: articulo secundo toto, tertio,
quarto, quinto sextoque basi albis. Corpus to-
tum ferrugineo fuscoque varium.

coquus. 105. L. thorace subspinoso, hirsuta, elytris obtusis
fulcatis atris antice ferrugineis, antennis me-
diocribus. Ent. syst. 2. 286. 75. *

Cerambyx coquus. Linn. syst. Nat. 2. 630. 44.

Habitat in America boreali.

ruspator. 106. L. thorace spinoso fusco: maculis duabus fer-
rugineis, elytris fuscis cinereo-variegatis. Ent.
syst. 2. 286. 76. *

Oliv. Inf. 67. tab. 17. fig. 129.

Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. D. Banks.

07. L. thorace spinoso quadripunctato, elytris rufis: maculis quatuor nigris, antennis brevis. *tornator.*

Ent. syst. 2. 287: 77. *

Cerambyx tetrophtbalmus. Forst. Cent. 1. 41.

Oliv. Inf. 67. tab. 8. fig. 52.

Herbst. Arch. tab. 32. fig. 4.

Habitat in America boreali.

108. L. thorace spinoso, grisea, elytris ferrugineis *Bankia* irroratis fasciisque duabus cinereis. Ent. syst.

2. 287. 78. *

Oliv. Inf. 67. tab. 15. fig. 111.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

109. L. thorace inermi, grisea, elytris fasciis duabus *saltator.* macularibus abbreviatis strigaeque postica punctata niveis, antennis brevibus. Ent. syst. 2.

287. 79. *

Habitat - - -

110. L. thorace inermi, grisea, elytris maculis duabus *stigma.* niveis, antennis brevibus.

Habitat in Insulis maris pacifici. D. Billardiere.

Parva. Antennae corpore breviores, cum capite griseae. Thorax omnino inermis, griseus, litura dorsali niveus. Elytra striato-punctata, grisea, maculis duabus magnis niveis. Corpus griseum.

111. L. thorace inermi, grisea: strigis tribus maculaque punctata marginali; albis, antennis bre- *varia.* vibus. *erector.*

Habitat in Australasiae Insulis. D. Billardiere.

Statura praecedentis. Antennae griseae, corpore breviores. Caput canaliculatum, griseum. Thorax rotundatus, inermis, griseus, strigis aliquot obscurioribus, lineolaque vtrinque obliqua, alba. Elytra punctato-striata, grisea, ante medium stri-

- frigis duabus, margine fere coëuntibus, post medium macula magna, marginali, et punctis plurimis conflata, strigaeque postica albis. Corpus griseum.
- histrion.* 112. *L. thorace inermi, flavescens: punctis numerosis niveis sparsis, antennis brevibus. Ent. syst. 2. 288. 80. **
Habitat Tranquebariae. Mus. D. Lund.
- villosa.* 113. *L. thorace subspinoso, villosa, testacea, nitida elytris basi cyaneis, antennis mediocribus. Habitat in Australasiae Insulis. D. Billardiere. Magnitudo L. pedestris. Antennae villosae, testaceae, longitudine corporis. Thorax villosus, subspinosus, testaceus, immaculatus. Elytra villosa, testacea, nitida, basi cyanea, sutura tamen testacea. Corpus testaceum.*
- testator.* 114. *L. thorace spinoso cornuque brevi recumbente, corpore testaceo, antennis brevibus apice nigris. Ent. syst. 2. 288. 81.*
Oliv. Inf. 67. tab. 16. fig. 122.
Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. D. Banks.
- pedestris.* 115. *L. thorace spinoso, atra: vitta integra alba, antennis mediocribus. Ent. syst. 2. 288. 82. **
Linn. syst. Nat. 2. 631. 51.
Oliv. Inf. 67. tab. 4. fig. 23.
VI. 247 Panz. Fn. Germ. 66. tab. 9.
Ross. Fn. Etr. 1. 146. 368.
Habitat in Europa australiori.
- rufipes.* 116. *L. thorace spinoso, nigra, elytrorum sutura alba, antennarum basi pedibusque rufis. Ent. syst. 2. 288. 83. **
Habitat in Hungaria. Dom. Hybner.
- morio.* 117. *L. thorace spinoso, nigra, elytris unicoloribus, antennis brevibus. Ent. syst. 2. 288. 84.*
Oliv.

- Oliv. Inf. 67. tab. 10. fig. 67.
Herbst. Arch. tab. 25. fig. 10.
Scopoli Ent. carn. 169.
Habitat in Europa australiori. Dom. Zschuck.
118. *L. thorace spinoso, atra, elytris marginibus lineisque duabus vtrinque coeuntibus albis.* Ent. *lineata.*
Syst. 2. 289. 85. *
Cerambyx Scopoli. Herbst. Arch. t. 25. f. 11.
Habitat in Germania. Dom. Schneider. *IV. 63 47*
119. *L. thorace spinoso, atra, elytris fuscis: margine vittaque abbreviata, albis.* *vittigera.*
Lamia vittigera. Panz. Fn. Germ. . tab. . . .
Habitat in Germania australiori. *IV. 63 48*
Nimis *L. lineatae* affinis. Caput, antennae, thorax, corpus, pedes atra, immaculata. Elytra minus atra, sine fusca margine vel potius vitta ante marginem aliaque media abbreviata albis. Sutura albicat.
120. *L. thorace spinoso, fusca: vittis tribus integris albis, antennis mediocribus.* *major.*
Ent. Syst. 2. 289. 86. *
Oliv. Inf. 67. tab. 12. fig. 84.
Ross. Fn. Etr. 1. 147. 369.
Habitat in India. Mus. Britt.
121. *L. thorace mutico, grisea, coleoptris basi bituberculatis maculisque duabus communibus, albis, antennis brevibus.* *tuberculator.*
Ent. Syst. 2. 289. 87. *
Oliv. Inf. 67. tab. 16. fig. 120.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Dom. Banks.
122. *L. thorace subspinoso, nigra, elytris frigida obliqua, alba.* *obliquator.*
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

- Statura et magnitudo *L. tuberculatoris*. Antenna longitudine corporis, nigrae, articulis basi pallidis. Caput et thorax fusca. Elytra punctata humero prominulo, nigra, stigma media, obliqua, albida. Femora subclauata.
- mutator*. 123. *L. thorace mutico, lineato, cinereo, villosa, antennis pedibusque testaceis.* Ent. syst. 2. 290. 88.*
Oliv. Inf. 67. tab. 14. fig. 102.
Habitat in Otahete. Mus. D. Banks.
- bidens*. 124. *L. thorace acute spinoso, grisea, elytris apice bidentatis.* Ent. syst. 2. 291. 95.*
Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.
- Cantator*. 125. *L. thorace mutico, cinereo, nigro-punctato, elytris pallide testaceis, apice bidentatis, cinereis nigro-maculatis.* Ent. syst. 2. 291. 96.*
Habitat in China. D. de Slanbusch.
- Solantri*. 126. *L. thorace subspinoso, nigra, elytris bidentatis, fuscis cinereo-irroratis.* Ent. syst. 2. 292. 97.*
Oliv. Inf. 67. tab. 16. fig. 118.
Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.
- cornutor*. 127. *L. thorace obtuse spinoso, mandibulis basi cornutis, antennis longissimis.* Ent. syst. 2. 292. 98.*
Oliv. Inf. 67. tab. 17. fig. 132.
Habitat in America. Mus. Britann.
- leprosa*. 128. *L. thorace spinoso, elytris basi variolosis, cinereis: macula laterali nigra, antennis longis.* Ent. syst. 2. 292. 99.*
Habitat in America. D. Drury.

17. STENOCORVS. *Palpi* quatuor:
anteriores filiformes;
posteriores clauati.
Antennae filiformes.

St. thorace subspinoso, cyanens, elytris basi flavo cyanens.
 uis. Ent. syst. 2. 293. 1. *

Cerambyx palliatus. Forst. nou. Inf. spec. Cent.
 1. 40.

Habitat in India.

St. thorace spinoso, elytris bidentatis griseis: *gargan-*
macula flava, antennis longissimis. Ent. syst. *cus.*
 2. 293. 3. *

Oliv. Inf. 67. tab. 13. fig. 105.

Drury Inf. 1. tab. 37. fig. 6.

Degeer Inf. 5. tab. 14. fig. 3.

Habitat in Marylandia. Mus. Brittan.

St. thorace utrinque bidentato, elytris bidentatis *festinus.*
 viridibus: linea laterali lutea. Ent. syst. 2.
 293. 4. *

Cerambyx festinus. Linn. syst. Nat. 2. 623. 11.

Oliv. Inf. 67. tab. 16. fig. 113.

Drury Inf. 1. tab. 37. fig. 5.

Voet. Coleopt. 2. tab. 16. fig. 66.

Herbst. Arch. tab. 25. fig. 12.

Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 6.

Degeer Inf. 5. 100. 4. tab. 13. fig. 14.

Habitat in America.

4.

Stenocori corpus subcylindricum, glabrum, immarginatum,
 tardum; *capite* rotundato; *oculis* magnis reniformibus,
 marginalibus; *antennis* elongatis: articulis apice saepe
 spinosis in serie oculorum insertis; *thorace* rotundato;
scutello orbiculato; *elytris* rigidis, fornicatis, longitudine
 abdominis, apice saepius bidentatis; *pedibus* eursoriis;
tarsis quadriarticulatis; *colore* vario.

T. II.

V

marylandicus.

4. St. thorace depresso, tuberculato, mutico, elytris bidentatis, fusco cinereoque nebulosis, antennis mediocribus Ent. syst. 2. 294. 5.

Callidium marylandicum. Oliv. Inf. 70. tab. 1. fig. 5.

Habitat in Marylandia. Mus. Britt.

spinicornis

5. St. thorace inermi, tuberculato, elytris bidentatis antennarum articulis bispinosis, corpore variegato. Ent. syst. 2. 294. 6. *

Cerambyx spinicornis. Oliv. Inf. 67. tab. 17. fig. 130.

Drury Inf. 1. tab. 41. fig. 4.

Voet. Coleopt. 2. tab. 24. fig. 131.

Habitat in America.

pictus.

6. St. thorace mutico, atro, niueo, lineato, elytris bidentatis, atris, cyaneo-variegatis, niueoque maculatis.

Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff.

Magnus in hoc genere. Antennae breues, fuscae. Caput atrum, niueo-lineatum. Thorax rotundatus, muticus, ater: lineis tribus niueis, lateribusque cyaneis. Scutellum niueum. Elytra atra, cyaneo-lineata, maculisque variis, niueis apice bidentata. Corpus niueum, cyaneo-nitidum. Pedes cyanei.

bidens.

7. St. thorace inermi, subtuberculato, antennarum articulis bispinosis, corpore testaceo. Ent. syst. 2. 294. 7. *

Cerambyx bidens. Oliv. Inf. 67. tab. 7. fig. 121.

Habitat in America meridionali. Dom. de Paykul.

semipunctatus.

8. St. thorace spinoso, inaequali, elytris bidentatis basi punctatis, apice glabris. Ent. syst. 2. 294. 8. *

Oliv. Inf. 67. tab. 2. fig. 19.

Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

9. St. thorace mutico, inaequali, elytris apice bidentatis, albo-irroratis, antennis longis, aculeatis. *irroratus*.

Ent. syst. 2. 295. 9. *

Cerambyx irroratus. Linn. syst. Nat. 2. 633. 62.

Oliv. Inf. 67. tab. 19. fig. 145.

Drury Inf. 1. tab. 41. fig. 3.

Habitat in America.

10. St. thorace spinoso, obscurus, elytris villosis, *obscurus*. punctato-striatis, apice vnispinosis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.

D. Lund.

Paullo minor St. irrorato. Antennae longitudine corporis, cinereae, articulis apice nigris. Caput obscurum, cinereo-villosum. Thorax punctatus, niger, lineis villosis-cinereis. Elytra villosa, punctato-striata, nigra, apice spina vnica, valida. Pedes ferruginei.

11. St. thorace mutico, cinereo: linea glabra, fusca, *glabratus*. elytris bidentatis. Ent. syst. 2. 295. 10. *

Habitat in Americae meridionalis Insulis. Dom. v. Rohr.

12. St. thorace spinoso, piceus, elytris punctis sparsis farinosis, antennis longis. Ent. syst. 2. 295.

11. *

Cerambyx farinosus. Linn. syst. Nat. 2. 626. 24.

Oliv. Inf. 67. tab. 7. fig. 46.

Degeer Inf. 3. 108. 9. tab. 13. fig. 17.

Habitat in radice Argemones mexicanae.

13. St. thorace spinoso, ferrugineo, elytris acuminatis: maculis tribus flauis. Ent. syst. 2. 295. *6 maculatus*.

11. *

Cerambyx 6 maculatus. Oliv. Inf. 67. tab. 15.
fig. 108.

Habitat in Cayenna. Mus. Dom. Olivier.

4 dens.

14. St. thorace quadrispinoso, elytris basi punctatis
atris: maculis tribus ferrugineis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.

Statura omnino et magnitudo St. 6 maculati. An-
tennae corpore longiores, ferrugineae, pube
aurea micantes. Thorax ater, spina laterali
duabusque dorsalibus elevatis, validis, acutis,
armatus. Scutellum pube aurea tectum. Ely-
tra atra, basi punctata: macula glabra, ferru-
ginea, apice glabra, maculis duabus approxima-
tis, ferrugineis; exteriore longiore, terminata
spina elongata, valida, acuta.

5 macula-
tus.

15. St. thorace subspinoso, rufo: maculis quatuor
flavis, elytris bidentatis, rufis: punctatis duo-
bus lineaque apicis albis, antennis longissimis.
Ent. syst. 2. 296. 13. *

Habitat in Insula Guadeloupa. Dom. Isert.

4 macula-
tus.

16. St. thorace spinoso, feabro, elytris bidentatis:
maculis binis glabris. Ent. syst. 2. 296.

14 *

Cerambyx 4 maculatus. Linn. syst. Nat. 2. 627.
27.

Sloan Jamaic. 2. tab. 237. fig. 3.

Drury Inf. 1. tab. 37. fig. 3.

Voet. Coleopt. 2. tab. 15. fig. 65.

Habitat in America meridionali.

maculosus. 17. St. thorace spinoso, fuscus, elytris bidentatis:
maculis binis glabris, antennis mediocribus,
nigris. Ent. syst. 2. 296. 15. *

Cerambyx maculosus. Oliv. Inf. 67. t. . f. .
Habi-

Habitat in America meridionali. Mus. Dom. Olivier.

8. St. thorace mutico, nigro: macula vtrinque *geminatus*. rufa, elytris nigris: maculis binis glabris, antennis longissimis. Ent. syst. 2. 297. 16. *

Habitat in Sierra Leon Africae. Dr. Pflug.

9. St. thorace mutico, cylindrico, cinereo, elytris *cylindricis*. ferrugineis: maculis duabus flavescentibus, ob-
collis. soletis. Ent. syst. suppl. 146. 16. *

Habitat in Americae Insulis. Dom. v. Rohr.

10. St. thorace mutico, pallidus, elytris unispinosis: *pallens*. punctis tribus nigris, antennis longis. Ent. syst. 2. 297. 17. *

Habitat in Americae meridionalis Insulis. Dom. Isert.

11. St. thorace mutico, antice attenuato, ferrugineus, *strepens*. elytris pallidis. Ent. syst. 2. 297. 18. *

Cerambyx strepens. Oliv. Inf. 67: tab. . fig. .

Habitat in Gallo provincia noctu volitans cum strepitu. Mus. Dom. Olivier.

12. St. thorace mutico, subrotundo, rufus, elytris *testaceis*. testaceis: margine vittaque abbreviata, cyaneis.

Habitat in Brasilia. Dom. Weber.

Statura et magnitudo praecedentis. Antennae corpore longiores, ferrugineae. Caput ferruginum. Thorax rotundatus, muticus, scaber, ferrugineus, annulo magno, cyaneo. Elytra testacea: margine exteriori vittaque media abbreviata, cyaneis. Corpus et pedes ferruginea.

13. St. thorace mutico, atro, elytris bidentatis, basi *fasciatus*. testaceis, apice atris: fascia pallida. Ent. syst. 2. 297. 19. *

Oliv.

Oliv. Inf. 67. tab. 14. fig. 98.

Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. D. Banks.

- circumflexus*, 24. St. thorace mutico, ferrugineus, elytris videntatis, testaceis: punctis duobus frigaque videntata, fuscis. Ent. syst. 2. 300. 20. *
Habitat in Cayenna. Dom. v. Rohr.
- nanus*, 25. St. thorace rotundato, mutico, griseus, antennis pedibusque testaceis. Ent. syst. 2. 300. 21. *
Habitat - - Mus. Dom. Lund.
Forte potius Callidium. Elytra apice emarginata.
- annulatus*. 26. St. thorace lineato, elytris videntatis, antennis longis: annulis tribus albis. Ent. syst. 2. 300. 22. *
Cerambyx annulatus. Oliv. Inf. 67. tab. 16. fig. 117.
Cerambyx hirtipes. Degeer Inf. 5. 116. 19. tab. 14. fig. 10.
Habitat in America meridionali. Mus. D. Banks.
- maculatus*. 27. St. thorace subspinoso, quadrimaculato, elytris bidentatis, ferrugineis, flavo cinereoque maculatis. Ent. syst. 2. 300. 23. *
Oliv. Inf. 67. tab. 12. fig. 86.
Habitat in America. Mus. D. Banks.
- lineola* 28. St. thorace spinoso, ferrugineo, elytris acuminatis, testaceis: lineolis tribus glabris, flavis. Ent. syst. 2. 301. 24. *
Oliv. Inf. 67. tab. 2. fig. 19.
Habitat in Brasilia. Mus. D. Banks.
- hemipterus* 29. St. thorace spinoso, ater, elytris abbreviatis. Habitat in Jaua. Mus. Dom. Bosc.
Magnus. Antennae atrae, altero latere spinosae, longitudine corporis. Caput atrum, mandibulis exsertis, acutis. Thorax villosus, ater vtrinque

que spina obtusa. Elytra valde abbreviata, vix striata, atra, apice acutiuscula. Pedes atrii, tibiis posticis compressis.

30. St. thorace subspinoso, elytris bidentatis, cinereo fufco flauoque variis: angulo bafeos compresso. Ent. fyft. 2. 301. 25.
Habitat in Cayenna. Dom. v. Rohr.
31. St. thorace spinoso, ater, elytris apice unispinosis, basi testaceis, antennis longis. Ent. fyft. 2. 301. 26. *
Cerambyx pubescens. Oliv. Inf. 67. tab. 18. fig. 135.
Habitat in Cayenna.
32. St. thorace mucico, obscurus, cinereo-villosus, villosus. elytris bidentatis. Ent. fyft. 2. 302. 27. *
Habitat in Carolina.
33. St. thorace subspinoso, elytris truncatis, bidentatis, ferrugineis, cinereo-fasciatis, antennis breuibus. Ent. fyft. 2. 302. 28. *
Habitat in America. Dom. Drury.
34. St. thorace spinoso, cinereus, elytris bidentatis: vndatus. fasciis duabus vndatis, nigris. Ent. fyft. 2. 302. 29. *
Habitat in America. Dom. Drury.
35. St. thorace spinoso fufco cinereoque, griseus, elytris punctato-striatis. Ent. fyft. suppl. 147. 29. *
Habitat in America. Dom. Hybner.
36. St. thorace spinoso, ferrugineo, fufcus, elytris bidentatis, pallidioribus, antennis longis. Ent. fyft. 2. 302. 30. *
Oliv. Inf. 69. tab. 2. fig. 16.
Habitat in India orientali. Mus. Dom. Banks.

angulatus. 37. St. thorace mutico, cinereus, elytris macula
marginali fasciaque angulata, nigris.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.

Paruus in hoc genere. Antennae corpore duplo
longiores: articulo primo longiori, incuruo.
Caput et thorax cinerea. Elytra laeuis, cinerea:
macula magna marginali, fasciaque postica an-
gulata, fuscis, apice parum acuminata. Femo-
ra clauata.

138. CALOPVUS. *Palpi* quatuor;
antiores clauati,
posteriores filiformes.

Maxilla bifida.

Ligula membranacea, bifida

Antennae filiformes.

ferraticor- 1. CALOPVUS.

nis.

Cerambyx ferraticornis. Linn. syst. Nat. 2. 634.
65. Fn. Sv. 665.

Degeer Inf. 5. 79. 16.

IV. 40. Payk. Fn. Sv. 3. 65. 1.

Habitat in Europa boreali.

Animalculum elongatum, cylindricum, obscu-
rum.

139. RHAGIVM. *Palpi* quatuor, capitati.
Maxilla unidentata.
Ligula membranacea, bifida.
Antennae fetaceae.
1. R. thorace spinoso, griseum, elytris nebulosis, te- *mordax*.
 staceo-subfasciatis. Ent. syst. 2. 303. 1. ^{44-55 IV. 48}
 Schaeff. Icon. tab. 8. fig. 2.
 Habitat in Germania. Dom. Schneider.
2. R. thorace spinoso, nigrum, elytris nebulosis, te- *inquisitor*.
 staceo-subfasciatis. Ent. syst. 2. 304. 2. -
~~*Cerambyx inquisitor*. Linn. syst. Nat. 2. 630.~~
 49. Fn. Sv. 659.
 Geoff. Inf. 1. 223. 2.
~~Frish. Inf. 13. tab. 14.~~
 Oliv. Inf. 69. tab. 2. fig. 12.
~~Degeer Inf. 5. 126. 2. tab. 4. fig. 1.~~ ^{44-55 IV. 49}
 Payk. Fn. Sv. 3. 66. 1.
 Habitat in Europae truncis arborum.
Larva hexapoda, nuda, alba, capite collarique
 corneis, fuscis, dorso canaliculato. Stroem.
 Act. Hafn. 1.
3. R. thorace spinoso, cinereum, elytris lineis tribus, *indagator*.
 eleuatis: antennis fasciisque duabus nigris.
 Ent. syst. 2. 304. 3. ^{44-55 IV. 49}
 Degeer Inf. 5. tab. 4. fig. 7.
 Payk. Fn. Sv. 3. 66. 2.
 Habitat in Germania. Dr. Schulz.

4.

Rhagi corpus oblongum, glabrum, immarginatum, tardum;
 capite magno, ovato, prominulo; oculis rotundatis, pro-
 minulis; antennis elongatis, approximatis, inter oculos in-
 fertis; thorace angusto, cylindrico, vtrinque spinoso; scu-
 tello rotundato; elytris rigidis, fornicatis, thorace multo
 latioribus, longitudine abdominis; pedibus cursoriis; tar-
 sis quadriarticulatis; coxae vaele.

curfor.

4. R. thorace spinoso, elytris rufis: sutura lineaque nigris. Ent. syst. 2. 304. 4.
Cerambyx curfor. Linn. syst. Nat. 2. 630. 45.
 Fn. Sv. 658.
 Degeer Inf. 5. 127. 3.
 Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 7.
 Payk. Fn. Sv. 3. 67. 3.
 Habitat in Europa boreali.

cinctum.

5. R. thorace spinoso, nigrum, elytris subserrugineis: fascia flava, femoribus posticis videntatis. Ent. syst. 2. 305. 5. *
 Habitat in Austria. Dom. Saldoner.

Salicis.

6. R. thorace tuberculato, spinosoque, rufum, pectore elytrisque nigris.
Callidium Salicis. Ent. syst. 2. 329. 51. *
Rhagium etruscum. Ross. Fn. Etr. 1. 149. 373.
 tab. 1. fig. 13.
Stenocorus ruficollis. Herbst. Arch. t. 25. f. 13.
 Habitat in Europae Salicibus.

Noctis.

7. R. thorace spinoso, nigrum, antennarum basi ferruginea. Ent. syst. 2. 305. 6.
Cerambyx Noctis. Linn. syst. Nat. 2. 630. 48.
 Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 2.
 Panz. Fn. Germ. 17. tab. 3.
 Habitat in Europa boreali.

bifascia-
tum.

8. R. thorace spinoso, elytris fasciis duabus obliquis flavis. Ent. syst. 2. 305. 7. *
 Degeer Inf. 5. 124. 1. tab. 4. fig. 6.
 Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 8.
 Oliv. Inf. 69. tab. 1. fig. 6.
 Schaeff. Elem. tab. 118. fig. 1.
~~Icon. tab. 8. fig. 1-3.~~
 Herbst. Arch. 170. tab. 45. fig. 12.
 Geoff. Inf. 1. 222. 1.
 Habitat in Europa boreali.

9. R. thorace ~~sub~~ spinosum, nigrum, elytris flavo *clatratum*
subreticulatis, pedibus rufis. Ent. syst. 2. 306. *tum.*
8. *
Habitat in Austria. Dom. Saldoner. *IV. 4750*
10. R. thorace spinoso, nigrum, elytris fascia lata, *ornatum*.
flava. Ent. syst. 2. 306. 9. *
Habitat in Pennsylvania. Mus. Dom. Banks.
11. R. thorace spinoso, elytris elevato-friatis, *minutum*.
nereis, nigro-vndatis. Ent. syst. 2. 306. 10. *
Oliv. Inf. 69. tab. 1. fig. 3.
Habitat Kiliae. *spec. de Exemplar u. R. indagata*

140. GNOMA. Palpi quatuor: articulo ultimo setaceo.

Maxilla bifida: lacinia exteriore apice crassiore.

Ligula cornea, apice rotundata, subemarginata.

Antennae setaceae.

1. G. nigra, ferrugineo-irrorata, antennis longissimis. *longicollis.*

Cerambyx longicollis. Ent. syst. 2. 265. 52. *

Oliv. Inf. 67. tab. 11. fig. 73.

Habitat in India orientali. Mus. Dom. Lund.

Os maxillis palisque. Palpi quatuor, inaequales, filiformes: *anteriores* paullo longiores, quadr-

Gnomae corpus subcylindricum, glabrum, immarginatum, tardum; capite magno, cylindrico, inserto; oculis magnis, reniformibus, lateralibus; antennis longis, approximatis. in sinu oculorum insertis; thorace elongato, cylindrico, rugoso, elytris multo angustiore; scutello rotundato; elytris rigidis, fornicatis, abdomine longioribus; pedibus longifuscis, compressis; tarsis quadriarticulatis; colore vario.

driarticulati, articulo primo brevissimo, secundo longiori, incuruo, tertio breviori, quarto longiori, fetaceo, adhaerentes maxillae dorso, *posteriores* paullo breviores, triarticulati, articulo ultimo fetaceo, adnati ligulae medio. *Mandibula* cornea, incurua, compressa, acuta, edentula. *Maxilla* cornea, bifida: lacinia inferiore brevior, compressa, ciliata, exterior subcylindrica, in medio crassa, ore incurua, parum pilosa. *Ligula* porrecta, cornea, basi angustata, compressa, apice rotundata, dilutata, subintegrâ. *Labium* breve, corneum, transversum, integrum. *Antennae* longissimae. Genus *Saperdis* affine.

cylindri-
collis.

2. *G. oliuacea*, albolineata, antennis longissimis, atris.

Habitat in Sumatra. D. Daldorff. Mus. D. de Sehestedt.

Minor *G. longicollis*. Antennae corpore duplo longiores, atrae, articulo tertio brevi, quarto quintoque basi parum albidis. Caput oliuaceum, orbita oculorum lineisque frontalibus albis. Thorax cylindricus, elongatus, oliuaceus, lineis tribus integris, albis. Elytra punctato-friata, oliuacea, humeris albis; puncto magno atro in medio, lineola parva, poneque medium striga albidis. Corpus albidum, pedibus oliuaceis.

clavipes.

3. *G. cinerea*, femoribus clauatis.

Habitat in Americae meridionalis Insulis. Mus. D. de Sehestedt.

Praecedentibus multo minor. Antennae villosae, corpore longiores: articulis basi ferrugineis, apice fuscis. Thorax cylindricus, elongatus, inermis, dorso tuberculis aliquot obsoletis. Ely-

Elytra punctis elevatis, minutis, scabra, apice rotundata, integra. Corpus cinereum, femoribus valde clauatis.

4. *G. thorace rugoso, nigra, elytris sanguineis.* *rugicollis.*

Habitat in Carolina. Muf. Dom. Bost.

Media, antennae nigrae in altero Textu corpore longiores. Thorax cylindricus, rugosus, ater, immaculatus. Elytra porcata, sanguinea, immaculata. Corpus nigrum, abdomine sanguineo. Pedes atri, femoribus valde clauatis.

141. SAPERDA. *Palpi filiformes.*
Maxilla membranacea, bifida.

Ligula cordata, truncata.

Antennae setaceae.

1. *S. corpore griseo, nigro, punctato, antennis me-* *carcharias*
diocribus. Ent. syst. 2. 307. 1.

Cerambyx carcharius. Linn. syst. Nat. 2. 631. 52.

Fn. Sv. 660.

Oliv. Inf. 68, tab. 2. fig. 22.

Geoff. Inf. 1. 308. 1.

Drury Inf. 1, tab. 41. fig. 5.

Schaeff. Icon. tab. 152. fig. 4.

Panz. Fn. Germ. 69. tab. 1.

Degeer Inf. 5. 73. 10. tab. 3. fig. 19.

Payk.

Saperda corpus elongatum, cylindricum, glabrum, immarginatum, agile; capite rotundato, transverso, inserto; oculis reniformibus, lateralibus; antennis elongatis, in oculostrum sinu insertis; thorace breui, rotundato, therni; scutella parvo, rotundato; elytris rigidis, fornicata, longitudine abdominis; pedibus breuib, cursoriis; tarsis quadriarticulatis; colore vario.

1. Payk. Fn. Sv. 3. 71. 1.
Habitat in Europae syluis.

scalaris.

2. *S. coleoptris* linea suturali dentata punctisque flavis, antennis mediocribus. Ent. syst. 2. 307. 2.
Cerambyx scalaris. Linn. syst. Nat. 2. 632. 55.
Fn. Sv. 697.

Oliv. Inf. 68. tab. 1. fig. 7.

Vl. 22

Panz. Fn. Germ. 64. tab. 3.

Voet. Coleopt. 2. tab. 17. fig. 78.

Frish. Inf. 12, 29, tab. 3. fig. 3.

Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 5.

Degeer Inf. 5. 77. 14.

Payk. Fn. Sv. 3. 72. 2.

Habitat in Europae Populo.

vittigera.

3. *S. fusco-grisea*, elytris vitta lata, alba: punctis impressis, nigris.

Habitat in Barbaria. Dom. de Rehbinder.

Statura et magnitudo *S. scalaris*. Antennae corpore breviores, fuscae. Caput et thorax punctata, grisea. Elytra plera, punctata, grisea. vitta lata, dorsali, alba et in hac puncta impressa, nigra, magis distincta. Corpus obscure-griseum.

laeta.

4. *S. atra*, thorace margine elytris maculis flavis punctisque duobus albis.

Oliv. Inf. 68. tab. 9. fig. 76.

Habitat in Guinea. Meier. Mus. D. Lund.

Statura et magnitudo *S. scalaris*. Antennae corpore breviores, atrae. Caput atrum, macula magna frontali orbitaque oculorum laete flavis. Thorax lateribus late flavis. Elytra atra, maculis duabus magnis ad marginem exteriorem coeuntibus flavis. Pone has puncta duo alba et versus apicem macula minor flava. Sutura parum albicat.

5. *S. alba*, thorace coleoptrisque fuscis: vittis duabus albis. Ent. syst. 2. 307. 3. *
 Habitat - - Mus. Dr. Hunter.
6. *S. nigra*, cinereo-villosa, thorace linea dorsali, elytris vitta albis, antennis breuibus. Ent. syst. 2. 308. 4. *
 Habitat in Barbaria. Mus. Dom. Desfontaines.
7. *S. liuida*, antennis elytrorumque punctis atris. *morbillosa*. Ent. syst. suppl. 147. 4. *
 Habitat Tranquebariae. Mus. D. Lund.
8. *S. atra*, elytris, albo-punctatis, antennis longis. *irrorata*. Ent. syst. 2. 308. 5. *
 Habitat in Africae plantis. Dom. Vahl.
Variat, elytris immaculatis, forte aetate.
9. *S. nigra*, capite thorace anoque ferrugineis. Ent. *modesta*. syst. 2. 308. 6. *
 Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. D. Banks.
10. *S. ferruginea*, antennis abdominisque apice supra nigris, elytris emarginatis. Ent. syst. 2. 308. 7. *
 Habitat in China. Mus. D. de Sehestedt.
11. *S. thorace luteo*: punctis duobus atris, elytris *oculata*. nigris. Ent. syst. 2. 308. 8.
Cerambyx oculatus. Linn. syst. Nat. 2. 633. 60.
 Fn. Sv. 664.
 Oliv. Inf. 68. tab. 1. fig. 4.
 Panz. Fn. Germ. 1. tab. 18. L. 49.
 Degeer Inf. 5. 74. 11. tab. 3. fig. 20.
 Schaeff. Icon. tab. 128. fig. 4.
 Hoefnag. Inf. tab. 13.
 Payk. Fn. Sv. 3. 72. 2.
 Habitat in Europa syluis.

- tricolor.* 12. *S. ferruginea*, elytris bidentatis, punctato-striatis, virescentibus, antennis medioeribus nigris. Ent. syst. 2. 309. 9. *
Habitat in India orientali. Mus. D. de Sehestedt.
- villosa.* 13. *S. ferrugineo-griseo-villosa*, scutello orbitaque oculorum fulvis.
Saperda birta. Ent. syst. 2. 309. 10. *
Habitat in noua Zelandia. Mus. D. Banks.
- unicolor.* 14. *S. testacea*, antennis pedibusque concoloribus, antennis longis. Ent. syst. 2. 309. 11. *
Habitat in Insula Amsterdam. Mus. D. Banks.
- linearis.* 15. *S. cylindrica*, nigra, pedibus luteis, antennis medioeribus. Ent. syst. 2. 309. 12.
Cerambyx linearis. Linn. syst. Nat. 2. 632. 58.
Fn. Sv. 663.
Oliv. Inf. 68. tab. 2. fig. 13.
Schaeff. Icon. tab. 55. fig. 6.
I. 44. Herbst. Arch. tab. 26. fig. 1.
Payk. Fn. Sv. 3. 73. 3.
Habitat in Europae Corylo.
- nigripes.* 16. *S. cylindrica*, nigra, thoracis lineis duabus scutelloque cinereis, pedibus nigris. Ent. syst. 2. 310. 13. *
Habitat in Hungaria. Dom. Smidt.
- cylindrica.* 17. *S. cylindrica*, nigra, pedibus anticis luteis. Ent. syst. 2. 310. 14.
Cerambyx cylindricus. Linn. syst. Nat. 2. 633. 59.
Fn. Sv. 662.
Oliv. Inf. 68. tab. 2. fig. 11.
VI. 12. Roef. Inf. 2. scarab. 2. tab. 3.
Geoff. Inf. 1. 208. 2.
Degeer Inf. 5. 75. 12.
Panz. Fn. Germ. 69. tab. 4.

Payk.

Payk. Fn. Sv. 3. 73. 4.

Habitat in Pyri et Pruni ramis.

18. *S. cylindrica*, atra, thorace supra ferrugineo: punctis tribus nigris. Ent. syst. 2. 310. 15. * *tripunctata*.

Habitat in Virginia.

19. *S. cylindrica*, thorace ferrugineo: punctis tribus atris, elytris atris: vitta abbreviata testacea. *mandarina*.

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Affinis certe *S. tripunctatae*, vix distincta. Caput ferrugineum, antennis nigris. Thorax ferrugineus, punctis tribus atris, duobus in medio tertioque in medio baseos. Elytra punctatofriata, atra: vitta lata media pallida, quae tamen apicem haud attingit.

20. *S. thorace rufo*, corpore nigro, pedibus rufis. *melanocephala*.
Ent. syst. 2. 310. 16. *

Habitat in Africa. D. Prof. Vahl.

21. *S. violacea*, antennarum articulo primo secundoque clavato-pilosis. Ent. syst. 2. 310. 17. * *pilicornis*.

Pall. Icon. tab. F. fig. 12.

Habitat in America meridionali. D. m. Hybner.

22. *S. atra*, elytris emarginatis basi flavis, antennis barbatis. *humeralis*.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lünd.

Statura praecedentium. Antennae corpore paullo longiores, nigrae, pilis longioribus barbatae. Caput et thorax nigra. Elytra striata, emarginata, nigra, basi flava. Corpus nigrum, cinereo-pubescens.

23. *S. capite thoraceque rufis*, elytris evaneis, antennis mediocribus ante apicem barbatis. Ent. syst. 2. 311. 18. * *barbicornis*.

Habitat in Brasilia.

T. II.

X

24. S.

- erythrocephala.* 24. S. thorace villoso, rufa, antennis, pectore elytrisque nigris. Ent. syst. 2. 311. 19. *
Cerambyx erythrocephalus. Schrank. Austr. 270.
 Panz. Fn. Germ. 69. tab. 5.
 Habitat in Germania. Dom. Hybner.
- discoidea.* 25. S. thorace villoso, virescens, coleoptorum disco fusco: punctis duobus fasciaque communi lunata virescentibus. Ent. syst. suppl. 147. 19. *
 Habitat in America boreali. D. v. Rohr.
- ruficollis.* 26. S. thorace villoso, rufo, antennis elytrisque fasciis. Ent. syst. 2. 311. 20. *
 Habitat in Virginia.
- fasciata.* 27. S. thorace subspinoso, cyanea, elytris fasciis duabus flavis. Ent. syst. 2. 311. 21. *
 Oliv. Inf. 68. tab. 3. fig. 24.
 Habitat in Sibiria. Mus. D. Banks.
- clavicornis.* 28. S. viridis, elytris maculis tribus flavis. Ent. syst. 2. 311. 22. *
 Oliv. Inf. 68. tab. 3. fig. 30.
 Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.
- lutes.* 29. S. nigra, femoribus clauatis apice violaceis, tibiis posticis compressis, antennis longis. Ent. syst. 2. 312. 23. *
 Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Prof. Leske.
- vittata.* 30. S. grisea, vittis tribus dentatis albis, antennis longis. Ent. syst. 2. 312. 24. *
Cerambyx trilineatus. Linn. Mant. 352.
 Drury Inf. 1. tab. 41. fig. 1.
 Oliv. Inf. 67. tab. 19. fig. 142.
 Habitat in America. D. Drury.
- punctata.* 31. S. nigra, elytris punctis tribus flavis. Ent. syst. 2. 312. 25. *
 Habitat ad Cap. Bon. Spei. D. de Paykull.

32. *S. grisea*, antennis breuibus atris, apice griseis, *acuminatae*
elytris apice acuminatis nigris.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.

Statura parua *S. lateralis*. Antennae breues,
crassiores, articulis tribus vltimis griseis. Tho-
rax griseus, linea dorsali lata lateralibusque
nigris. Elytra laeua, grisea, sutura late api-
ceque acuminato nigris. Corpus cinereum.

33. *S. nigra*, capite thoracisque spinosi lateribus ru-
fis, antennis breuibus, apice griseis. *crassicornis.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Statura et magnitudo praecedentis. Antennae
breues, crassae, nigrae, apice cinerascens.

- Caput rufum. Thorax spinosus, niger, lateri-
bus late rufis. Elytra laeua, nigra, apice emar-
ginata. Corpus nigrum.

34. *S. nigra*, thoracis lateribus elytrorumque vitta *lateralis*.
lateralis ferrugineis. Ent. syst. 2. 312, 26. *

Habitat in America boreali. Mus. D. Banks.

35. *S. thorace atro*, puncto vtrinque ferrugineo, *lyncea*.
elytris acuminatis griseis. Ent. syst. 2. 313.
27. *

Habitat in noua Zelandia. Mus. D. Banks.

36. *S. cinerea*, thorace elytrisque nigro-punctatis, *Boscii*.
antennis longis.

Habitat in Iaua. Mus. D. Bosc.

Corpus medium. Antennae corpore duplo lon-
giores, nigrae. Caput cinereum, macula ver-
ticali nigra. Thorax rotundatus, muticus,
laete cinereus, punctis nigris dorsalibus tribus
2. 1. baseos maiori, transuerso lateralibusque
vtrinque tribus. Elytra laeua, laete cinerea,
punctis

punctis plurimis nigris: tribus communibus.
Pedes elongati, nigri.

- grisea.* 37. *S. grisea*, scutello margine, elytris lineolis flavescentibus. Ent. syst. 2. 213. 28. *
Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.
- gracilis.* 38. *S. ferruginea*, elytris testaceis: vitta marginali antennisque nigris.
Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.
Statura omnino *S. analis*. Caput ferrugineum, antennis totis nigris. Thorax cylindricus, rufus, immaculatus. Elytra plana, punctato-striata, testacea, vitta marginali nigra. Corpus rufum.
- biloba.* 39. *S. thorace rotundato rugoso, cinerea, ooleoptris maculis quinque niveis: communi biloba, antennis longis.*
Habitat in Insulis Oceani australis. D. Billardiere.
Statura et magnitudo *S. griseae*. Antennae longissimae, testaceae: articulo primo griseo. Caput griseum, sub antennis nium. Thorax cylindricus, rugosus, griseus, punctis duobus baseos niveis. Scutellum nium. Elytra laevia, lineola marginali baseos puncto pore medium macula maiori, communi biloba, baseos niveis. Corpus nium.
- virginica.* 40. *S. cinerea*, thorace subspinoso: maculis duabus nigris, elytris apice bidentatis flavis: fascia grisea.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.
Parua. Caput flauum, antennis longitudine corporis nigris. Thorax subspinosus, cinereus, maculis duabus marginis antici fuscis. Elytra cinerea margine laterali nigro, apice emarginata, flaua: fascia fusca. Corpus cinereum.

41. *S. testacea*, elytris apice anoque nigris. Ent. syst. *analis*.

2. 313. 29. *

Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. D. Banks.

42. *S. thorace rotundata*, flava, antennis elytrisque *bidentata*.
apice bidentatis, nigris. Ent. syst. 2. 313. 30. *

Habitat in Aquapim Guineae. Dr. Isert.

Variat capite nigro et flavo, thorace punctis quatuor duobus, aut nullis.

43. *S. grisea*, elytris apice rotundatis, atris: litura *liturata*.
flava.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Parva. Antennae corpore longiores, nigrae. Caput griseum, striga verticali flava. Thorax griseus, linea dorsali flavescente. Elytra punctata, grisea, apice rotundata, atra: litura flavescente. Corpus griseum, femoribus clauatis.

44. *S. obscura*, elytris bidentatis, fuscis: vitta grisea, antennis elongatis, atris, ante apicem albis. *varicornis*

Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff. Mus. D. de Sehestedt.

Statura parva *S. cylindricae*. Antennae corpore longiores, atrae: articulo ultimo basi late albo. Caput obscurum. Thorax cylindricus, inermis, niger: linea laterali pallida. Scutellum pallidum. Elytra punctata, fusca: vitta lata media pallefcente, apice bidentata. Corpus fuscum: lateribus pallefcentibus.

45. *S. fusca*, thorace lineato, scutello flavo, antennis longis. *Cardui*.

Saperda nigricornis. Ent. syst. 2. 314. 31. *

Cerambyx Cardai. Linn. syst. Nat. 2. 632. 56. VI. 23

Oliv. Inf. 68. tab. 1. fig. 5.

Panz. Fn. Germ. 69. tab. 6.

Herbst.

Herbst. Arch. tab. 26. fig. 2.

Habitat in Europae australioris *Carduis*.

birfutula. 46. *S. villosa*, cinerea, thorace lineato, elytris nigro-irroratis.

Habitat in Austria. Dom. de Meyerle.

IX.

Nimis affinis *S. nigricornis*, at magis villosa et elytra magis nigro-irrorata. Forte mera varietas.

nigricornis.

47. *S. cinerea*, thorace lineato, elytris fuscis unicoloribus, antennis mediocribus.

IX.

Saperda futuralis. Ent. syst. 2. 314. 32. *

Habitat Lipsiae. Prof. Leske.

futuralis.

48. *S. thorace lineato*, virescens, elytris acuminatis: futura alba.

Saperda annulata. Ent. syst. 2. 314. 33. *

Oliv. Inf. 68. tab 2. fig. 16.

II. 41.

Panz. Fn. Germ. 23. tab. 16.

Roff. Fn. Etr. 1. 152. 379.

Habitat in Africae plantis. Dom. Prof. Vahl.

annulata.

49. *S. thorace rotundato*, subspinoso, antennarum articulis basi albis.

Saperda lineata. Ent. syst. 2. 314. 34. *

Habitat in America meridionali. Mus. D. Lund.

lineata.

50. *S. thorace rotundato*, nigro, albo-lineato, elytris bidentatis, testaceis, albo-lineatis.

Saperda tristis. Ent. syst. 2. 314. 35. *

Habitat Tranquebariae. Mus. D. Lund.

tristis.

51. *S. thorace quadrispinoso*, corpore fusco. Mant. Inf. 1. 220. 23. *

Habitat in Germania.

ferrea.

52. *S. thorace rotundato*, hirta, fusca, elytris punctatis.

Saperda ferrea. Schrank. Austr.

Habitat in Austria. Dom. de Meierle.

IX.

variet. nigripilis

Cor-

Corpus totum fuscum, griseo-hirtum. Thorax rotundatus, muticus. Elytra punctis impressis.

53. S. thorace fusco, albolineato, elytris acuminatis, *acuta.*
 fuscis: striga abbreviata lineolaque apicis albis.
 Habitat in Sumatra. D. Daldorff.

Media. Antennae breves, fuscae: articulo tertio elongato, apice albo. Caput fuscum, lineis quatuor albis. Thorax rotundatus, inermis, fuscus: lineis tribus albis. Elytra plana, punctata, fusca, striga media abbreviata, externe angulum paruum formante, alba, apice acuminata, lineola parva, albida. Corpus fuscum, vittis niueis.

54. S. thorace mutico, atro: lateribus niueis, elytris cinereis, apice bidentatis, fuscis: macula fulva. *dimidiata.*

Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff.

Parva. Antennae obscure-ferrugineae longitudine corporis. Caput nigrum, orbita oculorum cinerea. Thorax rotundatus, muticus, ater, lateribus niueis. Elytra plana, basi punctata, cinerea, apice bidentata, fusca, macula laete fulva. Corpus niueum, ano nigro. Pedes testacei.

55. S. thorace flavo, lineato, elytris punctis quatuor *populnea.*
 flavis, antennis mediocribus. Ent. syst. 2. 315.

37.

Cerambyx populneus. Linn. syst. Nat. 2. 632.
 Fn. Sv. 661.

VI. 23

Oliv. Inf. 68. tab. 1. fig. 1.

Geoff. Inf. 1. 208. 3.

Panz. Fn. Germ. 69. tab. 7.

Schaeff. Icon. tab. 48. fig. 5.

Habitat in Europae Americae Populetis.

56. S. viridis, thorace punctis duobus, elytris quatuor *tremula.*
 nigris. Ent. syst. 2. 315. 38.

Panz. 2. 45.

Panz. Fn. Germ. 1. tab. 7.
 Schaeff. Icon. tab. 101. fig. 1.
 Habitat Halae Saxonum. Dr. Schreber.

punctata. 57. *S. viridis*, punctis nigris numerosis, antennis mediocribus. Ent. syst. 2. 315. 39.

Cerambyx punctatus. Linn. syst. Nat. 2. 1067. 7.

Oliv. Inf. 68. tab. 1. fig. 9.

iv. 63. Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 10.

Habitat in Europa australi.

Seidlii.

58. *S. cinerea*, thorace punctis octo, elytris quinque nigris.

~~*Saperda Seidlii*~~. Panz. Nat. 24. 28. 36. tab. 1. fig. 36.

Habitat in Austria. Dom. de Meyerle.

Statura omnino et magnitudo *S. tremulae*. Antennae mediocres, cinerae, articulis apice nigris. Caput cinereum, fronte nigra. Thorax cinereus, vtrinque punctis quatuor nigris. Elytra planiuscula, cinerea, punctis quinque nigris, praeterea linea lateralis a basi ultra medium ducta et sub hac punctum solitarium. Corpus cinereum.

virescens. 59. *S. thorace villosa*, cinereo, elytris subattenuatis, viridibus. Ent. syst. 2. 315. 40. *

Oliv. Inf. 68. tab. 2. fig. 11.

Panz. Naturf. 24. 28. 37. tab. 1. fig. 37.

Habitat in Italia, Dr. Allioni; in Galliae Sambuco, Dr. Broussonet.

tenuicornis. 60. *S. nigra*, thoracis lateribus, elytrorum macula basos fasciaque media ferrugineis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Media. Antennae corpore duplo longiores, tenuissimae, nigrae: articulo primo crassiori, longissimo.

fimo. Caput nigrum, ore lineaque inter antenas ferrugineis. Thorax holosericeus, niger, lateribus rufis. Elytra nigra, macula magna basaeos. cum thoracis margine coeunte fasciaque mediaque ferrugineis. Corpus nigrum, pedibus flavescentibus.

61. *S. capite thoraceque rufis, nigro-punctatis, elytris griseis, immaculatis.* *Argus.*

Panz. Fn. Germ. 69. tab. 2.

Habitat in Hungaria. Dom. de Meyerle.

Paullo minor *S. tremula*. Antennae corpore breviores, nigrae. Caput rufum, puncto medio frontali tribusque basaeos nigris. Thorax rotundatus, rufus: punctis septem 4. 3. elevatis, glabris, atris. Elytra pubescentia, grisea. Corpus griseum, ano late rufo. Pedes rufi femoribus, puncto apicis nigro.

VI. 22.

62. *S. fusca, pedibus testaceis, antennis longissimis, nigris: annulo albo.* Ent. syst. 2. 315. 41. *longicornis*

Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. D. Banks.

63. *S. fusca, antennis obscuris, pedibus testaceis.* *flavipes.*

Habitat in Tanger. Dr. Schousboe. Mus. D. de Schestedt.

Statura et magnitudo praecedentium. Antennae obscurae: articulo primo longiori, nigro. Caput, thorax, elytra subtruncata, nigra, immaculata. Pedes testacei.

64. *S. fusca, cinereo-trilineata, antennis longissimis.* *antennata.*

Habitat in Guinea. Dom. Hesse. Mus. D. Lund.

Corpus tenue, elongatum. Antennae corpore duplo longiores, fuscae. Caput et thorax fusca, lineis tribus cinereis. Elytra piceo-fusca, lineis obsoletis, cinereis, apice rotundata.

65. *S. niuea, dorso atomisque numerosissimis atris.* *marginata*
~~*tricolorata*~~

Habitat in Java. Mus. Dom. Bosc. Paul-

- *Paullo maior* S. voluulo. Antennae corpore breviores, nigrae: articulis basi albis. Caput villosum, album, punctis numerosis, atris. Thorax elytraque villosa, niuea: dorso atomisque numerosis, atris.

femorata. 66. S. thorace antice fusco, postice testaceo, elytris fasciis tribus nigris testaceisque, antennis longissimis. Ent. syst. 2. 316. 42. *

Habitat - - Mus. Britt.

baemorrboidalis. 67. S. atra, thorace punctis tribus sanguineis, ano pedibusque testaceis. Ent. syst. 4. Append. 451.

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

voluulus. 68. S. supra nigra, thoracis elytrorumque margine cinereo. Ent. syst. 2. 316. 43. *

Habitat in Cayenna. Dom. v. Rohr.

lemniscata 69. S. fusca, cinereo-fexlineata, antennis longissimis.

Habitat in Carolina. Mus. Dom. Bose.

Media. Antennae corpore multo longiores, barbatae, fuscae: articulo primo longiori. Caput fuscum, lineis quatuor cinereis. Thorax cylindricus, punctatus, fuscus, lineis sex et elytra punctata, lineis tribus, quarum interiores apice coeunt. Corpus fuscum.

Affinis videtur S. antennatae.

ferruginea 70. S. thorace subspinoso, ferruginea, antennis pedibusque nigris. Ent. syst. 2. 316. 44. *

Cerambyx cantbarinus. Linn. syst. Nat. 2. 637. 82.

Panz. Fn. Germ. 34. tab. 14.

Habitat in Germania. Dom. de Hattorff.

spissicornis. 71. S. nigra. thoracis linea dorsali, elytrorum sutura maculisque albis, antennis hirtis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Schestedt. Par-

Parva: Antennae longitudine corporis, hirtae, nigrae: articulo 1. 2. tertioque basi incrassatis. Thorax rotundatus, niger: linea dorsali lateraliq;ue albis. Elytra nigra futura, lineolis baseos maculisq;ue apicis albis. Apex rotundatus. Abdomen nigrum, margine albo.

72. S. thorace subspinofo, ferruginea, antennis pedibusq;ue concoloribus. Ent. syst. 2. 316. 45. * *brunnea.*
 Panz. Fn. Germ. 34. tab. 15. *III. 55.*
 Habitat in Germania. Dom. Prof. Helwig.
73. S. testacea, thorace ferrugineo, antennis fuscis. *tuberculata.*
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. *16.*
 D. Lund.
 Corpus paruum, testaceum. Antennae nigrae: articulo primo testaceo. Thorax subtuberculatus, rufescens. Elytra punctata, rotundata, testacea.
74. S. nigra, elytris testaceis. Ent. syst. 2. 316. 46. * *testacea.*
 Habitat in Germania. Dom. de Hattorff. *IV. 64.*
75. S. corpore violaceo, immaculato. Ent. syst. 2. *violacea.*
 316. 47. *
Saperda micans. Panz. Fn. Germ. *III. 55.*
 Oliv. Inf. 68. tab. 2. fig. 12.
 Habitat in Italia. Dr. Allioni.
76. S. glabra, atra, thoracis margine flauo. Ent. syst. *marginata*
 suppl. 148. 47. *
 Habitat in Carolina. Dom. Bosc.
77. S. nigra, elytris flauis, apice nigris. Ent. syst. 2. *praeusta.*
 317. 48.
Leptura praeusta. Linn. syst. Nat. 2. 641. 24.
 Geoff. Inf. 1. 209. 4.
 Schaeff. Icon. tab. 52. fig. 8.
 Payk. Fn. Sv. 3. 79. 12.
 Habitat in Europa australiori.

epbippium. 78. *S. nigra*, thoracis linea dorsali scutelloque cinereis, femoribus ferrugineis. Ent. syst. 2. 317. 49. *

II. 41. Panz. Fn. Germ. 23. tab. 17.

Habitat in Hungaria. Dom. Hybner.

picea. 79. *S. picea*, antennis pedibusque ferrugineis. Ent. syst. 2. 317. 50. *

Habitat in America septentrionali. D. Lund.

hirticornis 80. *S. grisea*, antennis longis, hirtis. Ent. syst. suppl. 148. 50. *

Habitat in India orientali. Mus. D. Lund.

marginella 81. *S. grisea*, thoracis linea dorsali, scutello elytrorumque futura albis, antennis longis.

Habitat in Austria. Dom. de Meyerle.

Statura parua, filiformis praecedentium. Antennae corpore longiores, nudaе, nigrae. Caput et thorax cinerascens, linea dorsali albidior. Scutellum albidum, puncto nigro. Elytra cinerascens, futura margineque albidis. Pedes nigri.

hirta. 82. *S. nigra*, hirta, antennis longis. Ent. syst. 2. 317. 51. *

Saperda filum. Ross. Fn. Etr. 1. 152. 380. tab. 5. fig. 10.

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

scutellata. 83. *S. thorace subspinoso*, nigra, antennis, elytris pedibusque cinerascens, scutello albo. Ent. syst. 2. 317. 52. *

Habitat in Germania. Mus. Dom. de Sehestedt.

necydalina 84. *S. obscura*, elytris abbreviatis, pallidis, antennis longis, ferrugineis. Ent. syst. suppl. 148. 52. *

Habitat in Americae meridionalis Insulis. Mus. D. Lund.

rufimana. 85. *S. cyanea*, antennis nigris, femoribus anticis rufis.

Se

Saperda rufimana. Panz. Fn. Germ.

Habitat in Austria. Dom. de Meyerle.

III. 55.

Parva. Antennae longitudine corporis, nigrae.

Corpus totum pubescens, cyaneum, immaculatum, femoribus anticis solis rufis. Elytra punctata.

86. *S. nigra*, thoracis linea dorsali femoribusque apice rufis. Ent. syst. 2. 318. 53. *

Panz. Fn. Germ. 23. tab. 18.

Herbst. Arch. tab. 26. fig. 4.

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

II. 41

142. CALLIDIVM. *Palpi* quatuor, clauati.

Maxilla membranacea, bifida.

Ligula bifida: laciniis tenuissimis.

Antennae setaceae.

1. *C. thorace* subvillosa, fusca, elytris testaceo cinereoque variis, antennis mediocribus. Ent. syst. 2. 348. I. *

2. 348. I. *

Habitat in Terra Diemenii. Mus. Dom. Banks.

2. *C. thorace* villosa: tuberculis duobus, corpore fusco. Ent. syst. 2. 318. 2.

Cerambyx hajulus. Linn. syst. Nat. 2. 636. 76. VI. 24

Fn. Sv. 672.

Oliv.

Callidii corpus planiusculum, saepius pubescens, depressiusculum; immarginatum, tardum; capite ovato, obtuso, inserto; oculis reniformibus, marginalibus; antennis thorace longioribus, in sinu oculorum inertis; thorace plapo: margine rotundato, prominulo; scutello paruo, triangulo; elytris rigidis, fornicatis, longitudine abdominis; pedibus elongatis, cursoriis, femoribus saepius clauatis; tarsis quadriarticulatis; colore vario.

Oliv. Inf. 70. tab. 3. fig. 30.

Frieh. Inf. 13. tab. 10.

Panz. Fn. Germ. 70. tab. 1.

Sulz. Inf. tab. 4. fig. 29.

Voet. Col. 2. tab. 22. fig. III. 512.

Schaeff. Icon. tab. 68. fig. 1.

Elem. tab. 76. fig. 4.

Payk. Fn. Sv. 3. 85. 6.

Degeer Inf. 5. 86. 22.

Habitat in Europae truncis.

Elytra in altero sexu pallida.

- fennicum.* 3. C. thorace tuberculato, rufo, elytris violaceis, antennis mediocribus. Ent. syst. 2. 319. 3.
Cerambyx fennicus. Linn. syst. Nat. 2. 636. 77.
 Fn. Sv. 664.

Oliv. Inf. 70. tab. 1. fig. 9.

Geoff. Inf. 1. 219. 19.

Panz. Fn. Germ. 70. tab. 2.

Voet. Col. 2. tab. 20. fig. 97.

Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 12.

Herbst. Arch. tab. 26. fig. 8.

Payk. Fn. Sv. 3. 87. 9.

Habitat in Europae truncis.

VI. 24

- ruficollis.* 4. C. thorace subcylindrico, spinoso, rufo, nigra, elytris violaceis, antennis mediocribus, piceis.

Ent. syst. 2. 319. 4. *

Oliv. Inf. 70. tab. 2. fig. 27.

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

- ebulinum.* 5. C. thorace tuberculato, nigrum, elytris violaceis.
 Ent. syst. 2. 319. 5. *

Cerambyx ebulinus. Linn. syst. Nat. 2. 627.
 83. *

Habitat in Africae plantis. Dom. Prof. Vahl.

A. à Salla

5. *C. thorace laeni*, fusca, elytris pallidis: lineis duabus, postice coeuntibus fuscis. ~~truncatum.~~
 Habitat in America meridionali. D. Schldt. Mus. Dom. Lünd.
 Statura parua *C. ruficollis*. Antennae mediocres, ferrugineae. Caput et thorax rotundatus obscura. Elytra punctata, integra, pallida: lineis duabus, ante apicem coeuntibus, fuscis. Corpus flavescens, pedum geniculis nigris.
7. *C. fuscum*, thorace elytrisque viridi-aeneis, femoribus ferrugineis. Ent. syst. 2. 319. 6.
 Oliv. Inf. 70. tab. 4. fig. 46.
 Habitat in India. Mus. Dr. Hunter.
8. *C. nigrum*, opacum, femoribus omnibus clavatis, antennis longis. ~~truncatum.~~
 Ent. syst. 2. 320. 7.
 Oliv. Inf. 70. tab. 4. fig. 33.
 Panz. Fn. Germ. 70. tab. 3. VI-24
 Herbst. Arch. tab. 26. fig. 9.
 Payk. Fn. Sv. 3. 81. 2.
 Degeer Inf. 5. 88. 23.
 Habitat in Europae truncis. Dom. de Hattorff.
9. *C. thorace spinoso*, nudo, atrum, antennis brevis. spinosum.
 Ent. syst. 2. 320. 8.
 Habitat in Hungaria. Dom. Hybner.
10. *C. thorace subpubescente*, corpore violaceo, antennis brevibus. violaceum.
 Ent. syst. 2. 320. 9.
Cerambyx violaceus. Linn. syst. Nat. 2. 635. 70.
 Fn. Sv. 667.
 Frisch. Inf. 12. tab. 3.
 Oliv. Inf. 70. tab. 1. fig. 2.
 Herbst. Arch. tab. 26. fig. 10. VI: 25
 Panz. Fn. Germ. 70. tab. 4.
 Voet. Col. 2. tab. 23. fig. 123.
 Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 13.
 tab. 234. fig. 1.
 Habitat in Europae sylvis.

punctatum 11. C. thorace pubescente, nigrum, punctatum, femoribus rubris, antennis mediocribus. Ent. syst. suppl. 149. 10. *

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

femoratum 12. C. thorace nudo, corpore atro, opaco, femoribus rubris, antennis mediocribus. Ent. syst. 2. 320. 10.

Cerambyx femoratus. Linn: syst. Nat. 2. 634. 69.

Oliv. Inf. 70. tab. 7. fig. 77.

Schaeff. Icon. tab. 55. fig. 7.

Degeer Inf. 5. 93. 81.

Panz. Fn. Germ. 70. tab. 5.

Habitat in Germaniae nemoribus.

falcratum. 13. C. thorace nudo, nitido, corpore atro; femoribus rufis, antennis mediocribus. Ent. syst. 2. 320.

II. *

Callidium aulicum. Payk. Fn. Sv. 3 83. 3. β.

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

amethystinum 14. C. pubescens, cyaneum, pedibus rufis: femoribus clava atra. Ent. syst. 2. 321. 12. *

Habitat in America. Prof. Helwig.

fasciatum 15. C. thorace pubescente, atrum, elytris fasciis duabus rufis. Ent. syst. 2. 321. 13. *

Oliv. Inf. 70. tab. 4. fig. 42.

Habitat in America meridionali. Mus. D. Banks.

acuminatum 16. C. thorace verrucoso, nigricante, elytris acuminatis viridibus: futura cyanea. Ent. syst. 2. 321. 14. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Dom. Lee.

ruficum 17. C. thorace verrucoso, nigrum, elytris testaceis: macula media apiceque nigris. Ent. syst. 2. 321. 15. *

Oliv. Inf. 70. tab. 4. fig. 49.

Habitat in Russia. Dom. Lee.

8. C. thorace glabro, subspinofo, nigrum, elytris *hungari-*
obscuro-aeneis. Ent. syst. suppl. 149. 15. * *cum.*
Callidium hungaricum. Herbst. Arch. tab. 26.
fig. 12. VI. 26
Panz. Fn. Germ. 70. tab. 7.
Habitat in Germania. Dom. Hybner.
9. C. thorace glabro, corpore fusco, aeneo, anten- *variabile.*
nis pedibusque fuscis. Ent. syst. 2. 321. 16. *
~~*Cerambyx variabilis.*~~ Linn. syst. Nat. 2. 635.
75. Fn. Sv. 669.
Callidium dilatatum. Payk. Fn. Sv. 3. 91. 12. VI. 25
Degeer Inf. 5. 89. 25.
Oliv. Inf. 70. tab. 6. fig. 65.
~~Frish. Inf. 12. tab. 6. fig. 3. 4.~~
~~Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 12.~~
Panz. Fn. Germ. 70. tab. 6.
Habitat in Europae nemoribus.
10. C. thorace holosericeo, cinereo, elytris testaceis: *sericeum.*
punctis eleuatis, rubris, scutello niueo. Ent.
syst. 2. 322. 17. *
Callidium holosericeum. Ross. Fn. Etr. 1. 153.
382. tab. 1. fig. 6.
Habitat in Barbaria. Dom. Prof. Vahl.
11. C. thorace elytrisq[ue] cinereo-villosis, antennis *concolor.*
articulis basi scutelloque niueis. Ent. syst.
suppl. 149. 17. *
Habitat - - -
12. C. thorace tuberculato, obscure, rufo: linea dor- *tenebrifum*
sali nigra, elytris depressis, cinerascens:
lineis duabus eleuatis, atris. Ent. syst. 2. 322.
18. *
Oliv. Inf. 67. tab. 18. fig. 139.
Habitat in Cayenna. Mus. Dom. Olivier.

- variolosum* 23. *C. thorace subtuberculato, nigrum, elytris variolosis: sutura acuminata.* Ent. syst. suppl. 149. 18. *
Habitat Tranquebariae. Mus. D. Lund.
- rusticum*. 24. *C. thorace nudo, corpore lurido, antennis breuibus.* Ent. syst. 2. 322. 19.
Linn. syst. Nat. 2. 634. 67. Fn. Sv. 666.
Oliv. Inf. 70. tab. 3. fig. 39.
Schæff. Icon. tab. 63. fig. 6.
Panz. Fn. Germ. 70. tab. 8.
VI. 2 C Sulz. Inf. tab. 4. fig. 29.
Hist. Inf. tab. 13. fig. 1.
Payk. Fn. Sv. 3. 80. 1.
Degeer Inf. 5. 83. 20.
Habitat in Europae syluis.
- vittatum*. 25. *C. thorace rotundato, nudo, elytris ferrugineis vitta media nigra, antennis corpore longioribus.* Ent. syst. 2. 323. 20. *
Habitat in Guinea. Dom. Isert.
- scutellare*. 26. *C. thorace tuberculato, nigrum, elytris punctatis, scutello albo, antennis mediocribus, ferrugineis.*
Habitat in Amboina. Dom. Billardiere.
Duplo minus *C. rustico*. Caput nigrum, antennae ferrugineis, longitudine corporis. Thorax punctatus, subtuberculatus. Scutellum villosum album. Elytra punctata, nigra. Pedes subferruginei; femoribus clauatis.
- agreste*. 27. *C. thorace nudo, nigrum, elytris striatis, fuscis, antennis breuibus.* Ent. syst. 2. 323. 21. *
var. *striati* Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.
- stigma*. 28. *C. thorace punctato, corpore atro, elytris laevibus: stigmate albo.* Ent. syst. 2. 323. 22.
Cerambyx stigma. Linn. syst. Nat. 2. 625. 72.

Oliv. Inf. 70. tab. 2. fig. 21.

Voet. Coleopt. 2. tab. 25. fig. 134. 135.

Degeer Inf. 5. 109. 22. tab. 14. fig. 13.

Habitat in America.

29. C. thorace hirto, fuscum, antennarum articulis *fugax*.

basi rufis. Ent. syst. 2. 323. 23. *

Oliv. Inf. 70. tab. . fig. .

Habitat in Gallo prouincia. Mus. Dom. Olivier.

30. C. thorace nudo, corpore fusco, antennis longis *pygmaeum*

flavescentibus. Ent. syst. 2. 323. 24. *

Habitat in Anglia, Italia.

VI. 30

31. C. thorace mutico, nudo, atrum, nitidum, coleo- *equestre*.

ptis fascia interrupta, rubra. Ent. syst. 2. 324.

25. *

Habitat in Cayenna. Dom. v. Rohr.

32. C. thorace mutico, fuluo, nigrum, antennis lon- *fuluicolle*.

gissimis. Ent. syst. 2. 324. 26. *

Habitat in Surinam. Mus. Dom. Bosc.

33. C. thorace rotundato, hirto, elytris acuminatis, *hirtum*.

pallide-testaceis. Ent. syst. 2. 324. 27. *

Oliv. Inf. 70. tab. 5. fig. 62.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

34. C. thorace rotundato, pubescente, testaceo, ely- *pubescens*.

tris virescentibus, basi testaceis. Ent. syst. 2.

324. 28. *

Oliv. Inf. 70. tab. 6. fig. 75.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Dom. Olivier.

35. C. thorace rotundato, subtus, vtrinque macula *barbatum*.

tomentosa, ferruginea, antennis longis, barba-

tis. Ent. syst. 2. 324. 29. *

Oliv. Inf. 70. tab. 4. fig. 41.

Habitat Tranquebariae. Dr. Koenig.

- mixtum.* 36. C. thorace rotundato ferrugineo, cinereo-lilaeo; elytris testaceis: macula griseo-fusca. Ent. syst. suppl. 149. 29. *
Callidium griseum. Oliv. Inf. 70. tab. fig.
 Habitat in Gallia. Mus. D. Bosc.
- griseum* 37. C. thorace rotundato pubescente, corpore obscure cinereo, antennis brevibus. Ent. syst. 2. 325. 20. *
 Habitat in Barbaria. Mus. D. Desfontaines.
- compressum.* 38. C. thorace laevi, obscure, nigrum, antennis longis pedibusque testaceis, femoribus compressis. Ent. syst. 2. 325. 31. *
 Oliv. Inf. 70. tab. 4. fig. 44.
 Habitat in Siam. Mus. Dom. Banks.
- variegatum.* 39. thoracis dorso glabro, atro: lineis quatuor albis; elytris flavo-irroratis. Ent. syst. 2. 325. 32. *
 Oliv. Inf. 70. tab. 5. fig. 58.
 Habitat in noua Zelandia. Mus. D. Banks.
- lineatum.* 40. C. thorace lineis duabus, elytris quatuor albis: mediis coeuntibus abbreviatis. Ent. syst. 2. 325. 33. *
 Oliv. Inf. 70. tab. 4. fig. 50.
 Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.
- fulcatum.* 41. C. thorace tomentoso, cinereo, elytris albo nigroque striatis. Ent. syst. 2. 326. 34. *
 Oliv. Inf. 70. tab. 4. fig. 48.
 Habitat in noua Zelandia. Mus. D. Banks.
- sanguineum.* 42. C. thorace subtuberculato elytrisque sanguineis, antennis mediocribus. Ent. syst. 2. 326. 35. *
Cerambyx sanguineus Linn. syst. Nat. 7. 636. 80.
 Oliv. Inf. 70. tab. tab. 1. fig. 1.
 Geoff. Inf. 1. 270. 31.
 Schaeff. Icon. tab. 64. fig. 1.
 Panz. Fn. Germ. 70. tab. 9.

Voet. Coleopt. 2. tab. 23. fig. 122.

Payk. Fn. Germ. 3. 39. 10.

Degeer Inf. 5. 92. 29.

Habitat in Europae syluis.

3. C. thorace subtuberculato, corpore testaceo, antennis mediocribus, fuscis. Ent. syst. 2. 326. 36. *

Cerambyx testaceus. Lina. syst. Nat. 2. 635. 75.

Fn. Sv. 670.

Geoff. Inf. 1. 218. 18.

Oliv. Inf. 70. tab. 1. fig. 11.

Schaeff. Icon. tab. 64. fig. 6.

Habitat in Europae syluis.

variet. fennici

4. C. thorace subtuberculato, ferrugineo, elytris testaceis, antennis mediocribus, villosis, femoribus clauatis. Ent. syst. 2. 327. 37. *

Habitat in Americae Insulis. Dr. Isert.

5. C. thorace subtuberculato, testaceum, elytris apice violaceis. Ent. syst. 2. 327. 38. *

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

Feminam C. fennici credit Dom. de Paykull, at vix rite.

variet. fennici

6. C. thorace tuberculato, villoso, nigrum, elytris rubris: macula apiceque violaceis. Ent. syst. 2. 327. 89. *

Habitat in Marylandia. Dr. Schulz.

7. C. thorace rotundato, ferrugineum, elytris pubescentibus, aeneo-micantibus.

Habitat in Guinea. Dom. Hesse. Mus. D. de Sehestedt.

Statura parva praecedentium. Antennae corpore longiores, ferrugineae. Caput et thorax ferruginea, nitida, immaculata. Elytra substriata, villosa, aeneo valde micantia. Corpus ferrugineum, pedum geniculis nigris.

flavipes. 48. C. thorace rotundato, pubescente, ferrugineum, pedibus testaceis. Ent. syst. 2. 327. 41. *
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lund.

luridum. 49. C. thorace subtuberculato, nudo, nigrum, elytris laevibus, testaceis.

Cerambyx luridus. Linn. syst. Nat. 2. 634. 68.

Panz. Fn. Germ. 70. tab. 10.

Oliv. Inf. 70. tab. 7. fig. 78.

Payk. Fn Sv. 3. 87. 8.

Habitat in Europae sylvis.

VI. 27

fuscum. 50. thorace subtuberculato, canaliculato, nudo, nigrum, elytris striatis, obscure-testaceis, antennis mediocribus. Ent. syst. 2. 328. 42. *
Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

~~*maculatum.*~~

51. C. thorace villoso, fuscum, elytris maculis duabus ferrugineis, antennis longioribus. Ent. syst. 2. 328. 43. *

Habitat in Insula Guadeloupe. Mus. D. Lund.

melanolicum. 52. C. thorace plano, nudo: macula dorsali, fuscum, fuscum, pedibus testaceis, antennis brevibus. Ent. syst. suppl. 149. 43. *

Habitat in Germaniae Quercu. Dom. Hybner.

triste. 53. C. thorace subtuberculato, nudo, elytris substriatis, corpore lurido, immaculato. Ent. syst. 2. 328. 44. *

~~*Callidium uruense*~~ Panz. Naturf. 24. 30. 21. tab. 1. fig. 41.

Panz. Fn. Germ. 70. tab. 11.

Habitat in Saxoniae Quercu. Dom. Hybner.

54. C. thorace laevi, obscure, ferrugineo, elytris testaceis. Ent. syst. 2. 328. 45. *

Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. D. Banks.

var. *ruficornis*

VI. 27

(Panz. *pedunculatus* ad *C. fuscum*)

var. vascum.

55. C. thorace subuloso, nigro: lineis quatuor al- basniense.
 his, intermediis abbreviatis, antennis breuibus.

Ent. syst. 2. 328. 46. *

Cerambyx liciatus. Linn. syst. Nat. 2. 636. 78.

Oliv. Inf. 70. tab. 1. fig. 8.

Panz. Naturf. 24. tab. 1. fig. 38.

Panz. Fn. Germ. 70. tab. 12.

Herbst. Arch. tab. 26. fig. 18.

Payk. Fn. Sv. 3. 93. 15.

Habitat in Europa boreali.

VI. 27

56. C. thorace laevi, nitido, elytris violaceis, tibiis rufipes.
 rufis, antennis breuibus. Ent. syst. 2. 329. 47. *

Oliv. Inf. 70. tab. 6. fig. 66.

Habitat in Germania. Dom. de Hattorff.

57. C. thorace glabro, corpore nigro, elytris striatis, striatum.
 antennis breuibus. Ent. syst. 2. 329. 48. *

Cerambyx striatus. Linn. syst. Nat. 2. 635. 73.

Fn. Sv. 668.

Oliv. Inf. 70. tab. 2. fig. 24.

Herbst. Arch. tab. 26. fig. 13.

Panz. Fn. Germ. 70. tab. 13.

Deger Inf. 5. 90. 26.

Payk. Fn. Sv. 3. 83. 4.

Habitat in Europae sylvis.

VI. 28

58. C. nigrum, thorace atro, nitido, antennis breui- aulicum.
 bus. Ent. syst. suppl. 151. 48. *

Panz. Fn. Germ. 70. tab. 14.

Payk. Fn. Sv. 3. 82. 3. *van Linné*

Habitat in Daniae nemoribus.

VI. 28

59. C. thorace rotundato, pubescente, ferrugineo, strepens.
 elytrorum futura acuminata, corpore testaceo,
 antennis longis. Ent. syst. suppl. 150. 19. *

Habitat in Tanger. Dom. Schousboe.

60.

- bicolor.* 60. C. thorace glabro, flavescente, capite elytrisque
virescentibus, antennis mediocribus, nigris.
Ent. syst. 2. 329. 49. *
Oliv. Inf. 70. tab. 1. fig. 4.
Habitat in America meridionali.
- lynceum.* 61. C. thorace rotundato, subspinofo, villoso, ni-
grum, elytris macula subdidyma, fulva. Ent.
syst. 2. 329. 50. *
Cerambyx lynceus. Oliv. Inf. 67. tab. 12. fig. 97.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Dom. Yeats.
- cyaneum.* 62. C. thorace plano, tuberculato, villosum, viola-
ceum, abdominis penultimo segmento ferrugi-
neo, antennis mediocribus. Ent. syst. 2. 330.
52. *
Habitat in Italia.
- pusillum.* 63. C. thorace rotundato, nigrum, antennis tibiisque
testaceis. Ent. syst. 2. 330. 53. *
11. 96. Habitat in Germania. Dom. Schneider.
Nimis affine videtur C. pygmaeo.
- 2 macula-
tum.* 64. C. thorace rotundato, villoso, fuscum, elytris
maculis duabus ferrugineis. Ent. syst. 2. 330.
54. *
Oliv. Inf. 70. tab. 5. fig. 61.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.
- flavum.* 65. C. thorace subrotundo, corpore flavo, femoribus
clauatis, antennis mediocribus. Ent. syst. 2.
330. 55. *
Habitat in America. Mus. Tottianum.
- undatum.* 66. C. thorace tuberculato, elytris nigris: fasciis
duabus undatis albis, antennis breuib. Ent.
syst. 2. 331. 56. *
11. 28. *Cerambyx undatus.* Linn. syst. Nat. 2. 636. 79.
Fn. Sv. 675.
Panz. Fn. Germ. 70. tab. 15.

Oliv.

- Oliv. Inf. 73. tab. 3. fig. 36.
 Voet. Col. 2. tab. 19. fig. 87.
 Degeer Inf. 5. 91. 28.
 Payk. Fn. Sv. 3. 92. 14.
 Habitat in Europae truncis.
67. C. thorace rotundato, nigrum, elytris fasciis tribus cinereis. Ent. syst. suppl. 152. 56. * *terminans*
 Habitat in America boreali. D. Herschel.
68. C. thorace rotundato, elytris lividis: fasciis tribus fuscis, antennis brevis. Ent. syst. 2. 331. 57. * *coloratm.*
 Oliv. Inf. 70. tab. 6. fig. 67.
 Habitat in Carolina.
69. C. thorace rotundato rufo, elytris nigris basi rufis; fasciis duabus albis. Ent. syst. 2. 331. 58. * *varium.*
 Oliv. Inf. 70. tab. 5. fig. 55.
 Habitat in America boreali. D. Yeats.

143. CLYTVS. *Palpi* quatuor breves, extrorsum crassiores.
Maxilla bifida.
Ligula brevis, truncata, integra.

Antennae setaceae.

1. C. thorace rotundato flavo fasciato, elytris fasciis septem *flexuosus.*

Clyti corpus oblongum, cylindricum, saepius pubescens, immarginatum, tardum; capite quato, declivi, inserto; oculis magnis, reniformibus, marginalibus; antennis thorace longioribus, approximatis, in sinu oculorum insertis; thorace globoso, latitudine elytrorum; scutello rotundato; elytris rigidis, farnicatis, longitudine abdominis; pedibus longiusculis, cursoriis; femoribus compressis; tarsis quadriarticulatis; colore vario.

septem flauis: anticis antrorsum posticis, retrorsum arcuatis.

Callidium flexuosum. Ent. syst. 2. 331. 59. *

Ieptura Robiniae. Forst. Cent. 1. 43.

Ieptura picta. Drury Inf. 1. tab. 41. fig. 2.

Oliv. Inf. 70. tab. 6. fig. 76.

Voet. Col. tab. ~~92~~⁹¹. fig. 91.

Habitat in Americae Robinia.

migutus. 2. C. testaceus, elytris fascia abbreviata alba. Ent. syst. 2. 332. 60. *

Oliv. Inf. 70. tab. 5. fig. 56.

Habitat in noua Zelandia. Mus. D. Banks.

floralis. 3. C. thorace globofo albo-fasciato, elytris nigris: fasciis quinque albis; secunda tertiaque lunatis. Ent. syst. 2. 332. 61.

Callidium fasciatum. Herbst. Arch. tab. 26. f. 17.

Cerambyx floralis. Pall. Iter. 2. 724. 63.

Oliv. Inf. 70. tab. 5. fig. 53.

Voet. Col. tab. 19. fig. 93.

Panz. Fn. Germ. 70. tab. 16.

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

VI. 29.

fulmihans. 4. C. thorace globofo maculato, elytris nigris: fasciis undato-angulatis albis. Ent. syst. 2. 332. 62. *

Oliv. Inf. 70. tab. 5. fig. 63.

Habitat in America meridionali. Mus. D. Banks.

borcali
semipunctatus.

5. C. thorace globofo nigro: punctis tribus albis, elytris nigris: punctis duobus lunulisque tribus albis. Ent. syst. suppl. 151. 62. *

VIII. 31.

atomarius

Habitat in Germania.

6. C. thorace globofo cinereo maculato, elytris punctis strigaeque postica flexuosa albidis. Ent. syst. 2. 332. 63. *

Habitat Halae Saxonum. D. Hybner.

7. C. thorace globoso virefcente: maculis duabus *lufus*.
 ferrugineis, elytris bidentatis nigris: strigis
 flavis basi rufis. Ent. syst. suppl. 152. 63. °
 Habitat in America boreali. D. v. Rohr.

8. C. thorace rotundato, elytris fasciis quatuor fla- *arcuatus*.
 uis: prima interrupta, reliquis retrorsum ar-
 cuatis. Ent. syst. 2. 333. 64.

Leptura arcuata. Linn. syst. Nat. 2. 640. 21.

Fn. Sv. 696.

Oliv. Inf. 70. tab. 2. fig. 16.

Herbst. Arch. tab. 26. fig. 14.

L. 45.

Geoff. Inf. 1. 212. 10.

Panz. Fn. Germ. 4. tab. 14.

Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 6.

~~tab. 107. fig. 2. 3.~~

Payk. Fn. Sv. 3. 95. 17.

Habitat in Europae hortis.

Os maxillis palisque. *Palpi* quatuor, breues, ae-
 quales extrorsum crassiores: *anteriores* vix
 longiores, quadriarticulati, articulis sensim cras-
 sioribus, ultimo breui truncato, adhaerentes
 maxillae dorso; *posteriores* triarticulati: arti-
 culo ultimo breui, crassiori, truncato, adnati li-
 gulae basi superiori. *Mandibula* brevis, cor-
 nea, crassa, edentula, apice acuta. *Maxilla*
 brevis, cornea, compressa, bifida: lacinia inte-
 riore breui, acuta, exteriori longiore, apice cras-
 siore, truncata. *Ligula* brevis, membranacea,
 truncata, integra. *Labium* transversum, an-
 gustum, corneum, late submarginatum.

9. C. thorace rotundato, nigro, elytris nigris: fasciis *arictis*.
 flavis, secunda antrorsum arcuata, pedibus to-
 tis ferrugineis. Ent. syst. 2. 333. 65.

~~*Leptura arictis*. Linn. syst. Nat. 2. 640. 23. Fn.~~

~~Sv. 695.~~

Oliv.

~~Oliv. Inf. 70. tab. 2. fig. 20.~~

~~Geoff. Inf. 1. 214. II.~~

Herbst. Arch. tab. 26. fig. 16.

Petiv. Gazoph. tab. 36. fig. 6.

~~Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 7.~~

~~tab. 107. fig. 3.~~

I. 42

~~Panz. Fn. Germ. 4. tab. 15.~~

Frish. Inf. 12. tab. 3. fig. 5.

Habitat in Europae hortis.

gazella.

I. 45

10. C. thorace rotundato, nigro, elytris nigris: fasciis flavis, secunda antrosum arcuata, pedibus ferrugineis: femoribus nigris. Ent. syst. 2. 333. 66. *

Habitat Kiliae.

~~festinus.~~

11. C. thorace rotundato, niger, elytris maculis tribus flavis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Statura et summa affinitas C. laeti. Antennae extrorsum fere incrassatae, nigrae. Caput et thorax nigra, immaculata. Elytra truncata, scutello maculisque tribus laete-flavis: baseos duabus approximatis, maioribus ad futuram, posteriore transversa. Corpus nigrum, pectore vtrinque macula, abdomine fasciis duabus, baseos flavis. Pedes subelongati, nigri.

~~laetus.~~

12. C. thorace rufo, elytris truncatis, atris: maculis tribus flavis, antennis pedibusque ferrugineis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. Dom. Lund.

Minor C. arietis. Antennae breves, ferrugineae. Caput rufum, mandibulis, atris. Thorax rufus, basi interdum flavus. Elytra laevia, nigra, striga abbreviata, per scutellum ducta, macula lineari obliqua, altera approximata, triangulari ad

ad basin strigaque pone medium flauis. Corpus villoso-flauum, segmentis abdominalibus apice atris. Pedes ferruginei.

13. *C. ater*, elytris medio coarctatis: maculis duabus *coarctatus* albis.

Oliv. Inf. 70. tab. 6. fig. 71.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.

C. plebejo paullo maior. Antennae breues, compressae. Caput et thorax pilosa, atra. Elytra nitidiora, pilosa, laeuis, atra: maculis duabus albis, altera lineari obliqua ad basin, altera maiore in medio. Corpus atrum, abdomine basi pectoreque argenteo nitidulis.

14. *C. thorace rufo-maculato*, niger, elytris *margaritaceis* basi nigris.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Statura et magnitudo *C. plebeii*. Caput cum antennis atrum. Thorax globosus, ater, vtrunque maculis duabus magnis, rufis. Elytra plana, laeuissima, margaritacea, nitida, basi margineque exteriori atris. Corpus atrum, femoribus clauatis.

15. *C. thorace immaculato*, elytris nigris: strigis *plebejus* tribus punctoque humerali albis. Ent. syst. 2.

334. 67.

~~*Callidium pallidum*~~. Oliv. Inf. 70. tab. 6. f. 72.

~~*Leptura rustica*~~. Linn. syst. Nat. 2. 639. 17.

Fn. Sv. 692.

~~Geoff. Inf. 1. 215. 12.~~

Petiv. Gazoph. tab. 63. fig. 5.

Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 7.

Payk. Fn. Sv. 3. 99. 21.

Habitat in Europae nemoribus.

massiliensis 16. C. thorace immaculato, elytris nigris: strigis tribus albis; anteriore incurua. Ent. syst. 2. 334. 68. *

VII. 36. *Leptura massiliensis*. Linn. syst. Nat. 2. 640. 19.
Geoff. Inf. 1. 215. 12.
Oliv. Inf. 70. tab. 6. fig. 70.
Habitat in Germania.

mucronatis 17. C. thorace maculato, elytris mucronatis nigris: strigis tribus arcuatis flavis basi ferrugineis. Ent. syst. 2. 334. 69. *

Oliv. Inf. 70. tab. 3. fig. 34.
Habitat in America. D. Solander.

angustus 18. C. thorace muricato, elytris mucronatis: maculis tribus dorsalibus punctoque medio flavis. Ent. syst. 2. 335. 70. *

Habitat - - Mus Britt.

erythrocephalus 19. C. thorace subspinoso, elytris bidentatis fuscis: strigis quatuor flavis, femoribus clauatis compressis. Ent. syst. 2. 335. 71. *

Oliv. Inf. 70. tab. 5. fig. 60.
Habitat in America. Dr. Solander.

senilis 20. C. thorace nigro: tuberculis transversis, elytris testaceis: basi margineque omni cinereis. Ent. syst. suppl. 152. 7. *

Habitat in Cayenna. D. Cuvier.

detritus 21. C. thorace flavo fasciato, elytris nigris: fasciis quinque flavis, pedibus ferrugineis. Ent. syst. 2. 335. 72. *

Leptura detrita. Linn. syst. Nat. 2. 646. 20.
Fn. Sv. 694.

VIII. 31.

Oliv. Inf. 70. tab. 2. fig. 17.
Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 9.
tab. 64. fig. 3.

Geoff.

Geoff. Inf. 1. 216. 13.

Habitat in Europæ hortis.

22. *C. niger*, elytris glaucis basi nigro-maculatis. *glauus.*

Ent. syst. 2. 336. 73. *

Oliv. Inf. 70. tab. 6. fig. 68.

Habitat in India orientali. Mus. D. Banks.

23. *C. ater*, thorace fasciis duabus, elytris quatuor *fasciatus.*

flavis. Ent. syst. 2. 336. 74. *

Habitat - - Mus. Britt.

24. *C. thorace ferrugineo*, elytris nigris: fasciis *trifascia-*
tribus albis; prima annulari. Ent. syst. 2. 336. *tus.*

75. *

Oliv. Inf. 70. tab. 5. fig. 59.

Habitat in Lusitania. Dr. Grey.

25. *C. thorace nigro trimaculato*, elytris rotundatis *Verbasci.*

subvirescentibus: fasciis tribus abbreviatis ni-
gris, prima lunari. Ent. syst. 2. 336. 76. *

~~*Leptura Verbasci*. Linn. syst. Nat. 2. 640. 22.~~

Oliv. Inf. 70. tab. 1. fig. 5.

~~tab. 6. fig. 15.~~

~~Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 12.~~

Panz. Fn. Germ. 75. tab. 17.

Herbst. Arch. tab. 26. fig. 19.

Habitat in Europæ australioris Verbasco.

26. *C. thorace rotundato*: fascia nigra, elytris vire-
scentibus: fasciis tribus integris nigris, prima
annulari. Ent. syst. 2. 336. 77. *

Callidium ornatum. Herbst. Arch. tab. 26. f. 16.

Stenocorus duplex. Scopol. Fl. Inf. tab. 20. fig. 5.

Panz. Fn. Germ. 70. tab. 18.

Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 12.

Habitat in Germania. D. Smidt.

27. *C. thorace nigro-maculato*, elytris bidentatis *bidentis.*
virescentibus: annulo macula strigaeque nigris.

Ha-

Habitat in Sumatra. D. Daldorff.

Statura omnino et magnitudo *C. ornati*. Antennae breves, fuscae, basi ferrugineae. Caput virescens. Thorax rotundatus, virescens: maculis nigris. Elytra apice bidentata, virescentia, annulo baseos striga media, cum annulo coëunte maculaque orbiculata apicis atris. Pedes nigri.

annularis.

28. *C. virescens*, elytris fasciis tribus nigris: tertio annulari.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lund.

Statura omnino *C. ornati*. Caput virescens, antennis brevibus, ferrugineis. Thorax rotundatus, virescens, immaculatus. Elytra virescentia: fasciis tribus nigris; ultima annulari. Pedes pallide testacei.

punctatus.

29. *C. virescens*, elytris punctis quatuor. Ent. syst. 2. 337. 78. *

Geoff. Inf. 1. 213. 8.

Panz. Fn. Germ. 70: tab. 19.

Habitat in Gallia haud infrequens.

VII. 30

annularis.

30. *C. thorace nigro-maculato*, elytris bidentatis subvirescentibus: fasciis tribus nigris, prima annulari. Ent. syst. 2. 337. 79. *

Callidium annulare. Oliv. Inf. 70. tab. 6. f. 74.

Habitat in Siam, Mus. D. Banks. in India. Mus. D. Lund.

aegyptius.

31. *C. thorace ferrugineo*, elytris cinerascens: fasciis tribus fuscis; prima annulari. Ent. syst. 2. 337. 80. *

Habitat in Oriente. D. Prof. Forskahl.

mysticus.

32. *C. niger*, elytris fuscis; fasciis apiceque cinereis basi rufis. Ent. syst. 2. 337. 81.

Leptura mystica. Linn. syst. Nat. 2. 639. 18.

VII. 37. Fn. Sv. 693.

Oliv.

Oliv. Inf. 70. tab. 1. fig. 14.

Geoff. Inf. 1. 217. 15.

Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 9.

Voet. Coleopt. 2. tab. 26. fig. 8.

Payk. Fn. Sv. 3. 98. 20.

Degeer Inf. 5. 82. 19.

Habitat in Europae hortis.

33. *C. virescens*, antennis nigris, pedibus testaceis. *virens*.

Ent. syst. 2. 338. 82. *

Habitat in Barbaria. Mus. Dom. Desfontaines.

34. *C. niger*, elytris cinereo-fasciatis, basi bituber-*gibbosus*.
culatis, apice acuminata. Ent. syst. 2. 338.

83. *

Oliv. Inf. 70. tab. 2. fig. 18.

Habitat in Italia. D. Daldorff.

35. *C. thorace brunneo*, elytris nigris: fascia media *unifascia-*
niuea, basi brunneis. Ent. syst. 2. 338. 84. *tus*.

Oliv. Inf. 70. tab. 1. fig. 12.

Habitat in Gallo prouincia. Dom. Olivier.

36. *C. ater*, elytris striga obliqua alba. Ent. syst. 2. *picipes*.
338. 85. *

Oliv. Inf. 70. tab. 4. fig. 43.

Habitat in America. Mus. Dr. Hunter.

37. *C. ferrugineus*, elytris aureis: strigis duabus *piniaecus*.
albis.

Habitat in Carolina. Mus. Dom. Bosc.

Statura et magnitudo *C. Alni*. Antennae corpore paullo longiores; ferrugineae. Caput et thorax globosus ferruginea, immaculata. Elytra aurea, nitida, basi linea impressa strigisque duabus albis, quae tamen vix futuram attingunt. Corpus ferrugineum, femoribus clauatis.

Alni.

38. *C. niger*, elytris fasciis duabus albis, elytroru
basi antennis tibiisque ferrugineis. Ent. syst.
2. 338. 86. *

Leptura Alni. Linn. syst. Nat. 2. 689. 19.

Oliv. Inf. 70. tab. 3. fig. 7.

Herbst. Arch. tab. 26. fig. 21.

Scopol. Flor. Inf. tab. 20. fig. 3.

11. 20. Panz. Fn. Germ. 70. tab. 20.

Payk. Fn. Sv. 3. 100. 22.

Habitat in Anglia, Germania.

144. LEPTVRA. *Palpi filiformes.*

*Maxilla unidentata, apice
setosa.*

Ligulamembranacea, bifida

Antennae setosae.

- unipuncta*. 1. *L. nigra*, elytris rufis: puncto medio nigro. Ent.
ta. syst. 2. 339. 1.

11. 64. Oliv. Inf. 73. tab. 1. fig. 9.

Habitat Dresdae. Dom. Romanus.

- hastata*. 2. *L. atra*, elytris rubris: apice futuraeque mediae
gris. Ent. syst. 2. 339. 2. *

Oliv. Inf. 73. tab. 1. fig. 5.

11. 42. Geoff. Inf. 1. 226. 6.

Sulz. Inf. tab. 5. fig. 11.

Habitat in Europa australiori.

- 2punctata*. 3. *L. nigra*, villosa, elytris lividis: futura puncto
media apiceque nigris. Ent. syst. 2. 340. 3.

Habitat in Sibiria. Mus. D. Banks.

sub var. fusc. var. nigr.
sub var. nigr. fusc.

Lepturae corpus oblongum, antice posticeque attenuatum, fasciis
pilis tomentosum, immarginatum, tardum; capite exserto
ovato; oculis globosis, prominulis, marginalibus; antennis
thorace longioribus, approximatis, subter oculos insertis
thorace rotundato, angusto, antice angustiore, inermi
scutello parvo, triangulo; elytris rigidis, fornicatis, saepe
emarginatis, longitudine abdominis; pedibus longiusculis
cursoriis; tarsis quadriarticulatis; colore vario.

. L. thorace villoso aureo, elytris testaceis apice nigro tomentosa.
gris. Ent. syst. 2. 340. 4. *

Geoff. Inf. 1. 227. 8.

Payk. Fn. Sv. 3. 108. 9.

Degeer Inf. 5. 136. 13.

Habitat in Gallia. Muf. D. de Sehestedt.

. L. thorace laevi, nigra, elytris testaceis, apice nigro maculicor-
gris, antennarum articulis, basi flavis. Ent. syst. nis.

suppl. 152. 5. *

Payk. Fn. Sv. 3. III. 12.

Degeer Inf. 5. 139. 16.

Habitat in Germania.

. L. nigra, elytris rubescentibus liuidis: futura melanura.
apiceque nigris. Ent. syst. 2. 340. 5.

Linn. syst. Nat. 2. 637. 2.

Geoff. Inf. 1. 226. 7. tab. 4. fig. 1.

Petiv. Gazoph. tab. 30. fig. 5.

~~Degeer Inf. 5. 137. 14.~~

VI. 51.

~~Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 4.~~

Panz. Fn. Germ. 69. tab. 19.

Payk. Fn. Sv. 3. 110. 11.

Habitat in Europae floribus frequens.

. L. nigra, elytris pedibusque liuidis, elytris futura laevis.
apiceque nigris. Ent. syst. 2. 340. 6. *

Panz. Fn. Germ. 34. tab. 16.

Payk. Fn. Sv. 3. 128. 31.

III. 56.

Degeer Inf. 5. 139. 17.

Habitat Kiliae.

. L. nigra, elytris testaceis, immaculatis, pedibus liuida.
nigris. Ent. syst. 2. 340. 7. *

Herbst. Arch. tab. 26. fig. 23.

Habitat in floribus Kiloniensibus. Muf. D. Lund.

. L. nigra, elytris testaceis: vitta nigricante. Ent. strigilata.
syst. 2. 341. 8. *

Z 2

Payk.

Payk. Fn. Sv. 3. 112. 13.

Habitat in Suecia. Dom. Com. de Souza.

emarginata. 10. L. atra, elytris, purpureis, apice emarginatis
nigris. Ent. syst. 2. 341. 9. *
Habitat in Cayenna. Dr. Hunter.

sanguinolenta. 11. L. nigra, elytris sanguineis. Ent. syst. 2. 341. 10
Leptura sanguinolenta. Linn. syst. Nat. 2. 638
4. Fn. Sv. 679.

Leptura variabilis. Payk. Fn. Sv. 3. 109. 10.
Panz. Fn. Germ. 69. tab. 8.

VI. 91. Oliv. Inf. 73. tab. 2. fig. 13.

~~Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 9.~~

Degeer Inf. 5. 137. 14.

Habitat in Europae floribus.

cincta. 12. L. atra, elytris punctatis, testaceis: margine toto
atro.

Habitat in Austria. Dom. de Meyerle.

Statura omnino L. sanguinolentae, at minor, cuius
marem olim credidi. Caput, thorax, corpus
atra, immaculata. Elytra punctata, testacea
margine exteriori, late atro. Abdomen subtus
pilis aureis, nitens.

VI. 91.
32

meridiana. 13. L. thorace subspinoso, elytris fastigiatis, pectoribus
nitente. Ent. syst. 2. 341. 11. *

~~Stenocorus dispar.~~ Panz. Fn. Germ. 17. tab. 1. 2
Cerambyx meridianus. Linn. syst. Nat. 2. 638
47. Fn. Sv. 648.

II. 40.
IV. 64.

Schaeff. Icon. tab. 82. fig. 4.

tab. 279. fig. 3.

Payk. Fn. Sv. 3. 104. 4.

Degeer Inf. 5. 130. 5.

Habitat in Europae floribus.

Mas. nigricans, femina testacea.

thoracica. 14. L. atra, thorace rufo.

Lepta

Leptura thoracica. Creutz. Inf. 1. 125. 16. tab.
3. fig. 28.

Payk. Fn. Sv. 3. 105. 5.

Habitat in Carolina. Dom. de Meyerle.

Statura L. meridiana, at paullo crassior. Caput,
elytra, corpus nigra, immaculata. Thorax solus
rufus.

15. L. atra, elytris, punctatis, basi rubris.

Leptura canadensis. Oliv. Inf. 73. tab. fig.

Habitat in Canada. Mus. Dom. Bosc.

Statura magna L. thoracicae. Caput atrum, arti-
culis intermediis testaceis. Thorax rotundatus,
punctatus, ater, immaculatus. Elytra puncta-
ta, atra, basi late rufa. Abdomen atrum, abdo-
mine villis argenteis micante.

16. L. ferruginea, antennis elytris pectoreque fuscis. *villica*.

Ent. syst. 2. 341. 12. *

Leptura venustata. Linn. syst. Nat. 2. 638. 6.

Payk. Fn. Sv. 3. 113. 14.

Schaeff. Icon. tab. 69. fig. 1.

Habitat in Anglia. Mus. Britt.

17. L. nigra, thorace elytris tibiisque purpureis. *rubra*.

Ent. syst. 2. 342. 13.

Linn. syst. Nat. 2. 638. 3. Fn. Sv. 500.

Frish. Inf. 12. tab. 6. fig. 6.

Payk. Fn. Sv. 3. 107. 8.

Panz. Fn. Germ. 69. tab. 11.

Degeer Inf. 5. 132. 7.

Sulz. Inf. tab. 5. fig. 30.

Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 2.

Habitat in Europa.

18. L. nigra, elytris testaceis, tibiis rufis, thorace *testacea*.

postice rotundato. Ent. syst. 2. 342. 14.

Leptura testacea. Linn. syst. Nat. 2. 638. 5. Fn. VI. 92.

Sv. 680.

Leptu-

Leptura dispar. Payk. Fn. Sv. 3. 107. 8.

Panz. Fn. Germ. 69. tab. 12.

Degeer Inf. 5. 135. 11.

Schaeff. Icon tab. 39. fig. 3.

Habitat in Europae floribus.

Mas praecedentis videtur. Saepius in copula inveniuntur.

pubescens. 19. L. nigra, cinereo-villosa: costa alarum basi testacea. Ent. syst. 2. 342. 15. *

Payk. Fn. Sv. 3. 106. 7.

Habitat in Suecia. D. de Paykull.

in manus rubeat.
L. dispar *roub.*
in f. s.
virens.

20. L. fericeo-virescens, antennis fusco viridique variis. Ent. syst. 2. 342. 16.

Linn. syst. Nat. 2. 638. 7. Fn. Sv. 682.

Oliv. Inf. 73. tab. 2. fig. III.

Panz. Naturf. 24. 31. 42. tab. 1. fig. 42.

Payk. Fn. Sv. 3. 117. 19.

Panz. Fn. Germ. 69. tab. 13.

Degeer Inf. 5. 131. 6.

Habitat in Europae arboribus.

VI. 93.

smaragdula. 21. L. fericeo-virescens, antennis pedibusque nigris.

Ent. syst. 2. 342. 17. *

Payk. Fn. Sv. 3. 118. 20.

Habitat in Suecia. Dom. de Paykull.

holofericea. 22. L. nigra, cinereo-pubescentis, elytris emarginatis, tibiis testaceis.

Habitat in Austria. Dom. de Meyerle.

obscura
vari. L. pubescentis

Maiores L. atra et omnino distincta. Corpus totum nigrum, cinereo-holofericeum, capite tamen elytris emarginatis, magis nigris. Tibiae omnes basi testaceae.

rufipes. 23. L. villosa, nigra, elytris rotundatis, pedibus rufis.

Habitat in Austria. Dom. de Meyerle.

Affinis certe L. atrae. Differt tantum, elytris haud emarginatis et pedibus omnibus rufis. 24.

4. *L. corpore toto nigro*: Ent. syst. 2. 342. 28. * *atra*
 Geoff. Inf. 1. 228. 10. VI. 33.
 Oliv. Inf. 73. tab. 1. fig. 4.
 Panz. Fn. Germ. 69. tab. 14.
 Voet. Col. 2. tab. 29. fig. 9.
 Payk. Fn. Sv. 3. 125. 26.
 Habitat in Europae floribus.
5. *L. nigra, abdomine humerisque ferrugineis*. Ent. *bumeralis*.
 syst. 2. 343. 29. IV. 65
 Habitat in Germania. Dom. Schneider.
6. *L. aureo-pubescentis, elytris ferrugineis; macula apicis flava*. Ent. syst. suppl. 153. 19. * *fughx*.
 Habitat in America. Dom. Hybner.
7. *L. nigra, elytris puncto baseos lineaque media flavis*. Ent. syst. 2. 343. 20. * *exclamationis*.
 Habitat in Suecia. Dom. de Paykull.
 Varietas *L. 6 guttatae* teste Dom. de Paykull.
8. *L. cinerea, elytris testaceis; sutura nigra*. Ent. *futuralis*.
 syst. 2. 343. 21. * (11. 33. 24.)
 Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.
9. *L. punctata, nigra, scutello albo*. Ent. syst. 2. *scutellata*.
 343. 22. * VI. 33.
 Panz. Fn. Germ. 69. tab. 15.
 Payk. Fn. Sv. 3. 106. 6.
 Habitat in Italia. Dr. Allioni.
 Thorax et elytra valde punctata.
10. *L. laevis, nigra, elytris subacuminatis, subtus cinereo-holosericea*. *Chamomillae*.
 Habitat in Austriae Chamomilla. Dom. Scheidler. VI. 35
 Magnitudo et statura *L. scutellatae*, at puncta impressa omnino defunt. Elytra apice in angulum excurrunt. Corpus subtus cinereo-holosericeum.
11. *L. ferruginea, elytris testaceis*. Ent. syst. 2. *lurida*.
 343. 23. * Panz.

VI. 94 Panz. Fn. Germ. 69. tab. 16.

Habitat in fyluis Herciniae. Dom. Helwig.

femorata. 32. L. nigra, femoribus basi rufis. Ent. fyft. 2
343. 24.

Payk. Fn. Sv. 3. 127. 29.

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

ruficornis. 33. L. nigra, antennis pedibusque rufis. Ent. fyft
2. 344. 25. *

Payk. Fn. Sv. 3. 127. 30.

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

marginata 34. L. nigra, elytrorum margine tibiisque posticis ru-
fis. Ent. fyft. 2. 344. 26. *

VI. 94

Panz. Fn. Germ. 69. tab. 17.

Schaeff. Icon. tab. 55. fig. 8.

Habitat in Norwegia. Muf. D. Lund.

lupata.

35. L. atra, elytris macula lunata flaua.

Habitat in Carolina. Muf. Dom. Bosc.

Media. Caput cum antennis atrum. Thorax pubescens, punctatus, ater, postice pilis aliquot aureis. Elytra punctata, atra, macula magna baseos lunata, flaua, apice emarginata. Corpus atrum.

nigra.

36. L. elytris attenuatis, corpore nigro, nitido, abdomine rubro. Ent. fyft. 2. 344. 27. *

Leptura nigra. Linn. fyft. Nat. 2. 639. 14. Fn. Sv. 687.

Geoff. Inf. 1. 227. 9.

VI. 94

Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 7.

Panz. Fn. Germ. 69. tab. 18.

Payk. Inf. Sv. 3. 120. 22.

Degeer Inf. 5. 144. 24.

Habitat in Europae floribus.

praeusta.

37. L. aureo-pubescentis, capite elytrorumque apicibus nigris. Ent. fyft. 2. 344. 28. *

Panz.

Panz. Fn. Germ. 34. tab. 17.

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

III. 56

38. *L. fusca*, elytris nigris: punctis duobus baseos ~~4~~*guttata*.
ferrugineis. Ent. syst. 2. 344. 29. *

Habitat Halae Saxonum. ~~var. l. naturalis~~

39. *L. obscure-aenea*, pedibus flavis. Ent. syst. 2. *rostrata*.
344. 30. * ~~Est Rhinonianae neopydaloideae Brunnseri.~~

Habitat in Ammi maius Africae. Dom. Prof. Vahl.

40. *L. lutea*, thorace lineis duabus, elytris fasciis *luteicornis*
quatuor nigris. Ent. syst. 2. 345. 31. *

Habitat in Carolina. Mus. Britt.

41. *L. nigra*, elytris testaceis: maculis duabus ni- ~~4~~*maculata*
gris. Ent. syst. 2. 345. 32. *

Oliv. Inf. 73. tab. 1. fig. 7.

Payk. Fn. Sv. 3. 102. 2.

Habitat in Germania. D. Smidt.

42. *L. thorace spinoso*, pubescente, elytris fastigiatis, *lamed*.
liuidis: taenia obscura longitudinali sinuata.

Stenocorus lamed. Ent. syst. 2. 293. 2.

Cerambyx lamed. Linn. syst. Nat. 2. 630. 46.

Fn. Sv. 649.

~~Geoff. Inf. 1. 226. 6.~~

II. 39.

Payk. Fn. Sv. 3. 101. 1.

Habitat in Europae floribus.

43. *L. nigra*, elytris maculis duabus remotis, ferru- ~~4~~*apustulata*.
gineis. Ent. syst. 2. 345. 33. *

Habitat in Suecia. Dom. de Paykull.

44. *L. nigra*, elytris liuidis: maculis quatuor nigris. *8maculata*
Ent. syst. 2. 345. 34. *

~~*Leptura 8maculata*. Linn. syst. Nat. 2. 638. 10.~~

~~Fn. Sv. 684.~~

~~Schaeff. Elem. tab. 118. fig. 2.~~

~~Icon. tab. 1. fig. 7.~~

Habitat in Europae floribus.

75.

- interrogationis. 45. *L. nigra*, elytris flavis: linea longitudinali arcuata maculisque quatuor marginalibus nigris. Ent. syst. 2. 345. 35. *
Linn. Fn. Sv. 685.
II. 42. Payk. Fn. Sv. 3. 121. 24.
Habitat in Suecia. Dom. de Souza.
- marginella 46. *L. nigricans*, elytris futura maculis duabus marginalibus apiceque flavis. Ent. syst. 2. 346. 36. *
Habitat in Italia. Dr. Allioni.
Varietas praecedentis teste Dom. de Paykull.
- 6maculata 47. *L. nigra*, elytris testaceis: fasciis tribus dentatis, nigris; anteriore subinterrupta. Ent. syst. 2. 346. 37. *
Leptura 6maculata. Linn. syst. Nat. 2. 638. 11.
Fn. Sv. 686.
Schaeff. Icon. tab. 6. fig. 9.
Voet. Col. 2. tab. 26. fig. 12.
tab. 21. fig. 108.
VI. 35. Panz. Fn. Germ. 69. tab. 21.
Herbst. Arch. 5. tab. 26. fig. 26.
Payk. Fn. Sv. 3. 123. 25.
Degeer Inf. 5. 133. 9.
Habitat in Europae hortis.
- 7punctata. 48. *L. nigra*, thorace testaceo: puncto nigro, coleopteris testaceis: punctis septem. Ent. syst. 2. 346. 38. *
VII. 35. Habitat in Hungaria. Dom. Hybner.
- 12maculata 49. *L. nigra*, elytris flavis: maculis sex nigris. Ent. syst. 2. 346. 39. *
var. interrog. Habitat in Sibiria. Mus. D. Banks.
- attenuata. 50. *L. elytris attenuatis*, fasciis quatuor nigris, pedibus testaceis. Ent. syst. 2. 346. 40.
Leptura attenuata. Linn. syst. Nat. 2. 639. 13.
Fn. Sv. 688. Schaeff.

Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 6.

Payk. Fn. Sv. 3. 116. 18.

Habitat in Europae floribus.

1. *L. nigra*, elytris fasciis quatuor flavis: anterioribus *annularis*.
re annulari.

Habitat in Sibiria. Mus. D. Lund.

Statura omnino *L. attenuatae*. Caput et thorax nigra, pube aurea parum nitidula. Elytra laevia, attenuata, nigra, annulo baseos fasciisque tribus flavis. Corpus nigrum, pube aurulenta, nitidulum.

2. *L. nigra*, elytris punctis albis: exterioribus duobus *guttata*.
minoribus.

Habitat in Sibiria. Mus. D. Lund.

Statura praecedentis. Caput et thorax nigra, immaculata. Elytra laevia, truncata, atra, punctis sex albis: quatuor ad futuram maioribus, duobus exterioribus minoribus.

3. *L. nigra*, coleoptris attenuatis, flavis: fasciis *calcarata*.
quatuor nigris; anteriore punctata, secunda interrupta, tibiis posticis bidentatis. Ent. fyft. 2.

347. 41.

~~Geoff. Inf. 1. 226. 1.~~

Payk. Fn. Sv. 3. 114. 16.

Habitat in Germania. D. Smidt.

4. *L. nigra*, coleoptris testaceis: fasciis quatuor nigris, anteriore punctata, antennis pedibusque flavis. Ent. fyft. 2. 347. 42. *

Leptura armata. Herbf. Arch. tab. 26. fig. 24.

Payk. Fn. Sv. 3. 115. 17.

Habitat Kiliae.

5. *L. nigra*, elytris maculis duabus punctisque duobus *sinuata*.
flavis. Ent. fyft. 2. 347. 43. *

Habitat Kiliae.

- 4fasciata.* 56. *L. nigra*, elytris testaceis: fasciis quatuor distinctis, nigris. Ent. syst. 2. 348. 44.
Leptura 4fasciata. Linn. syst. Nat. 2. 639. 11.
 Fn. Sv. 687.
 Oliv. Inf. 73. tab. 2. fig. 17.
 Schaeff. Icon. tab. 59. fig. 6.
 Degeer. Inf. 5. 132. 8. tab. 4. fig. 11.
 Payk. Fn. Sv. 3. 114. 15.
 Habitat in Europae floribus.
- aurulenta.* 57. *L. atra*, thoracis margine antico posticoque at-
 reus, elytris testaceis: fasciis quatuor simplicibus nigris. Ent. syst. 2. 348. 45. *
 Habitat Kiliae.
- zebrata.* 58. *L. nigra*, thorace aureo, tomentoso, elytris fasciatis, subspinosis: fasciis quatuor flavis, basales lunata.
 Habitat in Carolina. Mus. Dom. Bosc.
 Praecedentibus minor. Antennae nigrae. Caput et thorax tomento aureo tecta. Elytra attenuata, apice spinosa, nigra, fasciis quatuor flavis basales lunata reliquis linearibus. Corpus nigrum, abdominis segmentis margine albidis. Pedes rufi.
- dubia.* 59. *L. subvillosa*, nigra, elytris testaceis, nigro-punctatis, pedibus nigris. Ent. syst. 2. 348. 46.
 Habitat in Siberia. Mus. D. Banks.
- complexa.* 60. *L. fusca*, elytris fasciis duabus cinereis, sutura connexis. Ent. syst. suppl. 153. 47. *
 Habitat in Tanger. Dom. Schousboe.
- 6guttata.* 61. *L. nigra*, elytris maculis tribus flavis. Ent. syst. 2. 349. 47. *
 Herbst. Arch. tab. 26. fig. 23.
 Panz. Fn. Germ. 69. tab. 22.
 Payk. Fn. Sv. 3. 119. 21.
 Habitat in Germania. Dom. de Hatterff.

2. *L. atra*, elytris fasciis tribus flavis: anteriore *3fasciata*.
interrupta. Ent. syst. 2. 349. 48. *

Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 10.

Habitat in Suecia. Mus. D. Lund.

Varietatem *L. 6 maculatae* credit D. de Paykull.

var. *L. maculatae* var.
Swiss

3. *L. nigra*, elytris basi testaceis, apice nigris, fl- *reticulata*.
uo-reticulatis. Ent. syst. ^{suppl.} 53. 48. *

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

4. *L. viridi-coerulea*, elytris subfastigiatis. Ent. *sericea*.
syst. 2. 349. 49. *

Leptura sericea. Linn. syst. Nat. 2. 638. 8. Fn.

Sv. 683.

Schaeff. Icon. tab. 84. fig. 1.

Habitat in Europae floribus.

off. Ymaria festucae

III 95.

5. *L. thorace orbiculato*, corpore toto atro, nitido. *morio*.
Ent. syst. 2. 349. 50. *

Habitat in Suecia. Mus. D. de Sehestedt.

6. *L. thorace globofo abdomineque rubris*, elytris *collaris*.
nigris. Ent. syst. 2. 349. 51.

Leptura collaris. Linn. syst. Nat. 2. 639. 16.

Fn. Sv. 691.

Geoff. Inf. 1. 228. 11.

Schaeff. Icon. tab. 58. fig. 9.

Degeer Inf. 5. 143. 22.

Payk. Fn. Sv. 3. 126. 28.

Habitat in Europae floribus.

7. *L. thorace globofo, nigro*, elytris violaceis, ab- *virginia*.
domine rufo. Ent. syst. 2. 349. 52. *

Leptura virginia. Linn. syst. Nat. 2. 639. 15.

Fn. Sv. 690.

Oliv. Inf. 73. tab. 2. fig. 24.

Schaeff. Icon. tab. 58. fig. 8.

Degeer Inf. 5. 144. 23.

Payk. Fn. Sv. 3. 125. 27.

Habitat in Europae floribus.

68.

bolosfericea 68. *L. nigra*, obscura, ano rufo.

Habitat in Germania. D. Smidt.

Magnitudo *L. virgineae*, tota nigra minime nitida, ano solo late rufo.

tenuicollis. 69. *L. testacea*, antennis elytrorumque apicibus nigris.

Habitat in Guinea. Dom. Meier. Mus. Dom. d. Sehestedt.

Statura ab hoc genere parum differt. Antenna nigrae: articulo primo testaceo. Caput exsertum, ovatum, testaceum. Thorax rotundatus laevis, testaceus, antice attenuatus. Elytra laevia, testacea, apice late nigra. Corpus testaceum, pectore plantisque fuscis.

cylindricollis.

70. *L. testacea*, elytris nigris, apice testaceis.

Habitat in Guinea. Dom. Meier. Mus. D. Lund.

Statura omnino praecedentis, at elytra nigra, apice testacea. Antennae nigrae: articulo primo testaceo.

attelaboides.

71. *L. testacea*, elytris nigris immaculatis.

Habitat in Guinea. Dom. Meier. Mus. D. Lund.

Statura et summa affinitas praecedentis et fortis eius varietas, at elytra tota nigra. Antennae nigrae: articulo primo testaceo.

Ultimae tres species forte proprii generis mihi haud rite examinatur.

45. MEGALOPVS. *Palpi filiformes; articulo ultimo acuto.*

Maxilla compressa, cornea, intus ferrata, apice fissâ.

Antennae extrorsum crassiores, subserratae.

M. testaceus, capitis vertice thoracisque dorso nigris. *ruficornis.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt, Mus. D. Lund.

Genus omnino distinctum. Os maxillis palpisque. *Palpi* quatuor aequales, filiformes: *anteriores* vix longiores, quadriarticulati; articulis inaequalibus: secundo longiori, ultimo acuto, adhaerentes maxillae dorso; *posteriores* triarticulati; articulis subaequalibus: ultimo obtusiori adnati ligulae medio. *Mandibula* cornea, arcuata, edentula, acuta. *Maxilla* compressa, cornea, intus ferrata, apice fissâ. *Ligula* porrecta, longitudine maxillae, cornea, bifida: laciniis approximatis, cylindricis, obtusis. *Labium* transuersum, corneum. *Antennae* extrorsum crassiores: articulo primo longiori, secundo orbiculato, reliquis subserratis.

Cor-

Megalopi corpus medium, oblongum, glabrum, immarginatum, tardum; *capite* ovato, exserto; *oculis* magnis, globosis, prominentibus, lateralibus; *antennis* distantibus, thorace brevioribus, in cantho oculorum antico insertis; *thorace* brevi, cylindrico, elytris angustiore; *scutello* brevi triangulo; *elytris* longitudine abdominis, rigidis, incumbentibus; *pedibus* longiusculis, cursoris; *femoribus* posterioribus, incrassatis, *tibis*que incurvis; *tarsis* omnibus quadriarticulatis; *colore* vario.

Corpus medium, statura et magnitudine fere *N. rufae*. Caput cum antennis testaceum, vertice fusco. Oculi magni, globosi, prominuli. Thorax rotundatus, testaceus, dorso fusco. Elytra laevia, testacea, subattenuata, immaculata. Pectus fuscum, abdomine testaceo. Pedes testacei femoribus posticis incrassatis.

nigricornis 2. *M.* testaceus, antennis elytrorum margine tibiisque posticis nigris.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Statura et summa affinitas praecedentis. Differt tamen capite cum antennis, nigro ore, flavescente. Thorax testaceus, dorso nigro. Elytra punctata, testacea, margine nigro et in hoc margine macula magna, baseos ovata, testacea. Corpus testaceum, femoribus incrassatis, tibiisque nigris.

146. NECYDALIS. *Palpi* filiformes.

Maxilla videntata.

Ligula membranacea, late emarginata.

Antennae filiformes.

tbalassina. 1. *N.* thorace canaliculato, corpore viridi, pedibus nigris. Ent. syst. 2. 350. 1. *

Panz.

Necydalis corpus oblongum, angustum, tomentosum, immaturnatum, agile; capite ovato, inserto; oculis globosis, prominentibus, marginalibus; antennis thorace longioribus, approximatis, inter oculos insertis; thorace rotundato; dorso inaequali; scutello brevi, rotundato; elytris rigidis, annuatis, incumbentibus longitudine abdominis; pedibus longioribus, tenuibus; femoribus posticis saepius clavatis; tarsis anticis quinque, posticis quadriarticulatis; colore vario.

Panz. Fn. Germ. 5. tab. 15.

I. 46

Habitat Kiliae.

- . N. thorace teretiusculo, corpore viridi, pedibus *viridissima* muticis, testaceis. Ent. syst. 2. 350. 2.

Cantbaris viridissima. Linn. syst. Nat. 2. 650.

23. Fn. Sv. 717.

Oedemera viridissima. Oliv. Inf. 50. t. 2. f. 15.

Geoff. Inf. 1. 177. 14.

~~Deger Inf. 5. 15. 4. tab. 1. fig. 13.~~

Payk. Fn. Sv. 3. 134. 1.

Habitat in Europae hortis frequens.

- . N. thorace teretiusculo, corpore coeruleo, sub-*coeruleescens* opaco. Ent. syst. 2. 3. *

~~*Cantbaris coerulea*. Linn. syst. Nat. 2. 650. 22.~~

~~Fn. Sv. 716.~~

~~*Oedemera coerulea*. Oliv. Inf. 50. tab. 2.~~

~~fig. 14.~~

~~*Telephorus villosus*. Deger Inf. 4. 76. 8.~~

Payk. Fn. Sv. 3. 135.

var. ruficollis

Habitat in Europae hortis.

- . N. thorace inaequali, corpore virescente, obscuro, *virescens*. antennis pedibusque nigris. Ent. syst. 2. 351. 4. *

Cantbaris virescens. Linn. syst. Nat. 2. 650. 24.

Payk. Fn. Sv. 3. 136. 6.

Habitat in Germania. Dom. Smidt.

- . N. thorace ovato, cyanea, antennis pedibusque *cyanea*. nigris. Ent. syst. 2. 351. 5. *

Habitat in Germania. Dom. Smidt.

- . N. thorace ovato: maculis duabus baseos nigris, *notoxybides* corpore fusco.

Habitat in Carolina. Mus. Dom. Bosc.

Statura et magnitudo praecedentium. Caput cum antennis nigrum. Thorax ovatus, rufus,

T. II.

A a

ma-

maculis duabus bascos nigris. Elytra laevia fufca.

sanguini-
collis.

7. N. fusca, thorace teretiusculo, rufo: punctis duobus ^{lat} compressis, elytris lineis tribus eleuatis. Ent. syst. 2. 351. 6. *

II. 43.

Oedemera sanguinicoilis. Oliv. Inf. 70. tab. 1. fig. 12.

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

- thoracica.* 8. N. thorace teretiusculo, rufo, elytris laeuissimis, fuscis.

Habitat in Carolina. Mus. Dom. Bose.

Statura et summa affinitas praecedentis. Corpus fuscum, at thorax rufus et elytra pubescentia laeuissima.

barbara.

9. thorace inaequali, virefcens, elytris apice pedibusque flatescentibus. Ent. syst. 2. 351. 7. *

Habitat in Barbaria. Dom. Desfontaines.

feladonia.

10. N. thorace inaequali, corpore viridi, nitidulo, elytris apice incrassatis, coeruleis. Ent. syst. 2. 351. 8. *

Habitat Kiliae.

ruficollis.

11. N. thorace teretiusculo abdomineque rufis, capite elytrisque viridi-aeneis. Ent. syst. 2. 352. 9. *

Oedemera ruficollis. Oliv. Inf. 50. tab. 1. fig. 11. Habitat in Italia. Dr. Allioni.

melanoce-
pbala.

12. N. nigra, thorace abdomineque fuluis, elytris testaceis. Ent. syst. ^{app. IV.} 153. 9. *

III. 57.

~~Panz. Fn. Germ. 36. tab. 9.~~

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

tristis.

13. N. nigra, thorace teretiusculo femorumque basibus rufis. Ent. syst. 2. 352. 10. *

Oedemera tristis. Oliv. Inf. 50. tab. 2. fig. 13.

Ha-

Habitat in Terra Diemenii. Mus. D. Banks.

4. *N. elytris subulatis*, atra, femoribus omnibus *atra*.
 clauatis. Ent. syst. 2. 352. 11. *
 Linn. syst. Nat. 2. 646. 5.
 Habitat in Europa australiori.
5. *N. elytris subulatis*, nigris, basi flavis. Ent. syst. *bumeralis*.
 2. 352. 12. *
Cantharis bumeralis. Oliv. Inf. 50. t. 2. f. 20.
 Geoff. Inf. 1. 342. 2.
 Forst. nou. Inf. sp. Cent. 1. 48. 48.
 Habitat in Anglia.
6. *N. nigra*, elytris basi futuraque late testaceis. *ustulata*.
 Ent. syst. 2. 352. 13. *
Oedemera ustulata. Oliv. Inf. 50. tab. 2. fig. 19.
 Habitat in Germaniae plantis.
7. *N. nigra*, thorace elytrisque testaceis: his api-*melanura*.
 ce nigris. Ent. syst. 2. 353. 14. *
Oedemera melanura. Oliv. Inf. 50. tab. 1. fig. 8. *III. 57.*
 Habitat in Hispaniae plantis. Dom. Prof. Vahl.
8. *N. capite thoraceque ferrugineis*, elytris testa-*notata*.
 ceis apice nigris. Ent. syst. 2. 353. 15. *
~~Payk. Fa. Sv. 3. 132. 1.~~
 Habitat in Germania. Dom. Hybner.
9. *N. testacea*, antennis nigris, elytrorum margine *marginella*
 coeruleo, nitido.
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
 D. de Sehestedt.
 Statura et magnitudo omnino *N. notatae*. Caput
 testaceum, clypeo nigro. Antennae nigrae.
 Thorax rotundatus, testaceus, immaculatus.
 Elytra lineis duabus elevatis, testacea, margi-
 ne bascos et laterali coeruleis, nitidis. Corpus
 testaceum.

- fulvicollis.* 20. *N. atra*, thorace anoque fulvis, elytris subcoerulefcentibus. Ent. syst. 2. 353. 16. *
Habitat in Germania. Mus. D. Lund.
- longipes.* 21. *N. niger*, elytris aurulentis, dorso cinereis, pedibus quatuor, posticis elongatis, compresso-elevatis. Ent. syst. suppl. 155. 16. *
Habitat in Insula St. Domingo. Mus. Dom. Bosc.
- rufa.* 22. *N. elytris subulatis, nigra*, femoribus omnibus clauatis, elytris antennisque rufis. Ent. syst. 2. 353. 17.
Linn. syst. Nat. 2. 642. 6.
Geoff. Inf. 1. 220. 22.
Schaeff. Icon. tab. 94. fig. 8.
Habitat in Europa australiori.
- praeusta.* 23. *N. atra*, elytris testaceis, apice nigris, femoribus omnibus clauatis. Ent. syst. 2. 354. 18. *
Habitat in Barbaria. Mus. Dom. Desfontaines.
- margaritacea.* 24. *N. rufa*, elytris subulatis, abbreviatis, margaritaceis, basi rufis, apice atris.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.
Statura omnino *N. coeruleae*. Caput rufum, antennarum articulis apice atris. Thorax glaucus, rufus, immaculatus. Elytra laeuissima subulata, abdomine duplo fere breuiora, basi rufa, in medio margaritacea, pitidissima, apice atra. Abdomen nigrum, ano rufo. Pedes rufi femoribus clauatis.
- coerulea.* 25. *N. elytris subulatis, coerulea*, femoribus posticis clauatis arcuatis. Ent. syst. 2. 354. 19. *
Necydalis coerulea. Linn. syst. Nat. 2. 642. 4.
Necydalis ceramoides. Forst. nou. Inf. spec. Cent. 1. 47. 47.
Oedemera coerulea. Oliv. Inf. 50. tab. 2. f. 16
Geoff.

Geoff. Inf. 1. 342. 3.

Sulz. Hist. Inf. 48. tab. 6. fig. 2.

Schaeff. Icon. tab. 94. fig. 7.

Habitat in Oriente et Europa australiori.

Variat pedibus simplicibus.

16. *N. elytris subulatis testaceis, corpore nigro, femoribus posticis clauatis basi testaceis.* Ent. *Podagrariae.*
 Syst. 2. 354. 20. *

Oedemera Podagrariae. Oliv. Inf. 50. tab. 1. fig. 10.

Linn. Syst. Nat. 2. 642. 9.

Geoff. Inf. 1. 343. 4.

Payk. Fn. Sv. 3. 134. 4.

Habitat in Europae hortis.

17. *N. coerulescens, thoracis margine abdomine pedibusque testaceis.* Ent. Syst. 2. 354. 21. * *bicolor.*
 Habitat ad Cap. Bon. Spei. Dom. de Paykull.

18. *N. nigra, elytris attenuatis, virescentibus, femoribus posticis incrassatis, arcuatis.* Ent. Syst. 2. 355. 22. * *clauipes.*

Oedemera aenea. Oliv. Inf. 50. tab. 2. fig. 18.

Payk. Fn. Sv. 3. 137. 7.

Habitat Kiliae.

19. *N. nigra, thorace elytrisque testaceis, pedibus rufis.* Ent. Syst. 2. 355. 23. * *testacea.*
 Habitat in Germania.

30. *N. nigra, elytris testaceis: margine omni nigro.* *marginata*
 Ent. Syst. suppl. 155. 23. *

Necydalis femorata. Panz. Fn. Germ. 36. tab. 12. f.

Habitat in Gallia. Dom. Bosc.

De Synonymo D. Panzer haereo, cum femora in meo specimen simplicia. Forte varietas sexus.

31. *N. elytris subulatis, glaucis, corpore nigro, abdominis incisuris albis.* Ent. Syst. 2. 355. 24. * *glaucescens*
 Linn.

Linn. fyft. Nat. 2. 642. 7.

Schaeff. Icon. tab. 94. fig. 7.

Habitat in Europa australi.

simplex.

32. *N. elytris subulatis*, testaceis, pedibus simplicibus. Ent. fyft. 2. 355. 25. *

Necydalis simplex. Linn. fyft. Nat. 2. 643. 10.

Necydalis flavescens. Payk. 3. 135. 5.

~~*Qadomona simplex*~~ Oliv. Inf. 50. tab. 1. fig. 9.

Degeer Inf. 5. 155. 4.

Habitat in Europae boreali.

Quercus.

33. *N. elytris subulatis*, abdomine pedibusque flavescentibus. Ent. fyft. 2. 355. 26. *

Habitat in Daniae Quercu. Mus. Dom. Lund.

147. MOLORCHVS. *Palpi* inaequales, filiformes.

Maxilla membranacea, bifida.

Ligula bifida.

Antennae setaceae.

abbreviatus.

1. *M. elytris dimidiatis*, ferrugineis, immaculatis, antennis breuibus. Ent. fyft. 2. 356. 1. *

Necydalis maior. Linn. fyft. Nat. 2. 641. 1.

Schaeff. Monogr. 1753. fig. 12.

Elem. tab. 13. fig. 2.

Icon. tab. 10. fig. 10. 11.

11. 65

Degeer

Molorchi corpus oblongum, angustatum, glabrum, immarginatum, agile; *capite* ovato, declivi, inserto; *oculis* reniformibus, vix prominulis, marginalibus; *antennis* thorace longioribus, approximatis, inter oculos insertis; *thorace* rotundato, angusto, dorso canaliculato; *elytris* rigidis, fornicatis, abbreviatis; *alis* plicatis, abdomini incumbentibus; *abdomine* elongato: margine utrinque reflexo; *pedibus* longiusculis; *femoribus* clavatis; *tarsis* quadriarticulatis; *colori* testaceo.

Degeer Inf. 5. 148. 1. tab. 5. fig. 1

Panz. Fn. Germ. 41. tab. 20.

Payk. Fn. Sv. 3. 129. 1.

Habitat in Europae floribus.

2. *M. elytris abbreviatis*, abdomine atro: fasciis *variegatus* fuluis. Ent. syst. 2. 357. 2. *

Habitat in noua Hollandia. Muf. D. Banks.

3. *M. elytris dimidiatis*, testaceis, apice lineola alba, *dimidiatus* antennis longis. Ent. syst. 2. 357. 3.

Necydalis minor. Linn. syst. Nat. 2. 641. 2.

Fn. Sv. 837.

Schaeff. Monogr. 1753. fig. 6. 7.

Icon. tab. 95. fig. 5.

Sulz. Inf. tab. 7. fig. 51.

Panz. Fn. Germ. 41. tab. 21.

Payk. Fn. Sv. 3. 130. 2.

Degeer. Inf. 5. 151. 2.

Habitat in Europae hortis.

4. *M. elytris dimidiatis*, testaceis, immaculatis, an- *umbellatarum.* tennis longis. Ent. syst. 2. 357. 4.

Necydalis umbellatarum. Linn. syst. Nat. 2.

641. 3.

Schaeff. Icon. tab. 95. fig. 4.

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 1.

Payk. Fn. Sv. 3. 131. 3.

Habitat in Germaniae umbellatis.

148. SPONDYLIS. *Palpi filiformes.*
Maxilla conica, crassa, integra.
Labium bifidum.
Antennae moniliformes.

buprestoides.

1. Spondylis. Ent. fyft. 2. 358. 1.
Attelabus buprestoides. Linn. fyft. Nat. 2. 621. 3.
 Frish. Inf. 3. 23. tab. 19.
 Degeer Inf. 5. 34. 21. tab. 5. fig. 21.
 Paykull Fn. Sv. 3. 155. 1.
 Habitat in Europæ borealis fyluis.

IV. 66

149. SINODENDRON. *Palpi inaequales.*
Maxilla videntata.
Labium filiforme, apice palpigerum.
Antennae lamellatae.

cylindricum.

1. S. thorace antice truncato quinquedentato, capitis cornu erecto. Ent. fyft. 2. 358. 94.
Scarabaeus cylindricus. Linn. fyft. Nat. 2. 544. 11. Fn. Sv. 380.
 Oliv. Inf. 1. 3. 47. 54. tab. 9. fig. 80.
 Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 2.
 Voet. Scarab. tab. 20. fig. 131.

I. 46
47

Laichart.

Sinodendri corpus cylindricum, glabrum, immarginatum, antice posticeque obtusum, tardum; capite paruo, onato, plano; oculis paruis, rotundatis, marginalibus; antennis breuibibus, reflexis, sub oculos insertis; thorace gibbo, antice truncato, muricato, aut inaequali; scutello paruo, triangulari; elytris rigidis, fornicatis, abdomen includentibus, apice saepius retufis, dentatis; pedibus breuibibus, validis; tibiis anticis, dentatis; tarsis quinquearticulatis; colore obscuro.

Laichart. Inf. 4. 4.

Scopol. Intr. Hist. nat. 5. 75.

Panz. Fn. Germ. 1. tab. 1.

Payk. Fn. Sv. 3. 140. 1.

Habitat in Europae borealis truncis Cerafi.

2. S. thorace antice mucronato, mandibulis vvaris, *cornutum*.
porrectis, medio vvidentatis.

Habitat in Terra Diemenii. Dom. Billardiere.

Statura et magnitudo omnino praecedentis, obscure-ferrugineum. Caput minutum, vtrinque ante oculos dente eleuato, minuto, mandibulisque valde elongatis, fere rectis, in medio dente laterali, valido armatis. Antennae lamellis sex. Thorax punctatus, canaliculatus, antico mucronatus. Elytra crenato-friata. Tibiae anticae ferratae.

Foemina simillima, at mandibulis haud porrectis inermibus.

3. S. atrum, nitidus, thorace cylindrico, elytris cre-*digitatum*
nato-friatis, pedibus ferrugineis. *Puffalo 21.*

Scarites cylindricus. Ent. syst. suppl. 44. 8. *

Habitat in India orientali. D. Daldorff.

4. S. thorace muricato, nigrum, elytris apice retufis *vvidentatign.*
vvidentatis.

Habitat in India orientali. D. Daldorff. Mus. D. de Sehestedt.

Statura et magnitudo S. gibbi. Antennae lamellatae, flavae. Thorax gibbus, muricatus. Elytra punctata, apice retufa, dente ad futuram eleuato, acuto.

5. S. thorace muricato, gibbo, elytris retufis, *fria-gibbum*.
tis. Ent. syst. suppl. 156. 1.

Habitat in India orientali. D. Daldorff.

6. S. thorace muricato, gibbo, elytris ante apicem *murica-*
bispinosis. Ent. syst. 2. 359. 2. *

Der-tum.

III, 58

Dermestes muricatus. Linn. *syft. Nat.* 2. 562. 6.
Oliv. *Inf.* 77. tab. 1. fig. 1.

Roff. *Fn. Etr.* 1. 38. 95.

Habitat in Europae australioris et Africae lignis.

capucinus. 7. *S. elytris integris nigris, thorace antice scabro.*
Ent. syft. 2. 359. 3. *

Habitat in Coromandel. Dr. Koenig.

dominicanam. 8. *S. laeue, nigrum, obscurum, elytris striatis, pedibus piceis.* *Ent. syft.* 2. 359. 4. *

Habitat in America meridionali. D. Pflug.

pustillum. 9. *S. ferrugineum, elytris punctato-striatis integris.* *Ent. syft. suppl.* 156. 5. *

Habitat in India orientali. D. Daldorff.

Corpus totum paruum, cylindricum, ferrugineum, immaculatum.

150. APATE. *Palpi aequales, filiformes.*

Maxilla videntata.

Labium truncatum.

Antennae perfoliatae.

~~*multiplicata*~~ 1. *A. elytris reticulatis, postice retusis dentatis,*
thorace muricato gibbo. *Ent. syft.* 2. 360. 1.

Ligniperda terebrans. Pall. *Specil. Zool.* 9.
tab. 1. fig. 3.

Voet. *Col.* 2. tab. 44. fig. 1.

Oliv. *Inf.* 77. tab. 1. fig. 4.

Habitat in Americae meridionalis Saccharo.

2.

Apates corpus cylindricum, subtomentosum, immarginatum, tardum; *capite* parvo rotundato, inflexo; *oculis* parvis, globosis, marginalibus; *antennis* breuibus, distantibus, sub oculis insertis; *thorace* rotundato, gibbo, antice saepius muricato; *scutello* paruo, rotundato; *elytris* rigidis, fornicatis, longitudine abdominis; *pedibus* breuibus, validis; *tarsis* quadriarticulatis; *colore* obscuro.

1. *A. elytris ante apicem bidentatis, thorace gibbo, francisca.*
 antice muricato: dente laterali hamato denticulato.

Habitat in Americae Insulis. Dr. Pflug.

Statura praecedentis paullo minor. Antennae nigrae: claua compressa, ferruginea. Caput nigrum, pube ferruginea, clypeoque pube aurea ciliato. Thorax gibbus, ater, antice muricatus, vtrinque dente porrecto, hamato, dentato. Elytra punctata: lineis duabus eleuatis, ante apicem excurrentibus. Abdomen obscurum.

2. *A. elytris ante apicem tridentatis, thorace gibbo montacha.*
 antice muricato, capite bidentato.

Habitat in Americae Insulis.

Statura et fere magnitudo *A. muricatae*. Antennae nigrae: claua magna, compressa, fusca. Caput nigrum, fronte dentibus duobus eleuatis et sub his pili densi, ferruginei. Thorax gibbus antice dentibus plurimis, eleuatis, scaber. Elytra subreticulata: lineis tribus eleuatis ante apicem in dentem excurrentibus. Corpus ferrugineo-villosum.

4. *A. elytris ante apicem subdentatis, thorace gibbo, Carmelita.*
 muricato, capite rufo, hirto.

Habitat in Americae Insulis. Mus. D. de Sehestedt.

Statura praecedentis, at paullo minor et alia.

Antennae nigrae: claua compressa, ferruginea. Caput totum pilis densis, ferrugineis tectum. Thorax gibbus, antice muricatus, at denticuli multo minores, vix eleuati, nullo modo recurui. Elytra punctata, lineis tribus eleuatis, ante apicem in dentes excurrentibus. Abdomen obscure ferrugineum.

Specimina e Guinea et Tanger missa nullo modo differunt.

Iesuita.

5. *A. elytris* integris variolosis, thorace gibbo, muricato: dente vtrinque hamato. Ent. syst. 2. 361. 5. *

Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

rugosa.

6. *A. thorace* gibbo, muricato, elytris integris rugosis.

Habitat in Tanger. D. Schousboe. Mus. D. Lund. Statura et magnitudo *A. zmaculatae*. Corpus totum atrum, immaculatum. Thorax valde gibbus, muricatus. Elytra reticulata, apice rotundata, integra.

dominicana.

7. *A. elytris* retusis dentatis, thorace muricato: dente laterali hamato, pedibus rufis.

Habitat in India orientali. Mus. D. de Sehestedt Duplo minor quam *A. Iesuita*. Caput nigrum, fronte pube ferruginea. Antennae ferruginae. Thorax niger, antice muricatus: dente laterali hamato. Elytra subpunctata, postice retusa, dentata. Corpus subtus cinereo-villosum. Pedes ferruginei.

femoralis.

8. *A. elytris* laeuiibus, retusis, cylindrica, atra, femoribus anticis incrassatis. Ent. syst. 2. 361. 6. *

Habitat in Americae Insulis. Mus. D. Lund.

gonagra.

9. *A. elytris* retusis, punctatis, cylindricus, niger, femoribus anticis compressis, incrassatis. Ent. syst. suppl. 157. 7. *

Habitat in Americae meridionalis Insulis. Dom. v. Rohr.

cornuta.

10. *A. thorace* antice vtrinque ultra caput porrecto, serrato, hirtio. Ent. syst. 2. 360. 2. *

Bostrichus cornutus. Oliv. Inf. 77. tab. 1. fig. 5. Habitat in Madagascar. Dom. Olivier.

hamata.

11. *A. elytris* antè apicem vnispinosis, thoracis margine antico bihamato, dentato. Ent. syst. 2. 360. 3. *

Ha.

Habitat in Saxoniae ligno. Dom. Prof. Leske.

12. *A. nigra*, elytris abdomineque rufis, thorace *capucina*.
emarginato, retuso. Ent. syst. 2. 362. 7.

Dermestes capucinus. Linn. syst. Nat. 2. 562. 5.
Fn. Sv. 416.

Bostrichus. Geoff. Inf. 1. 302. 1. tab. 5. fig. 1.
Schaeff. Elem. tab. 28.

Icon. tab. 189. fig. 1.

Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 5.

Roff. Fn. Etr. 36. 87.

Oliv. Inf. 77. tab. 1. fig. 1.

Panz. Fn. Germ. 34. tab. 18.

Payk. Fn. Sv. 3. 141.

Habitat in Europae truncis emortuis.

Varietas abdomine nigro e Tanger in Museo D.
Lund vix differt.

13. *A. thorace gibbo scabro: vtrinque macula po-²maculata*
ftica alba, nigro-punctata, elytris postice vni-
spinosis. Ent. syst. 2. 362. 8. *

Bostrichus 2maculatus. Oliv. Inf. 77. tab. 2.
fig. 14.

Habitat in Gallia provincia. Mus. Dom. Olivier.

14. *A. thorace gibbo muricato, elytris apice retufis, ^{finnata}*
sinuatis. Ent. syst. 2. 362. 9. *

Habitat in Gallia. Mus. Dom. Bosc.

15. *A. elytris retufis, dentatis, picea, thorace an-^{tridens}*
tice gibbo dentato. Ent. syst. 2. 362. 10. *

Habitat in Infula St. Thomas Americae. Mus. D.
de Sehestedt.

16. *A. elytris friatis, retufis, bidentatis: dente in-^{bidens}*
teriore elongato, thorace antice muricato. Ent.
syst. suppl. 157. 10. *

Habitat in Tanger. D. Schousboe. Mus. D. Lund.

17. *A. elytris retufis, thorace muricato: punctis ^{pustulata}*
duobus dorsalibus rufis, elytris basi rufis.

Ha-

Habitat in Tanger. D. Schousboe. Mus. D. de Sehestedt.

Corpus paruum, nigrum. Caput pube densa, cinerea. Thorax niger, antice muricatus, postice punctis duobus dorsalibus, rubris. Elytra subpunctata, nigra, basi ferruginea, apice retusa. Corpus nigrum, femoribus rutilis.

torquata.

18. A. thoracis margine antico prominulo villosulo elytris postice retusis tridentatis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Magnitudo A. tridentis. Caput planum, antennae flavis: articulis tribus ultimis elongatis. Thorax rotundatus, ater, nitidus: margine prominulo, hirto. Elytra sublaevia, nigra, apice retusa, tridentata.

marginata.

19. A. thorace gibbo, muricato, elytris brunneis apice retusis subreflexis.

Habitat in India orientali. D. Daldorff. Mus. D. de Sehestedt.

Statura praecedentium, at distinctus, elytris brunneis, retusis, margine futuraeque eleuatis, apice parum reflexis at absque dente.

limbata.

20. A. atra, elytris integris pallidis: margine omnino nigro. Ent. syst. 2. 363. 13. *

Dermestes domesticus. Linn. syst. Nat. 2. 643. 13. Fn. Sv. 424.

11. 66

Bostricibus limbatus. Herbst. Arch. tab. 20. f. 11. Panz. Fn. Germ. 431. tab. 19.

Payk. Fn. Sv. 3. 144. 5.

Habitat Kiliae sub cortice Fagi. D. Daldorff.

dispar.

21. A. atra, thorace gibbo, antice scabro, tibiis testaceis. Ent. syst. 2. 363. 11.

11. 58

Payk. Fn. Sv. 3. 143. 4.

Bostr. brevis Panz. 34-20 est nias
" , *thoracicus* " 4 18 in fam

Ha-

Habitat in Germaniae truncis. D. Daldorff.

22. *A. nigra*, thorace testaceo: punctis duobus lineolaque media nigris, elytris pallidis: linea postica nigra. Ent. syst. 2. 363. 12. *

Habitat in Germania. D. Smidt.

23. *A. atra*, laevis, nitidus, elytris laeuissimis, pedibus piceis. Ent. syst. 2. 363. 14. *

Habitat in Gallia.

24. *A. thorace gibbo*, muricato, elytris laeuibus integris brunneis. *brunni-pennis.*

Habitat in India. D. Daldorff. Mus. D. de Sehestedt.

Parua, atra, elytris integris, brunneis. Pedes brunnei.

25. *A. nigra*, elytris integris piceis, thorace antice scabro. Ent. syst. 2. 363. 15. *

Habitat in noua Zelandia. Mus. D. Banks.

26. *A. thorace rugoso*, nigra, elytris piceis. Ent. *Fagi.* syst. suppl. 157. 16. *

Habitat in Saxoniae Fago.

Antennae mihi perfoliatae videntur.

27. *A. thorace scabro*, elytris pedibusque griseis. *Tiliae.* Ent. syst. suppl. 157. 17. *

Apate Tiliae Panz. Fn. Germ. 8. tab. 14.

Habitat in Germaniae Tilia. Dr. Panzer.

28. *A. thorace rugoso*, nigra, antennis pedibusque ferrugineis. *brunripes.*

Habitat in Americae Infulis. Dr. Pflug. Mus. D. Lund.

Paruus. Antennae ferrugineae. Caput laeue, atrum. Thorax rugosus, niger. Elytra laeuia, integra, nigra. Pedes ferruginei.

29. *A. nigra*, thorace elytrisque laeuissimis, nigris. *glabrata.*

Ha-

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus
D. de Sehestedt.

Minuta, at distincta, thorace omnino laevi ely-
trisque integris.

151. BOSTRICHVS. *Maxilla* cornea.

Labium cylindricum, in-
tegrum, apice pal-
pigerum.

Antennae claua solida
compressa.

ruficornis 1. B. rufus, elytris nigris, apice spinoso dentatis
antennis flauis. Ent. syst. 2. 364. 1. *
Habitat in America boreali.

cylindrus. 2. B. cylindricus, ater, elytris friatis apice villosis
dentatis, pedibus compressis testaceis. Ent. syst.
2. 364. 2. *

II 43. *Platypus cylindrus*. Herbst. Col. 5. tab. 49. f. 3.
Panz. Fn. Germ. 15. tab. 1.

Habitat in Germaniae Quercu. D. Helwig.

parallelus. 3. B. cylindricus, ferruginens, elytris laeuius pal-
lidis: margine ferrugineo.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus
D. Lund.

Corpus cylindricum magnitudine B cylindri. An-
tennae breues, flavae: claua magna, compressa.

Caput

Bostrichi corpus paruum, cylindricum, tomentosum, immar-
ginatum, vtrinque obtusum, tardum; capite paruo, rotundato
recondito; oculis rotundatis, marginalibus; antennis bre-
uibus, distantibus. sub oculos insertis; thorace rotundato,
cylindrico; scutello paruo, rotundato; elytris rigidis, forni-
catis longitudine abdominis; pedibus breuibus, validis; tar-
sis quadriarticulatis; colore obscuro.

Caput et thorax laeuis, ferruginea, immaculata. Elytra laeuis, pallida: margine omni ferrugineo. Corpus ferrugineum.

4. *B. cylindricus*, ater, nitidus, thorace elytris longiore. *thoracicus*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muf. D. de Sehestedt.

Corpus totum cylindricum, laeue, atrum, nitidum. Labrum striatum, porrectum, acutum. Antennae claua solida, compressa. Thorax elongatus, elytris longior. Elytra laeuissima, abdomine breuiora. Abdomen acutum prominet. Pedes breues, tibiis quatuor anticis ferratis.

5. *B. cylindricus*, ater, nitidus, thorace elytris longiore, pedibus ferrugineis. *proboscideus*.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muf. Dom. Lund.

Statura omnino praecedentis, at duplo fere minor. Antennae ferrugineae, claua magna, compressa. Thorax elongatus, punctatus. Elytra laeuissima, atra, abdomine breuiora. Pedes ferruginei.

6. *B. cylindricus*, ater, nitidus, thorace elytris longiore, elytris puncto rufo. *spustulatus*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muf. D. de Sehestedt.

Affinis praecedentibus, at minor et elytra macula magna, rufa.

Species praecedentes omnes ab hoc genere, habitu antennarumque claua magna, compressa differunt. Forte proprii generis mihi haud rite examinatae.

7. *B. pilosus*, testaceus, elytris striatis, retusis praemorfo dentatis. Ent. syst. 2. 365. 3. *typograpus*.

Dermestes typographus. Linn. syst. Nat. 2. 561
7. Fn. Sv. 418.

Payk. Fn. Sv. 3. 145. 1.

Degeer Inf. 4. tab. 6. fig. 1. 2.

II. 43.

Panz. Fn. Germ. 15. tab. 2.

Sulz. Inf. tab. 2. fig. 4.

Act. Holm. 14. 163.

Schaeff. Icon. tab. 259. fig. 3.

Habitat intra arborum cortices, labyrinthos daedaleos puluere repletos formans, pinetorum pestis Variat colore et magnitudine.

varians.

8. *B. glaber*, testaceus, elytris retusis, ferratis, videntatis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Statura et magnitudo praecedentis. Thorax glaber, antice parum rugosus, testaceus. Elytra breuia, valde retusa, ferrata, dente vnico, cluato, longiori. Corpus testaceum.

vnidentatis.

9. *B. ater*, thorace antice scabro, elytris retusis, ferratis, vnidentatis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Corpus totum glabrum, atrum, nitidum, statum fere Apate, at huius generis. Thorax antice scaber. Elytra laeuius, atra, nitida, apice retusa, ferrata, denteque vnico elongato. Pedes ferruginei.

Laricis.

10. *C. niger*, elytris retusis, praemorfo dentatis, pedibus piceis. Ent. syst. 2. 365. 4. ^o

Payk. Fn. Sv. 3. 147. 3.

II. 44.

Panz. Fn. Germ. 15. tab. 3.

Herbst. Coleopt. 5. tab. 48. fig. 13.

Habitat sub cortice Pini Laricis Germaniae. Dom. Helwig.

11. *B. ater*, elytris praemorfo dentatis rufis. Ent. *chalcographus*.
 fyft. 2. 365. 5.
Dermestes chalcographus. Linn. fyft. Nat. 2. 562.
 8. Fn. Sv. 417.
 Panz. Fn. Germ. 39. tab. 20. 11. 67
 Payk. Fn. Sv. 3. 147. 4.
 Habitat intra arborum cortices.
12. *B. nigricans*, elytris glaucis, obtufiusculis. Ent. *polygraphus*.
 fyft. 2. 365. 6. *
Dermestes polygraphus. Linn. fyft. Nat. 2. 562.
 10. Fn. Sv. 420.
 Panz. Fn. Germ. 15. tab. 5. II. 44.
 Payk. Fn. Sv. 3. 155. 15.
 Herbfst. Arch. 4. tab. 20. fig. 9.
 Coleopt. 5. tab. 48. fig. 6.
 Habitat sub arborum corticibus.
13. *B. nigricans*, thorace rufo, elytris apice retuso-dentatis. Ent. *monographus*.
 fyft. 2. 365. 7. *
 Payk. Fn. Sv. 3. 149. 6.
 Habitat in Germaniae arboribus. Dom. Koch.
14. *B. villosus*, testaceus elytris integris, tibiis anticis dentatis. *Dactyliperda*.
Bostrichus Dactyliperda. Panz. Fn. Germ.
 Habitat in Dactylorum nucleis. Dom. de Meyerle.
 Paruus, affinis certe *B. micrographo*. Differt tamen corpore magis villofo, testaceo tibiisque anticis testaceis.
15. *B. ferrugineus*, elytris integris testaceis. Ent. *micrographus*.
 fyft. 2. 366. 8. *
Dermestes micrographus. Linn. fyft. Nat. 2. 562. 11.
 Payk. Fn. Sv. 3. 155. 13. VI. 26
 Panz. Fn. Germ. 66. tab. 13.
 Habitat in Europae ligno.

flavipes.

16. *B. ater*, nitidus, elytris apice retusis, ferratis, antennis pedibusque flavis.

Habitat in America meridionali. Mus. D. de Sehestedt.

11. 26

Paruus. Caput attum, antennis flavis. Thorax antice subrugosus. Elytra laevia, atra, nitida apice valde retusa, ferrata. Pedes flavi.

serripes.

17. *B. niger*, thorace depresso, elytris testaceis, apice retusis, ferratis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Statura parua praecedentis. Caput et thorax punctata, nigra. Elytra laevia, testacea, apice retusa, ferrata. Corpus et pedes testacea.

ruficollis.

18. *B. ater*, nitidus, thorace rufo, elytris retusis, bidentatis.

Habitat in America meridionali. Mus. D. de Sehestedt.

Corpus paruum, cylindricum, atrum. Thorax laevis, rufus, nitidulus. Elytra laevia, atra, nitida, apice retusa, margine bidentato.

compressicornis.

19. *B. glaber*, ater, nitidus, elytris marginato-retusis, antennis elongatis, compressis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. Dom. Lund.

Paruus, ater, glaber, nitidus. Elytra laevia, apice retusa, margine futuraeque elevatis. Antennae singulares, elongatae, compressae, flavae. Corpus atrum, pedibus flavis.

Alium in eodem museo a D. Smidt missum videtur antennis brevibus. Forte sexus varietas.

ferrugineus.

20. *B. glaber*, ferrugineus, nitidus, elytris subretusis, integris.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Cor.

Corpus paruum, cylindricum, ferrugineum, nitidum. Elytra sublaevia, parum retusa, inermia.

Varietas nigra, vix distincta.

21. B. thorace antice cristato, ferrugineus, elytris *cristatus*.

subretusis, nigris

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.

D. de Sehestedt.

Statura parua precedentis. Thorax laevis, ferrugineus, nitidus, antice crista parua, eleuata, dentata. Elytra basi laeuiua, ferruginea, apice retusa, substriata, nigra.

22. B. fuscus, elytris apice retusis, ante apicem unidentatis. Ent. syst. 2. 368. 24. *bidens*.

Payk. Fn. Sv. 3. 148. 5.

Panz. Fn. Germ. 39. tab. 21.

Habitat in Kiliae ligno.

23. B. ater, elytris striatis, piceis, capite excavato. *frontalis*.

Habitat in Carolina. Mus. Dom. Bosc.

Paruus. Caput valde excavatum, vel potius canaliculatum, dente paruo, vti videtur, vtrinque eleuato. Thorax rotundatus, punctatus, ater. Elytra crenato-striata, picea. Pedes picei.

152. HYLESINVS. *Antennae* claua, solida,
acuminata, rostro
obsoleto infedentes.

Scolytus. 1. H. glaber, nigricans, elytris truncatis, abdomine
retuso, fronte villosa, cinerascens.

Bostrichus Scolytus. Ent. syst. 2. 366. 9. *

Ekkoptogaster Scolytus. Herbft. Coleopt. 5. tab.
49. fig. 1. 2.

Scolytus. Geoff. Inf. 1. 350. 1. tab. 5. fig. 5.

Payk. Fn. Sv. 3. 150. 7.

Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 13.

Schaeff. Icon. tab. 112. fig.

~~Panz. Fn. Germ. 15. tab. 6.~~

Panz = II. 45.
H. costaricensis Kory

Habitat in Angliae vltimis. Dom. Lee.

Paullo minorem totum nigrum ex America meri-
dionali misit Dom. Smidt, vix tamen distinctum.

crenatus. 2. H. glaber, ater, elytris crenato-friatis.

Bostrichus crenatus. Ent. syst. 2. 366. 10. *

Payk. Fn. Sv. 3. 150. 8.

II. 45 Panz. Fn. Germ. 15. tab. 7.

Herbst. Col. 5. tab. 48. fig. 10.

Habitat in Germania. Dom. Schneider.

Fraxini. 3. H. griseus, elytris nigro-reticulatis.

Panz. Fn. Germ. 66. 15.

Ha-

Hylesini corpus paruum, cylindricum, pubescens, immargina-
tum, tardum; *capite* ovato, rostro brevissimo, fere obsoleto,
inserto; *antennis* brevis: articulo primo longissimo, vlti-
mo crassiori, apice acuminato, inserti ad rostri basin; *oculis* ma-
gnis, haud prominulis, reniformibus, lateralibus; *thorace* cy-
lindrico, antice parum angustato; *elytris* rigidis, fornicatis,
arcte includentibus, longitudine abdominis; *pedibus* brevi-
bus, compressis; *tibiis* extus crassioribus, saepius dentatis;
tarsis quadriarticulatis; *colore* obscuro.

Hylesini genus haud rite determinatum. Character naturalis
generis adhuc desideratur.

Habitat in Austriae Fraxino in truncis gregatim tubercula efficiens. Dom. Scheidler.

Distinctus omnino ab *H. vario*, duplo fere maior.

Caput griseum, vertice nigro. Thorax griseus, annulo dorsali nigro. Elytra substriata, grisea, nigro-reticulata. Pedes nigri, tarsi grisei.

1. *H. flavescens*, thorace elytrisq. fusco-variis. *varius.*

Habitat in Germaniae ligno. Dom. Smidt.

Medius. Caput cinerascens, antennarum clava acuta. Thorax flavescens, annulo dorsali fusco. Elytra laevia, flava, fusco-variegata. Corpus flavescens.

5. *H. villosus*, nigricans, tibiis quatuor posticis ferratis. *ligniperda.*

Bostrichus ligniperda. Ent. syst. 2. 367. 14. *

Payk. Fn. Sv. 3. 149. 7.

Habitat in Germaniae ligno. Dom. Hybner.

6. *H. villosus*, niger, elytris breuibus, piceis. *abietinus.*

Bostrichus abietinus. Ent. syst. 2. 367. 15. *

Habitat in Germaniae Abiete. Dom. Smidt. *III. 59.*

7. *H. villosus*, piceus, pedibus testaceis. *villosus.*

Bostrichus villosus. Ent. syst. 2. 367. 16. *

Payk. Fn. Sv. 3. 154. 13.

Panz. Fn. Germ. 15. tab. 8. *II. 45.*

Herbst. Coleopt. 5. 121.

Habitat in Germaniae arboribus. Dom. Helwig.

8. *H. fuscus*, thorace lineis, elytris maculis albis. *maculatus*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.

Dom. de Sehestedt.

Magnus. Caput cinereum. Thorax fuscus, linea dorsali lateraliq. cinereis, et in hac macula magna, fusca. Elytra laevia, fusca, maculis cinereis baseos: suturali longiori, apicis subnata. Corpus cinereum.

piniperda. 9. H. subuillofus, niger, elytris crenato-friatis, platis rufis.

Bostrichus piniperda. Ent. fyft. 2. 367. 17.

Dermestes piniperda. Linn. fyft. Nat. 2. 562. 9.
Fn. Sv. 421.

Degeer Inf. 4. tab. 6. fig. 8. 9.

IIAG Panz. Fn. Germ. 15. tab. 9.

Herbst. Col. 5. tab. 48. fig. 4.

Payk Fn. Sv. 3. 152. 11.

Habitat in ramculis Pini inferioribus, quos perforat, exficcat, destruit.

aenipennis 10. H. glaber, ater, elytris aeneis, nitidis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Maior. Antennae claua compressa, nigrae. Caput et thorax glabra, laeuia, atra, nitida. Corpus atrum, pedibus valde compressis.

Variat sexu antennis longioribus pilosis, fronteque ferrugineo-villosa.

fasciatus, 11. H. subuillofus, testaceus, elytris basi futuraque nigris.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. Dom. de Sehestedt.

Paullo maior H. testaceo. Caput et thorax pubescentia, testacea, immaculata. Elytra laeuia, integra, testacea, basi futuraque fuscis. Pedes breues, compressi, testacei.

Variat sexu capite retuso.

gibbus, 12. H. glaber, gibbus, obscure-rufus, nitidus, elytris testaceis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. Dom. Lund.

Statura omnino praecedentis. Caput et thorax glabra, laeuia, obscure-rufa, nitida. Elytra vix striata.

friata, testacea. Corpus nigrum, pedibus testaceis.

3. *H. glaber*, obscure-rufus, elytris basi futuraque *futuralis*.
nigris.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Statura omnino praecedentium. Caput et thorax
laevia, rufa, nitida. Elytra vix friata, rufa, ba-
si futuraque nigris. Corpus nigrum, pedibus
rufis.

14. *H. glaber*, testaceus, elytris laenibus.

Bostrichus testaceus. Ent. syst. 2. 367. 18. *

Panz. Fn. Germ. 66. tab. 16.

Habitat in Pini truncis. Dom. Zschuck.

testaceus.

vi. 56.

15. *H. niger*, elytris striatis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.

Statura omnino *H. futuralis*. Caput et thorax lae-
uia, glabra, atra. Elytra striata, nigra. Corpus
nigrum, pedibus compressis, breuibus.

Variat sexu: capite retuso, ferrugineo, villoso.

niger.

16. *H. glaber*, ater, elytris crenato-striatis.

Habitat in Amboina. Dom. Billardiere.

Statura omnino *H. chloropodis*, at duplo maior.

Corpus cylindricum, atrum. Antennae breues,
claua cinerascens. Thorax vix punctatus.

Elytra crenato-striata. Pedes breues, femori-
bus compressis.

breuitates.

17. *H. niger*, elytris striatis, antennis pedibusque *chloropus*.
rufis.

Curculio chloropus. Ent. syst. 2. 471. 323.

Linn. syst. Nat. 2. 617. 82. Fn. Sv. 635.

Payk. Monogr. 116, 110.

Panz. Fn. Germ. 10. tab. 14.

II. 62.

Bonsd.

Bonsd. Curc. fneec. 2. 18. fig. 19.

Habitat in Europae ligno quercino.

pubescens. 18. H. villosus, niger, antennis pedibusque flavescentibus, fronte villosa.

Bostrichus pubescens. Ent. syst. 2. 368. 19. *
II. 46 Panz. Fn. Germ. 15. tab. 10.

Herbst. Coleopt. 5. 121.

Habitat in Germaniae ligno. Dom. Prof. Helwig.

ater. 19. H. glaber, ater, nitidus, elytris laevibus, pedibus piceis.

Bostrichus ater. Ent. syst. 2. 368. 20. *

Bostrichus angustatus. Herbst. Col. 5. 111. 9.
tab. 48. fig. 9.

Pavk. Fn. Sv. 3. 153. 12.

Oliv. Inf. 2. 18. 9. 10. tab. 2. fig. 16.

Habitat in Sueciae ligno. D. de Paykull.

voluulus. 20. H. glaber, testaceus, ore anoque nigris.
Bostrichus voluulus. Ent. syst. 4. Append. 454
18. *

Habitat in Americae ligno. D. v. Rohr.

melanocephalus. 21. H. villosus, griseus, capite nigro, pedibus flavescentibus.

Bostrichus melanocephalus. Ent. syst. 2. 368.
21. *

Habitat in Daniae ligno. Mus. D. Lund.

flavus. 22. H. glaber, flavus, nitidus.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.

Corpus paruum cylindricum, totum flavum, immaculatum, nitidum.

Variat forte sexu: capite retuso.

oleiperda. 23. H. villosus, fuscus, elytris striatis griseis, pedibus testaceis.

Bo-

Bostrichus oleiperda. Ent. syst. 2. 366. 11. *

Habitat in Gallia meridionali, Oleam destruens.

Muf. Dom. Bosc.

4. *H. villosus*, griseus, antennarum claua elongata. *Oleae*.

Bostrichus Oleae. Ent. syst. 2. 366. 12. *

Habitat in Galliae meridionalis Olea, Muf. D. Bosc.

5. *H. ater*, nitidus, elytris rufis, abdomine retuso. *pygmaeus*.

Bostrichus pygmaeus. Ent. syst. 2. 367. 13. *

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

6. *H. subvillosus*, fuscus, elytris vitta abbreviata *vittatus*.
cinerea.

Bostrichus vittatus. Ent. syst. 2. 368. 22. *

Habitat in Holsatiae ligno. D. Daldorff.

17. *H. glaber*, ater, immaculatus.

minutus.

Bostrichus minutus. Ent. syst. 2. 368. 23. *

Panz. Fn. Germ. 15. tab. 11.

II. 46.

Habitat in Kiloniae Boletto verficoloro.

18. *H. cinereus*, elytris laevis obscurioribus.

minimus.

Habitat sub Abietis cortice Saxoniae. D. Hybner.

Minutus. Thorax laevis, cinereus. Elytra integra, obscuriora.

Variat thorace nigricante; forte aetate.

29. *H. thorace eleuato*, gibbo, niger, obscurus, pedibus flauis. *obscurus*.

Habitat in Americae meridionalis ligno. D. Smidt.

Muf. D. de Sehestedt.

Minutus. Corpus totum obscurum, pedibus folis flauis. Thorax gibbus.

30. *H. cylindricus*, ater, pedibus rufis, thorace *canaliculato*. *canaliculatus*.

Curculio canaliculatus. Ent. syst. 2. 471. 324. *

Habitat in Americae meridionalis Insulis. D. Smidt.

153. BRUCHVS. *Palpi aequales, filiformes.*
Maxilla membranacea, bifida.
Ligula acuminata.
Antennae filiformes.

- spinosus.* 1. B. griseus, thorace elytrisque spinosis. Ent. syst. 2. 369. 1. *
 Habitat in Iamaica. D. Drury.
- nucleorum* 2. B. cinereus, elytris striatis, femoribus posticis ouatis, dentatis. Ent. syst. 2. 369. 2. *
 Herbst. Arch. tab. 20. fig. 16.
 Habitat in Indiae nucleis.
- ~~*Bactris.*~~ 3. B. cinereus, elytris sublaevibus, femoribus posticis ouatis, tibiis incuruis. Ent. syst. 2. 369. 3. *
 Linn. syst. Nat. 2. 603. 4. Amoen. acad. 6. 392. 6.
 Habitat in Bactris nucleis.
- umbellatum.* 4. B. squamosus, supra griseus, subtus cinereus. Ent. syst. 2. 370. 4. *
 Habitat in Barbariae umbellatis. D. Prof. Vahl.
- Pisi.* 5. B. elytris nigris, albo - maculatis, podice albo punctis duobus nigris. Ent. syst. 2. 370. 5. *
Bruchus Pisi. Linn. syst. Nat. 2. 604. 1. Mus. Lud. Vlr. 35.
 Geoff. Inf. 1. 267. 1. tab. 4. fig. 9.
 Ledermüll. microsc. tab. 99. fig. 2.
 Degeer Inf. 4. tab. 16. fig. 3. 4.

Pl. 37.

Pungens A. Pisi
A. n. h. v.
Linn. syst. Nat.

Scop.

Bruchi corpus paruum, ouatum, gibbum, glabrum, hirtum marginatum, tardum; *capite* inflexo, obtuso, ouato, inflexo; *oculis* rotundatis, lateralibus, vix prominulis; *antennis* brevibus, ferratis, ante oculos insertis; *thorace* ouato, gibbo; *scutello* paruo, triangulo; *elytris* rigidis, fornicatis, abdomine brevioribus, ano prominulo; *pedibus* brevibus, validis; *tarsis* quadriarticulatis; *colore* vario, obscuro.

Scop. Ent. carn. 63.

Panz. Fn. Germ. 66. tab. 11.

Habitat in America boreali et Europa australi, pisa destruens. Deoratur a Gracula quiscula, Coruis, Picis aliisque.

. B. corpore fusco, griseo-maculato. Ent. syst. 2. *Cacho.*
370. 6. *

Habitat in Theobromatis seminibus.

. B. fuscus, thorace elytrisque cinereo-punctatis. *punctatus.*
Ent. syst. suppl. 158. 6. *

Habitat - - -

. B. griseo-nitidulus, elytris vix abdomine brevioribus. *Robiniae.*
Ent. syst. 2. 370. 7. *

Habitat in Robiniae pseudoacaciae seminibus Americae borealis.

. B. obscure ferrugineus, elytris fusco-maculatis, *femoratus.*
femoribus posticis elongatis, clauatis. Ent. syst.
suppl. 158. 7. *

Habitat in Indiae orientalis seminibus. D. Dal-
dorff.

o. B. thorace gibboso cupreo, elytris nigris tuber-*gibbosus.*
culato-spinosis. Ent. syst. 2. 370. 8. *

Habitat in America boreali.

1. B. elytris griseis, nigro-maculatis, pedibus ru-*Theobro-*
fis, scutello albo. Ent. syst. 2. 371. 9. * *matris.*

Bruchus Theobromae. Linn. syst. Nat. 2. 605. 2.

Habitat in Theobromatis seminibus.

2. B. niger, elytris cinereis: maculis tribus nigris, *marginel-*
margine connexis. Ent. syst. 2. 371. 10. * *lus.*

Habitat in Germania. D. de Hattorff.

3. B. niger, elytris striatis, ferrugineis: maculis *3 macula-*
tribus nigris, margine connexis. Ent. syst. suppl. *tus.*

158. 10. *

Ha-

- analis.* Habitat in India orientali. Dom. Hybner.
 14. *B. subferrugineus*, elytris apice atris, ano atro
 linea apicis alba. Ent. syst. 2. 371. 11. *
 Habitat in India orientali. Mus. D. Banks.
- sparsus.* 15. *B. cinereus*, elytris albo-punctatis, femoribus
 posticis punctatis.
 Habitat in Tanger. Mus. D. de Sehestedt.
 Medius. Antennae cinereae, basi rufae. Thorax
 cinereus, macula magna basaeos alba. Elytra
 striata, cinerea: punctis albis sparsis. Anus
 prominet maculis duabus fuscis. Pedes cinerei
 femoribus posticis acute dentatis.
- 2 punctatus.* 16. *B. niger*, elytris striatis: puncto rufo.
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
 D. Lund.
 Statura et magnitudo *B. 2 punctati*. Antennae
 crassae, ferratae. Caput et thorax atra, immaculata.
 Elytra striata, nigra, puncto magno
 rufo. Corpus cinereo-tomentosum, podice pro-
 minulo, immaculato. Pedes nigri, femoribus
 posticis rufis.
- 2 punctatus.* 17. *B. cinereus*, elytris fuscis: puncto basaeos ocellari
 atro. Ent. syst. 2. 371. 12. *
 Sulz. Hist. Inf. tab. 4. fig. 2.
 Habitat in Helvetiae plantis.
- 4 maculatus.* 18. *B. thorace nigro*: macula basaeos pallida, elytris
 rufescentibus: macula apiceque nigris. Ent.
 syst. 2. 371. 13. *
 Habitat in Insula St. Croix Americae. Dr. Pflug.
- arbitrarius.* 19. *B. fuscus*, femoribus posticis incrassatis, com-
 pressis.
 Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.
 Statura et magnitudo *B. Pisi*. Antennae ferratae
 fuscae. Elytra substriata. Femora postica ou-
 ta, valde incrassata, compressa. 20.

20. *B. cinereo-villosus*, elytris striatis, femoribus posticis incrassatis, compressis. Ent. syst. suppl.

159. 13. *

Habitat in India orientali. D. Daldorff.

21. *B. testaceo fuscoque varius*, elytris punctato-striatis, femoribus posticis compresso-clauatis, unidentatis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Minor quam *B. gonagra*, et distinctus. Antennae extrorsum subcrassiores, testaceae. Caput et thorax obscura, fusco-sublineata. Elytra punctato-striata, testacea, lituris aliquot fuscis albidisque obsoletis. Pedes testacei, femoribus posticis valde compressis, incrassatis, acute unidentatis.

22. *B. ferrugineus*, thoracis macula baseos scutello-que albis. Ent. syst. 2. 372. 14. *

Habitat - - - Mus. D. Lund.

23. *B. ferrugineus*, cinereo-villosus, antennarum articulis tribus ultimis incrassatis. Ent. syst. suppl. 159. 14. *

Habitat in Indiae orientalis seminibus. D. Daldorff.

24. *B. elytris nigris*: atomis albis, femoribus posticis unidentatis. Ent. syst. 2. 372. 15. *

Bruchus granarius. Linn. syst. Nat. 2, 605. 5.

Fn. Sv. 628.

Payk. Fn. Sv. 3. 157. 1.

Habitat in plantarum seminibus.

vi. 37.

25. *B. niger*, scutello elytrorumque fascia postica albis.

Habitat in Hispaniae Eruo, Mus. D. de Sehestedt.

Sta-

Statura et magnitudo *B. granarii*. Caput et thorax nigra, puncto ad basin thoracis albo. Scutellum album. Elytra vix striata, nigra, atomis fasciisque maculari albis. Pedes ferruginei: postici nigri, femoribus muticis.

Cisti.

26. *B. ater*, immaculatus, femoribus muticis. Ent. syst. 2. 372. 16. *

Panz. Fn. Germ. 66. tab. 12.

Payk. Fn. Sv. 3. 159. 3.

Habitat in floribus *Cisti Helianthem.* Mus. Dom. Banks.

v. 98

futuralis.

27. *B. niger*, futura elytrorum flavescente. Ent. syst. 2. 372. 17. *

Habitat Parisiis. Mus. D. Bosc.

abdominalis.

28. *B. niger*, abdomine cinereo-maculato, pedibus anticis testaceis. Ent. syst. 2. 372. 18. *

Habitat in India orientali. Mus. D. Banks.

feminarius

29. *B. ater*, antennarum basi pedibusque anticis testaceis, femoribus muticis. Ent. syst. 2. 373. 19. *

Bruchus feminarius. Linn. syst. Nat. 2. 605. 6.

Geoff. Inf. 1. 268. 3.

Habitat in Angliæ floribus.

villosus.

30. *B. villosus*, cinereus, immaculatus. Ent. syst. 2. 373. 20. *

Habitat in Germania. D. Smidt.

nigricornis.

31. *B. villosus*, cinereus, antennis pedibusque nigris. Habitat in Isle de France. D. Daldorff. Mus. D. de Sehestedt.

Statura parua *B. villosi*, at alius. Antennae extorsum parum crassiores, nigrae. Caput, thorax elytraque striata, cinerea, immaculata. Corpus cinereum, pedibus nigris.

2. *B. niger*, obscurus, antennis pedibusque rufis, *rufipes*.
femoribus posticis incrassatis nigris. Ent. syst.
2. 373. 21. *
- Bruchus rufipes*. Oliv. Inf. tab. fig.
Habitat Bariffiis. Mus. D. Bosc. *cum Ant. trib. brevipes idem*
3. *B. obscurus*, elytris friatis, vitta media ferrugi-
nea. Ent. syst. suppl. 159. 21. * *vittatus*.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.
34. *B. elytris punctatis*, testaceis, nigro-maculatis, *maculatus*
podice griseo: punctis binis nigris. Ent. syst.
2. 373. 22. *
- Habitat in America. D. v. Rohr.
35. *B. testaceus*, cinereo-villosus, pedibus simpli-
cibus. Ent. syst. suppl. 159. 22. * *capisinqola*.
Habitat in Cayennae feminibus.
36. *B. testaceus*, immaculatus, elytris subfriatis, *Mimosae*.
femoribus posticis acute dentatis. Ent. syst. 2.
374. 23. *
- Habitat in Mimosaefeminibus Americae meridionalis. Mus. D. Lünd.
37. *B. cinereus*, elytris friatis, pallidis, fusco-maculatis, pedibus testaceis. *minutus*.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.
Minutus. Caput et thorax villosa, cinerea, immaculata, maculis quinque fuscis 2. 2. 1. Corpus cinereum, pedibus testaceis.
38. *B. antennis pectinatis*, flavis, corpore atro, pedibus testaceis. Ent. syst. 2. 374. 24. * *flavicornis*.
Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.
39. *B. antennis pectinatis*, corpore longioribus, corpore griseo, fusco, maculato. Ent. syst. 2. 374. 25. * *ferraticornis*.

T. II

Cc

Ha-

Habitat in Oriente. Prof. Forstkahl.

Coryphaea. 40. B. antennis pectinatis, fuscis, thorace elytris
fuscis.

Habitat in Carolina. Mus. Dom. Bosc.

Statura minimo *B. ferraticornis*. Antennae in
mis maris valde pectinatae, nigrae. Caput
grum. Thorax punctatus, obscure-rufus, im-
maculatus. Elytra punctato-striata, laetius
fa. Corpus nigrum. Abdomen cinereum, pos-
ce prominet punctis duobus parvis, fuscis.

2guttatus. 41. B. thorace nigro, lineolis duabus baseos, scute-
loque albis, elytris basi rufis, antennis flabe-
latis.

Habitat in Carolina. Mus. Dom. Bosc.

Parvus. Antennae corpore paullo breuiores, fla-
bellatae, nigrae, basi rufae. Thorax niger, li-
neolis duabus approximatis, eleuatis baseo
albis. Scutellum album. Elytra striata, basi ru-
fa, apice nigra. Pedes rufi, tibiis nigris.

2striatus. 42. B. thorace nigro, lineolis duabus baseos approxi-
matis scutelloque albis, elytris rufis: strigis
duabus albidis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Affinis videtur *B. 2guttato*. Antennae corpore
paullo breuiores, nigrae. Caput nigrum. Tho-
rax niger, lineolis duabus baseos eleuatis, ap-
proximatis, albis. Scutellum album. Elytra
striata, ferruginea, strigis duabus approximatis
albis. Pedes rufi, femoribus nigris.

Variat sexu: antennis simplicibus.

pectinicornis. 43. B. antennis pectinatis, corpore ferrugineo, leu-
gioribus. Ent. syst. 2. 374. 26.

Bruchus pectinicornis. Linn. syst. Nat. 2. 605.

Dege

Degeer Inf. 5. 281. 2.

Schaeff. Elem. tab. 86. fig. 1.

Habitat in Chinae feminibus.

4. *B. antennis pectinatis, niger, elytris striatis, fer- barbicornis.*
rugineis, femoribus posticis videntatis.

Habitat - - - Mus. D. de Sehestedt.

Statura et magnitudo praecedentis. Antennae pectinatae, nigrae, basi ferrugineae. Caput et thorax nigra, macula ad basin thoracis triangulari alba. Elytra striata, ferruginea, immaculata. Corpus nigrum. Pedes ferruginei, pedibus posticis videntatis.

5. *B. nigricans, antennis pectinatis pedibusque fer- flavipes.*
rugineis.

Habitat - - -

Praecedentibus paullo maior. Antennae magnae, ferrugineae, valde pectinatae: articulo ultimo ovato. Caput et thorax obscura, nigra, immaculata. Elytra striata, obscura. Pedes inermes, ferruginei.

154. ANTHRIBVS. *Palpi* aequales, filiformes.

Maxilla bifida.

Antennae articulis subaequalibus, infidentes rostro breui, plerumque 11 articulis.

beros.

1. *A. griseus*, *elytris* punctato-striatis, fusco-maculatis.

Habitat in Guinea. Dom. Hesse. Mus. D. Lund. Magnus in hoc genere. *Antennae* maris longitudine corporis, nigrae, articulo 8. 9. apice cinereo. Caput griseum, obscurum. Thorax griseus, lineolis duabus fuscis. *Elytra* punctato-striata, maculis duabus magnis, marginalibus fuscis. Pedes nigri, cinereo-varii.

Femina antennis brevioribus, subfiliformibus: articulis ultimis parum crassioribus, compressis.

gigas.

2. *A. griseus*, atomis albis, antennis longissimis.

Habitat in Guinea. D. Meier. Mus. D. de Sebestedt.

Antennae corpore duplo longiores, obscurae: articulis ultimis incrassatis: ultimo tamen setoso. Rostrum longiusculum, canaliculatum. Thorax et *elytra* grisea, obscura, atomis sparsis, albis. Pedes inermes, cinerei.

Anthrubi corpus ovatum, gibbum, subglabrum, immarginatum; *capite* ovato, antice porrecto, plano, obtuso, setato; *oculis* globosis, prominulis, marginalibus; *antennis* longiusculis, in fovea laterali sub oculis insertis; *thorace* truncato: marginibus deflexis; *scutello* parvo, rotundato; *elytris* rigidis, fornicatis, apice deflexis, longitudine abdominis; *pedibus* brevibus, 5-articulatis; *tarsis* quadriarticulatis; *lore* vario, saepius obscuro.

Variat paullo minor, elytris albo-maculatis.

Femina antennis breuibus.

A. cinereo nigroque varius, antennis atris apice *atricornis*.
albis.

Habitat in Guinea. Dom. Hesse. Mus. D. Lund.

Statura praecedentium. Antennae in nostro specimine breues, atrae, nodosae, nitidae. Caput et thorax scabra, fusca, cinereo-varia. Elytra punctato-friata, nigra, cinereo-varia. Corpus et pedes variegata.

A. griseus, cinereo fuscoque varius, antennarum *acuticornis*
claua, articulo vltimo acuto.

Habitat in Sumatra. D. Daldorff. Mus. D. de Sehestedt.

Maior A. perfolicornis et alius. Antennae nigrae, ante apicem albiae: articulis tribus vltimis incrassatis; vltimo acuto, breuiori. Caput et thorax grisea, fusco-maculata, thoracis striga postica clauata. Elytra punctato-friata, grisea, cinereo fuscoque variegata. Pedes variegati.

griseus, antennis corpore longioribus. Ent. syst. *longicornis*
suppl. 160. 1. *

Habitat in India orientali. Mus. D. de Sehestedt.

A. ater, elytris fulcatis, ferrugineo-maculatis. *pustulatus*.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
Dom. Lund.

Magnus. Antennae corpore breuiores, nigrae.

Caput atrum, bifasciatum: fulcis villoso-albis.

Thorax ater, ferrugineo-maculatus. Elytra
dor-

Antennae in hoc genere et specie et sexu nimis differunt. Mox setaceae, articulo vltimo subulato, mox articulis tribus ouatis, crassioribus, vltimo setaceo, mox claua ouata, compressa, obtusa, mox moniliformes, extrorsum crassiores: articulo vltimo ouato, acuto.

dorso plana, fulcata, atra, maculis plurimis, sparsis ferrugineis. Corpus atrum, albido-fri-gosum. Pedes atri.

pilicornis. 7. A. cinereus, thorace elytrisq[ue] fusco - variis, antennis pilosis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. Dom. de Séhestedt.

Corpus magnum, cinereum, vix maculatum. Antennae breues, vtrinque, pilosae: articulo primo secundoque nudis. Caput cinereum. Thorax et elytra cinereo fuscoque varia. Pedes cinerei.

pubicornis. 8. A. fuscus: linea dorsali lata, cinerea, antennis pilosis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Statura omnino praecedentis. Antennae vtrinque pilosae. Caput fuscum, fronte cinerea. Thorax fuscus, linea dorsali lata, cinerea, apice parum coarctata. Elytra vix striata, fusca: linea lata, dorsali, cinerea, basi medio apiceque coarctata, punctis aliquot nigris. Pedes fusci.

barbicornis. 9. A. cinereus, elytris fusco-maculatis, antennis pilosis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Séhestedt.

Antennae pilosae, corpore paullo breuiores, nigrae. Caput et thorax cinerea, fusco-maculata. Elytra punctato-striata, cinerea, fusco-maculata, tuberculoque paruo baseos eleuata. Pedes cinerei, femoribus posticis, fascia atra.

compressicornis. 10. A. obscurus, albo - variis, elytris punctis eleatis, atris, antennarum claua ouata, compressa.

Habitat in Guinea. Mus. Dom. Lund.

Statura omnino et magnitudo præcedentium. Antennae singulares, crassae, corpore breuibres, atrae, articulis basi cinereis, apice claua ouata, compressa. Caput et thorax fusco cinereoque varia. Elytra concolora, striata, punctis aliquot eleuatis, atris, sparsis. Corpus cinereum.

1. A. cinereo fuscoque varius; elytris planis, laevibus, antennis breuibus: claua ouata, compressa. *clauicornis*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. Dom. de Sehestedt.

Statura praecedentis. Antennae atrae, claua ouata, compressa. Caput villosum, cinereum. Thorax et elytra cinereo fuscoque variegata. Corpus cinereum.

2. A. thorace fusco: punctis quatuor albis, elytris variegatis, antennis claua ouata, compressa. *crassicornis*

Habitat in Sumatra. D. Daldorff.

Præcedentibus minor. Antennae fuscae, ante clauam albae, claua ipsa compressa, atra. Caput fuscum, cinereo-variis. Thorax fuscus, punctis quatuor albis. Elytra striato-punctata, fusca, albo-varia.

3. A. fusco cinereoque varius, elytris punctato-striatis, antennarum claua compressa. *perfoliicornis*

Habitat in Sumatra. D. Daldorff. Mus. D. Lund.

Statura et affinitas A. clauicornis. Antennae breues, claua ouata, compressa. Caput et thorax fusca, cinereo-varia, thorace postice striga parua, eleuata. Elytra punctato-striata, fusca, cinereo-varia. Corpus atrum, pedibus cinereis.

4. A. niger, antennis elongatis, tenuibus: claua ouata, compressa. *tenuicornis*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. Dom. de Sehestedt.

Sta-

Statura omnino praecedentium. Antennae longitudine corporis, nigrae, articulis apice incrassatis, vltimis tribus clauam ouatam, compressam, obtusam constituentibus. Rostrum breue, planum. Thorax et elytra nigra, punctis aliquot eleuatis scabra. Corpus nigrum.

Albinus.

15. *A. niger*, fronte anoque albis, thorace tuberculato. Ent. syst. 2. 375. 1.

Curculio Albinus. Linn. syst. Nat. 2. 616. 79.
Fn. Sv. 632.

Degeer Inf. 5. 255. 44. tab. 8. fig. 1.

Payk. Monogr. 118. 112.

Fn. Sv. 3. 160. 2.

I 47.

Bonsd. Curcul. 16. 1.

Habitat in Europa boreali.

latirostris. 16. *A. rostro latissimo, plano, elytris apice albis punctis duobus nigris*. Ent. syst. 2. 376. 2. *

Platyrrhinus costirostris. Ent. Helv. 1. 114.
tab. 14. fig. 1. 2.

Geoff. Inf. 1. 307. 8. tab. 5. fig. 8.

Payk. Monogr. 117. 111.

Fn. Sv. 3. 159. 1.

Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 17.

Schaeff. Icon. tab. 89. fig. 6.

Roff. Fn. Etr. 1. 132. tab. 5. fig. 5.

II 47 Panz. Fn. Germ. 15. tab. 12.

Bonsd. Curc. suec. 2. tab. 1. fig. 2.

Habitat in Europa boreali.

albirostris. 17. *A. rostro latissimo, plano, elytrisque postice albis nigro-variis*. Ent. syst. 2. 376. 3. *

Curculio albirostris. Payk. Monogr. 120. 113.

Payk. Fn. Sv. 3. 162. 3.

II 47 Panz. Fn. Germ. 15. tab. 13.

Schall. Act. Hall. 1. 287.

Herbst. Arch. 80. 6. tab. 24. fig. 26.

Habitat in Saxoniae Betula. Dom. Hybner.

18. *A. rostro latissimo, plano, elytrorumque apicibus anoque albis.* Ent. syst. suppl. 160. 4. * *stris.*
Anthribus breuirostris. Panz. Fn. Germ. 57. *V. 17*
 tab. 9.

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

19. *A. cinereus, thorace elytrisque spinosis, antennarum claua compressa.* *spinosus.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Magnitudo omnino *A. albirostris*. Antennae corpore breuiores, rufae: claua ouata, compressa, nigra. Caput cinereum. Thorax cinereus, spinis duabus anticis tribusque in medio eleuatis, acutis. Elytra vix striata, spinis tribus ad futuram eleuatis. Corpus cinereum.

20. *A. fuscus, thorace inaequali, elytris spinosis.* *aculeatus.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Statura praecedentis. Antennae breues, fuscae: articulis tribus vltimis crassioribus, distinctis; vltimo orbiculato. Caput planum, fuscum. Thorax inaequalis, fuscus. Elytra fusca, spinis tribus ad futuram maioribus, eleuatis, acutis aliquot minoribus sparsis. Pedes testacei, fusco-annulati.

21. *A. obscurus, capite, thoracis antico, elytrorumque macula obscure-griseis.* *lunatus.*

Habitat in Carolina. Mus. Dom. Bosc.

Caput planum, rotundatum, obscure-griseum. Thorax obscurus, antice lateribusque griseis. Elytra striata, obscura: punctis holosericeis, atris, maculaque magna, in medio cinerea, quae
 fae-

saepius obsoleta. Pedes albo nigroque variegati.

Mas minor, obscurior.

griseus. 22. A. griseus, elytris postice cinereis. Ent. syst. 2. 377. 4. *
Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks

Roboris. 23. A, rostro plano, latissimo, nigro, aeneus, rostro thorace pedibusque rufis. Ent. syst. suppl. 160. 4. *

Anthribus ruficollis. Ent. Helv. 1. 122. 1. tab. 15. fig. 4. 5.

Curculio ruficollis. Linn. Fn. Sv. 595.

Atelabus ruficollis. Herbst. Arch. 5. tab. 25. fig. 1.

Habitat in Kiliae Robore.

planirostris 24. A. rostro plano, latissimo, aeneus, rostro pedibusque testaceis. Ent. syst. 2. 377. 5. *

Curculio planirostris. Payk. Monogr. 124. 117.

II. 47. Panz Fn. Germ. 15. tab. 14.

Degeer Inf. 5. 252. 42.

Habitat in Holsatiae Aesculo Hippocastano. D. Daldorff,

nigripennis. 25. A. rostro plano, rufus, elytris atris. Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Statura omnino A. Roboris. Antennae rufae, articulis tribus ultimis clauatis, fuscis. Thorax rotundatus, pubescens, rufus immaculatus. Elytra punctato-friata, atra.

collaris. 26. A. rostro plano, niger, thorace rufo. Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

A. Roboris paullo maior. Caput atrum, rarius fronte obscure-rufa. Thorax subcylindricus, pubescens, rufus, immaculatus. Elytra punctato-friata, atra. Corpus nigrum. Pedes nunc rufi, nunc nigri. 27.

27. *A. niger*, elytris eleuato-striatis, rufis: punctis *scabrosus*.
nigris, sparfis. Ent. syst. 2. 377. 6. *

Anthribus scabrosus. Payk. Fn. Sv. 3. 164. 4.

Curculio scabrosus. Payk. Monogr. 121. 114.

Bruchus scabrosus. Herbst. Arch. tab. 20. fig. 156

Geoff. Inf. 1. 306. tab. 5. fig. 3.

Panz. Fn. Germ. 15. tab. 15.

II. 46

Habitat in Europae Jacea.

28. *griseus*, elytris punctis albis nigrisque alternis, *Coffeae*.
striatis.

Habitat in Indiae Coffea. D. Daldorff. Mus. D.
de Sehestedt.

Statura et magnitudo *A. scabrosi*. Caput et tho-
rax obscure-grisea. Elytra grisea, striis e pun-
ctis albis nigrisque. Corpus griseum, pedibus
subtestaceis.

29. *A. elytris nigris: punctis albis nigrisque alter-* *varius*.
nis, striatis. Ent. syst. 2. 378. 8. *

Anthribus varius. Payk. Fn. Sv. 3. 165. 5.

Curculio varius. Payk. Monogr. 122. 115.

Geoff. Inf. 1. 307. 2.

Panz. Fn. Germ. 15. tab. 16.

II. 48

Habitat in Sueciae Pinetis. Dom. de Paykull.

30. *A. obscure-ferugineus, griseo-pubescentis, ely-* *pubescens*.
tris apice griseis. Ent. syst. suppl. 161. 8. *

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

31. *A. cinereo fuscoque varius: punctis eleuatis, sepicola*.
pilosis. Ent. syst. 2. 378. 9. *

Habitat in Germaniae sepibus. Dom. Schneider.

32. *A. villosus, cinereus, antennis pedibusque testa-* *sericeus*.
ceis: femoribus posticis claua nigra.

Habitat in Austria. Mus. D. Lund.

Minu-

Minutus. Caput, thorax, elytra cinerea, immaculata. Antennae et pedes testacea, femoribus posticis elongatis, clauatis: claua nigra.

155. BRACHYCERVS. *Palpi* quatuor, brevissimi,
antici biarticulati.

Antennae breues, extrorsum crassiores, rostro insidentes.

apterus.

1. B. thorace spinoso: cruce impressa, elytris ferrugineo-punctatis. Ent. syst. 2. 379. 1. *
Oliv. Inf. 3. 82. tab. 1. fig. 3.
Linn. syst. Nat. 2. 619. 95.
Degeer Inf. 5. 275. tab. 16. fig. 1.
Habitat in India.

ocellatus.

2. B. thorace spinoso, antice excauato, elytris cinereus: punctis atris, subocellatis. Ent. syst. 2. 379. 2. *
Oliv. Inf. 3. 82. tab. fig.
Habitat in Madagascar. Mus. Britann.

scalaris.

3. B. thorace spinoso, inaequali, ater, elytris striis rufis, denticulatis. Ent. syst. 2. 380. 3. *
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Dr. Schulze.

4.

Brachyceri corpus magnum, onatum, gibbum, glabrum, immarginatum, tardum; *capite* paruo, inserto, antice producto in rostrum crassum, planum, obtusum, inaequale; *oculis* parvis, oblongis, marginalibus; *antennis* brevibus sub medio marginis rostri insertis; *thorace* transverso, inaequali saepius spinoso; *scutello* nullo; *elytris* connatis, rigidis, fornicatis, deflexis, longitudine abdominis; *pedibus* brevibus, validis; *tarsis* quadriarticulatis; *colore* obscuro.

4. *B. thorace spinoso, inaequali, ater, elytris rubris, ~~obesus.~~*
 punctis nigris, confertis. Ent. syst. 2. 386. 4. *
Brachycerus obesus. Oliv. Inf. 82. tab. fig.
Curculio tuberculatus. Degeer Inf. 7. 658. 63.
 tab. 49. fig. 8.
Curculio oedematofus. Sulz. Hist. Inf. tab. 4.
 fig. 10.
Curculio ater. Wulf. Inf. cap. tab. 1. fig. 11.
 Herbst. Arch. tab. 45. fig. 8.
 Habitat ad Cap. Bon. Spei.
5. *B. niger, thorace spinoso, canaliculato, punctato, ~~coraiger.~~*
 elytris punctis elevatis, striatis. Ent. syst. suppl.
 161. 4. *
 Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lund.
6. *B. thorace spinoso, quinquefulcato, elytris laevi- ~~globosus.~~*
 bus. Ent. syst. 2. 381. 5. *
Brachycerus globosus. Oliv. Inf. 3. 82. t. f.
Curculio globosus. Drury Inf. 1. tab. 32. fig. 4.
 Habitat in Indiis. Dom. Drury.
7. *B. thorace spinoso, sulcatoque, niger, thoracis la- ~~maculatus:~~*
 teribus elytrorumque maculis ferrugineis.
 Habitat - - - Mus. D. de Sehestedt.
 Statura et magnitudo omnino *B. globosi.* Caput
 nigrum, immaculatum. Thorax acute-spinosus,
 valde canaliculatus, niger, marginè ferrugineo.
 Elytra connata, laevia, atra: maculis plurimis
 ferrugineis. Pedes scabri, nigri.
8. *B. fuscus, capite thoraceque cylindricis, angustio- ~~rostratus.~~*
 ribus, elytris postice spinosis. Ent. syst. 2.
 381. 6. *
 Oliv. Inf. 82. tab. 1. fig. 4.
 Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. D. Banks.
9. *B. obscurus, thorace varioloso, elytris punctatis ~~spiniger.~~*
 spinisque triplici serie.

Ha-

Habitat in Guinea. Dom. Hesse. Mus. D. de Sehestedt.

Magnitudo B. obesi. Caput cinereum. Thorax punctis plurimis alte-impressus. Elytra punctata, obscura, lineis tribus spinarum eleuatarum acutarum, armata. Pedes cinerei.

verrucosus. 10. B. cinereus, thorace subinermi, elytris scabri spinosisque tuberculoque postico eleuato.

Habitat in Guinea. Dom. Meier. Mus. D. Lund. Magnus. Caput inaequale, cinereum. Thorax subinermis, cinereus, punctis plurimis eleuatis atris, glabris. Elytra cinerea, fascia media lata, inaequali, fusca, punctis eleuatis, atris spinisque breuibus, acutis, armata. Postice tuberculum obtusum, eleuatum ad futuram. Pedes cinerei.

Variat absque elytrorum fascia fusca.

barbarus. 11. B. thorace spinoso, fulcatoque, elytris scabri anguloque duplici, crispato. Ent. syst. 2. 381

varietates sequentes. 8. *
Curculio barbarus. Linn. syst. Nat. 2. 617. 87

Habitat in Africa. *Sicilia*

undatus. 12. B. thorace spinoso canaliculatoque, elytris lineis eleuatis, crispatis, corpore nigro. Ent. syst. suppl. 161. 8. *

Habitat in Gallia, Barbaria.

inaequalis. 13. B. thorace scabro, elytris lineis eleuatis, crispatis, capite bidentato. Ent. syst. 2. 382. 9. *

Oliv. Inf. 82. tab. 2. fig. 12.

Habitat ad Cap. Bon. spei. Mus. Dom. Olivier.

crispatus. 14. B. niger, thorace spinoso canaliculatoque, elytris cinereis: angulo exteriori crispato, dentato. Ent. syst. 2. 382. 10. *

Habitat in Barbaria. Mus. Dom. Desfontaines.

5. *B. cornutus*, thorace elytrisq[ue] subspinosis, ely- ~~trorum~~ *cornutus*.
trorum spinis fasciculato-pilosis. Ent. syst. 2.
382. 11. *
Brachycerus cornutus. Oliv. Inf. 82. tab. 2.
fig. 14.
Curculio cornutus. Linn. syst. Nat. 2. 618. 9r.
Mus. Lud. Vlr. 57.
Habitat in Indiis.
6. *B. cinereus*, thorace spinoso, fulcato, elytris an- *algicus*.
gulo duplici, spinosis. Ent. syst. 2. 382. 12. *
Oliv. Inf. 82. tab. 7. fig. 16.
Habitat in Africa. Dom. Prof. Vahl.
7. *B. griseo-fuscus*, elytris postice retusis, denta- *reticus*.
tis. Ent. syst. 2. 382. 13. *
Oliv. Inf. 82. tab. 1. fig. 6.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Dom. Banks.
8. *B. fuscus*, thorace elytrisq[ue] globosis. Ent. syst. *spectrum*.
2. 383. 14. *
Oliv. Inf. 82. tab. 1. fig. 5.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. *positum*
9. *B. thorace spinoso, fulcato, niger, obscurus, ely-* *muricatus*.
tris lineis tribus eleuatis, crenatis. Ent. syst.
2. 383. 15. *
Oliv. Inf. 82. tab. 2. fig. 19.
Habitat in Hungaria. Dom. Hybner.
Thorax lineis duabus dorsalibus eleuatis, dentatis.
10. *B. thorace crista duplici, elytris dorso planis, re-* *crisatus*.
ticulatis. Ent. syst. suppl. 161. 15. *
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lund.
11. *B. thorace punctis eleuatis scabro, elytris va-* *grifus*.
riolosis.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Dom. de Sche-
stedt.

Statura omnino B. Morionis, at minor. Corpus pilosum, griseum, obscurum, immaculatum. Thorax punctis eleuatis scaber. Elytra punctis maioribus variolosa.

motio.

22. B. ater, thorace elytrisq̄ue variolosis.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lund.

Corpus paruum, atrum, immaculatum. Caput tuberculis duobus baseos. Thorax et elytra atra, punctis impressis, variolosis, reticulatis. Pedes inermi, fusci.

vna.

23. B. thorace spinoso inaequali, elytris tuberculis eleuatis, obtusis, numerosis. Ent. syst. 2. 383 16. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. D. de Paykull.

156. ATTELABVS. *Palpi* filiformes.

Maxilla bifida.

Antennae moniliformes, rostro infidentes.

Coryli.

1. A. niger, elytris rufis, reticulatis. Ent. syst. 2. 384. 1.

Attelabus Coryli. Linn. syst. Nat. 2. 619. 1. Fn. Sv. 638.

Degeer Inf. 5. 257. 46. tab. 8. fig. 3.

Payk. Monogr. 128. 121.

- Fn. Sv. 3. 168. 1.

IX.

Ent. Helv. 1. 118. tab. 15. fig. 1. 2.

Schaeff

Attelabi corpus paruum, ouatum, glabrum, immarginatum, tardum; capite exserto, ouato, postice attenuato, antice porrecto; oculis globosis, marginalibus, ante rostrum insertis; antennis breuibus, approximatis, rostri basi insertis; thorace rotundato, ouato; scutello rotundato; elytris nigris, fornicatis, longitudine abdominis; pedibus breuibus, validis; tarsis quadriarticulatis; colore vario, plerumque obscure.

Schaeff. Icon. tab. 75. fig. 8.

Sulz. Inf. tab. 4. fig. 1.

β. *Attelabus Auellanae*. Linn. fyft. Nat. 2. 619. 2.

Geoff. Inf. 1. 237. 11.

Schaeff. Icon. tab. 56 fig. 5. 6.

Habitat in Coryli Auellanae foliis, quae in cy-
lindrum voluit et vtrinque claudit.

A. rufus, pectore femoribusque atris, capite po-
stice attenuato, cylindrico, longitudine cor- *cygnus.*
poris.

Habitat in Sumatra. D. Daldorff. Mus. D. de Se-
heftedt.

Statura singularis. Magnitudo A. Coryli. Ro-
strum breue, planum, apice incrassatum, ru-
fum. Antennae rufae: articulo primo vltimis-
que tribus crassioribus, fuscis. Caput glabrum,
rufum, postice attenuatum, cylindricum, lon-
gitudine fere totius corporis. Thorax antice
attenuatus, rufus. Elytra striata, rufa. Cor-
pus rufum, pectore femoribusque nigris.

Varietas forte sexus, capite triplo breuiore, vix
differt.

A. rufus, capite postice attenuato, cylindrico, *longicollis.*
nigro.

Habitat in Australasia. D. Riche. Mus. D. Bosc.

Statura praecedentium. Antennae articulis sex
anterioribus rufis, interne obtuse prominulis,
vltimis tribus paullo maioribus, medio rostri
insertae. Caput rufum, nitidum, postice pro-
ductum, cylindricum, longitudine corporis, ni-
grum. Thorax antice angustatus, ferrugineus,
lateribus nigris. Elytra striata: striis puncta-
tis, rufa, basi apiceque parum flavescentia.
Corpus ferrugineum, pedibus parum elongatis.

- 2guttatus.* 4. *A. ater*, nitidus, elytris puncto medio flavo. Habitat in Sumatra. D. Daldorff.
Caput postice attenuatum et thorax laeuis, atra, nitida. Elytra laeuis, atra, nitida, puncto magno medio flavo. Pedes ferruginei, femoribus clauatis, claua atra.
- 2pustulatus.* 5. *A. ater*, elytris macula baseos rufa. Ent. syst. 2. 383. 3.
Habitat in America boreali. D. Yeats.
- rufus.* 6. *A. rufus*, immaculatus, elytris striatis. Habitat in Iaua. Mus. D. Bosc.
Statura et magnitudo *A. Pensylvanici*, totus rufus. Caput postice angustatum. Elytra striata: striis punctatis.
- Pensylvanicus.* 7. *A. niger*, elytris rufis: fascia media apicisque nigra. Ent. syst. 2. 385. 4. *
Linn. syst. Nat. 2. 620. 5.
Habitat in America boreali.
- gemmatus* 8. *A. ferrugineus*: tuberculis nigris sparsis. Ent. syst. 2. 385. 5. *
Attelabus gemmatus. Thunb. nou. Inf. sp. 3. 68. fig. 80.
Habitat ad Cap. Bon. Spei.
- notatus.* 9. *A. obscure ferrugineus*, elytris flavo-notatis, pedibus flavis. Ent. syst. 2. 385. 6. *
Habitat in India. D. de Paykull.
- Tranquebaricus.* 10. *A. rufus*, elytris fasciis duabus nigris: anteriore interrupta. Ent. syst. suppl. 161. 6. *
Habitat Tranquebariae. Mus. D. de Sehestedt.
- longimanus.* 11. *A. piceus*, elytris apicem retusis, pedibus anticis elongatis: femoribus videntatis. Ent. syst. 2. 385. 7. *
Habitat in Senegallia. D. de Paykull.

2. *A. fuscus*, elytris variolosis, basi vnispinosis, pedibus anticis elongatis: femoribus vnidentatis. *dentipes.*
 Ent. syst. suppl 162. 7. *
 Habitat in Americae Insulis. Mus. D. Lund.
3. *A. ferrugineus*, elytris laeuissimis, atris. Ent. *nigripennis.*
 syst. 2. 386. 8. *
 Habitat ad Cap. Bon. Spei. Dom. de Paykull.
4. *A. ferrugineus*, antennis tarsisque fuscis, elytris *fuscicornis* punctato-friatis. Ent. syst. 2. 386. 9. *
 Habitat in Senegallia. Dom. de Paykull.
5. *A. ferrugineus*, elytris spinosis, atris. *bystrix.*
 Habitat in Sumatra. D. Daldorff.
 Magnitudo *A. Coryli*. Caput ferrugineum, antennis palpisque nigris. Thorax ferrugineus, tuberculis duobus dorsalibus, obtusis. Scutellum ferrugineum, spina parua, nigra. Elytra striata, atra, spinis quatuor erectis, validis, acutis. Corpus ferrugineum, femoribus annulo fusco.
6. *A. ater*, thorace rufo, elytris basi angulatis, pedibus anticis elongatis: femoribus vnidentatis. *ruficollis.*
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.
 Statura et magnitudo *A. curculionoidis*. Corpus atrum, nitidum. Rostrum apice incrassatum. Thorax laeuis, rufus, nitidus, immaculatus. Elytra substriata, atra, nitida, angulo baseos prominente. Pedes atri, antici longiores, femoribus clauatis, dente valido, recuruo, acuto.
7. *A. ater*, nitidus, femoribus omnibus subserratis. *atratus.*
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.
 Statura praecedentis, paullo minor, totus ater, nitidus, immaculatus. Elytra friata. Femora omnia denticulis tribus paruis, serrata.

*cyanipennis.*18. *A. ater*, elytris striatis, cyaneis.Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.Statura praecedentis, at paullo minor. Thorax
punctatus. Elytra striata, cyanea, immaculata.
Abdomen supra rufum. Pedes cyanei, femo-
ribus subferratis.*nitidus.*19. *A. ater*, nitidus, elytris striatis, femoribus mu-
ticis.Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
Dom. de Sehestedt.Affinis *A. atrato*, at minor. Caput et thorax atra
nitida, immaculata. Elytra striata, angulo ba-
seos parum prominulo. Pedes antici elongati,
femoribus incrassatis, at muticis.

Variat rarius thorace parum rufescente.

*spinifus.*20. *A. ferrugineus*, thorace elytrisque spinosis. Ent.
syst. 2. 386. 10. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Dom. de Paykull.

*indicus.*21. *A. ferrugineus*, capite elytrorum basi fasciaque
media cyaneis. Ent. syst. 2. 386. 11. *

Thunb. nou. Inf. sp. 3. 68. fig. 81.

Habitat in India orientali.

*curculio-
noides.*22. *A. niger*, thorace elytrisque striato-punctatis
rubris. Ent. syst. 2. 386. 12.

Geoff. Inf. 1. 273. 10.

Payk. Monogr. 130. 122.

Fn. Sv. 3. 171. 2.

Schaeff. Icon. tab. 56. fig. 7.

Sulz. Inf. tab. 4. fig. 12.

Habitat in Europae Corylo, Salice.

IX.

variolosus. 23. *A. ater*, thorace elytrisque ferrugineis, elytr-
variolosis.

Habitat in Barbaria. Mus. Dom. Bost.

57

Statura et summa affinitas *A. curculionoidis*. Rostrum paullo breues, atrum. Thorax laeuis, rufus, immaculatus. Elytra haud-striata, at punctis plurimis, latioribus, rugis, variolosa. Corpus atrum, pedibus anticis parum elongatis.

24. *A. ferrugineus*, coleoptris angulatis: disco nigro. Ent. syst. 2. 387. 13. * *angulatus*.

Habitat in Cayenna. Dom. v. Rohr.

25. *A. violaceus*, hirtus, rostro atro. Ent. syst. 2. *pubescens*. 387. 14. * *Herbst. 7. 139. 16. Indistinctus*

Habitat in Germania. Dom. de Hattorff *Herbst. 7. 139. 17. Indistinctus*

26. *A. hirtus*, ater, elytris crenato-striatis, coeruleo-*hirtus*. fcentibus.

Habitat in Carolina. Mus. Dom. Bosc.

Statura et magnitudo omnino *A. pubescentis*.

Rostrum elongatum, atrum, antennis articulis tribus vltimis incrassatis. Thorax hirtus, ater. elytra valde crenato-striata, coeruleo-fcentia. Corpus nigrum, pedibus inermibus.

27. *A. aureus*, rostro plantisque nigris. Ent. syst. 2. *Bacchus*. 387. 15.

Curculio Bacchus. Linn. syst. Nat. 2. 611. 38.

Payk. Monogr. 133. 124.

Fn. Sv. 3. 172. 4.

Geoff. Inf. 1. 270. 4. *II. 49*

Degeer Inf. 5. 250. 38.

Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 18.

Sulz. Inf. tab. 4. fig. 4.

Habitat in Vite, Corylo.

Variat sexu: thorace antrorsum spinose.

28. *A. corpore viridi-aurato*, subtus concolore. Ent. *Betuleti*. syst. 2. 387. 16.

Curculio Betulae. Linn. syst. Nat. 2. 611. 39.

Fn. Sv. 605. *II. 49*

Geoff. Inf. 1. 270. 2. Payk.

Payk. Monogr. 131. 123.

Fn. Sv. 3. 170. 3. a.

Degeer Inf. 5. 248. 5. tab. 7. fig. 25.

Habitat in Betula alba, in Vite, folia contorquens.

Variat sexu: thorace antrorsum spinoso.

Populi.

29. A. corpore viridi-ignito, subtus atro, coerulescente. Ent. fyft. 2. 387. 17.

Curculio Populi. Linn. fyft. Nat. 2. 611. 40.

Fn. Sv. 606.

Payk. Monogr. 132, 123. 8. 1

Fn. Sv. 3. 171. 3. 3.

Ent. Helvet. 1. 110. 2. tab. 13. fig. 3. 4.

Geoff. Inf. 1. 270. 3.

Degeer Inf. 5. 249. 38.

Habitat in Betula, Populo.

Varietatem praecedentis credit Dom. de Paykull, at vix merito.

bicolor.

30. A. niger, capite thorace elytrisque rubris, rostre longitudine corporis, atro. Ent. fyft. 2. 388. 18. *

Habitat in America. Mus. Dr. Hunter.

hungaricus

31. A. villosus, ater, thorace elytrisque rubris: sutura atra. Ent. fyft. 2. 388. 19. *

Curculio hungaricus. Herbff. Arch. t. 24. f. 10.

Habitat in Hungaria.

aequatus.

32. A. cupreo-niger, elytris rubris. Ent. fyft. 2. 388. 20. *

Curculio aequatus. Linn. fyft. Nat. 2. 607. 9.

Payk. Monogr. 135. 126.

Fn. Sv. 3. 173. 6.

Panz. Fn. Germ. 20. tab. 8.

Geoff. Inf. 1. 270. 4.

Habitat in Europae Salice.

Variat duplo minor, scutello futuraque nigris, distinctus?

3. *A. ater*, elytrorum striis simplicissimis, femori-~~femorialis~~
bus rufis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.

Maior *A. aequato*. Rostrum elongatum, incur-
uum, atrum. Thorax antice attenuatus, laevis,
ater, immaculatus. Elytra striis laevissimis,
atra. Pedes atrii, femoribus rufis.

4. *A. violaceus*, nitens, thorace elytrisque testaceis. coeruleocephalus.

Ent. syst. 2. 389. 21. *

Herbst. Arch. tab. 24. fig. 11.

Act. Hallenf. 1. 282.

Vlll. 93.

Habitat in Saxoniae Crataego. Dom. Hybner.

5. *A. obscure-aeneus*, subtus obscurior. Ent. syst. cupreus.

2. 389. 22.

Curculio cupreus. Linn. syst. Nat. 2. 608. 21.

Fn. Sv. 593.

Payk. Monogr. 134. 125.

II 50

Fn. Sv. 3. 173. 5.

Habitat in Europae borealis hortis.

6. *A. coeruleus*, immaculatus, antennis tibiisque *coeruleus*,
fuscis. Ent. syst. suppl. 162. 22. *

Habitat in Germania. D. Daldorff.

7. *A. niger*, elytris aeneis. Ent. syst. 2. 389. 23. * *aeneus*.

Curculio aeneus. Payk. Monogr. 142. 134.

Attelabus aeneus. - Fn. Sv. 3. 179. 14. II 50

Habitat in Hyssopo officinali Europae borealis.

8. *A. niger*, obscurus, elytris striatis, cyaneis. Ent. tristis.
syst. suppl. 163. 23. *

Habitat in Germania. Dom. Schneider.

9. *A. obscurus*, elytris striatis, cinereis: fascia *la-fellatus*.
ta, media atra. Ent. syst. suppl. 163. 23. *

Habitat in Borussia. Dom. Schneider.

- fuscirostris* 40. *A. griseus*, pedibus rufis, rostro femoribusque basi nigris. Ent. syst. 2. 389. 24. *
Habitat in Germania. Dom. de Hattorff.
- cuprirostris* 41. *A. viridi-aeneus*, elytris striatis, rostro cupreo
Ent. syst. 2. 389. 25. *
VIII. 24. *Curculio viridi-sericeus*. Geoff. Inf. 1.
Habitat in Saxoniae Betula. Dom. Zschuck.
- apustulatus* 42. *A. ater*, thorace scabro: puncto antico, elytri striatis: maculis duabus rufis.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.
Paruus. Caput atrum. Thorax rotundatus, scaber, ater, puncto in medio marginis antici obscure rufo. Elytra striata, atra, maculis duabus obscure rufis.
- rufirostris* 43. *A. niger*, rostro dimidiato pedibusque rufis. Ent. syst. 2. 390. 26. *
Habitat in Anglia. Mus. D. Banks.
- nigrirostris* 44. *A. oinereus*, rostro arcuato, atro, pedibus testaceis. Ent. syst. suppl. 163. 26. *
Habitat in floribus Onobrychis prope Tanger. D. Schoushoe. Mus. D. Lund.
- atrirrostris* 45. *A. niger*, obscurus, rostro atro nitido, pedibus testaceis.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.
Minutus. Rostrum elongatum, arcuatum, atrum nitidum. Thorax, elytra, corpus nigra, obscura. Pedes rufi.
- Crotalariae* 46. *A. ater*, capitis vertice impresso, thorace vtrinque retuso.
Habitat in Crotalariae leguminibus Americae Mus. D. Lund.
Praecedentibus maior, totus ater, parum nitidus. Capitis vertex parum impressus. Rostrum elongatum.

gatum, cylindricum, incurvum. Thorax margine exteriori, antice retusus, laevis, ater. Elytra striata. Pedes inermes, atri.

47. A. pubescens, cyaneus, elytris striatis. Ent. syst. *Alliariae*.

2. 390. 27.

Curculio Alliariae. Linn. syst. Nat. 2. 506. 4.

Fn. Sv. 580.

Ersh. Inf. 9. 35. tab. 78.

Degeer Inf. 5. 251. 39.

Payk. Fn. Sv. 3. 175. 8.

Habitat in Eryfimo *Alliaria*.

48. A. niger, obscurus, elytris striatis, obscure coeruleis, rostro basi compresso, apice subulato. *Pomoniae*.

Ent. syst. suppl. 164. 27. *

Curculio ruficornis. Herbst. Col. tab. 112. f. 8.
at antennae in nostris vix rufae.

Habitat in Kiliae *Pomona*.

49. A. ater, nitidus, elytris striatis, rostro elongato apice depresso. *planirostris*.

Habitat in Germania. D. Smidt.

Paullo maior A. *Craccae*. Antennae moniliformes, extrorsum crassiores. Rostrum elongatum, apice dilatatum, depressum. Elytra striata. Corpus atrum.

50. A. ater, rostro porrecto cylindrico, elytris striatis globosis. *Pisi*.

Habitat in Austria. Dom. de Meyerle.

Paullo maior A. *Craccae*, totus ater. Rostrum porrectum, arcuatum, cylindricum. Elytra striata, globosa, atra. Pedes inermes.

51. A. niger, obscurus, elytris striatis, obscure coeruleis, rostro apice depresso. Ent. syst. 2. 390. *Craccae*.

28. *

Curculio Craccae. Linn. syst. Nat. 2. 506. 6.

Payk.

Payk. Monogr. 140. 131.

- Fn. Sv. 3. 177. 11.

Degeer Inf. 5. 253. 83. tab. 6. fig. 31. 32.

Habitat in Holfatiae hortis.

Sorbi.

52. *A. ater*, elytris friatis, obscure coerulescentibus, rostro arcuato, longitudine corporis. Ent. syst. 2. 390. 29. *

Curculio laeuigatus. Payk. Monogr. 141. 138.

H. 51.

- Fn. Sv. 3. 178. 12.

Habitat in Germaniae arboribus.

cyaneus.

53. *A. ater*, elytris cyaneis nitidulis. Ent. syst. 2. 391. 30. *

Curculio cyaneus. Linn. syst. Nat. 2. 506. 5. Fn.

H. 51.

Sv. 581.

Herbst. Arch. tab. 24. fig. 5.

Habitat in Europae Malua.

globosus.

54. *A. gibbus*, supra ater, subtus cinereus. Ent. syst. 2. 391. 31. *

Curculio Hypoleucos. Payk. Monogr. 75. 72.

IV. 15

Quenz. Diff. Inf. 16.

Panz. Fn. Germ. 57. tab. 10.

Habitat in Europae arena.

ovatus.

55. *A. ovatus*, gibbus, cyaneus; nitidus, elytris abbreviatis friatis.

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Statura parua *A. globosi*. Caput cyaneum, rostro breui, atro, antennarum articulis tribus ultimis incrassatis. Thorax planus, punctatus, cyaneus. Elytra abdomine breuiora, crenato-friata, cyanea, nitida. Corpus cyaneum.

Malua.

56. *A. griseus*, elytris pedibusque testaceis. Ent. syst. 2. 391. 32. *

Curculio Pineti Payk. Monogr. 61. 58.

Habitat in Angliae Malua.

57. *A. ater*, femoribus luteis. Ent. syst. 2. 391. 34. *flauipes*.

Curculio flauipes. Payk. Monogr. 143. 135.

Geoff. Inf. 1. 272. 8.

II. 51.

Habitat primo vere frequens in locis apricis, calidis.

58. *A. ater*, antennis pedibusque flauis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.

D. Lund.

flauicornis

Statura parua, *A. flauipedis*. Rostrum elongatum, cylindricum, incuruum. Thorax antice attenuatus, niger. Elytra striata. Antennae et pedes omnes flaua.

59. *A. sanguineus*, elytris crenato-striatis. Ent. syst. *frumentarius*.

2. 392. 35.

Attelabus purpureus. Ent. syst. 2. 391. 34.

Curculio purpureus. Linn. syst. Nat. 2. 607. 14.

Fn. Sv. 585.

Curculio frumentarius. Linn. syst. Nat. 2. 608.

15. Fn. Sv. 586.

Rhinomacer frumentarius. Ent. Helv. 1. 108.

1. tab. 13. fig. 1. 2.

Payk. Monogr. 139. 130.

II. 52.

- Fn. Sv. 3. 177. 10.

Act. Holm. 1750. 186. 1.

Leuwenh. Arc. 183. Aug. 6. 83. fig. 3.

Degeer Inf. 5. 251. 48.

Habitat in frumento diutius afferuato.

60. *A. nigricans*, elytris cinereis: fasciis duabus *vernalis*.

nigris, pedibus rufis. Ent. syst. 2. 392. 36. *

Curculio vernalis. Payk. Monogr. 138. 129.

- Fn. Sv. 3. 183. 18.

Habitat in Holfatiae Vrticae, primo vere.

61. *A. pedibus saltatoriis*, corpore atro. Ent. syst. 2. *Betulae*.

392. 37. Linn. syst. Nat. 2. 620. 7. Fn. Sv.

640.

II. 52

Cur-

Curculio Betulae. Payk. Monogr. 127. 120.

Degeer Inf. 5. 209. 47.

Habitat in Betulae foliis frequens, quae rodendo pulcre crispa reddit.

157. RHINOMACER. *Palpi* extrorsum crassiores: articulo ultimo truncato.

Antennae setaceae, rostro infidentes.

varius.

1. *R. nigro alboque varius*. Ent. syst. suppl. 164. 1. Habitat ad Cap. Bon. Spei. D. Weber.

curculioi-
des.

2. *R. villoso-griseus*, antennis pedibusque nigris. Ent. syst. 2. 393. 1. *

Mycterus griseus. Ent. Helv. 1. 124. 1. tab. 16. fig. 1. 2. 3.

I. 48

Panz. Fn Germ. 12. tab. 8.

Curculio Rbinomacer. Payk. Monogr. 126. 119.

Anthribus Rhinomacer. Payk. Fn. Sv. 3. 166. 8.

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

attelaboi-
des.

3. *R. villoso-piceus*, antennis pedibusque testaceis. Ent. syst. 2. 393. 2. *

Curculio Rbinomacer. Payk. Monogr. 126. 119. β.

Anthribus Rbinomacer. Payk. Fn. Sv. 3. 166. 8. β.

Habitat in Sueciae plantis. D. de Paykull.

Va-

Rhinomacri corpus paruum, ovatum, villosum, immarginatum, tardum; capite inserto, ovato, antice rostro brevi, pluriusculo: oculis globosis, marginalibus; antennis longitudine thoracis in medio rostri insertis; thorace ovato; scutello rotundato: elytris rigidis, fornicatis, longitudine abdominalis; pedibus longiusculis, tenuibus; tarsis quadriarticulatis; colore obscuro, minime nitido.

Varietas praecedentis testa D. de Paykull.

4. *R. villosus*, ater, elytris fuscis.

Habitat in Austria. D. de Meyerle.

Statura omnino praecedentium, at totus villosus, ater, elytris folis fuscis aut minus nigris.

lepturoides

X.

158. CALANDRA. *Mandibula* lata, fornicata, truncata.

Antennae claua truncata: articulo ultimo spongioso, retractili.

1. *C. thorace* elytrisque scabris, antennis apice albis. *gigas*.

Cyrculio gigas. Ent. syst. 2. 394. 1. *

Oliv. Inf. 83. tab. 12. fig. 146.

Habitat in Iaponia. Mus. Britann.

2. *C. obscura*, rostro apice spina eleuata, compressa. *ferrirostris*

Oliv. Inf. 83. tab. 17. fig. 211.

Drury Inf. 2. tab. 33. fig. 3?

Habitat in Iaua. Mus. D. de Sehestedt.

Maior *C. palmarum*. Rostrum porrectum, rectum, dorso apice ferratum, dente eleuato, compresso.

Antennae claua truncata, nigra. Thorax laeuis, obscure rufus, lineis duabus magnis dorsalibus abbreviatis, atris. Elytra substriata, obscura, immaculata. Corpus atrum, femoribus tibisque omnibus interne pilis aureis ciliatis.

3.

Calandrae corpus ovatum, planum, glabrum, immarginatum, tardum; capite paruo, gibbo, inserto, antice producto in rostrum subcompressum; oculis magnis, oblongis, lateralibus; antennis longitudine thoracis, in forma oblonga ante rostri basin insertis; thorace plano, antice annulari caput arcu contingente, postice rotundato; elytris rigidis, planis, fornicatis, abdomine breuioribus; pedibus breuibibus, compressis, validis; tarsis quadriarticulatis; colore vario, obscuro.

Palmarum.

3. *C. atra*, elytris abbreviatis friatis.
Curculio Palmarum. Ent. syst. 2. 395. 2.
 Linn. syst. Nat. 2. 506. 1. Mus. Lud. Vlr. 42.
 Oliv. Inf. 2. 83. tab. 2. fig. 16.
 Degeer Inf. 5. tab. 15. fig. 26.
 Rumph. Amb. 1. 79. tab. 17. fig. 9.
 Petiv. Gazoph. tab. 35. fig. 5.
 Gronov. Zooph. 578. tab. 16. fig. 4.
 Mer. Surin. tab. 48. fig. 3.
 Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 20.
 Habitat in Indiae Palmis.

Phoenicis. 4. *C. atra*, rostro antice, elytrorum margine pedibusque anticis rufo-ciliatis.

Habitat in Guinea. D. Meier. Mus. D. Lund.
 Statura et summa affinitas *C. Palmarum*. Rostrum subcompressum, antice crista parva e pilis erectis ferrugineis. Thorax planus, laevis, postice rotundatus, at minus dilatatus, ater, lineis duabus obsoletis, rubris. Elytra striata, abdomine breuiora, margine exteriori rufo ciliata. Corpus atrum, pedibus quatuor anticis dense rufis ciliatis.

Borassi.

5. *C. atra*, nitida, rostro apice vtrinque reflexo, pedibus ciliatis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Seheffedt.

Statura et magnitudo omnino *C. longipedis*, et totus ater, immaculatus, nitidus. Rostrum subcompressum, apice vtrinque reflexum. Thorax planus, laevis, ater, immaculatus, nitidus, postice rotundatus. Elytra abdomine breuiora, striata. Pedes atri, subtus pilis nigris ciliati, tibus apice spina acuta.

eruentata. 6. *C. atra*, thorace lineis, elytris punctis duobus ferrugineis.

Cur.

Curculio cruentatus. Ent. syst. 2. 395. 3. *

Oliv. Inf. 33. tab. 12. fig. 147.

Habitat in Carolina. Mus. D. Banks.

6. *C. nigricans*, elytris ferrugineis, rostro apice *longipes*.
vtrinque reflexo, pedibus anticis elongatis.

Curculio longipes. Ent. syst. 2. 395. 4. *

Oliv. Inf. 83. tab. 15. fig. 191.

Voet. Col. 2. tab. 86. fig. 10.

Habitat in China. Mus. D. Lee.

Variat sexu, rostri dorso ferrato.

8. *C. atra*, thorace elytrisq[ue] fuscis, rostro apice *berox*.
vtrinque reflexo.

Habitat in Sumatra. D. Daldorff.

Maximus in hoc genere et affinis *C. Colosso*. Caput laeve, atrum, rostro compresso, apice vtrinque reflexo. Thorax planus, obscurus. Elytra vix striata, fusca. Corpus atrum.

9. *C. nigricans*, elytris brunneis aut cinereis, pedibus elongatis. *Colossus*.

Curculio Colossus. Ent. syst. 2. 396. 5. *

Oliv. Inf. 83. tab. 3. fig. 32.

Voet. Col. 2. tab. 36. fig. 9.

Habitat in India orientali.

10. *C. atra*, thorace subovato, excavato, punctato, *Indus*.
elytris rugoso-fulcatis, tibiis spinosis.

Curculio Indus. Ent. syst. 2. 396. 6.

Linn. syst. Nat. 2. 506. 2. Mus. Lud. Vlr. 43.

Degeer Inf. 5. 45. 22.

Habitat in India.

11. *C. supra cinerea*, nigro-irrorata, elytris maculis *punctata*.
duabus nigris.

Habitat in Sumatra. D. Daldorff.

Statura omnino *C. hemipterae*, at paullo maior.

Antennae atrae, clava ovata, compressa, apice alba. Rostrum breve, atrum, dorso baseos cinereum.

nereum. Thorax planus, cinereus, atro varius. Elytra abbreviata, striata, cinerea, nigro parum irrorata, maculisque duabus distinctis nigris. Antus prominet cinereus, striga nigra pone apicem elytrorum. Corpus cinereum, medio atrum. Pedes nigri.

Guineensis 12. *C. grisea*, rostro bidentato, elytris subspinosis.
Curculio Guineensis. Ent. syst. suppl. 164. 6.
Habitat in Guinea. Mus. D. Lund.

discors. 13. *C. punctata*, cinerea, albo-lineata.
Habitat in Sumatra. D. Daldorff.
Triplø præcedenti minor. Antennæ longitudine rostri, cinereae: articulis aequalibus brevibus, cylindricis; ultimo maiori, ovato, fusco, apice albo ad basin rostri insertae. Rostrum basi crassius, cinereum, apice arcuatum, atrum. Thorax variolosus, cinereus, lineis tribus niveis. Scutellum nivenum. Elytra connata, variolosa, cinerea: vitta submarginali, strigam mediam obliquam, interne flexuosam exferente. Corpus cinereum, pedibus anticis longioribus.

granulata. 14. *C. obscura*, thorace noduloso, elytris punctato-striatis.
Habitat in Sumatra. D. Daldorff. Mus. D. de Sehestedt.

Statura et magnitudo omnino *C. guineensis*. Antennæ clava ovata, compressa, apice pallida. Thorax fuscus, nodulis elevatis, subacutis, inaequalis. Elytra obscura, punctato-striata. Pedes scabri, cinerei, antici parum elongati.

pavana. 15. *C. grisea*, thoracis dorso fusco: arcubus cinereis, rostro bifurcato.
Curculio pavana. Ent. syst. 2. 396. 7. *
Habitat in Indiis. Dom. Torstenfön.

6. *C. obscure-purpurascens*, elytris abbreviatis, *fe-ferruginea*
moribus mediis ciliatis.

Curculio ferrugineus Ent. syst. 2. 396. 8.

Oliv. Inf. 83. tab. 2. fig. 16.

Sulz. Hist. Inf. tab. 4. fig. 5.

Habitat in Brasilia.

In altero sexu rostri dorsum carinatum.

Instrumenta cibaria in hisce Curculionum generibus minutissima difficillime eruuntur, nec mihi adhuc satis faciunt.

Os porrectum, in rostrum elongatum, incuruum, corneum, cylindricum. Palpi haud obseruavi. Mandibulae latae, fornicatae, truncatae, dentatae. Maxilla brevissima, cornea, vti videtur, integra. Labium transuersum, corneum, breue, integrum. Antennae articulo secundo longissimo, reliquis aequalibus, sensim crassioribus, ultimo crassiori, compresso, apice spongioso, retractili, basi rostri insertae.

7. *C. atra*, thoracis dorso antennarumque claua *Scab.*
purpureis, femoribus omnibus ciliatis.

Oliv. Inf. 83. tab. 16. fig. 204.

Habitat in Sumatra. D. Daldorff.

Statura magna *C. ferrugineae*, cuius forte mera varietas. Rostrum cylindricum, atrum, ante apicem pilis rufis ciliatum. Antennae atrae, claua purpurea, apice truncata, cinerascens. Thorax laeuis, ater, obscurus, dorso purpurascens. Elytra abbreviata, striata, atra. Corpus atrum, abdomine macula media baseos sanguinea. Pedes atri, femoribus tibiisque intus pilis ferrugineis, ciliatis.

8. *C. obscure-purpurascens*, elytris abbreviatis, *bemiptera*.
maculatis.

Curculio bemipterus. Ent. syst. 2. 396. 9. *

T. II.

E e

Linn.

- Linn. fyft. Nat. 2. 506. 3. Muf. Lud. Ulr. 44.
Oliv. Inf. 83. tab. 1. fig. 1.
Degeer Inf. 5. tab. 15. fig. 25.
Habitat in Cayenna. Muf. D. Olivier.
- cribraria.* 19. *C. nigra*, thorace elytrisque purpureis, nigro-punctatis.
Curculio cribarius. Ent. fyft. suppl. 165. 9. *
Habitat in America boreali. Dom. Mauerhoff.
- variegata.* 20. *C. rufo nigroque varia*, roftro apice nigro.
Curculio variegatus. Ent. fyft. 2. 397. 10. *
Oliv. Inf. 83. tab. 13. fig. 158.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Muf. D. Lee.
- melanocardia.* 21. *C. cinerea*, coleoptris macula commune cordata fusca.
Curculio melanocardius. Ent. fyft. 2. 397. 11. *
Linn. fyft. Nat. 2. 608. 18. Muf. Lud. Ulr. 45.
Sulz. Hift. Inf. tab. 4. fig. 11.
Habitat in India.
- limbata.* 22. *C. nigricans*, thoracis elytrorumque margine rufo.
Curculio limbatus. Ent. fyft. 2. 397. 12. *
Oliv. Inf. 83. tab. 2. fig. 22.
Habitat in Senegallia.
- cruciata.* 23. *C. nigra*, thorace fubfpinofa: lineis elytris poftice cruce albis.
Curculio cruciatus. Ent. fyft. 2. 397. 13. *
Oliv. Inf. 83. tab. 11. fig. 131.
Habitat in noua Hollandia. Muf. D. Banks.
- sanguinolenta.* 24. *C. atra*, elytris fascia, bafeos fanguinea.
Curculio sanguinolentus. Ent. fyft. 2. 398. 14. *
Oliv. Inf. 83. tab. 10. fig. 118.
Habitat in Infula Tabago Americae. Dom. Lee.
- fasciata.* 25. *C. atra*, elytris ftriatis: fascia media fanguinea.

Cm.

Curculio fasciatus. Ent. syst. 2. 398. 15. *

Oliv. Inf. 83. tab. 11. fig. 136.

Habitat - - - Mus. Dom. Francillon.

6. *C. laevis, atra, nitida, elytris maculis duabus* *apustulata*.
rufis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Statura et magnitudo praecedentium. Rostrum
elongatum, arcuatum, atrum. Thorax laeuissi-
mus, ater, nitidus, immaculatus. Elytra lae-
uissima, apice parum striata, atra, maculis dua-
bus rufis. Corpus atrum.

7. *C. plana, atra, nitida, elytris striatis, femoribus* *planicollis*.
rufis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.

Statura et magnitudo praecedentis. Rostrum elon-
gatum, arcuatum, atrum. Thorax planus, mar-
gine vtrinque rotundato. Elytra striata, apice
declivata. Pedes nigri, femoribus rubris.

8. *C. glabra, nitida, rostro arcuato.*

coruina.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Tota atra, nitidissima, immaculata.

9. *C. nigra, obscura, thorace subpunctato, elytris* *necydaloi-*
des.
striato-punctatis.

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Statura omnino *C. abbreviatae*, at distincta et alia.

Caput atrum, nitidum, rostro incurvo. Thorax
niger, obscurus, vix punctatus. Elytra abdo-
mine breviora, striato-punctata.

10. *C. cinerea, capite atro.*

melanoce-
pbala.

Habitat in Carolina. Mus. Dom. Bosc.

Paullo minor *C. abbreviata*. Caput atrum. Thorax et elytra laevia, cinerea, fere immaculata. Corpus et pedes atra.

abbreviata 31. *C. atra*, thorace punctato, elytris substriatis.
Curculio abbreviatus. Ent. syst. 2. 403. 37.*
Calandra abbreviata. Ent. Helv. 1. 64. 2. tab.
 2. fig. 3. 4.

Panz. Fn. Germ. 42. tab. 3.

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

liturata. 32. *C. nigra*, obscura, elytris subtuberculatis: liturae baseos rufa.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Media. Rostrum arcuatum, atrum. Thorax planus, pubescens, niger, obscurus. Elytra tuberculis plurimis, elevatis, obsolete, inaequalibus nigra, obscura, litura sinuata, baseos rufa.

signata. 33. *C. atra*, nitida, elytris striatis: lineola baseos abdomine maculis albis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Statura omnino *C. nitentis*. Rostrum arcuatum, atrum. Caput et thorax antice attenuatus, atra nitida, immaculata. Elytra striata, lineola parva baseos ad futuram alba. Corpus atrum, maculis aliquot albis ad basin abdominis.

porculus. 34. *C. atra*, thorace elytrisque obscuris, griseo-punctatis.

Curculio porculus. Ent. syst. suppl. 166. 36.*

Habitat Halae Saxonum.

nitens. 35. *C. atra*, nitida, thorace plano, laevi, elytris striatis, longitudine abdominis.

Curculio nitens. Ent. syst. 2. 403. 38.*

Habitat in Gallia meridionali.

Distincta omnino a *C. cornina*, duplo minor.

6. *C. nigra*, thorace varioloso, elytris striatis, albo-*viduata*.
irroratis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.

Magnitudo praecedentis. Rostrum longum, arcua-
tum, laeve. Thorax niger, obscurus, variolosus
lineaque dorsali eleuata. Elytra crenato-stria-
ta, nigra, atomis obsoletis, albidis, irrorata.
Pedes nigri, obscuri.

17. *C. atra*, nitida, elytris striatis: lineola postica *carbonaria*
alba.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Rostrum longum, arcuatum. Thorax laeuissimus,
ater, nitidus. Elytra abdomen omnino tegan-
tia, striata, atra, ante apicem lineola parua, al-
ba. Corpus atrum.

18. *C. plana*, atra, thorace punctato, elytris striatis. *Saba*.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.

Praecedentibus affinis, at minor. Rostrum longum,
incuruum. Thorax planus, punctatus, ater.
Elytra striata.

19. *C. picea*, thorace punctato, longitudine ely-*granaria*.
trorum.

Curculio granarius. Ent. syst. 2. 414. 88.

Calandra granaria. Ent. Helv. 1. 62. 1. tab. 2.
fig. 1. 2.

Linn. syst. Nat. 2. 608. 16. Fn. Sv. 587.

Geoff. Inf. 1. 255. 18.

Payk. Monogr. 54. 51.

Panz. Fn. Germ. 17. tab. 11.

Joblot. Obs. Microsc. 1754. tab. 7. fig. 1.

II. 55.

Degeer

Degeer Inf. 5. 239. 25.

Habitat in Europae granariis, frumentorum grana exedens. Pellitur Isatide, Hyofcyamo, Sambuco, Thlafpide.

Fruventi. 40. *C. nigra*, thorace punctato, ferrugineo, nigro maculato, elytris striatis: basi maculaque ferrugineis.

Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff.

Statura omnino *C. Oryzae*, at paullo maior. Antennae nigrae, claua ouata, apice niuea. Thorax elongatus, planus, punctatus, ferrugineus: macula media lunulaque magna baseos nigra. Elytra abbreviata, striata, nigra, macula magna baseos minorique media, ferrugineis. Corpus nigrum, abdominis basi pedibusque ferrugineis.

Oryzae. 41. *C. picea*, thorace punctato, longitudine elytrorum, elytris punctis duobus rufis.

Curculio Oryzae. Ent. syst. 2. 414. 89. *

Linn. Amoen. acad. 6. 395. 19.

Oliv. Inf. 83. tab. 8. fig. 81.

Habitat in *Oryza* saepius lecta inter grana a Oriente adportata.

tuberculata. 42. *C. ferruginea*, thorace longitudine elytrorum punctisque duobus dorsalibus, eleuatis.

Curculio tuberculatus. Ent. syst. 2. 414. 90. *

Oliv. Inf. 83. tab. 9. fig. 165.

Habitat in noua Zelandia. Mus. D. Banks.

59. RHYNCHAENVS. *Palpi filiformes.*
Maxilla cylindrica,
vndentata.
Antennae clauatae:
articulo primo
longissimo, infi-
identes rostro e-
longato ante api-
cem.

* *femoribus simplicibus.*

- . R. niger, elytris holosericeis, striatis. *striatus.*
Curculio striatus. Ent. syst. 2. 398. 16. *
Curculio striatulus Oliv. Inf. 83. 140.
 Habitat in Insula Terre neuve. Mus. D. Banks.
- . B. ater, antennis apice griseis, femoribus fulcatis. *rubetra.*
Curculio rubetra. Ent. syst. 2. 398. 17. *
Curculio gagates. Oliv. Inf. 83. fig. 104.
 Habitat in Cayenna. Dom. v. Rohr.
- . R. gibbus, ater, glaber, nitidus, rostro subcom-*gagates.*
 presso, tibiis anticis vndentatis.
Curculio gagates. Ent. syst. 2. 398. 18. *
 Habitat in Cayenna. Dom. de Paykull.

4.

Rhynchaeni corpus oblongum, glabrum, immarginatum, tardum;
capite paruo, rotundato, inserto, antice producto in rostrum
 elongarum, cylindricum, vtrinque sulcatum ad receptionem
 secundi articuli antennarum; *oculis* magnis, oblongis, la-
 tentibus, ad basin rostri; *antennis* longitudine thoracis: ar-
 ticulo secundo longissimo, reliquis sensim crassioribus, vltimis
 tribus clauatis, claua acutiuscula, ante apicem rostri insertis;
thorace breui, rotundato; *scutello* minuto, saepe nullo; *ely-*
tris rigidis, fornicatis, inflexis, longitudine abdominis; *pe-*
didibus breuibus, validis, saepe dentatis; *tarsis* quadriarticula-
 tis; *colore* vario.

Characterem generis in generibus Insectorum dedi.

aeneus.

4. *R. viridi-aeneus*, thorace punctato, elytris striatis
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
Dom. Lund.

Statura et magnitudo *C. gagatis*. Corpus totum
viridi-aeneum. Capitis vertex parum impres-
sus. Thorax punctatus. Elytra striata.

mendicus.

5. *R. ouatus*, cinerascens, elytris striatis.
Curculio mendicus. Ent. syst. 2. 399. 19.
Oliv. Inf. 83. tab. 9. fig. 108.
Habitat in Insula Madagascar. Mus. Gall.

Pineti.

6. *R. niger*, elytris striatis, albo-maculatis.
Curculio Pineti. Ent. syst. 2. 399. 20.
Curculio confusus. Payk. Monogr. 35. 33.
Fn. Sv. 3. 223. 41.
Herbst. Col. 6. 293. 264. tab. 82. fig. 10.
Habitat in Europae Pino sylvestri frequens.

Pini.

7. *R. elytris rufescentibus*, fasciis nebulosis.
Curculio Pini. Ent. syst. 2. 399. 21.
Linn. syst. Nat. 2. 608. 19. Fn. Sv. 589.
Payk. Monogr. 36. 34.

Fn. Sv. 3. 225. 43.

Oliv. Inf. 83. tab. 4. fig. 42.

Panz. Fn. Germ. 42. tab. 1.

Degeer Inf. 5. 222. 15.

Frish. Inf. 11. tab. 23. fig. 5.

Schaeff. Icon. tab. 25. fig. 7.

Habitat in Sueciae Pino.

*Onopordi-
nis.*

8. *R. niger*, cinereo-villosus, rostro atro: vtrinque
sulco abbreviato baseos.

Curculio Onopordon. Ent. syst. 2. 399. 22. *

Habitat in Africae Onopordine. D. Prof. Vahl.

Vrsus.

9. *R. ferrugineo-fuscus*, albo-lineatus, rostro nigro

Curculio Vrsus. Ent. syst. 2. 399. 23. *

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

10. *R. niger*, cinereo-irroratus, elytris puncto ba-
feos distincto. Iaceae.

Curculio Iaceae. Ent. syst. 2. 400. 24. *

Geoff. Inf. 1. 281. 8.

Panz. Fn. Germ. 18. tab. 2.

II. 52

Habitat in Centaurea Iacea. Prof. Hermann.

11. *R. niger*, immaculatus, rostro cyllindrico, elytris *planus*.
friatus.

Curculio planus Ent. syst. 2. 400. 25. *

Habitat in Germania. D. Smidt,

12. *R. flauo fuscoque varius*, abdomine cinereo, ni-
gro-punctato. *punctula-*

Curculio punctatus. Ent. syst. 2. 400. 26. *

Habitat in America. Mus. D. Romani.

13. *R. nigro-virescens*, rostro ferrugineo: orbita *ocularis*.
oculorum niuea.

Curculio ocularis. Ent. syst. 2. 400. 27. *

Habitat in Barbaria. Mus. Dom. Desfontaines.

14. *R. niger*, virescenti-irroratus, rostro nigro, sub-
carinato. Cynarae.

Curculio Cynarae. Ent. syst. 2. 401. 28. *

Curculio Cardui. Ross. Fn. Etr. 1. III. 284.
tab. 5. fig. 11.

Panz. Naturf. 24. 18. 25. tab. 1. fig. 25.

Habitat in Cynarae floribus Africae. D. Vahl.

15. *R. griseus*, elytris puncto albo.

Curculio Colon. Ent. syst. 2. 401. 29.

Linn. Mant. 531.

Oliv. Inf. 83. tab. fig. 76.

Geoff. Inf. 1. 280. 6.

Herbst. Arch. tab. 24. fig. 1.

Ent. Helv. 1. 64. 3. tab. 7. fig. 1. 2.

Schaeff. Icon. tab. 25. fig. 9. tab. 62. fig. 10.

Payk. Monogr. 33. 32.

Colon.

IV. 68

Payk.

Payk. Fn. Sv. 3. 223. 42.

Panz. Fn. Germ. 42. tab. 2.

Habitat in Germaniae plantis.

- 2maculatus.* 16. R. fuscus, elytris puncto cinereo, rostro pedibusque atris.
Curculio 2maculatus. Ent. syst. 2. 401. 30. *
 Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.
- punctum.* 17. R. ater, elytris striatis: puncto medio albo, antennis pedibusque rubris.
Curculio punctum. Ent. syst. 2. 401. 31. *
 Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.
- ferratus.* 18. R. ferrugineus, thorace varioloso, elytris striatis: striis subferratis.
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.
 Statura praecedentium. Rostrum incuruum. Caput et thorax varioloso-punctata, brunnea. Elytra paullo pallidiora, striata, striis dentibus breuibus, acutis subferrata fulcisque punctatis.
- 2guttatus.* 19. R. niger, elytris puncto eleuato, abdomine pedibusque posticis flauis.
Curculio 2guttatus. Ent. syst. 2. 402. 32. *
 Habitat in America. Mus. Dr. Hunter.
- bilineatus.* 20. R. fuscus, elytris lineis duabus punctorum alborum.
Curculio bilineatus. Ent. syst. 2. 402. 33. *
 Habitat in Germania. D. de Hattorff.
- sordidus.* 21. R. niger, obscurus, immaculatus, elytris striatis.
Curculio sordidus. Ent. syst. 2. 402. 34. *
 Habitat in Americae meridionalis Insulis. Dr. Pflug.
- scillus.* 22. R. obscurus, thorace scabro, elytrorum striis pilosis.

Curculio fuillus. Ent. syst. 2. 402. 35. *

Habitat in Americae meridionalis Insulis. Dom. Smidt.

3. *R. cinereus*, elytris apice striis albis nigro - pun- *tessellatus.*
ctatis.

Curculio tessellatus. Ent. syst. 2. 403. 36. *

Habitat in Germania. D. de Hattorff.

4. *R. thorace laevi*, elytris muricatis, nigris: pun- *Equiseti.*
ctis duobus apiceque albis.

Curculio Equiseti. Ent. syst. 2. 403. 37. *

Curculio scaber. Linn. syst. Nat. 2. 609. 22.

Fn. Sv. 592.

Herbst. Arch. tab. 24. fig. 2.

Panz. Fn. Germ. 4. tab. 4.

Degeer Inf. 5. 224. 17.

Payk. Monogr. 39. 36.

Fn. Sv. 3. 226. 44.

Herbst. Col. 6. 287. 258. tab. 82. fig. 4.

Habitat in Angliae et Germaniae Equiseto aruensi.

5. *R. niger*, obscurus, thorace fasciculis duabus, ely- *fascicula-*
tris tribus eleuatis. *tus.*

Habitat in Amboina. D. Billardiere.

Statura *R. Equiseti*, at maior. Caput nigrum, rostro cylindrico, inflexo, basi parum ferrugineo-villoso. Thorax niger, obscurus, dorso plano, canaliculato, pari tuberculorum e pilis eleuatis, fasciculatis, nigris. Elytra subuariolosa, nigra, tuberculis tribus e pilis fasciculatis, vno pone alterum.

6. *R. niger*, obscurus, elytris granulatis, postice *granula-*
bispinosis. *tus.*

Habitat in Amboina. D. Billardiere.

Statura et magnitudo praecedentis. Rostrum in-
suraum, fuscum. Thorax punctis maioribus,
ele-

17. 68

elevatis, granulatis. Elytra granulata, postice spinis duabus elevatis, validis, vna pone alteram. Pedes inermes.

- dimidiatus*. 27. R. niger, elytris substriatis, rufis.
Curculio dimidiatus. Ent. syst. 2. 403. 40. *
 Oliv. Inf. 83. tab. I. fig. 5.
 Habitat - - -
- subspinosus*. 28. R. obscurus, thorace varioloso, elytris subspinosis.
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.
 Medius. Rostrum elongatum, fuscum. Thorax punctis variolosis confluentibus. Elytra spinis parvis, elevatis striata.
- palpebra*. 29. R. griseus, fusco-maculatus, thoracis marginem antico orbitaque oculorum elevatis.
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.
 Statura praecedentium. Rostrum elongatum, incurvum. Orbita oculorum elevata. Thorax rotundatus, villosus, testaceo parum maculatus: margine elevato. Elytra striata, villosa, grisea, testaceo parum maculata. Pedes grisei.
- Bufo*. 30. R. fuscus, elytris subreticulatis: fascia media alba.
Curculio Bufo. Ent. syst. 2. 404. 41. *
 Oliv. Inf. 83. fig. 118.
 Habitat in Sibiria. Mus. D. Banks.
- famulus*. 31. R. supra ferrugineus, thoracis dorso elytrorumque sutura inaequaliter atris.
Curculio famulus. Ent. syst. suppl. 165. 41.
 Habitat Tranquebariae. Mus. D. Lund.
- armillatus*. 32. R. ater, elytris cinereo-vadatis, tibiis posticis apice albis.

Habitat in Tanger. D. Scousboe. Mus. D. de Sehestedt.

Maior R. atrirostris. Rostrum cylindricum, incurvatum, atrum. Thorax punctatus, ater. Elytra striata, atra, strigis fasciisque plurimis, fere obsolete, cinereis vndata. Pedes inermes, femoribus quatuor posticis annulo baseos apice albis.

33. R. ater, thorace plano, elytris striatis, abdomine ferrugineo. *Musculus.*

Habitat in Sumatra. D. Daldorff.

Magnitudo R. atrirostris. Caput atrum, rostro arcuato, elongato, piceo. Antennae nigrae, clava cinerea. Thorax planus, laevis, ater, immaculatus. Elytra striata, nigra. Corpus nigrum, abdomine rufo. Pedes picei.

34. R. cinereus, rostro arcuato atro. *atrirrostris*

Curculio atrirostris. Ent. syst. 2. 404. 42. *

Payk. Monogr. 40. 37.

Fn Sv. 3 227. 45.

Habitat Lipsiae. Mus. D. Prof. Leske.

35. R. griseus, rostro pedibusque ferrugineis. *brunniro-*

Curculio brunnirostris. Ent. syst. 2. 404. 43. * *stris.*

Habitat in Daniae plantis. Mus. D. Lund.

36. R. supra ater, thorace lineis tribus, elytris vittis duabus albis. *4vittatus.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Medius. Rostrum valde elongatum, arcuatum, tenue, atrum. Thorax ater, lineis tribus luteis albidis. Elytra vix striata, atra, vittis duabus postice coeuntibus, albidis. Corpus cinereum, pedibus atris.

37. R. aeneo-nitidus, elytris basi angulo obtuso, *festivus.*
rostro, apice antennisque fuscis.

Cur-

- Curculio festiuus*. Ent. syst. 2. 404. 44.
Habitat in Surinamo.
- Tragiae*. 38. R. aeneus, rostro pedibusque subconcoloribus.
Curculio Tragiae. Ent. syst. 2. 404. 45.
Oliv. Inf. 83. fig. 112.
Habitat in Tragiae volubilis feminibus Brasiliae.
Mus. D. Banks.
- Chloris*. 39. R. thorace elytrisque obscure viridibus, corpore nigro.
Curculio Chloris. Ent. syst. suppl. 144. 46.
II. 64. Panz. Fn. Germ. 18. tab. 8.
Habitat in Germania. Dr. Panzer.
- curuiro-
stris*. 40. R. ater, nitidus, rostro arcuato.
Curculio curuirostris. Ent. syst. 2. 405. 47.*
Oliv. Inf. 83. fig. 115.
Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.
- Aethiops*. 41. R. ater, antennis tibiisque piceis, elytris oblongis striatis.
Curculio Aethiops. Ent. syst. 2. 405. 48.*
Payk. Monogr. 29. 46.
Fn. Sv. 3. 236. 54.
Herbst. Col. 6. 270. 241. tab. 80. fig. 10.
Habitat in Suecia. D. de Paykull.
- Rubi*. 42. R. niger, thorace antice angustato, elytris oblongis striatis.
Curculio Rubi. Herbst. Col. 6. 271. 242.
Habitat in Germaniae Rubo. D. de Meyerle.
Statura omnino R. Aethiopsis, at paullo minor.
Rostrum elongatum, tenue, cylindricum, atrum.
Thorax punctatus; niger, antice angustatus.
Scutellum paruum, cinereum. Elytra ovata striata, nigra. Pedes nigri.
- Scirpi*. 43. R. fuscus, elytris substriatis ferrugineo-irroratis.

Curculio Scirpi. Ent. syst. 2. 405. 49. *

Habitat in Galliae Scirpo. Mus. D. Bosc.

4. *R. ater*, nitidus, elytris striatis: puncto bascos *Vinea.*
vittaque media albis.

Habitat in Iaua. Mus. D. Billardiere.

Statura et magnitudo *R. Scirpi.* Antennae nigrae: articulo primo rufo. Caput nigrum, rostro elongato, incuruo. Thorax laeuis, ater, vtrinque linea albida. Elytra striata, abdomine breuiora, atra: puncto oblongo bascos vittaque media albis. Pedes nigri.

5. *R. ater*, antennis ferrugineis, thorace bituberculo-*Pruni.*
lato.

Curculio Pruni. Ent. syst. 2. 405. 50. *

Linn. syst. Nat. 2. 507. 12.

Payk. Monogr. 137. 128.

Fn. Sv. 3. 246. 45.

Herbst. Col. 6. 445. 443.

Habitat in Pruni Cerasi foliis.

6. *R. ater*, immaculatus, elytris crenato-striatis. *Armeniacae.*

Curculio Armeniacae. Ent. syst. 2. 405. 51.

Habitat Kiliae in Pruni foliis.

7. *R. fuscus*, thorace quadrituberculato, elytris *tuberculatus.*
striatis tuberculatisque.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Statura *R. Cameli.* Rostrum inflexum. Thorax margine antico parum reflexo tuberculisque quatuor in medio eleuatis: intermediis duobus maioribus, compressis. Elytra striata tuberculisque aliquot eleuatis, sparsis.

8. *R. fuscus*, thorace elytrisque tuberculatis, ro-*Camelus.*
stro apice rufo.

Curculio Camelus. Ent. syst. 2. 406. 52. *

Ha-

Habitat in Germaniae hortis. D. Smidt.

tubercu- 49. R. thorace quadrituberculato nigro, elytris striatis, cinereo-variegatis.

Curculio 4tuberculatus. Ent. syst. 2. 406. 53
Payk. Monogr. 71. 69.

Fn. Sv. 3. 258. 79.

Herbst. Col. 6. 409. 390. tab. 92. fig. 3.

Habitat in Europa boreali. D. Daldorff.

teter.

50. R. depressus, villosus, fuscus, rostro atro.

Curculio teter. Ent. syst. 2. 406. 54. *

III. 61. *Curculio Linariae*. Panz. Fn. Germ. 26. tab. 18

Habitat ad radices Antirrhini Linariae Italiae et Germaniae, Gallas excitans. Dr. Allioni.

Chamae-
ropis.

51. R. testaceus, capite thoracis macula pectoreaque nigris. Ent. syst. suppl. 164. 54 *

Habitat in floribus Chamaeropsis humilis Barbariae. D. Schousboe. Mus. D. Lund.

Campanu-
lae.

52. R. ovatus, niger, elytris striatis obtusis.

Curculio Campanulae Ent. syst. 2. 406. 55.
Linn. syst. Nat. 2. 506. 7.

Payk. Monogr. 28. 27.

Fn. Sv. 3. 212. 29.

Degeer Inf. 5. 236. 7.

Herbst. Col. 6. 161. 119. tab. 70. fig. 15.

Habitat in Campanulae rotundifoliae pericarpis.

nigriro-
stris.

53. R. viridis, rostro atro.

Curculio nigrirostris. Ent. syst. 2. 407. 56. *

Payk. Monogr. 56. 58.

Fn. Sv. 3. 247. 47.

Herbst. Col. 6. 281. 254.

Arch. tab. 24. fig. 3.

III. 60. Panz. Fn. Germ. 36. tab. 14.

Habitat in Anglia. Mus. D. Banks.

4. *R. subtestaceus*; thorace viridi-lineato, rostro *variabilis*.
apice fusco.

Curculio variabilis. Ent. syst. 2. 407. 57. *

Curculio nigrirostris. Payk. Monogr. 57. 53. β.

Fn. Sv. 3. 247. 47. β.

Herbst. Col. 6. 283. 254. tab. 81. fig. 12.

Habitat in Europa boreali. Dr. Schulz.

5. *R. oblongus*, niger, argenteo-holosericus, ro- *picrostris*.
stro dimidiato pedibusque piceis.

Curculio picrostris. Ent. syst. 2. 407. 58. *

Payk. Monogr. 63. 69.

Fn. Sv. 3. 253. 73.

Herbst. Col. 6. 446. 446.

Habitat in Trifolii capitulis.

6. *R. cinereus*, thorace elytrisque cinereo-viren- *Viscariae*.
tibus, rostro nigro.

Curculio Viscariae. Linn. syst. Nat. 2. 609. 27.

Fn. Sv. 598.

Payk. Fn. Sv. 3. 261. 82.

Habitat in floribus *Lychnidis Viscariae*.

Paruus. Rostrum elongatum, cylindricum, incur-
num, apice atrum. Thorax virescens. Elytra
virescentia, striata. Corpus cinereum.

7. *R. cinereus*, thorace elytrisque cinereo-virenti- *bifrons*.
bus, scutello niueo.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.

D. Lund.

Statura et magnitudo *R. Viscariae*. Caput cum
rostro longo, arcuato, atrum. Thorax puncta-
tus, elytraque striata, virescentia. Scutellum
album. Corpus cinereum, pedibus nigrican-
tibus.

8. *R. niger*, antennarum basi, coleoptrorum disco *Salicariae*.
tibusque testaceis.

T. II.

F f

Cur-

Curculio Salicariae. Ent. syst. 2. 407. 58. *
Payk. Monogr. 74. 48. β.

Fn. Sv. 3. 363. 85. β.

A. 52 Panz. Fn. Germ. 17. tab. 4.

Habitat in Lythro Salicaria Angliae.

floralis. 59. R. obscure griseus, elytrorum futura pallida.

Curculio floralis. Ent. syst. 2. 408. 59. *

Payk. Monogr. 77. 74.

Fn. Sv. 3. 266. 88.

Habitat in Pomonae floribus. Dom. de Paykull

Umbellae. 60. R. nigricans, elytris striatis, scutello albo.

Habitat in Carolina. Mus. Dom. Bosc.

Statura R. pericarpii, at maior et alius. Caput
grum. Thorax laevis, nigricans, immacu-
tus. Elytra parum pallidiora, striata: striis a-
te apicem coeuntibus. Scutellum album, at
tura elytris omnino concolor. Corpus cin-
reum, pedibus nigris.

Vulpeculus 61. R. supra niger, elytrorum futura corporeq
subtus brunneis.

Habitat in Carolina. Mus. Dom. Bosc.

Statura omnino R. pseudacori. Caput nigrum
apice retusum. Rostrum longum. arcuatu
nigrum. Thorax lineola abbreviata, media
feos alba. Elytra substriata, nigra, futura fe-
ruginea lineolisque duabus ad futuram base
albis. Corpus ferrugineo-villosum. Pedes
scuri.

Pseudacori 62. R. supra niger, thoracis lateribus ferrugine
elytris striatis: futura basi alba.

Curculio Pseudacori. Ent. syst. 2. 408. 61. *

A. 53 Panz. Fn. Germ. 17. tab. 5.

Habitat in Galliae Pseudacoro. Mus. Dom. Bosc.

scamicus. 63. R. testaceus, coleoptorum disco fusco: futu
alba.

Curculio scanicus. Payk. Monogr. 59. 56.

Payk. Fn. Sv. 3. 251. 70.

Habitat in Scania. Muf. D. Lund.

IX.

Minor R. pseudacori. Caput et thorax testacea, vertice nigro. Elytra striata, testacea, ad futuram fusca, futura ipsa, lunulisque aliquot indistinctis, albis. Pedes testacei.

64. R. ouatus, thorace tuberculato, coleoptris striatis: futura basi albida, pedibus rufis. *Castor*.

Curculio Castor. Ent. syst. 2. 408. 62. *

Habitat in Germania. D. Smidt.

65. R. subglobosus, nebulosus, elytrorum futura basi *pericarpus*.
alba.

Curculio pericarpus. Ent. syst. 2. 408. 63.

Linn. syst. Nat. 2. 609. 31. Fn. Sv. 602.

Panz. Fn. Germ. 42. tab. 5.

Herbst. Arch. tab. 24. fig. 4.

Coleopt. 6. 401. 381. tab. 91. fig. 12.

Payk. Monogr. 67. 65.

Fn. Sv. 3. 255. 75.

Habitat in Scrophulariis.

IV. 69

66. R. ater, thorace tuberculato, elytris striatis: *quercicola*.
futura basi alba, pedibus nigris.

Curculio quercicola. Ent. syst. 2. 408. 64. *

Payk. Monogr. 70. 68.

Fn. Sv. 3. 215. 33.

Herbst. Col. 6. 403. 383. tab. 91. fig. 13.

Habitat in Sueciae Quercu. Dom. de Paykull.

67. R. thorace bituberculato canaliculatoque, elytris *assimilis*.
striatis.

Curculio assimilis. Ent. syst. 2. 409. 65.

Panz. Fn. Germ. 42. tab. 6.

Payk. Monogr. 69. 67.

Fn. Sv. 3. 257. 77.

Habitat in Suecia. Dom. de Paykull.

IV. 69

Sisymbrii. 68. R. albo fuscoque varius, elytris puncto bascos eleuato, atro, rostro nigro.

Curculio Sisymbrii. Ent. syst. 2. 409. 66. *

II. 53 Panz. Fn. Germ. 17. tab. 6.

Payk. Monogr. 55. 52.

Fn. Sv. 3. 247. 66.

Herbst. Coleopt. 6. 159. 116. tab. 70. fig. 12.

Habitat in Sisymbrio amphibio Kiliae.

Capreae. 69. R. coleoptris fasciis duabus abbreviatis, albis.

Curculio Capreae. Ent. syst. 2. 409. 67. *

Habitat in Salice caprea Angliae. Mus. D. Banks.

2punctatus 70. R. villosus, cinereus, elytris macula media fusca.

Curculio 2punctatus. Ent. syst. 2. 409. 68.

Linn. syst. Nat. 2. 609. 28. Fn. Sv. 599.

Panz. Fn. Germ. 42. tab. 7.

Payk. Monogr. 58. 55.

Fn. Sv. 3. 250. 69.

Herbst. Coleopt. 6. 234. 198. tab. 77. fig. 2.

Habitat in Salicis floribus. Dom. de Paykull.

Carpini. 71. R. villosus, virescens, rostro nigro, pedibus testaceis.

Curculio Carpini. Ent. syst. 2. 409. 69.

Curculio Carpini. Knoch, Beytr. 1.

Habitat in Germaniae Carpino. Mus. D. de Sehestedt.

Erysimi. 72. R. niger, thorace bituberculato, virescente, elytris cyaneis.

Curculio Erysimi. Ent. syst. 2. 210. 70. *

II. 54. Panz. Fn. Germ. 17. tab. 7.

Payk. Monogr. 76. 73.

Fn. Sv. 3. 265. 87.

Herbst. Coleopt. 6. 407. 388. tab. 92. fig. 1.

Habitat Kiliae. D. Daldorff.

testaceus. 73. R. testaceus, rostro elongato arcuato.

Ha-

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.

Paruus, totus testaceus, immaculatus. Rostrum
elongatum, arcuatum, tenue. Elytra striata.

4. R. nigricans, coleoptris maculis quatuor albidis. *4maculatus.*

Curculio 4maculatus Ent. syst. 2. 410. 71.

Lim. syst. Nat. 2. 609. 29. Fn. Sv. 600.

Geoff. Inf. 1. 187. 22.

Habitat in Europae plantis.

5. R. supra fuscus, elytris fascia media fusca. *unifasciatus.*

Curculio unifasciatus Ent. syst. 2. 410. 72. *

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

6. R. ater, elytris fascia media abbreviata puncto-*Lytbri.*
que postico albis, pedibus flauis.

Curculio Lytbri. Ent. syst. 2. 410. 73. *

Cionus Lytbri. Ent. Helv. 1. 68. 2. tab. 3. fig.

3. 4.

Panz. Fn. Germ. 17. tab. 8.

Curculio pygmaeus. Herbst. Coleopt. 6. 142.

102. tab. 69. fig. 7.

Payk. Monogr. 74. 71.

Fn. Sv. 3. 264. 85.

Habitat in Lythri floribus Sueciae. Dom. de Pay-
kull.

7. R. obscurus, thorace tuberculato, elytris crena-*umbellatus.*
to - striatis, oculorum orbita eleuata.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Corpus paruum, breue, gibbum. Rostrum longum,
arcuatum, canaliculatum, orbita oculorum val-
de eleuata. Thorax obscure-griseus, linea me-
dia subcompressa tuberculoque vtrinque eleua-
to. Elytra breuia, crenato-striata. Pedes ni-
gri.

- 2fasciatus*. 78. *R. niger*, elytris fasciis duabus cinereis: bascos maiore vndata.
Curculio 2fasciatus. Ent. syst. 2. 410. 74. *
 Habitat Kiliae. Mus. Dom. Lund.
- acridulus*. 79. *R. niger*, antennis pedibusque piceis, abdomine ouato.
Curculio acridulus. Ent. syst. 2. 411. 75. *
 Linn. syst. Nat. 2. 507. 13. Fn. Sv. 584.
 Degeer Inf. 5. 235. 22.
 V. 70 Panz. Fn. Germ. 42. tab. 10.
 Herbst Arch. tab. 24. fig. 12.
 Coleopt. 6. 272. 244. tab. 81. fig. 1.
 Payk. Monogr. 50. 47.
 Fn. Sv. 3. 238. 56.
 Habitat in Europae floribus.
- subrufus*. 80. *R. testaceus*, thorace tuberculato, elytris striatis: strigis cinerascensibus.
Curculio subrufus. Herbst. Col. tab. 92. fig. 14.
 Habitat in Zelandiae Quercu. Mus. D. Lund.
 Statura parua praecedentium. Corpus totum testaceum, nunc magis, nunc minus pallidum: strigis aliquot elytrorum indistinctis, cinereis. Thorax vtrunque tuberculo eleuato.
- scabratus*. 81. *R. fuscus*, thorace tuberculato, elytris scabris, pedibus piceis.
Curculio scabratus. Ent. syst. 2. 411. 76.
 Habitat in Germania. D. Smidt.
- alauda*. 82. *R. supra ater*, thorace bituberculato margineque antico eleuato.
Curculio alauda. Ent. syst. 2. 411. 77. *
 V. 16 *Curculio affinis* Payk. Monogr. 68. 66.
 Habitat in Germania. Dom. Smidt.
- dorsalis*. 83. *R. elytris rubris, futura dimidiata, nigra*.
Curculio dorsalis. Ent. syst. 2. 411. 78. *

- Linn. syst. Nat. 2. 608. 17. Fn. Sv. 588.
 Panz. Fn. Germ. 17. tab. 9. *II. 54*
 Oliv. Inf. 83. fig. 169.
 Payk. Monogr. 14. 73.
 Habitat in Ranunculo ficaria.
4. *R. cinereus*, thoracis dorso fusco, elytris testaceis, cinereo-vndatis. *Quercus.*
Curculio Quercus. Ent. syst. 2. 412. 79. *
 Linn. syst. Nat. 2. 614. 59.
 Herbst. Col. 6. tab. 92. fig. 7.
 Payk. Monogr. 72. 70.
 Fn. Sv. 3. 262. 83.
 Habitat in Kiliae Quercu.
5. *R. fuscus*, elytris puncto strigisque duabus vndatis, albidis. *Tigris.*
 Habitat in America meridionali. Mus. D. de Sehestedt.
 Paruus. Rostrum minus elongatum, cinereum. Thorax obscurus, fuscus, linea dorsali cinerea. Elytra striata, fusca, macula baseos fasciisque duabus vndatis, cinereis. Apex parum albicat. Corpus cinereum.
6. *R. ouatus*, fuscus: linea longitudinali alba. *futuralis.*
Curculio futuralis. Ent. syst. 2. 412. 80. *
 Habitat in Germaniae Salice.
7. *R. ater*, thorace punctis duobus baseos, elytris futura punctisque sparsis albis. *Crux.*
Curculio Crux. Ent. syst. 2. 412. 81. * *II. 58*
 Habitat Hamburgi. Dr. Schulz.
8. *R. ater*, rostro apice plano, elytris striatis. *Lemnae.*
Curculio Lemnae. Ent. syst. 2. 412. 82. *
 Panz. Fn. Germ. 17. tab. 10. *II. 55*
 Herbst Col. 6. 453. 457.
 Payk. Monogr. 78. 75.
 Payk.

Payk. Fn. Sv. 3. 267. 89.

Habitat in Europae borealis Lemna. Dom. Prof.
Helwig.

*exclama-
tionis.*

89. R. ater, elytris puncto lineolaque apicis albis.
Curculio exclamationis. Ent. syst. 2. 412. 83.
Oliv. Inf. 83. fig. 167.

Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

venustus.

90. R. fuscus, thorace elytrisque albo-lineatis, pedibus testaceis.

Curculio venustus. Ent. syst. 2. 412. 84. *

II. 68. *Curculio albovittatus.* Herbft. Archiv.

Habitat in Anglia. Mus. D. Banks.

*Plantagi-
nis.*

91. R. elytris cinereis: macula media fusca.

Curculio Plantaginis. Ent. syst. 2. 415. 85. *

Degeer Inf. 5. 237. 24. tab. 7. fig. 17. 18.

Payk. Monogr. 44. 41.

Fn. Sv. 3. 231. 48.

Herbst. Col. 6. tab. 70. fig. 2.

Habitat Halae. Dom. Hybner.

Artemisiae 92. glaber, ater, thorace punctato, elytrorum frons simplicibus.

Curculio Artemisiae. Payk. Fn. Sv. 3. 237. 55.

II. 65. Herbft. Col. 6. tab. 76. fig. 5.

Habitat in Sueciae Artemisia.

Statura R. aethiopsis, at duplo minor. Thorax punctis latius impressus. Elytra striis laevibus.

Rumicis.

93. R. griseus, nigro-nebulosus, antennis fuscis.

Curculio Rumicis. Ent. syst. 2. 413. 86.

Linn. syst. Nat. 2. 613. 60. Fn. Sv. 390.

Degeer Inf. 5. 531. 20. tab. 7. fig. 10. 11.

Payk. Monogr. 43. 40.

IV. 74.

Fn. Sv. 3. 229. 47.

Habitat in Europae borealis Rumice.

14. *R. griseus*, thorace nigro, cinereo, lineato, elytris punctis nigris, tessellatis.

Curculio adpersus. Ent. syst. 2. 413. 87. *

Habitat Kiliae.

Affinis certe *R. Rumicis*, cuius forte mera varietas.

** *femoribus dentatis*.

15. *R. femoribus dentatis*, niger, elytris fusco-irroratis, tibiis anticis acute-dentatis. *calcaratus*.

Curculio calcaratus. Ent. syst. 2. 420. 114. *

Oliv. Inf. 83. tab. 15. fig. 186.

Habitat - - - Mus. Dom. Geoffroy.

16. *R. femoribus posticis dentatis*, niger, elytris vni-spinosis. *bidens*.

Curculio bidens. Ent. syst. 2. 420. 115. *

Oliv. Inf. 83. fig. 113.

Habitat in noua Zelandia. Mus. Dom. Banks.

17. *R. femoribus dentatis*, griseus, thorace elytris-que tuberculatis, rostro cornubus duobus arcuatis. *taurus*.

Curculio taurus. Ent. syst. 2. 421. 116. *

Oliv. Inf. 83. fig. 60.

Habitat Cayennae.

18. *R. femoribus dentatis*, thorace tuberculato, rostro vtrinque acute-spinoso. *cornutus*.

Curculio cornutus. Ent. syst. 2. 421. 117.

Oliv. Inf. 83. fig. 193.

Habitat Cayennae. Mus. Dom. Geoffroy.

19. *R. femoribus dentatis*, fuscis, thorace elytris-que tuberculis numerosis, atris. *miliaris*.

Curculio miliaris. Ent. syst. 2. 421. 118. *

Oliv. Inf. 83. fig. 83.

Habitat Cayennae. Mus. Dom. Bosc.

- cyanicollis*. 100. R. femoribus dentatis, oblongus, nigricans, thorace cyaneo: lateribus scabris, elytris striatis.
Curculio cyanicollis. Ent. syst. 2. 421. 119.
 Oliv. Inf. 83. fig. 121.
 Habitat - - - Mus. Dr. Hunter.
- Jamaicensis*. 101. R. femoribus dentatis, obscurus, scaber, thorace vtrinque fasciculato, tuberculato, elytris striatis.
Curculio Jamaicensis. Ent. syst. 2. 421. 120.
 Oliv. Inf. 83. tab. 4. fig. 44.
 Habitat in America meridionali. Mus. D. Banks.
- vaginalis*. 102. R. femoribus dentatis, ater, elytris tuberculatis acuminatisque: maculis duabus tomentoso-aureis.
Curculio vaginalis, longirostris, femoribus dentatis, elytris striatis: tuberculis sparsis, iuxta apicem mucronatis.
 Linn. syst. Nat. 2. 612. 51.
Curculio Senegalensis. Ent. syst. 2. 422. 121.
 Degeer Inf. 5. tab. 15. fig. 23.
 Habitat in America meridionali.
Mas cornubus duobus validis arcuatis, ad basia rostri.
- validus*. 103. R. femoribus anticis dentatis, oblongus, scaber, niger, tibiis anticis dentatis.
Curculio validus. Ent. syst. 2. 422. 122.
 Oliv. Inf. 83. fig. 186.
 Habitat in Cayenna.
- Vespertilio* 104. R. femoribus dentatis, niger, rostro plano, vtrinque dente obtuso, elytris tuberculatis.
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.
 Minor quam R. vaginalis. Rostrum atrum, plenum, in medio vtrinque dente valido, obtuso,
 de-

depresso, margineque a dente ad apicem reflexo. Thorax laevis, niger, obscurus. Elytra punctata, striata, striis tuberculis eleuatis, acutis, ferrata. Pedes atri, tarsis vtrinque auro ciliatis.

105. R. femoribus dentatis, niger, thorace antice *coronatus*.
Spinis ciliato, elytris striatis.

Curculio coronatus. Ent. syst. 2. 422. 123. *

Oliv. Inf. 83. fig. 70.

Habitat - - -

106. R. femoribus quatuor anticis dentatis, elytris *mucoreus*.
polline flavescentibus, supra apicem gibbosis.

Curculio mucoreus. Ent. syst. 2. 423. 124.

Linn. syst. Nat. 2. 612. 49. Mus. Lud. Vlr. 53.

Habitat in India orientali.

107. R. femoribus quatuor posticis dentatis, elytris *pufio*.
striatis nigris: linea repanda grisea.

Curculio pufio. Ent. syst. 2. 423. 125.

Linn. syst. Nat. 2. 612. 50. Mus. Lud. Vlr. 46.

Oliv. Inf. 83. tab. 16. fig. 206.

Habitat in India orientali.

108. R. femoribus dentatis, niger, thorace lineis *spinipes*.
duabus, elytris strigis quatuor albis, tibiis anticis spinosis.

Curculio spinipes. Ent. syst. 2. 423. 126. *

Habitat in Americae meridionalis Insulis. Mus.

Dr. Hunter.

109. R. femoribus dentatis, fusco-griseus, thorace *Rana*.
elytrisque vitta laterali flavescente.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.

D. de Sehestedt.

Corpus medium, supra planum, fusco-griseum, punctis paruis, eleuatis, numerosis, atris, scabrum, vitta laterali ab apice thoracis ad apicem ely-

elytrorum ducta flava. Rostrum elongatum, arcuatum, atrum, apice vtrinque parum dilatatum. Corpus subtus ferrugineo-villosum.

discoides. 110. R. femoribus dentatis, laevis, ater, thorace elytrisque vitta laterali flavescente.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Statura omnino praecedentis. Rostrum breve, compressum, atrum, antennarum clava cinerescens. Thorax planus, laevis, ater, vitta laterali flavescente, albo-marginata. Elytra laevia, atra: vitta lata laterali, quae ad apicem dilatatur, totum apicem occupat. Corpus atrum.

lineatus. 111. R. femoribus dentatis, ater, thorace elytrisque striatis: vitta laterali flavescente.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Statura R. Ranae, at duplo minor. Rostrum elongatum, atrum. Thorax ater, vittis duabus flavis. Elytra striata, atra: vitta media flava. Corpus atrum, vtrinque vitta communi, maculaque magna ad basin abdominis, flavis. Pedes atrii.

bombinus. 112. R. femoribus dentatis, ferrugineo-fuscus, elytris striatis: tuberculis elevatis atris.

Curculio bombinus. Ent. syst. 2. 423. 127. *
Oliv. Inf. 83. fig. 12.

Habitat in Cayenna. D. v. Rohr.

clausipes. 113. R. femoribus clauatis dentatis, scaber, nigro pallidoque varius, elytris postice tuberculatis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Medius. Rostrum elongatum, incurvum, atrum. Thorax punctis elevatis, atris scaber, fusco cinereoque

varius. Elytra punctis scabra, variegata, postice tuberculo obtuso. Pedes: obscuri, femoribus omnibus elongatis, clauatis, dentatis.

14. R. femoribus clauatis, dentatis, nigricans, elytris fuscis: macula media holosericea, atra. *testudo.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Statura et magnitudo praecedentis. Rostrum brevius, vtrinque sulco exaratum, nigricans, obscurum. Thorax scaber, niger, lateribus obscure brunneis. Elytra punctato-striata, fusca, macula media holosericea atra, apice parum acuminata. Femora valde elongata, clauata, dentata, postice compressa.

15. R. femoribus dentatis, scaber, nigro ferrugineoque varius, elytris punctis ocellaribus striatis. *chamaeleon.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Statura praecedentium. Rostrum elongatum, incuruum, atrum. Thorax scaber, ater, ferrugineo-varius. Elytra varia, striata, punctis impressis atris: pupilla parva ferruginea. Femora parum elongata, subclauata, dentata.

16. R. femoribus dentatis, fuscus, thorace lateribusque albis, elytris striatis: apice macula niuea, apice testaceis. *Draco.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Praecedentibus paullo minor. Rostrum breue cylindricum, obscure brunneum. Thorax scaber, obscurus, lateribus late albis. Elytra striata, obscura: macula magna lunata baseos niuea, apice late testacea. Pedes obscure ferruginei, femoribus clauatis, dentatis.

- Scorpio.* 117. R. femoribus dentatis, ater, thorace plano basi cinereo, coleoptris tuberculatis acuminatisque, medio cinereis.
Curculio Scorpio. Ent. syst. 2. 424. 128. *
 Oliv. Inf. 83. fig. 14.
 Habitat in Cayenna. D. v. Rohr.
- Chimaridis.* 118. R. femoribus posticis dentatis, niger, albo-maculatus, pedibus anticis longissimis.
Curculio Chimaridis. Ent. syst. 2. 424. 129.
 Oliv. Inf. 83. 130.
 Habitat in Americae meridionalis Chimaride cymosa. Dr. Isert.
- guttatus.* 119. R. femoribus subdentatis, niger, thorace maculis duabus baseos, elytris tuberculatis: punctis albidis.
Curculio guttatus. Ent. syst. 2. 424. 130. *
 Oliv. Inf. 83. tab. 5. fig. 45.
 Habitat in Cayenna.
- fascicularis.* 120. R. femoribus dentatis, niger, elytris fasciculato-pilosis, pedibus cinereo-variis.
Curculio fascicularis. Ent. syst. 2. 424. 131. *
 Oliv. Inf. 83. tab. 1. fig. 9.
 Habitat in Cayenna.
- Hystrix.* 121. R. femoribus dentatis, niger, elytris crenato-friatis: punctis duobus albis.
Curculio Hystrix. Ent. syst. 2. 425. 132. *
 Oliv. Inf. 83. tab. 15. fig. 182.
 Habitat in Cayenna. Mus. D. Geoffroy.
- marmoratus.* 122. R. femoribus dentatis, brunneus, albo-maculatus.
Curculio marmoratus. Ent. syst. 2. 425. 133. *
 Oliv. Inf. 83. tab. 13. fig. 153.
 Habitat in Cayenna.

123. R. femoribus dentatis, thorace carinato, ely-*scaber.*
tris sulcatis, tuberculato-spinosis.
Curculio scaber. Ent. syst. 2. 425. 134. *
Habitat in Cayenna. Dr. Mallet.
124. R. femoribus dentatis, thorace linea laterali, *3fasciatus.*
elytris albo-punctatis maculisque duabus
brunneis.
Curculio 3fasciatus. Ent. syst. 2. 425. 135. *
Habitat in Cayenna. Mus. Dr. Hunter.
125. R. femoribus dentatis, thorace scabro antice bi-*cylindriro-*
corni, elytris postice bituberculatis *stris.*
Curculio cylindrirostris. Ent. syst. 2. 426. 136.
Oliv. Inf. 83. fig. 128.
Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.
Thorax antice cornubus duobus, e fasciculis pilo-
rum eleuatorum, quae aetate pereunt.
126. R. femoribus dentatis, elytris macula magna *stigma.*
ferruginea.
Curculio stigma Ent. syst. 2. 426. 137. *
Curculio pudicus. Ent. syst. suppl. 165. 19.
Curculio piger. Ent. syst. suppl. 169. 160.
Linn. syst. Nat. 2. 612. 52. Mus. Lud. Vlr. 48.
Habitat in Indiis.
Variat futura baseos fasciaque media ferrugineis.
127. R. femoribus subdentatis, thorace scabro, ely-*bebes.*
ttis sulcatis tuberculatis, ore barbato.
Curculio bebes. Ent. syst. 2. 426. 138. *
Oliv. Inf. 83. fig. 144.
Habitat in Bengala. Mus. D. Banks.
128. R. femoribus dentatis, pallidus, thorace ely-*annulatus*
trisque strigis nigris.
Curculio annulatus. Ent. syst. 2. 426. 139. *
Linn. syst. Nat. 2. 613. 54. Mus. Lud. Vlr. 51.
Oliv.

Oliv. Inf. 83. fig. 62.

Habitat in India.

angulus.

129. *R. femoribus dentatis, niger, elytris vitta abbreviata, fasciaque postica cinereis, tibiis anticis compressis dentatis.*

Habitat in Sumatra. D. Daldorff. Mus. D. Lund.

Statura et magnitudo *R. Abietis*. Caput fuscum.

Thorax scaber, niger, immaculatus. Elytra punctato-fstriata, nigra, vitta cinerea, a basi ad fasciam ducta, fasciaque pone medium cinereis. Macula magna, cinerea, fere obsoleta, elytron terminat. Corpus cinereo-villosum. Pedes nigri, antici elongati, tibiis quatuor anticis compressis, acute dentatis.

Abietis.

130. *R. femoribus dentatis, niger, elytris fasciis linearibus, interruptis albis.*

Curculio Abietis. Ent. syst. 2. 428. 144. *

Linn. syst. Nat. 2. 613. 57. Fn. Sv. 615.

Degeer Inf. 5. 205. 1. tab. 6. fig. 11.

Panz. Fn. Germ. 42. tab. 14.

Schaeff. Icon. tab. 25. fig. 1.

Petiv. Gazoph. 14. tab. 8. fig. 9.

Habitat in Pini sylvestris cortice et resina.

1171.

Eripaceus.

131. *R. femoribus dentatis, niger, elytris albo-irroratis, tuberculisque duobus eleuatis pilosis, atris.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Magnitudo et statura *C. Abietis*. Rostrum inflexum, atrum. Thorax scaber, niger. Elytra fstriata, nigra, atomis numerosis albidis irrorata, tuberculis duobus eleuatis, e pilis fasciculatis, atris: altero baseos, altero ante apicem. Corpus obscurum.

carinatus. 132. *R. femoribus dentatis, obscurus, thorace carinato, elytris lineis, tribus carinatis.*

Habi-

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Praecedente minor. Rostrum arcuatum, atrum,
basi griseum. Thorax subscaber, obscurus: li-
nea media eleuata, connata. Elytra punctato-
striata, lineis tribus eleuatis, costatis. Pedes an-
tici elongati, tibiis incuruis.

33. R. femoribus dentatis, brunneo cinereoque va- *σ tubercu-*
riegatus, thorace tuberculis quatuor, elytris *latus.*
duobus baseos.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.

Minor. Rostrum inflexum, atrum. Thorax varie-
gatus, tuberculis quatuor eleuatis, dorsalibus,
obtusis. Elytra concolora, striata: striis subti-
lissime-ferratis, tuberculisque duobus baseos
eleuatis. Femora clauata, ferruginea, annulo
atro.

34. R. femoribus dentatis, ferrugineus, elytris *verruca.*
striatis: puncto medio albo.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Statura R. abietis. Rostrum obscurum, puncto ba-
seos obsoleto, albo. Thorax scaber, tuberculis
duobus paruis eleuatis. Elytra striata: striis
subferratis, obscure-brunnea: puncto paruo,
medio, albo.

35. R. femoribus dentatis, thorace albo, elytris ni- *dentipes.*
gris, albo-striatis, tibiis dentatis.

Curculio dentipes. Ent. syst. 2. 428. 145. *

Oliv. Inf. 83. tab. 8. fig. 90.

Habitat in Senegalliae Gossypio. Mus. Gallicum.

36. R. femoribus dentatis, niger, thorace elytrisque *multigut-*
albo - punctatis. *tatus.*

T. II.

Gg

Cur-

Curculio multiguttatus. Ent. syst. 2. 428. 146.
Oliv. Inf. 83. tab. 13. fig. 163.
Habitat in America meridionali.

pupillator. 137. R. femoribus dentatis, tuberculatis, fuscus, elytris macula marginali cinerea, nigro-punctatus.
Curculio pupillator. Ent. syst. 2. 428. 147.
Oliv. Inf. 83. tab. 15. fig. 183.
Habitat in Cayenna. Mus. Dom. Geoffroy.

Nexo. 138. R. femoribus dentatis, niger, fulvo-maculatus, pedibus anticis elongatis.
Habitat in Sumatra. D. Daldorff.
Rostrum cylindricum, nigrum. Thorax punctis elevatis scaber, obscurus, lineis duabus fulvis. Elytra punctato-striata, nigra: linea basica fascia media maculaque apicis fulvis. Pedes rufi, antici valde elongati, femoribus posticis subbidentatis.

porcatus. 139. R. femoribus dentatis, cinereus, thoracis elytrorumque dorso nigris, pedibus anticis posticisque elongatis.

Habitat in Sumatra. D. Daldorff.
Statura omnino praecedentis. Caput cinereum, rostro cylindrico, nigro. Thorax obscure-cinereus, dorso nigro. Elytra fulcata: fulcis punctatis, cinereis, a basi ad medium ad futuram nigris. Versus apicem tuberculum paruum, elevatum. Pedes antici posticique elongati, femoribus clauatis.

Lapatbi. 140. R. femoribus bidentatis, albo nigroque variis, thorace elytrisque muricatis.

Curculio Lapatbi. Ent. syst. 2. 429. 149. *
Linn. syst. Nat. 2. 608. 20. Fn. Sv. 591.
Oliv. Inf. 83. tab. 6. fig. 96.
Panz. Fn. Germ. 42. tab. 15.

17. 71.

Degeer

Degeer Inf. 5. 223. 16. tab. 7. fig. 1. 2.

Payk. Monogr. 37. 35.

Habitat in Europae Salice.

41. R. femoribus dentatis, obscurus, elytris lineo-*abdomina-*
lis eleuatis, apice atro-brunneis. *lis.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Statura et magnitudo R. Lapathi. Rostrum arcua-
tum, atrum, apice ferrugineum. Thorax rugo-
sus, niger, obscurus. Elytra nigra, lineolis bre-
uibus, eleuatis, ante apicem atra, apice brun-
nea. Corpus nigrum, ano brunneo. Pedes ci-
nereo-variegati.

42. R. femoribus dentatis, obscurus, albo-subma-*argula.*
culatus, elytris lineis eleuatis, plurimis, com-
pressis.

Habitat in Carolina. Mus. Dom. Bosc.

Statura et magnitudo R. Lapathi. Rostrum incur-
uum, fuscum. Thorax antice vtrinque impres-
sus, obscurus, lineis duabus, vndatis, albidis.
Elytra obscura, punctis aliquot baseos albis
maculaque pone medium communi brunnea, li-
neolisque plurimis breuibus, eleuatis, carinatis.
Pedes antici elongati, femoribus bidentatis.

43. R. femoribus dentatis, albus: supra fuscus, al-*irroratus.*
bo-maculatus, femoribus albo-annulatis.

Curculio irroratus. Ent. syst. 2. 429. 150.

Habitat in Cayenna. Dom. v. Rohr.

44. R. femoribus dentatis, griseus, elytris striis tri-*porculus.*
bus eleuatis: exterioribus abbreviatis.

Curculio porcatus. Panz. Fn. Germ.

Y. 17.

Habitat in Austria Dom. de Meyerle.

Magnitudo omnino R. Lapathi, at magis depressus.

Caput nigrum, rostro crassiusculo, vtrinque sul-

Gg 2

cato.

cato. Thorax subuariolosus, griseus. Elytra grisea: lineis tribus eleuatis: exterioribus ante apicem coeuntibus.

pilipes.

145. R. femoribus dentatis, cinereus, pedibus anticis elongatis: tibiis tarsisque ciliato-pilosis.

Habitat in Iana. Mus. Dom. Bosc.

Paullo maior R. statua. Caput cinereum, rostrum cylindrico, incuruo, nigro, apice subbiserrato. Thorax subpunctatus, cinereus. Elytra striata, cinerea, immaculata. Pedes antici elongati, femoribus in medio videntatis, tibiis tarsisque pilis densis, elongatis, subtus ciliatis, intermedii breues, postici elongati, femoribus clauatis.

statua.

146. R. femoribus dentatis, ater, elytris sulcatis macula communi alba, femoribus posticis elongatis.

Curculio statua. Ent. syst. 2. 430. 152.

Habitat - - - Mus. Dom. Bosc.

tricinctus.

147. R. femoribus dentatis, ater, thoracis lateribus elytrorumque fasciis tribus albis, pedibus anticis elongatis.

Curculio tricinctus. Ent. syst. 2. 430. 151.

Oliv. Inf. 83. tab. 6. fig. 61.

Habitat in Insula Guadeloupe. Dom. Badier.

tuberculatus.

148. R. femoribus dentatis, thorace quadrituberculato, elytris subspinosis: tuberculis tribus.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Medius. Caput cinereum. Thorax cinereus, in medio tuberculis quatuor eleuatis. Elytra striata, cinerea: striis spinis paruis, acutis, nigris subbiserrata. Praeterea tubercula tria eleuant obtusa ad futuram. Corpus cinereum.

49. *R. femoribus dentatis*, thōrace ferrugineo: *coecus*.
 ocellis duobus, elytris griseis, apice brunneis.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
 D. Lund.
Medius. Caput obscurum, rostro nigro. Thorax villosus, ferrugineus: maculis duabus ocellaribus, griseis. Elytra eleuato - striata, grisea, apice brunnea. Corpus brunneum.
50. *R. femoribus dentatis*, obscure - cinereus, elytris lineis eleuatis, compresso - carinatis. *Coluber.*
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
 D. de Sehestedt.
Medius et distinctus, lineolis elytrorum plurimis, eleuatis, valde compressis et fere carinatis.
51. *R. femoribus dentatis*, fuscus elytris lineis eleuatis, compressis, subspinosis. *Aspis.*
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
 D. de Sehestedt.
Statura et affinitas *R. Colubri*, at distinctus. Rostrum tenue, inflexum, nigrum. Thorax gibbus, scaber, fuscus: puncto baseos albo. Elytra fusca, lineis plurimis eleuatis, compresso - carinatis, subspinosis. Corpus fuscum, pectoris lateribus albidis.
52. *R. femoribus dentatis*, fuscus, thōrace tuberculo medio subbifido, elytris striatis tuberculatisque. *Cerastes.*
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
 D. Lund.
Corpus medium. Rostrum tenue, arcuatum, inflexum. Antennae subferrugineae, claua ouata. Thorax scaber, fuscus, tuberculo eleuato, subbifido in medio. Elytra striata, sulcis punctatis tuberculisque aliquot eleuatis, compressis. Femora clauata.

- baenor-*
boes. 153. R. femoribus dentatis, fuscus, elytris costatis,
femoribus posticis bidentatis.
Habitat in America meridionali, D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.
Statura præcedentium. Rostrum inflexum, atrum.
Thorax scaber, fuscus, linea dorsali elevata.
Elytra magis brunnea, fulcata: fulcis quatuor
et in his striae duae e punctis impressis. Femora
postica bidentata.
- 6guttatus.* 154. R. femoribus dentatis, niger, elytris maculis
tribus albis.
Curculio 6guttatus. Ent. syst. 2. 430. 153.*
Oliv. Inf. 83. tab. 14. fig. 170.
Drury Inf. 2. tab. 33. fig. 1. 2.
Habitat in America. Mus. D. Hunter.
- luridus.* 155. R. femoribus dentatis, ovatus, obscure-niger,
elytris punctato-striatis.
Curculio luridus. Ent. syst. 2. 431. 154.*
Oliv. Inf. 83. fig. 175.
Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.
- solidus.* 156. R. femoribus dentatis, fuscus, tibiis posticis in-
curvis, dentatis.
Curculio solidus. Ent. syst. 2. 431. 155.*
Oliv. Inf. 83. fig. 145.
Habitat ad Cap. Bon. Spei, Mus. D. Banks.
- mixtus.* 157. R. fuscus, cinereo-varius, elytris striatis: li-
turis duabus lateralibus, ferrugineis.
Habitat in Amboina. Dom. Billardiere.
Corpus cylindricum, colore cinereo fuscoque mix-
to. Thorax vix punctatus. Elytra striata, litu-
ris duabus ante medium fere marginalibus, fer-
rugineis. Femora acute-dentata.
- frigidus.* 158. R. femoribus dentatis, fuscus, elytris striatis
subtuberculatis, ferrugineo-varius,

Curculio frigidus. Ent. syst. 2. 431. 156. *

Curculio Cbinensis. Oliv. Inf. 83. tab. 8. fig. 97.

Habitat in Amboina. Dom. de Paykull.

59. R. femoribus dentatis, supra fuscus, thorace *pictus*.
elytrisque albo-striatis.

Curculio pictus. Ent. syst. suppl. 166. 157. *

Habitat in Tanger. Dom. Schousboe. Mus. D. de
Sehestedt.

60. R. femoribus dentatis, obscurus, thorace cly-^{set} *pilosus*.
trisque fasciculato-pilosis.

Habitat in Iaua. Mus. Dom. Bosc.

Statura omnino R. frigidi, at paullo minor. Caput nigrum. Thorax punctatus, obscurus: fasciculis pilosis, antice dnobus, in medio quatuor. Elytra striata, fasciculis pilorum plurimis, sparsis. Pedes obscuri.

61. R. femoribus dentatis, cinereus, rostro atro, *alienatus*.
elytris fulcato-punctatis.

Habitat in Sumatra. D. Daldorff.

Minor R. frigido. Rostrum arcuatum, inflexum, atrum. Thorax vix punctatus, obscure-cinereus, immaculatus. Elytra fulcata, fulcis punctatis. Pedes cinerei, femoribus dentatis.

62. R. femoribus dentatis, niger, elytris striatis, *Fabricii*.
ferrugineis: lineis posticis duabus albidis.

Curculio Fabricii. Ent. syst. suppl. 166. 157. *

Habitat Tranquebariae. D. Daldorff.

63. R. femoribus dentatis, niger, elytris excauato-*gibbus*.
punctatis: striga abbreviata, albida.

Curculio gibbus. Ent. syst. 2. 431. 157. *

Oliv. Inf. 83. tab. 8. fig. 88.

Habitat in Insula Bourbon. Mus. Gallicum.

64. R. femoribus dentatis, ater, nitidus, immacu-*globus*.
latus.

Ha-

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Statura brevis praecedentium, totus laevis, ater,
nitidus, elytra vix striata.

Ebenus. 165. R. femoribus dentatis, ater, nitidus, elytris tuberculatis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.

Affinis praecedenti, at paulo minor et alius, totus ater, nitidus, immaculatus. Thorax laevissimus, nitidissimus. Elytra nitida, tuberculis plurimis obsoletis inaequalia.

calidus. 166. R. obscure - aeneus, rostro atro, thorace rugoso, elytris punctato - striatis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Medius. Rostrum incurvum, striatum, atrum. Thorax rugosus, obscure - aeneus. Elytra punctato - striata, aenea. Corpus aeneum.

flavicornis 167. R. femoribus dentatis, thorace elytrisque tuberculatis, niger, elytris cinereo - fasciatis, antennis flavis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.

Rostrum incurvum, nigrum, antennis flavescens. Thorax tuberculatus, niger. Elytra striata, tuberculata, nigra, fasciis aliquot obsoletis, nigris. Pedes cinerei, femoribus anticis incrassatis.

ocellatus. 168. R. femoribus dentatis, obscure - cinereus, elytris macula ocellari atra.

Curculio ocellatus. Ent. syst. 2. 432. 158.

Oliv. Inf. 83. fig. 31.

Habitat in Cayenna.

169. R. femoribus dentatis, elytris striatis, postice *medita-*
acuminatis. *bundus.*

Curculio meditabundus. Ent. syst. 2. 432. 159.*

Oliv. Inf. 83. fig. 132.

Habitat in noua Hollandia, Mus. D. Banks.

170. R. femoribus dentatis, fuscus, elytris reticu- *Pacca.*
lato-striatis, postice tuberculatis, apice acumi-
natis.

Habitat in India orientali. Mus. D. Lund.

Rostrum crassiusculum, incuruum. Thorax punctis eleuatis scaber. Elytra fulcata: fulcis striis transuersis, reticulatis, tuberculoque ante apicem eleuato, obtuso, apiceque acumine paruo, fusca, punctis fasciculatis, brunneis, sparsis. Corpus fuscum, pedibus pilis ferrugineis, maculatis.

171. R. femoribus dentatis, obscurus, thoracis linea *Capra.*
laterali scutello elytrorumque fascia cinereis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Statura omnino R. Pacca. Rostrum longitudine thoracis. Thorax scaber, obscurus: linea laterali cinerea. Elytra fulcata: fulcis rugosis, obscura. Pedes ferruginei, femoribus acute-dentatis.

172. R. femoribus dentatis, niger, thoracis lateribus *strepidus.*
rotundatis, elytris subspinosis.

Curculio strepidus. Ent. syst. 2. 432. 160.*

Oliv. Inf. 83. fig. 151.

Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

173. R. femoribus dentatis, obscurus, thorace sca- *Mangife-*
bro: linea dorsali alba, elytris reticulatis. *rae.*

Curculio Mangiferae. Ent. syst. 2. 432. 161.*

Oliv. Inf. 83. fig. 137.

Hyba.

Hybn. Naturf. 24. 46. 12. tab. 2. fig. 13.

Habitat in Mangiferae nucleis Indiae orientalis.
Koenig.

stultus. 174. R. femoribus dentatis, griseus, elytris macula
communi lunata, cinerea, rostro atro.

Curculio stultus. Ent. syst. 2. 433. 162. *

Habitat in Coromandel. Prof. Vahl.

Araneus. 175. R. femoribus dentatis, obscurus, cinereo-vi-
rius, thoracis lateribus rotundatis.

Curculio Araneus. Ent. syst. 2. 433. 163. *

Habitat in Americae Insulis. Dr. Pflug.

Bubo. 176. R. femoribus dentatis, thorace cinereo, villosa,
elytris punctato-friatis, brunneis: litura po-
stica cinerea.

Habitat - - - Mus. D. Lund.

Corpus praecedentibus magis cylindricum. Ro-
strum crassiusculum, brunneum. Thorax cine-
reo-villosus, dorso fuscescente: linea cinerea.
Punctum fuscum praeterea ad latera. Elytra
punctis latioribus friata, brunnea, litura trans-
uerfa, villoso-cinerea. Corpus cinereo-villo-
sum. Pedes brunnei.

Strix. 177. R. femoribus dentatis, niger, thorace ferrugi-
neo, lineato, elytris friatis, ferrugineo-pun-
ctatis.

Curculio Strix. Ent. syst. 2. 433. 164. *

Oliv. Inf. 83. fig. 16.

Habitat in Cayenna. Mus. Dom. Olivier.

fulcatulus. 178. R. femoribus dentatis, ater, elytris fulcis tri-
bus villoso-albis.

Habitat in Amboina. Dom. Billardiere.

Statura cylindrica R. squalidi. Caput atrum.

Thorax trilobus, punctis parvis, eleuatis, sca-
ber: strigis duabus in medio interruptis, impres-
fis.

sis, villosa - albis. Elytra punctato - striata, et praeterea fulcis tribus villosa - albis exarata, qui tamen apicem haud attingunt. Corpus atrum, femoribus acute - dentatis.

79. R. femoribus dentatis, villosa - griseus, rostro *squalidus*. testaceo, elytris striis tribus elevatis, albidis.

Curculio squalidus. Ent. syst. 2. 433. 165. *

Oliv. Inf. 83. fig. 184.

Habitat Surinami. Mus. D. Banks.

80. R. femoribus dentatis, ater, thorace punctis *germanus*. duobus testaceis.

Curculio germanus. Ent. syst. 2. 433. 166.

Linn. syst. Nat. 2. 613. 58.

Panz. Fn. Germ. 42. tab. 16.

Sulz. Hist. Inf. tab. 4. fig. 5.

Schaeff. Icon. tab. 62. fig. 9.

tab. 101. fig. 6.

Frish. Inf. 13. 28. tab. 26.

Payk. Monogr. 1. 1.

Habitat in Germania haud infrequens.

81. R. femoribus dentatis, fusco albo ferrugineo - *bispinosus*. que variegatus pectore bispinoso.

Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff.

Forte cum sequentibus proprii generis, Cionus

Ent. Helv. Differt habitu, corpore magis depresso, planiusculo, antennarum tertio quartoque articulis longioribus clauaque ovata, at instrumenta cibaria mihi haud rite nota. Cionus Lythri vero Ent. Helv. tab. 3. fig. 3. nec statura nec antennis huc pertinet.

Maior R. Thapsi. Rostrum elongatum, nigrum, basi parum testaceum. Oculi magni, approximati. Thorax et elytra variegata, scutello albo. Corpus albo - villosum, pectore antice spinis
dua

IV. 72

duabus validis, acutis. Pedes elongati, atri, cinereo-irrorati.

Femina mutica.

sanctus.

182. R. femoribus dentatis, ater, thorace vtrinque albo-cruciato, elytris cinereo-punctatis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Maior R. Scrophulariae. Rostrum incurvum, basi sulcatum. Orbita oculorum albida. Thorax ater, linea dorsali et vtrinque cruce albis. Elytra atra, punctis numerosis, sparsis, albis. Pectus cinereo-villosum, atro-maculatum. Abdomen atrum, lineis quatuor albis. Femora postica compressa.

deplanus.

183. R. femoribus dentatis, ater, thorace albo-lineato, elytris acuminatis: futura strigisque albis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Statura praecedentis. Rostrum arcuatum, atrum, basi compressum, cinereum. Thorax subrugosus, ater: lineis quinque integris, albis. Elytra striata, apice parum acuminata, atra: futura strigisque aliquot obliquis, albidis. Subtus villosus-cinereus, abdomine linea media atra.

Pblefus.

184. R. femoribus dentatis, elytris basi bituberculatis, albo-maculatis, maculaque magna futurali atra.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Statura plana, depressa R. Scrophulariae, at duplo maior. Rostrum atrum, nitidum, basi albidum. Thorax nigricans interdum punctis aliquot albis, interdum antice ferrugineus. Scutellum ferrugineum. Elytra tuberculis duobus baseos elevatis, obtusis, substriata, nigro alboque

que variegata maculaque magna media, communi, atra. Elytra apice emarginata. Subtus nunc cinereo, nunc ferrugineo-villofus, femora elongata, clauata, dentata.

85. R. femoribus dentatis, obscure-ferrugineus, *Pleuronectes*.
elytris albo-punctatis, basi bituberculatis, apice emarginatis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Statura praecedentis, paullo minor. Rostrum elongatum, incurvum, atrum. Caput et thorax obscure-brunnea, interdum nigro-maculata. Elytra punctato-striata, brunnea, punctis parvis, albis, sparsis, basi tuberculis duobus elevatis, apice emarginatis. Femora valde elongata, clauata.

86. R. femoribus dentatis, posticis apice spinosis, *planulus*.
fuscus, albo-punctatus.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Praecedentibus statura plana, depressa convenit. Rostrum incurvum, atrum. Caput fuscum, orbita oculorum alba. Thorax fuscus: lateribus nigris, albo-punctatis. Elytra substriata, apice rotundata, fusca, punctis plurimis sparsis, albis. Pedes nigricantes, femoribus posticis elongatis, clauatis, tridentatis apiceque spina valida, acuta, annuloque albo-cincta.

87. R. femoribus dentatis, niger, thorace rugoso: *lamella*.
linea laterali alba, coleoptris punctato-striatis: maculis quatuor albis, duabus communibus.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Rostrum atrum, basi parum carinatum. Thorax rugosus, ater, linea laterali lata, alba. Elytra
ro-

rotundata, nigra: maculis tribus albis; duabus communibus. Pectus albo-maculatum. Pedes nigri, femoribus elongatis, tenuibus.

temporarius.

188. *R. femoribus dentatis*, niger, elytris fuscis margine nigro, albo-punctato.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Statura omnino praecedentium. Rostrum arcuatum, incuruum, atrum. Caput et thorax laevis, atra, orbita, oculorum thoracisque lateribus albis. Elytra laevia, fusca, basi parum nigro-alba, lateribus nigris, albo-punctatis. Corpus cinereo-villosum, nigro-maculatum. Pedes nigri, femoribus tridentatis: dentibus duobus posticis minutis.

Pipa.

189. *R. femoribus dentatis*, griseus, elytris striatis nigro ferrugineoque variis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Statura praecedentis. Rostrum incuruum, atrum, basi bifurcatum. Orbita oculorum albida. Thorax et elytra nigro ferrugineoque varia. Corpus griseum.

Vlula.

190. *R. femoribus dentatis*, cinereus, thoracis macula media nigra: linea albida, elytris striatis: fascia nigra.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Statura omnino praecedentium. Rostrum elongatum, arcuatum, atrum. Thorax cinereus, macula magna nigra, et in hac linea media cinerea. Elytra striata cinerea: fascia lata media nigra.

Scrophulariae.

191. *R. femoribus dentatis*, thorace albido, coleopteris maculis duabus atris, albae connatis.

Cur.

Curculio Scrophulariae. Ent. syst. 2. 434. 167.

Linn. syst. Nat. 2. 614. 61. Fn. Sv. 603.

Geoff. Inf. 1. 296. 44.

Reaum. Inf. 3. tab. 2. fig. 12.

Degeer Inf. 5. 208. 3. tab. 6. fig. 17. 18. 19. 20.

Payk. Monogr. 23. 22.

- Fn. Sv. 3. 207. 24.

Herbst. Col. 6. tab. 73. fig. 1.

Habitat in Europae Scrophulariis.

92. *R. femoribus dentatis, coleoptris maculis duabus dorsalibus simplicibus atris.* *Thapsus.*

Curculio Thapsus Ent. syst. 2. 434. 168. *

Oliv. Inf. 83. fig. 21.

Herbst. Col. 6. tab. 73. fig. 2.

Habitat in Scrophulariis, Verbasco.

Varietatem praecedentis credit D. de Paykull rite?

93. *R. femoribus dentatis, niger, thoracis lateribus flavescentibus, elytris punctis albis nigrisque, alternis striatis.* *Verbasci.*

Curculio Verbasci. Ent. syst. 2. 434. 169.

Habitat Kiliae. D. Daldorff.

94. *R. femoribus dentatis, niger, thorace tuberculato, elytrorum futura macula atra albaque.* *moestus.*

Habitat in Europa. Mus. D. de Sehestedt.

Statura et magnitudo praecedentium. Caput fuscum, rostro nigro. Thorax tuberculo vtrinque eleuato, niger, interdum puncto baseos albido.

Elytra striata, nigra, futura puncto baseos eleuato atro, apicis albo. Corpus cinereum, puncto paruo villoso ferrugineo, ad basin thoracis.

95. *R. femoribus dentatis, albidus, coleoptris nigro variis: macula dorsali baseos apicisque nigris.* *Blattariae*

Curculio Blattariae. Ent. syst. 2. 435. 170. *

Cio.

Cionus Blattariae. Ent. Heluet. 1. 66. 1. tab. 3
fig. 1.

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

olens. 196. R. femoribus dentatis, cinereo-pilosus, coleoptris macula dorsali atra.

Curculio olens. Ent. syst. 2. 435. 171. *

Habitat in Gallia. Muf. D. Bosc.

caprimulgus. 197. R. femoribus dentatis, villosus, cinereus, antennis pedibusque testaceis.

Habitat in Germania. D. Smidt.

Statura omnino et magnitudo R. olentis, at totus cinereus, immaculatus, antennis pedibusque testaceis.

foetidus. 198. R. femoribus dentatis, elytris cinereis: macula dorsali fusca striisque abbreviatis punctorum nigrorum.

Habitat in Selandia Daniae. Muf. D. de Sehested.

Statura praecedentium. Rostrum basi rufum, apice nigrum. Thorax cinereus: macula dorsali nigra; linea media cinerea. Elytra cinerea: macula magna communi baseos fusca, lineisque aliquot indistinctis abbreviatis et punctis albis nigrisque.

Mas paullo minor magisque obscurus.

Solani. 199. R. femoribus dentatis, obscurus, elytris lineis elevatis nigris cinereo-punctatis.

Curculio Solani. Ent. syst. 2. 435. 171. *

Habitat Halae Saxonum. Dom Hybner.

Smidtii. 200. R. femoribus dentatis, thorace carinato, dimidiato-rufo, elytris planis bispinosis fuscis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muf. D. Lund.

Statura praecedentium. Rostrum arcuatum, cinereum, dorso atro. Thorax valde carinatus, antennis

tice rufus, postice niger. Elytra plana, angulo baseos antequae apicem acute spinosa, fusca, basi nigra. Corpus atrum, abdomine basi albo-maculato. Pedes tenues, grisei, dorso nigro.

1. R. femoribus dentatis, nigro-fasciatis, thorace elytrisque tuberculatis, femoribus anticis crassissimis. *cbiragra.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Statura praecedentium. Rostrum longum, arcuatum, atrum. Thorax cinereus, nigro-fasciatus, tuberculis octo: 4. 4; duobus intermediis lineae anticae maioribus. Elytra plana, tuberculis plurimis, sparsis apicis maiori obtuso, cinerea, atro-fasciata. Pedes atrii, femoribus anticis longioribus, crassissimis, dentatis, tibiis incuruis.

2. R. femoribus dentatis, elytris tuberculo suturali eleuato anguloque apicis dilatato, plano. *Aefopus.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Paruus. Rostrum longiusculum, cylindricum, ferrugineum, apice atrum. Thorax laevis, ferrugineus, carina media eleuata, atra. Elytra striata, ferruginea: angulo baseos prominulo. In medio tuberculum, ad futuram eleuatum, acutum, at angulus apicis dilatatus, planus. Pedes ferruginei, femoribus anticis longioribus, incrassatis, dentatis.

3. R. femoribus dentatis, niger, elytris ferrugineo-variis, femoribus canaliculatis. *grauis.*

Curculio grauis. Ent. syst. 2. 435. 172. *

Oliv. Inf. 83. fig. 177.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

s punctatus 204. R. femoribus dentatis, elytris futura puncta
que duobus albis, femoribus canaliculatis.

Curculio s punctatus. Ent. syst. 2. 435. 173. *

Linn. syst. Nat. 2. 614. 64. Fn. Sv. 618.

Schaeff. Icon. tab. 1. fig. 12.

Herbst. Arch. tab. 24. fig. 18.

Coleopt. 6. tab. 81. fig. 3.

Payk. Monogr. 15. 14.

Fn. Sv. 3. 201. 18.

Habitat in Europae plantis.

guttula. 205. R. femoribus dentatis, thorace tuberculato, a
ger, elytris striatis: puncto postico albo.

Curculio guttula. Ent. syst. 2. 436. 174. *

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

abbreviatulus. 206. R. femoribus dentatis, fuscus, atomis griseis
irroratis, elytris abbreviatis.

Curculio abbreviatulus. Ent. syst. 2. 436. 175.

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

Ecbii. 207. R. femoribus dentatis, niger, thorace elytris
que albo-lineatis.

Curculio Ecbii. Ent. syst. 2. 436. 176. *

Curculio geographicus. Oliv. Inf. 83. fig.

II. 56. Panz. Fn. Germ. 17. tab. 12.

Habitat in Germaniae Echio. Dom. Prof. Helwi

sanguinirostris. 208. R. femoribus dentatis, viridi-cinereus, viridis
fuscus, rostro rufo, basi albo.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mu
D. de Sehestedt.

Paullo maior R. didymo, totus viridi-cinereus
villosus. Rostrum arcuatum, basi atrum, apice
rufum. Antennae cinereae, claua rufa. Elytra
striata.

didymus. 209. R. femoribus dentatis, supra fuscus, elytris
striatis: macula laterali transversa, alba.

Curculio didymus. Ent. syst. 2. 437. 177.

Curculio vrticarius. Ent. Helv. I. 98. II. tab,
II. fig. 1. 2.

Geoff. Inf. I. 299. 47.

Payk. Monogr. 29. 28.

Fn. Sv. 3. 213. 30.

Herbst Col. 6. tab. 91. fig. 6.

Habitat in Germaniae Vrtica vrente. D. de Hattorf.

IV. 74.

210. R. femoribus dentatis, niger, thorace tuberculato, elytris cinereo-variis, rostro arcuato, atro. *Lamii*.

Curculio Lamii. Ent. syst. 2. 437. 178. * *E. 57.*

Panz. Fn. Germ. 17. tab. 13.

Habitat in Germaniae Lamio. Dom. Prof. Helwig.

211. R. femoribus dentatis, cinereo-villosus, rostro arcuato, atro. *Brassicae*.

Curculio Brassicae. Ent. syst. 2. 437. 179. *

Habitat in Kiliae Brassica.

212. R. femoribus dentatis, cinereo-villosus, tarsis rufis. *Borraginis*.

Curculio Borraginis. Oliv. Inf. 83. fig.

Habitat in Galliae Borragine. Dom. Olivier.

213. R. femoribus dentatis, niger, rostro pedibusque ferrugineis: femoribus anticis incrassatis. *rufirostris*.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Paruus. Rostrum planum, flavum. Thorax niger. Elytra striata, nigra. Pedes flavi: antici elongati, femoribus incrassatis.

214. R. femoribus dentatis, cinereus, thorace tuberculis duobus, elytris plurimis eleuatis. *multituberculatus*.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehested.

Paruus. Rostrum obscurum. Thorax cinereus, tuberculis duobus. Elytra cinerea, tuberculis plurimis: interiori maiore, compresso. Corpus nigrum.

baemorrboidalis. 215. R. femoribus dentatis, thorace fusco: lateribus cinerascens, elytrorum sutura apice ferruginea.

Curculio baemorrboidalis. Ent. syst. 2. 431. 181. *

Habitat in noua Hollandia. Mus. Dom. Banks.

trimaculatus. 216. R. femoribus dentatis, coleoptris nigris: maculis tribus cinereis; postica communi lunata.

Curculio 3 maculatus. Ent. syst. 2. 438. 182. Payk. Monogr. 26. 24.

Fn. Sv. 3. 209. 26.

Herbst. Col. 6. 471. 482.

Habitat in Alsatia. Prof. Hermann.

litura. 217. R. femoribus dentatis, albo nigroque variis rostro atro.

Curculio litura. Ent. syst. 2. 438. 183. * Payk. Monogr. 26. 25.

Fn. Sv. 3. 210. 27.

Herbst. Col. 6. tab. 91. fig. 4.

Habitat in Europae borealis Carduis.

villosus. 218. R. femoribus dentatis, villosus, griseus, scutello fasciaque elytrorum postice albis.

Curculio villosus. Ent. syst. 2. 438. 184. * Herbst. Arch. tab. 24. fig. 19.

Habitat in Germania. Dom. de Hattorff.

Sciurus. 219. R. femoribus dentatis, niger, elytris striatis punctis duobus suturalibus, albis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Parvus. Caput et thorax laeuis, atra, immaculata.
Elytra friata, atra: punctis duobus communi-
bus, albis.

120. R. femoribus dentatis, ater, elytris friatis: *plagiatus*.
ga rufa.

Curculio plagiatus. Ent. syst. suppl. 166. 184.*
Habitat in Carolina. Muf. D. Bosc.

121. R. femoribus dentatis, nigricans, thorace tu- *Raphani*.
berculato, rostro arcuato, atro.

Curculio Raphani. Ent. syst. 2. 438. 185.*
Habitat in Germaniaë Raphano. D. Smidt.

122. R. femoribus dentatis, niger, elytris rufis: *mar-* *varians*.
gine omni nigro.

Curculio varians. Ent. syst. 2. 439. 186.*
Payk. Monogr. 16. 15.

Fn. Sv. 3. 202. 19.

Herbst. Coleopt. 6. tab. 80. fig. 8.

Habitat in Sueciae Pino. Dom. de Paykull.

123. R. femoribus dentatis, fuscus, thorace linea *Troglody-*
dorsali cinerea, elytris pedibusque testaceis. *tes*.

Curculio Troglodytes. Ent. syst. 2. 439. 187.*
Payk. Monogr. 30. 29.

Fn. Sv. 3. 214. 31.

Herbst. Col. 6. 473. 484.

Habitat Kiliae. D. Daldorff.

124. R. femoribus dentatis, oblongus, ater, anten- *carbona-*
narum claua villosa, elytris crenato-friatis. *rius*.

Curculio carbonarius. Ent. syst. 2. 439. 188.
Linn. syst. Nat. 2. 617. 42. Fn. Sv. 614.

Panz. Fn. Germ. 42. tab. 18.

Payk. Fn. Sv. 3. 194. 11.

Herbst. Col. 6. tab. 64. fig. 3.

Habitat in Europa.

IV. 72

aterrimus. 225. R. femoribus dentatis, ater, thorace apice bidentato, elytris nitidis.

Curculio aterrimus Ent. syst. 2. 439. 189.

Linn. syst. Nat. 2. 607. 10. Fn. Sv. 582.

Habitat in Europa boreali.

Cerasi. 226. R. femoribus dentatis, ater, thorace apice bidentato, elytris oblongis opacis.

Curculio Cerasi. Ent. syst. 2. 440. 190.

Linn. syst. Nat. 2. 607. 11. Fn. Sv. 583.

Ent. Heluet. 1. 90. 7. tab. 9. fig. 1. 2.

IV. 71. Panz. Fn. Germ. 42. tab. 19.

Geoff. Inf. 1. 299. 48.

Frish. Inf. 11. 31. tab. 23. fig. 1. 3.

Payk. Monogr. 8. 7.

Fn. Sv. 3. 193. 10.

Herbst. Col. 6. tab. 64. fig. 1. 2.

Habitat in Cerasi foliis.

violaceus. 227. R. femoribus dentatis, niger, elytris striatis violaceis.

Curculio violaceus. Ent. syst. 2. 440. 191. *

Linn. syst. Nat. 2. 614. 63. Fn. Sv. 579.

Geoff. Inf. 1. 271. 5.

Degeer Inf. 5. 213. 5.

IV. 73 Panz. Fn. Germ. 42. tab. 20.

Payk. Monogr. 9. 8.

Fn. Sv. 3. 195. 12.

Herbst. Col. 6. tab. 64. fig. 4.

Habitat in Europae borealis Pinis.

Nucum. 228. R. femoribus dentatis, corpore griseo, longitudine rostri.

Curculio Nucum. Ent. syst. 2. 440. 192. *

Linn. syst. Nat. 2. 673. 59. Fn. Sv. 616.

Roff. Inf. 3. tab. 67. fig. 67.

IV. 73 Oliv. Inf. 83. fig. 47.

Panz. Fn. Germ. 42. tab. 21.

Schad

Schaeff. Elem. tab. 55. fig. 14.

Icon. tab. 50. fig. 4.

Degeer Inf. 5. 205. 2. tab. 6. fig. 14. 15. 16.

Geoff. Inf. 1. 295. 42.

Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 22.

Payk. Monogr. 21. 20.

Fn. Sv. 3. 204. 20.

Herbst. Col. 6. tab. 73. fig. 10.

Habitat in Coryli Auellanae nucleis.

Forte cum sequentibus proprii generis. Differt parum statura, at rostrum longissimum, tenuissimum, cylindricum, parum incuruum, et antennae articulo secundo longissimo, vsque ad oculos attingente, clauato, tertio sequentibus longiore, vltimis tribus crassioribus, claua obtusa, in medio rostri insertae, proprium genus indicare videntur.

29. R. femoribus dentatis, griseus, rostro corpore *proboscideus*.
duplo longiore.

Curculio proboscideus. Ent. syst. 2. 440. 193. *

Oliv. Inf. 83. fig. 127.

Habitat in America boreali. Mus. D. Banks.

30. R. femoribus dentatis, brunneus, pedibus *tegulofus*.
staceis.

Curculio gulofus. Ent. syst. 2. 441. 194. *

Habitat Parisiis. Dom. Grandchamp.

31. R. femoribus dentatis, ferrugineus, cinereo-*parafita*.
irroratus, femoribus macula nigra.

Curculio parafita. Ent. syst. 2. 441. 195. *

Oliv. Inf. 83. fig. 181.

Habitat in Cayenna. Mus. D. Geoffroy.

32. R. femoribus dentatis, griseus, scutello elythro-*esuriens*.
rumque macula postica albis.

Curculio esuriens. Ent. syst. 2. 441. 196. *

Ent.

- Ent. Helv. I. 112. 12. tab. 11. fig. 3. 4.
Habitat in Gallia.
- auarus.* 233. R. femoribus dentatis, obscure ferrugineus, thorace linea dorsali, elytris fascia postica albis
Curculio auarus. Ent. syst. suppl. 170. 196.*
Habitat in Gallia. Mus. D. Bosc.
- C. album.* 234. R. femoribus dentatis, ater, coleoptris duplici albo notatis.
Curculio C. album. Ent. syst. suppl. 170. 197.*
Habitat in India orientali. Mus. D. de Sehestedt.
- nasutus.* 235. R. femoribus dentatis, brunneus, elytris striatis cinereis, apice brunneis.
Curculio nasutus. Ent. syst. 2. 441. 197.
Oliv. Inf. 83. fig. 138.
Habitat - - - Mus. Britann.
- baustellatus.* 236. R. femoribus dentatis, castaneus, elytris striatis, rostro corpore quadruplo longiore.
Curculio baustellatus. Ent. syst. 2. 442. 198.*
Oliv. Inf. 83. fig. 171.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lee.
- varius.* 237. R. femoribus dentatis, niger, cinereo-irrotatus, rostro pedibusque rufis.
Curculio varius. Ent. syst. 2. 442. 199.*
Habitat in Cayenna. D. Mallet.
Pedes rufi, apice nigricantes, antici elongati.
- Ceraforum.* 238. R. femoribus dentatis, fuscus, scutello elytrorumque fasciis obsolete cinereis.
Curculio Ceraforum. Ent. syst. 2. 442. 200.
Panz. Fn. Germ. 42. tab. 22.
17. 73 Payk. Monogr. 22. 21.
Fn. Sv. 3 206. 22.
Herbst. Col. 6. tab. 73. fig. 10.
Habitat in Anglia. D. Lee.

239. R. femoribus dentatis, ater, thorace punctis *amoenus*.
duobus, coleoptris quinque niueis.

Curculio amoenus. Ent. syst. 2. 442. 201. *

Oliv. Inf. 83. fig. 143.

Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

240. R. femoribus dentatis, nigro-aeneus, thorace *metallinus*
punctato, elytris striato-punctatis.

Curculio metallinus. Ent. syst. 2. 442. 202. *

Habitat in Americae meridionalis Insulis. Dom.

Smidt.

241. R. femoribus dentatis, griseus, capite biden- *bitornis*.
tato.

Curculio bicornis. Ent. syst. 2. 443. 203. *

Habitat in noua Zelandia. Mus. D. Banks.

242. R. femoribus dentatis, niger, elytris albo-sub- *tenuiro-*
fasciatis, antennis rufis. *stris:*

Curculio tenuirostris. Ent. syst. 2. 443. 204. *

Habitat in Anglia. Mus. D. Banks.

243. R. femoribus dentatis, elytris testaceis, obso- *Drupa-*
lete fasciatis. *rum.*

Curculio Druparum. Ent. syst. 2. 443. 205.

Linn. syst. Nat. 2. 614. 62. * Fn. Sv. 617.

Geoff. Inf. 1. 296. 43.

Degeer Inf. 5. 214. 7.

Schaeff. Icon. tab. 1. fig. 11.

Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 21.

Payk. Monogr. 11. 10.

Fn. Sv. 3. 197. 14.

Herbst. Col. 6. tab. 70. fig. 9.

Habitat in Europae Pruno Pado.

244. R. femoribus dentatis, ferrugineo-fuscus, ca- *Fraxini*.
pite dorsoque nigris.

Curculio Fraxini. Ent. syst. 2. 443. 206. *

Degeer Inf. 5. 212. 4.

Payk.

Payk. Monogr. 25. 23.

Fn. Sv. 3. 209. 25.

Herbst. Col. 6. tab. 73. fig. 5.

Habitat in Sueciae Fraxino. D. de Paykull.

melanocephalus. 245. R. femoribus dentatis, brunneus, capite fusco, rostro atro.

II. 57. *Curculio melanocephalus.* Ent. syst. 2. 444. 207. *

Panz. Fn. Germ. 18. tab. 12.

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

pectoralis. 246. R. femoribus dentatis testaceis, pectorè nigro.

~~II. 57.~~ *Curculio pectoralis.* Panz. Fn. Germ.

Habitat in Austria. D. de Meyerle.

III. 62

Statura parua R. melanocephali. Caput et thorax testacea, immaculata. Elytra punctato-friata, testacea, magis nebulosa. Pectus nigrum. Pedes testacei.

flavipes. 247. R. fuscus, elytris cinereo-variis, pedibus flavis.

Curculio flavipes. Panz. Fn. Germ.

Habitat in Austria. D. de Meyerle.

VI. 36

Statura parua praecedentis. Caput et thorax fusca, immaculata. Elytra haud friata, cinereo fuscoque variegata. Pedes omnes flavi.

arcuatus. 248. R. femoribus dentatis, pallidus, elytris cinerascensibus.

II. 62. *Curculio arcuatus.* Panz. Fn. Germ.

Habitat in Austria. D. de Meyerle.

Paruus. Rostrum elongatum, parum rufescens. Caput et thorax laevis, pallida, immaculata. Elytra friata, magis cinerascens. Pedes acute dentati, pallidi.

depressus. 249. R. femoribus dentatis, thorace depresso: lateribus obtuse angulatis.

Curculio depressus. Ent. syst. 2. 444. 208. *

Linn.

Linn. syst. Nat. 2. 612. 53. Mus. Lud. Vlr. 49.

Seb. Mus. 4. tab. 95. fig. 4.

Habitat in America meridionali.

50. R. femoribus anticis dentatis, corpore griseo Pomorum.
nebuloso.

Curculio Pomorum. Ent. syst. 2. 444. 209.

Linn. syst. Nat. 2. 612. 46. Fn. Sv. 612.

Frish. Inf. 1. 32. tab. 8.

III. 63.

Payk. Monogr. 13. 12.

Fn. Sv. 3. 199. 7.

Degeer Inf. 5. 215. 8. tab. 6. fig. 26. 27.

Herbst. Col. 6. tab. 70. fig. 11.

Habitat in Pomonae floribus.

51. R. femoribus dentatis, griseo fuscoque macu- vorax.
latus, rostro arcuato atro.

Curculio vorax. Ent. syst. 2. 444. 210.

Curculio longimanus. Forst. Cent. Inf. 1. 24.

Payk. Monogr. 3. 3.

Fn. Sv. 3. 189. 5.

Herbst. Col. 6. tab. 71. fig. 4.

II. 57

Panz. Fn. Germ. 18. tab. 13.

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

252. R. femoribus dentatis, corpore testaceo, pecto- tortrix.
re fusco.

Curculio tortrix. Ent. syst. 2. 444. 211. *

Linn. syst. Nat. 2. 615. 67. Fn. Sv. 622.

Geoff. Inf. 1. 300. 51.

Degeer Inf. 5. 214. 6.

Ent. Helv. 1. 92. 8. tab. 9. fig. 3. 4.

Panz. Fn. Germ. 18. tab. 19.

II. 58

Payk. Monogr. 7. 6.

Fn. Sv. 3. 192. 9.

Herbst. Col. 6. tab. 7. fig. 8.

Habitat in Populo, folia contorquens,

- Tremulae.* 253. R. femoribus dentatis, nigricans, elytris striatis griseo-irroratis.
Curculio Tremulae. Ent. syst. 2. 445. 212.⁴
 Payk. Monogr. 4. 4.
 Fn. Sv. 3. 189. 6.
 Habitat in Sueciae Populo. D. de Paykull.
- aeftuans.* 254. R. femoribus dentatis, fuscus, cinereo-lineatus, pedibus pallidis.
Curculio aeftuans. Ent. syst. 2. 446. 213.⁶
 Habitat in Americae meridionalis Insulis. D. Smidt.
- taeniatus.* 255. R. femoribus dentatis, thorace nigro: margine antico posticoque rufis, elytris pallidis, nigro maculatis.
Curculio taeniatus. Ent. syst. 2. 445. 214.⁶
 Payk. Monogr. 6. 5.
 Fn. Sv. 3. 191. 8.
 Habitat in Anglia. Mus. D. Banks.
- *** *Femoribus saltatoriis.*
- Alni.* 256. R. pedibus saltatoriis, niger, coleoptris testaceis: maculis duabus obscuris.
Curculio Alni. Ent. syst. 2. 445. 216.⁶
 Linn. syst. Nat. 2. 611. 42. Fn. Sv. 608.
 Geoff. Inf. 1. 286. 20.
 Degeer Inf. 5. 262. 49.
 Payk. Monogr. 20. 19.
 Fn. Sv. 3. 220. 39.
 Habitat in Betula, Alno.
- crassus.* 257. R. pedibus saltatoriis, supra fuscus, thorace quadri-tuberculato, elytris striatis.
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.
 Magnus in hac familia. Thorax fuscus, tuberculis quatuor eleuatis. Elytra striata, fusca, obscura.

scura. Corpus brunneum, femoribus posticis
incrassatis.

58. R. pedibus saltatoriis, niger, cinereo - variegatus. *pilosus*.

Curculio pilosus. Ent. syst. 2. 446. 217. *

Payk. Monogr. 18. 17.

Fn. Sv. 2. 318. 36.

Habitat in Anglia. Mus. D. Banks.

59. R. pedibus saltatoriis, ater, elytrorum fascia *bortorum*,
sesquialtera pedibusque testaceis.

Curculio bortorum. Ent. syst. 2. 446. 218. *

Curculio mutilatus. Laichart. Austr.

Habitat in Germania. Mus. D. de Sehestedt.

60. R. pedibus saltatoriis, niger, obscurus, rostro *rufescens*.
tibiisque rufis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Paullo maior, quam R. calcar. Antennae rufae,
claua fascia fusca. Caput fuscum, rostro ar-
cuato, rufo. Thorax et elytra laeuia, nigra,
obscura. Pedes nigri, femoribus posticis increas-
satis, subdentatis.

261. R. pedibus saltatoriis, niger, antennis plantis-*calcar*.
que testaceis, femoribus dentatis.

Curculio calcar. Ent. syst. 2. 446. 219. * III. 62.

Payk. Monogr. 18. 17.

Habitat Kiliae. D. Daldorff.

262. R. pedibus saltatoriis, niger, tibiis testaceis. *Saliceti*.

Curculio Saliceti. Ent. syst. 2. 446. 220. *

Payk. Monogr. 66. 64.

Fn. Sv. 3. 271. 94.

Herbst. Col. 6. 430. 418.

Habitat in Sueciae Salicetis.

263. R. pedibus saltatoriis, coleoptris ante apicem *Beccabun-*
rufis, *gae*.

Cur-

Curculio Beccabungae. Ent. syst. 2. 447. 221.
Linn. syst. Nat. 2. 611. 41. Fn. Sv. 604.
Payk. Fn. Sv. 3. 254. 72.

Habitat in Sueciae Veronica Beccabunga. D.
Paykull.

Haud faltat teste D. de Paykull.

Salicis. 264. R. pedibus faltatoriis, elytris atris : fasciis du-
bus albis.

Curculio Salicis. Ent. syst. 2. 447. 222.
Linn. syst. Nat. 2. 611. 43. Fn. Sv. 610.
Degeer Inf. 5. 246. 51.

Panz. Fn. Germ. 18. tab. 15.

Payk. Monogr. 64. 62.

Fn. Sv. 3. 269. 91.

Herbst. Col. 6. tab. 93. fig. 2.

Habitat in Salicis floribus.

viminalis. 265. R. pedibus faltatoriis, corpore testaceo.

Curculio viminalis. Ent. syst. 2. 447. 223.

Curculio Quercus. Linn. syst. Nat. 2. 609. 18.
Sv. 596.

Curculio Vlmi. Degeer Inf. 5. 260. 48. tab. 8.
fig. 5.

Geoff. Inf. 1. 286. 19.

Reaum. Inf. 3. 31. tab. 3. fig. 17. 18.

Payk. Monogr. 19. 18.

Fn. Sv. 3. 219. 38.

Herbst. Col. 6. tab. 93. fig. 1.

Habitat in Europae Salice.

Ilicis. 266. R. pedibus faltatoriis, nigricans, elytris striatis,
cinereo-variis: futura basi alba.

Curculio Ilicis. Ent. syst. 2. 447. 224. ♀

Payk. Monogr. 18. 17.

Fn. Sv. 3. 219. 37.

Herbst. Col. 6. 431. 420.

Habitat in Vplandiae Quercu.

267. *R. pedibus saltatoriis, testaceus, elytris femo-* *Lonicerae.*
ribusque fascia nigra.

Habitat in Italiae Lonicera. Mus. D. de Sehestedt.

Statura et magnitudo omnino *R. viminalis*. Caput et thorax rufa, immaculata. Scutellum album. Elytra striata, testacea: fascia media fusca. Pedes testacei, femoribus posticis incrassatis: fascia fusca.

268. *R. pedibus saltatoriis, testaceus, scutello niueo.* *scutellaris.*

Habitat in Germania. Mus. D. Lund.

Affinis certe *R. viminali*, at minor et scutellum omnino niueum.

269. *R. pedibus saltatoriis, ater, elytris striatis:* *Iota.*
futura basi alba.

Curculio Iota Ent. syst. 2. 448. 225.

Panz. Fn. Germ. 18. tab. 16.

Payk. Monogr. 66. 63.

Fn. Sv. 3. 271. 93.

Herbst. Col. 6. 432. 421.

Habitat in Vplandiae arboribus. D. de Paykull.

270. *R. pedibus saltatoriis, corpore atro, femoribus* *Fagi.*
albis.

Curculio Fagi Ent. syst. 2. 448. 226.

Linn. syst. Nat. 2. 64. 44. Fn. Sv. 609.

Payk. Monogr. 64. 61.

Habitat in Fagi syluatici foliis.

271. *R. pedibus saltatoriis, fasciis, antennis tarsisque* *Fragariae*
testaceis.

Curculio Fragariae. Ent. syst. 2. 448. 227.

Habitat in Germaniae Fragariis. D. Smidt.

272. *R. pedibus saltatoriis, ater, scutello albo, an-* *Populi.*
tennis pedibusque testaceis.

Curculio Populi. Ent. syst. 2. 448. 228.

Rhynchaenus Populi. Ent. Helv. 1. 72. 2.

II. 59.

Panz.

Panz. Fn. Germ. 18. tab. 17.

Habitat in Selandiae Populo. Muf. D. de Seheffedt.

160. COSSONVS. *Mandibula incurua, acutissima.*
Antennae claua solida, vniarticulata.

linearis.

1. *C. niger, antennis pedibusque piceis.*

Curculio linearis Ent. syst. 2. 419. 110.

Cossonus linearis. Ent. Helv. 1. 60. 1. tab. 1. fig. 1. 2.

156. Panz. Fn. Germ. 18. tab. 7.

Payk. Monogr. 51 48.

Fn. Sv. 3. 242. 60.

Herbst. Col. 6. 53. 15.

Habitat Strasburgi. D. Prof. Hermann.

Variat paullo minor, thorace elytrisque ferrugineis, at vix distinctus.

Cossonus ferrugineus. Ent. Helv. 1. 60. 2. tab. 1. fig. 3. 4.

elongatulus.

2. *C. ferrugineus, thorace canaliculato, femoribus compressis.*

Curculio elongatulus. Ent. syst. suppl. 68. 111. 2.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. D. Daldorff.

canaliculatus.

3. *C. ater, abdomine rufo, thorace punctato: dorso canaliculato.*

Habi-

Cossoni corpus elongatum, cylindricum, glabrum, immarginatum, tardum; *capite* paruo, subrotundo, antice porrecto is rostrum elongatum, rectum, apice incrassatum; *antennis* articulo secundo longissimo, ultimo crassiori, clauato, ante apicem incrassatum insertis; *oculis* rotundatis, lateralibus; *thorace* planiusculo, latitudine elytrorum; *elytris* rigidis, fornicatis, longitudine abdominis, includentibus; *pedibus* brevibus, validis, compressis; *tarsis* quadriarticulatis; *colore* obscuro.

Habitat in Sumatra. D. Daldorff.

Statura praecedentium. Antennae nigrae, claua cinerea. Thorax punctatus, in medio glaber, planus, canaliculatus: canali basi dilatato. Elytra punctato-friata, nigra. Abdomen obscure-rufum. Pedes breues: femoribus clauatis.

Character generis naturalis adhuc desideratur.

. C. ater, nitidus, elytris friato - punctatus.

corticalis.

Habitat in America meridionali.

Corpus totum depressum; planum. Antennae nigrae: claua cinerascens. Thorax postice subtrilobus. Elytra punctato-friata. Corpus nigrum.

. C. thorace punctato, postice retuso, ater, elytris *squama*. macula apicis ferruginea.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Statura utique praecedentis, at omnino distinctus. Thorax punctatus, apice retusus. Elytra macula magna versus apicem ferruginea.

161. LIXVS. *Palpi* quatuor, aequales, breuissimi: articulo ultimo subulato.

Maxilla cornea, acuta, integra.

Antennae clauatae: articulo primo longissima, infidentes rostro crassiusculo.

* *femoribus* muticis.

paraplecticus. I. L. subcinereus, elytris mucronatis.

Curculio paraplecticus. Ent. syst. 2. 414. 91.
Linn. syst. Nat. 2. 610. 24. Fn. Sv. 604. L.
Scan. 184.

Oliv. Inf. 83. fig. 106.

Ent. Helv. 1. 94. 9. tab. 10. fig. 1. 2.

Geoff. Inf. 1. 279.

Schreb. Saml. 9. 336. tab. 4.

I. 48 Degeer Inf. 5. 224. 18. tab. 7. fig. 8.

Sulz. Hist. Inf. tab. 4. fig. 1.

Schaeff. Icon. tab. 44. fig. 1.

Payk. Monogr. 53. 50.

Fn. Sv. 3. 244. 63.

Herbst. Col. 6. tab. 62. fig. 1.

Ha.

Lixi corpus elongatum, cylindricum, immarginatum, rardum; capite paruo, inferto, antice porrecto in rostrum rectum, cylindricum, crassiusculum, vtrinque sulco obliquo exaratum, ad receptionem articuli secundi antennarum; oculis paruis, oblongis, lateralibus, ad basin rostri; *antennis* thorace breuioribus: articulo secundo longissimo, vltimis clauatis: clauis acuta; *thorace* breui, rotundato, antice parum angustato; *elytris* rigidis, includentibus, longitudine abdominis, immixtum apice acuminatis; *pedibus* longiusculis, cursoris; *pedibus* quadriarticulatis; *colorq* obscuro, saepius polline adspersa.

Habitat Larua intra caulem Umbellatarum aquaticarum. Paraplegiam equorum cauffare fertur.

2. *L. cylindricus*, flauo-puluerulentus, elytris acuminatis. *puluerulentus.*

Habitat in Austria. Dom. de Meyerle.

Statura omnino praecedentis, paullo minor. Corpus totum atomis luteis, puluerulentis tectum, thorace vix linea laterali fusca. Elytra acuminata.

3. *L. cylindricus*, cinereus, thorace elytrisq; fusco-striatis, elytris mucronatis. *elegans.*

Habitat in Germania. D. Smidt.

Duplo minor *L. paraplectico*. Caput cinereum, rostro apice nigro. Thorax cinereus, striis duabus dorsalibus, latis, nigris. Elytra ante apicem videntata, apice valde mucronata, cinerea, striis tribus distinctis, fuscis.

4. *L. cylindricus*, canus, fusco-lineatus.

Curculio anguinus Ent. syst. 2. 415. 92.

Linn. syst. Nat. 2. 610. 35.

Ent. Helv. 1. 96. 70. tab. 10. fig. 3. 4.

Oliv. Inf. 33. fig. 168.

Panz. Naturf. 24. 19. 26. tab. 1. fig. 26.

Panz. Fn. Germ. 42. tab. 11.

Habitat in Germania.

Os maxillis palisque. *Palpi* quatuor, aequales, breuissimi, filiformes; *anteriores* vix longiores, quadriarticulati: articulis rotundatis, aequalibus; ultimo subulato, adhaerentes maxillae dorso; *posteriores* breuissimi, triarticulati: articulis rotundatis, aequalibus, adnati labii basi.

Mandibula magna, fornicata, cornea, lata, incurua, apice multidentata. *Maxilla* breuissima, cornea. *Ligula* nulla? *Labium* corneum, ro-

anguinus.

IV. 70

tundatum, integrum. *Antennae* fractae, clauatae: claua acuta, ante apicem rostri insertae: articulo secundo in canalem flexuosum rostri recondendo.

- friatellus.* 5. L. obscurus, elytris cinereis, fusco-substriatis.
Curculio friatellus. Ent. syst. 2. 415. 93. *
 Habitat in Barbariae plantis. Dom. Desfontaines.
- Umbellatarum.* 6. L. thorace nigro, cinereo, lineato, elytris mucronatis, griseis.
Curculio Umbellatarum. Ent. syst. 2. 415. 94. *
 Habitat in Barbariae umbellatis. Dom. Prof. Vahl.
- mucronatus.* 7. L. cylindricus, cinereus, fusco-lineatus, elytris mucronatis.
Curculio mucronatus. Ent. syst. 2. 415. 95. *
 Habitat in Barbariae plantis.
 Affinis L. anguino et forte idem.
- ferrugatus* 8. L. niger, ferrugineo-villosus, elytris obtusis.
Curculio ferrugatus Ent. syst. 2. 416. 96. *
 Habitat in Hungaria. Dom. Hybner.
 Varietas duplo minor mas.
- gages.* 9. L. ater, nitidus, elytris striatis, obscuris, rostro truncato.
Curculio gages. Ent. syst. 2. 416. 97. *
 Habitat in Aquapim Guineae. Dr. Isert.
- 8 lineatus.* 10. L. cylindricus, niger, thorace elytrisque lineis quatuor albis.
Curculio 8 lineatus. Ent. syst. 2. 416. 98.
 Oliv. Inf. 83. fig. 89.
 Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. Gallicum.
- semipunctatus.* 11. L. cylindricus, niger, thorace lineis, elytris punctis albis.
Curculio semipunctatus. Ent. syst. 2. 416. 99. *
 Oliv. Inf. 83. fig. 141.

Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

2. *L. niger*, elytris maculis duabus ferrugineis. *4 pustulatus*. Ent. syst. 2. 416. 100. * *4 pustulatus*.

Oliv. Inf. 83. fig. 117.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

3. *L. cylindricus*, albo fuscoque nebulosus, elytris *mixtus*.
submucronatis, antennarum claua testacea.

Curculio mixtus. Ent. syst. 2. 417. 101. *

Habitat in Barbariae plantis. Mus. Dom. Desfontaines.

4. *L. ater*, thorace elytrisque scabris, fuscis, femoribus anticis incrassatis. *melanocephalus*.

Curculio melanocephalus. Ent. syst. suppl. 168. 101. *

Habitat in Isle de France. D. Daldorff.

Rostrum breue. Forte potius *Curculio*. *C. brunneipes* affinis videtur.

5. *L. cylindricus*, subcinereus, thorace lineis tribus *filiformis*.
fuscis.

Curculio filiformis. Ent. syst. 2. 417. 102. *

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

6. *L. cylindricus*, supra niger, elytris acuminatis: *cylindricus*.
fascia nigra pallida.

Curculio cylindricus. Ent. syst. 2. 417. 103. *

Oliv. Inf. 83. fig. 123.

Habitat in Sibiria. Mus. D. Banks.

7. *L. thorace fusco*: punctis quatuor albis, elytris *notatus*.
fuscis: fascia sesquialtera testacea.

Curculio notatus. Ent. syst. 2. 417. 104.

Habitat in Barbariae plantis. Dom. Prof. Vahl.

8. *L. niger*, rostro barbato, tibiis anticis tridentatis. *barbirostris*.

Curculio barbirostris. Ent. syst. 2. 418. 105.

Oliv. Inf. 83. fig. 37.

Seb.

Seb. Mus. 4. tab. 95. fig. 5.

Habitat in Indiis.

ampbora. 19. *L. cylindricus*, griseo-villosus, rostro, pedibus abdomineque ferrugineis.

Habitat Algirae. Dom. de Rehbinder.

Statura et magnitudo *L. angustati*. Rostrum incurvum, cylindricum, ferrugineum. Thorax griseo-villosus. Elytra obscuriora, hinc inde griseo-villosa. Abdomen et pedes ferrugineos. Elytra apice rotundata.

angustatus 20. *L. cylindricus*, ater, elytris obtusis, punctatis

Curculio angustatus Ent. syst. 2. 418. 106.

Herbst. Arch. tab. 24. fig. 7.

Roff. Fn. Etr. 1. III. 283.

V. 70 Panz. Fn. Germ. 42. tab. 12.

Habitat in Anglia.

Pica.

21. *L. cylindricus*, niger, albo-variegatus, pedibus anticis elongatis.

Curculio Pica. Ent. syst. suppl. 197. 106. *

Habitat in Isle de France. Dom. Daldorff.

Bardanae. 22. *L. cylindricus*, griseo-tomentosus, pedibus anticis elongatis.

Curculio Bardanae. Ent. syst. 2. 418. 107. *

V. 55 Panz. Fn. Germ. 18. tab. 3.

Habitat in Saxoniae Bardana. Mus. Dom. Romae

truncatulus.

23. *L. cylindricus*, fuscus, obscurus, elytris punctato-striatis, rostro truncato.

Curculio truncatulus Ent. syst. suppl. 167. 107

Habitat in India orientali. Dom. Daldorff.

voluulus.

24. *L. cylindricus*, fuscus, elytris castaneis, griseo-variis.

Curculio voluulus. Ent. syst. suppl. 167. 107.

Habitat in India orientali. Dom. Daldorff.

5. *L. cylindricus*, supra ferrugineus, subtus cinereus, abdomine nigro, punctato. *algirus.*

Habitat Algirae. Dom. de Rehbinder.

Statura praecedentium. Caput ferrugineum, rostro cylindrico, apice nigro. Thorax scaber, ferrugineus. Elytra ferruginea, atomis. vix conspicuis, griseis, striata, puncto tamen baseos maiori, distincto. Subtus cinereus, abdomine punctis numerosis, subocellaribus, nigris.

6. *L. cylindricus*, ater, lateribus subcoeruleo-*Afcanii.*
tibus.

Curculio Afcanii. Ent. syst. 2. 418. 108.

Linn. syst. Nat. 2. 610. 36.

Oliv. Inf. 83. fig. 83.

Panz. Fn. Germ. 42. tab. 13.

Herbst. Arch. tab. 24. fig. 8.

Habitat in Europa australiori.

7. *L. ater*, thoracis lateribus elytrorumque striis *albostriatus.*
albis.

Habitat in Guinea. D. Hesse. Mus. D. Lund.

Statura et magnitudo *L. Afcanii*. Rostrum arcuatum, vti thorax laevis, ater, lateribus late cinereis. Elytra striata, striis tribus approximatis, in medio marginali abbreviata albis. Corpus atrum, albo-varium. Pedes picei.

8. *L. cylindricus*, niger, elytris vitta testacea. *lineola.*

Curculio lineola. Ent. syst. 2. 419. 109.

Oliv. Inf. 83. fig. 135.

Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

9. *L. elongatus*, ater, thorace linea dorsali alba, *clauipes.*
pedibus elongatis piceis: femoribus eleuatis.

Habitat in noua Cambria. D. Billardière.

Statura praecedentium. Caput atrum, rostro incuruo. Thorax punctatus, ater: linea dorsali alba.

alba. Elytra punctato-striata, atra. Corpus lateribus albo-tomentosis. Pedes simplices, elongati, picei, femoribus clauatis.

crassipes. 30. L. femoribus anticis subclauatis, corpore atro.
Curculio crassipes. Ent. syst. 2. 419. 110. *
 Habitat Strasburgi. Mus. D. Prof. Hermann.

Atriplicis. 31. L. elongatus, ater, thorace nitido, elytris striatis obtusis.

Curculio Atriplicis. Ent. syst. 2. 419. 112. *

Curculio T. album. Linn. syst. Nat. 2. 609. 23

Fn. Sv. 594.

Payk. Monogr. 52. 49.

Fn. Sv. 3. 243. 62.

Herbst. Col. 6. 67. 31.

Habitat in Atriplicis littorali Florae Kiloniensis

Mus. D. Lund.

Lymexylon. 32. L. elongatus, griseus, thorace scabro, elytris striatis.

Curculio Lymexylon. Ent. syst. 2. 420. 113. *

Pl. 56. Panz. Fn. Germ. 18. tab. 11.

Payk. Monogr. 41. 38.

Fn. Sv. 3. 240. 59.

Herbst. Col. 6. tab. 76. fig. 9.

Habitat in Germaniae ligno quercino. D. Prof. Helwig.

** *Femoribus dentatis.*

caliginosus 33. L. femoribus dentatis, ater, elytrorum striis punctatis approximatis.

Curculio caliginosus. Ent. syst. 2. 427. 140. *

Habitat in Anglia. Mus. Britt.

dubius. 34. L. femoribus dentatis, niger, thorace laevi, elytris striatis scabris.

Curculio dubius. Ent. syst. 2. 427. 141. *

Habitat - - Dr. Schulz.

6. *L. femoribus dentatis, fuluo-irroratus, pedibus roreus, anticis elongatis.*
Curculio roreus. Ent. syst. 2. 427. 142. *
 Habitat in Cayenna. D. v. Rohr.
7. *L. femoribus dentatis, brunneus, rostro fusco, brunneus, elytris testaceis punctato-friatis.*
Curculio brunneus. Ent. syst. 2. 427. 143.
 Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.
8. *L. femoribus dentatis, oblongus, piceus, elytris reticulatis: fasciis obliquis pallidis, tibiis anticis spinosis.*
Curculio reticulatus. Ent. syst. 2. 429. 148. *
 Habitat Tranquebariae. Dr. Koenig.
9. *L. femoribus dentatis, niger, thorace trilobo trilobus, scabro, elytris punctato-friatis brunneis.*
 Habitat in Guinea. D. Meyer. Mus. D. Lund.
 Statura et magnitudo praecedentis. Rostrum breviusculum, subincursum, nigrum. Thorax trilobus, scaber, niger, linea vna alteraque, obsoleta alba. Elytra punctato-friata, brunnea. Corpus cinereo-villosum, pedibus nigris: femoribus dentatis.
10. *L. femoribus dentatis, niger, albo-lineatus, abdomine prominente acuto.*
 Habitat in Sumatra. D. Daldorf. Mus. D. de Sehestedt.
 Statura cylindrica L. filiformis. Rostrum porrectum, rectum, cylindricum, obscure ferrugineum. Antennae fractae, ferrugineae, apice parum albicantes. Thorax planus, laevis, niger, lineis duabus dorsalibus, lateralique albis. Elytra punctato-friata, abbreviata, obscura: linea ad futuram atomisque plurimis albis. Corpus albo-villosum, abdomine valde prominente,

nente, acuto. Pedes nigri, femoribus acute dentatis.

~~attenuatus~~

40. L. femoribus dentatis, ater, nitidus, elytris femoribusque apice spinosis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Corpus valde elongatum, tenue. Rostrum cylindricum, longitudine corporis; atrum, antennis articulo secundo reliquis omnibus longiore, in medio rostri inserto. Caput minutum. Thorax cylindricus, laevis, ater, nitidus. Elytra cylindrica, laevis, atra, nitida, pilis rarioribus adspersa, apice spina valida, acuta. Pedes elongati, nigri, femoribus dentatis, apice unispinosis.

~~Antelope.~~

41. L. femoribus dentatis, ater, nitidus, thorace varioloso, femoribus clauatis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Statura omnino praecedentis, at paullo minor et distinctus. Rostrum elongatum, longitudine corporis incuruum. Thorax globosus, variolosus, pilosus. Elytra laevis, atra, nitida, apice inermia. Pedes elongati, femoribus dentatis, clauatis apice muticis.

~~Gazella.~~

42. L. femoribus dentatis, pilosus, ater, nitidus, rostro thorace breuiore.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Statura praecedentium. Corpus elongatum, pilosum, atrum. Rostrum thorace breuius, cylindricum, rectum. Thorax pilosus, gibbus. Elytra gibba, pilosa, laevis, immaculata. Corpus atrum, abdominis margine basi albido. Pedes elongati, pilosi, nigri.

Alius

Alius rostro thorace longiori simillimus, nullo modo differt.

3. L. femoribus dentatis, thorace elongato, tibiis *elongatis*.
anticis bidentatis.

Curculio elongatus. Ent. syst. 2. 445. 215.

Habitat in Iamaica. D. Drury.

Species mihi obscura.

62. CVRCVLIO. *Palpi* quatuor, breuissimi:
articulo ultimo longiori, subulato.

Maxilla breuis, apice dilatata, truncata.

Antennae fractae, rostro breui, insidentes.

Femoribus muticis.

4. C. corpore viridi, argenteo auroque maculato. *argyreus*.

Ent. syst. 2. 448. 229.

Curculio argyreus. Linn. syst. Nat. 2. 615. 74.

Mus. Lud. Vlr. 54.

Habitat in Indiis.

5. C. elytris striatis, auro-maculatis, basi gibbis, apice *splendidus*.
acuminatis. Ent. syst. 2. 448. 230.

Habitat in Brasilia. Mus. D. Banks.

3.

Curculionis corpus oblongum, crassum, immarginatum, tardum; *capite* paruo, inserto, antice porrecto in rostrum breue, crassum, obtusum utrinque sulco obliquo, ad receptionem secundi antennarum articulo: *oculis* paruis, oblongis, lateralibus ad basin rostri; *antennis* thorace breuioribus: articulo secundo longissimo, reliquis subaequalibus, ultimis crassioribus: claua acutiuscula; *thorace* rotundato, antice parum attenuato; *scutello* nullo; *elytris* rigidis, inclinentibus, longitudine abdominis; *pedibus* validis, cursoriis; *tarsis* quadriarticulatis; *colore* vario.

- imperialis*. 3. *C. elytris ftriis eleuatis; atris fulcisque punctata viridi-aureis alternis, basi gibbis, apice acuminatis.* Ent. syst. 2. 449. 231.
 Drury Inf. 2. tab. 33. fig. 1.
 Oliv. Inf. 83. fig. 1.
 Hübner. Naturf. 10. tab. 7. fig. 1.
 • Habitat in America meridionali et Brasilia.
- sumptuosus* 4. *C. elytris virefcentibus: punctis eleuatis atris basi gibbis.* Ent. syst. 2. 449. 232. *
Curculio sumptuosus. Oliv. Inf. 83. tab. 1. f. 13.
 Habitat in Cayenna.
- Cbryfis.* 5. *C. albidus, elytris acuminatis: fasciis duabus punctisque duobus aureis.* Ent. syst. 2. 449. 233. *
Curculio Cbryfis. Oliv. Inf. 83. tab. 1. fig. 6.
 Habitat in India orientali. Mus. Gallic.
- regalis.* 6. *C. corpore viridi-sericeo: fasciis aureis repandis.* Ent. syst. 2. 449. 234. *
Curculio regalis. Linn. syst. Nat. 2. 616. 75.
 Oliv. Inf. 83. tab. 1. fig. 8.
 Habitat in Indiis.
- marginatus.* 7. *C. fuscus, elytrorum futura abdominisque marginibus aureis.* Ent. syst. 2. 449. 235. *
 Oliv. Inf. 83. fig. 82.
 Habitat in Cayenna. Mus. Dr. Hunter.
- aeneus.* 8. *C. aeneus, elytris laeuiffimis, postice viridimaculatis.*
 Habitat in Amboina. D. Billardiere.
 Paulo minor, quam *C. regalis*. Antennae nigrae, claua cinerea. Caput aeneum, nitidum: rostrum breui nigro. Thorax gibbus, globosus, laeuiffimus, aeneus, nitidus. Elytra laeuia, aenea, nitida, postice punctis variis lineaque marginibus viridibus. Corpus atrum, vtrinque viridimaculatum. Pedes atris, cyaneo-nitiduli.

- . *C. canescens*, thorace punctis nigris quatuor, co-^{19 puncta-}
leoptris nouemdecim. Ent. syst. 2. 450. 236. * ^{tus.}
Oliv. Inf. 83. fig. 25.
Habitat in Cayenna. D. Mauduit.
- o. *C. coerulescens*, thorace punctis nigris quatuor, ^{16 puncta-}
coleoptris sedecim. Ent. syst. 2. 450. 237. * ^{tus.}
Curculio 16punctatus. Linn. syst. Nat. 2. 618.
92. Mus. Lud. Vlr. 58.
Oliv. Inf. 83. fig. 17.
Habitat in Brasilia.
1. *C. supra fuscus*, thorace coleoptrisque vittis *decorus*.
duabus viridi-aureis. Ent. syst. 2. 450. 238. *
Curculio decorus. Oliv. Inf. 83. fig. 152.
Habitat in Brasilia. Mus. D. Banks.
2. *C. variolosus*, niger, atomis aureis numerosissi-^{prodigus.}
mis. Ent. syst. suppl. 170. 238. *
Habitat in Tanger. D. Schousboe.
3. *C. viridi-squamosus*, elytris punctatis. Ent. syst. *nitidulus*.
2. 451. 239. *
Curculio nitidulus. Oliv. Inf. 83. fig. 38.
Habitat in Cayenna.
4. *C. elytris spinosis albis: macula laterali fusca. candidus*.
Ent. syst. 2. 451. 240. *
Oliv. Inf. 83. tab. 13. fig. 135.
Habitat in Cayenna. D. Mallet.
5. *C. capite albido, thorace rugoso, elytris puncta- pauperatus*
to - striatis viridibus.
Habitat in Sumatra. D. Daldorff. Mus. D. Lund.
Statura omnino *C. candidi*, at duplo maior. An-
tennae breues, crassae, fractae, albiae: arti-
culo ultimo crassiori, nigro. Caput canalicula-
tum, albidum, fusco purum irroratum. Tho-
rax cylindricus, canaliculatus, rugis transuer-
sis inaequalis, viridis, striis tribus latis, fuscis.
Elytra

Elytra punctato-friata, viridia: futura fusca
Corpus viridi-squamosum.

mutuus.

16. *C. cinereus*, thorace rugoso, elytris friatis: vitta media obsoleta lateribusque viridi-albis.

Habitat in Iaua. Mus. D. Bose.

Affinis videtur *C. pauperato*. Corpus crassum ouatum. Rostrum breue, crassum, canaliculatum, apice late emarginatum. Thorax rugosus transuersalibus inaequalis, cinereus, lineis quatuor viridi-albidis. Elytra striata: striis punctatis, cinereus: vitta parua media, obsoleta margineque late viridi-albis. Corpus cum pedibus cinereum.

niueus.

17. *C. niueus*, thoracis dorso rostroque fuscis, elytris spinosis acuminatisque. Ent. syst. 2. 451. 241. *

Oliv. Inf. 83. fig. 173.

Habitat in Cayenna. Mus. Dr. Hunter.

lacteus.

18. *C. albus*, auro-nitidulus, elytris fulcatis, acuminatis. Ent. syst. 2. 451. 242. *

Oliv. Inf. 83. fig. 172.

Habitat in Iamaica. Mus. Dr. Hunter.

puluerulentus.

19. *C. villosus*, virescens, elytrorum margine puluerulento, ferrugineo, capite plano, canaliculato. Ent. syst. 2. 452. 243. *

Habitat Tranquebariae. Mus. D. de Sehestedt.

squamosus.

20. viridi-squamosus, rostro thoraceque canaliculatis. Ent. syst. 2. 452. 244. *

Habitat in China, in India orientali. Mus. D. de Sehestedt.

rusticus.

21. *C. villosus*, cinereus, rostro subcarinato.

Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff.

Affinis omnino *C. unicolori*, at alius. Corpus tum villosum, cinereum. Antennae breues. c.

nerca

nerae. Rostrum haud canaliculatum, sed parum carinatum.

2. *C. cinereo-pubescens*, rostro canaliculato, antennarum clava apice acuminata, atra. *unicolor*.

Habitat in Sumatra. D. Daldorff.

Paullo maior *C. squamoso*, totus pube cinerea tectus, immaculatus. Antennae breves, clava apice valde acuminata, atra. Rostrum canaliculatum. Elytra punctato-friata.

13. *C. cylindricus*, niger, elytris puncto baseos apicisque viridi. *moratus*.

Curculio moratus. Ent. syst. suppl. 171. 244.*

Habitat in Isle de France.

24. *C. albus*, elytris fulcatis, vni-spinosis acuminatis-que. Ent. syst. 2. 452. 245.* *cretaceus*.

Habitat in Insula Guadeloupe. D. de Badier.

25. *C. cinereus*, elytris puncto baseos duobusque apicis albis. Ent. syst. 2. 452. 246.* *cinerascens*.

Habitat in Cayenna. Mus. D. Gigot d'Orcy.*

26. *C. virefcens*, elytris punctatis: spina antica posticaque erecta valida. Ent. syst. 2. 452. 247.* *smaragdulus*.

Habitat in Cayenna. D. v. Rohr.

27. *C. cinereo fufcoque varius*, coleoptris punctatis postice gibbis: tuberculis octo. Ent. syst. 2. *stuberculus*.

453. 248.

Habitat in Cayenna. D. v. Rohr.

28. *C. capite thoraceque obscure ferrugineis*, elytris fuscis: punctis maculisque albis. Ent. syst. 2. *seruus*.

453. 249.*

Habitat in Cayenna. D. v. Rohr.

Simillimus in Museo D. Lund, totus ater, punctis elytrorum albidis, vix distinctus.

29. *C.*

- innocuus.* 29. *C. albidus*, thorace rugoso, elytris punctate-friatis.
Habitat in Mogador. D. Schousboe. Mus. D. de Sehestedt.
Corpus totum albidum, immaculatum. Thorax rugosus. Elytra punctis impressis friata, nec spinosa, nec acuminata.
- modestus.* 30. *C. cinereus*, thorace elytrisque fusco-maculatis.
Ent. syst. 2. 453. 250. *
Curculio modestus. Oliv. Inf. 83. fig. 178.
Habitat in noua Zelandia. Mus. D. Banks.
- flauescens.* 31. *C. obscurus*, thoracis elytrorumque acuminatorum lateribus flauis. Ent. syst. 2. 454. 251. *
Habitat in America meridionali. D. Schreber.
- pollinosus.* 32. *C. squamoso-flauescens*, elytris acuminatis.
Ent. syst. 2. 454. 252. *
I. 59 Panz. Fn Germ. 19. tab. 4.
Habitat in Austria. D. Schneider.
- lateralis.* 33. *C. viridi-squamosus*, thoracis elytrorumque lateribus flauis. Ent. syst. 2. 454. 253. *
Habitat in India orientali. Mus. D. Lund.
- viridis.* 34. *C. virescens*, thoracis elytrorumque lateribus flauis. Ent. syst. 2. 454. 254. *
Linn. syst. Nat. 2. 616. 76.
Oliv. Inf. 83. fig. 18.
Degeer Inf. 5. 256. 45.
Sulz. Inf. tab. 3. fig. 24.
Schaeff. Icon. tab. 53. fig. 6.
Payk. Monogr. 107. 103.
Fn. Sv 3. 301. 24.
Bonsd. Curc. 22. 6.
Herbst. Col. 6. tab. 69. fig. 4.
Habitat in Germaniae Pomona.

5. *C. virescens*, thoracis dorso fulvo. Ent. syst. *fellatus*.
 suppl. 171. 255. *
 Habitat in Russia meridionali. Dom. Boeber.
6. *C. virescente-albus*, elytris basi videntatis, postice gibbosis. Ent. syst. 2. 454. 255. *
Curculio gibber. Oliv. Inf. 83. fig. 189.
 Pallas Icon. tab. B. fig. 54.
 Habitat in Cayenna. Mus. Dr. Hunter.
7. *C. fulvus*, capite basi pedibusque fuscis, rostro fulvus.
 emarginato. Ent. syst. 2. 455. 256. *
 Habitat in Saxonia. Dom. Hybner.
8. *C. fuscus*, thoracis elytrorumque margine cinereo. Ent. syst. 2. 455. 257. *
 Panz. Fn. Germ. 19. tab. 5. II. 59
 Habitat in Germania. Dom. Schneider.
9. *C. corpore ferrugineo, auro-maculato*. Ent. syst. *aurifer*.
 2. 455. 258. *
Curculio aurifer. Oliv. Inf. 83. fig. 124.
 Brown. Jamaic. 429. tab. 43. fig. 3.
 Drury. Inf. 1. tab. 32. fig. 1.
 Habitat in Americae meridionalis Insulis.
10. *C. albus*, elytris vitta abbreviata, dentata, pedibusque cyaneis. Ent. syst. 2. 455. 259. *
Curculio cyanipes. Oliv. Inf. 83. fig. 190.
 Habitat in Cayenna. Mus. Dr. Hunter.
11. *C. thorace fusco, albo-lineato, elytris cinereis, repandus*.
 fusco-fasciatis: margine corporeque viridibus,
 nitidis. Ent. syst. 2. 456. 260. *
 Habitat in Italia. Dom. de Schlangbusch.
12. *C. viridi-nitens*, elytris viridi-ferrugineo, nigro cinereoque variis. Ent. syst. 2. 456. 261. *
Curculio Tamarisci. Oliv. Inf. 83. fig. 71.
 Habitat in Africae Tamarisco. Dom. Prof. Vahl.

- splendidulus.* 43. *C. viridi-nitens*, coleoptrorum disco cinereo nigro, fasciato. Ent. syst. 2. 456. 262. *
Habitat in Sibiria. Mus. D. Banks.
- curvipes.* 44. *C. argento-squamosus*, tibiis posticis arcuatis intus dentatis, ciliatis. Ent. syst. 2. 456. 263.
Curculio curvipes. Oliv. Inf. 83. fig. 84.
Habitat in India orientali. Mus. D. Lund.
Femina tibiis posticis simplicibus.
- morbillosus* 45. *C. thorace elytrisq. fusco cinereoq. variis punctis elevatis, atris, numerosis.* Ent. syst. 2. 457. 264.
Habitat in Gallia, Barbaria.
- nebulosus.* 46. *C. canus*, elytris fasciis obliquis, nigris. Ent. syst. 2. 457. 265.
Linn. syst. Nat. 2. 617. 84. Fn. Sv. 635.
Geoff. Inf. 1. 278. 1. tab. 4. fig. 8.
Degeer Inf. 5. 241. 27.
Sahaeff. Icon. tab. 25. fig. 3.
Erish. Inf. 11. 32. tab. 23. fig. 5.
Payk. Monogr. 104. 161.
Fn. Sv. 3. 298. 122.
Bonsd. Curc. suec. 20. 3.
Herbst. Coleopt. 6. tab. 64. fig. 8.
Habitat Larua in foliis Salicis, imago in collibus lapidosis.
- roridus.* 47. *C. oblongus*, nigricans, elytris fasciis abbreviatis punctisque albis. Ent. syst. 2. 457. 266. *
Curculio roridus. Pall. Icon. tab. A.
Habitat in Austria. Dom. Schneider.
- cinereus.* 48. *C. cinereus*, thoracis lineis corporeque fuscis.
Curculio cinereus. Schrank. Austr.
Habitat in Austria. Dom. de Meyerle.
Statura et magnitudo omnino *C. nebulosi*. Antennae nigrae, claua apice cinerascens. Rostellum

breue, crassum, supra cinerascens: linea media parum eleuata. Thorax laeuis, cinereus: lineis tribus latis, fuscis. Elytra cinerea, futura fusca. Corpus et pedes fusca.

9. *C. fuscus*, elytris cinereo-variis, rostro pedibus-*senilis*. que nigris.

Habitat in Austria. Dom. de Meyerle.

Statura praecedentis. Antennae nigrae, claua cinerascente. Rostrum breue, crassum, cylindricum, nigrum. Thorax vix scaber, fuscus: linea laterali lineolisque tribus dorsalibus, obsoletis, cinereis. Elytra laeuis, fusca, cinereo valde variegata. Corpus fuscum, pedibus nigris.

- o. *C. thorace nigro, scabro, albo-lineato, elytris al-* *marmorabis: maculis nigris, sparsis, subquadratis. Ent. tus.* *syft. 2. 458. 267.*

Habitat in Germaniae lapidosis.

- i. *C. oblongus, cinereus, subnebulosus, rostro tri-* *fulcivostri* *fulcato. Ent. syft. 2. 458. 268.*

Linn. syft. Nat. 2. 617. 85.

Degeer Inf. 5. 240. 26.

Oliv. Inf. 83. fig. 24.

Schaeff. Icon. tab. 25. fig. III.

Payk. Monogr. 103. 100.

Fn. Sv. 3. 297. 121.

Bonsd. Curc. suec. 21. 4.

Habitat in Europae plantis.

- ii. *C. nigricans, cinereo-variis, capite retuso, ro-* *porculus* *stroque carinato. Ent. syft. 2. 458. 269. **

Curculio porculus. Act. suec. 6. tab. 2. fig. 20.

Habitat in Hungaria. Dom. Hybner.

- iii. *C. cinereus, thorace antice vtrinque retuso, ely-* *retusus* *tris fascia fusca, pedibus anticis elongatis.*

Habitat in Guinea. Dom. Meier. Mus. D. de Seheftedt.

Statura magna C. emarginati. Rostrum planum, cinereum, bifulcatum. Thorax cinereus, dorso obscuro, antice vtrinque valde retuso. Elytra striata, cinerea: fascia pone medium nigra. Corpus cinereum, pedibus anticis elongatis.

emarginatus. 54. C. oblongus, fuscus, coleoptrorum dorso cinereo: lineis duabus punctorum impressorum atrorum. Ent. syst. 2. 458. 270.*
Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

perlatus. 55. C. niger, abdomine albo: punctis elevatis, glabris, atris, rostro fulcato. Ent. syst. 2. 459. 271.*
Habitat in China. Mus. D. de Seheftedt.

distinctus. 56. C. griseus, elytris punctis duobus distinctis albidis: anteriore didymo. Ent. syst. 2. 459. 272.
Habitat in Hungaria. Dom. Hybner.

glaucus. 57. C. rostro carinato, thoraceque inaequali obscuris, elytris glaucis: puncto postico elevato. Ent. syst. 2. 459. 273.
Panz. Naturf. 24. 22. 30. tab. 1. fig. 30.
Fn. Germ. 19. tab. 6.
Habitat Kiliae. D. Daldorff.

obliquus. 58. C. cinereus, elytrorum dorso albo: strigis obliquis punctoque postico fornicato nigris. Ent. syst. 2. 460. 274.
Habitat in Germania.

Os maxillis palpisque. *Palpi* quatuor subaequales, breuissimi; *anteriores* vix longiores, quadriarticulati: articulis tribus prioribus, brevissimis, aequalibus, rotundatis, quarto longiori subulato, adhaerentes maxillae dorso; *posterior*

riores vix breuiores, triarticulati, adnati ligulae basi. *Mandibula* breuis, lata, fornicata, incurua, apice tridentata. *Maxilla* breuissima, cornea, integra, apice latior, truncata, ciliata. *Ligula* breuissima, membranacea, integra. *Labium* breue, transuersum, corneum.

9. *C. oblongus*, fuscus, elytris albidis: fascia media lituraque baseos apicisque fuscis. Ent. syst. albidus.

2. 460. 275.

Curculio niueus. Bonsd. Curc. suec. 21. 5.

Curculio candidus. Herbst. Arch. 33. 75. tab.

24. fig. 31.

Panz. Fn. Germ. 19. tab. 7.

Payk. Monogr. 106. 102.

Fn. Sv. 3. 300. 123.

Herbst. Col. 6. 80. 42.

Habitat in Germaniae plantis.

II. 60

10. *C. oblongus*, fuscus, villis cinereis, maculatus. *diffus.*

Ent. syst. 2. 460. 276. *

Habitat in India orientali. Prof. Abildgaard.

11. *C. thorace tuberculis duobus compressis, elytris bicristatus*
fstriatis tuberculatisque apice cinereis.

Habitat in noua Cambria. Dom. Billardiere.

Statura et magnitudo *C. crenulati*. Caput cinereum, rostro breui, fusco. Thorax punctatus, fuscus, lateribus parum cinerascens, cristis duabus eleuatis, compressis, erectis. Elytra striata: striis punctatis, fusca, apice cinerea, tuberculo duplici pari ad basin, solitarioque vno ante apicem et altero in apice cinereo. Corpus cinereum, femoribus posticis annulo fusco.

12. *C. griseus*, elytris rugosis, nigris, cinereo-maculatis, rostro atro. Ent. syst. 2. 460. 477. *

Habitat Tranquebariae. Mus. D. Lund.

lusitanicus 63. *C. oblongus*, supra fuscus, elytris macula basica
alba. Ent. syst. 2. 460. 278. *

Curculio lusitanicus. Oliv. Inf. 83. tab. 16. fig.
202.

Habitat in Lusitania. Dr. Gray.

crenulatus. 64. *C. cinereus*, elytris lineis elevatis tribus crenu-
latis, atris. Ent. syst. 2. 461. 279. *

Curculio crenulatus. Oliv. Inf. 83. fig. 729.

Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

punctatulus. 65. *C. niger*, elytris punctis nigris albisque alternis
holosericeis, striatis. Ent. syst. 2. 461. 280.

Oliv. Inf. 83. fig. 119.

Habitat in Terra noua Americæ. Mus. D. Banks.

incanus. 66. *C. oblongus*, fuscus, thoracis dorso plano. Ent.
syst. 2. 461. 281.

Linn. syst. Nat. 2. 610. 81. Fn. Sv. 631.

Geoff. Inf. 1. 282. 10.

H. G. Panz. Fn. Germ. 19. tab. 8.

Bonrd. Curc. fuc. 41. 36.

Degeer Inf. 5. 242. 28.

Payk. Monogr. 102. 99.

Fn. Sv. 3. 296. 120.

Herbst. Col. 6. tab. 77. fig. 3.

Habitat in Europæ plantis.

articulatus 67. *C. ater*, thorace punctato, rostro basi articulat
Ent. syst. 2. 461. 282.

Habitat in Austria. Dom. Schneider.

costatus. 68. *C. cinereus*, thorace nigro: lineis quatuor cin-
reis. Ent. syst. 2. 462. 283. *

Habitat in Gallia australiori. Mus. D. Banks.

melanobolus. 69. *C. fuscus*, elytris tibiisque testaceis. Ent. syst.
2. 462. 284.

Habitat in Germania. D. Smidt.

C. obscurus, coleoptrorum fascia interrupta al-^{inter-}ba. Ent. syst. 2. 462. 285. * ^{ruptus.}

Curculio interruptus. Oliv. Inf. 83. fig. 122.

Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

C. ater, elytris crenato-striatis, pedibus anticis *scutellaris*.
elongatis. Ent. syst. 2. 462. 286. *

Curculio scutellaris. Oliv. Inf. 83. fig. 142.

Habitat in Terra Diemenii. Mus. D. Banks.

C. fuscus, thoracis margine punctisque duobus *longima-*
ferrugineis, pedibus anticis elongatis. Ent. ^{mus.}
syst. 2. 462. 287. *

Curculio longimanus. Oliv. Inf. 83. fig. 114.

Habitat in Brasilia. Mus. D. Banks.

C. cinereus, fusco-irroratus, thorace acute spi-*spinifex*.
noso. Ent. syst. 2. 463. 288. *

Curculio Inderiensis. Pall. Icon. tab. B. fig. 5.

Habitat in Russia meridionali. Dr. Schulze.

C. cinereus, thorace trifurcato, elytris gibbis, *Echinus*.
striatis, multituberculatis.

Habitat in Guinea. D. Meier. Mus. D. Lund.

Magnitudo *C. spinificis*. Antennae pilosae, cinereae, claua parua, fusca. Thorax planus, fulcis tribus abbreviatis, impressus. Elytra gibba, striata, tuberculis plurimis, eleuatis; posticis duobus maioribus. Corpus cinereum.

C. fusco-aureus, pedibus ferrugineis. Ent. syst. *micans*.
2. 463. 289. *

Curculio Pyri. Payk. Monogr. 85. 82.

Curculio micans. Payk. Fn. Sv. 3. 302: 125.

Bonsd. Curc. 24. 8.

Herbst. Col. 6. tab. 78. fig. 3.

Panz. Fn. Germ. 19. tab. 9.

Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 11.

Habitat in Daniae hortis. Mus. D. de Sehestedt.

murinus 76. *C. fuscus*, thorace trilineato, elytris pallido-fri-
tis nigroque punctatis. Ent. syst. 2. 463. 29
Habitat in Germania. D. Smidt.

Polygoni. 77. *C. thorace lineato*, elytris cinereis: lineo-
fucis futuraque nigro-punctata. Ent. syst.
464. 291. *

Linn. syst. Nat. 2. 609. 26. Fn. Sv. 597.

Oliv. Inf. 83. fig. 41.

II. 61. Panz. Fn. Germ. 19. tab. 10.

Payk. Monogr. 42. 39. β.

Habitat in Europae Polygono.

dilatatus. 78. *C. cinereus*, thorace inaequali marginato, ely-
tris fulcatis, postice videntatis.

Habitat in Tanger. D. Schousboe. Mus. D. Lun.

Statura fere Opatri. Rostrum breue, valde sulca-
tum. Thorax cinereus, linea antica transuersa
lineolisque duabus transuersis incuruis eleua-
tis margineque dilatato. Elytra cinerea, sulca-
ta: sulcis striis duabus punctorum impressio-
rum. Stria eleuata intermedia, abbreviata po-
stice dentem format. Corpus cinereum.

tomentosus 79. *C. pilosus*, obscurus, rostro plano, elytris pu-
ctato-striatis.

Habitat in Guinea. D. Meier. Mus. D. de Sebest.

Statura et magnitudo *C. grisei*. Antennae cin-
reae, claua parua, fusca. Rostrum breue, pu-
num, obscurum, villosum. Thorax planus.
Pilosus, obscurus, dorso obsolete bifurcato.
Elytra hirta, obscura, striato-punctata, apice
acuminata. Corpus cinereum.

griseus. 80. *C. supra griseo-fuscus*, subtus cinereus, re-
canaliculato. Ent. syst. 2. 464. 292. *

Habitat in Anglia et Italia.

fritillum. 81. *C. griseus*, elytris nigro-punctatis. Ent. 8

II. 64. suppl. 175. 292.

Curculio fritillum. Panz. Fn. Germ. 18. tab. 19.

Habitat in Germania. Dr. Panzer.

82. *C. obscure brunneus*, thorace lineis duabus, elytris macula laterali virescentibus, pedibus anticis longioribus. *rubiginosus.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Statura et magnitudo *C. incani*. Antennae longitudine fere corporis nigrae. Rostrum breue, planum. Thorax brunneus, lineis duabus latis, virescentibus. Elytra striata, obscure brunnea, litura parua in ipsa basi maculaque oblonga in medio marginis exterioris virescentibus. Corpus cinereum. Pedes nigri, femoribus clavatis, antici longiores.

83. *C. nigricans*, elytris griseis: maculis duabus *3guttatus.* albis; posteriore maiore communi. Ent. syst. 2. 464. 293. *

Petiv. Gazoph. tab. 50. fig. 8.

Schaeff. Icon. tab. 43. fig. 9.

Sulz. Inf. tab. 4. fig. 11.

Habitat in Anglia.

84. *C. fasciis*, thorace elytrisque scabris cinereo-lineatis, elytris ante apicem videntatis. *Meyerlaei.*

Habitat in Austria. D. Scheidler.

Statura *C. moerentis*, at maior. Rostrum fuscum, subcarinatum. Thorax rotundatus, punctis elevatis, scaber, fuscus, lineis tribus laevibus, cinereis. Elytra scabra, fusca, lineis tribus laevibus, cinerascens, ante apicem declivata, dente in medio unico, elevato. Pedes nigri. *VIII. 54.*

85. *C. lutescens*, thorace lineis duabus dorsalibus *Arundinis* fuscis. Ent. syst. 2. 464. 294.

Curculio luteus. Knoch. Beytr. 1.

II. 61.

Panz.

Panz. Fn. Germ. 19. tab. 11.

Habitat in Germaniae Arundine. D. Prof. Helwi

plagiatus.

86. *C. obscurus*, elytris rugoso-friatis, femoribus clauatis rufis.

Habitat in Insula Chorfo. D. de Meyerle.

Nimis affinis videtur *C. 2sulcato*, at distinctus duplo fere maior. Caput atrum, rostro breui crasso dorso bifulcato, villoso. Thorax obscurus, vix scaber. Elytra rugosa, striata, obscura, feminae depressa, plana, lateribus griseis. Pedes nigri, femoribus clauatis, rufis.

Goerzenfis

87. *C. obscurus*, scaber, femoribus omnibus clauatis rufis.

Habitat in Austria. D. de Meyerle.

Statura omnino *C. scabrati*, at duplo maior. Caput atrum, rostro breui, crasso, bifulcato. Thorax et elytra obscura, punctis eleuatis numerosissimis, atris, scabra. Pedes nigri, femoribus clauatis, rufis.

IX.

scabratus.

88. *C. cinereus*, punctis eleuatis atris.

Habitat in noua Cambria. D. Billardiere.

Statura *C. geminati*, at duplo maior. Antennae nigrae, articulo primo valde elongato, incuruo. Caput et thorax cinerea, punctis plurimis eleuatis, atris. Elytra striata, cinerea, punctis plurimis eleuatis, sparsis, atris. Pedes cinerei, femoribus clauatis, inermibus.

sulphurifer 89. *C. scaber*, cinereus, flauo-puluerulentus, pedibus nigris.

Curculio sulphurifer. Herbst. Col. 6.

Habitat in Austria. D. de Meyerle.

Statura omnino *C. Goerzenfis*, at paullo minor. Corpus totum punctis paruis, eleuatis scabrum, cinereum, puluere flauescente adpersum. Pedes omnes nigri, femoribus clauatis.

90.

IX.

1. *C. laevis, ater, immaculatus.*
Curculio dignus. Herbst. Col. 6. *dirius* *glabratus.*
 Habitat in Austria. D. de Meyerle.
 Corpus magnum, atrum, glabrum, omnino immaculatum. Rostrum breue, crassum, lineola parua, vtrinque impressa.
1. *C. ater, thorace scabro, elytris punctato-friatis.* *orbicularis.*
Curculio orbicularis. Herbst. Col. 6.
 Habitat in Austria. D. de Meyerle.
 Statura omnino praecedentium, totus ater. Thorax punctis elevatis, scaber. Elytra punctato-friata, nullo modo acuminata.
2. *C. supra fusco-cinereus, subtus niger, rostro moerens.*
 subfulcato. Ent. syst. 2. 465. 295. *
 Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.
3. *C. griseus, capite thoraceque nigris: linea dorsali alba.* *griffonus.*
 Ent. syst. 2. 465. 296. *
 Habitat in Italia. D. de Schlanbusch.
4. *C. cinereus, thorace trilineato, elytris striis numerosis fuscis, per paria approximatis.* *geminatus*
 Ent. syst. 2. 465. 297. *
 Habitat Kiliae. D. Daldorff.
5. *C. niger, elytris striatis, antennis pedibusque ferrugineis.* *gramineus*
 Ent. syst. 2. 465. 298. *
 Habitat in Germaniae graminosis. D. Smidt.
6. *C. flavescente villosus, rostro apice retuso atro.* *diadema.*
 Ent. syst. 2. 465. 299. *
 Habitat in Cayenna. D. v. Rohr.
7. *C. griseus, thoracis dorso fusco: linea albida, elytris nigro-punctatis: futura ante apicem albida.* *Meles.*
 Ent. syst. 2. 466. 300. *
 Habitat in Germania. D. Smidt.

Coryli.

98. *C. cinereo-fuscoque varius*, elytrorum sutura dimidiata atra Ent. syst. 2. 466. 301. *

II. 62. Panz. Fn. Germ. 19. tab. 12.
Habitat in Angliae Corylo.

lineatus.

99. *C. fuscus*, thorace striis tribus pallidioribus Ent. syst. 2. 466. 302. *

Linn. syst. Nat. 2. 616. 80. Fn. Sv. 630.

Ent. Heluet. 1. 80. 1. tab. 6. fig. 1. 2.

Geoff. Inf. 1. 283.

Degeer Inf. 5. 247. 35.

Schaeff. Icon. tab. 103. fig. 8.

Payk. Monogr. 112. 108.

Fn. Sv. 3. 307. 130.

Bensd. Curcul. 30. 16.

Herbst. Col. 6. 497. 527.

Habitat in Europae plantis.

lunatus.

100. *C. coleoptris eleuato-striatis: fascia semicirculari maculaque postica albis; lunula nigra.*
Ent. syst. 2. 466. 303. *

Habitat in Anglia in arenosis Richmondensibus.

caninus.

101. *C. fuscus*, thorace, lineis elytrisque, brunneis.
Ent. syst. 2. 467. 304. *

Habitat in Germania. D. Smidt.

eleuatus.

102. *C. niger*, elytris lineis tribus eleuatis rufis: margine atro.

Habitat in Selandia. D. Rosenkilde. Mus. D. Lund.

Paruus. Caput nigrum, puncto frontali impresso.

Rostrum breue, nigrum, antennis ferrugineis.

Thorax canaliculatus, niger, dorso punctis quatuor impressis. Elytra striato-punctata, lineis

tribus eleuatis rufis: margine atro punctoque atro margine connexo. Corpus cinereum.

mus.

103. *C. cinereus: dorso fusco.*

Curculio cinerascens. Ent. syst. 2. 467. 305. *

Ha-

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

104. *C. tomentoso-cinereascens*, pedibus testaceis. *fuluipes*.

Ent. syst. 2. 467. 306. *

Payk. Monogr. 114. 109.

Fn. Sv. 3. 310. 133.

Degeer Inf. 5. 235. 41.

Herbst. Col. 6. 497. 526.

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

105. *C. testaceus*, capite elytrisque striatis, cinereo-*ruficollis*.

fuscis. Ent. syst. 2. 467. 307. *

Habitat Halae Saxonum. D. Hybner.

106. *C. brunneus*, elytris fasciis vndatis cinereis. *fuluicornis*

Ent. syst. 2. 468. 308.

Payk. Monogr. 109. 105.

Fn. Sv. 3. 304. 127.

Bonsdorff. Curcul. 27. 13.

Herbst. Col. 6. tab. 65. fig. 13.

Habitat in Europae arboribus.

107. *C. subhispidus*, cinereus, elytris punctato-*ecbis* ~~atus~~
striatis.

Habitat in noua Cambria. Mus. D. Billardiere.

Maior sequentibus. Caput cinereum, rostro breui apice fusco. Thorax nullo modo canaliculatus. at punctis latis approximatis, cinereis. Elytra punctato-striata. Pedes cinerei, femoribus clauatis.

108. *C. cinereus*, pilosus, antennis nigris. Ent. syst. *pilosus*.

2. 468. 309. *

Habitat in Germania. D. Schneider.

109. *C. fuscus*, elytris apice pallidis: striga vndata *vndatus*.

fusca, Ent. syst. 2. 468. 310. *

Curculio tereticollis. Bonsd. Curc. 28. 14.

Degeer Inf. 5. 246. 33.

Payk.

Payk. Monogr. 108. 104.

Fn. Sv. 3. 303. 126.

Herbst. Col. 6. 499. 529.

Habitat in Europae Corylo Auellana. Dom. de Hattorff.

lanatus.

110. *C. pilosus*, cinereus, elytris striatis: fasciis duabus abbreviatis albis.

Habitat in noua Cambria. Mus. D. Billardiere.

Statura parua praecedentium. Rostrum breue, canaliculatum, cinereum. Thorax globosus, laeuis, cinereus, immaculatus. Elytra pilosa, punctato-striata, cinerea, fasciis duabus, in medio interruptis, albis. Pedes cinerei.

bispidulus.

111. *C. fuscus*, thorace cinereo-lineato, elytris hispidis: punctis obscurioribus striatis. Ent. syst. 2. 468. 311. *

Payk. Monogr. 110. 106.

Fn. Sv. 3. 305. 128.

Herbst. Col. 6. tab. 87. fig. 14.

Habitat in Kiliae plantis aquaticis. Mus. D. Lund.

birsutulus.

112. *C. cinereus*, hispidus, elytris striatis, antennis pedibusque flavescentibus. Ent. syst. 2. 468. 312. *

Curculio ecbinatus. Bonsd. Curc. 33. 21.

Payk. Monogr. 92. 89.

I. 48. Fn. Sv. 3. 286. 109.

Herbst. Col. 6. tab. 87. fig. 11.

Habitat in Germania. D. Smidt.

holosericeus.

113. *C. testaceus*, elytris holosericeis punctato-striatis.

Habitat in Austria. D. Scheidler.

Paruus. Caput et thorax obscure testacea. Elytra punctata, dilutiora, holosericea. Pedes testacei.

114. *C. cinereus*, capite thoraceque canaliculatis, *scrabriculus*.
 elytris hispidis. Ent. syst. 2. 469. 313.
 Linn. Mant. 91. 88.
 Bond. Curc. 32. 20.
 Payk. Monogr. 91. 88.
 Fn. Sv. 3. 285. 108.
 Herbst. Col. 6. tab. 78. fig. 10. tab. 77. fig. 14.
 Habitat in Sueciae arenosis.
115. *C. obscurus*, thorace scabro, elytris pilosis *fulsetosus*.
 catis, pedibus rubris.
Curculio scaber longirostris, cinereus, pedibus rufis,
 elytris scabris. Linn. syst. Nat. 2. 609. 22.
 Fn. Fv. 592.
 Habitat in Suecia. Mus. D. Lund.
 Statura et magnitudo omnino *C. ceruini*. Rostrum
 breue, obscurum, antennis rufescentibus. Tho-
 rax globosus, fuscus, punctis eleuatis scaber.
 Elytra hispida, fulcata: fulcis striis duabus
 punctorum impressorum. Pedes rufi.
116. *C. cinereus*, capite thoraceque laenibus, elytris *squamulatus*.
 substriatis, hispidis.
Curculio squamulatus. Herbst. Col. t. 87. f. 12.
 Habitat in Germania.
 Nimis affinis videtur *C. scrabriculo*, at duplo fere
 minor et caput et thorax laud impressa.
117. *C. ater*, hispidus, antennis pedibusque rufis. *Erinaceus*.
 Habitat in Austria. Dom. de Meyerle.
 Statura et magnitudo omnino *C. scrabriculi*, at to-
 tus ater, pllis cinereis hispidus. Elytra crenato-
 striata. Antennae et pedes rufi.
118. *C. ater*, elytris vitta marginali scutelloque *inlimbatus*.
 auratis. Ent. syst. 2. 469. 314.
Curculio lateralis. Payk. Monogr. 95. 92.
 Fn. Sv. 3. 288. III.
 Habitat in Europa.

- parvulus.* 119. *C. viridis*, antennis tibiisque testaceis. Ent. syst. 2. 469. 315. *
Habitat in Italia. Dr. Allioni.
- viridicollis* 120. *C. thorace viridi-squamoso*, elytris striatis, nigris. Ent. syst. 2; 469. 316.
Panz. Fn. Germ. 19. tab. 13.
Payk. Fn. Sv. 3. 309. 131.
Hérbst. Col. 6. tab. 75. fig. 12.
Habitat in Germaniae Quercu. Dom. Prof. Helwig.
- ceruusus.* 121. *C. griseus*, elytris puncto obsoleto baseos alba, antennis basi rufescentibus. Ent. syst. 2. 470. 317. *
Linn. syst. Nat. 2. 615. 70. Fn. Sv. 627.
Degeer Inf. 5. 220. 13.
Habitat in Europae plantis.
- striatus.* 122. *C. fuscus*, elytris striis cinereis, nigro-punctis. Ent. syst. 2. 470. 318. *
Habitat in Barbaria. Dom. Prof. Vahl.
- lacerta.* 123. *C. griseus*, elytris striatis, antennis apice nigris. Ent. syst. 2. 470. 319. *
Habitat in India orientali. Mus. D. Banks.
- velox.* 124. *C. pilosus*, niger, elytris margine puncto baseos, fascia interrupta punctoque apicis albis. Ent. syst. 2. 470. 320. *
Habitat in Cayenna. Dom. v. Rohr.
- seminulum* 125. *C. niger*, immaculatus, elytris ovatis, puncto-striatis. Ent. syst. 2. 470. 321. *
Habitat in Hungaria. Mus. Dom. Hybner.
- sinuatus.* 126. *C. cinerascens*, elytris fascia sinuata, fusca, antennis pedibusque testaceis.
Habitat in Austria. Mus. Dom. de Meyerle.
Minutus. Antennae testaceae. Caput cinereum. Thorax cinereus, dorso fusco. Elytra striata.

villosa, cinerea, dorso ad futuram fasciaque media, valde sinuata fuscis. Pedes omnes testacei.

27. *C. ater*, antennis rufis, thorace vtrinque bituberculato. Ent. syst. 2. 471. 322.
Linn. syst. Nat. 2. 616. 78. Fn. Sv. 636.
Habitat in Europae plantis.
28. *C. niger*, obscurus, elytris punctis plurimis griseo-albis. Ent. syst. 2. 471. 325. * *multipunctatus*.
Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.
29. *C. niger*, elytris sulcatis cinereis. Ent. syst. 2. *tristis*.
471. 326. *
Habitat in Suecia et Anglia.
30. *C. niger*, elytris striatis fuscis, cinereo-maculatis. Ent. syst. 2. 472. 327. * *raucus*.
Curculio tristis. Bond. Curc. suec. 36. 27.
Payk. Monogr. 97. 94.
Fn. Sv. 3. 291. 114.
Herbst. Col. 6. tab. 87. fig. 2.
Habitat in Europa boreali.
31. *C. ater*, elytris postice albo-maculatis. Ent. *adpersus*.
syst. 2. 472. 328. *
Curculio adpersus. Oliv. Inf. 83. fig. 156.
Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.
32. *C. niger*, coleoptris striatis fuscis: striga baseos niuea. Ent. syst. suppl. 177. 328. * *striga*.
Habitat in Isle de France. D. Daldorff.
33. *C. fuscus*, elytris punctis eleuatis holosericeis. *punctatus*.
Ent. syst. 2. 472. 329. *
Payk. Monogr. 111. 107.
Fn. Sv. 3. 306. 129.
Herbst. Col. 6. 505. 540.
Habitat in Suecia.

- obscurus.* 134. *C. ouatus*, ferrugineo - fuscus. Ent. syst. 2. 472. 330. *
Curculio murinus. Bonzd. Curc. suec. 37. 80.
 Payk. Monogr. 98. 95.
 Fn. Sv. 3. 292. 116.
 Herbst. Col. 6. tab. 87. fig. 3.
 Habitat in Suecia.
- Mercurialis.* 135. *C. ouatus*, fuscus, elytrorum futura postice eleuata compressa.
 Habitat in Selandiae Mercuriali. Mus. D. Lund.
 Statura et summa affinitas *C. obscuri*, at paulo minor. Thorax fuscus, linea dorsali parum eleuata. Elytra haud punctata, at lineis aliquot eleuatis costata et futura postice eleuata, compressa. Corpus fuscum, femoribus clauatis.
- maxillofus* 136. *C. ouatus*, niger, mandibulis exsertis arcuatis
 Ent. syst. 2. 472. 331. *
 Habitat in Hungaria. Dom. Hybner.
- niger.* 137. *C. ouatus*, scaber, niger, pedibus rufis. Ent. syst. 2. 473. 332. *
Curculio niger. Ent. Heluet. 1. 88. 5. tab. 8. fig. 1. 2.
Curculio clauipes. Bonzd. Curcul. suec. 40. 35.
 Payk. Monogr. 101. 198.
 Fn. Sv. 3. 295. 119.
 Herbst. Col. 6. 332. 306.
 Habitat in Germania.
- eleuatus.* 138. *C. niger*, thorace scabro, elytris fulcatis: fulcis punctis impressis, duplici serie.
 Habitat in Austria. D. de Scheidler.
 Paulo minor, quam *C. niger*. Rostrum breuius. Thorax punctis eleuatis scaber. Elytra lineis tribus valde eleuatis et fulcis punctis duplici serie impressis.

39. *C. ater*, nitidus, rostro emarginato. Ent. syst. *laevigatus*.
2. 473. 333. *
Habitat Kiliae sub lapidibus.
40. *C. niger*, elytris punctato-striatis; antennis ti- *rotunda-*
biisque rufis. Ent. syst. 2. 473. 334. * *tus.*
Habitat in Germania. D. de Leuwenkiold.
41. *C. niger*, thorace carinato-variolofo, elytris *variolosus*.
striatis. Ent. syst. 2. 473. 335. *
Curculio senex Roff. Fn. Etr. 1. 337.
Habitat in Saxonia.
42. *C. thorace elytris*que variolosis nigris, albo- *sticticus*.
punctatis. Ent. syst. 2. 473. 336. *
Habitat ad Cap. Bon. Spei.
43. *C. obscurus*, niger, thorace subpunctato, ely- *affinis*.
tris punctato-striatis.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.
Statura omnino *C. valgi*, at paullo maior. Caput
nigrum, antennarum claua acuta. Thorax sub-
punctatus, niger, obscurus. Elytra nigra, ob-
scura, punctato-striata, striis ante apicem co-
euntibus. Pedes nigri, tibiis posticis simpli-
cibus.
44. *C. ater*, nitens, elytris punctato-striatis, fe- *valgus*.
moribus annulo cinereo. Ent. syst. 2. 474. 337. *
Habitat in America.
Affinis certe *C. curuipedis*, et forte mera eius
varietas.
45. *C. ater*, elytris margine lineolisque duabus *succinctus*.
albis. Ent. syst. 2. 474. 338. *
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lee.
46. *C. virescens*, thoracis dorso elytrorumque *succinctus*.
tura vittaque dorsali obscurioribus, rostro emar-
ginato.

Habitat in Moldavia. Mus. D. Lund.

Magnitudo C. valgi. Rostrum breve, dorso plus
obscuriore, apice emarginato. Thorax flavo
virens, dorso late obscuriore. Elytra substriata
flavo-virescentia, futura vittaque media
falsi obscurioribus, apice acuminata. Color
virescens.

Cameleon. 147. C. aeneus, elytris futura vittaque abbreviata
viridi-aureis, Ent. syst. 2. 474. 339. *

Curculio Cameleon. Oliv. Inf. 83. fig. 166.

Drury Inf. 2. tab. 33. fig. 4. 5.

Habitat in Iamaica. Mus. Dr. Hunter.

vittatus. 148. C. ater, elytris striis albis rubrisque abbreviatis.
Ent. syst. 2. 474. 340. *

Linn. syst. Nat. 2. 610. 33.

Oliv. Inf. 83. fig. 192.

Sloan. Iamaic. 2. 210.

Habitat in Americae Insulis. Destruit larva radicis Citri medicae. Dr. Schwarz.

Spengleri. 149. C. elytris flavis: lineis glaberrimis abbreviatis atris.
Ent. syst. 2. 475. 341. *

Linn. syst. Nat. 2. 609. 32.

Oliv. Inf. 83. fig. 82.

Act. Berol. 4. tab. 7. fig. 7.

Habitat in Americae Insulis.

bi vittatus. 150. C. niger, elytris punctato-striatis: vitta emarginata
dorsali que interrupta flavis. Ent. syst. 2. 475. 342. *

Oliv. Inf. 83. fig. 23.

Habitat in Americae Insulis. Dr. Pflug.

lividus. 151. C. griseus, thorace elytris que cinereo atro maculatis.
Ent. syst. 2. 475. 343. *

Curculio lividus. Oliv. Inf. 83. fig. 59.

Brown. Illustr. tab. 49. fig. 8.

Speng.

- Sparm. Act. Holm. 1785. tab. 2. fig. 17.
Habitat in America meridionali.
52. *C. coleoptris atris*: striis sex dorsallibus approximatis, abbreviatis albis. Ent. syst. 2. 476. 344. *
Curculio pulcher. Oliv. Inf. 83. fig. 130.
Brown, Illustr. tab. 49. fig. 6.
Habitat in Iamaica. Mus. D. Banks.
53. *C. elytris flavescentibus*: striis abbreviatis nigris, marginalique sanguinea. Ent. syst. 2. 476. 345. *
festivus.
Habitat in Americae meridionalis Insulis. Dr. Isert.
54. *C. griseus*, thorace lineis lateralibus fulvis, elytris albis, maculis atris fulvisque. Ent. syst. 2. 476. 346. *
bistransversus.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lee.
55. *C. elytris acuminatis griseis*: margine baseos flavescente. Ent. syst. 2. 476. 347. *
Robrii.
Habitat in Americae Insulis. D. v. Rohr.
56. *C. niger*, thorace elytris punctis impressis albis. Ent. syst. 2. 477. 348. *
impressus.
Curculio impressus. Oliv. Inf. 83. fig. 126.
Habitat in Iamaica. Mus. D. Banks.
57. *C. niger*, thorace angulato, elytris tuberculatis basi apiceque albidis. Ent. syst. 2. 477. 349. *
albipes.
Curculio albipes. Oliv. Inf. 83. fig. 109.
Habitat in Madagascar. Mus. Gallic.
58. *C. niger*, thorace rufo-maculato, elytris lineis tribus impressis cinereis. Ent. syst. 2. 477. 350. *
riuculosus.
Curculio riuculosus. Oliv. Inf. 83. tab. 11. f. 133.
Habitat in India orientali.

- depressiro-*
stris. 159. *C. fusco cinereo*que varius, rostro depressifloro, apice atro. Ent. syst. 2. 477. 351. *
Habitat Halae Saxonum. Mus. Hybner.
- marginel-*
lus. 160. *C. niger*, thoracis elytrorumque margine albo. Ent. syst. 2. 478. 352. *
Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. D. Banks.
- verrucosus.* 161. *C. aeneo niger*, elevato-punctatus, elytris postice verrucosis. Ent. syst. 2. 478. 353. *
Linn. syst. Nat. 2. 618. 90. Mus. Lud. Vlr. 6.
Curculio verrucosus. Oliv. Inf. 83. fig. 125.
Drury Inf. 1. tab. 32. fig. 5:
Habitat ad Cap. Bon. Spei.
- Capensis.* 162. *C. ater*, thorace elevato-punctato, elytris striato-crenatis. Ent. syst. 2. 478. 354.
Linn. syst. Nat. 2. 618. 82. Mus. Lud. Vlr. 39.
Curculio Capensis. Oliv. Inf. 83. fig. 52.
Habitat ad Cap. Bon. Spei.
- exfertus.* 163. *C. ater*, mandibulis exfertis, elytris crenato-striatis, postice uniter tuberculatis.
Habitat in noua Cambria. D. Billardiere.
Statura et magnitudo *C. Capensis*. Rostrum breve, sulcatum, mandibulis exfertis, inermibus. Thorax planiusculus, subpunctatus, ater. Scutellum elevatum. Elytra striata: striis punctatis, atra, ante apicem dente elevato, obtusa. Pedes tibiis anticis compressis, vix dentatis.
- 6 vittatus.* 164. *C. niger*, thorace scabro albo-lineato, elytris acuminate. Ent. syst. 2. 478. 355. *
Curculio 6 vittatus. Oliv. Inf. 83. tab. 12. f. 14.
Habitat - - Mus. Dr. Hunter.
- vitulus.* 165. *C. niger*, fronte bidentata, elytris unispinis. Ent. syst. 2. 479. 356. *
Habitat in Terra del Fuego. Mus. D. Banks.

66. *C. griseus*, thorace inaequali, antice prominu- *inaequalis*.
lo, elytris fulcatis: postice bidentatis, rostro tri-
fulcato. Ent. syst. 2. 479. 357.*
Curculio inaequalis. Oliv. Inf. 83. fig. 164.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.
67. *C. albidus*, thorace elytrisque nodulis eleuatis *recuruus*.
atris numerosis glabris, elytris apice recuruo
acuminatis.
Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lund.
Statura magna praecedentium. Rostrum crassum,
albidum, nigro-punctatum: dorso canalicula-
to; canali atro. Thorax albidus, nodulis plu-
rimis, approximatis, atris, nitidis. Elytra pun-
ctato - striata: nodulisque plurimis, eleuatis,
atris, nitidis, apice in spinam validam, acutam,
recuruam exeunt. Corpus albidum, nigro-pun-
ctatum.
68. *C. cylindricus*, fuscus, elytris apice acuminatis. *acumina-*
Ent. syst. 2. 479. 358.* *tus*.
Curculio acuminatus. Oliv. Inf. 83. fig. 139.
Habitat in noua Zelandia. Mus. D. Banks.
69. *C. fuscus*, elytris acuminatis, crenato-striatis. *capistratus*
rostro fulcato. Ent. syst. 2. 479. 359.*
Habitat ad Cap. Bon. Spei. D. Prof. Leske.
70. *C. niger*, thorace elytrisque spinosis, fronte *emeritus*.
excauata. Ent. syst. 2. 480. 360.*
Linn. syst. Nat. 2. 617. 87. Mus. Lud. Vlr. 35.
Habitat in Indiis.
71. *C. ater*, thorace punctato, elytris striatis tuber- *tubercula-*
culatisque. Ent. syst. 2. 480. 361.* *tus*.
Habitat in India orientali. D. Prof. Abildgaard.
72. *C. thorace mutico scabro*, elytris lineis tribus *crispatus*.
eleuatis dentatis. Ent. syst. 2. 480. 362.*
Curculio crispatus. Oliv. Inf. 83. fig. 160.
Habi-

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

cultratus. 173. *C. niger*, thorace tuberculis duobus compressis elytris tuberculatis, postice cinereis. Ent. syst. 2. 480. 363. *

Curculio cultratus. Oliv. Inf. 83. fig. 157.

Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

tribulus. 174. *C. cinereus*, thorace scabro, antice impressis elytris spinosis. Ent. syst. 2. 481. 364. *

Curculio tribulus. Oliv. Inf. 83. fig. 161.

Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

4dens. 175. *C. cinereus*, thorace scabro, elytris spinosis spinis quatuor, posticis longioribus. Ent. syst. 2. 482. 365. *

Curculio 4dens. Oliv. Inf. 83. fig. 187.

Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

4spinosus. 176. *C. albidus*, elytris quadrispinosis, rostro fusca. Ent. syst. 2. 481. 366. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei.

clauus. 177. *C. albicans*, thorace canaliculato, coleoptri spinosis: lineolis tribus baseos rubris. Ent. syst. 2. 481. 367. *

Curculio clauus. Oliv. Inf. 83. fig. 168.

Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

nodulosus. 178. *C. thorace lineis sex nodulosis*, elytris spinosis. Ent. syst. 2. 482. 368. *

Curculio nodulosus. Oliv. Inf. 83. fig. 188.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

rubifer. 179. *C. cinereus*, thorace scabro, elytris spinis ciliatis sanguineis. Ent. syst. 2. 482. 369. *

Curculio rubifer. Oliv. Inf. 83. fig. 159.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

globifer. 180. *C. thorace scabro*, elytris spinosis, postice scissatis. Ent. syst. 2. 482. 370. *

Curculio globifer. Oliv. Inf. 83: fig. 135.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Banks.

181. C. thorace vtrinque spinoso noduloso, elytrorum striis subferratis, apice acuminatis.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lund.

Magnitudo C. pilularii. Thorax planus, vtrinque spinosus. Elytra grisea, obsolete maculata, striis quatuor elevatis, ferratis.

182. C. thorace vtrinque spinoso noduloso, elytris tuberculato-striatis, apice acuminatis. Ent. syst. 2. 482. 371. *

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Spengler.

183. C. obscurus, thorace scabro, elytris lineis tribus elevatis spinosis. Ent. syst. 2. 483. 372.

Habitat ad Cap. Bon. Spei. Mus. D. Lund.

** *Femoribus dentatis.*

184. C. femoribus dentatis, corpore viridi-variegato. Ent. syst. 2. 483. 373. *

Curculio spectabilis. Oliv. Inf. 83. fig. 180.

Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

185. femoribus anticis dentatis, gibbus, nigricans, thorace lineis, elytris strigis duabus lineaque apicis flavescentibus. Ent. syst. 2. 483. 374. *

Habitat in Cayenna. D. v. Rohr.

186. C. femoribus dentatis, cinereus, elytris dentibus tribus apiceque emarginatis. Ent. syst. 2. 483. 375. *

Curculio tridens. Oliv. Inf. 83. fig. 154.

Habitat in noua Zelandia. Mus. D. Banks.

187. C. femoribus subdentatis, ater, thorace elytrisque laevibus fusco-maculatis. Ent. syst. 2. 484. 376. *

Habitat in Germania boreali.

- Ligustici.* 188. *C. femoribus dentatis, corpore obscuro.* Ent. syst. 2. 484. 377.
Linn. syst. Nat. 2: 615. 68. Fn. Sv. 621.
Oliv. Inf. 83. fig. 77.
Degeer Inf. 5. 218. 10.
Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 12.
Payk. Monogr. 89. 77.
Fn. Sv. 3. 274. 97.
Herbst. Col. 6. tab. 86. fig. 8.
Habitat in Ligustico Leuistico.
- Zebra.* 189. *C. femoribus dentatis, niger, elytris albo-variiis.* Ent. syst. 2. 484. 378. *
Payk. Monogr. 83. 80.
Fn. Sv. 3. 278. 101.
Herbst. Col. 6. tab. 88. fig. 7.
Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.
- 2 notatus.* 190. *C. femoribus dentatis, obscurus, elytris puncto postico cinereo.* Ent. syst. 2. 484. 379. *
Habitat in Germania. D. Smidt.
- nubilus.* 191. *C. femoribus dentatis, griseus, elytris punctis obscurioribus numerosis subquadratis.* Ent. syst. 2. 485. 380.
Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 11.
Payk. Monogr. 79. 76.
Fn. Sv. 3. 273. 96.
Bonsd. Curcul. suec. 38. 31.
Herbst. Col. 6. tab. 86. fig. 10.
Habitat Hamburgi. Dr. Schulz.
- punctum.* 192. *C. femoribus anticis acute dentatis, niger, scutello niueo.* Ent. syst. suppl. 172. 381. *
Habitat ad Cap. Bon. Spei. D. Daldorff.
- brunnipes.* 193. *C. femoribus anticis dentatis, fuscus, thorace pedibusque obscure brunneis.* Ent. syst. suppl. 172. 381. *
Habitat ad Cap. Bon. Spei. D. Daldorff.

194. *C. femoribus obtuse-dentatis*, niger, elytris *dentifor-*
nereo-maculatis; antennarum articulo secundo *nfs.*
apice prominulo. Ent. syst. suppl. 172. 381.*
Habitat in India orientali. Dom. Daldorf.
195. *C. femoribus dentatis*, thorace scabro, elytris *austriacus.*
sulcatis: striis ferratis.
Habitat in Austria. Dom de Meyerle.
Statura et magnitudo *C. nigritae*. Caput nigrum,
rostro breui, canaliculato. Thorax rotundatus, IX.
scaber, obscurus, immaculatus. Elytra *cornuta* *tristis*.
sulcata, lineis elegantis, ferratis. Pedes nigri,
femoribus clauatis, dentatis.
196. *C. femoribus dentatis*, niger, obscurus, thorace *nigrita.*
scabro, elytris crenato-striatis. Ent. syst. 2.
485. 381.*
Habitat in Italia.
197. *C. femoribus dentatis*, ater, elytris striatis, fer- *fulcatus.*
rugineo-maculatis. Ent. syst. 2. 485. 382.*
Payk. Monogr. 81. 78.
Fn. Sv. 3. 275. 98.
Degeer Inf. 5. 217. 9.
Bonsd. Curc. fuc. 40. 34.
Herbst. Col. 6. tab. 87. fig. 5.
Habitat in Saxonia.
198. *C. femoribus acute-dentatis*, antennis pedi- *calcaratus*
busque rufis. Ent. syst. 2. 485. 383.*
Curculio calcaratus. Ent. Helv. 1. 91. 6. tab.
8. fig. 3. 4.
Habitat in Austria. Dom. Schneider.
199. *C. femoribus dentatis*, elytris punctis viridibus. *gemmatus*
Ent. syst. 2. 485. 384.*
Curculio gemmatus. Oliv. Inf. 83. fig. 74.
Naturf. 6. tab. 4.
Habitat in Europae plantis.

Squamiger, 200. *C. femoribus acute-dentatis, niger, elytris viridi-variegatis, pedibus rufis.*

Habitat in Austria. Dom. Scheidler.

Affinis sane *C. gemmato*. Rostrum brevis, apice incrassatum, antennis nigris: articulo secundo longissimo, claua apice cinerea. Thorax globosus, scaber. Elytra striata, nigra, hinc vnde viridi-squamosa. Pedes rufi, femoribus acute-dentatis.

picipes, 201. *C. femoribus dentatis, griseus, elytris nebulosis: punctis subocellatis, striatis. Ent. syst. 2. 486. 385.*

Curculio notatus. Bonsd. Curc. suec. 39. 33.

Geoff. Inf. 1. 281. 9.

Payk. Monogr. 100. 97.

Fn. Sv. 3. 293. 117.

Herbst. Col. 6. tab. 88. fig. 5.

Habitat Kiliae. Mus. D. Lund.

Morio. 202. *C. femoribus dentatis, ater, nitens, elytris glabris, rostro bifurcato. Ent. syst. 2. 486. 386.**

Oliv. Inf. 83. fig. 26.

Payk. Monogr. 99. 96.

Fn. Sv. 3. 294. 118.

Degeer Inf. 5. tab. 7. fig. 22.

Herbst. Col. 6. tab. 86. fig. 6.

Habitat in Germania. Dom. de Hattorff.

fulcatus. 203. *C. femoribus dentatis, niger, thorace scabro, elytris rugoso-striatis, rostro bifurcato. Ent. syst. 2. 486. 387.**

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

collaris. 204. *C. femoribus dentatis, thorace cinereo, scabro, elytris nigris, rostro carinato. Ent. syst. 2. 486. 388.**

Habitat Kiliae.

205. *C. femoribus dentatis, obscure-cinereus, fusco-asperatus. maculatus, elytris pilosis.*

Curculio asperatus. Payk. Monogr. 84. 81.

Habitat in Europa boreali. Mus. D. Lund.

Antennae rufescentes. Thorax squamosus, fuscus, lineis tribus cinerascens. Elytra striata, pilis brevissimis densioribus irrorata, cinerea, fusco-maculata. Pedes rufescentes.

206. *C. femoribus dentatis, cinereus, elytris tessellatis.* Ent. syst. 2. 486. 389. *

Habitat Kiliae.

207. *C. femoribus acute dentatis, niger, elytris viridipetidi-squamosis, pedibus rufis.* Ent. syst. 4. App. 454, 390. *

Curculio lepidopterus. Payk. Fn. Sv. 3. 276. 99. *

III. 61.

Herbst. Col. 6. tab. 88. fig. 8.

Habitat in Austria. D. Schneider.

208. *C. femoribus anticis acute dentatis, viridis, nigro-irroratus.* Ent. syst. suppl. 174. 390. *

Habitat in Isle de France.

209. *C. femoribus anticis dentatis, virescens, elytris punctato-striatis: vitta abbreviata cyanea.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Antennae virescentes, clava cinerea. Rostrum breve, apice emarginatum, cinereum. Thorax parum punctatus, virescens. Elytra punctato-striata, virescentia: vitta abbreviata, cyanea, et in hac puncta impressa paullo maiora. Pedes subcyanei, femoribus anticis elongatis, acute dentatis.

210. *C. femoribus dentatis, viridi-aeneus, pedibus Pyri.* rufis. Ent. syst. 2. 487. 390.

Cur-

Curculio Pyri. Linn. syst. Nat. 2. 615. 72. Fn. Sv. 623.

Curculio aeruginosus. Bonsd. Curc. suec. 23. 7. Geoff. Inf. 1. 282.

Oliv. Inf. 33. fig. 30.

Degeer Inf. 5. 246. 34.

Sulz. Inf. tab. 3. fig. 23.

Payk. Monogr. 88. 85.

Fn. Sv. 3. 280. 103.

Herbst. Col. 6. tab. 79. fig. 2.

Habitat in Pyro communi frequens.

Alneti.

211. *C. femoribus dentatis, niger, coeruleo-squamosus, antennis piceis*. Ent. syst. 2. 487-391.

Payk. Fn. Sv. 3. 281. 103. β.

Herbst. Col. 6. tab. 79. fig. 3.

Habitat in Germaniae Alno.

Praecedentis varietatem credit D. de Paykull, at vix rite.

vespertinus.

212. *C. femoribus dentatis, cinereo-subuillofus, scutello albo*. Ent. syst. 2. 487-392. *

Curculio ceruinus. Payk. Monogr. 87. 84.

Fn. Sv. 3. 282. 105.

Habitat in Germania. D. Smidt.

Mali.

213. *C. femoribus dentatis, pubescens, fuscus, antennis pedibusque testaceis*. Ent. syst. 2. 487-393. *

Curculio Padi. Bonsd. Curc. suec. 26. 11.

Payk. Monogr. 86. 83.

Fn. Sv. 3. 281. 104.

Herbst. Col. 6. tab. 79. fig. 5.

Habitat Lipsiae. D. Prof. Leske.

pallidus.

214. *C. femoribus dentatis, squamoso-pallidus, antennis tibiisque rufis*. Ent. syst. 2. 487-394. *

Habitat in Germania. D. Smidt.

215. *C. femoribus anticis dentatis, viridi-cinereus, arboresci.*
 elytris punctato-friatis. Ent. syst. 2. 488.

395. *

Habitat in Cayenna. D. v. Rohr.

216. *C. femoribus clauatis dentatis nigris, viridi-Betulae.*
 squamosus, antennis rufis.

Habitat in Austriae Alno. Dom. de Meyerle.—

Statura et magnitudo praecedentium. Antennae
 rufescentes. Caput et thorax viridi-squamosa.
 Elytra friata, villosa, viridi-squamosa. Pedes
 rufescentes, femoribus valde clauatis: claua
 nigra.

217. *C. femoribus dentatis, cinereus, rostro antice dentifer.*
 canaliculato, femoribus posticis tridentatis. Ent.
 syst. 2. 488. 396.

Habitat in India orientali. D. Prof. Abildgaard.

218. *C. femoribus dentatis, griseus: lateribus albis, curvior-*
femoribus intermediis bidentatis. Ent. syst. 2. *nig.*
 488. 397. *

Habitat in India orientali. D. Prof. Abildgaard.

219. *C. femoribus dentatis, flavescens, capite tho-*
dorsatus.
 raceque trilineatis, coleoptrorum disco fusco.
 Ent. syst. suppl. 173 397. *

Habitat in India orientali. D. Daldorff.

220. *C. femoribus dentatis, corpore viridi-argen-*
argentatus
 tato. Ent. syst. 2. 489. 398. *

Curculio argentatus. Linn. syst. Nat. 2. 615. 73.

Geoff. Inf. 1. 293. 38.

Oliv. Inf. 83. fig. 96.

Degeer Inf. 5. 219. 12.

Sulz. Inf. tab. 4. fig. 9.

Payk. Monogr. 89. 86.

Fn. Sv. 3. 281. 106.

Bonsd. Curc. fucc. 27. 12.

Herbst.

Herbst. Col. 6. tab. 79. fig. 4.

Habitat in Europae Betula, Vrtica, Quercu.

viridanus. 221. C. femoribus dentatis, viridis, ore antennisque nigris, oculis atris. Ent. syst. 2. 489. 399. *

Habitat Tranquebariae. Dr. Koenig.

oblongus. 222. C. femoribus dentatis, antennis, elytris pedibusque ferrugineis. Ent. syst. 2. 489. 400. *

Curculio oblongus. Linn. syst. Nat. 2. 615. 21.

Fn. Sv. 625.

D. 63. Panz. Fn. Germ. 19. tab. 15.

Herbst. Arch. 7. tab. 45. fig. 9.

Payk. Monogr. 90. 87.

Fn. Sv. 3. 284. 107.

Bonsd. Curc. suec. 25. 9.

Geoff. Inf. 1. 294. 39.

Oliv. Inf. 83. fig. 30.

Habitat in Europae plantis.

muricatus 223. C. femoribus dentatis, griseus, elytris striis elevatis hispidis, antennis rufis. Ent. syst. 2. 489. 401. *

Habitat in Germania. D. Daldorff.

ouatus. 224. C. femoribus dentatis, niger, thorace scabro. Ent. syst. 2. 490. 402. *

Curculio ouatus. Linn. syst. Nat. 2. 615. 69.

Fn. Sv. 626.

Curculio Rosae. Degeer Inf. 5. 219. 11.

Payk. Monogr. 82. 79.

Fn. Sv. 3. 277. 100.

Bonsd. Curc. suec. 35. 25.

Herbst. Col. 6. tab. 88. fig. 2.

Habitat in Europae arbutis.

albo-lineatus. 225. C. femoribus dentatis, cinereus, thorace elytrisque albo-lineatis, rostro subtus atro. Ent. syst. 2. 490. 403. *

Habitat Halæ Saxonum. Dom Hybnet.

226. C. femoribus dentatis, niger, elytris albo-maculatis. Ent. syst. 2. 490. 404. *

Habitat in Germaniæ Betula. D. Smidt.

227. C. femoribus dentatis, rostro elytrisqve vnituberculatis. Ent. syst. 2. 490. 405. *

Curculio attelaboides. Oliv. Inf. 83. fig. 174.

Habitat in Brasilia. Mus. D. Banks.

163. BRENTVS. *Palpi* inæquales, filiformes.

Antennæ moniliformes, insertæ, rostro recto, porrecto, cylindrico.

* *femoribus simplicibus*.

1. B. rostro longissimo, subtus barbato, elytris elongato-clauatis. Ent. syst. 2. 491. 103. *

Brentus barbicornis. Oliv. Inf. 84. tab. 1. fig. 5.
tab. 2. fig. 5.

Habitat in noua Zelandia. Mus. D. Banks.

2. B. thorace scabro, integro, elytris apice recurvato-spinosis, antennis filiformibus.

Brentus curuidens. Lund. Act. Hist. nat. Hafn. 5. 2. 59. 1. *

Bren-

Brenti corpus elongatum, cylindricum, immarginatum, tardum; *capite* paruo,onato, antice porrecto in rostrum longissimum, rectum, cylindricum; *oculis* paruis, globosis, prominulis, lateralibus, capitis medio insertis; *antennis* breuibus, rostri medio plerumque insertis; *thorace* subcylindrico, antice paruum attenuato, sæpius canaliculato; *scutello* nullo; *elytris* rigidis, fornicatis, includentibus, abdomine longioribus; *pedibus* breuibus, validis; *femoribus* compressis: *tarsis* quadriarticulatis; *colore* nigro, sæpius obscuro.

T. II.

M m

Brentus myrmecophaga. Herbf. Col. tab. 107.
fig. 6. mas.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Specimen nostrum femina. Rostrum elongatum,
cylindricum, antennis versus apicem insertis
mandibulisque exsertis. Antennae omnino fili-
formes: articulis elongatis, cylindricis: infe-
rioribus sex apice clauatis. Thorax ovalis, sca-
ber, dorso integro vel absque canali dorsali.
Elytra punctato-striata, apice dente valido, re-
curuo, lineis duabus flauis, in medio coeunti-
bus. Praeterea lineae quinque glabrae. Pedes
omnes inermes.

affimilis.

3. *B.* rostro apice glabro, atro, elytris ferrugineo-
subfasciatis. Ent. syst. 2. 491. 2. *

Habitat in noua Zelandia. Mus. D. Banks.

monilis.

4. *B.* piceus, thorace postice canaliculato, elytris
acuminatis, vnifriatis. Ent. syst. 2. 492. 3.

Brentus monilis. Lund. Act. Hist. nat. Hafn. 5.
2. 61. 2. *

Habitat in Americae Insulis. Mus. D. de Sehestedt.

futuralis.

5. *B.* viridi-aeneus, thorace canaliculato, elytris
acuminatis, vnifriatis: sutura brunnea.

Brentus futuralis. Lund. Act. Hist. nat. Hafn.
5. 2. 63. 3. *

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

B. monili paullo minor. Antennae moniliformes,
brunneae: articulis tribus vltimis paullo maiori-
bus, griseis. Rostrum cylindricum, basi aeneum,
apice ferrugineum. Thorax canaliculatus, ae-
neus. Elytralaeuia, aenea: sutura late-brunnea,
apice acuminata. Corpus viridi-aeneum.

6. *B. thorace elytrisqve vnifulcatis: sulco villoso, obtufus.*
tibiis anticis ciliatis.

Brentus obtufus. Lund. Act. Hift. nat. Hafn. 5.
2. 64. 4. *

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muf.
D. Lund.

Magnitudine variat. Antennae omnino moniliformes: articulo vltimo acuto. Rostrum elongatum, cylindricum, maris ante medium antenniferum, feminae vltra medium mandibulique extertis. Thorax canaliculatus, canali cinereo, villofo. Elytra rotundata, punctato-friata, fulcoque futurali cinereo, villofo. Color vnicolor, nunc niger, nunc piceus. Pedes inermes.

7. *B. ater, thorace elytrisqve vnifulcatis: sulco glabro, tibiis anticis glabris.* *glabratus.*

Brentus glabratus. Lund. Act. Hift. nat. Hafn.
5. 2. 65. 5. *

Habitat in America meridionali. Muf. D. de Sehestedt.

Affinis praecedenti, at rostrum paullo breuius, crassius. Foffula inter oculos impressa. Thoracis et elytrorum sulcus glaber. Tibiae anticae nullo modo ciliatae.

8. *B. thorace laeui, nitido, elytris subfriatis, tibiis trifstriatus*
anticis vnidentatis.

Brentus trifstriatus. Lund. Act. Hift. nat. Hafn.
5. 2. 66. 6. *

Habitat in Sumatra. D. Daldorff.

Corpus paruum. Rostrum breue, planum, parum incuruum. Thorax breuiffimus, obscure-brunneus,

Variant Brenti sexu. Femina rostro longiore, cui ante apicem antennae insertae, mandibulisque extertis, vti pulcre exposuit Dom. Lund in Actis societatis historiae naturalis Hafniensibus.

neus, nitidus. Elytra ad futuram substriata. Corpus obscure ferrugineum. Femora mutica, at tibiae anticae in medio unidentatae.

2sulcatus. 9. B. thorace rostroque canaliculatis, elytris ad futuram bistriatis.

Brentus 2sulcatus. Lund. Act. Hist. nat. Hafn. 5. 2. 67. 7. *

Habitat in Sumatra. Dom. Daldorff. Mus. D. de Sehestedt.

Statura praecedentis. Rostrum cylindricum, canali medio impresso, qui tamen nec basin, nec apicem attingit. Thorax canali medio lato impressus. Elytra ad futuram bistriata. Color piceus.

ferrugineus.

10. B. brunneus, thorace canaliculato, elytris punctato-striatis, ad futuram unisulcatis.

Brentus ferrugineus. Lund. Act. Hist. nat. Hafn. 5. 2. 68. 8. *

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Statura praecedentium, at paullo minor. Antennae moniliformes, articulis tribus ultimis paullo crassioribus. Caput inter oculos fossula exaratum. Thorax valde canaliculatus. Elytra punctato-striata, ad futuram unisulcata. Corpus brunneum, pedibus inermibus.

brunneus. 11. B. brunneus, elytris integris immaculatus. Ent. syst. 2. 492. 4. *

Brentus brunneus. Oliv. Inf. 84. tab. 1. fig. 3. Habitat in Senegallia. Mus. Dom. Olivier.

foveatus. 12. B. ferrugineus, thorace subtus vtrinque foveato, elytris fasciis tribus atris.

Brentus foveatus. Lund. Act. Hist. nat. Hafn. 5. 2. 69. 9. *

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Par-

Paruus. Antennæ moniliformes, ferrugineae: articulis tribus ultimis crassioribus. Caput atrum, nitidum, rostro breuiore, ferrugineo, apice nigro. Thorax ferrugineus, nitidus: fascia media atra, antice dentes duos exserente. Dorsum integrum, at antice sub lateribus fouea lata, impressa. Elytra truncata, laeuias, sulco vnico ad futuram, brunnea: fasciis tribus atris.

13. **B. ater**, thorace ferrugineo. Ent. syst. suppl. formicarius.
174. 5. *

Brentus formicarius. Lund. Act. Hist. nat. Hafn.

5. 2. 71. 10. *

Attelabus formicarius. Ent. syst. suppl. 163. *

Habitat Tranquebariae. Dom. Daldorff. Mus. D. Lund.

Paruus in hoc genere. Rostrum cylindricum, atrum, antennis rufis, moniliformibus: articulo ultimo longiori, cylindrico, clauato. Thorax rufus, antice globosus. Elytra laeuias, atra, nitida. Pedes rufi, femoribus clauatis, at inermibus: annulo nigro.

In altero sexu antennarum claua breuior, ouata.

** *femoribus dentatis.*

14. **B. femoribus anticis dentatis**, thorace postice canaliculato, elytris stria sesquialtera flaua. Ent. *anchorago*
syst. 2. 492. 5.

Brentus anchorago. Lund. Act. Hist. nat. Hafn.

5. 2. 72. 11.

Curculio anchorago. Linn. syst. Nat. 2. 613. 56.

Mus. Lud. Vlr. 52.

Curculio bastile. Pall. Icon. 25. 2. fem.

Herbst. Coleopt. 7. tab. 108. fig. 4. fem.

Voet. Col. 2. tab. 34. fig. 1. 2. fem.

Sulz. Hist. Inf. tab. 4. fig. 6. fem.

β. *Brentus peregrinus.* Herbst. Col. 7. tab. 108.
fig. 1. mas.

Degeer

Degeer Inf. 5. 273. 8. tab. 25. fig. 23. mas.

Oliv. Inf. 84. tab. 1. fig. 2. mas.

Habitat in America meridionali.

Os palpis maxillisque. *Palpi* quatuor, inaequales, filiformes: *anteriores* longiores, quadriarticulati: articulo primo breuissimo, secundo longiori, cylindrico, tertio breui, orbiculato, quarto breui, obtuso adhaerentes maxillae dorso; *posteriores* breuissimi, triarticulati: articulo secundo paullo crassiori, tertio breui, cylindrico obtuso adhaerentes labii apice. *Mandibula* elongata, cornea, inermis, acuta; feminae exserta arcuata. *Maxilla* longitudine palpi compressa, pilosa. *Ligula* nulla. *Labium* corneum, quadratum, integrum. *Antennae* in plurimis moniliformes, in paruis filiformes, rostro insidentes:

voluulus. 15. B. femoribus anticis posticisque dentatis, thorace pectoreque canaliculo rufo, elytris lineolis flavis. Ent. syst. 2. 493. 6.

Brentus voluulus. Lund. Act. Hist. nat. Hafn. 5. 2: 75. 12. *

Brentus linearis. Oliv. Inf. 84. tab. 1. fig. 4.

Brentus voluulus. Herbst. Col. 7. tab. 108. fig. 2. mas.

Brentus canaliculatus. Herbst. Col. 7. tab. 108. fig. 7. fem.

Habitat in Insula Guadeloupe.

In figura D. Herbst femora omnia dentata, a quo merito.

Magnitudine variat.

cylindrus. 16. B. femoribus omnibus dentatis, thorace postice canaliculato, elytris stria interrupta, ferruginea.

Brentus cylindrus. Lund. Act. Hist. nat. Hafn. 5. 2. 77. 13. *

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Statura omnino B. voluuli. Antennae extrorsum
crassiores, at vix pilosae. Thorax postice canali-
culatus, ater. Elytra punctato-friata, atra,
fria media rufa, bis interrupta. Pectus haud
canaliculatum. Femora omnia dentata. Tibiae
a medio ciliatae.

7. B. femoribus omnibus tibiisque anticis dentatis, *nasutus*.
thorace elongato, aeneo, elytris acuminatis.
Ent. syst. 2. 493. 7. *

Brentus nasutus. Oliv. Inf. 84. tab. 2. fig. 7.
Habitat in Jamaica Insula.

8. B. femoribus dentatis, capite thoraceque canali- *canalicula-*
culatis, tibiis anticis bidentatis. *tus.*

Brentus canaliculatus. Lund. Act. Hist. nat.
Hafn. 5, 2. 78. 14. *

Brentus armiger. Herbst. Col. 7. tab. 108. fig.
5. fem.

Brentus interruptus. Herbst. Col. 7. tab. 108.
fig. 6. mas.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Seheffedt.

Magnitudine variat. Antennae pilosae, extrorsum,
crassiores. Caput postice rostrique basis canali-
culata. Thorax pectusque canaliculata. Elytra
crenato-friata, nigra, lineolis flavis; maris ro-
tundata, feminae apice valde producta. Pedes
atri, femoribus omnibus dentatis tibiisque anti-
cis bidentatis.

9. B. femoribus omnibus dentatis, posticis bidenta- *2dentatus*.
tis, elytris rotundatis: fria interrupta, flava.

Brentus 2dentatus. Lund. Act. Hist. nat. Hafn.
5. 2. 80. 15.

Ha-

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Statura praecedentis. Antennae pilosae, extremae crassiores. Rostrum atrum, haud canaliculatum. Thorax postice canaliculatus. Elytra crenato-striata, nigra, stria saepius interrupta. Apice in omni sexu rotundata. Pedes atris femoribus unidentatis, posticis bidentatis.

reticulatus 20. B. femoribus dentatis, cinereus, thorace punctato canaliculato, elytris sulcato-punctatis.

Brentus reticulatus. Lund. Act. Hist. nat. Hafn. 5. 2. 81. 16. ♀

Habitat in Sumatra. D. Daldorf.

Medius. Rostrum cylindricum, antennis brevibus, crassis. Caput cinereum. Thorax punctatus cinereus, canali medio lato exaratus. Elytra sulcata, sulcis punctatis; cinerea, ad futurae laevia, nigra, apice rotundata. Abdomen atrum. Mas minor, elytris postice minus rotundatis.

depressus. 21. B. femoribus omnibus dentatis, thorace canaliculato, rufus elytrorum futura atra.

Brentus depressus. Lund. Act. Hist. nat. Hafn. 5. 2. 83. 17.

Habitat in Guinea. Mus. Dom. de Sehestedt.

Statura et magnitudo omnino B. disparis. Rostrum cylindricum, atrum, lateribus a basi ad antennis cinereo-villosis. Antennae moniliformes. Thorax rufus, depressus, canali dorsali cinereo pubescente lateribusque antice parum compressis, cinereo-pubescentibus. Elytra punctato-striata: punctis impressis, cinereo-villosis, rufis futura late atra, apice rotundata. Pedes rufis femoribus dentatis.

calcar. 22. B. femoribus omnibus dentatis, thorace integro tibiis anticis bidentatis.

Bra

Brentus calcar. Lund. Act. Hist. nat. Hafn. 5.
2. 84. 18. *

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Caput et thorax atra nitida, nullo modo canaliculata. Elytra crenata-striata, nigra, lineolis flavis, apice truncata. Pedes atrii, femoribus omnibus dentatis. Tibiae anticae bidentatae.

23. B. femoribus dentatis, thorace integro, elytris longimanus
apice unidentatis, pedibus anticis elongatis.

Brentus longimanus. Lund. Act. Hist. nat. Hafn.
5. 2. 86. 19. *

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Statura omnino praecedentium. Caput obscure aeneum, rostro atro, antennisque filiformibus. Thorax oblongus, nigro aeneus, laevis, nullo modo canaliculatus. Elytra simpliciter striata, nigro aenea; lineolis flavis, apice truncata, unidentata. Pedes nigri, femoribus omnibus dentatis, antici longiores, tibiis unidentatis.

24. B. femoribus omnibus dentatis, thorace subintegro, rostro utrinque ferrato. ferrirostris

Brentus ferrirostris. Lund. Act. Hist. nat. Hafn.
5. 2. 86. 19. *

Brentus cinnamomeus. Herbst. Col. 7. tab. 107.
fig. 1. fem.

Habitat in Sumatra. D. Daldorff. Java.

Specimen unicum mas. Rostrum apice parum incrassatum, margine ferrato. Thorax dorso plano, vix canaliculato ater, nitidus. Elytra ad futuram striata, nigra, flavo-maculata. Pedes ferruginei, femoribus valde incrassatis, acutidentatis.

dispar.

25. B. femoribus omnibus dentatis, thorace plano, integro, ferrugineo: vittis duabus nigris, elytris acuminatis, flauo-lineatis. Ent. syst. 2. 493. 8. *

Brentus bifrons. Ent. syst. 2. 494. 10. *

Brentus dispar. Lund. Act. Hist. nat. Hafn. 5. 2. 88. 21. *

Curculio dispar. Linn. syst. Nat. 2. 613. 55. Mus. Lud. Vlr. 50.

a. *Brentus maxillofus*. Herbst. Col. 7. tab. 107. fig. 2. fem.

Brentus Gnatbo. Herbst. Col. 7. tab. 107. fig. 3.

Brentus dispar. Oliv. Inf. 84. tab. 1. fig. 1. 6.

β. *Brentus ruficollis*. Herbst. Col. 7. tab. 108. fig. 3.

Habitat in America meridionali. Dom. Drury.

Variat totus ater, lineolis tamen elytrorum eleuatis, glabris, distinctis.

cylindri-
cornis.

26. B. femoribus dentatis, thorace rotundato, nigro, aeneo, elytris ferrugineis, flauo-substriatis. Ent. syst. 2. 494. 9. *

Habitat in noua Zelandia.

tridentatus.

27. B. femoribus dentatis, capite punctato, subcalliculato, elytris sulcatis, femoribus anticis, compressis.

Brentus tridentatus. Lund. Act. Hist. nat. Hafn. 5. 2. 91. 22. *

Habitat in Sumatra. D. Daldorff, Mus. D. de Sehestedt.

Caput magnum, cylindricum, punctatum, subcalliculatum, mandibulis exsertis, validis, tridentatis. Thorax lateribus cinereo-villofis, dorso glabro, integro, atro. Elytra sulcata, nigra, flauo-maculata. Corpus atrum. Femora intus bi- extus videntata, apice incrassata, dente

dente ordinario, postica incrassata, vnidentata.

164. COLYDIVM. *Palpi* quatuor, clauati: articulo ultimo maiori.
Ligula membranacea, e-marginata.
Antennae perfoliatae.

1. *C. ferrugineum*, thorace fulcato. Ent. syst. 2. *fulcatum*.
 495. I. *

Habitat in Germania sub arborum corticibus.

IX.

2. *C. atrum*, elytris striatis, apice retusis.

retusum.

Habitat in Sumatra. Dom: Daldorff.

Sequentibus maius. Caput magnum, cylindricum, canaliculatum, atrum. Thorax cylindricus, vix punctatus, postice parum agustatus. Elytra striata, postice retusa, margine prominulo. Corpus atrum.

3. *C. obscure-brunneum*, elytris testaceis.

bicolor.

Habitat in Austria Dom. de Meyerle sub cortice Populi.

Corpus maiusculum. Caput obscure-brunneum, Antennis testaceis. Thorax striolis quatuor impressis obscure-ferrugineus. Elytra substriata, testacea. Corpus cylindricum, obscurum, elytris pedibusque testaceis.

4.

Colydii corpus paruum, cylindricum, elongatum, glabrum, immarginatum, tardum; capite ovato, plano, latitudine thoracis, inserto; oculis globosis, vix prominulis, lateralibus; antennis breuibus, distantibus, sub oculis insertis; thorace elongato, plano: dorso canaliculato; scutello triangulari; elytris rigidis, fornicatis, planis, longitudine elytrorum; pedibus breuibus, validis, compressis; tarsis quadriarticulatis; colore vario.

denticulatum 4. *C. nigrum*, thorace antice denticulis duobus eleuatis, compressis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Maius et latius reliquis. Antennae omnino perforatae, nigrae. Thorax marginatus, glaber, niger, lineis duabus dorsalibus, eleuatis, quae antice in denticulos duos eleuatos, compressos excurrunt. Elytra laeuius, nigra. Pedes rufi.

elongatum 5. *C. atrum*, pedibus ferrugineis. Ent. syst. 2. 495. 2. *

Colydium elongatum. Payk. Fn. Sv. 9. 312. 1.

Tritoma saucata. Thunb. Mus Vpf. 3. 39.

Ips linearis. Oliv. Inf. 2. 18. 53. tab. 2. fig. 17.

Roff. Fn. 50. 123. tab. 2. fig. 45.

Panz. Fn. Germ. 3. tab. 17.

Habitat in Europae ligno antiquo. Dom. de Paykull.

fstriatum 6. *C. nigrum*, thorace canaliculato, antice subdenticulato, elytris crenato-fstriatis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Paruum. Caput planum, margine utrinque reflexo.

Thorax punctatus, niger, dorso valde canaliculato. Elytra fstriato-punctata, nigra, fstriis apice parum eleuatis. Pedes ferruginei.

filiforme 7. *C. atrum*, elytris fulcatis: basi pedibusque ferrugineis. Ent. syst. 2. 496. 3. *

Habitat Halae Saxonum in truncis Quercus. Dom.

Hybner. *Varic. elongati.*

rufipes 8. *C. nigrum*, thorace laeui, elytris fstriatis, pedibus ferrugineis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Sta-

Statura omnino *C. friati*, at thorax laevis, nec rugosus, nec dentatus. Pedes ferruginei.

1. *C. atrum*, capite elytrorum basi pedibusque ferrugineis. *erythrocephalum.*

Habitat in Hungaria. Dom. Scheidler.

Statura et magnitudo omnino *C. filiforme*. Caput obscure-rufum. Thorax laevis, ater, immaculatus. Elytra laevis, atra, basi ferruginea. Pedes ferruginei.

2. *C. ferrugineum*, elytris laeuissimis. *cylindricum.*

Habitat in America meridionali. Mus. D. Lund.

Corpus totum elongatum, filiforme, laeve, brunneum.

3. *C. rufum*, elytris punctato-friatis. Ent. syst. *rufum.*
suppl. 175. 4. *

Habitat Parisiis. Dom. Brogniart.

4. *C. testaceum*, thorace crenato: dorso carinato. *frumentarium.*
Ent. syst. 2. 496. 4. *

Colydium bidentatum. Payk. Fn. Sv. 3. 313. 2.

Dermeestes surinamensis. Linn. syst. Nat. 2. 562.
29.

Tenebrio surinamensis. Degeer Inf. 5. 54. 5.
tab. 13. fig. 12.

Panz. Fn. Germ. 14. tab. 11.

Habitat in Americae meridionalis farina diutius asseruata. Mus. D. Banks.

Meram varietatem *Dermeestes* 6 dentati credit D.

de Paykull an rite? — *Omnino sci. Illig. IV. 162*

5. *C. atrum*, laeve, elytris, antennis pedibusque ferrugineis. *ruficornis.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
Dom. de Sehestedt.

Statura parva, elongata praecedentium. Antennae perfoliatae, rufae. Caput et thorax laevis, atra, niti-

nitidula. Elytra striata, nigra. Pedes ferruginei.

165. HYPOPHLOEVS. *Palpi aequales, clavati.*

Ligula elongata, integra.

Antennae extrorsum crassiores, utriusque ferratae.

rufipes.

1. H. ater, nitidus, pedibus ferrugineis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Sequentibus maior. Antennae compressae, atrae. Caput et thorax laevis, atra, nitida. Elytra striata, nigra, immaculata. Corpus nigrum, pedibus ferrugineis.

Boros.

2. H. supra niger, obscurus, subtus brunneus.

Boros elongatus. Herbst. Col. tab. 110. fig. 7.

Habitat in Finlandia. Mus. D. Lund.

Reliquis maior. Antennae breves, utrinque ferratae, nigrae. Caput punctatum, nigrum. Thorax planus, punctatus, niger, rufo purum micans. Elytra vix striata. Corpus et pedes ferruginea.

III. 9.

castaneus.

3. H. laevis, nitidus, castaneus, antennis nigris. Er. Syst. 2. 500. 1. *

H.

Hypophloeus corpus elongatum, cylindricum, glabrum, immixtum, natum, agile; capite ovato, transverso, inserto; oculis globosis, prominulis, lateralibus; antennis brevibus, distinctis, subter oculos insertis; thorace elongato, planiusculo; femoribus rotundato; elytris rigidis, fornicatis, longitudine abdominis; pedibus brevibus, validis, compressis; tarsis quinquearticulatis; colore vario.

- Hypophloeus castaneus*. Payk. Fn. Sv. 3. 321. 1.
Ips taxicornis. Oliv. Inf. 2. 18. 11. 15. tab. 1.
 fig. 2.
 Roff. Fn. Etr. 49. 122. tab. 4. fig. 2. I. 51
 Panz. Fn. Germ. 12. tab. 13.
 Herbst. Arch. tab. 21. fig. 6.
 Habitat sub cortice ~~Vini~~ ^{Quercus et Fagi} Dom. Prof. Helwig.
4. *H. laevis*, ater, elytris antennis pedibusque testaceis. Ent. syst. 2. 501. 2. * *linearis*.
 Payk. Fn. Sv. 3. 325. 6. I. 52
 Panz. Fn. Germ. 6. tab. 16.
 Habitat sub Pini sylvestris cortice Germaniae. Prof. Helwig.
5. *H. laevis*, ater, elytris testaceis: fascia atra. Ent. *fasciatus*.
 syst. 2. 501. 3. *
 Payk. Fn. Sv. 3. 324. 5. I. 52
 Panz. Fn. Germ. 6. tab. 17.
 Habitat sub cortice Quercus Germaniae. Prof. Helwig.
6. *H. ferrugineus*, elytris substriatis. Ent. syst. 2. *depressus*.
 501. 4. *
Ips unicolor. Oliv. Inf. 2. 18. 12. 16. tab. 2. f. 18.
Melinus. Herbst. Arch. tab. 21. fig. B. I. 52
 Payk. Fn. Sv. 3. 325. 7.
 Panz. Fn. Germ. 1. tab. 23.
 Habitat sub cortice Quercus Germaniae. Prof. Helwig.
7. *H. oblongus*, rufus, elytris testaceis, apice atris. *bicolor*.
 Ent. syst. 2. 501. 5. *
Ips bicolor. Oliv. Inf. 2. 18. 12. 15. tab. 2. f. 14. I. 53
 Payk. Fn. Sv. 3. 323. 3.
 Panz. Fn. Germ. 12. tab. 14.
 Habitat in Gallia, sub arborum corticibus.

bicornis. 8. *H. oblongus*, rufus, capite bicorni. Ent. syst. 2.
502. 6. *
Habitat in Gallia. Mus. Dom. Bosc.

166. LYCTVS. *Palpi* breuissimi, filiformes.
Maxilla brevis, membranacea, bifida.
Antennae claua solida.

* *antennarum articulo uno crassiori.*

politus. 1. *L. niger*, antennis pedibusque ferrugineis, thorace plano oblongo, punctato. Ent. syst. 2. 502.
1. *

J. 53. *Ips picipes*. Oliv. Inf. 2. 13. 77. tab. 2. fig. 12.
~~*Tenebrio minutus* Linn. syst. Nat. 2. 1675. 12. ?~~
Panz. Fn. Germ. 4. tab. 18. ?
Habitat in Europae Boletis arboreis.

depressus. 2. *L. brunneus*, pectore abdomineque nigricantibus, thorace oblongo, plano. Ent. syst. 2. 503. 2. *
Lyctus depressus. Payk. Fn. Sv. 3. 327. 2.
Habitat Dresdae. D. Hesse.

variet. L. politus
liti in 34. Varietatem praecedentis credit Dom. de Paykull,
at vix merito.

nitidulus. 3. *L. glaber*, ater, nitidus, capite elytrorum basi pedibusque ferrugineis. Ent. syst. suppl. 175.
2. *
variet. L. politus
liti in 34. Habitat in Germania. Dom. Meyerhoff.

4.

Lycti corpus oblongum, depressiusculum, glabrum, immarginatum, tardum; *capite* magno, ovato, plano, inserto; *oculis* parvis, vix prominulis, lateralibus; *antennis* breuibas, distantibus, sub oculis insertis, thorace ovato, planiusculo; *scutello* minuto; *elytris* rigidis, fornicatis, longitudine abdominis; *pedibus* breuibas, validis, compressis; *tarsis* quinquearticulatis; *colore* obscuro.

4. *L. glaber*, ater, elytris puncto ferrugineo. Ent. *2 pustulatus*.
 syst. 2. 503. 3. *
Lyctus dispar. Payk. Fn. Sv. 3. 328. 3. β.
Ryzophogus clauicornis. Herbst. Col. 5. tab. 45. *var. L. politus*
 fig. 10. *Pl. bipunctatus. tab. 45. f. 9.* *Dr. III.*
 Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.
5. *L. niger*, thorace ovato plano vtrinque dentato. *dentatus*.
 Ent. syst. 2. 503. 4. *
 Habitat in America meridionali. Mus. D. Lund.
6. *L. ferrugineus*, elytris laevibus, testaceis. Ent. *brunneus*.
 syst. 2. 503. 5. *
 Habitat in Americae Infulis. Dr. Pflug.
7. *L. oblongus*, ferrugineus, elytris punctato-striato-*terebrans*.
 tis. Ent. syst. 2. 503. 6. *
Ips terebrans. Oliv. Inf. 2. 18. 5. 4. tab. 1. fig. 7.
Lyctus cylindricus. Panz. Fn. Germ. 35. t. 18.
 Habitat in Germania, sub arborum corticibus. D.
 Prof. Helwig.
8. *L. obscurus*, elytris striatis, antennis pedibusque *Iuglandis*.
 testaceis. Ent. syst. 2. 504. 7.
Monotoma striata. Herbst. Col. 5. tab. 46. f. 1. *I. 53*
 Payk. Fn. Sv. 3. 330. 6.
 Panz. Fn. Germ. 5. tab. 17.
 Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.
9. *L. ater*, nitidus, antennis pedibusque piceis. Ent. *bisteroides*.
 syst. 2. 504. 8. *
Ryzophogus bisteroides. Herbst. Col. 5. t. 45. f. 2. *I. 54*
 Payk. Fn. Sv. 3. 329. 5.
 Panz. Fn. Germ. 5. tab. 16.
 Habitat in Dania, sub arborum corticibus. Mus. D.
 Lund.
- ** *Antennarum articulis duobus crassioribus.*
10. *L. niger*, thorace rugoso, elytris striato-crenato-*crenatus*.
 tis: maculis duabus rufis. Ent. syst. 2. 504. 9. *
 T. II. N n *Lyctus I. 54.*

- Lyctus crenatus*. Payk. Fn. Sv. 3. 334. II.
Ips crenata Oliv. Inf. 2. 18. 6. 6. tab. 2. fig. 9.
Monotoma crenata. Panz. Fn. Germ. 1. tab. 24.
Bitoma crenata. Herbst. Col. 5. tab. 46. fig. 6.
 Herbst. Arch. 14. tab. 20. fig. 20.
 Habitat in Europa, sub arborum corticibus.
- rufipennis*. 11. *L. niger*, thorace rugoso, elytris rufis.
 Habitat in Germania.
 Affinis certe praecedenti, cuius varietatem olim credidi. Differt tamen thorace minus rugoso, elytrisque vix crenatis totis rufis.
- obscurus*. 12. *L. depressus*, niger, thorace lineis quatuor eleuatis, elytris obscuris, eleuato-lineatis.
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.
 Minor *L. crenato*. Antennae ferrugineae: articulis duobus crassioribus. Caput nigrum, obscurum, linea vnica eleuata. Thorax depressus, niger, obscurus: lineis quatuor eleuatis. Elytra depressa, fusca: lineis tribus eleuatis.
- canaliculatus*. 13. *L. obscurus*, thorace canaliculato, elytris striatis brunneis. Ent. syst. 2. 504. II.
Ips oblonga. Oliv. Inf. 2. 18. 7. 8. tab. 1. fig. 5.
Bitoma unipunctata. Herbst. Col. 5. tab. 46. f. 3.
J. 54. *Dermestes linearis*. Thunb. Act. Vpf. 4. 4. 4.
 Payk. Fn. Sv. 3. 332. 9.
 Panz. Fn. Germ. 4. tab. 16.
 Geoff. Inf. 1. 103. 9.
 Habitat sub arborum corticibus. Mus. D. Banks.
- baematodes*. 14. *L. obscurus*, thorace punctato-subcarinato, elytris crenato-striatis.
 Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.
 Statura parua *L. canaliculati*. Antennae breues, crassae: articulis vltimis duobus, paullo crassioribus, subferrugineis. Thorax niger, obscurus.

rus, depressus, subcarinatus, vel potius vtrin-
que parum impressus. Elytra striata.

5. *L. ater*, glaber, nitidus, antennis pedibusque *nitidus*.
ferrugineis. Ent. syst. 2. 505. 12. *

Lyctus nitidus. Payk. Fn. Sv. 3. 331. 8.

I. 55.

Habitat in Germania. Dom. Prof. Helwig.

6. *L. oblongus*, ferrugineus, elytris punctato-stria- *contractus*
tis: futura nigra. Ent. syst. 2. 505. 13. *

Ips contracta. Oliv. Inf. 2. 18. 6. 5. tab. 2. f. 10.

Bitoma 2 punctata. Herbst. Col. 5. tab. 46. f. 5.

Geoff. Inf. 1. 103. 8.

Payk. Fn. Sv. 3. 333. 10.

Habitat in Gallia, sub arborum cortice.

67. CATOPS. *Palpi* inaequales, subulati.

Labium membranaceum, bifi-
dum: laciniis breuibus, acu-
tis.

Antennae extrorsum crassiores.

C. niger, elytris pedibusque griseis.

rufescens.

Tritoma minuta. Ent. syst. 1. 2. 507. 9. *

Chrysomela minuta. Linn. syst. Nat. 2. 593. 50.

Fn. Sv. 533.

~~*Ptomaphagus rufescens*. Illig. Col. Bor. 1. 87. 1.~~

Habitat sub corticibus arborum.

2. C.

Catops corpus paruum, oblongum, gibbum, immarginatum,
agile; *capite* latitudine fere thoracis, deflexo; *oculis* par-
uis, rotundatis, lateralibus posticis; *antennis* extrorsum cras-
sioribus: articulo primo longiori, incuruo, ante oculos inser-
tis; *thorace* latitudine elytrorum, margine rotundato; *elytris*
rigidis longitudine abdominis; *pedibus* longiusculis; *femori-*
bus compressis; *tibiis* extus ferratis; *tarsis* quinquearticu-
latis; *colore* nigro aut brunneo, obscuro.

*sericeus.*2. *C. holosericeus*, nigricans, pedibus testaceis.*Tritoma sericea*. Ent. syst. 1. 2. 507. 8. *~~*Catops sericeus*. Payk. Fn. Sv. 1. 342. 1.~~*Cbolema*. Latreille.Herbst. Col. 4. 196. 6. ~~♀♀♀~~

Habitat in Germania sub arborum corticibus.

Os palpis maxillisque. *Palpi* quatuor inaequales, filiformes: *anteriores* elongati, quadriarticulati; articulo primo breui, rotundato, reliquis subaequalibus; ultimo subulato, adhaerentes maxillae dorso; *posteriores* breues triarticulati: articulo ultimo subulato, paullo obtusiore adnati labii laciniis. *Labrum* breue, transuersum. *Mandibula* breuis, cornea, arcuata, acuta, inermis. *Maxilla* membranacea, bifida: laciniis tenuibus, obtusis: exteriore paullo longiore. *Ligula*-basi cornea, apice membranacea, bifida: laciniis breuibus, linearibus, acutis. *Labium* breue, corneum, transuersum, integrum.

*vittatus.*3. *C. rufus*, elytris nigris: vitta nigra.*Tritoma vittata*. Ent. syst. 2. 506. 6. *

Habitat in India. Mus. Dr. Hunter.

*morio.*4. *C. holosericeus*, ater, antennis pedibusque concoloribus.*Tritoma morio*. Ent. syst. 2. 507. 7. **Catops morio*. Payk. Fn. Sv. 1. 344. 2.♀ *Ptomaphagus fornicatus*. Illig. Col. Bor. 1. 89. 3♀ *Dermestes fornicatus*. Degeer Inf. 4. 216. 9
♀ tab. 8. fig. 15.

I. 9. ♀ Panz. Fn. Germ. 8. tab. 1.

♀ Habitat Kiliae. D. Daldorff.

*flavipes.*5. *C. fuscus*, ore, antennis pedibusque ferrugineis elytrorum striis crenatis.*Helops flavipes*. Ent. syst. 1. 122. 27. *

Habi

Habitat in Americae meridionalis Infulis. Dom.
Smidt.

6. *C. niger*, elytris pedibusque testaceis. *agilis.*

Tritoma dubia. Ent. syst. 2. 506. 5. *

~~*Ptomaphagus agilis*. Illig. Col. Bor. 1. 88. 2.~~

Habitat Kiliae. Muf. D. Lund,

VIII. 34.

168. MYCETOPHAGVS. *Palpi* inaequales.

Maxilla membrana-
cea, unidentata.

Ligula rotundata, in-
tegra,

Antennae extrorsum
crassiores.

1. *M. niger*, elytris striatis: fascia apiceque rufis, ^{ola}*fasciatus.*
antennis pedibusque ferrugineis. Ent. syst.
suppl. 175. 1. *

Habitat Tranquebariae. D. Daldorff.

2. *M. rufus*, thorace elytrisque nigris: his maculis 4 macula-
duabus rufis. tus.

Silphoides Boleti. Herbft. Arch. tab. 61. f. 10.

Chrysomela 4pustulata. Linn. syst. Nat. 2. 592.

80. Fn. Sv. 549.

Panz. Fn. Germ. 12. tab. 9.

~~Geoff. Inf. 1. 106. 16.~~

I. 49.

Payk. Fn. Sv. 3. 315. 1.

Habitat in Germaniae Boletis.

3. *M.*

Mycetophagi corpus oblongum, glabrum, immarginatum, ag-
le; capite parvo, rotundato, inserto; oculis prominulis, glo-
bosis, lateralibus; antennis brevibus, distantibus, sub oculis
insertis; thorace transverso, ovato: marginibus rotundatis;
scutello rotundato; elytris rigidis, fornicatis, longitudine ab-
dominis; pedibus brevibus, cursoriis, compressis; tarsis
quinquearticulatis; colore plerumque rufo-nigro, vario.

- ellipticus.* 3. *M. niger*, elytris laevibus: macula baseos elliptica sanguinea.
Tenebrio ellipticus. Ent. syst. suppl. 49. 15. *
 Habitat in Carolina, sub arborum cortice. Mus.
 D. Bosc.
- Ianus.* 4. *M. supra niger*, subtus ferrugineus, elytris laevibus.
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
 D. de Sehestedt.
 Antennae extrorsum crassiores nigrae, basi apiceque ferrugineae. Caput, thorax, elytra laevia, nigra, opaca, immaculata. Corpus et pedes ferruginea.
- bicolor.* 5. *M. obscurus*, subtus antennis pedibusque ferrugineis, elytris striatis. Ent. syst. 2. 497. 2. *
 Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.
 Affinis praecedenti, at distinctus videtur paullo minor, et elytra striata.
- pustulatus.* 6. *M. niger*, opacus, elytris macula ferruginea.
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
 D. Lund.
 Antennae nigrae, articulo primo ultimoque ferrugineis. Caput et thorax nigra. Elytra laevia, nigra, macula magna, ferruginea. Corpus piceum, pedibus testaceis.
- maculatus* 7. *M. niger*, elytris, macula baseos, fascia postica apiceque ferrugineis.
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
 D. de Sehestedt.
 Statura et magnitudo praecedentium. Antennae ferrugineae. Caput et thorax nigra, laevia, obscura, immaculata. Elytra laevia, obscura, macula baseos, fascia versus apicem apiceque obscure rufis. Corpus nigrum, pedibus rufis.

8. *M. niger, obscurus, pedibus testaceis.* *rufipes.*
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
 D. Lund.
 Praecedente paullo minor. Corpus totum nigrum,
 obscurum. Antennae basi parum et pedes fer-
 ruginei.
9. *M. niger, obscurus, elytris fascia media pedibus- fasciatus.*
que rufis.
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
 D. de Sehestedt.
 Statura et magnitudo omnino *M. 2 pustulati*, cu-
 jus forte mera varietas. Differt tantum fascia
 elytrorum lata, loco puncti. Corpus nigricans,
 pedibus ferrugineis.
10. *M. niger, thorace elytrisque ferrugineo nigro- varius.*
que variis.
 Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
 D. Lund.
 Statura praecedentium, at paullo minor. Anten-
 nae nigrae, articulo primo ultimoque ferrugi-
 neis. Thorax elytraque laenia, obscura, ferru-
 gineo valde variegata. Corpus nigrum, abdo-
 minis margine rufo. Pedes ferruginei.
11. *M. niger, elytris striatis, pedibus rufis.* *flavipes.*
 Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.
 Statura omnino *M. bicoloris*, at paullo minor, et
 antennae et corpus nigra.
12. *M. supra niger, elytris laeuis, basi apiceque glabratus.*
rufis.
 Habitat in Germania. D. de Meyerle.
 Statura praecedentium, *M. fasciato* affinis. Caput
 nigrum. Thorax minus niger, margine in pri-
 mis parum rufescente. Elytra laeuia, nigra,
 basi apiceque late rufa. Corpus cum pedibus
 rufum.

St Tenebris, 8 9 11 Dec

13. M.

L. chrysocephalus Torr. I. 149-78

- dermestoides.* 13. *M. fuscus*, abdomine pedibusque testaceis. Ent. syst. 2. 498. 3.
Habitat in Germaniae Boletis.
- atomarius* 14. *M. niger*, elytris, punctis fasciaque postica fulvis. Ent. syst. 2. 498. 4. *
Dermestes atomarius. Thunb. Inf. Sv. 67. 78.
Payk. Fn. Sv. 3. 317. 3.
Panz. Fn. Germ. 12. tab. 10.
Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.
- nigrita.* 15. *M. niger*, subtus piceus, elytris substriatis.
Habitat Tranquebariae.
Magnitudo fere *M. dermestoides*. Caput, thorax elytraque substriata, nigra, immaculata. Corpus piceum.
- multipunctatus.* 16. *M. rufus*, elytris substriatis: punctis rufis, numerosis. Ent. syst. 2. 498. 5. *
Dermestes multipunctatus. Thunb. Inf. Suec. 679.
Payk. Fn. Sv. 3. 320. 7.
Panz. Fn. Germ. 12. tab. 11.
Habitat in Sueciae Boletis. Dom. de Paykull.
- 10 punctatus.* 17. *M. niger*, elytris punctis quinque pedibusque rufis.
Habitat in Russia. Mus. D. Lund.
Statura et magnitudo *M. multipunctati*. Antennae nigrae: articulo ultimo rufo. Caput et thorax laevia, nigra, thoracis basi punctis duobus impressis. Elytra substriata, nigra, punctis quinque 1. 1. 2. 1. rufis. Corpus nigrum, pedibus rufis.
- pivicornis.* 18. *M. ater*, elytris striatis, antennis pedibusque piceis. Ent. syst. 2. 498. 6. *
Habitat in Americae meridionalis Insulis. D. Smidt.
- lunaris.* 19. *M. rufus*, elytris substriatis, nigris: lunulis duobus punctisque duobus rufis.

Habitat in Germania.

Statura praecedentium. Antennae obscurae, apice rufae. Caput nigrum, ore rufo. Thorax rotundatus, laevis, rufus. Elytra substriata, nigra, lunula baseos, puncto ad marginem, lunula transuersa punctoque ante apicem rufis.

20. *M. ater*, elytris fasciis duabus lunatis punctoque *furcatus*.
apicis rufis.

Habitat in Austriae Betula. Dom. de Meyerle.

Statura praecedentis, at duplo minor. Caput cum antennis nigrum. Elytra sublaeuis, nigra, fasciis duabus latis, lunatis punctoque paruo apicis rufis. Pedes rufi.

21. *M. niger*, thorace rufo, elytris striatis: margine *fulvicollis*.
maculisque duabus rufis. Ent. syst. 2. 499. 8. *

Payk. Fn. Sv. 3. 320. 6.

Pl. 99.

Habitat in Germania. Mus. D. Lund.

22. *M. piceus*, elytris striatis, nigris: basi puncto-*piceus*.
que postico ferrugineis. Ent. syst. 2. 499. 9. *

Payk. Fn. Sv. 3. 318. 4.

Panz. Fn. Germ. 1. tab. 22.

I. 50.

Habitat in Germania. Dom. de Hattorff.

23. *M. niger*, elytris macula baseos ferruginea. *humeralis*.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
Dom. de Sehestedt.

Paruus, subvillosus, supra niger, elytris macula magna baseos ferruginea. Corpus ferrugineum.

24. *M. flavus*, antennis nigris. Ent. syst. 2. 499. 11. *nigricornis*.

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

nis.

25. *M. ater*, elytris striatis, antennis pedibusque *castaneis*.
castaneis. Ent. syst. 2. 499. 12. *

Payk. Fn. Sv. 3. 316. 2.

II. 66.

Habitat in Germania. Dom. Prof. Helwig.

Populi. 26. *M. testaceus*, capite elytrisque fasciis duabus fuscis. Ent. syst. suppl. 176. 12. *

Payk. Fn. Sv. 3. 319. 5.

Habitat in Sueciae Populo. Dom. de Paykull.

metallicus. 27. *M. aeneus*, pedibus ferrugineus. Ent. syst. 2.

*Est Napierisbirola F. 499. 13. **

Scot. annica Peng. 8. 2.

Habitat Halae Saxonum. Dem. Hybner.

testaceus. 28. *M. testaceus*, immaculatus. Ent. syst. 2. 499. 14. *

Habitat in Germaniae Boletis. D. Prof. Helwig.

169. TRITOMA. *Palpi* anteriores securi-formes.

Antennae claua perfoliata.

aguttatum 1. *T. ferrugineum*, elytris macula baseos apicisque flauis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Paullo maior *T. 2 pustulata*. *Antennae* ferrugineae: claua compressa. Caput et thorax laeuius, glabra, ferruginea, immaculata. Elytra punctato-friata, ferruginea: macula baseos apiceque late albidis. Corpus ferrugineum.

fasciatum. 2. *T. pallidum*, elytris puncto fuscia punctoque apicis fuscis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Sta-

Tritomatis corpus onatum, gibbum, glabrum, immarginatum, agile; capite paruo, ouato, inserto; oculis globosis, promi-nulis, lateralibus; antennis breuibus, distantibus, sub oculis insertis; thorace gibbo, transuerso, onato; scutello retun-dato; elytris rigidis, fornicatis, gibbis, longitudine abdominis, apice deflexis; pedibus breuibus, compressis; tarsis quinquearticulatis; colore nigro rufoque nitido.

Statura et magnitudo praecedentis. Antennae pallidae, claua compressa, perfoliata, fusca. Thorax marginatus, pallidus, interdum obscurior. Elytra glabra, laeuis, pallida, puncto vno aut duobus haeseos, fascia lata media, ad futuram dilata punctoque apicis ferrugineis. Corpus ferrugineum, pedibus pallidis.

3. *T. atrum*, elytris macula laterali coccinea, pedibus nigris. Ent. syst. 2. 505. 1.* 2 pustulatum.

Tritoma. Geoff. Inf. 1. 335. 1. tab. 6. fig. 2.

Panz. Naturf. 24. 12. 17. tab. 1. fig. 17.

Payk. Fn. Sv. 3. 335. 1.

Herbst. Col. 4. 193. 1. tab. 43. fig. 11.

Habitat in Boletis arboreis Angliae, capta d. 17.

Aprilis ad Hamstead.

4. *T. atrum*, elytris macula laterali rufa, pedibus rufis. *bumerale.*

Habitat in Carolina. Mus. Dom. Bosc.

Statura omnino praecedentis, at distincta videtur.

Antennae rufae, claua nigra. Differt inprimis corpore paullo minore, minus nitido, macula elytrorum laterali absque puncto nigro pedibusque totis rufis.

5. *T. rufum*, capite, thorace pedibusque atris. *rufipenne.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.

D. de Sehestedt.

Magnitudo T. 2 pustulatae. Caput et thorax atra, nitida, immaculata. Elytra laeuissima, sanguinea, immaculata. Corpus rufum, pedibus nigris.

6. *T. pallide nitidum*, antennis atris. *nigricorne*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.

D. Lund.

Corpus totum glabrum, pallidum, nitidum, antennis solis atris.

- glabrum*. 7. T. glabrum, atrum, antennis pedibusque piceis. Ent. syst. 2. 506. 2. *
Payk. Fn. Sv. 3. 335. 2.
~~#. 66. Panz. Fn. Germ. 23. tab. 19.~~
Habitat in Suecia, sub arborum cortice. D. de Paykull.
- marginatum*. 8. T. atrum, abdominis margine sanguineo. Ent. syst. 2. 506. 3. *
Habitat in Americae meridionalis Insulis. Dom. Smidt.
- connatum*. 9. T. pubescens, nigrum, obscurum, thorace pedibusque rufis, elytris connatis.
Tritoma connata. Panz. Fn. Germ. 36. tab. 18.
III. 64 Habitat in Austria. Dom. de Meyerle.
Statura parva praecedentium, at distinctum elytris connatis.
- collare*. 10. T. nigrum, thorace pedibusque rufis.
Habitat in Austria. D. de Meyerle.
Maior quam T. rufipes. Caput cum antennis nigrum. Thorax laevis, rufus, nitidus. Elytra laevis, obscura. Corpus nigrum, ano parum rufescente.
- rufipes*. 11. T. atrum, nitidum, capite, thorace pedibusque rufis.
Ent. syst. 2. 506. 4. *
Habitat in Norwagiae, Germaniae fungis arboreis.
- pulchellum*. 12. T. rufum, nitidum, elytris atris. Ent. syst. suppl. 177. 4. *
Habitat in India. Mus. D. de Sehestedt.
- punctatum*. 13. T. rufum, nitidum, thorace punctis quatuor atris.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.
Media. Antennae rufae, clava perfoliata, atra. Caput rufum, nitidum, puncto frontali atro.
Tho-

Thorax laevis, rufus, nitidus: punctis quatuor atris 2. 2. Elytra subpunctato-striata, rufa. Corpus rufum, immaculatum.

14. T. rufum, nitidum, antennarum clava nigra. *rufum.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.

Media. Caput et thorax laevis, rufa, nitida, antennarum clava perfoliata, nigra. Elytra subtilissime striato-punctata. Corpus rufum.

15. T. glabrum, atrum, pedibus ferrugineis. *atrum.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Corpus medium totum atrum, nitidum, pedibus folis ferrugineis.

16. T. glabrum, ferrugineum, elytris basi fasciaque media atris. *2fasciatum*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. de Sehestedt.

Media. Caput et thorax obscure rufa et fere nigra, nitida. Elytra laevis, rufa, basi fasciaque pene medium atris. Corpus rufum.

17. T. nigrum, elytris fuscis: strigis vndatis albis. *vndatum.*

Antbribus vndatus. Ent. syst. 2. 378. 7. *

Bruchus vndatus. Mant. Inf. 1. 41. 9.

Habitat in Africae floribus. D. Prof. Vahl.

Species mihi haud rite nota. Vix ad hoc genus pertinere videtur.

170. TETRATOMA. *Palpi crassiusculi inaequales.*

Maxilla membranacea, bifida.

Ligula breuissima rotundata, integra.

Antennae articulis quatuor ultimis clauatoperfoliatis.

Fungorum.

1. *T. rufum*, capite elytrisque nigris. Ent. syst. 2. 507. 1. *

Tetratoma dermestoides. Herbst. Col. 4. tab. 38. fig. 7.

Panz. Fn. Germ. 9. tab. 10.

J-56. Payk. Fn. Sv. 3. 337. 1.

Habitat in Fungis arboreis Germaniae. D. Daldorf.

dimidiatum.

2. *T. atrum*, capite, thorace pedibusque rufis.

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Media. Antennae huius generis nigrae, basi rufae. Caput et thorax substriata; glabra, rufa, immaculata. Elytra laevia, atra. Corpus atrum, pedibus rufis.

ruficolle.

3. *T. nigrum*, thorace pedibusque rufis. Ent. syst. suppl. 176. 2. *

Habitat in Selandia. Mus. D. Lund.

2.

Tetratomatis corpus oblongum, glabrum, immarginatum, tardum; capite ovato, inserto; oculis magnis, globosis, prominulis, lateralibus; antennis breuibus, distantibus, sub oculis insertis; thorace gibbo, transverso; scutello rotundato; elytris rigidis, fornicatis, longitudine abdominis, apice deflexis; pedibus tenuibus, longiusculis; tarsis quinquearticulatis; colore atro, nitido.

4. *T. capite* thoraceque testaceis, coleoptris nigris: *ancora*.
macula communi lobata alba. Ent. syst. 2. 508.

2. *

Panz. Fn. Germ. 9. tab. 9.

Herbst. Col. 4. tab. 38. fig. 8.

Habitat in Germania. Dom. Prof. Helwig.

I. 57.

171. SCAPHIDIVM. *Palpi* filiformes.

Maxilla bifida.

Antennae articulis quin-
que clauato-perfolia-
tis.

1. *S. atrum*, elytris truncatis: maculis duabus rufis. ~~4 macula-~~
Ent. syst. 2. 509. 1. * ~~tum.~~

Scaphidium 4 *maculatum*. Oliv. Inf. 2. 20. 1.
tab. 1. fig. 1.

Payk. Fn. Sv. 3. 338. 1.

Panz. Fn. Germ. 12. tab. 11.

Herbst. Col. 5. tab. 49. fig. 4.

Habitat in Germaniae truncis putrescentibus.

I. 57.

2. *S. atrum*, nitidum, thoracis margine elytrorum- ~~4 pustula-~~
que macula sanguineis. Ent. syst. 2. 509. 2. * ~~tum.~~

Scaphidium 4 *pustulatum*. Oliv. Inf. 2. 20. 4. 2.
tab. 1. fig. 2.

Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

3.

Scaphidii corpus ouatum, antice posticeque acuminatum, gla-
brum, immarginatum, agile; *capite* paruo, acuto, inserto;
oculis globosis, prominulis, lateralibus; *antennis* breuibus,
distantibus, sub oculis insertis; *thorace* transuerso, antice
parum angustato; *scutello* minuto, rotundato; *elytris* rigi-
dis, fornicatis, abdomine acutissimo breuioribus; *pedibus*
longiusculis, teretibus, eurforiis; *tarsis* quinquearticulatis;
colore atro rufoque nitido.

immaculatum. 3. *S. atrum*, nitidum, elytris immaculatis, punctatofriatis. Ent. syst. suppl. 177. 3. *

Scaphidium immaculatum. Oliv. Inf. 2. 20. 3. tab. 1. fig. 3.

Habitat in Gallia. Mus. D. Bosc.

agaricinum. 4. *S. atrum*, nitidum, antennis pedibusque flavis. Ent. syst. 2. 510. 3. *

Scaphidium agaricinum. Oliv. Inf. 2. 20. 5. tab. 1. fig. 4.

Silpha agaricina. Linn. syst. Nat. 2. 670. Fn. Sv. 448.

Dermestes bemipterus. Panz. Naturf. 24. tab. fig. 14.

Panz. Fn. Germ. 12. tab. 16.

J. 58 Payk. Fn. Sv. 3. 339. 2.

Herbst. Col. 5. tab. 49. fig. 5.

Habitat in Europae Agaricis.

concolor. 5. *S. atrum*, nitidum, elytris laevissimis. Habitat in America, in Carolina. Mus. D. Bosc. Omnino distinctum a *S. immaculato*. Corpus duplo minus, totum atrum, pedibus obscure piceis. Elytra laevissima.

2. IPS. *Palpi* aequales, breuissimi: articulo ultimo ouato.

Maxilla bifida.

Ligula conica, emarginata.

Antennae perfoliatae.

. ferruginea, elytris atris: punctis sex albis. *guttata*.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.

D. Lund.

Corpus oblongum. *Antennae* perfoliatae, nigrae.

Caput et thorax ferruginea, immaculata. Elytra

laeuia, atra, punctis sex albis 2. 2. 2. Corpus

ferrugineum.

. glabra, atra, elytris maculis duabus rufis. Ent. *grandis*.

syft. 2. 511. 2. *

Habitat in Africa aequinoctiali. Mus. D. Lee.

. glabra, atra, elytris fasciis duabus rufis: anteriore abbreviata.

Habitat in Sumatra. D. Daldorff.

Statura praecedentium, at distincta. Caput et tho-

rax laeuia. Elytra atra, fasciis duabus rufis.

Anterior futuram haud attingit, at in medio

antice posticeque dentem emittit. Posterior vix

nec futuram, nec marginem attingit.

. atra, elytris limbo antico fasciaque postica sinuata.

tis, fuluis.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.

D. de Sehestedt.

Me-

is corpus oblongum, gibbum, glabrum, immarginatum, agile; capite ouato, planiusculo, inserto; oculis globosis, prominulis, lateralibus; antennis breuibus, distantibus, subter oculos insertis; thorace transuerso, subquadrato; scutello rotundato; elytris rigidis, fornicatis, longitudine abdominis; pedibus breuibus, validis; tibiis compressis; tarsis quadrarticulatis; colore plerumque atro, nitido.

Γ. II.

Οο

Media. Antennae clava perfoliata. Caput et thorax laevis, atra, nitida. Elytra subpunctato-striata, atra, nitida, basi margineque ultra medium sinuatis, fulvis. Pone medium fascia vtrinque sinuata, flava, quae tamen suturam haud attingit. Corpus cum pedibus atrum.

collaris.

5. I. ferruginea, thorace atro; margine albo, puncto nigro.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Statura et magnitudo praecedentis. Antennae ferrugineae, clava nigra. Caput atrum, ore ferrugineo. Thorax ater, laevis, nitidus, lateribus late albis: puncto nigro. Elytra punctato-striata, ferruginea, macula humerali atra. Corpus ferrugineum, pectore atro.

nigricornis.

6. I. testacea, nitida, antennis nigris.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.

Statura praecedentium, at tota glabra, testacea, nitida, antennis folis nigris.

3punctata. 7. I. atra, elytris rufis: macula magna, atra. Ent. syst. 2. 511. 3. *

Habitat in Europa australiori. Dom. Saldoner.

2pustulata. 8. I. atra, elytris macula baseos rufa. Ent. syst. 2. 511. 4. *

VII. 55.

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

fasciata.

9. I. pallida, thorace punctis elytris fascia dentata atris.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Statura Ips 2 punctatae, at minor. Caput pallidum, antennarum clava compressa, nigra. Thorax pallidus: punctis septem nigris fere in annulo

po

positis. Scutellum nigrum. Elytra laevia, pallida, nitida, maculis duobus baseos obscuris, fascia media lata, dentata, atra, quae ad futuram dilatatur, fasciolaque ante apicem obscura. Corpus pallidum.

10. I. pallida, coleoptris macula media nigra. Ent. *dorsalis*.
Syst. 2. 512. 5. *

Habitat in Europa australi. Dom. Prof. Vahl.

11. I. nigra, elytris laeuissimis: punctis duobus ferrugineis. Ent. Syst. 2. 512. 6. * *4 pustulata*.

Silpha quadripustulata. Linn. Syst. Nat. 2. 570.
5. Fn. Sv. 446.

Degeer Inf. 4. 185. 12. tab. 6. fig. 20. 21.

Naturf. 24. 12. tab. 1. fig. 18.

Oliv. Inf. 2. 12. 8. 9. tab. 3. fig. 22.

Payk. Fn. Sv. 3. 341. 1.

Herbst. Col. 4. tab. 42. fig. 1.

Habitat in Europa boreali.

12. I. nigra, elytris striatis: punctis quatuor rufis. *4 notata*.
Ent. Syst. suppl. 179. 6. *

Payk. Fn. Sv. 3. 344. 4.

Habitat in Germaniae truncis.

13. I. picea, elytris subpunctatis, nigris, basi ferrugineis. *punctata*.

Mycetophagus punctatus Ent. Syst. 2. 499. 10. * *I. 51.*

Cryptophagus punctatus. Payk. Fn. Sv. 3. 351. 1.

Cryptophagus pilosus. Herbst. Col. 4. tab. 42.
fig. 15.

Panz. Fn. Germ. 12. tab. 12.

Habitat in Germaniae fungis. Dom. Prof. Helwig.

14. I. nigra, elytris fasciis duabus punctoque apice ferrugineis. *bifasciata*.

Mycetophagus 2fasciatus Ent. Syst. 2. 499. 11. * *I. 51.*

Cryptophagus 2fasciatus. Payk. Fn. Sv. 3. 352. 2. *V. 16*

Herbst. Col. 4. tab. 42. fig. 12.

Panz. Fn. Germ. 2. tab. 14.

Habitat Halae Saxorum. Dom. Hyhner.

6 pustulata 15. I. nigra, elytris striatis: maculis tribus rufis.

Ent. syst. 2. 512. 7. *

Habitat in Europa boreali. Mus. D. de Scheffeld.

4 guttata 16. I. atra, nitida, elytris maculis duabus albis: anteroiore sinuata. Ent. syst. 2. 513. 8. *

Nivoidula 4 guttata. Oliv. Inf. 2. 12. 19. 22. tab. 3. fig. 25.

Payk. Fn. Sv. 3. 343. 3.

Herbst. Col. 4. tab. 42. fig. 3.

I. 59 Panz. Fn. Germ. 3. tab. 18.

Habitat in Europa.

ferruginea 17. I. ferruginea, elytris testaceis. Ent. syst. 2. 513. 9. *

Dermestes ferrugineus. Linn. syst. Nat. 2. 564.

21. Fn. Sv. 433.

I. 55 Payk. Fn. Sv. 3. 344. 5.

Panz. Fn. Germ. 8. tab. 15.

Habitat in Germania. Mus. Dom. de Laewen-
skiold.

baemorrhoidalis 18. I. rufa, elytris nigris, apice rufis. Ent. syst. 2. 513. 11. *

Diaperis baemorrhoidalis. Payk. Fn. Sv. 3. 360. 4.

I. 67 Panz. Fn. Germ. 13. tab. 16.

Habitat in Suecia. Dom. de Paykull.

Differt ab hoc genere, numero articularum tarsi, vix tamen Diaperis, mihi haud rite examinata.

pallida 19. I. pallida, elytris laevissimis, antennarum clava nigra.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. Lund.

Cor-

Corpus parvum, totum testaceum; glabrum, laeve,
immaculatum, antennis solis, clava fusca.

173. TRIPLAX. *Palpi* inaequales, securiformes.

Ligula trifida.

Antennae clava perfoliata.

1. T. rufa, antennis, elytris pectoreque nigris.

Ips nigripennis. Ent. syst. 2. 513. 10. *

Silpha ruffica. Linn. syst. Nat. 2. 570. 10. Fn.
Sv. 449.

Anthribus ruber. Degeer Inf. 5. 28. 30. tab.
8. fig. 12.

Triplax ruffica. Payk. Fn. Sv. 3. 346. 1.

Triplax ruffica. Herbst. Col. 8. tab. 49. fig. 12.

Erotylus rufficus. Oliv. Inf. 89. tab. 1. fig. 1.

Herbst. Arch. tab. 43. fig. 9.

Habitat in Germaniae arboribus. D. Smidt.

Os maxillis palpisque. *Palpi* quatuor inaequales,
anteriores longiores, quadriarticulati: articulo
secundo longissimo, obconico, tertio breviorē,
crassiusculo, quarto maximo, compresso, secu-
riformi, adhaerentes maxillae dorso; *posterior-
es* breviores, triarticulati: articulo primo bre-
ui, secundo longiori, obconico, tertio magno,
securiformi, ligulae medio laterali adnatis.
Mandibula cornea, arcuata; acuta, apice fissā,

Ma-

Triplax corpus oblongum, gibbum, glabrum, immarginatum,
agile; *capite* parvo, ovato, inserto; *oculis* magnis, promi-
nulis, globosis, lateralibus; *antennis* longitudine thoracis
ante oculos insertis; *thorace* subquadrato, antice parum an-
gustato, latitudine elytrorum; *scutello* parvo, rotundato;
elytris rigidis, fornicatis, includentibus, longitudine abdomi-
nis; *pedibus* longiusculis, compressis, cursoriis; *tarsis* qua-
drarticulatis; *colore* nigro rufoque istidulo.

nigripennis.

V. 19.

Maxilla cornea, breuissima, bifida: laciniis subaequalibus, obtusis. *Ligula* breuis, membranacea, trifida: laciniis exterioribus arcuatis, acutis, interiore breuiore, obtusa, ciliata.

rufipes. 2. *T. atra*, capite thorace pedibusque ferrugineis.

Ips rufipes. Ent. syst. 2. 514. 12. *

Triplax rufipes. Payk. Fn. Sv. 3. 347. 2.

II. 67. Panz. Fn. Germ. 13. tab. 17.

Habitat in Norwagiae Fungis.

Praecedenti valde affinis.

aenea.

3. *T. coccinea*, elytris aeneis, immaculatis.

Ips aenea. Ent. syst. 2. 514. 13. *

Triplax aenea. Payk. Fn. Sv. 3. 348. 3.

Siipba aenea. Act. Hall. 1. 254.

Cryptopbagus aeneus. Herbst. Col. 4. tab. 42. fig. 9.

Habitat Halae Saxonum, in Fungis arboreis. Dom.

Hybner.

174. ENGIS. *Palpi* articulo ultimo obtuso, subulato.

Maxilla bifida.

Ligula rotundata, integra.

Antennae claua perfoliata.

fasciata.

2. *E. atra*, elytris fasciis duabus rufis: anteriore nigro-maculata.

Ips

Engidis corpus oblongum, gibbum, glabrum, immarginatum, agile; capite ovato, plano, inserto; oculis magnis, oblongis, transuersis, superne inferneque obseruantibus; antennis longitudine thoracis ante oculos insertis; thorace quadrato, margine parum incrassato, subreflexo; scutello latiori, rotundato; elytris thorace vix latioribus, rigidis, fornicatis, longitudine abdominis; pedibus longiusculis, cursoriis; tarsis quinquearticulatis; colore nigro rufoque nitido.

Ips fasciata. Ent. syst. 2. 511. 1. *
Habitat in America boreali.

Os maxillis palisque. *Palpi* quatuor subaequales, filiformes: *anteriores* vix longiores, quadriarticulati: articulis subaequalibus, quarto paullo longiori, attenuato, obtuso, adhaerentes maxillae dorso; *posteriores* paullo breviores, triarticulati: articulis subaequalibus, tertio parum longiori, attenuato, obtuso, adnati ligulae medio exteriori. *Mandibula* cornea, arcuata, apice fissa. *Maxilla* membranacea, bifida: tinciniis subaequalibus; *exteriore* parum longiore. *Ligula* brevis, membranacea, rotundata, integra. *Labium* breue, transuersum, corneum, integrum.

2. *E. nigra*, capite thorace elytrorum puncto baseos *humeralis*. pedibusque rufis.

Ips humeralis. Ent. syst. 2. 514. 14. *

Engis humeralis. Payk. Fn. Sv. 3. 349. 1.

Dermestes pustulatus. Thunb. Act. Ups. 4. 4. 6.

Dermestes scanicus. Panz. Fn. Germ. 4. tab. 9.

Ips humeralis. Herbst. Cql. 4. tab. 42. fig. 4.

Dacne. Latreille Inf.

Habitat in Suecia. Dom. de Paykull.

3. *E. nigra*, elytris puncto baseos lunulaque postica *lunata*. ferrugineis.

Ips lunata. Ent. syst. 2. 514. 15. *

Habitat Kiliae Holfatorum.

4. *E. atra*, fronte maculis duabus elytrorum pedibusque ferrugineis.

Ips rufifrons. Ent. syst. 2. 514. 16. *

Engis rufifrons. Payk. Fn. Sv. 3. 350. 1. β.

Panz. Fn. Germ. 36. tab. 19.

Habitat in Anglia. Mus. D. Banks.

ALC 34

5.

III. 64

sanguini-
collis.

5. *E. ater*, thorace elytrorumque maculis duabus pedibusque rufis.

Mycetophagus sanguinicollis. Ent. syst. 2. 498.

7. *

Silpha glabra. Act. Hall. 1. 255.

Engis sanguinicollis. Payk. Fn. Sv. 3. 351. 2.

Dermestes apustulatus. Panz. Fn. Germ. 6. tab. 6.

Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.

175. VPIS. *Palpi inaequales, clauati.*

Maxilla unidentata.

Ligula brevis, emarginata.

Antennae extrorsum crassiores.

ceramboi-
des.

1. VPIS. Ent. syst. 2. 515. 1. *

Spondylis ceramboides. Mant. Inf. 1. 127. 2.

Attelabus ceramboides. Linn. syst. Nat. 2. 621.

12. Fn. Sv. 643.

Curculio maximus. Vdm. Diff. 26. tab. 1. fig. 1.

Tenebrio variolosus. Degeer Inf. 5. 32. 2. tab. 2. fig. 1.

Panz. Naturf. 24. 24. 33. tab. 1. fig. 33.

Habitat in Europae borealis Boletis.

178. **DIAPERIS.** *Palpi subtiliformes.*
Maxilla bifida.
Ligula cylindrica, apice pal-
pigera.
Antennae secundum totam
longitudinem perfoliatae:
foliolis compressis; vlti-
mo ouato.

1. *D. nigra*, elytris fasciis tribus haecis repandis. *Boleti.*

Ent. syst. 2. 518. 1. *

Diaperis. Geoff. Inf. 1. 337. 1. tab. 6. fig. 3.

Chrysomela Boleti. Linn. syst. Nat. 2. 591. 36.

Fn. Sv. 527.

Tenebrio Boleti. Degeer Inf. 5. 49. 9. tab. 3. f. 3.

Schaeff. Elem. tab. 58.

- Icon. tab. 77. fig. 6.

Oliv. Inf. 55. tab. 1. fig. 1.

Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 9.

Habitat in arborum Boletis.

Variat minor, nuper exclusa, capite thoraceque pallide ferrugineis elytrisque flavescentibus absque fasciis. D. Daldorff.

2. *D. atra*, elytris rufis: puncto futura fasciatque *Hydri.*

atris. Ent. syst. suppl. 178. 1. *

Habitat in Carolinae Hydno candido. Mus. D. Bosc.

3.

Diaperidis corpus ouatum, gibbum, glabrum, immarginatum, tardum; capite paruo, rotundato, deflexo, inserto; oculis globosis, prominulis, lateralibus; antennis breuibus, distantibus, sub oculis insertis; thorace transuerso: margine rotundato, subreflexo; scutello minuto, triangulo; elytris rigidis, fornicatis, apice deflexis, longitudine abdominis; pedibus breuibus, validis; tarsis anticis quinque -, posticis quatuor articulatis; colore vario, nitido.

violacea. 3. *D. nigro-cyanea*, antennis apice ferrugineis. Ent. syst. 2. 517. 2. *

I. 59

Habitat in Germaniæ Boletis. D. Prof. Helwig.

viridipennis. 4. *D. thorace ferrugineo*, elytris aeneis.

nis.

Habitat in Carolina. Mus. D. Bosc.

Praecedentibus minor. Antennae omnino huius generis, nigrae, basi rufae. Caput nigrum. Thorax laevis, ferrugineus, immaculatus. Elytra substriata, viridi-aenea. Corpus obscure ferrugineum, pedibus rufis.

Mas dentibus duobus clypei; cornibusque duobus erectis, validis nigris in occipite.

aenea.

5. *D. nigro-aenea*, antennarum basi pedibusque ferrugineis.

I. 17.

Habitat in Borussia. Mus. D. Lund.

Praecedentibus minor. Antennae nigrae, basi ferruginae. Caput et thorax laevis, obscure aenea, nitida. Elytra substriata, nigro-aenea. Pedes rufi.

bicolor.

6. *D. atra*, nitida, capite thoraceque obscure rufis.

Scaphidium bicolor. Ent. syst. suppl. 174. 4. *

Diaperis aenea. Payk. Fn. Sv. 3. 359. 3.

VIII. 95.

Panz. Fn. Germ. 8. tab. 2.

Habitat in Europae Boletis.

177. MELOE. *Palpi* subfiliformes.
Maxilla recta, bifida.
Labium emarginatum.
Antennae moniliformes.

1. *M. corpore* violaceo. Ent. syst. 2. 517. 1.

~~*Meloe proscarabaeus*. Linn. syst. Nat. 2. 679. 1.~~

proscarabaeus.

Fn. Sv. 826.

~~Geoff. Inf. 1. 377. 1.~~

~~Frish. Inf. 6. tab. 6. fig. 5.~~

~~Oliv. Inf. 45. tab. 1. fig. 1.~~

~~Schaeff. Icon. tab. 3. fig. 5.~~

Panz. Fn. Germ. 10. tab. 12.

Degeer Inf. 5. 3. 1. tab. 1. fig. 1. ?

Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 54.

Payk. Fn. Sv. 3. 361. 1. var. α.

Habitat in campis apricis arenosis Europae.

Labrum rotundatum, emarginatum. *Mandibula* cornea, crassa, acuta, edentula.

Animalculum molle, tardum, oleum limpidissimum flavicans e poris praesertim e pedum geniculis exsudat.

I. 59.
60
61.

2. *M. thorace* quadrato nigro, elytris laevissimis. *laevigata*.

Meloe laevigata. Oliv. Inf. 45. tab. 2. fig. 5.

Habitat in Marocco. Mus. D. de Sehestedt.

Major quam *M. proscarabaeus*. Caput thorace latius, orbiculatum, nigrum, obscurum. Thorax quadratus, niger, obscurus. Elytra brevia, laeviss-

est vera *Meloe*
majalis Linn.
Jug. 14. 160

Meloe corpus oblongum, molle; glabrum, inmarginatum, tardum; capite magno, ovato, exserto; oculis oblongis, lateralibus, haud prominulis; antennis mediocribus, inter oculos insertis; thorace elevato, quadrato; scutello nullo; elytris coriaceis, mollibus, abdomine brevioribus; alis nullis; pedibus elongatis, compressis, cursoriis; tarsis apicis quinque-, posticis quadriarticulatis; colore nigro, obscuro.

uissima, nigra. Abdomen feminae longissimum, nigrum.

majoralis.

3. *M. segmentis dorsallibus abdominis rubris.* Ent. syst. 2. 518. 2.

~~*Meloe majoralis.* Linn. syst. Nat. 2. 679. 2.~~

Frisch. Inf. 6 tab. 6. fig. 4.

Schaeff. Icon. tab. 3. fig. 6.

J. Co.

Oliv. Inf. 45. tab. 1. fig. 4.

Panz. Fn. Germ. 10. tab. 13.

Habitat in Europa australiori.

limbata.

4. *M. nigra, thorace plano, elytris limbo ferrugineo.* Habitat in Hungaria. Mus. D. Lond.

Statura et magnitudo *M. proscarabaei*. Caput laeve, nigrum. Thorax quadratus, planus, laevis. Elytra laevia, nigra, limbo ferrugineo, qui tamen color marginis exterioris basin haud attingit. Corpus atrum.

- marginata 5. *M. nigra, thoracis elytrorumque margine ferrugineo.* Ent. syst. 2. 518. 3. *

Meloe marginata. Oliv. Inf. 45. tab. 1. fig. 3.

Meloe Hungarus. Schrank. Beytr. 71. 19.

Habitat in Italiae Salvia verbenacea. Dr. Allioni.

- punctata. 6. *M. atra, thorace elytrisque varioloso-punctatis.* Ent. syst. 2. 518. 4. *

Meloe vralensis. Pall. Iter. 2. 722. 56.

Panz. Fn. Germ. 10. tab. 16.

Habitat in Anglia. Mus. Britt.

- brevicollis. 7. *M. nigra, thorace transverso, postice retuso, elytris subrugosis.*

Meloe brevicollis. Panz. Fn. Germ. 10. tab. 15.

Payk. Fn. Sv. 3. 362. 2.

Habitat in Germania australiore. D. de Meyerle.

Statura et magnitudo omnino *M. proscarabaei*, at distincta videtur, tota nigra, obscura. Caput tho-

thorace latius. Thorax brevis, transversus, postice retusus.

8. *M. laevis, cyanea, nitida.*

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

Praecedentibus triplo minor. Caput et thorax laeuissima, cyanea, nitida. Elytra et abdomen paullo obscuriora.

cyanea.

*Cic. gla.
Linn.
Leach*

178. STAPHYLINVS. *Palpi filiformes.*

Maxilla unidentata.

Ligula trifida.

Antennae moniliformes.

1. *St. capite, thorace elytrisq; villosis - auris. aureus.*

Ent. syst. 2. 519. 1. *

Oliv. Inf. 42. tab. 1. fig. 2.

Habitat in Siam. Mus. D. Banks.

2. *St. hirsutus, niger, thorace abdomineq; postice birtus.*

flavis. Ent. syst. 2. 519. 2. *

Linn. syst. Nat. 2. 683. 1. Fn. Sv. 839.

Pear. Fa. Germ. 4. tab. 19.

Geoff. Inf. 1. 362. 7.

Payk. Monogr. 8. 1.

Fn. Sv. 3. 368. 1.

Schaeff. Monogr. 1754. tab. 2. fig. 12.

- Icon. tab. 36. fig. 6.

Degeer Inf. 4. 20. 5.

Oliv. Inf. 42. tab. 1. fig. 6.

IGI.

Sulz.

Staphylini corpus elongatum, glabrum, immarginatum; agile; capite magno, onato, exterto; oculis globosis, lateralibus, vix prominulis; antennis breuibus, approximatis, in articulatione labii superioris inferis; thorace plano, postice rotundato, marginibus deflexis; scutella maiusculo, triangulari; elytris dimidiatis, rigidis, margini deflexo, alas tegentibus; pedibus validis; tarsis quinquearticulatis; colore vario.

Sulz. Inf. tab. 7. fig. 16.

Habitat in Europae locis arenosis.

- nebulosus. 3. St. pubescens, cinereus, nigro-nebulosus, abdomine nigro, tibiis testaceis. Ent. syst. 2. 520. 3. *

Payk. Fn. Sv. 3. 375. 11.

Habitat in Germania. D. Smidt.

- mirinus. 4. St. pubescens, cinereus, nigro-nebulosus, abdomine atro, pedibus nigris. Ent. syst. 2. 520. 4. *

Linn. syst. Nat. 2. 683. 2. Fn. Sv. 840.

Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 11.

Degeer Inf. 4. 12. 1. tab. 1. fig. 1.

Oliv. Inf. 42. tab. 6. fig. 51.

Roff. Fn. Etr. 1. 247. 608.

VI. 29

Panz. Fn. Germ. 66. tab. 16.

Payk. Monogr. 14. 8.

Fn. Sv. 3. 376. 12.

Habitat in cadaueribus, fimo.

Larva hexapoda, nuda, pallida, capite abdominisque segmentis tribus anterioribus brunneis, subtus tuberculo cylindrico, pediformi. Stroem. Act. Hafn. 1.

- chloropterus. 5. St. capite thoraceque cupreis, elytris viridibus. *Staphylinus chloropterus.* Panz. Fn. Germ. 36. tab. 20.

Habitat in Austria: D. de Meyerle.

III. 70.

Caput et thorax subpilosa, cuprea, obscure nitida, mandibulis atris, antennisque fusco-testaceis. Elytra villosa, viridia. Abdomen nigrum, ano subferrugineo. Pedes testacei, femoribus fascia aut macula nigra.

- pubescens. 6. St. pubescens cinereus, nebulosus, abdomine subtus villoso-argenteo. Ent. syst. 2. 520. 5. *

Staphylinus pubescens. Payk. Monogr. 16. 9.

Geoff.

- Geoff. Inf. 1. 303. 8.
 Degeer Inf. 4. 17. 2.
 Oliv. Inf. 42. tab. 2. fig. 15.
 Payk. Fn. Sv. 3. 376. 13.
 Habitat in Suecia. D. Com. de Souza.
7. *St. obscurus, elytris brunneis fusco-maculatis. viduus.*
 Habitat in Carolina. Muf. D. Bosc.
 Statura et magnitudò *St. olentis*. Antennae nigrae, articulo primo ferrugineo. Caput ferrugineum, mandibulis atris. Thorax punctatus, obscurus. Elytra brunnea, fusco obsolete maculata. Abdomen obscurum, punctis dorsalibus duobus in singulo segmento obscurioribus. Pectus pilis aureis tectum. Pedes rufi, femoribus nigris.
8. *St. niger, opacus, immaculatus, capite thorace olens.*
 latiore. Ent. syst. 2. 520. 6. *
Staphylinus olens. Payk. Monogr. 9. 4. III. 64.
 Fn. Sv. 3. 371. 5.
 Oliv. Inf. 42. tab. 1. fig. 1.
 Panz. Fn. Germ. 27. tab. 1.
 Geoff. Inf. 1. 360. 1. tab. 7. fig. 1.
 Myll. Zool. Dan. 97. 1090.
 Degeer Inf. 4. 22. 3.
 Habitat in Europae cadaveribus.
9. *St. ater, nitidus, elytris obscuris, capite thorace similis.*
 latiore. Ent. syst. 2. 521. 7. *
Staphylinus similis. Payk. Monogr. 105.
 Fn. Sv. 3. 371. 6.
 Oliv. Inf. 42. tab. 5. fig. 42.
 Geoff. Inf. 1. 361. 3.
 Schaeff. Icon. tab. 30. fig. 12.
 Habitat in Germania. D. Smidt.
10. *St. ater, nitidus, elytris piceis, Ent. syst. 2. 521. picipennis.*
 8. *

Sta-

Staphylinus picipennis. Payk. Fn. Sv. 3. 373. 8.
Habitat in Germania. Mus. D. de Sehestedt.

maxillofus 11. St. pubescens, niger: fuscis cinereis. Ent. syst.
2. 521. 9.

Staphylinus maxillofus: Linn. syst. Nat. 2. 683.
3. Fn. Sv. 841.

Oliv. Inf. 42. tab. 1. fig. 5.

III. 65 Panz. Fn. Germ. 27. tab. 2.

Geoff. Inf. 1. 360. 1. tab. 7. fig. 1.

Schaeff. Icon. tab. 20. fig. 1.

Degeer Inf. 4. 18. 4. tab. 1. fig. 7. 8.

Payk. Monogr. 5. 2.

Fn. Sv. 3. 369. 2.

2. Habitat in Europæ sylvis, victitans rapina.
Adultior omnino niger et glaber euadit.

oculatus 12. St. ater, nitidus, capite utrinque macula fulva.
Ent. syst. 2. 521. 10. *

Oliv. Inf. 42. tab. 2. fig. 19.

Habitat in noua Hollandia. Mus. D. Banks.

cyaneus 13. St. ater, opacus, thorace elytrisque coerulefcentibus. Ent. syst. 2. 521. 11. *

Geoff. Inf. 1. 361. 2.

Oliv. Inf. 42. tab. 1. fig. 4.

III. 65 Panz. Fn. Germ. 27. tab. 3.

Payk. Monogr. 13. 7.

Fn. Sv. 3. 370. 4.

Habitat in Italia. Dr. Allioni.

dilatatus 14. St. thorace marginato, atro, nitidulo, elytris fuscis, antennis ferratis. Ent. syst. 2. 522. 12. *

Payk. Fn. Sv. 3. 389. 29.

Habitat Halae Saxonum. D. Prof. Leske.

fulgens 15. St. cyaneus, nitidus, antennis apice nigris. Ent. syst. 2. 522. 13. *

Habitat in Cayenna. Mus. D. Bose.

16. *St. ater*, elytris, antennarum basi pedibusque ru- ~~erythro-~~
 fis. Ent. syst. 2. 522. 14. * ~~pterus.~~
 Linn. syst. Nat. 2. 683. 4. Fn. Sv. 842.
 Oliv. Inf. 42. tab. 2. fig. 14. *Verred*
 Panz. Fn. Germ. 27. tab. 4.
 Geoff. Inf. 1. 364. 9.
 Frisb. Inf. 5. 49. tab. 29.
 Degeer Inf. 4. 21. 6. *III. 65*
 Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 2.
 Payk. Monogr. 7. 3.
 Fn. Sv. 3. 369. 3.
 Habitat frequens in fimo.
Mandibula cornea, medio dilatata, acutissima.
Maxilla cornea, videntata, in medio ciliata.
Ligula trifida: lacinia intermedia maiore,
 emarginata.
17. *St. niger*, aeneo-nitidus, elytris pedibusque te- ~~calcoce-~~
 staceis, antennis fuscis. Ent. syst. 2. 522. 15. * ~~pterus.~~
 Oliv. Inf. 42. tab. 2. fig. 16.
 Ross. Fn. Etr. 1. 248. 612. tab. 7. fig. 13.
 Panz. Fn. Germ. 27. tab. 5.
 Degeer Inf. 4. 22. 8.
 Payk. Monogr. 11. 6. *III. 66*
 Fn. Sv. 3. 374. 10.
 Habitat in Germania. D. Smidt.
18. *St. niger*, capite thoraceque obscure piceis, ely- *fossor.*
 tris aureis, tarsis anticis dilatatis. Ent. syst. 2.
 523. 16. * *II. 66*
 Panz. Fn. Germ. 27. tab. 6.
 Habitat in Germania. Muf. D. de Sehestedt.
19. *St. ater*, capite rufo. Ent. syst. 2. 523. 17. * *erythroce-*
 Oliv. Inf. 42. tab. 2. fig. 9. *pterus.*
 Habitat in noua Hollandia. Muf. D. Banks.

- pilosus.* 20. *St. pilosus*, niger, abdomine fusco, elytris scabris. Ent. syst. 2. 523. 18. *
 Oliv. Inf. 42. tab. 1. fig. 3.
 Habitat in Cayenna. Dom. v. Rohr.
- splendens.* 21. *St. capite thoraceque laevissimis, atris, elytris aeneis, nitidulis, capite thorace latiore.* Ent. syst. 2. 523. 19. *
 Habitat in Germania. D. Smidt.
- politus.* 22. *St. niger, thorace elytrisque nitidis, thorace lineis punctorum impressorum.* Ent. syst. 2. 524. 20. *
 Linn. syst. Nat. 2. 683. 5. Fn. Sv. 843.
 Geoff. Inf. 1. 361. 3.
 Degeer Inf. 4. 22. 7.
 Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 12.
 Oliv. Inf. 42. tab. 2. fig. 10.
 Panz. Fn. Germ. 27. tab. 7.
 Payk. Monogr. 42. 31.
 Fn. Sv. 3 391. 31.
 Habitat in Europae cadaveribus.
- tristis.* 23. *St. niger, thorace obscure-aeneo, elytris pubescentibus obscurioribus.* Ent. syst. 2. 524. 21. *
 Habitat in Dania. Mus. D. de Sehestedt.
- femoratus.* 24. *St. fuscus, obscurus, elytris subglaucis, ano rufescente, femoribus flavis.*
 Habitat in Carolina. Mus. Dom. Eosc.
 Statura et magnitudo praecedentium. Antennae obscurae, articulo primo flavescente. Caput et thorax subpunctata, fusca, minime nitida. Elytra obscura, glauca. Abdomen fuscum, ano rufescente. Corpus obscurum, femoribus flavescentibus.
- varians.* 25. *St. ater, nitidus, punctatus, alis albis.* Ent. syst. 2. 524. 22. *

Staphylinus varians. Payk. Monogr. 45. 33.

Fn. Sv. 3. 393. 33.

Oliv. Inf. 42. tab. 5. fig. 46.

Habitat in Europa boreali. Mus. D. de Sehestedt.

26. *St. niger*, pedibus, antennarum basi apiceque fer- *brunnipes*.
rugineis. Ent. syst. 2. 524. 23. *

Oliv. Inf. 42. tab. 1. fig. 7.

Habitat in Anglia. Mus. D. Banks.

27. *St. testaceus*, abdōmine atro: ano testaceo. *testaceus*.

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.

Statura et magnitudo *St. brunnipedis*. Caput planum, testaceum. Thorax planus, punctatus, testaceus. Elytra pilosa, testacea, subpunctata, immaculata. Abdomen pilosum, atrum, ano testaceo, appendiculis nigris. Pedes testacei.

28. *St. ater*, nitidus, antennarum articulo primo ely- *vlmineus*.
tris abdominisque segmento penultimo rufis.

Staphylinus Vlmi. Ross. Fn. Etr. 1. 248. 611.
tab. 5. fig. 6.

vii. 35.

Oliv. Inf. 42. tab. 4. fig. 37.

Habitat in Italia. Mus. Dom. Bosc.

Statura-*St. nitidi*, at maior et distinctus.

29. *St. niger*, nitidus, thorace, elytris pedibusque *obscurus*.
obscuris-brunneis.

Habitat in India orientali. D. Daldorff. Mus. D.
de Sehestedt.

Statura omnino *St. nitidi*. Antennae nigrae, basi apiceque brunneae: articulis vtrinque prominulis. Caput atrum, ore brunneo. Thorax et elytra subpunctata, fusco-brunnea, immaculata. Abdomen atrum, ano brunneo. Pedes brunnei.

- nitidus.* 30. St. ater, nitidus, elytris testaceis. Ent. syst. 2. 524. 24. *
- M. 67.* Panz. Fn. Germ. 22. tab. 8.
Payk. Monogr. 40. 30.
Fn. Sv. 3. 390. 30.
Habitat Kiliae. Dom. Daldorff.
- brunnipennis.* 31. St. niger, obscurus, elytris pedibusque brunneis. Habitat in India orientali. D. Daldorff. Mus. D. Lund.
Medius. Antennae nigrae, basi ferrugineae. Caput et thorax scabra, nigra, obscura. Elytra subpunctata, brunnea, immaculata. Abdomen atrum, ano siue ultimo segmento brunneo. Pedes brunnei.
- fulgidus.* 32. St. ater, nitidus, elytris plantisque testaceis, ano subferrugineo. Ent. syst. 2. 525. 25. *
- Oliv. Inf. 42. tab. 4. fig. 34.
Habitat in Germania. D. Smidt.
- haemorrhoidalis.* 33. St. pilosus, ater, nitidus, ano brunneo. Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus. D. de Sehestedt.
Statura praecedentis. Caput, thorax et elytra pilosa, atra, nitida, immaculata. Abdomen atrum, ano brunneo. Pedes atri.
- crenatus.* 34. St. nigricans, thorace marginato, elytris crenato-friatis. Ent. syst. 2. 525. 26. *
- Payk. Monogr. App. Curc. 146. 45.
Fn. Sv. 3. 403. 47.
Habitat in Germania. D. Smidt.
- friatulus.* 35. St. niger, thorace canaliculato, elytris striatis. Ent. syst. 2. 525. 27. *
- Habitat in Germania. D. Smidt.

36. *St. niger*, thorace marginato, elytris testaceis. *strumosus*.
Ent. syst. 2. 525. 28. *
Payk. Fn. Sv. 3. 402. 45.
Habitat Halae Saxonum. Dom. Hybner.
37. *St. ater*, nitidus, elytris cyaneis. Ent. syst. 2. *cyanipennis*.
525. 29. *
Staphylinus amoenus. Oliv. Inf. 42. t. 4. f. 36.
Habitat Parisiis. Mus. Dom. Bosc.
Varietatem *St. politi* credit Paykull, at vix rite.
38. *St. ater*, thoracis lateribus pedibusque flavis. *marginatus*.
Ent. syst. 2. 526. 30. *
Oliv. Inf. 42. tab. 3. fig. 29.
Act. Nidros. 4. 3321. 33.
Payk. Monogr. 44. 32.
Fn. Sv. 3. 392. 32.
Habitat in Europa boreali.
39. *St. ater*, antennarum basi, elytris pedibusque testaceis. *rufispennis*.
Habitat in America meridionali. D. Smidt. Mus.
D. Lund.
Triplio maior *St. alpino* et alius. Antennae extrorsum crassiores, nigrae, basi ferrugineae. Caput et thorax punctata, atra, immaculata, nitida, ore ferrugineo. Elytra testacea. Corpus atrum, pedibus testaceis.
40. *St. ater*, nitidus, elytris pedibusque testaceis, *fulvipes*.
thorace ovato. Ent. syst. 2. 526. 31. *
Panz. Fn. Germ. 27. tab. 9. III. 67.
Habitat in Germania. D. Smidt.
41. *St. ater*, pedibus rufis, elytrorum margine flavo. *flavescens*.
Ent. syst. 2. 526. 32. *
Linn. syst. Nat. 2. 684. 9. Fn. Sv. 830.
Habitat in Europa boreali.
42. *St. ater*, elytris fuscis: linea media pedibusque *plagiatus*.
testaceis. Ent. syst. suppl. 180. 32. *
Sta-

Staphylinus plagiatus. Payk. Fn. Sv. 3. 387. 26.
Habitat in Europa boreali.

alpinus. 43. St. depressus, ater, antennarum basi, elytris pedibusque liuidis. Ent. syst. 2. 526. 33. *
Oliv. Inf. 42. tab. 6. fig. 55.
Payk. Fn. Sv. 3. 388. 27.
Habitat in Betula, Salice, in fummis Alpibus Lapponiae. Dom. de Paykull.

apustulatus 44. St. niger, elytris puncto postico ferrugineo. Ent. syst. 2. 526. 34. *
Linn. syst. Nat. 2. 685. 16. Fn. Sv. 847.
Panz. Fn. Germ. 27. tab. 10.
Habitat in Europa.

II. 67. *analis*. 45. St. ater, nitidus, antennis, elytris, ano pedibusque testaceis. Ent. syst. 2. 526. 35. *
Oliv. Inf. 42. tab. 3. fig. 24.
Payk. Monogr. 47. 34.
Fn. Sv. 3. 394. 34.
Habitat Kiliae. Dom. Daldorff.

merdarius 46. St. ater, thorace elytris ano pedibusque testaceis. *Oxyporus merdarius*. Ent. syst. 2. 533. 11. *
Panz. Fn. Germ. 27. tab. 18.
III. 71. Oliv. Inf. 42. tab. 5. fig. 45.
Payk. Monogr. 47. 34. β.
Fn. Sv. 3. 394. 34. β.
Habitat in Europae stercore.
Varietatem praecedentis credit D. de Paykull, forte rite.

fuscipes. 47. St. ater, thorace subrotundo, elytris pedibusque piceis. Ent. syst. 2. 527. 38.
Linn. syst. Nat. 2. 685. 23. Fn. Sv. 857.
III. 68. Panz. Fn. Germ. 27. tab. 12.
Payk. Fn. Sv. 3. 397. 39.
Habitat in Europae fimetis.

48. *St. niger*, elytris, antennis pedibusque ferrugi-*flavipes*.
neis. Ent. syst. 2. 527. 39. *
Staphylinus flavipes. Linn. syst. Nat. 2. 685.
24. Fn. Sv. 856.
Habitat in Selandia. Mus. D. de Sehestedt.
49. *St. thorace rufo*, elytris fuscis: puncto basos *atricapil-*
margineque postico albis. Ent. syst. 2. 527. 40. * *lus*.
Oliv. Inf. 42. tab. 4. fig. 39.
Payk. Monogr. 49. 35. II. 68
Fn. Sv. 3. 414. 60.
Habitat in Anglia. Mus. D. Banks.
50. *St. filiformis*, ater, elytris, apice pedibusque te- *angustatus*
fuceis. Ent. syst. 2. 528. 41. *
Paederus angustatus Payk. Fn. Sv. 3. 431. 6.
Oliv. Inf. 42. tab. 2. fig. 18.
Panz. Fn. Germ. 34. tab. 18. I. 62.
Payk. Monogr. 36. 27.
Habitat in Suecia. Dom. de Paykull.
51. *St. elongatus*, ater, elytris, antennis pedibusque *linearis*.
fuscis. Ent. syst. suppl. 180. 41. *
Staphylinus linearis. Oliv. Inf. 42. tab. 4. f. 38.
Habitat in Gallia. Mus. Dom. Bosc.
52. *St. flavus*, capite abdominisque cingulo atris, *canalicula-*
thorace canaliculato. Ent. syst. 2. 528. 42. * *tus*.
Oliv. Inf. 42. tab. 3. fig. 31.
Panz. Fn. Germ. 27. tab. 13. III. 68
Payk. Monogr. 31. 23.
Fn. Sv. 3. 385. 22.
Habitat Kiliae. D. Daldorff.
53. *St. ater*, nitidus, thorace elytrorumque apicibus *tenuis*.
rufis. Ent. syst. 2. 528. 43. * III. 78
Habitat in Germania. Dom. de Paykull.
54. *St. filiformis*, flavus, ano fusco. Ent. syst. 2. *gracilis*.
528. 44. * Sta-

- Staphylinus gracilis*. Payk. Monogr. 38. 28.
Paederus angustatus. Fn. Sv. 431. 7. β.
 Habitat in Suecia. Dom. de Paykull.
- brunneus*. 55. St. brunneus, capite abdominisque medio atris.
 Ent. syst. suppl. 180. 44. *
Staphylinus brunneus. Payk. Monogr. 63. 45.
 Fn. Sv. 3. 404. 47.
 Habitat in Europa boreali.
- punctulatus*. 56. St. filiformis, ater, nitidus, capite ovato. Ent.
 syst. 2. 528. 45. *
Staphylinus punctulatus. Payk. Monogr. 30. 22.
 Fn. Sv. 3. 380. 17.
 Habitat in Suecia.
- emarginatus*. 57. St. depressus, brunneus, elytris pallidioribus,
 thoracis margine reflexo. Ent. syst. 2. 528. 46. *
Staphylinus emarginatus. Payk. Monogr. 56. 40.
 Payk. Fn. Sv. 3. 401. 44.
 Oliv. Inf. 42. tab. 2. fig. 12.
 Habitat in Gallia. Mus. Dom. Bosc.
- pubescentibus* 58. St. ater, nitidus, elytris pallidis: margine nigro.
 Ent. syst. suppl. 181. 46. *
 Habitat ad Cap. Bon. Spei. Dom. Daldorff.
- limbatus*. 59. St. niger, elytrorum medio pedibusque testaceis.
 Habitat in Germania. Dom. Karstens.
 Paruus, statura fere St. fuscipedis, at margo ely-
 trorum exterior et interior niger.
- bicolor*. 60. St. niger, elytris pedibusque fuscis. Ent. syst.
 2. 529. 47. *
Staphylinus bicolor. Payk. Monogr. 21. 13.
 Fn. Sv. 3. 381. 18.
 Habitat in Gallia fimetis. Mus. Dom. Bosc.
- rufipes*. 61. St. ater, nitidus, elytris obscuris, pedibus rufis.
 Ent. syst. 2. 529. 48. *
 Oliv. Inf. 42. tab. 4. fig. 35. Payk.

Payk. Fn. Sv. 418. 65.

Habitat in Germania. D. Smidt.

62. St. niger, elytris testaceis ad futuram nigris, ca- *tuberculato*
pate tuberculato. Ent. syst. suppl. 181. 49. * *tus*.

Habitat in India. Dom. Daldorff.

63. St. ferrugineus, capite atro. Ent. syst. 2. 529. 49. * *melanoccephalus*.
Oliv. Inf. 42. tab. 4. fig. 32.

Payk. Monogr. 59. 42.

Fn. Sv. 3. 416. 43.

Habitat in Suecia. Dom. de Paykull.

64. St. niger, elytris liuidis, pedibus ferrugineis, an- *crassicornis*.
tennis extrorsum crassioribus. Ent. syst. 2. 529. 50. *

Habitat in Dania. Mus. D. de Sehestedt.

65. St. flauus, immaculatus. Ent. syst. 2. 530. 53. * *caraboides*
Staphylinus caraboides. Linn. syst. Nat. 2. 530.

53. Fn. Sv. 854.

Staphylinus fuluus. Degeer Inf. 4. 25. 12.

Payk. Monogr. 19. 11.

Fn. Sv. 3. 385. 25.

Oliv. Inf. 42. tab. 2. fig. 17.

Habitat in Europa.

66. St. niger, thorace elytrisq̄ue rugosis. Ent. syst. *rugosus*.
2. 530. 54. *

Oliv. Inf. 42. tab. 5. fig. 43.

Habitat in Anglia.

67. St. niger, thorace depresso: lineis elevatis tri- *piceus*.
bus, elytris piceis. Ent. syst. 2. 530. 55. *

Staphylinus piceus. Linn. syst. Nat. 2. 686. 85.

Geoff. Inf. 1. 367. 16.

Oliv. Inf. 42. tab. 3. fig. 30.

Panz. Fn. Germ. 27. tab. 14.

Payk. Monogr. 19. 12.

Fn. Sv. 3. 374. 22.

Habitat in Europæ borealis fimo.

68.

- porcatus*. 68. *St. niger*, obscurus, thorace marginato, elytris eleuato-friatis. Ent. syst. 2. 530. 56.*
 Oliv. Inf. 42. tab. 4. fig. 33.
 Payk. Monogr. 71. 50.
 Fn. Sv. 3. 413. 59.
 Habitat in Sueciae stercore bouino, varius. D. de Paykull.
 Minutus, at distinctus, thoracis margine vtrinque prominulo elytrisque striis tribus eleuatis.

179. STENVVS. *Palpi* inaequales:
antiores longissimi.
Antennae claua solida.

- 2guttatus*. 1. *St. niger*, elytris puncto albido, oculis prominulis.
Staphylinus 2guttatus. Ent. syst. 2. 527. 36.*
Staphylinus luno. Payk. Monogr. 34. 35. β.
Staphylinus 2guttatus. Linn. syst. Nat. 2. 685.
 15. Fn. Sv. 851.
Paederus 2guttatus. Oliv. Inf. 44. tab. 1. fig. 3.
 I. 61. *Stenus luno*. Payk. Fn. Sv. 3. 433. 1. β.
 Geoff. Inf. 1. 371. 24.
 Habitat ad littora maris Baltici.
Varietas sequentis teste D. de Paykull.
- luno*. 2. *St. niger*, immaculatus, thorace rotundato laeui.
Staphylinus clauicornis. Ent. syst. 2. 527. 37.*
 III. 68. *Staphylinus luno*. Payk. Monogr. 34. 35. α.
Stenus luno. Payk. Fn. Sv. 3. 432. 1. α.

Geoff.

Steni corpus paruum, elongatum, glabrum, immarginatum, agile; capite subturando plano, exserto, thorace latiore; oculis magnis, globosis, prominulis, lateralibus; antennis breuibus, approximatis, frontalibus; thorace angusto, rotundato, cylindrico; scutello vix villo; elytris valde abbreviatis, truncatis, rigidis, alas tegentibus; abdomine elongato, cylindrico, margine vtrinque eleuato; pedibus longicaulis, tenuibus, cursoriis; tarsis quadriarticulatis; colore nigro, obscuro.

Geoff. Inf. I. 371. 24. α.

Panz. Fn. Germ. 27. tab. II.

Habitat Kiliae. Muf. D. Lund.

Variat pedibus fuscis et flavescentibus.

Os maxillis palpisque. *Palpi* quatuor inaequales, *anteriores* longissimi, exserti, quadriarticulati: articulo primo brevissimo, secundo tertioque longioribus, filiformibus, quarto longo, ovato, adhaerentes maxillae dorso; *posteriores* breviores, triarticulati: articulo primo brevissimo, secundo longiori, filiformi, tertio ovato, crassiori, adnati ligulae medio. *Labrum* reconditum, breve, transuersum, obtusum. *Mandibula* cornea, arcuata, acuta, apice bifida. *Maxilla* brevis, membranacea, bifida: laciniis aequalibus obtusis. *Ligula* brevis, membranacea, trifida: lacinia media brevissima, laterali-
bus elongatis, diuaticatis, acuminatis. *Labium* breue, transuersum, integrum.

. St. ater, nitidus, abdomine conico. tibiis testaceis. *spissicornis*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muf.

D. de Sehestedt.

Paruus, ater, nitidus. Antennae breues, claua solida. Abdomen postice attenuatum, subconicum. Pedes testacei, femoribus nigris.

. St. ater, nitidus, abdomine conico, elytris pedibusque testaceis. *conicus.*

Habitat in America meridionali. D. Smidt. Muf.

D. Lund.

Statura et summa affinitas praecedentis. Differt tantum elytris pedibusque totis testaceis.

. St. niger, elytris obscuris: macula postica repanda pallida. *Ficus.*

Habitat in Oriente, lectus inter ficus fructus siccatos. D. Amthor.

Sta-

Statura parua, crassa, breuis. Antennae nigrae. Caput et thorax nigra. Elytra abbreviata, obscura: macula magna, repanda, pallida. Corpus nigrum, ano pedibusque ferrugineis.

floralis.

6. *St. niger*, pedibus flavescentibus.

Staphylinus floralis. Ent. syst. 2. 530. 52. *

Staphylinus floralis. Payk. Monogr. 67. 47.

I. 62

Fn. Sv. 3. 406. 49.

Panz. Fn. Germ. 34. tab. 20.

Habitat in Galliae floribus. Mus. D. Bose.

180. OXYPORVS. *Palpi* inaequales:

anteriores filiformes;
posteriores securiformes.

Ligula emarginata cum mucrone.

Antennae moniliformes.

rufus.

1. *O. rufus*, capite elytrorum abdominisque postice nigris. Ent. syst. 2. 531. 1.

Staphylinus rufus. Linn. syst. Nat. 2. 684. 6.

Fn. Sv. 844.

Oliv. Inf. 43. tab. 1. fig. 1.

II. 64.

Panz. Fn. Germ. 16. tab. 19.

Geoff. Inf. 1. 370. 22.

Schaeff. Icon. tab. 85. fig. 3.

Degeer Inf. 4. 24. 10. tab. 1. fig. 11. 12.

Payk. Monogr. 18. 18.

Fn. Sv. 3. 425. 1.

Ha-

Oxypori corpus paruum, elongatum, glabrum, immarginatum, agile; capite ovato, magno, exserto; mandibulis porrectis, forficatis; oculis globosis, prominulis, lateralibus; antennis breuibus, distantibus, infra oculos insertis; thorace rotundato: margine deflexo; scutello paruo, rotundato; elytris binidiatis, rigidis, fornicatis, alas regentibus; pedibus longiusculis, tenuibus; tarsis quadriarticulatis; colore vario.

Habitat in Europae Boletis.

O. ater, elytris pallidis: angulo postico nigro, *maxillofus*
abdomine rufo: ano fusco. Ent. syst. 2. 531.

2. *

II. 68.

Panz. Fn. Germ. 16. tab. 20.

Habitat in Germania. D. Schneider.

O. flavus, elytris nigris, basi apiceque pallidis. *lunulatus*.
Ent. syst. 2. 532. 3. *

Staphylinus lunulatus. Linn. syst. Nat. 2. 689.

7. Fn. Sv. 845.

Payk. Monogr. 49. 35.

Fn. Sv. 3. 415. 61.

Habitat in Europae Boletis.

O. ater, laevis, nitidus, elytris macula baseos ob-*subterra-*
longa, testacea. Ent. syst. 2. 532. 4. *neus*.

Staphylinus subterraneus. Linn. syst. Nat. 2. 690. 9.

Payk. Monogr. 52.

Fn. Sv. 3. 420. 66.

Habitat in Suecia. D. de Paykull.

O. ater, thorace vtrinque puncto baseos rufo. *cellaris*.
Ent. syst. 2. 532. 5. *

Staphylinus littoreus. Linn. syst. Nat. 2. 685. 18.

Fn. Sv. 852.

Staphylinus pubescens. Payk. Monogr. Curc. App.
138. 33.

Staphylinus cellaris. Payk. Fn. Sv. 3. 421. 76.

Habitat in Sueciae cellis subterraneis. D. de Payk.

O. ater, nitidus, thoracis margine pedibus elytris-*margina-*
que rufis: his futura maculaque marginali ni-*tus*.
gris. Ent. syst. 2. 532. 6. *

Panz. Fn. Germ. 27. tab. 17.

III. 70

Habitat in Suecia. Mus. D. de Sehestedt.

O. thorace rufo, coleoptris pallescentibus: ma-*3 macula-*
culis tribus nigris. Ent. syst. 2. 533. 7. * *tus*.

Sta-

Staphylinus littoreus. Payk. Monogr. 80. 55.

Staphylinus maculatus. Payk. Fn. Sv. 3. 422. 68.

Habitat in Dania. Muf. D. de Sehestedt.

maculatus 8. *O. niger*, elytris macula bascos pedibusque pallidis. Ent. fyft. 2. 533. 8. *

Habitat in Selandia. Muf. D. de Sehestedt.

pusulatus 9. *O. ater*, nitidus, elytris macula bascos anoque rufis. Ent. fyft. 2. 533. 9.

II. 68. Panz. Fn. Germ. 16. tab. 21.

Habitat in Germania. D. Smidt.

analis. 10. *O. flauus*, elytris basi anoque atris. Ent. fyft.

II. 69. 2. 533. 10.

Habitat Kiliae. D. Daldorff.

thoracicus 11. *O. nigricans*, thorace rufo, elytris fuscis, basi albis. Ent. fyft. 2. 534. 12. *

Habitat in Holfatiae Boletis. Muf. D. de Sehestedt.

pygmaeus. 12. *O. nigricans*, thorace elytrisque pallidis. Ent. fyft. 2. 534. 13. *

III. 71. Panz. Fn. Germ. 27. tab. 19.

Habitat Kiliae in Boletis. Muf. D. de Sehestedt.

flauipes. 13. *O. niger*, elytris pedibusque fuscis. Ent. fyft. 2. 534. 13. *

Habitat in Europa boreali.

chrysomelinus. 14. *O. ater*, thorace rufo, elytris testaceis: margine bascos atro. Ent. fyft. 2. 534. 14. *

Staphylinus chrysomelinus. Linn. fyft. Nat. 2. 685. 2. Fn. Sv. 855.

Geoff. Inf. 1. 368. 18.

Oliv. Inf. 42. tab. 3. fig. 22.

I. 63. Panz. Fn. Germ. 9. tab. 14.

Payk. Monogr. 77. 54.

Fn. Sv. 3. 423. 69.

Habitat in Europae Boletis.

5. *O. ater*, nitidus, thoracis margine postico, elytris abdominis segmentorum marginibus pedibusque testaceis. Ent. syst. suppl. 182. 15. *

Habitat in Germania. D. Daldorff.

5. *O. testaceus*, capite abdomineque atris. Ent. *melanocephalus*.
syst. 2. 534. 16. *

Habitat in Daniae Selandia. Mus. D. de Sehestedt.

7. *O. rufus*, abdomine atro nitido. Ent. syst. 2. 535. *abdominalis*.
17. *

Habitat in Norwagia. Mus. D. Lund.

3. *O. testaceus*, abdomine obscuriore. Ent. syst. 2. *testaceus*.
535. 18. *

Habitat in Germania. D. Smidt.

9. *O. brunneus*, capite thoracisque medio atris. *brunneus*.
Ent. syst. 2. 535. 19. *

Habitat in Germania. D. Smidt.

5. *O. nigricans*, elytris pallidis. Ent. syst. 2. 535. *minus*.
20. *

Habitat in Selandia. Mus. D. de Sehestedt.

1. *O. ater*, nitidus, pedibus rufis. Ent. syst. 2. 535. *rufipes*.
21.

Staphylinus rufipes. Linn. syst. Nat. 2. 685. 21.

Fn. Sv. 855.

Geoff. Inf. 1. 368. 18.

M. 71

Panz. Fn. Germ. 27. tab. 20.

Habitat in Europa boreali.

2. *O. ater*, nitidus, thoracis margine elytris pedibusque testaceis. Ent. syst. 2. 535. 22.

Habitat in Anglia.

3. *O. ater*, nitidus, thoracis elytrorumque marginibus ferrugineis. Ent. syst. 2. 536. 23. * *marginellus*.

Staphylinus rufipes. Payk. Fn. Sv. 3. 419. 65. e.

Monogr. 76. 53. β.

I. 63

Panz.

Panz. Fn. Germ. 9. tab. 13.

Habitat Kilise.

181. PAEDERVS. *Palpi* inaequales:
antiores clauati;
posteriores filiformes.
Ligula linearis, integra.
Antennae moniliformes.

riparius. 1. *P. rufus*, elytris coeruleis, capite abdominisque apice nigris. Ent. syst. 2. 536. 1. °

Staphylinus riparius. Linn. syst. Nat. 2. 684. 8.
 Fn. Sv. 846.

Geoff. Inf. 1. 369. 21.

Oliv. Inf. 44. tab. 1. fig. 2.

Schaeff. Icon. tab. 71. fig. 3.

Degeer Inf. 4. 28. 14. tab. 1. fig. 18.

Panz. Fn. Germ. 9. tab. 1.

I. 63

Payk. Monogr. 27. 19.

Fn. Sv. 427. 2.

Habitat in Europa, in America meridionali et in India orientali.

ruficollis. 2. *P. niger*, thorace rufa, elytris cyaneis. Ent. syst. 2. 537. 2.

Staphylinus ruficollis. Payk. Monogr. 26. 18.

Oliv. Inf. 44. tab. 1. fig. 1.

III. 72

Panz. Fn. Germ. 27. tab. 22.

Geoff.

Paederi corpus elongatum, filiforme, glabrum, immarginatum, agile; capite subgloboso, exterto; oculis globosis, prominulis, lateralibus; antennis mediocribus, distantibus, infra oculos insertis; thorace cylindrico: margine deflexo; scutello minuto; elytris dimidiatis, rigidis, fornicatis, alas tegentibus; pedibus brevibus, cursoriis; tarsis quadriarticulatis; colore vario.

Geoff. Inf. I. 370. 23.

Payk. Fn. Sv. 3. 427. 1.

Herbst. Arch. tab. 48. fig. 5.

Habitat Kiliae, sub lapidibus. Mus. D. de Sehestedt.

P. niger, elytris postice pedibusque fulvis. Ent. *elongatus*.
 Syst. 2. 537. 3.

Staphylinus elongatus. Linn. Syst. Nat. 2. 685. 14.

Payk. Monogr. 25. 17.

Fn. Sv. 428. 2.

I. 64.

Habitat in Europa.

P. ater, nitidus, elytris totis pedibusque testaceis. *fulvipennis*
 Ent. Syst. 2. 537. 4. *

Panz. Fn. Germ. 27. tab. 23.

III 72

Habitat Kiliae.

P. niger, pedibus testaceis. Ent. Syst. 2. 537. 5. * *brunnipes*.
 Habitat in Holfatia.

P. ater, nitidus, elytris plantisque testaceis, capi- *fulgidus*.
 te punctulato. Ent. Syst. 2. 537. 6. *

Panz. Fn. Germ. 34. tab. 20.

IV. 75

Habitat Kiliae. Dom. Daldorff.

P. ater, antennis thoraceque rufis, elytris pedi- *tricolor*.
 busque testaceis. Ent. Syst. 2. 537. 7. *

Payk. Monogr. 23. 15.

Fn. Sv. 3. 378. 15.

Habitat in Daniae Boletis.

P. filiformis, niger, pedibus piceis. Ent. Syst. 2. *filiformis*.
 538. 8. *

Staphylinus quadratus. Payk. Monogr. 29. 21.

Paederus filiformis. Payk. Fn. Sv. 3. 429. 4.

Habitat in Germania. D. Smidt.

P. filiformis, niger, capite orbiculato. Ent. Syst. *orbiculatus*.
 2. 538. 9.

Staphylinus orbiculatus. Payk. Monogr. 35. 26. IV-75

T. II.

Qq

Paed-

Paederus orbiculatus. Payk. Fn. Sv. 3. 431.
 Oliv. Inf. 42. tab. 1. fig. 7.
 Panz. Fn. Germ. 34. tab. 21.
 Habitat in Suecia, varius.

melanore-
phulus. 10. *P. filiformis*, niger, thorace pedibusque fulv
 Ent. syst. 2. 538. 10. *
 Panz. Fn. Germ. 36. tab. 24.
 III. 79 Habitat in Germania. Dom. Schneider.

INDEX GENERVM ET SPECIERVM.

Numerus prior tomum, posterior paginam indicat.

<p>77. ADORIVM. 1. 2 punctatum. I. 409 2. palliatum. 410 3. testaceum. 4. lividum. 5. vittatum. 6. concolor.</p>	<p>4. reflexa. I. 135 5. collaris. . 6. lineata. 136 7. leucographa. 8. glabra. 9. punctata. 10. abbreviata. 11. angustata. 12. orbiculata. 137 13. laevigata. 14. filiformis.</p>
<p>88. AEGITHVS. 1. Surinamensis. 2. 9 2. marginatus. 10 3. cinctus. 4. discoideus. 5. Guadeloupensis.</p>	<p>94. ALLECVLA. 1. morio. 2. 21 2. varians. 22 3. pallicornis. 4. ferruginea. 5. fasciata.</p>
<p>132. AESALVS. 1. scarabaeoides. 2. 254</p>	<p>98. ALVRNVS. 1. grossus. 2. 25 2. testaceus. 3. ferrugineus. 26</p>
<p>38. AGRA. 1. aenea. I. 224 2. rufipes. 225 3. attelaboides.</p>	<p>11. ANISOTOMA. 1. ferruginea. I. 99</p>
<p>24. AKIS. 1. planata. I. 134 2. spinosa. 135 3. acuminata.</p>	<p>Qq 2 3. hu-</p>

- | | | | |
|--------------------|--------|-------------------|------|
| 2. humeralis. | 1. 99 | 15. trilineata. | I. 2 |
| 3. bicolor. | 100 | 16. obsoleta. | 2 |
| 4. nigripennis. | | 56. ANTHICVS. | |
| 5. feminulum. | | 1. monoceros. | I. 2 |
| 62. ANOBIVM. | | 2. cornutus. | 2 |
| 1. tessellatum. | I. 321 | 3. Rhinoceros. | |
| 2. striatum. | | 4. Monodon. | |
| 3. reticulatum. | 322 | 5. ruficollis. | |
| 4. rufipes. | | 6. fuluicollis. | 2 |
| 5. castaneum. | | 7. abdominalis. | |
| 6. pertinax. | | 8. fuscipennis. | |
| 7. Boleti. | I. 323 | 9. fasciatus. | |
| 8. molle. | | 10. thoracicus. | 2 |
| 9. paniceum. | | 11. 2 punctatus. | |
| 10. Abietis. | | 12. pedestris. | |
| 11. planum. | | 13. antherinus. | |
| 12. capense. | | 14. 3 fasciatus. | |
| 13. minutum. | | 15. floralis. | |
| 14. micans. | 324 | 16. bicolor. | 2 |
| 15. nitidum. | | 17. limbatus. | |
| 37. ANTHIA. | | 18. hirtellus. | |
| 1. maxillofa. | I. 220 | 19. populneus. | |
| 2. thoracica. | 221 | 20. minutus. | |
| 3. 10 guttata. | | 21. Helwigii. | |
| 4. 6 guttata. | | 22. sanguineus. | 2 |
| 5. venatrix. | 222 | 23. Dresdensis. | |
| 6. fulcata. | | 14. ANTHRENVS. | |
| 7. 6 maculata. | | 1. Pimpinellae. | I. 1 |
| 8. 7 guttata. | | 2. histrio. | |
| 9. Nimrod. | | 3. elongatulus. | |
| 10. 4 guttata. | 223 | 4. Scrophulariae. | |
| 11. tabida. | | 5. muscorum. | |
| 12. vmbraculata. | | 6. Gloriosae. | |
| 13. variegata. | | 7. Verbasci. | |
| 14. exclamationis. | | 8. varius. | |

9. maculatus.	I. 108	29. varius.	2. 411
10. pubescens.		30. pubescens.	
11. hirtus.		31. fepicola.	
12. ferraticornis.		32. sericens.	
13. denticornis.	109	97. APALVS.	
14. glabratus.		I. 2 maculatus.	2. 24
I 54. ANTHRIEVS.		2. 4 maculatus.	25
1. heros.	2. 404	150. APATE.	
2. gigas.		I. muricata.	2. 378
3. atricornis.	405	2. francisca.	379
4. acuticornis.		3. monacha.	
5. longicornis.		4. carmelita.	
6. pustulatus.		5. Iesuita.	380
7. pilicornis.	406	6. rugosa.	
8. pubicornis.		7. dominicana.	
9. barbicornis.		8. femoralis.	
10. compressicornis.		9. gonagra.	
11. clauicornis.	407	10. cornuta.	
12. crassicornis.		11. hamata.	
13. perfolicornis.		12. capucina.	381
14. tenuicornis.		13. 2 maculata.	
15. Albinus.	408	14. sinuata.	
16. latirostris.		15. tridens.	
17. albirostris.		16. biders.	
18. niueirostris.	409	17. pustulata.	
19. spinosus.		18. torquata.	382
20. aculeatus.		19. marginata.	
21. lunatus.		20. limbata.	
22. griseus.	410	21. dispar.	
23. Roboris.		22. signata.	383
24. planirostris.		23. volutus.	
25. nigripennis.		24. brunnipennis.	
26. collaris.		25. minuta.	
27. scabrosus.	411	26. Fagi.	
28. Coffeae.		27. Tiliae.	

28. brunnipes.	I. 383	33. 7maculatus.	I
29 glabrata:		34. 2punctatus.	
7. APHODIVS.		35. rufipes.	
1. Sorex.	I. 67	36. nigripes.	
2. fossor.		37. luridus.	
3. elonga-ulus.	68	38. lutarius.	
4. fasciatus.		39. contaminatus.	
5. scrutator.	69	40. consputus.	
6. Hydrochaeridis.		41. immundus.	
7. fulcatus.		42. 4maculatus.	
8. foetens.		43. 4pustulatus.	
9. analis.		44. Sus.	
10. scybalarius.	70	45. moestus.	
11. prodromus.		46. eleuatus.	
12. obsoletus.		47. plagiatus.	
13. terrestris.	71	48. marginellus.	
14. obscurus.		49. fasciatus.	
15. ater.		50. testudinarius.	
16. porcus.		51. Scrofa.	
17. 2 maculatus.		52. merdarius.	
18. subterraneus.	72	53. atricapillus.	
19. fimetarius.		54. Pecari.	
20. conflagratus.		55. depressus.	
21. erraticus.		56. fabuleti.	
22. conspurcatus.	73	57. porcatus.	
23. inquinatus.		58. stercorator.	
24. nigrita.		59. tibialis.	
25. futuralis.	74	60. impudicus.	
26. sordidus.		61. asper.	
27. rufescens.		62. rufus.	
28. Anachoreta.		63. arenarius.	
29. granarius.	75	64. foetidus.	
30. haemorrhoidalis.		65. caesus.	
31. 4 tuberculatus.		6. ATEVCHVS.	
32. nitidulus.		1. facer.	I.
			2.

1. laticollis.	I. 55	38. pallipes.	I. 63
2. femipunctatus.		39. flavipes.	
3. variolosus.	56	40. pallens.	
4. miliaris.		41. cinctus.	
5. sanctus.		42. triangularis.	
6. morbillosus.		43. affinis.	64
7. intricatus.		44. melanocephalus.	64
8. profanus.		45. maculatus.	
9. cyaneus.		46. politus.	
10. minutus.	57	47. 6punctus..	65
11. Bacchus.		48. violaceus.	
12. gibbosus.		49. 2tuberculatus.	
13. azureus.		50. discoideus.	
14. Hollandiae.		51. aterrimus.	
15. Leei.		52. ouatus.	
16. smaragdulus.	58	53. chrysis.	66
17. muricatus.		54. pusillus.	
18. Koenigii.		55. variegatus.	
19. granulatus.	59	56. paruulus.	
20. cupreus.		57. fusco-punctatus.	
21. flagellatus.		58. femoratus.	
22. scabratus.			
23. Schaefferi.		92. ATOPA.	
24. Helwigii.	60	1. ceruina.	2. 15
25. voluens.		2. cinerea.	
26. pillularius.		3. liuida.	16
27. sinuatus.			
28. obliquus.	61	156. ATTELABVS.	
29. squalidus.		1. Coryli.	2. 416
30. planus.		2. cygneus.	417
31. Schreberi.		3. longicollis.	
32. bidens.	62	4. 2guttatus.	418
33. glabratus.		5. 2pustulatus.	
34. laeuigatus.		6. rufus.	
35. capistratus.		7. pensylvanicus.	
36. 2pustulatus.		8. gemmatus.	
		9. notatus.	

- | | | | |
|-----------------------|--------|-------------------|-------|
| 10. Tranquebaricus. | 2. 418 | 46. Crotalariae. | 2. 41 |
| 11. longimanus. | | 47. Alleariae. | 41 |
| 12. dentipes. | 419 | 48. Pomonae. | |
| 13. nigripennis. | | 49. planirostris. | |
| 14. fuscicornis. | | 50. Pifi. | |
| 15. hystrix. | | 51. Craccae. | |
| 16. ruficollis. | | 52. Sorbi. | 41 |
| 17. atratus. | | 53. cyaneus. | |
| 18. cyanipennis. | 420 | 54. globosus. | |
| 19. nitidus. | | 55. ouatus. | |
| 20. spinosus. | | 56. Malvae. | |
| 21. Indicus. | | 57. flavipes. | 41 |
| 22. curculionoides. | | 58. flavicornis. | |
| 23. variolosus. | | 59. frumentarius. | |
| 24. angulatus. | 421 | 60. vernalis. | |
| 25. pubescens. | | 61. Betulae. | |
| 26. hirtus. | | | |
| 27. Bacchus. | | 26. BLAPS. | |
| 28. Betuleti. | | 1. Gages. | I. 11 |
| 29. Populi. | 422 | 2. fulcata. | |
| 30. bicolor. | | 3. mortifaga. | |
| 31. Hungaricus. | | 4. obtusa. | |
| 32. aequatus. | | 5. spinipes. | I |
| 33. femoralis. | 423 | 6. calcarata. | |
| 34. coeruleocephalus. | | 7. tenebrosa. | |
| 35. cupreus. | | 8. buprestoides. | |
| 36. coeruleus. | | 9. dermestoides. | |
| 37. aeneus. | | 10. emarginata. | |
| 38. tristis. | | 11. tristis. | |
| 39. fellatus. | | 12. femoralis. | I |
| 40. fuscirostris. | 424 | 13. tibialis. | |
| 41. cuprirostris. | | 14. crenata. | |
| 42. 4pustulatus. | | 15. glabra. | |
| 43. rufirostris. | | 16. punctata. | |
| 44. nigrirostris. | | 17. clathrata. | |
| 45. atrirostris. | | 18. metallica. | |

6. BOLETOPHAGVS.

- 1. cornutus. 1. 112
- 2. crenatus. 113
- 3. agricola. 114
- 4. armatus.

51. BOSTRICHVS.

- 1. flavicornis. 2. 384
- 2. cylindrus.
- 3. parallelus.
- 4. thoracicus. 385
- 5. proboscideus.
- 6. 2pustulatus.
- 7. typographus.
- 8. varians. 386
- 9. vnidentatus.
- 10. Laricis.

11. chalcographus. 387

- 12. polygraphus.
- 13. monographus.
- 14. dactyliperda.
- 15. micrographus.
- 16. flavipes. 388
- 17. ferratus.
- 18. ruficollis.
- 19. compressicornis.
- 20. ferrugineus.
- 21. cristatus. 389
- 22. bidens.
- 23. frontalis.

5. BRACHINVS.

- 1. 2maculatus. 1. 217
- 2. complanatus.
- 3. annulus.
- 4. fulminans. 218
- 5. nigripennis.

6. 3pustulatus. 1. 218

- 7. mutilatus. 0
- 8. piger. 219
- 9. histrio.
- 10. ruficeps.
- 11. fumans.
- 12. crepitans.
- 13. sclopetum. 220

155. BRACHYCERVVS.

- 1. apterus. 2. 412
- 2. ocellatus.
- 3. scalaris.
- 4. obesus. 413
- 5. cordiger.
- 6. globosus.
- 7. maculatus.
- 8. rostratus.
- 9. spiniger.
- 10. verrucosus. 414
- 11. barbarus.
- 12. vndatus.
- 13. inaequalis.
- 14. crispatus.
- 15. cornutus. 415
- 16. Algirus.
- 17. retusus.
- 18. spectrum.
- 19. muricatus.
- 20. cristatus.
- 21. grifeus.
- 22. morio. 416
- 23. Vva.

163. BRENTVS.

- 1. barbicornis. 2. 545
- 2. curuidens.
- 3. affi-

3. affimilis.	2. 546	4. vmbellatarum.	2. 396
4. monilis.		5. Pifi.	
5. futuralis.		6. Cacao.	397
6. obtufus.	547	7. punctatus.	
7. glabratus.		8. Robiniae.	
8. 3ftriatus.		9. femoratus.	
9. bifulcatus.	548	10. gibbofus.	
10. ferrugineus.		11. Theobromatis.	
11. brunneus.		12. marginellus.	
12. foueatus.		13. 3maculatus.	
13. formicarius.	549	14. analis.	398
14. anchorago.		15. fparfus.	
15. voluulus.	550	16. 2pustulatus.	
16. cylindrus.		17. 2punctatus.	
17. nafutus.	551	18. 4maculatus.	
18. canaliculatus.		19. arthriticus.	
19. 2dentatus.		20. gonagra.	399
20. reticulatus.	552	21. podagricus.	
21. depreffus.		22. fcutellaris.	
22. calcar.		23. crafficornis.	
23. longimanus.	553	24. granarius.	
24. ferriroftris.		25. Ervi.	
25. difpar.	554	26. Cifti.	400
26. cylindricornis.		27. futuralis.	
27. 3dentatus.		28. abdominalis.	
II 6. BRONTES.		29. feminarius.	
1. dubius.	2. 97	30. villofus.	
2. flauipes.		31. nigricornis.	
3. pallens.	98	32. rufipes.	401
4. testaceus.		33. vittatus.	
5. minimus.		34. maculatus.	
153. BRVCHVS.		35. capfincola.	
1. fpinofus.	2. 396	36. Mimofae.	
2. Nucleorum.		37. minutus.	
3. Bactris.		38. flauicornis.	
		39. ferraticornis.	402

40. Coryphae.	2. 402	30. aurifera.	2. 191
41. 2guttatus.		31. fasciata.	
42. 2ftriatus.		32. lucidula.	192
43. pectinicornis.		33. rauca.	
44. barbicornis.	403	34. ftriata.	
		35. rutilans.	
128. BVPRESTIS.		36. ignita.	
1. vnidentata.	2. 186	37. lineata.	
2. bicolor. <i>barbara</i>		38. ocellata.	193
3. 4dentata.		39. aenea.	
4. 2vittata.		40. maculata.	
5. regalis.	187	41. flauo-maculata.	
6. gigantea.		42. interrupta.	
7. vittata.		43. sternicornis.	
8. fastuosa.		44. Chrysis.	194
9. regalis.	188	45. castanea.	
10. collaris.		46. violacea.	
11. attenuata.		47. equestris.	
12. punctatissima.		48. depressa.	
13. rufipes.		49. mariana.	195
14. Berolinensis.		50. farinosa.	
15. calcarata.		51. ventricosa.	
16. Carniolica.	189	52. smaragdula.	
17. corrusca.		53. fulminans.	
18. micans.		54. futuralis.	
19. decora.		55. cyanipes.	196
20. regia.		56. modesta.	
21. funesta.	190	57. blanda.	
22. variolosa.		58. aurata.	
23. umbrosa.		59. testacea.	
24. lurida.		60. fulgida.	197
25. obscura.		61. cyaniceps.	
26. melancholica.	191	62. 3punctata.	
27. punctata.		63. elegans.	
28. 12maculata.		64. 3fasciata.	
29. morbillosa.		65. 9maculata.	

66. porcata.	2. 198	103. reticulata.	2. 205
68. dorsata.		104. acuminata.	
69. chrysofigma.		105. excavata.	
70. impressa.		106. moesta.	
71. affinis.	199	107. lugubris.	
72. frontalis.		108. cariota.	
73. ornata.		109. vndata.	206
74. 8punctata.		110. sanguinea.	
75. ferrata.		111. 6punctata.	
76. taeniata.		112. tenebricosa.	
77. elongata.	200	113. Tenebrionis.	
78. pulcra.		114. 10punctata.	207
79. gibbosa.		115. Rubi.	
80. nobilis.		116. angulata.	
81. cylindrica.		117. aurulenta.	
82. voluulus.		118. dorsata.	
83. tubulus.		119. cyanicornis.	
84. scabra.	201	120. 2maculata.	208
85. decafigma.		121. 4maculata.	
86. 8guttata.		122. femorata.	
87. Andreae.		123. tristis.	
88. fascicularis.		124. cuprea.	209
89. manipularis.	202	125. 14guttata.	
90. variolaris.		126. hybernata.	
91. Onopordi.		127. metallica.	
92. pilosa.		128. nobilitata.	
93. hirta.		129. bicolor.	
94. scutellaris.	203	130. exaltata.	210
95. stigma.		131. vmbellatarum.	
96. austriaca.		132. adspersa.	
97. sibirica.		133. Morio.	
98. imperialis.	204	134. 4punctata.	
99. splendens.		135. cruciata.	
100. fusca.		136. lineata.	211
101. rustica.		137. manca.	
102. canaliculata.		138. meditabunda.	

139. ignara.	2. 211	2. pilula.	I. 103
140. atomaria.		3. albopunctatus.	
141. plana.		4. Dianae.	
142. cyanoptera.	212	5. fasciatus.	
143. viridis.		6. ater.	104
144. 2guttata.		7. dorsalis.	
145. deplana.		8. murinus.	
146. linearis.		9. semifriatus.	
147. atra.		10. varius.	105
148. acuta.	213	11. aeneus.	
149. elata.		12. nitens.	
150. pauida.		13. minutus.	
151. emarginata.			
152. ruficollis.		158. CALANDRA.	
153. innuba.	214	1. gigas.	2. 429
154. capitata.		2. ferrirostris.	
155. armata.		3. Palmarum.	430
156. spinosa.		4. Phoenicis.	
157. festiua.		5. Borassi.	
158. nitens.	215	6. cruentata.	
159. sepulcralis.		7. longipes.	431
160. nitidula.		8. heros.	
161. Millefolii.		9. Coloffus.	
162. laeta.		10. Indus.	
163. Salicis.	216	11. 4punctata.	
164. Sophorae.		12. Guineensis.	432
165. discoidea.		13. discors.	
166. quercata.		14. granulata.	
167. paruula.		15. pagana.	
168. cyanea.		16. ferruginea.	433
169. purpurascens.	217	17. Schach.	
170. thoracica.		18. hemiptera.	
171. candena.		19. cribraria.	434
172. tricincta.		20. variegata.	
13. BYRRHVS.		21. melanocardia.	
1. gigas.	I. 102	22. limbata.	

23. cruciata.	2. 434	15. 2fasciatum.	2. 331
24. sanguinolenta.		16. accuminatum.	
25. fasciata.		17. Rufficum.	
26. 4pustulata.	435	18. Hungaricum.	331
27. planicollis.		19. variabile.	
28. coruina.		20. sericeum.	
29. necydaloides.		21. concolor.	
30. melanocephala.		22. tenebrosum.	
31. abbreviata.	436	23. variolosum.	331
32. liturata.		24. rufficum.	
33. signum.		25. vittatum.	
34. porcula.		26. scutellare.	
35. nitens.		27. agreste.	
36. viduata.	437	28. stigma.	
37. carbonaria.		29. fugax.	339
38. Saba.		30. pygmaeum.	
39. granaria.		31. equestre.	
40. frumenti.	438	32. fulvicolle.	
41. Oryzae.		33. hirtum.	
42. 2tuberculata.		34. pubescens.	
142. CALLIDIVM.		35. barbatum.	
1. obscurum.	2. 333	36. mixtum.	342
2. bajulus.		37. griseum.	
3. Fennicum.	334	38. compressum.	
4. ruficolle.		39. variegatum.	
5. ebulinum.		40. lineatum.	
6. tenellum.	335	41. sulcatum.	
7. aeneum.		42. sanguineum.	
8. clauipes.		43. testaceum.	341
9. spinosum.		44. pilicorne.	
10. violaceum.		45. praeustum.	
11. punctatum.	336	46. ligneum.	
12. femoratum.		47. micans.	
13. fulcratum.		48. flavipes.	342
14. amethystinum.		49. luridum.	
		50. fuscum.	514

51. 4 maculatum.	2. 342	2. livida.	1. 295
52. melancholicum.		3. dispar.	
53. triste.		4. abdominalis.	
54. raucum.		5. analis.	
55. Hafniense.	343	6. viridescens.	
56. rufipes.		7. obscura.	296
57. friatum.		8. Carolina.	
58. aulicum.		9. nigricans.	
59. strepens.		10. pellucida.	
60. bicolor.	344	11. ruficornis.	
61. lynceum.		12. limbata.	
62. cyaneum.		13. rubens.	297
63. pusillum.		14. lateralis.	
64. 2 maculatum.		15. smaragdula.	
65. flavum.		16. tristis.	
66. vndatum.		17. lugubris.	
67. terminans.	345	18. atra.	
68. coloreum.		19. marginata.	298
69. varium.		20. brunnicollis.	
138. CALOPVS.		21. flavicollis.	
1. ferraticornis.	2. 312	22. diadema.	
34. CALOSOMA.		23. 2 maculata.	
1. alternans.	1. 211	24. pallipes.	299
2. calidam.		25. barbara.	
3. porculatum.		26. haemorrhoidalis.	
4. indagator.		27. pallida.	
5. fycophanta.	212	28. ruficollis.	
6. fericeum.		29. nigripennis.	
7. inquisitor.		30. flavipes.	300
8. scrutator.	213	31. melanocephala.	
9. reticulatum.		32. dimidiata.	
10. longicorne.	214	33. 2 punctata.	
58. CANTHARIS.		34. laeta.	
1. fusca.	1. 294	35. flavicollis.	
		36. lineola.	301
		37. abbreviata.	

38. brevipennis.	I. 301	18. hortensis.	I. 172
39. manca.		19. sylvestris.	173
40. 2 vittata.	302	20. concolor.	
41. longicornis.		21. irregularis	
42. nigripes.		22. Creutzeri.	
43. melanura.		23. taedatus.	174
44. pectoralis.		24. Schejdleri.	
45. vittata.	303	25. aruenfis.	
46. nitidula.		26. Hungaricus.	
47. lineata.		27. retusus.	
48. bicolor.		28. Maderae.	175
49. nigra.		29. conuexus.	
50. pulicaria.		30. auratus.	
51. minima.	304	31. splendens.	
52. testacea.		32. auronitens.	
53. biguttata.		33. suturalis.	
54. Cardiacae.		34. morbillosus.	176
		35. rugosus.	
33. CARABVS.		36. granulatus.	
1. scabrosus.	I. 168	37. cancellatus	
2. coriaceus.		38. clathratus.	
3. caelatus.	169	39. melancholicus.	177
4. marginalis.		40. nitens.	
5. Meyerlei.		41. leucopthalmus.	
6. glabratus.	170	42. fasciato-punctatus.	178
7. violaceus.		43. terricola.	
8. purpurascens.		44. scrobiculatus.	
9. catenulatus.		45. maurus.	
10. Carolinus.	171	46. niger.	
11. cyaneus.		47. planus.	179
12. excellens.		48. striatulus.	
13. Hispanus.		49. arenarius.	
14. nodulosus.		50. fabulosus.	
15. monilis.		51. lateralis.	180
16. Lusitanicus.		52. 4 color	
17. gemmatus.	172	53. ruficornis.	

54. fuluipes.	I. 180	90. oblongus.	I. 186
55. picicornis.		91. pallipes.	187
56. flauicornis.		92. rubens.	
57. piceus.	181	93. festinans.	
58. femoralis.		94. cephalotes.	
59. madidus.		95. megacephalus.	
60. decorus.		96. interruptus.	
61. spinibarbis.		97. Calidonium.	188
62. aeneocephalus.		98. caliginosus.	
63. humeralis.		99. striola.	
64. angusticollis.	182	100. impressus.	
65. miliaris.		101. striolatus.	
66. axillaris.		102. metallicus.	189
67. trilobus.		103. frigidus.	
68. multipunctatus.		104. elatus.	
69. borealis.		105. gibbus.	
70. oblongo-punctatus.	183	106. politus.	
71. Croesus.		107. lepidus.	
72. spoliatus.		108. cassideus.	190
73. cinctus.		109. silphoides.	
74. festiuus.	184	110. fabulicola.	
75. rufipes.		111. globosus.	
76. elegans.		112. melanocephalus.	
77. splendidulus.		113. fuscus.	191
78. nitidulus.		114. breuicollis.	
79. tenuicollis.	185	115. punctulatus.	
80. ruficollis.		116. oculatus.	
81. tricolor.		117. pesticus.	
82. modestus.		118. micans.	
83. agilis.		119. notula.	
84. 4 notatus.	186	120. obscurus.	192
85. fasciatus.		121. stigma.	
86. atricapillus.		122. Ammon.	
87. marginellus.		123. pudicus.	193
88. bis 2 guttatus.		124. bicolor.	
89. 8 punctatus.		125. holosericeus.	

Rr

126.

126. 2 notatus.	I. 193	162. marginatus.	1. 1
127. fulvicollis.		163. vestitus.	2
128. pilicornia.		164. Nigrita.	
129. dimidiatus.	194	165. pallipes.	
130. coerulescens.		166. quadrum.	
131. laetus.		167. cyanocephalus.	
132. viuidus.		168. rufibarbis.	2
133. tardus.		169. flauilabris.	
134. cupreus.	195	170. amethystinus.	
135. tricolor.		171. liuidus.	
136. carnifex.		172. semivittatus.	
137. vulgaris.		173. notulatus.	
138. communis.		174. corticalis.	
139. integer.	196	175. curtus.	2
140. alpinus.		176. crux maior.	
141. latus.		177. crux minor.	
142. abdominalis.		178. vittatus.	
143. ouatus.		179. 2 vittatus.	20
144. helopioïdes.		180. angulatus.	
145. azureus.		181. Turcicus.	
146. aeneus.	197	182. haemorrhoidalis.	
147. erythrocephalus.		183. picipes.	
148. analis.		184. 2 pustulatus.	
149. lineola.		185. Andreae.	20
150. ferrugineus.		186. eleuatus.	
151. pallidus.	198	187. germanus.	
152. St. Crucis.		188. Heros.	
153. Surinamensis.		189. spinilabris.	
154. dorfiger.		190. velox.	20
155. aterrimus.		191. rufescens.	
156. nigricornis.		192. praeustus.	
157. Austriacus.		193. apricarius.	
158. parum punctatus.	199	194. lunatus.	
159. 6 punctatus.		195. prafinus.	2
160. palliatus.		196. Cursor.	
161. discoideus.		197. furcatus.	

198. vaporariorum.	I. 206	9. cruenta.	I. 389
199. meridianus.		10. Austriaca.	390
200. discus.	207	11. nebulosa.	
201. comma.		12. echinata.	
202. vernalis.		13. atrata.	
203. 4 maculatus.		14. Murraca.	
204. 4 guttatus.		15. vittata.	391
205. 4 pustulatus.	208	16. ferruginea.	
206. vstulatus.		17. brunnea.	
207. dorfalis.		18. vnicolor.	
208. 2 guttatus.		19. scalaris.	
209. guttula.		20. marginella.	392
210. fenestratus.	209	21. punctaria.	
211. smaragdulus.		22. cincta.	
212. cruciger.		23. ornata.	
213. testaceus.		24. Hebraea.	
214. truncatus.		25. Iudaica.	
215. abbreviatus.		26. obscura.	
216. 2 punctatus.		27. tristitiata.	
217. celer.	210	28. Zona.	393
218. minutus.		29. Morio.	
219. pygmaeus.		30. brachiata.	
220. triflis.		31. aurulenta.	
221. fasciola.		32. purpurea.	
222. truncatellus.		33. Cyclops.	394
223. minimus.		34. annulus.	
		35. 6 notata.	
6. CASSIDA.		36. bifasciata.	
1. viridis.	I. 387	37. quadrata.	395
2. thoracica.	388	38. reticulata.	
3. equestris.		39. 6 punctata.	
4. prasina.		40. interrupta.	
5. affinis.		41. 8 punctata.	
6. vibex.	389	42. scripta.	
7. azurea.		43. gibba.	
8. sanguinolenta.		44. deusta.	

- | | | | |
|--------------------|--------|---------------------|--------|
| 45. clathrata. | I. 396 | 84. cyanea. | I. 402 |
| 46. cribraria. | | 85. spinifex. | |
| 47. nobilis. | | 86. bicornis. | 403 |
| 48. bicolor. | | 87. Taurus. | |
| 49. taeniata. | | 88. bidens. | |
| 50. trivittata. | 397 | 89. gibbosa. | |
| 51. margaritacea. | | 90. truncata. | |
| 52. cruciata. | | 91. flava. | |
| 53. aurichalcea. | | 92. leucophaea. | |
| 54. crux. | | 93. transuersa. | 404 |
| 55. II punctata. | | 94. reticulans. | |
| 59. 13 punctata. | 398 | 95. variegata. | |
| 60. sinuata. | | 96. punctum. | |
| 61. arcuata. | | 97. trifasciata. | |
| 62. clauata. | | 98. retiformis. | 405 |
| 63. 2 notata. | | 99. venosa. | |
| 64. micans. | | 100. nervosa. | |
| 65. eleuata. | 399 | 101. varians | |
| 66. 2 tuberculata. | | 102. annulata. | |
| 67. tuberculata. | | 103. grossa. | |
| 68. dilatata. | | 104. lineata. | 406 |
| 69. suturalis. | | 105. exclamationis. | |
| 70. 2 guttata. | | 106. flauomaculata. | |
| 71. miliaris. | 400 | 107. irrorata. | |
| 72. adhaerens. | | 108. inaequalis. | |
| 73. 2 maculata. | | 109. lateralis. | 407 |
| 74. punctata. | | 110. palliata. | |
| 75. adspersa. | | 111. variolosa. | |
| 76. marginata. | | 112. discoidea. | |
| 77. 4 pustulata. | 401 | 113. 2 pustulata. | |
| 78. dorsata. | | 114. discors. | 408 |
| 79. 5 fasciata. | | 115. cuprea. | |
| 80. St. Crucis. | | 116. 6 pustulata. | |
| 81. Jamaicensis. | | 117. 12 pustulata. | |
| 82. Chinenfis. | 402 | 118. 16 punctata. | |
| 83. exaltata. | | 119. 2 punctata. | |

167. CATOPS.

- 1. rufescens. 2. 563
- 2. fericea. 564
- 3. vittata.
- 4. Morio.
- 5. flauipes.
- 6. agilis 565

91. CEBRIO.

- 1. gigas. 2. 14
- 2. fuscus.
- 3. bicolor.
- 4. ruficollis. 15

135. CERAMBYX.

- 1. longimanus. 2. 266
- 2. moschatus.
- 3. virens. 267
- 4. albitarsus.
- 5. nitens.
- 6. micans.
- 7. ater. 268
- 8. festinus.
- 9. vittatus.
- 10. velutinus.
- 11. fericeus.
- 12. futuralis.
- 13. elegans. 269
- 14. regius.
- 15. latipes.
- 16. albicornis.
- 17. longipes. 270
- 18. cyanicornis.
- 19. interruptus.
- 20. Cerdo.
- 21. Heros.
- 22. spinicornis. 271

- 23. denticornis. 2. 271
- 24. ater.
- 25. bidens.
- 26. tuberculatus.
- 27. voluulus.
- 28. Batus. 272
- 29. ferrugineus.
- 30. alpinus.
- 31. ocellatus.
- 32. scalaris. 273
- 33. ebulinus.
- 34. Morio.
- 35. Koehleri.
- 36. Lundii.
- 37. Desfontainii. 274
- 38. humeralis.
- 39. 4 dens.
- 40. fuccinctus.
- 41. bicornis.
- 42. striatus. 275
- 43. abbreviatus.
- 44. rufipes.
- 45. dimidiatus. 276
- 46. bicolor.
- 47. depressus.
- 48. fasciatus.
- 49. barbicornis.
- 50. albo-fasciatus. 277
- 51. nebulosus.
- 52. obscurus.
- 53. griseus.
- 54. costatus.
- 55. fasciculatus.
- 56. hispidus. 278
- 57. pilosus.
- 58. 4 punctatus.

59. balteatus.	278	17. Morio.	2. 138
60. rugicollis.	279	18. cuspidata.	
61. 2 maculatus.		19. cordata.	139
62. splendidus.		20. 4 punctata.	
63. Daldorfii.		21. rufipes.	
64. nitens.		22. holosericea.	
65. fulgidus.	280	23. strigosa.	
66. longicornis.		24. nitida.	
67. marginalis.		25. lobata.	140
68. breuicornis.		26. Carmelita.	
69. scriptus.		27. fulcata.	
70. iuuenens.		28. Chrysis.	
71. holosericeus.	281	29. virens.	141
72. cinereus.		30. splendida.	
107. CEROCOMA.		31. lucida.	
1. Schaefferi.	274	32. francisca.	
2. VahlII.		33. capucina.	
3. Schreberi.		34. Lanii.	
226. CETONIA.		35. bajula.	142
1. Goliata.	135	36. flauolea.	
2. Cacicus.		37. graculus.	
3. bifrons.		38. liturata.	
4. Poliphemus.	136	39. carnifex.	143
5. Ynea.		40. glabrata.	
6. micans.		41. rauca.	
7. Chinenfis.		42. cornuta.	
8. nigrita.		43. triftis.	
9. acerata.	137	44. smaragdula.	
10. faftuofa.		45. fascicularis.	144
11. marmorata.		46. aulica.	
12. viridis.	138	47. purpurafcens.	
13. recurua.		48. Capenfis.	
14. metallica.		49. fignata.	145
15. pubefcens.		50. marginata.	
16. opaca.		51. ornata.	
		52. marginella.	

33. lineola.	2. 145	89. stolata.	2. 153
34. scutellata.	146	90. atomaria.	
35. striata.		91. festiua.	
36. flauomaculata.		92. abbreviata.	
37. sinuata.	147	93. maculata.	
38. fasciata.		94. difformis.	154
39. oliuacea.		95. acuminata.	
40. interrupta.		96. marmorata.	
41. picta.		97. haemorrhoidalis.	
42. trilineata.		98. adspersa.	
43. elata.	148	99. areata.	
44. femipunctata.		100. hirta.	155
45. 5lineata.		101. funesta.	
46. atromaculata.		102. stictica.	
47. limbata.		103. albopunctata.	
48. trigona.		104. cinerascens.	156
49. elegans.	149	105. irrorata.	
50. 4maculata.		106. furcata.	
51. 6maculata.		107. sepulcralis.	
52. cuprea.		108. punctulata.	
53. Africana.		109. floralis.	
54. laeta.	150	110. 14maculata.	
55. suturalis.		111. varicolor.	157
56. vittata.		112. variegata.	
57. fulgida.		113. torquata.	
58. Iris.	151	114. aequinoctialis.	
59. Gagates.		115. sanguinolenta.	158
60. tetradactyla.		116. discoidea.	
61. clauata.		117. lugubris.	
62. fucata.		118. Histrio.	
63. lurida.	152	119. modesta.	
64. mixta.		120. gloriosa.	
65. lunulata.		121. Maura.	
66. aurichalcea.		122. Hottentotta.	159
67. nitidula.		123. regia.	
68. Philippensis.		124. cruenta.	

12. CHELONARIVM.

1. atrum. I, 101
2. punctatum. 102

80. CHRYSOMELA.

1. punctatissima. I. 423
2. pustulata.
3. tenebricosa.
4. rugosa. 424
5. Morio.
6. coriaria.
7. Surinamensis.
8. 3maculata.
9. vittata.
10. gibbosa.
δ 11. 8maculata. 425
12. submarginata,
13. coniugata.
14. trifasciata.
15. futuralis.
16. pulcra.
17. cruciata. 426
18. 12guttata.
19. thoracica.
20. affinis.
21. striata.
22. alternans.
23. Australasiae.
24. globus. 427
25. varicornis.
26. amethystina.
27. testacea.
28. bractea.
29. orbicula. 428
30. micans.
31. Centaurei.

32. 3vittata. I. 428
33. flauicans. 429
34. litura.
35. Nigrita.
36. Goettingensis.
37. Hottentotta.
38. Aethiops.
39. bicolor.
40. Lusitanica. 430
41. rufipes.
42. ferruginea.
43. Bankii.
44. metallica.
45. lamina.
46. obscurata.
47. Raphani.
48. calcarata. 431
49. punctata.
50. morbillofa.
51. 10pustulata.
52. Adonidis.
53. clauata.
54. 14punctata.
55. 14guttata. 432
56. Hebraea.
57. saphira.
58. graminis.
59. fulgida.
60. bifrons.
61. cuprea.
62. tristis. 433
63. haemoptera.
64. varians.
65. violacea.
66. semiftriata.
67. Amboinensis.

68. Populi.	I. 433	104. brunnea.	I. 439
69. tremula.	434	105. cerealis.	
70. grossa.		106. Meyerlei.	
71. staphylaez.		107. Americana.	440
72. feruida.		108. festiua.	
73. polita.		109. fastuosa.	
74. lunata.	435	110. splendidula.	
75. lurida.		111. gloriosa.	
76. linea.		112. speciosa.	441
77. exclamationis.		113. limbata.	
78. stolidia.		114. carnifex.	
79. nigricornis.		115. sanguinolenta.	
80. collaris.		116. marginata.	
81. Salicis.	436	117. Schach.	
82. Senegalensis.		118. analis.	442
83. viminalis.		119. aucta.	
84. cyanipes.		120. mediata.	
85. cyanicornis.		121. 3opunctata.	
86. 1opunctata.		122. marginella.	
87. 6punctata.		123. Hannoverana.	443
88. 6notata.	437	124. arcuata.	
89. aegrota.		125. 5punctata.	
90. pallida.		126. dimidiata.	
91. notata.		127. scutellata.	
92. Rumicis.		128. pectoralis.	
93. vulpina.		129. lineola.	
94. crassicornis.		130. sacra.	444
95. Lapponica.		131. haemorrhoidalis.	
96. interrupta.	438	132. fucata.	
97. Cayennensis.		133. aenea.	
98. marmorata.		134. Bulgarenfis.	
99. scripta.		135. Philadelphica.	
100. vndulata.		136. Armoraciae.	445
101. 18guttata.	439	137. Cochleariae.	
102. Polygoni.		138. pallipes.	
103. Russica.		139. Sophiae.	

140. discoidea.	1. 445	14. sinuata.	1. 234
141. lauanea.		15. sylvatica.	235
142. picta.	446	16. Maura.	
143. aestuans.		17. littoralis.	
144. calida.		18. tristis.	
145. Indica.		19. interrupta.	236
146. varicornis.		20. lunulata.	
147. fuluicollis.		21. melancholica.	
148. Napi.		22. lurida.	
149. Hyoscyami.	447	23. Chinensis.	
150. nigripes.		24. analis.	
151. nitidula.		25. femiuttata.	237
152. Helxines.		26. flexuosa.	
153. fuluicornis.		27. Capensis.	
154. 3fasciata.		28. abdominalis.	
155. Modeeri.	448	29. germanica.	
156. semiaenea.		30. obscura.	238
157. erythrocephala.		31. micans.	
158. relicta.		32. tuberculata.	
159. testacea.		33. 1 punctata.	
160. globosa.		34. 2 punctata.	
		35. chrysis.	
42. CICINDELA.		36. 4punctata.	239
1. grossa.	1. 231	37. 6punctata.	
2. Heros.	232	38. aurulenta.	
3. labiata.		39. 4lineata.	
4. violacea.		40. cincta.	240
5. cyanea.		41. vittata.	
6. megalcephala.		42. 2ramosa.	
7. Virginica.	233	43. marginalis.	
8. Carolina.		44. punctulata.	241
9. sepulcralis.		45. 6guttata.	
10. bicolor.		46. catena.	
11. campestris.		47. longipes.	
12. Maroccana.	234	48. marginata.	
13. hybrida.		49. 1oguttata.	

- | | | | |
|-----------------------------|--------|--------------------------|--------|
| 50. <i>futuralis</i> . | I. 242 | 20. <i>Nigrita</i> . | 2. 20 |
| 51. <i>8guttata</i> . | | 21. <i>Maura</i> . | |
| 52. <i>argentata</i> . | | 22. <i>pallipes</i> . | |
| 53. <i>viduata</i> . | | 23. <i>angustata</i> . | |
| 54. <i>3fasciata</i> . | | 24. <i>festiva</i> . | |
| 55. <i>angulata</i> . | 243 | 25. <i>aulica</i> . | |
| 56. <i>funestata</i> . | | 26. <i>hirta</i> . | |
| 57. <i>holofericea</i> . | | 27. <i>agilis</i> . | |
| 58. <i>interrupta</i> . | | 28. <i>6lineata</i> . | 21 |
| 59. <i>Cayennensis</i> . | | | |
| 60. <i>aequinoctialis</i> . | | 51. CLERVS. | |
| 61. <i>guttula</i> . | 244 | 1. <i>mutillaris</i> . | I. 279 |
| 62. <i>flauilabris</i> . | | 2. <i>dubius</i> , | 280 |
| 63. <i>fasciata</i> . | | 3. <i>ichneumoneus</i> . | |
| 64. <i>minuta</i> . | | 4. <i>sphegeus</i> . | |
| | | 5. <i>fornicarius</i> . | |
| 93. CISTELA. | | 6. <i>6guttatus</i> . | |
| 1. <i>ceramoides</i> . | 2. 16 | 7. <i>spinofus</i> . | |
| 2. <i>lepturoides</i> . | 17 | 8. <i>4maculatus</i> . | 281 |
| 3. <i>testacea</i> . | | 9. <i>vnifasciatus</i> . | |
| 4. <i>picipes</i> . | | 100. CLYTHRA. | |
| 5. <i>bicolor</i> . | 18 | 1. <i>longipes</i> . | 2. 28 |
| 6. <i>sulphurea</i> . | | 2. <i>3punctata</i> . | |
| 7. <i>ruficollis</i> . | | 3. <i>curuata</i> . | 29 |
| 8. <i>coerulea</i> . | | 4. <i>curuipes</i> . | |
| 9. <i>nigripennis</i> . | | 5. <i>tibialis</i> . | |
| 10. <i>analis</i> . | | 6. <i>obliqua</i> . | |
| 11. <i>melanocephala</i> . | | 7. <i>palliata</i> . | 30 |
| 12. <i>rufipes</i> . | 19 | 8. <i>hirta</i> . | |
| 13. <i>fuluipes</i> . | | 9. <i>fasciata</i> , | |
| 14. <i>Morio</i> . | | 10. <i>6maculata</i> . | 31 |
| 15. <i>murina</i> . | | 11. <i>argentata</i> . | |
| 16. <i>thoracica</i> . | | 12. <i>6notata</i> . | |
| 17. <i>flauipes</i> . | | 13. <i>4punctata</i> . | |
| 18. <i>humeralis</i> . | | 14. <i>picta</i> . | 32 |
| 19. <i>Eudomyi</i> . | 20 | 15. <i>4notata</i> . | |
| | | | 16. |

16. 3maculata.	2. 32	52. Scopolina.	2. 39
17. rugosa.		53. Koenigii.	
18. Atraphaxidis.		54. paracenthesis.	
19. monstrosa.	33	55. bicolor.	40
20. plicata.		56. 2pustulata.	
21. gibber.		57. punctulata.	
22. impressa.		58. nitidula.	
23. cristata.		59. concolor.	
24. lunulata.		60. Hordei.	41
25. 12maculata.	34		
26. obfita.		143. CLYTVS.	
27. 3dentata.		1. flexuosus.	2. 345
28. Dominicana.		2. minutus.	346
29. taxicornis.		3. floralis.	
30. decora.	35	4. fulminans.	
31. 2fasciata.		5. semipunctatus.	
32. 6notata.		6. atomarius.	
33. 8signata.	36	7. luscus.	347
34. 8punctata.		8. arcuatus.	
35. maxillofa.		9. Arietis.	
36. aurita.		10. Gazella.	348
37. Lentisci.		11. festiuus.	
38. 4maculata.		12. laetus.	
39. Turcica.	37	13. coarctatus.	349
40. longimana.		14. margaritaceus.	
41. Lar.		15. plebeius.	
42. humeralis.		16. Massiliensis.	350
43. plagioccephala.	38	17. mucronatus.	
44. pallens.		18. angulatus.	
45. ruficollis.		19. erythrocephalus.	
46. nigripes.		20. senilis.	
47. brunnea.		21. detritus.	
48. coerulans.		22. glaucus.	351
49. cuprea.	39	23. 6fasciatus.	
50. cyanea.		24. 3fasciatus.	
51. bucephala.		25. Verbascl.	
			26.

26. ornatus.	2. 351	14. vnipunctata.	I. 358
27. bidens.		15. dimidiata.	
28. annulus.	352	16. margine punctata.	
29. 4 punctatus.		17. lineola.	359
30. annularis.		18. dorsimacula.	
31. Aegyptiacus.		19. vnifasciata.	
32. mysticus.		20. annulata.	
33. virens.	353	21. 3 lineata.	
34. gibbosus.		22. vittata.	
35. vnifasciatus.		23. futuralis.	
36. picipes.		24. limbata.	
37. piniadeus.		25. striata.	360
38. Alni.	354	26. oblongo-punctata.	
90. CNOBVLO.		27. abbreviata.	
1. cupreum,	2. 12	28. 6 lineata.	
2. nebulosum.	13	29. 2 punctata.	
3. dilatatum.		30. 3 punctata.	361
4. triste.		31. hieroglyphica.	
5. smaragdulum.		32. riularis.	
6. amethystinum.		33. tricincta.	
7. bicolor.	14	34. arcuata.	
75. COCCINELLA.		35. catenata.	
1. marginata.	I. 356	36. reticulata.	362
2. limbata.		37. vndata.	
3. marginella.	357	38. flexuosa.	
4. diaphana.		39. cingulata.	
5. pubescens.		40. inaequalis.	
6. Abietis.		41. varians.	363
7. immaculata.		42. 3 fasciata.	
8. vnicolor.		43. interrupta.	
9. coccinea.		44. 2 fasciata.	
10. M. nigram.		45. 4 notata.	
11. discolor.	358	46. 4 maculata.	
12. cincta.		47. 5 punctata.	
13. sanguinea.		48. 5 maculata.	364
		49. 6 punctata.	

50. glacialis.	I. 364	86. 20 punctata.	I. 370
51. 6 maculata.		87. 22 punctata.	
52. 7 punctata.		88. 22 maculata.	
53. 7 maculata.	365	89. 23 punctata.	
54. 7 notata.		90. 24 punctata.	371
55. 8 punctata.		91. 24 maculata.	
56. transuersalis.		92. 28 punctata.	
57. 8 maculata.		93. conglomerata.	
58. 8 notata.	366	94. conglobata.	371
59. 9 maculata.		95. confluens.	
60. 9 notata.		96. lineola.	
61. 9 punctata.		97. tricolor.	
62. 10 punctata.		98. detrita.	
63. 10 maculata.	367	99. strigata.	
64. innuba.		100. 2 guttata.	374
65. dilatata.		101. 8 guttata.	
66. 11 punctata.		102. 10 guttata.	
67. 11 maculata.		103. bis 6 guttata.	
68. 72 punctata.		104. 12 guttata.	
69. variegata.	368	105. 14 guttata.	
70. chryfomelina.		106. bis 7 guttata.	375
71. borealis.		107. 15 guttata.	
72. 12 notata.		108. 16 guttata.	
73. cassidea.		109. 18 guttata.	
74. 13 maculata.	369	110. 20 guttata.	374
75. dispar.		111. oblongo-guttata.	
76. 13 punctata.		112. vnipustulata.	
77. laeta.		113. aenea.	
78. versicolor.		114. nitidula.	
79. 14 maculata.	370	115. flauipes.	377
80. ocellata.		116. Nigrita.	
81. 16 punctata.		117. paruula.	
82. 16 maculata.		118. discoidea.	
83. 16 notata.		119. floralis.	
84. 18 punctata.	371	120. biuerrucata.	377
85. 19 punctata.		121. villosa.	

22. analis.	I. 378	158. argulata.	I. 386
23. thoracica.		159. vulpina.	
24. marginella.		160. leonina.	
25. haemorrhoidalis.	379	161. tigrina.	
26. oculata.		162. canina.	387
27. Cacti.			
28. 2 pustulata.		78. COLASPIS.	
29. lateralis.	380	1. testacea.	I. 411
30. variabilis.		2. crenata.	
31. rufipes.		3. glabrata.	412
32. Morio.		4. flavicornis.	
33. frontalis.	381	5. luteicornis.	
34. dentipes.		6. Crotonis.	
35. 4 pustulata.		7. rufipes.	413
36. 4 verrucata.		8. viridis.	
37. fasciata.	382	9. tricolor.	
38. diuisa.		10. aenea.	
39. bis 2 pustulata.		11. fuluipes.	414
40. arctica.		12. cuprea.	
41. erythrocephala.	383	13. obscura.	
42. 6 pustulata.		14. fulua.	
43. bis 3 pustulata.		15. barbara.	415
44. 6 verrucata.		16. ferruginea.	
45. 8 pustulata.		17. nitidula.	
46. lunata.	384	18. nigricornis.	
47. 10 pustulata.		19. laeuigata.	
48. bis 5 pustulata.		20. marginata.	416
49. bis 6 pustulata.		21. metallica.	
50. 12 pustulata.		22. ruficornis.	
51. 12 verrucata.		23. brunnea.	
52. 14 pustulata.	385	24. suilla.	417
53. guttato-pustulata.		25. saliens.	
54. felina.		26. gibba.	
55. pantherina.		27. quercata.	
56. pardalina.	386	164. COLYDIVM.	
57. vrsina.		1. fulcatum.	555

2. retusum.	2. 555	19. Canadensis.	I. 34
3. bicolor.		20. latebrosa.	
4. 2 dentatum.	556	21. pygmaea.	35
5. elongatum.		22. Pardalis.	
6. striatum.		23. Catta.	
7. filiforme.		24. Rosalia.	
8. rufipes.		25. Ammon.	
9. erythrocephalum.	557	26. Eryx.	
10. cylindricum.		27. Midas.	36
11. rufum.		28. Hamadryas.	
12. frumentarium.		29. lunaris.	
13. ruficorne.		30. emarginata.	37
		31. caelata.	
39. COLLYRIS.		32. Belzebul.	
1. longicollis.	I. 226	33. bifasciata.	
2. aptera.		34. Dromedarius.	38
3. formicarica.		35. Simon.	
		36. Faunus.	
5. COPRIS.		37. Perma.	
1. Oedipus.	I. 30	38. Tarandus.	
2. Rhadamistus.	31	39. Capucinus.	
3. nemestrinus.		40. Carmelita.	39
4. Jachus.		41. lucida.	
5. Lustator.		42. Lemur.	
6. Sabaeus.		43. Camelus.	
7. Nanus.	32	44. Vertagus.	40
8. splendidulus.		45. Melitaeus.	
9. conspicillatus.		46. vnifasciata.	
10. festius.		47. Aeson.	
11. Harnax.		48. Antenor.	
12. Pactolus.	33	49. Bonafus.	
13. aurata.		50. sagittarius.	41
14. Pithecus.		51. Nimrod.	
15. Seniculus.		52. Venator.	
16. Jauana.		53. Vulcanus.	
17. metallica.	34	54. Bucephalus.	42
18. Guineensis.			55

55. Gigas.	I. 42	91. fracticornis.	I. 50
56. Molossus.		92. Xiphias.	
57. Vrfus.	43	93. nutans.	
58. lancifer.		94 Ciconia.	51
59. Paniscus.		95. aenea.	
50. Carolina.		96. Hyæna.	
51. Nifus.	44	97. thoracica.	52
52. Meleager.		98. centricornis.	
53. orientalis.		99. vnicornis.	
54. Dorcas.		100. scabrosa.	
55. Tullius.		101. furcula.	
56. Plutus.		102. furcata.	
57. Fricator.	45	103. verticicornis.	53
58. Mimas.		104. fulcator.	
59. Taurus.		105. 4 pustulata.	
60. Vacca.		106. reflexa.	
61. media.	46	107. Hybneri.	
62. Capra.		108. 4 cornis.	54
63. Ceruus.		109. 4 dentata.	
64. Ilex.		110. cristata.	
65. Alces.		54. CORYNETES.	
66. Gazella.	47	1. violaceus.	I. 285
67. femorata.		2. rufipes.	286
68. Oryx.		3. ruficollis.	
69. nuchidens.		4. abdominalis.	
70. Tragus.	48	5. sanguinicollis.	287
71. Antilope.		160. COSSONVS.	
72. Dama.		1. linearis.	2. 496
73. Vitulus.		2. elongatulus.	
74. Carnifex.		3. canaliculatus.	
75. tridens.	49	4. corticalis.	497
76. Hispanus.		5. squama.	
77. Mopfus.		117. COSSYPHVS.	
78. spinifex.		1. depressus.	2. 98
79. Coenobita.		2. planus.	
80. nuchicornis.	50		
	55		81.

72. 4pustulata.	I. 464	11. didymus.	2. 43
73. 2pustulata.		12. flauicollis.	
74. S. littera:		13. marginatus.	
75. atricilla.	465	14. humeralis.	
76. Sifymbrii.		15. pubescens.	
77. Nasturtij.		16. 2punctatus.	
78. dorfolis.		17. lineola.	44
79. phthysica.	466	18. 2maculatus.	
80. exoleta.		19. cordiger.	
81. laeuigata.		20. variabilis.	
82. Volkameriae.		21. 3lineatus.	45
83. copalina.		22. Bothnicus.	
84. St. Crucis.	467	23. frenatus.	
85. Holfatica.		24. luridus.	
86. tabida.		25. impressus.	
87. Euphorbiae.		26. Coryli.	
88. atra.		27. variegatus.	46
89. nemorum.		28. 3fasciatus.	
90. Brassicae.	468	29. imperialis.	
91. Surinamensis.		30. 6punctatus.	
92. Rubi.		31. flauescens.	
93. hortorum.		32. ornatus.	47
94. paruula.		33. violaceus.	
95. vittata.	469	34. congestus.	
		35. obliquus.	
		36. rubrifrons.	
01. CRYPTOCEPHALVS.		37. calcaratus.	
1. elatus.	2. 41	38. dentipes.	
2. 6signatus.		39. lobatus.	
3. Salicis.	42	40. cinctus.	48
4. 6notatus.		41. Billardieri.	
5. laetus.		42. Lundii.	
6. lineatus.		43. Sehestedtii.	
7. venustus.		44. VahlII.	
8. 6guttatus.		45. collaris.	49
9. Gorteriae.		46. fericeus.	
10. modestus.			

- | | | | |
|----------------------|-------|-------------------|----|
| 47. nitens. | 2. 49 | 83. Pini. | 2 |
| 48. glabratus. | | 84. reticulatus. | |
| 49. viduatus. | | 85. pufillus. | |
| 50. lituratus. | 50 | 86. nanus. | |
| 51. pustulatus. | | 87. minutus. | |
| 52. vittatus. | | 88. paruulus. | |
| 53. limbatus. | | 89. gracilis. | |
| 54. nitidulus. | 51 | 90. auratus. | |
| 55. tricolor. | | 91. pygmaeus. | |
| 56. labiatus. | | 92. saliens. | |
| 57. flauilabris. | | 114. CVCVIVS. | |
| 58. flauipes. | | 1. gigas. | |
| 59. flauifrons. | | 2. heros. | |
| 60. Hybneri. | | 3. rufipennis. | |
| 61. Moraei. | 52 | 4. depressus. | |
| 62. canellus. | | 5. sulcatus. | |
| 63. 8 guttatus. | | 6. rufus. | |
| 64. 15 guttatus. | | 7. rufipes. | |
| 65. guttula. | | 8. maxillofus. | |
| 66. 10 punctatus. | 53 | 9. spinofus. | |
| 67. hieroglyphicus. | | 10. oblongus. | |
| 68. coloratus. | | 11. planus. | |
| 69. dubius. | | 12. dermestoides. | |
| 70. 12 punctatus. | 54 | 13. muticus. | |
| 71. haemorrhoidalis. | | 14. monilis. | |
| 72. scutellaris. | | 15. minutus. | |
| 73. 2 pustulatus. | | 103. CVPES. | |
| 74. 2 fasciatus. | 55 | 1. capitata. | |
| 75. 4 pustulatus. | | 162. CVRCVLIO. | |
| 76. notatus. | | 1. argyreus. | 2. |
| 77. hiftrio. | | 2. splendidus. | |
| 78. smaragdulus. | | 3. imperialis. | |
| 79. 3 guttatus. | | 4. fumptuofus. | |
| 80. faponatus. | | 5. Chryfis. | |
| 81. Spengleri. | 56 | 6. regalis. | |
| 82. hecticus. | | | |

7. marginatus.	4. 508	43. splendidulus.	2. 514
8. aeneus.		44. cornipes.	
9. 19 punctatus.	509	45. morbillosus.	
10. 16 punctatus.		46. nebulosus.	
11. decorus.		47. roridus.	
12. prodigus.		48. cinereus.	
13. nitidulus.		49. senilis.	515
14. candidus.		50. marmoratus.	
15. pauperatus.		51. sulcirostris.	
16. avarus.	510	52. porculus.	
17. niueus.		53. retusus.	
18. lacteus.		54. emarginatus.	516
19. puluulentus.		55. perlatus.	
20. squamosus.		56. distinctus.	
21. rusticus.		57. glaucus.	
22. unicolor.	511	58. obliquus.	
23. moratus.		59. albidus.	517
24. cretaceus.		60. dispar.	
25. cinerascens.		61. bicristatus.	
26. smaragdinus.		62. Vetula.	
27. 8 tuberculatus.		63. Lusitanicus.	518
28. feruus.		64. crenulatus.	
29. innocuus.	512	65. punctatulus.	
30. modestus.		66. incanus.	
31. flauescens.		67. articulatus.	
32. pollinosus.		68. costatus.	
33. lateralis.		69. melancholicus.	
34. viridis.		70. interruptus.	519
35. fellatus.	513	71. scutellaris.	
36. gibber.		72. longimanus.	
37. fuluus.		73. spinifex.	
38. palliatus.		74. Echinus.	
39. aurifer.		75. micans.	
40. cyanipes.		76. murinus.	520
41. repandus.		77. Polygoni.	
42. Tamarisci.		78. dilatatus.	

79. tomentosus.	2. 520	115. fetosus.	2. 51
80. griseus.		116. squamulatus.	
81. fritillum.		117. Erinaceus.	
82. rubiginosus.	521	118. limbatus.	
83. 3guttatus.		119. paruulus.	5
84. Meyerlei.		120. viridicollis.	
85. Arundinis.		121. ceruinus.	
86. planatus.	522	122. striatus.	
87. Goerzenfis.		123. lacerta.	
88. scabratus.		124. velox.	
89. sulphurifer.		125. feminulum.	
90. glabratus.	523	126. sinuatus.	
91. orbicularis.		127. ruficornis.	5
92. moerens.		128. multipunctatus.	
93. gressorius.		129. tristis.	
94. geminatus.		130. raucus.	
95. gramineus.		131. adspersus.	
96. diadema.		132. striga.	
97. Meles.		133. punctatus.	
98. Coryli.	524	134. obscurus.	51
99. lineatus.		135. Mercurialis.	
100. lunatus.		136. maxillofus.	
101. caninus.		137. niger.	
102. elevantus.		138. costatus.	
103. mus.		139. laeuigatus.	5
104. fuluipes.	525	140. rotundatus.	
105. ruficollis.		141. variolosus.	
106. fuluicornis.		142. ficticus.	
107. echinatus.		143. affinis.	
108. pilosus.		144. valgus.	
109. vndatus.		145. succinctus.	
110. lanatus.	526	146. excisus.	
111. hispidulus.		147. Cameleon.	5
112. hirsutulus.		148. vittatus.	
113. holosericeus.		149. Spengleri.	
114. scabrioulus.	527	150. 2vittatus.	

151. liuidus.	2. 532	188. Ligustici.	2. 538
152. pulcher.	533	189. Zebra.	
153. festiuus.		190. 2notatus.	
154. histriomicus.		191. nubilus.	
155. Rohrii.		192. punctum.	
156. impressus.		193. brunnipes.	
157. albipes.		194. denticornis.	539
158. riuiosus.		195. Auftriacus.	
159. depressirostris.	534	196. nigrita.	
160. marginellus.		197. fulcatus.	
161. verrucosus.		198. calcaratus.	
162. Capensis.		199. gemmatus.	
163. exfertus.		200. squamiger.	540
164. 6vittatus.		201. picipes.	
165. vitulus.		202. Morio.	
166. inaequalis.	535	203. 2sulcatus.	
167. recuruus.		204. collaris.	
168. acuminatus.		205. asperatus.	541
169. capistratus.		206. Iris.	
170. emeritus.		207. lepidopterus.	
171. tuberculatus.		208. roralis.	
172. crispatus.		209. clarus.	
173. cultratus.	536	210. Pyri.	
174. tribulus.		211. Alneti.	542
175. 4dens.		212. vespertinus.	
176. 4spinofus.		213. Mali.	
177. clauus.		214. pallidus.	
178. nodulosus.		215. arboreti.	543
179. rubifer.		216. Betulae.	
180. globifer.		217. dentifer.	
181. spectrum.	537	218. curuicornis.	
182. pillularius.		219. doriatus.	
183. glandifer.		220. argentatus.	
184. spectabilis.		221. viridanus.	545
185. pinguis.		222. oblongus.	
186. tridens.		223. muricatus.	
187. fuscumaculatus.			544.

- | | | | |
|---------------------|--------|-------------------|-------|
| 224. ouatus. | 2. 544 | 11. linearis. | 27 |
| 225. albo-lineatus. | | 12. minutus. | 7 |
| 226. Picus. | 545 | 176. DIAPERIS. | |
| 227. attelaboides. | | 1. Boleti. | 2. 58 |
| 31. CYCHRVS. | | 2. hydatina. | |
| 1. rostratus. | I. 165 | 3. violacea. | 58 |
| 2. attenuatus. | 166 | 4. viridi-pennis. | |
| 3. reflexus. | | 5. aenea. | |
| 4. eleuatus. | | 61. DERMESTES. | |
| 5. vnicolor. | | 1. lardarius. | I. 31 |
| 85. CYPHON. | | 2. carniuorus. | |
| 1. pallidus. | I. 501 | 3. cadauerinus. | |
| 2. lucidus. | | 4. macellarius. | 3 |
| 3. griseus. | 502 | 5. megatoma. | |
| 4. pubescens. | | 6. pellio. | |
| 5. marginatus. | | 7. vndatus. | |
| 6. melanurus. | | 8. trifasciatus. | |
| 7. hemisphaericus. | | 9. 20 guttatus. | 31 |
| 8. orbiculatus. | 503 | 10. tigrinus. | |
| 9. compressicornis. | | 11. bicolor. | |
| 10. fasciatus. | | 12. vulpinus. | |
| 11. testaceus. | | 13. felinus. | |
| 12. depressus. | | 14. hirticollis. | |
| 106. DASYTES. | | 15. murinus. | 31 |
| 1. ater. | 2. 71 | 16. tessellatus. | |
| 2. scutellaris. | 72 | 17. Lycoperdi. | |
| 3. haemorrhoidalis. | | 18. frontalis. | |
| 4. niger. | | 19. 2 punctatus. | |
| 5. lineatus. | | 20. fimetarius. | 31 |
| 6. flauipes. | | 21. fumatus. | |
| 7. coeruleus. | | 22. tomentosus. | |
| 8. metallicus. | | 23. fuscus. | |
| 9. aeneus. | | 24. adstrictor. | |
| 10. nigricornis. | | 25. futuralis. | 31 |
| | | 25. 6 dentatus. | |

26. lunatus.	I. 317	2. Equifeti.	2. 127
27. vnidentatus.		3. Zofterae.	
28. bidentatus.		4. Feflucae.	
29. nigripes.	318	5. violacea.	
30. obfcurus.		6. dentipes.	
31. testaceus.		7. Nymphaeae.	128
32. fcaber.		8. Sagittariae.	
33. Chinenfis.		9. nigra.	
34. fubterraneus.		10. Lemnae.	
35. Scanicus.		11. clauipes.	
36. limbatus.		12. fasciculata.	129
37. feneftratus.		13. fimplex.	
38. variabilis.	319	14. Menyanthis.	
39. ferra.		15. Hydrochaerides.	
40. cellaris.			
41. crenatus.		66. DORCATOMA.	
42. minutus.		1. Dresdenfe.	I. 330
43. pedicularius.			
44. Vrticae.	320	104. DRYOPS.	
45. brachypterus.		1. femorata.	2. 67
46. 2 pufkulatus.		2. aenea.	
		3. liquida.	68
		4. lineata.	
I 13. DIRCAEA.		5. cyanea.	
1. barbata.	2. 88	6. marginata.	
2. difcolor.	89	7. vittata.	
3. 4guttata.		8. ftriata.	
4. ruficollis.	90	9. rufifrons.	
5. 2 fasciata.			
6. dubia.		41. DRYPTA.	
7. fuluicollis.		1. emarginata.	I. 230
8. variegata.		2. cylindricollis.	231
9. murina.	91		
10. humeralis.		48. DYTISCVS.	
11. micans.		1. latiffimus.	I. 257
		2. limbatus.	258
I 24. DONACIA.		3. marginalis.	
1. craffipes.	2. 126	4. circumflexus.	

5. punctulatus.	I. 259	41. vliginosus.	I. 266
6. immarginatus.		42. paludosus.	
7. Roefelii.		43. irroratus.	
8. atratus.		44. agilis.	
9. costalis.		45. maculatus.	
10. lateralis.	260	46. brunneus.	
11. laeuigatus.		47. erythrocephalus.	267
12. latus.		48. varius.	
13. ruficollis.	261	49. interrogatus.	
14. fulcatus.		50. notatus.	
15. fasciatus.		51. adspersus.	
16. striatus.		52. haemorrhoidalis.	268
17. fuscus.		33. bicolor.	
18. Lanio.	262	54. posticatus.	
19. iecur.		55. planus.	
20. vittatus.		56. depresso.	
21. cinereus.		57. dorsalis.	
22. zonatus.		58. 6pustulatus.	
23. 1 fasciatus.	263	59. palustris.	
24. sticticus.		60. ouatus.	
25. griseus.		61. picipes.	
26. 1 opunctatus.		62. lituratus.	
27. fuliginosus.		63. signatus.	270
28. carbonarius.		64. 12pustulatus.	
29. 2pustulatus.		65. 8pustulatus.	
30. cinctus.	264	66. Halensis.	
31. 2punctatus.		67. granularis.	
32. fenestratus.		68. confluens.	
33. ater.		69. obliquus.	
34. lacustris.		70. fuluus.	271
35. Hybneri.	265	71. impressus.	
36. nitidus.		72. femipunctatus.	
37. stagnalis.		73. crux.	
38. transversalis.		74. arcuatus.	
39. calidus.		75. geminus.	272
40. abbreviatus.		76. lineatus.	

77. inaequalis.	I. 272	14. phosphoreus.	2. 223
78. minutus.		15. ignitus.	
79. pygmaeus.		16. lambens.	224
80. reticulatus.	273	17. fuscipes.	
81. crassicornis.		18. amaculatus.	
82. flavipes.		19. rubiginosus.	
83. pictus.		20. ligneus.	
84. Nigrita.		21. lacunosus.	
85. pusillus.		22. Morio.	225
86. paruulus.		23. laevigatus.	
43. ELAPHRVS.		24. rufus.	
1. vliginosus.	I. 245	25. ferrugineus.	
2. riparius.		26. porcatus.	
3. striatus.		27. fulcatus.	226
4. impressus.	246	28. striatus.	
5. atratus.		29. virens.	
6. flavipes.		30. fulgens.	
7. aquaticus.		31. inaequalis.	
8. semipunctatus.		32. bicornis.	
9. rupestris.		33. bidens.	227
10. guttatus.	247	34. aterrimus.	
130. ELATER.		35. niger.	
1. gigas.	I. 221	36. marmoratus.	
2. flabellicornis.		37. marinus.	228
3. fascicularis.	222	38. puluerulentus.	
4. speciosus.		39. holosericeus.	
5. luridus.		40. fuscus.	
6. tomentosus.		41. tessellatus.	229
7. foveatus.		42. atomarius.	
8. Myops.		43. fasciatus.	
9. oculatus.		44. varius.	
10. luscus.	223	45. lacteus.	230
11. coecus.		46. excavatus.	
12. lineatus.		47. aeneus.	
13. noctiluus.		48. impressus.	
		49. pectinicornis.	231
			50.

50. aeruginosus.	231	86. testaceus.	238
51. furcatus.		87. pennatus.	239
52. futuralis.		88. balteatus.	
53. vittatus.		89. lateralis.	
54. cupreus.		90. elongatus.	
55. cruciatus.	232	91. melanocephalus.	
56. syriacus.		92. vespertinus.	240
57. castaneus.		93. discoideus.	
58. latus.		94. sputator.	
59. liuens.		95. analis.	
60. mesomelas.	233	96. elegans.	
61. denticollis.		97. filum.	
62. linearis.		98. variabilis.	241
63. obscurus.		99. pilosus.	
64. bicolor.	234	100. melancholicus.	
65. puncticollis.		101. longicollis.	
66. flavipes.		102. pallipes.	
67. rufidens.		103. striatus.	
68. castanipes.		104. erythrocephalus.	
69. maculatus.	235	105. rufipes.	242
70. spinicornis.		106. minutus.	
71. haemorrhoidalis.		107. tridentatus.	
72. filiformis.		108. pallens.	
73. 2 lineatus.		109. limbatus.	
74. Alapex.	236	110. riparius.	243
75. tristis.		111. Bructeri.	
76. marginatus.		112. aduena.	
77. thoracicus.		113. nitidulus.	
78. ruficollis.	237	114. pulchellus.	
79. brunneus.		115. angulatus.	
80. fugax.		116. scriptus.	244
81. haematodes.		117. V nigrum.	
82. pyrrhopterus.		118. 2 guttatus.	
83. sanguineus.	238	119. equestris.	
84. ephippium.		120. 2 punctatus.	245
85. praenotus.		121. 2 maculatus.	246

122. melanurus.	2. 245	2. humeralis.	2. 583
123. 3 maculatus.		3. lunata.	
124. 4 maculatus.		4. rufifrons.	
125. vnifasciatus.		5. sanguinicollis.	584
126. 6 guttatus.		18. ERODIVS.	
127. Alni.	246	1. testudinarius.	I. 121
128. puffillus.		2. gibbus.	
129. pygmaeus.		3. planus.	
130. variegatus.		4. muricatus.	
131. 3 fasciatus.		5. minutus.	
132. notatus.	247	87. EROTYLVS.	
133. festiuus.		1. giganteus.	2. 3
134. 2 pustulatus.		2. reticulatus.	
135. 2 notatus.		3. 6 fasciatus.	
136. 4 punctatus.		4. Histrio.	4
137. 4 pustulatus.	248	5. testaceus.	
50. ELOPHORVS.		6. sphacelatus.	
1. aquaticus.	I. 277	7. gibbosus.	
2. nubilus.		8. eleuatus.	
3. elongatus.		9. notatus.	
4. humeralis.	278	10. concatenatus.	5
5. flauipes.		11. 5 punctatus.	
6. crenatus.		12. punctatissimus.	
7. pygmaeus.		13. variegatus.	
8. minimus.		14. 8 maculatus.	
86. ENDOMYCHVS.		15. gemmatus.	
1. marginatus.	I. 504	16. longimanus.	
2. coccineus.	505	17. abdominalis.	
3. cruciatus.		18. vnifasciatus.	6
4. 4 pustulatus.		19. fasciatus.	
5. fasciatus.		20. 4 pustulatus.	
6. Bouistae.		21. Zebra.	
174. ENGIS.		22. alternans.	7
1. fasciata.	2. 582	23. dentatus.	
		24. limbatus.	

- | | | | |
|---------------------|--------|-------------------|-------|
| 25. brunneus. | 2. 7 | 23. EVRVCHORA. | |
| 26. atratus. | 8 | 1. ciliata. | I. 13 |
| 27. rufipennis. | | 35. GALERITA. | |
| 28. tricolor. | | 1. Americana. | I. 21 |
| 29. vndatus. | | 2. attelaboides. | |
| 79. EVMOLPVV. | | 3. hirta. | |
| 1. ignitus. | I. 418 | 4. olens. | 21 |
| 2. nitidus. | | 5. depressa. | |
| 3. Asiaticus. | 419 | 6. plana. | 21 |
| 4. cyaneus. | | 7. Flesus. | |
| 5. pretiosus. | | 8. Bufo. | |
| 6. auratus. | | 9. fasciolata. | |
| 7. compressicornis. | | 86. GALLERVCA. | |
| 8. antennatus. | | 1. 2maculata. | I. 41 |
| 9. splendidus. | 420 | 2. testacea. | 41 |
| 10. sumptuosus. | | 3. pallipes. | |
| 11. glabratus. | | 4. rosea. | |
| 12. modestus. | | 5. fasciata. | |
| 13. metallicus. | | 6. ruficollis. | |
| 14. hirtus. | | 7. littoralis. | |
| 15. dentipes. | | 8. Tranquebarica. | |
| 16. aeneus. | 421 | 9. vnicolor. | |
| 17. nigritus. | | 10. Sumatrae. | 41 |
| 18. nitidulus. | | 11. Cayennensis. | |
| 19. obscurus. | | 12. nigripennis. | |
| 20. Vitis. | 422 | 13. obscura. | |
| 21. atratus. | | 14. Baccharidis. | |
| 22. variabilis. | | 15. rustica. | 41 |
| 23. ruficollis. | | 16. Tanaceti. | |
| 24. femoratus. | | 17. tricolor. | |
| 25. aerugineus. | | 18. marginata. | |
| 26. arenarius. | 423 | 19. pallicornis. | 41 |
| 89. EVMORPHV. | | 20. luteicornis. | |
| 1. immarginatus. | 2. 11 | 21. bicolor. | |
| 2. marginatus. | 12 | 22. analis. | |

3. atripennis.	I. 482	59. Americana.	I. 489
4. cruenta.	483	60. atomaria.	490
5. ferruginea.		61. Gelatinariae.	
6. abdominalis.		62. tenella.	
7. Alni.		63. haemorrhoidalis.	
8. compressicornis.		64. histrionica.	
9. Bassiae.	484	65. varicornis.	491
o. Lawsoniae.		66. famelica.	
1. Absinthii.		67. fasciata.	
2. picea.		68. Caroliniana.	
3. Betulae.		69. equestris.	
4. tricolor.		70. macula.	492
5. sericea.	485	71. roguttata.	
6. 4 maculata.		72. nobilitata.	
7. 6 punctata.		73. 4 fasciata.	
8. impressa.		74. sellata.	
9. discoidea.		75. abbreviata.	493
o. limbata.	486	76. limbata.	
1. cincta.		77. thoracica.	
2. 3 lineata.		78. nitida.	
3. triloba.		79. aequinoctialis.	
4. lineola.		80. albicollis.	
5. Nymphaeae.		81. 4 notata.	
6. Capreae.	487	82. bicolor.	494
7. Auicenniae.		83. humeralis.	
8. ruficanda.		84. lunata.	
9. Vitellinae.		85. collaris.	
o. Lactucae.		86. cyanipennis.	
1. palliata.	488	87. glabrata.	
2. Calmariensis.		88. miniata.	495
3. Morio.		89. quercata.	
4. sanguinea.		90. coniugata.	
5. marginella.		91. Petaurista.	
6. notata.		92. oculata.	496
7. notulata.	489	93. coccinea.	
8. Maura.		94. hectica.	

95. impressa.	I. 496	II. clauiger.	I. 6
96. marginella.		12. hastatus.	
97. flauicollis.	497	13. Enema.	
98. obsoleta.		14. Pan.	
99. Erucae.		15. bilobus.	
100. cyanea.		16. Croesus.	
101. pallens.		17. Daedalus.	
102. 2 guttata.		18. truncatus.	
103. 4 guttata.		19. Zoilus.	
104. liturata.	498	20. Actaeon.	
104. trifasciata.		21. Simson.	
106. geminata.		22. Elephas.	
107. restituta.		23. Boas.	
108. oleracea.		24. Ianus.	
109. concinna.	499	25. bicornis.	
110. 4 punctata.		26. Orion.	
111. futuralis.		27. bicolor.	
112. obsidiana.		28. Tityus.	II
113. mercurialis.		29. Atlas.	
114. aduena.		30. Caucasus.	
115. filiformis.	500	31. Geryon.	II
116. porrecta.		32. Aloeus.	
117. elongata.		33. Typhon.	II
118. frontalis.		34. Vulcanus.	
2. GEOTRVPES.		35. Semiramis.	
1. Hercules.	I. 2	36. Antaeus.	
2. Alcides.	3	37. Syphax.	
3. Gideon.	4	38. Maimon.	II
4. Oromedon.		39. Titanus.	
5. Centaurus.		40. Aenobarbus.	
6. Ganymedes.	5	41. nasicornis.	
7. Jephtha.		42. sylvanus.	II
8. Aegeon.		43. 4 spinosus.	
9. Chorinaeus.		44. Milon.	
10. dichotomus.	6	45. Ajax.	
		46. Rhinoceros.	

47. Barbaroffa.	1. 15	49. GYRINVS.	
48. Stentor.		1. natator.	I. 274
49. Satyrus.		2. bicolor,	
50. Jamaicensis.	16	3. australis.	275
51. Silenus.		4. Americanus.	
52. Sirichtus.		5. micans.	
53. Hylax.		6. praemorsus.	
54. Aries.	17	7. hastatus.	
55. Monodon.		8. spinosus.	
56. coronatus.		9. striatus.	
57. Dionysius.		10. minutus.	276
58. Meliboeus.		11. nitidulus.	
59. Didymus.		12. strigosus.	
60. valgus.	18	13. rufipes.	
61. depressus.		14. villosus.	
62. hircus.		82. HELODES.	
63. punctatus.		1. Phellandrii.	I. 469
64. farctus.	19	2. campestris.	470
65. retusus.		3. violacea.	
66. piceus.		4. elongata.	
67. excavatus.		5. porcata.	
68. dentatus.	20	29. HELOPS.	
69. Talpa.		1. coeruleus.	I. 156
70. caniculus.		2. erythrocephalus.	
71. Iuencus.		3. metallicus.	157
72. veter.	21	4. aeneus.	
73. laborator.		5. violaceus.	
74. morator.		6. lanipes.	
75. arator.		7. micans.	
76. globator.		8. marginatus.	
40. GNOMA.		9. 4 pustulatus.	
1. longicollis.	2. 315	10. excavatus.	158
2. cylindricollis.	316	11. variegatus.	
3. clauipes,		12. morbillosus.	
4. rugicollis.		13. cyanipes.	

- | | | | |
|----------------------|--------|----------------------|------|
| 14. aeruginosus. | I. 158 | 74. HETERO CERVS, | |
| 15. cyanicol is. | | 1. marginatus. | I. 3 |
| 16. abdominalis. | 159 | 2. dubius. | 3 |
| 17. bicolor. | | 3. laeuigatus. | |
| 18. haemorrhoidalis. | | 8. HEXODON. | |
| 19. calcaratus. | | 1. reticulatum. | I. |
| 20. viridis. | | 2. vnicolor. | |
| 21. Dama. | | 102. HISPA. | |
| 22. luridus. | | 1. faltatrix. | 2. |
| 23. fasciculatus. | 160 | 2. spinosa. | |
| 24. laeuis. | | 3. atra. | |
| 25. equestris. | | 4. Erinaceus. | |
| 26. Morio. | | 5. testacea. | |
| 27. Nigrita. | | 6. 2pustulata. | |
| 28. dentatus. | | 7. 4pustulata. | |
| 29. finuatus. | | 8. spinipes. | |
| 30. punctatus. | | 9. fanguinicollis. | |
| 31. caprarius. | 161 | 10. Morio. | |
| 32. picicornis. | | 11. haemorrhoidalis. | |
| 33. rufipes. | | 12. quadrata. | |
| 34. longipes. | | 13. ferrata. | |
| 35. Capensis. | | 14. thoracica. | |
| 36. striatus. | | 15. humeralis. | |
| 37. ater. | | 16. dentata. | |
| 38. planus. | 162 | 17. Maura. | |
| 39. Pimelia. | | 18. truncata. | |
| 40. obliquatus. | | 19. angulata. | |
| 41. Hottentotta. | | 20. hastata. | |
| 42. dentipes. | | 21. emarginata. | |
| 43. spinipes. | | 22. eleuata. | |
| 44. vndatus. | | 23. carinata. | |
| 45. Aethiops. | | 24. ruficollis. | |
| 46. quisquilius. | 163 | 25. plicatula. | |
| 47. ruficollis. | | 26. futuralis. | |
| 48. cyaneus. | | 27. ferraticornis. | |

28. compressicornis.	2.	64	25. aeneus.	I.	88
29. bidens.			26. metallicus.		89
30. nigricornis.			27. 4guttatus.		
31. vittata.			28. detritus.		
32. fulcata.		65	29. abbreviatus.		
33. rotundata.			30. pygmaeus.		
34. gibba.			31. fulcatus.		
35. integra.			32. striatus.		90
36. cyanipennis.			33. rotundatus.		
37. metallica.		66	34. minutus.		
HISTER.			35. fulvicornis.		
1. maior.	I.	83	36. planus.		
2. inaequalis.		84	37. compressus.		91
3. unicolor.			38. corticalis.		
4. bis 6striatus.			39. 4dentatus.		
5. 12striatus.		85	40. maxillofus.		
6. impressus.			41. oblongus.		92
7. nitidulus.			42. picipes.		
8. angulatus.			43. caesus.		
9. glabratus.			III. HORIA.		
10. semipunctatus.			1. maculata.	2.	85
11. acuminatus.		86	2. testacea.		86
12. scaber.			3. maxillosa.		
13. cyaneus.			47. HYDRACHNA.		
14. bicolor.			1. Hermannii.	I.	255
15. brunneus.			2. gibba.		256
16. lunatus.			3. ovalis.		
17. sinuatus.		87.	4. scripta.		257
18. purpurascens.			46. HYDROPHILVS.		
19. cruciatus.			1. piceus.	I.	249
20. 2pustulatus.			2. ater.		250
21. pulchellus.		88	3. oliuaceus.		
22. erythropterus.			4. caraboides.		
23. 2maculatus.			5. ellipticus.		251
24. 4maculatus.			6. lateralis.		
			Tt 2		7. ab-

- | | | | |
|----------------------|--------|---------------------|--------|
| 7. abbreviatus. | I. 251 | 11. fasciatus. | 2. 392 |
| 8. rufipes. | | 12. gibbus. | |
| 9. scarabaeoides. | | 13. futuralis. | |
| 10. picipes. | | 14. testaceus. | 393 |
| 11. orbicularis. | 252 | 15. niger. | |
| 12. subrotundus. | | 16. brevipēs. | |
| 13. bicolor. | | 17. chloropus. | |
| 14. collaris. | | 18. pubescens. | 394 |
| 15. testaceus. | | 19. ater. | |
| 16. vndatus. | | 20. voluulus. | |
| 17. erythrocephalus. | | 21. melanocephalus. | |
| 18. haemorrhoidalis. | | 22. flauus. | |
| 19. marginellus. | | 23. oleiperda. | |
| 20. attenuatus. | 253 | 24. Oleae. | 395 |
| 21. obscurus. | | 25. pygmaeus. | |
| 22. luridus. | | 26. vittatus. | |
| 23. melanocephalus. | | 27. minutus. | |
| 24. griseus. | | 28. minimus. | |
| 25. striatulus. | 254 | 29. obscurus. | |
| 26. 2 punctatus. | | 30. canaliculatus. | |
| 27. minutus. | | | |
| 28. pygmaeus. | | 165. HYPOPHLOEVS. | |
| 29. nigriceps. | | 1. rufipes. | 2. 558 |
| 30. truncatellus. | 255 | 2. Boros. | |
| | | 3. castaneus. | |
| | | 4. linearis. | 559 |
| | | 5. fasciatus. | |
| | | 6. depressus. | |
| | | 7. bicolor. | |
| | | 8. bicornis. | 560 |
| | | | |
| 152. HYLESINVS. | | 72. IMATIDIVM. | |
| 1. Scolytus. | 2. 390 | 1. 3 fasciatum. | I. 345 |
| 2. crenatus. | | 2. fasciatum. | 346 |
| 3. Fraxini. | | 3. thoracicum. | |
| 4. varius. | 391 | 4. lineola. | |
| 5. ligniperda. | | 5. fanguineum. | |
| 6. abietinus. | | | |
| 7. villosus. | | | |
| 8. maculatus. | | | |
| 9. piniperda. | 392 | | |
| 10. aeneipennis. | | | |

72. *IPS.*

1. guttata.	2. 577
2. grandis.	
3. abbreviata.	
4. finuata.	
5. collaris.	578
6. nigricornis.	
7. 2 punctata.	
8. 2 pustulata.	
9. fasciata.	
10. dorsalis.	579
11. 4 pustulata.	
12. 4 notata.	
13. punctata.	
14. 2 fasciata.	
15. 6 pustulata.	580
16. 4 guttata.	
17. ferruginea.	
18. haemorrhoidalis.	
19. pallida.	

05. *LAGRIA.*

1. tuberculata.	2. 69
2. viridipennis.	
3. villosa.	
4. marginata.	
5. rugosa.	
6. pubescens.	70
7. lata.	
8. hirta.	
9. tomentosa.	
10. obscura.	
11. tristis.	
12. nitidula.	71
13. lugubris.	
14. liuida.	

136. *LAMIA.*

1. gigas.	2. 281
2. tribulus.	
3. fronticornis.	
4. pedicornis.	282
5. Hiftrip.	
6. crista.	
7. marmorata.	
8. ambulator.	
9. spinipes.	
10. rubus.	283
11. 8 maculata.	
12. spinicornis.	
13. lineator.	
14. lactator.	
15. globifera.	284
16. scabrator.	
17. gladiator.	
18. Sehestedtii.	
19. fuscator.	
20. barbicornis.	
21. tridentata.	
22. textor.	285
23. vaginator.	
24. crucifera.	
25. pulchra.	
26. regalis.	286
27. imperialis.	
28. vndata.	
29. irrorata.	
30. nigricornis.	
31. bifidator.	
32. aedilis.	287
33. ocellator.	
34. atomaria.	
35. varia.	288
	36.

36. antennator.	2. 288	72. reticulator.	2. 295
37. araneiformis.		73. scalator.	
38. punctata.		74. molator.	
39. nodosa.	289	75. titillator.	
40. cancriformis.		76. vittator.	
41. tuberculata.		77. oculator.	
42. horrida.		78. Capensis.	296
43. Scorpio.		79. Hottentotta.	
44. decorator.		80. 2cincta.	
45. mixta.	290	81. ferrugator.	
46. obscura.		82. humeralis.	
47. glauca.		83. 5fasciata.	297
48. bidentata.		84. 3fasciata.	
49. scabra.		85. 2fasciata.	
50. compressa.		86. nobilis.	
51. clauator.	291	87. Aethiops.	
52. praemorfa.		88. variegator.	
53. inaequalis.		89. curculionoides.	
54. obscurator.		90. lusca.	298
55. spinifera.	292	91. notata.	
56. grifator.		92. lugubris.	
57. cylindrator.		93. tristis.	
58. 2spinator.		94. funesta.	
59. aedificator.		95. punctator.	
60. amputator.	293	96. crispa.	299
61. sternator.		97. fasciculata.	
62. spinator.		98. rotator.	
63. gutturator.		99. Glycyrrhizae.	
64. nebulosa.		100. cruciata.	
65. inermis.		101. fulginator.	
66. repandator.	294	102. cineraria.	300
67. variolator.		103. carinata.	
68. futor.		104. annulata.	
69. fartor.		105. coquus.	
70. dentator.		106. rufpator.	
71. ruficator.		107. tornator.	301

108. Bankii.	2. 301	14. hectica.	2. 102
109. saltator.		15. nitidula.	
110. stigma.		16. phosphorea.	
111. varia.		17. Iaponica.	
112. Histrion.	302	18. compressicornis.	103
113. villosa.		19. pallens.	
114. testator.		20. striata.	
115. pedestris.		21. Capensis.	
116. rufipes.		22. vespertina.	
117. Morio.		23. australis.	
118. lineata.	303	24. thoracica.	
119. vittigera.		25. planicornis.	
120. molitor.		26. Italica.	
121. tuberculator.		27. Cayennensis.	105
122. obliquator.		28. vittata.	
123. nutator.	304	29. versicolor.	
124. bidens.		30. Mauritanica.	
125. Cantator.		31. erythrocephala.	
126. Solandri.		32. plumosa.	
127. cornutor.		33. hemiptera.	106
128. leprosa.		34. maculata.	
		35. lateralis.	
18. LAMPYRIS.		36. flabellata.	
1. noctiluca.	2. 99	37. guttata.	107
2. splendidula.		38. flabellicornis.	
3. corrusca.		39. hespera.	
4. analis.	100	40. ignita.	
5. obscura.			
6. bicolor.		83. LEMA.	
7. laticornis.		1. 4pustulata.	1. 471
8. pyralis.	101	2. impressa.	
9. cincta.		3. 1punctata.	
10. marginata.		4. semipunctata.	472
11. pectinata.		5. armata.	
12. lucida.		6. cyanipennis.	
13. guttula.		7. praeusta.	
			8. al-

8. albicornis.	I. 472	5. maculicornis.	2. 35
9. merdigera.		6. melanura.	
10. retufa.	473	7. laevis.	
11. brunnea.		8. liuida.	
12. 12 punctata.		9. strigilata.	
13. Tranquebarica.		10. emarginata.	39
14. 14 punctata.		11. fanguinolenta.	
15. ruficollis.	474	12. cincta.	
16. melanura.		13. meridiana.	
17. Asparagi.		14. thoracica.	
18. atrata.		15. Canadensis.	35
19. nigricornis.		16. villica.	
20. 5 punctata.	475	17. rubra.	
21. Coromandeliana.		18. testacea.	
22. Solani.		19. pubescens.	35
23. cyanella.		20. virens.	
24. cornuta.		21. smaragdula.	
25. cyanea.		22. holofericea.	
26. bicolor.	476	23. rufipes.	35
27. melanops.		24. atra.	
28. vnifasciata.		25. humeralis.	
29. 2 fasciata.		26. fugax.	
30. nigripes.		27. exclamationis.	†
31. obscura.		28. futuralis.	
32. vittata.	477	29. scutellata.	
33. cuprea.		30. Chamomillae.	
34. nitidula.		31. lurida.	
35. striata.		32. femorata.	36
36. varia.	478	33. ruficornis.	
37. posticata.		34. marginata.	
		35. lunata.	
I 44. LEPTVRA.		36. nigra.	
1. vnipunctata.	2. 354	37. praeusta.	
2. hastata.		38. 4 guttata.	36
3. 2 punctata.		39. rostrata.	
4. tomentosa.		40. luteicornis.	

41. 4 maculata.	2. 361	2. puluerulentus.	2. 499
42. lamed.		3. elegans.	
43. 4 pustulata.		4. anguinus.	
44. 8 maculata.		5. striatellus.	500
45. interrogationis.	262	6. Umbellatarnm.	
46. marginella.		7. mucronatus.	
47. 6 maculata.		8. ferrugatus.	
48. 7 punctata.		9. gages.	
49. 12 maculata.		10. 8 lineatus.	
50. attenuata.		11. femipunctatus:	
51. annularis.	363	12. 4 pustulatus.	501
52. 12 guttata.		13. mixtus.	
53. calcarata.		14. melanocephalus.	
54. subspinosa.		15. filiformis.	
55. sinuata.		16. cylindricus.	
56. 4 fasciata.	364	17. notatus.	
57. aurulenta.		18. barbirostris.	
58. zebrata.		19. amphora.	502
59. dubia.		20. angustatus.	
60. connexa.		21. Pica.	
61. 6 guttata.		22. Bardanae.	
62. 3 fasciata.	365	23. truncatulus.	
63. reticulata.		24. voluulus.	
64. fericea.		25. algirus.	503
65. Morio.		26. Afcanii.	
66. collaris.	366	27. alboftriatus.	
67. virginea.		28. lineola.	
68. holofericea.		29. clauipes.	
69. tenuicollis.		30. crassipes.	504
70. cylindricollis.		31. Atriplicis.	
71. attelaboides.		32. Lymexylon.	
LETHRVS.		33. caliginofus.	
1. cephalotes.	1. 1	34. dubius.	
2. aeneus.	2	35. roreus.	505
51. LIXVS.		36. brunneus.	
1. paraplecticus.	2. 498	37. reticulatus.	

- | | | | |
|-----------------------|--------|----------------------|-------|
| 38. trilobus. | 2. 505 | 3. rostratus. | 2. II |
| 39. acutus. | | 4. marginatus. | |
| 40. attenuatus. | 506 | 5. proboscideus. | II |
| 41. Antilope. | | 6. ferraticornis. | |
| 42. Gazella. | | 7. dimidiatus. | |
| 43. elongatus. | 507 | 8. fasciatus. | |
| 131. LVCANVS. | | 9. reticulatus. | |
| 1. Alces. | 2. 248 | 10. humeralis. | |
| 2. Giraffa. | | 11. ferratus. | II |
| 3. Coruus. | | 12. inaequalis. | |
| 4. Elaphus. | 249 | 13. ferrugineus. | |
| 5. Capreolus. | | 14. praeustus. | |
| 6. Dama. | | 15. tricolor. | |
| 7. femoratus. | | 16. bicolor. | II |
| 8. Bifon. | 250 | 17. atratus. | |
| 9. Gazella. | | 18. haemorrhoidalis. | |
| 10. Lama. | | 19. cinctus. | |
| 11. futuralis. | | 20. rufipennis. | II |
| 12. Saga. | | 21. linearis. | |
| 13. Taurus. | | 22. cruentus. | |
| 14. acuminatus. | 251 | 23. galeatus. | |
| 15. Barbaroffa. | | 24. cristatus. | |
| 16. parallelepipedus. | | 25. limbatus. | II |
| 17. inermis. | | 26. compressus. | |
| 18. cancroides. | 252 | 27. diaphanus. | |
| 19. lunatus. | | 28. discoideus. | |
| 20. piceus. | | 29. sanguineus. | II |
| 21. tenebroides. | | 30. aurora. | |
| 22. striatus. | 253 | 31. nigripes. | |
| 23. caraboides. | | 32. flabellicornis. | |
| 24. rufipes. | | 33. pectinatus. | II |
| 25. punctatus. | | 34. minutus. | |
| 121. LYCVS. | | 35. laeuigatus. | |
| 1. latissimus. | 2. 110 | 36. ruficollis. | |
| 2. palliatus. | | 37. thoracicus. | |
| | | 38. marginellus. | II |

66. LYCTVS.		10. 2pustulata.	2. 78
1. politus.	2. 560	11. rufa.	
2. depressus.		12. Afzeliana.	
3. nitidulus.		13. ruficollis.	
4. 2pustulatus.	561	14. testacea.	79
5. dentatus.		15. festiua.	
6. brunneus.		16. marginata.	
7. terebrans.		17. lemniscata.	
8. Iuglandis.		18. vittata.	
9. histeroides.		19. atrata.	
10. crenatus.		20. cinerea.	80
11. rufipennis.	562	21. erythrocephala.	
12. obscurus.		22. oculata.	
13. canaliculatus.		23. dubia.	
14. haematodes.		24. Afra.	
15. nitidus.		25. crassicornis.	
16. contractus.		26. haemorrhoidalis.	81
108. LYMEXYLON.		59. MALACHIVS.	
1. dermestoides.	2. 87	1. pulcher.	1. 305
2. abbreviatum.		2. laetus.	
3. proboscideum.		3. aeneus.	306
4. nauale.	88	4. 2pustulatus.	
5. flavipes.		5. rufus.	
6. Morio.		6. marginellus.	307
109. LYTTA.		7. elegans.	
1. vesicatoria.	2. 76	8. viridis.	
2. segetum.		9. sanguinolentus.	
3. nitidula.		10. ruficollis.	
4. collaris.	77	11. 4maculatus.	308
5. Gigas.		12. viridipennis.	
6. villosa.		13. cyaneus.	
7. coccinea.		14. thoracicus.	
8. Syriaca.		15. angulatus.	
9. melanocephala.		16. abdominalis.	
		17. praeustus.	
		18.	

- | | | | |
|--------------------|--------|---------------------|------|
| 18. pedicularius. | I. 308 | 127. MELOLONTHA. | |
| 19. pulcarius. | | 1. stigma. | 2. I |
| 20. fasciatus. | 309 | 2. alba. | |
| 21. limbatus. | | 3. Fullo. | |
| 22. equestris. | | 4. rorida. | I |
| 23. flauipes. | | 5. ferrata. | |
| 24. albifrons. | 310 | 6. vulgaris. | |
| 25. rufipes. | | 7. Hippocastani. | I |
| 26. labiatus. | | 8. villosa. | |
| 27. concolor. | | 9. pilosa. | |
| 28. nitidulus. | | 10. occidentalis. | I |
| 32. MANTICORA. | | 11. feruida. | |
| 1. maxillofa. | I. 167 | 12. transuersa. | |
| 2. pallida. | | 13. reflexa. | |
| 145. MEGALOPVS. | | 14. Alopec. | |
| 1. ruficornis. | 2. 367 | 15. tomentosa. | |
| 2. nigricornis. | 368 | 16. solstitialis. | I |
| 30. MELANDRYA. | | 17. bidens. | |
| 1. ferrata. | I. 163 | 18. candida. | |
| 2. canaliculata. | 164 | 19. atra. | |
| 3. barbata. | 165 | 20. aequinoctialis. | |
| 4. repanda. | | 21. Pini. | I |
| 67. MELASIS. | | 22. 2 maculata. | |
| 1. flabellicornis. | I. 331 | 23. Atriplicis. | |
| 2. myftacina. | | 24. oblonga. | |
| 177. MELOE. | | 25. ruficornis. | |
| 1. profcarabaeus. | 2. 587 | 26. lanigera. | |
| 2. laeuigata. | | 27. longicornis. | I |
| 3. macalis. | 588 | 28. punctata. | |
| 4. limbata. | | 29. viridis. | |
| 5. marginata. | | 30. aenea. | |
| 6. punctata. | | 31. futuralis. | |
| 7. breuicollis. | | 32. bicolor. | |
| 8. cyanea. | 589 | 33. geminata. | |
| | | 34. barbata. | I |
| | | 35. Morio. | |

36. castanea.	2. 167	72. ferratulae.	2. 173
37. rufipennis.		73. fastuosa.	
38. elata.		74. errans,	
39. dorsalis.	168	75. varians.	
40. glacialis.		76. vmbrosa.	
41. lurida.		77. rupicola.	
42. striata.		78. innuba.	
43. triftis.		79. elongata.	174
44. testacea.		80. rauca.	
45. hirticollis.		81. ferruginea,	
46. pallida.		82. moerens.	
47. ruficollis.	169	83. splendida.	
48. quadridens.		84. aulicola,	
49. variolosa.		85. lucicola.	
50. lunata.		86. atrata.	
51. signata.		87. arboricola.	
52. marginata.		88. horticola.	175
53. cyanocephala.		89. nitidula.	
54. brunnea.	170	90. abdominalis,	
55. melanocephala.		91. floricola.	
56. ferruginea.		92. aruicola.	176
57. pallens.		93. praticola.	
58. erythrocephala.		94. fruticola.	
59. tridentata.		95. agricola.	
60. mixta.	171	96. lineata.	
61. obscura.		97. ruricola.	
62. rufa.		98. atomaria.	177
63. festiua.		99. farinosa.	
64. laeta.		100. squamosa.	
65. holosericea.		101. 2 lineata.	178
66. Iulii.		102. regia,	
67. nigrita.	172	103. glabrata.	
68. Frifhii.		104. ridens.	
69. Vitis.		105. argentea.	
70. aurata.		106. graminicola.	179
71. Cardui.		107. pygmaea.	

- | | | | | | |
|----------------------|----|-----|----------------------|----|-----|
| 108. chryfomelina. | 2. | 179 | 144. cyanipennis. | 2. | 184 |
| 109. capreola. | | | 145. hirta. | | 185 |
| 110. cincta. | | | 146. vulpes. | | |
| 111. proboscidea. | | | 147. Melis. | | |
| 112. spinipes. | | 180 | 148. Bombylius. | | |
| 113. dentipes. | | | 149. vittata. | | |
| 114. podagrica. | | | | | |
| 115. arthritica. | | | 60. MELYRIS. | | |
| 116. gonagra. | | | 1. abdominalis. | 1. | 316 |
| 117. crassipes. | | | 2. viridis. | | 311 |
| 118. calcarata. | | | 3. bicolor. | | |
| 119. cancroides. | | 181 | 4. nigra. | | |
| 120. marginella. | | | 5. lineata. | | |
| 121. puluerulenta. | | | 147. MOLORCHYS. | | |
| 122. Morio. | | | 1. abbreviatus. | 2. | 374 |
| 123. fyluicola. | | | 2. variegatus. | | 375 |
| 124. subspinosa. | | | 3. dimidiatus. | | |
| 125. longipes. | | | 4. vmbellatarum. | | |
| 126. abbreviata. | | | 123. MORDELLA. | | |
| 127. minuta. | | 182 | 1. aculeata. | 2. | 121 |
| 128. mutabilis. | | | 2. mixta. | | 122 |
| 129. variabilis. | | | 3. fasciata. | | |
| 130. versicolor. | | | 4. hamata. | | |
| 131. splendidula. | | | 5. variegata. | | |
| 132. micans. | | 183 | 6. roguttata. | | 123 |
| 133. picea. | | | 7. pubescens. | | |
| 134. discoidea. | | | 8. 8punctata. | | |
| 135. araneoides. | | | 9. testacea. | | |
| 136. 4lineata. | | | 10. nigripennis. | | |
| 137. gibba. | | | 11. 2maculata. | | |
| 138. monticola. | | 184 | 12. atomaria. | | |
| 139. humeralis. | | | 13. scutellaris. | | |
| 140. vrfus. | | | 14. vittata. | | 124 |
| 141. bombylifformis. | | | 15. haemorrhoidalis. | | |
| 142. Lynx. | | | 16. 2fasciata. | | |
| 143. crinita. | | | 17. ferruginea. | | |

18. brunnea.	2. 125	24. nigricornis.	2. 569
19. ventralis.		25. castaneus.	
20. abdominalis.		26. Populi.	570
21. humeralis.		27. metallicus.	
22. marmorata.		28. testaceus.	
23. lateralis.			
24. frontalis.			
25. atra.	126		
26. thoracica.			
27. ruficollis.			
28. flava.			
68. MYCETOPHAGVS.		110. MYLABRIS.	
1. fasciatus.	2. 565	1. fasciata.	2. 81
2. 4maculatus.		2. Cichorei.	
3. ellipticus.	566	3. 3fasciata.	
4. Ianus.		4. lunata.	
5. bicolor.		5. praeusta.	
6. 2pustulatus.		6. marginata.	
7. maculatus.		7. Algirica.	
8. rufipes.	567	8. Capensis.	83
9. fasciatus.		9. Hermanniae.	
10. varius.		10. Sidae.	
11. flauipes.		11. Lauaterae.	
12. glabratus.		12. atrata.	
13. dermestoides.	568	13. punctum.	84
14. atomarius.		14. 10punctata.	
15. Nigrita.		15. 4punctata.	
16. multipunctatus.		16. 6maculata.	
17. 10punctatus.		17. flauicornis.	
18. picicornis.		18. geminata.	
19. lunaris.		19. ruficornis.	
20. sinuatus.	569	20. 3maculata.	85
21. flauicollis.		21. minuta.	
22. piceus.		22. argentata.	
23. humeralis.			
		69. NECROPHORVS.	
		1. Germanicus.	1. 333
		2. humator.	334
		3. grandis.	
		4. mediatu.	
		5. velutinus.	
		6. marginatus.	

7. Vespillo.		I. 335	73. NITIDVLA.	
8. mortuorum.			1. grossa.	I. 34
I 46. NECYDALIS.			2. 2 pustulata.	
1. thalassina.		2. 368	3. 4 pustulata.	34
2. viridissima.		369	4. obscura.	
3. coerulescens.			5. abbreviata.	
4. virescens.			6. marginata.	
5. cyanea.			7. aestiva.	
6. notoxoides.			8. pallida.	34
7. sanguinicollis.		370	9. obsoleta.	
8. thoracica.			10. ferruginea.	
9. barbara.			11. cornuta.	
10. seladonia.			12. strigata.	34
11. ruficollis.			13. imperialis.	
12. melanocephala.			14. 10 guttata.	
13. triftis.			15. varia.	
14. atra.		371	16. fordida.	34
15. humeralis.			17. punctata.	
16. vstulata.			18. flexuosa.	
17. melanura.			19. bicolor.	
18. notata.			20. Colon.	
19. marginella.			21. limbata.	34
20. fulvicollis.		372	22. haemorrhoidalis.	
21. longipes.			23. discoidea.	
22. rufa.			24. pedicularia.	
23. praeusta.			25. 6 pustulata.	
24. margaritacea.			26. fasciata.	34
25. coerulea.			27. litura.	
26. Podagrariae.		373	28. aenea.	
27. bicolor.			29. viridescens.	
28. clauipes.			30. hemiptera.	
29. testacea.			31. humeralis.	34
30. marginata.			32. rupta.	
31. glaucescens.			33. quadrata.	
32. simplex.		374	34. cadauerina.	
33. Quercus.			35. macroptera.	34

36. dimidiata.	I. 354	2. fuscum.	I. 115
37. truncata.		3. obscurum.	116
38. rufipes.	355	4. porcatum.	
9. NOTOXVS.		5. fabulosum.	
1. porcatus.	I. 287	6. gibbum.	
2. violaceus.		7. depresso.	
3. mollis.		8. laeuigatum.	117
4. Indicus.	288	9. crenatum.	
5. Chinenfis.		10. glabratum.	
10. ODACANTHA.		11. arenarium.	
1. melanura.	I. 229	12. pictum.	
2. 2 fasciata.		13. oblongum.	
3. cyanocephala.		14. clathratum.	118
4. 3 pustulata.		15. planum.	
5. elongata.		16. simplex.	
6. dorsalis.		17. granulatum.	
19. OMALYSVS.		18. subterraneum.	
1. futuralis.	2. 108	19. ferrugineum.	
ONITIS.		20. orientale.	119
1. Inuus.	I. 26	21. tibiale.	
2. Aygulus.	27	22. strigatum.	
3. Lophus.		23. hispidum.	
4. Clinius.		24. sericeum.	120
5. Vandelli.	28	25. ouatum.	
6. Apelles.		26. canaliculatus.	
7. Bifon.		27. minutum.	121
8. Iafius.		28. pufillum.	
9. Sphinx.	29	180. OXYPORVS.	
10. Belial.		1. rufus.	2. 604
11. vnguiculatus.		2. maxillofus.	605
12. Nicanor.		3. lunulatus.	
13. Menalcas.	30	4. subterraneus.	
14. Philemon.		5. cellaris.	
7. OPATRVV.		6. marginatus.	
1. grifeum.	I. 115	7. 3 maculatus.	

- | | | | |
|-----------------------------|--------|---------------------------|--------|
| 8. <i>maculatus</i> . | 2. 606 | 2. <i>emarginatus</i> . | 2. 255 |
| 9. <i>pustulatus</i> . | | 3. <i>cornutus</i> . | 256 |
| 10. <i>analis</i> . | | 4. <i>barbatus</i> . | |
| 11. <i>thoracicus</i> . | | 5. <i>dentatus</i> . | |
| 12. <i>pygmaeus</i> . | | 6. <i>bicolor</i> . | |
| 13. <i>flauipes</i> . | | 7. <i>minutus</i> . | 257 |
| 14. <i>chrysomelinus</i> . | | 108. <i>PAVSVS</i> . | |
| 15. <i>dimidiatus</i> . | 607 | 1. <i>microcephalus</i> . | 2. 75 |
| 16. <i>melanocephalus</i> . | | 2. <i>lineatus</i> . | |
| 17. <i>abdominalis</i> . | | 3. <i>ruficollis</i> , | |
| 18. <i>testaceus</i> . | | 4. <i>flauicornis</i> . | |
| 19. <i>brunneus</i> . | | 71. <i>PELTIS</i> . | |
| 20. <i>minutus</i> . | | 1. <i>grossa</i> . | I. 343 |
| 21. <i>rufipes</i> . | | 2. <i>ferruginea</i> . | 344 |
| 22. <i>hypnorum</i> . | | 3. <i>oblonga</i> . | |
| 23. <i>marginellus</i> . | | 4. <i>limbata</i> . | |
| 181. <i>PAEDERVS</i> . | | 22. <i>PIMELIA</i> . | |
| 1. <i>riparius</i> . | 2. 608 | 1. <i>friata</i> . | I. 128 |
| 2. <i>ruficollis</i> . | | 2. <i>unicolor</i> . | |
| 3. <i>elongatus</i> . | 609 | 3. <i>flauicollis</i> . | |
| 4. <i>fulvipennis</i> . | | 4. <i>gibba</i> . | |
| 5. <i>brunnipes</i> . | | 5. <i>laeuigata</i> . | 129 |
| 6. <i>fulgidus</i> . | | 6. <i>globosa</i> . | |
| 7. <i>tricolor</i> . | | 7. <i>glabrata</i> . | |
| 8. <i>filiformis</i> . | | 8. <i>hispida</i> . | |
| 9. <i>orbiculatus</i> . | | 9. <i>longipes</i> . | |
| 10. <i>melanocephalus</i> . | 610 | 10. <i>rustica</i> . | |
| 68. <i>PARNVS</i> . | | 11. <i>muricata</i> . | |
| 1. <i>prolificornis</i> . | I. 332 | 12. <i>tuberculata</i> . | 130 |
| 2. <i>acuminatus</i> . | | 13. <i>morbillofa</i> . | |
| 3. <i>obscurus</i> . | | 14. <i>2punctata</i> . | |
| 133. <i>PASSALVS</i> . | | 15. <i>scabra</i> . | |
| 1. <i>interruptus</i> . | 2. 255 | 16. <i>grossa</i> . | |
| | | 17. <i>angulata</i> . | 131 |
| | | 18. <i>echinata</i> . | |
| | | 19. | |

19. dentipes.	I. 131	9. mucronatus.	2. 259
20. dentata.		10. arcuatus.	
21. crenata.		11. maculatus.	
22. porcata.		12. ceruicornis.	
23. maculata.		13. buphthalmus.	260
24. ferrata.	132	14. forficatus.	
25. minuta.		15. breuicornis.	
26. gemmata.		16. coriarius.	
27. canaliculata.		17. giganteus.	261
28. costata.		18. cylindricus.	
29. rugosa.		19. armillatus.	
30. variolaris.	133	20. Luzonum.	
31. pygmaea.		21. ferripes.	
5. PLATYNOTVS.		22. mandibularis.	
1. reticulatus.	I. 138	23. damicornis.	262
2. excavatus.		24. 2fasciatus.	
3. crenatus.	139	25. Thomae.	
4. dilatatus.		26. 2lineatus.	
5. variolosus.		27. Amazonus.	
6. laeuigatus.		28. spinibarbis.	263
7. vndatus.		29. palmatus.	
8. ferratus.	140	30. dentatus.	
9. rugosus.		31. maxillofus.	264
10. dentipes.		32. canaliculatus.	
11. morbillofus.		33. cinnamomeus.	
12. granulatus.		34. melanopus.	
14. PRIONVS.		35. crenatus.	
1. fuliginosus.	2. 257	36. spinofus.	265
2. rostratus.		37. barbatus.	
3. lineatus.		38. pectinicornis.	
4. nitidus.	258	39. muticus.	
5. Faber.		57. Psoa.	
6. scabricornis.		1. Viennensis.	I. 293
7. depfarius.		2. Americana.	294
8. pallens.	259		

65. **PTILINVS.**
 1. myftacinus. I. 328
 2. pectinicornis. 329
 3. flauescens.
 4. pectinatus.
 5. ferratus. 330
63. **PTINVS.**
 1. pubescens. I. 324
 2. germanus.
 3. rufipes. 325
 4. longicornis.
 5. elegans.
 6. fur.
 7. imperialis. 326
 8. crenatus.
 9. Latro.
 10. denticornis.
 11. ferricornis.
 12. spinicornis. 327
 13. fulcatus.
 14. Scotias.
120. **PYROCHROA.**
 1. coccinea. 2. 108
 2. rubens. 109
 3. flabellata.
 4. pectinicornis.
 5. 10 maculata.
115. **PYTHO.**
 1. coeruleus. 2. 95
 2. feftiuus. 96
 3. caftaneus.
139. **RHAGIVM.**
 1. mordax. 313
 2. inquirer.
3. indagator. 2. 313
 4. cursor. 314
 5. cinctum.
 6. Salicis.
 7. noctis.
 8. bifasciatum.
 9. clathratum. 315
 10. ornatum.
 11. minutum.
157. **RHINOMACER.**
 1. varius. 2. 428
 2. curculionoides.
 3. attelaboides.
 4. lepturoides. 429
122. **RHIPIPHORVS.**
 1. subdipterus. 2. 118
 2. ferrugineus.
 3. nafutus.
 4. spinofus. 119
 5. pectinatus.
 6. paradoxus.
 7. flabellatus.
 8. humeratus.
 9. triftis.
 10. nigricornis.
 11. punctatus. 120
 12. 6 maculatus.
 13. ventralis.
 14. lituratus.
 15. 2 maculatus.
 16. dimidiatus.
 17. 2 punctatus.
 18. tarfatus.
 19. limbatus. 121
 20. populneus.

59. RHYNCHAENVS.		36. 4 vittatus.	2. 445
1. striatus.	2. 439	37. festiuus.	
2. rubetſa.		38. Tragiae.	446
3. gagates.		39. Chloris.	
4. aeneus.	440	40. curuiroſtris.	
5. mendicus.		41. Aethiops.	
6. Pineti.		42. Rubi.	
7. Pini.		43. Scirpi.	
8. Onopordi.		44. vnca.	447
9. Vrfus.		45 Pruni.	
10. Iaceae.	441	46. Armeniacae.	
11. planus.		47. 5 tuberculatus.	
12. punctulatus.		48. Camelus.	
13. ocularis.		49. 4 tuberculatus.	448
14. Cynarae.		50. teter.	
15. Colon.		51. Chamaeropis.	
16. 2 maculatus.	442	52. Campanulae.	
17. punctum.		53. nigriroſtris.	
18. ferratus.		54. variabilis.	449
19. biguttatus.		55. piciroſtris.	
20. bilineatus.		56. Viſcariae.	
21. fordidus.		57. bifrons.	
22. fuillus.		58. Salicariae.	
23. teſſellatus.	443	59. floralis.	450
24. Equiſeti.		60. Umbellae.	
25. faſciculatus.		61. vulpeculus.	
26. granulatus.		62. Pſeudacori.	
27. dimidiatus.	444	63. ſcanieus.	
28. ſubſpinofus.		64. Caſtor.	451
29. palpebra.		65. pericarpieus.	
30. Bufo.		66. quercicola.	
31. famulus.		67. aſſimilis.	
32. armillatus.		68. Siſymbrii.	452
33. muſculus.	445	69. Capreae.	
34. atriroſtris.		70. 2 punctatus.	
35. brunniroſtris.		71. Carpini.	

72. Eryfimi.	2. 452	108. spinipes.	2. 459
73. testaceus.		109. vana.	
74. amaculatus.	453	110. discoideus.	462
75. vnifasciatus.		111. 4lineatus.	
76. Lythri.		112. bombinus.	
77. vmbraculatus.		113. clauipes.	
78. 2fasciatus.	454	114. testudo.	461
79. acridulus.		115. Chameleon.	
80. subrufus.		116. draco.	
81. scabratus.		117. scorpio.	463
82. alauda.		118. Chimaridis.	
83. dorfalis.		119. guttatus.	
84. Quercus.	455	120. fascicularis.	
85. Tigris.		121. Hystrix.	
86. futuralis.		122. marmoreus.	
87. crux.		123. scaber.	463
88. Lemnae.		124. 3fasciatus.	
89. exclamationis.	456	125. cylindrirostris.	
90. venustus.		126. stigma.	
91. Plantaginis.		127. hebes.	
92. Artemisiae.		128. annulatus.	
93. Rumicis.		129. angulus.	464
94. Pollux.	457	130. Abietis.	
95. calcaratus.		131. erinaceus.	
96. bidens.		132. carinatus.	
97. Taurus.		133. 6tuberculatus.	465
98. cornutus.		134. verruca.	
99. miliaris.		135. dentipes.	
100. cyanicollis.	458	136. multiguttatus.	
101. Iamaicensis.		137. pupillator.	466
102. vaginalis.		138. Nero.	
103. validus.		139. porcatus.	
104. vespertilio.		140. Lapathi.	
105. coronatus.	459	141. abdominalis.	467
106. mucoreus.		142. argula.	
107. pufio.		143. irroratus.	

144. porculus.	2. 467	180. germanus.	2. 475
145. pilipes.	468	181. zspinofus.	
146. statua.		182. sanctus.	476
147. tricinctus.		183. diaphanus.	
148. 7tuberculatus.		184. phlesus.	
149. coecus.	469	185. pleuronectes.	477
150. coluber.		186. planulus.	
151. aspis.		187. lamella.	
152. cerastes.		188. temporarius.	478,
153. haemorrhous.	470	189. Pipa.	
154. 6guttatus.		190. vlula.	
155. luridus.		191. Scrophulariae.	
156. stolidus.		192. Thapsus.	479
157. mixtus.		193. Verbasci.	
158. frigidus.		194. moestus.	
159. pictus.	471	195. Blattariae.	
160. pilosus.		196. olens.	480
161. alienatus.		197. caprimulgus.	
162. Fabricii.		198. foetidus.	
163. gibbus.		199. Solani.	
164. globosus.		200. Smidtii.	
165. ebenus.	472	201. chiragra.	481
166. calidus.		202. Aesopus.	
167. flavicornis.		203. grauis.	
168. ocellatus.		204. 5punctatus.	482
169. meditabundus.	473	205. guttula.	
170. Pacca.		206. abbreviatulus.	
171. capra.		207. Echii.	
172. strepidus.		208. sanguivirostris.	
173. Mangiferae.		209. didymus.	
174. stultus.	474	210. Lamii.	483
175. Araneus.		211. Brassicae.	
176. Bubo.		212. Borriginis.	
177. strix.		213. rufirostris.	
178. sulcatulus.		214. multituberculatus.	
179. squalidus.	2. 475	215. haemorrhoidalis.	484
			216.

216. 3 maculatus.	2. 484	252. tortrix.	2. 491
217. litura.		253. Tremulae.	491
218. villosus.		254. aestuans.	
219. Scirrus.		255. taeniatus.	
220. plagiatus.	485	256. Alni.	
221. Raphani.		257. crassus.	
222. varians.		258. pilosus.	491
223. Troglodytes.		259. hortorum.	
224. carbonarius.		260. rufescens.	
225. aterrimus.	486	261. calcar.	
226. Cerasi.		262. Saliceti.	
227. violaceus.		263. Beccabungae.	
228. Nucum.		264. Salicis.	49
229. proboscideus.	487	265. viminalis.	
230. gulofus.		266. Ilicis.	
231. parasita.		267. Lonicerae.	49
232. esuriens.		268. scutellaris.	
233. auarus.	488	269. Jota.	
234. C. album.		270. Fagi.	
235. nasutus.		271. Fragariae.	
236. haustellatus.		272. Populi.	
237. varius.			
238. Ceraforum.		99. SAGRA.	
239. amoenus.	489	1. femorata.	2. 31
240. metallinus.		2. splendida.	
241. bicornis.		3. pulpurea.	
242. tenuirostris.		4. fulgida.	
243. Druparum.		5. tristis.	
244. Fraxini.		6. dentipes.	
245. melanocephalus.	490		
246. pectoralis.		141. SAPERDA.	
247. flavipes.		1. carcharias.	2. 31
248. arcuatus.		2. scalaris.	31
249. depressus.		3. vittigera.	
250. Pomorum.	491	4. laeta.	
251. vorax.		5. candida.	31

1. detrita.	2. 319	42. bidentata.	2. 325
2. morbillosa.		43. liturata.	
3. irrorata.		44. varicornis.	
4. modesta.		45. Cardui.	
10. atricornis.		46. hirsutula.	326
11. ocellata.		47. nigricornis.	
12. tricolor.	320	48. futuralis.	
13. villosa.		49. annulata.	
14. unicolor.		50. lineata.	
15. linearis.		51. trifidis.	
16. nigripes.		52. ferrea.	
17. cylindrica.		53. acuta.	327
18. 3 punctata.	321	54. dimidiata.	
19. mandarina.		55. populnea.	
20. melanocephala.		56. tremula.	
21. pilicornis.		57. punctata.	328
22. humeralis.		58. Seidlil.	
23. barbicornis.		59. virefcens.	
24. erythrocephala.	322	60. tenuicornis.	
25. discoidea.		61. Argus.	329
26. ruficollis.		62. longicornis.	
27. fasciata.		63. flavipes.	
28. clauicornis.		64. antennata.	
29. latipes.		65. irrorata.	
30. vittata.		66. femorata.	330
31. 6 punctata.		67. haemorrhoidalis.	
32. acuminata.	323	68. voluulus.	
33. clauicornis.		69. lemniscata.	
34. lateralis.		70. ferruginea.	
35. lyncea.		71. spifficornis.	
36. Boscii.		72. brunnea.	331
37. grisea.	324	73. tuberculata.	
38. gracilis.		74. testacea.	
39. biloba.		75. violacea.	
40. virginea.		76. marginata.	
41. analis.	325	77. praeusta.	

- | | | | |
|-------------------|--------|------------------|--------|
| 78. ephippium. | 2. 232 | 16. Blakburnii. | 1. 21 |
| 79. picea. | | 17. testaceus. | |
| 80. hirticornis. | | | |
| 81. marginella. | | 20. SCARITES. | |
| 82. hirta. | | 1. depressus. | 1. 11 |
| 83. scutellata. | | 2. marginatus. | |
| 84. necydalina. | | 3. testaceus. | |
| 85. rufimana. | | 4. grandis. | |
| 86. lineola. | 333 | 5. Gigas. | |
| | | 6. impressus. | 1. 11 |
| 64. SARROTRIVM. | | 7. quadratus. | |
| 1. muticum. | 1. 327 | 8. subterraneus. | |
| | | 9. laenigatus. | |
| 171. SCAPHIDIUM. | | 10. porcatus. | |
| 1. 4maculatum. | 2. 575 | 11. ruficornis. | |
| 2. 4pustulatum. | | 12. crenatus. | 1. 11 |
| 3. immaculatum. | 576 | 13. cyaneus. | |
| 4. agaricinum. | | 14. 2pustulatus. | |
| 5. concolor. | | 15. arenarius. | |
| | | 16. thoracicus. | |
| 3. SCARABAEVS. | | 17. gibbus. | 1. 11 |
| 1. dispar. | 1. 22 | 18. cursor. | |
| 2. Coryphaeus. | | 19. Arabs. | |
| 3. Typhoeus. | 23 | | |
| 4. Momus. | | 19. SCAVNES. | |
| 5. Lazarus. | | 1. atratus. | 1. 11 |
| 6. quadridens. | | 2. striatus. | |
| 7. mobilicornis. | 24 | 3. fulcatus. | |
| 8. Cyclops. | | 4. punctatus. | |
| 9. longimanus. | | | |
| 10. stercorarius. | | 44. SCOLYTVS. | |
| 11. sylvaticus. | 25 | 1. flexuosus. | 1. 21 |
| 12. vernalis. | | 2. limbatus. | 24 |
| 13. laeuigatus. | | 3. labiatus. | |
| 14. cordatus. | 26 | | |
| 15. splendidus. | | 21. SEPIDIUM. | |
| | | 1. 3cuspidatum. | 1. 126 |
| | | 2. variegatum. | 127 |
| | | | 3. 67 |

- 3. cristatum.
- 4. reticulatum.
- 5. rugosum.
- 6. vittatum.

I. 127

- 5. gibbum.
- 6. muricatum.
- 7. Capucinus.
- 8. Dominicam.
- 9. pusillum.

2. 377

378

70. SILPHA.

- I. Surinamensis.

I. 336

- 2. littoralis.

- 3. liuida.

337

- 4. micans.

- 5. Indica.

- 6. Americana.

- 7. thoracica.

- 8. laeucollis.

338

- 9. marginalis.

- 10. rugosa.

- 11. Lapponica.

- 12. atrata.

339

- 13. paedemontana.

- 14. inaequalis.

340

- 15. lunata.

- 16. laeuigata.

- 17. obscura.

- 18. reticulata.

341

- 19. opaca.

- 20. sinuata.

- 21. 4punctata.

- 22. dentata.

342

- 23. limbata.

- 24. vndata.

- 25. minuta.

149. SINODENDRON.

- I. cylindricum.

2. 376

- 2. cornutum.

377

- 3. digitatum.

- 4. vnidendum.

45. SPERCHAEVS.

- I. emarginatus.

I. 248

10. SPHAERIDIUM.

- I. scarabaeoides.

I. 92

- 2. lunatum.

93

- 3. 2pustulatum.

- 4. marginatum.

- 5. glabratum.

- 6. abdominale.

94

- 7. 5maculatum.

- 8. dytiscoides.

- 9. fasciculare.

- 10. Colon.

- 11. globus.

- 12. luteum.

95

- 13. obscurum.

- 14. rufipes.

- 15. anale.

- 16. nitidulum.

- 17. flauum.

- 18. atomarium.

96

- 19. melanocephalum.

- 20. lugubre.

- 21. stercoreum.

- 22. haemorrhoidale.

- 23. flauipes.

97

- 24. vnipunctatum.

- 25. limbatum.

- 26. ruficolle.

- 27. fimetarium.

28. te-

28. testaceum.	1. 98	29. obscurus.	2. 595
29. aeneum.		30. nitidus.	596
30. minutum.		31. brunnipennis.	
31. pulicarium.		32. fulgidus.	
32. Wintheriae.		33. haemorrhoidalis.	
148. SPONDYLIS.		34. crenatus.	
1. buprestoides.	2. 376	35. striatulus.	
178. STAPHYLINVS.		36. strumosus.	597
1. aureus.	2. 589	37. cyanipennis.	
2. hirtus.		38. marginatus.	
3. nebulosus.	590	39. rufipennis.	
4. murinus.		40. fuluipes.	
5. chloropterus.		41. flavescens.	
6. pubescens.		42. plagiatus.	
7. viduatus.	591	43. alpinus.	598
8. olens.		44. 4 pustulatus.	
9. similis.		45. analis.	
10. picipennis.		46. merdarius.	
11. maxillofus.	592	47. fuscipes.	
12. oculatus.		48. flavipes.	599
13. cyaneus.		49. atricapillus.	
14. dilatatus.		50. angustatus.	
15. fulgens.		51. linearis.	
16. erythropterus.	593	52. canaliculatus.	
17. chalconcephalus.		53. tenuis.	
18. fossor.		54. gracilis.	
19. erythrocephalus.		55. brunneus.	600
20. pilosus.	594	56. punctulatus.	
21. splendens.		57. emarginatus.	
22. politus.		58. Philanthus.	
23. tristis.		59. limbatus.	
24. femoratus.		60. bicolor.	
25. varians.		61. rufipes.	
26. brunnipes.	595	62. tuberculatus.	601
27. testaceus.		63. melanocephalus.	
28. vlmineus.		64. crassicornis.	
		65. caraboides.	66. ru-

66. rugosus.	2. 601	32. villosus.	2. 311
67. piceus.		33. Druryi.	
68. porcatus.	602	34. vndatus.	
137. STENOCORVS.		35. plebeius.	
1. cyaneus.	305	36. rusticus.	
2. garganicus.		37. angulatus.	312
3. festiuus.		179. STENVS.	
4. Marylandicus.	306	1. 2 guttatus.	2. 602
5. spinicornis.		2. Iuno.	
6. pictus.		3. spissicornis.	603
7. bidens.		4. conicus.	
8. semipunctatus.		5. Ficus.	
9. irroratus.	307	6. floralis.	604
10. obscurus.		27. TENEBRIO.	
11. glabratus.		1. gigas.	144
12. farinosus.		2. punctulatus.	
13. 6 maculatus.		3. cupreus.	
14. 4 dens.	308	4. fulcatus.	145
15. 5 maculatus.		5. curuipes.	
16. 4 maculatus.		6. ferratus.	
17. maculosus.		7. digitatus.	
18. geminatus.	309	8. molitor.	
19. cylindricollis.		9. obscurus.	146
20. pallens.		10. impressus.	
21. strepens.		11. nitidulus.	
22. vittatus.		12. laeuigatus.	
23. fasciatus.		13. variolofus.	
24. circumflexus.	310	14. abbreviatus.	147
25. nanus.		15. depressus.	
26. annulatus.		16. cornutus.	
27. 10 maculatus.		17. variabilis.	
28. lineola.		18. aeruginofus.	
29. hemipterus.		19. scaber.	148
30. varius.	311	20. sanguinipes.	
31. pubescens.		21. culinaris.	

- | | | | |
|--------------------|--------|--------------------|------------------|
| 22. brunneus. | I. 148 | 3. 8punctatus. | 2. 133 |
| 23. ferrugineus. | | 4. fasciatus. | |
| 24. pallens. | 149 | 5. succinctus. | 133 |
| 25. cadauerinus. | | 6. Indus. | |
| 26. retusus. | | 7. 2punctatus. | |
| 27. Mauritanicus. | | 8. bibens. | |
| 28. chrysomelinus. | | 9. hemipterus. | |
| 29. villosus. | 150 | 10. canaliculatus. | |
| 170. TETRATOMA. | | 11. lunulatus. | 133 |
| 1. Fungorum. | 2. 574 | 12. viridulus. | |
| 2. dimidiatum. | | 13. piger. | |
| 3. ruficolle. | | 14. Delta. | |
| 4. anchora. | 575 | 15. lineatus. | |
| 52. TYLLVS. | | 16. retusus. | |
| 1. elongatus. | I. 281 | 17. nigripes. | 134 |
| 2. damicornis. | | 18. maculatus. | |
| 3. Weberi. | | 19. hirtus. | |
| 4. ambulans. | | 20. pilosus. | |
| 5. ferraticornis. | | 21. minutus. | |
| 129. TRACHYS. | | 53. TRICHODES. | |
| 1. tessellata. | 2. 218 | 1. 8punctatus. | I. 283 |
| 2. ephippium. | | 2. tricolor. | |
| 3. pygmaea. | 219 | 3. 2fasciatus. | |
| 4. rugosa. | | 4. sipylius. | 284 |
| 5. minuta. | | 5. Ammios. | |
| 6. terminans. | | 6. apiarius. | |
| 7. fustigata. | | 7. aluearius. | |
| 8. pulchella. | 220 | 8. cyaneus. | 285 |
| 9. exigua. | | 9. crabroniformis. | |
| 10. pufilla. | | 173. TRIPLAX. | |
| 11. nana. | | 1. nigripennis. | 2. 581 |
| 125. TRYCHIVS. | | 2. rufipes. | |
| 1. Eremita. | 2. 130 | 3. aenea. | |
| 2. nobilis. | | 169. TRITOMA. | |
| | | 1. 4guttatum. | 2. 573
2. 133 |

- | | | | |
|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 2. fasciatum. | 2. 570 | 19. 4guttata. | I. 154 |
| 3. 2pustulatum. | 571 | 20. bidens. | |
| 4. humerale. | | 21. femorata. | |
| 5. rufipenne. | | 22. sulcata. | 155 |
| 6. nigricorne. | | 23. ferruginea. | |
| 7. glabrum. | 572 | 24. cornuta. | |
| 8. marginatum. | | 25. maxillofa. | |
| 9. connatum. | | 26. mandibularis. | |
| 10. collare. | | | |
| 11. rufipes. | | 15. TROX. | |
| 12. pulchellum. | | 1. gemmatus. | I. 109 |
| 13. punctatum. | | 2. granulatus. | 110 |
| 14. rufum. | 573 | 3. fabulosus. | |
| 15. atratum. | | 4. hispidus. | |
| 16. 2fasciatum. | | 5. arenarius. | 111 |
| 17. vndatum. | | 6. fuberofus. | |
| | | 7. horridus. | |
| | | 8. luridus. | |
| 28. TROGOSITA. | | 9. cornutus. | 112 |
| 1. retufa. | I. 150 | 10. spinicornis. | |
| 2. varia. | 151 | | |
| 3. coerulea. | | 175. VPIS. | |
| 4. Gigas. | | 1. ceramboides. | 2. 584 |
| 5. picipes. | | | |
| 6. caraboides | | 96. ZONITIS. | |
| 7. thoracica. | 152 | 1. pallida. | 2. 23 |
| 8. 2pustulata. | | 2. praeufta. | |
| 9. virefcens. | | 3. nigripennis. | |
| 10. elongata. | | 4. angulata. | |
| 11. bicolor. | | 5. mutica. | |
| 12. filiformis. | | 6. fuluipennis. | 24 |
| 13. calcar. | 153 | 7. chryfomelina. | |
| 14. Taurus. | | 8. flaua. | |
| 15. quadricornis. | | 9. viridipennis. | |
| 16. Vacca. | | 10. rostrata. | |
| 17. metallica. | | 11. vittata. | |
| 18. aenea. | | 95. ZYGIA. | |
| | | 1. oblonga. | 2. 22 |

APR 9 1926



