



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были отданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как минимум о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



MENTEM ALIT ET EXCOLIT



K.K. HOFBIBLIOTHEK
ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK

48.F.47



48. F. 47.

PRÆLUDIA
BOTANICA
ROBERTI MORISON
SCOTI
ABERDONENSIS.

a

HORTUS REGIUS
B L E S E N S I S
A U C T U S,

C V M

Notulis durationis & Characterismis Plan-
tarum tam additarum, quam non scriptarum ;

I T E M

Plantarum in eodem horto Regio *Blesensi*
aucto contentarum, nemini hucusque scriptarum,
brevis & succincta delineatio.

Quibus accessero

Observationes Generaliores (Plantarum in
eodem horto Regio *Blesensi* aucto contentarum) rei
Herbariz studiosis valde necessariz, & cog-
nitu perutiles.

PRÆLUDIORUM BOTANICORUM

Pars prior.

A U T H O R E

ROBERTO MORISON Medico & Professore
Botanico, serenissimo CAROLO secundo, magna Bri-
tanniz, &c. **R E G I,**

Doctis (in arte) scribo :
Indoctos docebo.

L O N D I N I.

Typis Tho. Roycroft, Impensis Jacobi Allestry ad Insigne
Rosa Coronata in vico vulgò dicto Ducklane, Anno 1669.





SERENISSIMO
ET
POTENTISSIMO
CAROLO II.

*Magna Britannia, Franciæ, &
Hyberniæ,*

REGI.

Serenissime REX:



*UM Hortum Regium Ble-
sensem auctum, pro tertia
vice typis committere decre-
veram. Statim subiit ani-
mum meum, aliquid de novo addere,*

præter nomenclaturam Authorum, in plantis recitandis: quod Reipublicæ Botanicæ ejusque emolumento publico inservire queat. Quare ex longa experientia edoctus: durationem Stirpium omnium ibidem contentarum, per notulas ☉ scilicet ☉ ☿, apposite satis ad eandem indigitandam quadrantes; alios docere æquum judicavi. Plantas præterea 260. a nullo Authore descriptas exhibeo, ☉ Characterismo ☉, serenissimi principis Gastonis Franciæ (Majestatis vestræ) Avunculi easdem honoravi. Quia ejus liberalitate ☉ impensis fuerunt acquisitæ. Easque hic breviter ☉ succincte delineavi; ut prodesse omnibus ☉ singulis, quibus volupe est Artis Botanicæ studium. Porro observationes generaliores (Plantarum in horto eodem Regio contentarum) rei
Her-

Herbaria studiosis valde necessarias & cognitu perutiles edo. Plantas insuper 360, in eodem prædicto horto Regio aucto contentas, plus minusve, Asterisco affectas offero. Quo augmento accrevit idem hortus Regius Blesensis ab Anno 1655, usque ad Annum 1660 quo Anno, extinctus est serenissimus, Majestatis vestrae, Avunculus, omnium Botanicorum Patronus & Mæcenas vere Regius: versatissimus & oculatissimus, in Arte Botanica Princeps: Cui ego per decennium, in indagandis & in hortum Regium invehendis plantis, operam navavi iisdem ex omnibus Galliaë tractibus collectis; præter meridionales Alpinos & Pyrenæos Montes: ad quos nos mittere (si Dii voluissent) decreverat. Quin & methodum meam novam a

natura datam, a me solummodo (citra
jaclantiam) observatam; a nullo nisi
meipso, in hunc usque diem detectam,
quamvis mundi incunabilis sit coeva;
Designatoribus, Chalcographis & (id
genus) aliis hominibus ingeniosis com-
misisset, publicique juris fecisset. Sed
proh ! dolor atque decus Botanicorum
inevitabili fato, morte praeventus, tam
Charus Mæcenas; qui nullis sumpti-
bus pepercit, ut tam indigenas, in
Gallia sponte venientes, quam aliun-
de, ex omnibus mundi plagis; omnis
generis haberet plantas. Nunquam satis
ob hoc, omnibus Botanicis tam præ-
sentibus, quam adventuris & mihi præ-
cipue laudandus. Ego ut viam præ-
sternerem methodo novæ, a me solum-
modo (ut supra dictum) detectæ, con-
firmaturus

cinnamaturus *historiam* *generalem*, *om-*
nium *Stirpium*, *tam* *Arborum*, *fru-*
ticum *quam* *suffruticum*, *per* *Tabulas*
cognitionis *seu* *affinitatis*, *amicorum*
quorundam (*imo* *doctorum*) *Botani-*
corum *precibus*, *pluries* *tam* *hic* *quam*
alibi *terrarum*, *verbis* *coram*, *litteris* *è*
longinquo *solicitatus*. *Ut* *has* *meas* *pri-*
mitias (*tanquam* *prælua* *Botanica*,
ad *methodum* *prædictam*) *in* *lucem* *da-*
rem. *Oratum* *me* *sæpe* *fateor*, *tandem*
me *exoratum* *habuere*. *Atque* *ingeniû*
mei, *in* *Arte* *Botanica* *specimen* *exhi-*
bere *volui*. *Quin* *et* *Patronum* (*Ma-*
jestate *vestra* *Augusta*) *aptiorem* *eligere*
non *potui*, *cui* *collectionem* *hanc* *Plan-*
tarum, *voverem* *aut* *dicarem*: *quic-*
quid *est*, *est* *novum*. *Cui* *inquam* *aptius*
voverem *aut* *inscriberem*, *quam* *M. V.*
quum

quum eundem mihi obtines locum, quem defunctus vester Avunculus. Alumnus sum vester, in vestro solo, antiquo scilicet vestro Regno Scotorum, natus & educatus. Ad idem Officium vobis reddendum vocatus, eandemque quam apud Avunculum M. V. sustineo hic Provinciam. Ideo M. V. in defuncti Avunculi vestri locum vicemque sufficere, par erat. Quare primitias has nostras, præludiorumve Botanicorum horum nostrorum, partem banc primam accipe (serenissime R E X) fronte serena, meque benigne intuere. Dum sublimiora quæ meditor, id est methodum novam, nulli adhuc auditam, per Tabulas cognationis disponentem, omnes vegetabilium classes: Modo faveat Augusta vestra Majestas, nostris conatibus, & laboribus æstate, lucubra-

lucubrationibus hyeme, per aliquot annos
exantlatis: partim sub Auspiciis Avun-
culi vestri in Gallia, Gastonis Franciæ;
partim sub Auspiciis vestris hic. Quod
si annuere hoc mihi digneris: Polliceor
Britanniam vestram, cum methodo exa-
ctissima (quæ est naturæ ipsius) impo-
sterum, in re Botanica gloriari posse:
quemadmodum, Italia, Gallia, Germa-
nia, superiori sæculo, sine methodo, in
Scientia Botanica, gloriata sunt. Penes
me eandem nunc habeo, sed unde designa-
torum Chalcographorumque labores com-
pensentur, non mihi suppetit. Tandem ut
concludam, quod beatæ memoriæ, sere-
nissimi Principis Gastonis, Patroni &
Domini (quondam) mei dignissimi voti;
jam tandem partim persolvi: Cætera (fa-
vente Numine) persolvam. Has nostras
primitias,

*primitias, benigno si M. V. intueatur o-
culo; animum nobis addet, ad majora &
sublimiora prompte edenda.*

Serenissimæ vestræ

MAJESTATIS,

Fidelissimus & devotissimus

Servus Domesticus

M E D I C U S

&

Professor *Botanicus*

ROBERTUS MORISON.



SERENISSIMO
ET
CELSISSIMO PRINCIPI,
DOMINO

JACOBO

Eboracensi & Albanensi, &c.

DUCI.

Serenissime PRINCEPS:



A Medicina parte (quam
Botanicen, seu vegetabilium
Scientiam appellamus) nul-
lam jucundiorē aut delectabiliorem,
unquam judicavit serenissimus vester A-
* Y vunculus,

vinctulus, Gaston. Franciæ, Dux Au-
relianensis in Arte, aut (si mavis) Sci-
entia Botanica, versatissimus Princeps.
Ille enim ab adolescentia ad ultimum
spiritus halitum; Scientiam hanc Bo-
tanicam, rite coluit amavitque. Quin
& affirmare audacter audeo; (noli
credere me Celsitudinis vestræ Regiæ au-
ribus dare) post Salomonem, in re Bo-
tanica, oculatiorem ipso principem; orbem
nunquam tulisse. Hortum suum Regium
Blesensem; omnium hortorum, qui un-
quam in Europa extitere, plantis omnis
generis refertissimum: moriens reliquit.
Atque vivus & valens, lapsus seu hal-
lucinationes Caspari Bauhini, Cory-
phæi omnium Botanicorum, ante se
scribentium; observare in votis habuit.
Nobisque in mandatis, per aliquot annos,
Blesis

Bleſis commorantibus dedit. Quod faciendum in nos ſuſcepimus; non minore ardore, quam ſi ipſe in vivis fuiſſet. Et jam tandem, partim ſub ipſius Auſpiciis ante obitum, partim ſub ſereniſſimi Domini, Domini noſtri, Regis Auſpiciis: ut Beatae memoriae Principis & Domini mei quondam, (nunquam ſatis mihi deplorandi) votum perſolveremus, eaſdem Caſpari Bauhini, in Pinace hallucinationes, tam in digerendis quam denominandis plantis in lucem dedimus. Item alterius ſeu ſecundi, omnium Botanicorum Coryphaei, Johannis Bauhini, Caſpari Fratris: animadverſiones pariter, in tres Tomos, hiftoriae ſuae univerſalis; Typis commiſimus. Tenuem hunc noſtrum laborem, Celsitudini veſtrae Regiae, inſcribere & dicare: (quippe quod votum ſereniſſimi

1
sini Principis Avunculi vestri fuerit) non
tenuem puto esse gloriam. Dum duorum
Fratrum Caspari & Johannis Bauhi-
ni, hallucinationes seu lapsus observo. Eo
magis aliquid, Celsitudini vestrae Regiae
(pro Patrocinio vestro) Encomii adve-
nire putarem: quod ambo, omnium Bo-
taniorum, quotquot unquam extitere;
(absque controversia) vere Coryphaei
fuere. Uterque docte, concinne & valde
laboriose scripsit. Casparus Bauhinus,
Pinacem suam, opus fuisse quadraginta
annorum asserit. Johannes Bauhinus
in compilandis tribus Tomis, historiae suae
universalis; quinquaginta annos, sese
insumpsisse affirmat. Accipe igitur (se-
renissime PRINCEPS) benigne, hos
nostros labores per aliquot annos exantla-
tos. Et favore tuo nos intueri dignare:

Et

*Et ad majora, & ab omnibus hujus Artis
maximopere desiderata, audenda, nos in-
citabis, inque æternum tibi devincies.*

Serenissime Princeps

Vestrum devotissimum


&

Obsequentissimum Clientem.

ROB. MORISON.

and a number of other things
which are not mentioned in
the preceding chapters.

W. B. E. S. S.



PRÆFATIO

A D.

Lectorem Botanicum.

Quorundam Botanicorum votis
satisfacere cupiens, præludia Bo-
tanica typis committere, animus
induxi tandem meum. Cum jam
præludiorum meorum Botanico-
rum, pars prior, penitus prelo excesserit. Hal-
lucinationes Caspari Bauhini in Pinace, tam
in digerendis, quàm denominandis plantis ;
à me observatas, habes. Item animadversio-
nes in tres tomos, historiae universalis Johan-
nis Bauhini offero. Easque publici juris facio;
ut penes quos est ejusdem Johannis Bauhini,
plantarum historia universalis, tribus tomis
digesta : ad manum pariter haberent, ipsius
errata. Noli quæso (amice lector) me gloria-
sum aut insolentem existimare scriptorem :
quod non solum hujus sæculi, sed omnium
(quotquot adhuc existere) Botanicorum; Co-
ryphæos duos, Casparum & Johannem Bau-
hinum Fratres, corrigo. Ex frequenti enim
ipsorum

PRÆFATIO.

ipsorum voluminum inspectione, & ex longâ
& diutinâ eorundem examinatione. Ipsos,
summi iudicii, indefessi laboris, & incompu-
rabilis doctrinæ (in Scientiâ Botanicâ) ho-
mines fuisse observo: ipsosque seu fato, seu
naturali propensione; maximum in promo-
vendis studiis Botanicorum, habuisse deside-
rium; pariter declaro. Errasse tamen mul-
toties utrumque, nemo (in re Botanicâ, me-
diocriter versatus) inscius ibit; hos meos
tractatulos legendo. Labi nihilominus, hu-
manum esse confiteor; homo sum ipse, huma-
ni à me nihil alienum puto; in hisce meis
tractatulis, hallucinatum me esse non dabito.
Quapropter hallucinationes meas, ab amico
lectore, notari desidero. Quin & pariter
observabit lector, me hæc concinasse, tam ut
voto meo prædicto satisfaceret, quàm ut pub-
licis inservirem commodis. Et quam ego de
Fratribus Bauhinis Coryphæis; eandem
de me existimationem habeat lector, velim.
Vale,

(Amice Lector)

Tuus humillimus

servus & ad omnia paratus,

Rob. Morison M. & P.B.R.



PRÆFATIO

A D

Lectorem Botanicum.

Catalogum omnium Stirpium, in horto Regio Blesensi vegetantium, sub interitum Mecœnatis ipsius, exhibiturus. Certiorem te redderem (amice lector) neminem in quacunque re feliciter versari: nisi inclinatione natura, fateve vel divinâ ordinatione ad eam trahatur. Quae omnia in Celsitudine ejus Regiâ, Aurelianensi Duce defuncto, in re Botanicâ concurrere videbantur. Nam ab ineunte etate, (pueritiâ scilicet) incepit illi hic ardor Botanicus, quique cum adolescentiâ accrevit; etate mediâ, stabilita & conformata fuit. Ut paucis multa comprehendam, principem oculatiorem, post Salomonem, in re Botanicâ orbis nunquam tulit. Quapropter non potiore jure, naturali propen-

P R Æ F A T I O.

propensione, Medicinam affectantes ; Apollo
 Æsculapius, Machaon, atque Podalyrius,
 in Divorum numerum à Veteribus relati :
 quam serenissimus hic Princeps, Botanicorum
 Divus, posteris denominandus. Observabis
 (amice lector) plantas omnes hac notulâ ☉
 affectas, vivaces seu perennes denotari. Plan-
 tas vivaces seu perennes appello, quarum ra-
 dix (postquam defloruerint, semenque pro-
 duxerint plantæ) novos quotannis emittit
 Asparagos caulesve, quin & ex eâdem radice,
 de novo singulis annis revivescunt plantæ pe-
 rennes. Arborea & frutices nulla indigi-
 tantur notâ, quippe spontè sese declarant vi-
 vaces. Plantas autem quibus passim affigi-
 tur hæc notula ☿ intellige (amice lector) an-
 nuas, per annuas, non solum intelliguntur eæ
 plantæ, quæ intra anni spatium, semen suum
 perficiunt, sed & quæ secundo, aut perrarò
 tertio anno, semine perfectò, exsiccantur pe-
 reuntque nulla restibili radice ; ex quâ de
 novo, stolones ut perennes exittant. Has
 duas notulas ☉ & ☿ ad plantarum duratio-
 nem indigitandam elegi : quippè ut aurum,
 in multos annos ignem facile perfert, sine per-
 ditione ; ita plantæ perennes, plurimos Solis
 accessus

PRÆFATIO.

accessus & recessus, pariter facillimè tollerant, sese renovantes de novo quotannis. Mercurii omnium metallorum magis fluidi & ad ignem positi, citissimè evanidi notulam hanc & annuis affixi; quippè annuæ intra annum (ut plurimum) pereunt. Nota insupèr plantas in Catalogo hoc contentas, quibus adjicitur Characterismus & esse non scriptas apud Authores, sed à nobis primò exhibitas. Quoniam serenissimi principis Galtonis Franciæ, imperio, jussu & expensis, acquisite & examinata fuerunt; seu indigenæ in Gallia, à nobis collectæ, sive è longinquo ad nos delatæ easdem ipsius Principis Characterismo honoravimus. Nota plantas Asterisco in margine notatas, fuisse recuperatas ab Anno 1655. usque ad Annum 1660. quo extinctus est Mæcenæ ipse serenissimus dux Aurelianensis. Sic quinque illis Annis 360 plus minúsve plantis, novissimum hunc à me auctum percipies Catalogum. Deniquè intuenso, ictu oculi percipere potes, quæ Stirpes sunt vivaces, quæ annuæ, quæque à Celsitudine ejus Regiæ, primò exhibitæ: ipsi, ejusque memoriæ eas acceptas refer. Cum enim, omnium Stirpium, tam in agris spontè nascentium, quam in hortis

PRÆFATIO.

tis Celsitudinis ejus, Regiæ educatarum (ex frequenti omnium seminum inspectione & ad invicem collatione) durationem, longâ, nempe decennali experientiâ didicimus: hanc liberè Botanicæ rei studiosis exhibemus. Nec hoc à quovis ante nos factum. Idèd omnibus & singulis Botanicis, opus gratum ac maximè desideratum esse concludimus. Porrò accipe plantarum 260 in eodem horto Regio Blesensi aucto contentarum; breviter & succinctè à nobis factam delineationem. Quin & insupèr adjecimus (quorundam amicorum precibus) observationes generaliores, Botanicis valdè necessarias & cognitu perutiles; atque ex hisce suprâ citatis, construere præludiorum Botanicorum nostrorum partem primam, operæpretium duximus. Vale.

(Amice Lector)

Tuus humillimus

& ad omnia paratus, servus

Rob. Morison M. & P.B.R.



In Hortum Regium BLESENSEM.

HINC, nulli biseri miranda Rosaria pesti.
 Nec mala hesperidum, vigili servata Draconis.
 Si Paradisiacis quicquam (sine crimine) campis
 Conferri possit. Blæsis mirabile specta!
 Magnifici Gastonis opus: qui terra capaci;
 Quicquid alit sæcunda senu, plantasque tenellas;
 Robur & Arboreum, modico concessit in Horto.
 Bersabidem perhibent, novisse à Graminis herba,
 Ad Libani Cedros. Coluit propriisque locavit
 Sedibus hic princeps: siccis montana reponens
 Udis ima locis. Ut vultu cuncta venirent
 Natio, facilique florent tibi nota labore.
 posuit JACOBUS METELANUS Scotus

Ad Lectorem BOTANICUM.

Define mirari claris Babylonis in Hortis.
 Pendula, costilibus, semina fulta pilis.
 Nec sese Alcinoi jactent Pomaria, plures
 Plantas Blesensis nobilis Hortus alit,
 Quas decus Hektoridum variis distinxit arenis
 Gastonus, populo Pharmaca sana suo:
 Principibus cades multis, Laus maxima habetur.
 Cura erat huic hominum, principe digna, salus.
 Regia progenies, mens Regia, Regia virtus,
 Regia vita, obitus Regius ipse fuit.
 Gastoni Auspiciis magni, collegerat herbas
 Quotquot in Europa, quotquot ubique virent,
 Primus & Astragalos meminist, Scutellariasque
 Morifonus, Patria splendida fama sua.

* a

Morifoni

Morisoni nomen cunctis celebrabitur Hortis :

Dum sua cum foliis femina planta feret.

Canebat CLAUDIUS CRITCHTONIUS Scotus.

In Horti Regii BLESENSIS, ejusque Au-
thoris Encomium : scribit Authoris amicus.

QUAE Dives Natura mihi miracula jactat,
Thesauros pandens Ambitiosa novos ?
Mirandum Gastonis opus ! dabit Area, quicquid
Orbe datum est ; ingens in nuce mundus adest.
Quicquid ubique viget plantarum, haec horrea servant.
Hic stupet ornatus flora vel ipsa suos,
Area sparsa suis stellis, velut Aethera, luce,
Invidiosa polis, inferiore micat ;
Nec Morisone minor Tua gloria ; Qualilet herba
Natura paret legibus, atque Tuis,
Sceptra tenens, clauso plantarum in carcere regnas
Surgit & Auspiciis herba caditque Tuis.
Quasque prius torris, nunc chartis inseris herbas
Et datur in Libris Vita secunda Tuis.
Quaeque suis foliis poterat tam saepe perire
Non poteris foliis planta perire Tuis.
Quid quod & hac tantum vibras lusoria tyla
Ridet & hac tanquam ludicra majus opus.
Non aliter Liber hic quam magni Antea mbulo Regis
Sive suum veluti Phosphorus ante diem
Illa edas cunctis optata volumina votis
Illud, quo majus non habet Orbis, opus.
Illic innumeras Tu digeris ordine plantas
Illic in proprios herba redacta locos
Illa Tibi fient monumenta perennia ; vitam
Quam dederas herbis & dabis herba Tibi.

ALEXANDER MORISON A. M.



Explicatio nominum Autho-
rum, in Horto Regio *Blesensi* aucto
Citatorum.

AD. & Adv. Lob. Lobelius in Adversa-
riis.

Ad. Lob. part. pr. & part. alt. Lobelius in Ad-
versariorum parte prima, & parte altera.

Ama. Amat. Amatus Lusitanus.

Apul. Apuleius.

Bapt. Ferr. & Ferrar. Job. Baptista Ferrarius.

Bell. Bellon. Petrus Bellonius.

Baub. Pin. B Pin. Casparus Baubinus in Pi-
nace.

Baub. Prod. B. Prod. & Prodr. Casparus Bau-
binus in Prodromo.

Baub. & B. Phytop. Casparus Baubinus in
Phytopinace.

B. Pin. app. Baubinus in Pinacis appendice.

C. B. Pin. Casparus Baubinus in Pinace.

Casp. Baub. in Pin. C. B. P. aliquando C. B.,
Casparus Baubinus in Pinace.

* 2 2

C.

EXPLICATIO

- C. B. Prod. descr.** Casparus Bauhinus in *Prodromo, descriptione.*
- Ces. & Casalp.** Andreas Casalpinus.
- Cam. & Camer.** Camerarius in *Epitome Mattheoli & horto suo.*
- Cast.** Castor Durantes.
- Clus. hist. vel Clus.** Carolus Clusius in *historia sua rariorum.*
- Clus. desc.** Clusius in *historia rariorum descriptione.*
- Clus. cur. post.** Carolus Clusius in *curis posterioribus.*
- Clus. ex. & exot.** Carolus Clusius in *historia exoticarum.*
- Clus. hist. app. I. & app. alt.** Carolus Clusius in *appendice prima & altera ad historiam.*
- Col. & Colum.** Fabius Columna in *historia de minus cognitis.*
- Col. Phytob.** Fabius Columna in *Phytobasano.*
- Cord. & Cord. hist.** Cordus in *historia sua Plantarum.*
- Corn. & Cornuti,** Jacobus Cornutus de *plantis suis Canadensibus.*
- Dalech. & Dal.** Dalechampius. **Dal. & Dalechamp.** Dalechampii *hist. Lugd. est historia Lugdunensis citans Dalechampium.*
- Diosc.** Dioscorides. **Dod.**

Nominum Authorum, &c.

- Dod. Dodonæus in historia pemptadum, editione Latina in folio.*
Dod. Gall. ed. Dod. ut. & utr. Dodonæus in editione Gallica, & utraque tam Gallica (à Carolo Clusio edita) quam sua Latina.
Dod. desc. Dodonæus in folio Latinè, descriptione.
Desc. & descr. post citationem Authoris, denotant plantam ab ipso Authore citato scriptam, non figuratam: ut Lob. Dod. Clus. &c. desc. significat ab ipsis esse descriptam.
Eyst. & Eystet. & hort Eyst. hortus Eystettensis à Beslero editus.
Fuch. Fuchius in historia sua Latina, in folio.
Ger. Johan. Gerardus, emaculatus à Fansono.
Ges. Gesn. Gesnerus in corralario, historie Cordi, addito: & in Libello de collectione Stirpium
Hist. Lugd. & Lugdun. historia Lugdunensis Latinè edita in folio.
Hist. & histor. Mex. & Mexican. historia Mexicana in folio.
Hist. .s. histor. Brasil. historia Brasiliana in folio.
Hort. Farnes. & Farn. hortus Farnesianus.
Hort. Eyst. & Eystet. hortus Eystettensis.
Icon. Lob. Lobelius in Iconibus.

Imperat.

EXPLICATIO

Imperat. ferantes Imperatus in sua historia naturali.

Joh. Baub. & J. B. Johannes Bauhinus. in universali sua historia, tribus Tomis digesta.

Lob. Icon. obs & Ad. & Adver. Lobe'ius in Iconibus, forma oblonga, observationibus & Adversariis Stirpium: in folio.

Lug. & Lugdun. histor. hist Lugd. & Lugdun. historia Lugdunensis, Lugduni excusa, lingua Latina: in folio.

Matth. & Matt. ed. Baub. Mattheoli editionis Bauhini citatio.

Maran. & Marantæ, Bartholomæus Marantha.

Muton. & Mutoni. Mutonus ab Authoribus citatus.

Obs. & Icon. Lob. Lobelius in Observationibus & Iconibus suis.

Obs. Lob. & ad. Lob. Lobelius in Observationibus & Adversariis suis.

Park. Johannes Parkinson, in suo Theatro Botanico.

Park. in appad. Theat. Joh. Parkinson in appendice ad Theatrum suum Botanicum.

Park. parad. idem Joh Parkinson in suo Paradiso terrestri.

Pass.

Nominum Authorum, &c.

- Pass. Passei. Passæus in Iconibus suis in forma oblonga.*
- Plin. Plinius.*
- Pon. & Pona, Johannes Pona in editione sua Latina.*
- Pon. & Pona. desc. Mont. Bald. Johannes Pona in Montis Baldi descriptione.*
- Prosp. Alp & Alpin. de plant. & plan. Ægypt. Prosper Alpinus de plantis Ægypti.*
- Prosp. A p. exot. Prosper Alpinus de exoticis.*
- Rob. Steph. Præd. Rust. Robertus Stephanus in Prædio Rustico suo.*
- Ruel. & Ruell Johannes Ruellius.*
- Stapel. & Stapelii, Johannes Boda Stapelius, novissimus in Theophrastum Commentator.*
- Swert. Swertius in florilegio suo.*
- Tab. & Tabern. Theodorus Tabernemontanus in Iconibus suis in forma oblonga.*
- Thal. & Thalii, Johannes Thalius in Sylva sua Hærcynica.*
- Theoph. & Theophr. Theophrastus.*
- Trag. & Tragi, Hieronymus Tragus in historia.*
- Vest. & Vestling. Obs. in Prosp. Alp. Vestlingii Observationes in Prosperum Alpinum.*
- Valet. hortus valet, Acupictorum in usum factus.* Desc.

Explicatio nominum Authorum &c.

Desc. & descript. intellige Authoris citati plantam scriptam, non figuratam.

Col. & Colum. in hallucinationibus Caspari Bauhini à nobis primo exhibitis, Columnam designat. I. & II. Pl. primam & secundam demonstrat (post paginam designatam) plantam prædictæ Columnæ.

Quicumque plura, de Authoribus desiderat; consulat Casparum Bauhinum, sub introitum Pinacis sui, ibi prolixius docet. Qui fuere Authores omnes, qui (ante suum sæculum) de re Botanica scripsere: & quo volumine & quando ipsorum opera, in lucem prodierunt.

Nota insuper, quando nomina Theophrasti, Dioscoridis, Plinii, Mattheoli Tragi, Thalii, Lobelii, Dodonæi, Clusii Fuchsi, Dalechampii, Ponæ, & cæterorum (id genus) Authorum aliorum; ad longum, ab aliis citantur; scribuntur ut supra. Et citantes ipsos curte in Botanographorum monumentis, in medium adferuntur ut passim à nobis, & aliis antè nos scribentibus factitatur, observare licet.

HOR-



HORTUS REGIUS BLESENSIS AUCTUS.

A



BIES Hist. Lugd. alba sive foemina B. pin.

Abrotonum mas Dod. mas angustifolium majus B. pin. ☉

Abrotonum mas incanum Col. mas angustifolium incanum B. pin. ☉

* **Abbrotanum** mas angustifolium maximum C. B. P. magnum camphoratum quibusdam incensaria cam. ☉

Abrotonum odoratum humile Dod. mas angustifolium minus B. pin. ☉

Abrotonum campestre B. pin. *Artemisia tenuifolia* Dod. ☉

A

Abrotonum

Abrotonum foemina vulgare Clus. foemina
foliisteretibus B. pin. ☉

Abrotonum foemina Narbonense Clus. foemina
flore majore B. pin. ☉

Abrotonum foemina viride B. pin. foem.
sextum Clus. descr. ☉

Absinthium vulgare Fuchf. latifolium Dod.
Ponticum, seu Romanum officinarum, seu
Dioscoridis B. pin. ☉

Absinthium insipidum; Absinthio vulgari
simile B. pin. ♀

Absinthium maritimum Lavendulae folio B.
pin. latifolium marinum hort. Eyst. ☉

Absinthium marinum Latifolium Park. ☉

Absinthium Seriphium vulgare, perperam
Dioscoridis Icon. Lob. Seriphium Belgi-
cum B. pin. ☉

Absinthium Seriphium Gallicum Matth. ed.
& B. pin. Narbonense Dod. descr. ☉

Absinthium tenuifolium Dod. Ponticum.
Matth. ed. B. Ponticum tenuifolium in-
canum B. pin. ☉

Absinthium Austriacum tenuifolium Clus.
Ponticum, Tridentinum herbariorum
Obs. Lob. Ponticum tenuifolium Austri-
acum B. pin. ☉ **Absinthium**

(3)

Abfinthium Alpinum umbelliferum Cluf.
Alpinum umbelliferum latifolium B.
pin. ☉

Acacia Americana Robini, Cornuti.

Acacia Ægyptiaca hift. Lugd. foliis fcorp-
oidis leguminofæ B. pin.

Acanthium Dod. Spina alba tomentofa la-
tifolia fylveftris B. pin. ♀

Acanthium Illyricum Obs. Lob. ♀

Acanthium Lufitanicum, ♂ ♀

*** Acanthium Illyrico accedens capitulis**
minoribus. ♂ ♀

Acanthus fativus Dod. fativus vel mollis
Virgilii B. pin. ☉

Acanthus fylveft. Dod. aculeatus B. pin. ☉

Acarna flore luteo patulo B. pin. Carlina fyl-
veftris minor Dod. ♀

Acarna flore purpurorubente patulo B. pin.

Acanthioides parva Apula Col. ♀

Acarna major caule foliofo B. pin. Chamæ-
leon Salmanticenfis Cluf. ♀

A 2

Acc

Acer major Dod. *montanum candidū* B. pin.

Acer montanum flavum .i. *crispum* B. pin.

Opulus montanus hist. Lugd. descr.

Acer minor Dod. *campestre* & *minus* B. pin.

Acer Monspeffulanum hist. Lugd. *trifolia*
B. pin.

* *Acetosa crispa* I. B. ☉

Acetosa pratensis B. pin. *Oxalis* Dod. ☉

Acetosa montana maxima B. pin. *Oxalis*
major Broccenbergensis Thal. syl. Har-
cyn. ☉

Acetosa vesicaria peregrina hort. Eyst. A-
mericana foliis longissimis pediculis do-
natis B. pin. & prodr. ♀

Acetosa rotundifolia hortensis B. pin. *Oxa-*
lis rotundifolia Dod. ☉

Acetosa Cretica semine aculeato B. prodr.
& pin. ♀

Acetosa arvensis lanceolata B. pin. *Oxalis*
minima Dod. ☉

Aconitum hyemale Ponticum hort. Eyst.

Unifolium luteum bulbosum B. pin. ☉

Aconitum lycoctonon luteum majus Dod.

Lycoctonon luteum B. pin. ☉

Aconitum

- Aconitum lycoctonon luteum minus Dod.
descr. ☉
- Aconitum lycoctonon flore Delphinii Dod.
caeruleum glabrum flore consolidæ re-
galis B. pin. ☉
- Aconitum caeruleum .f. Napellus primus B.
pin. Napellus Dod. ☉
- Aconitum violaceum .f. Napellus secundus
B. pin. Lycoctonon quartum Tauricum
Clus. ☉
- Aconitum lycoctonon quintum Neuber-
gense Clus. purpureum .f. Napellus terti-
us B. pin. ☉
- Aconitum lycoctonon caeruleum parvum
Dod. caeruleum minus .f. Napellus minor
B. pin. ☉
- Aconitum spica florum pyramidali. ☉ ☉
- Aconitum novum Judenbergense Clus. ☉
- Aconitum salutiferum .f. Anthora B. pin.
Anthora Dod. ☉
- Aconitum racemosum B. pin. Christophori-
ana Dod. ☉
- Aconitum baccis niveis Cornuti. ☉
- Aconitum baccis rubris Cornuti. ☉
- Acorus verus .f. Calamus aromaticus offici-
narum

narum B. pin. Acorum legitimum Clus. ☉

Adiantum foliis Coriandri B. pin. Adiantum. f. Capillus Veneris verus Ad. Lob. ☉

Adiantum Americanum Cornuti. Fruticosum Brasilianum B. prodr. ☉

Adiantum nigrum Plinij Lob. Dryopteris nigra Dod. ☉

Adonis Matth. ed. B. sylvestris flore phoeniceo B. pin. ☿

Adonium luteum Tab. ☿

Æthiopsis Dod. foliis sinuosis B. pin. ☿

Ageratum Matthioli hist. Lugd. foliis serratis B. pin. ☉

Ageratum floribus candidis Obs. Lob. ☉

Ageratum purpureum hist. Lugdun. ferratum Alpinum B. pin. ☉

Ageratum villosum purpureum. ☿ ☉

* Agrimonoïdes Col. ☉

Alaternus prima Clus. Philyca clatior B. pin.

Alaternus foliis ex albo variegatis. ☿

Alaternus foliis ex luteo variegatis. ☿

Alcea

Alcea vulgaris Dod. *vulgaris major* B.
pin. ☉

Alcea folio rotundo laciniato B. pin. *Malva*
s. *Alcea montana* Col. ☉

Alcea fruticosa cannabino folio Clus. *cannabina* B. pin. ☉

Alcea Syriaca hort. Eyst. *arborescens*
Syriaca B. pin. *Althæa frutex secunda*
Clus. ☉

Alcea Syriaca flore candido Hort. Eyst. ☉

Alcea Veneta hort. Eyst. *vesicaria* Dod. B.
pin. ♀

* *Alcea vesicaria capitis bonæ spei* ☉
♂

Alcea villosa Dalechampij hist. Lugd. *hir-*
suta B. pin. ♀

Alcea Indica parvo flore B. pin. *Ægyptia*
Clus. *Bamia Alexandrina* Cæsalp. ♀

Alcea Ægyptiaca villosa B. pin. *Bamia*
moschata Vellingij Obs. in prosp. Alp.
♀

Alchimilla Dod. *vulgaris* Clus. B. pin. ☉

Alchimilla minor. ☉ ☉

Alchimilla minima montana Col. *Saxifraga*
s. *Perchepier Anglorum* Icon. Lob. *Chæ-*

rophylo nonnihil similis B. pin. ♀

Alliaria Dod. B. pin. ♀

Allium Dod. sativum B. pin. ☉

Allium sphaericeo capite, folio latiore B. pin.

Ampeloprasum Dod. Scorodoprasum
primum Clus. ☉

Allium Ursinum Fuch. sylvestre latifolium
B. pin. ☉

Allium anguinum Matthioli histor. Lug-
dun. montanum latifolium maculatum
Bauh. pin. Victoralis longa Clus. ☉

Allium sylvestre tenuifolium Dod. campe-
stre juncifolium capitatum purpurascens
majus B. pin. ☉

* Allium insipidum juncifolium Gethoi-
des sylvestre Col. ☉

Allium montanum bicorne flore obsoletiore
B. pin. Moly lurido colore Swertij. ☉

Allium juncifolium bicorne luteum B. pro-
dr. & pin. ☉

Allium montanum capite rotundo B. pin.
Allium seu Moly montanum quintum
Clus. ☉

Allium montanum foliis Narcissi majus B.
pin.

pin. Allium .s. Moly Narcissinis foliis primum Clus. ☉

Alnus Dod. vulgaris Clus. rotundifolia glutinosa viridis B. pin.

Alnus nigra baccifera hist. Lugd. B. pin. Frangula Dod.

Alni effigie lanato folio major B. pin. Aria Theophrasti effigie Alni Ad. & Icon. Lob.

Alni effigie lanato folio minor B. pin. Amelanchier Gallorum Obs. Lob.

• Aloe Dod. vulgaris B. pin. ☉

Aloe ex America Dod. folio in oblongum aculeum abeunte B. pin. ☉

Alfne heredulæ folio B. pin. hederacea Tab. ♀

Alfne foliis Veronicæ Tab. Veronicæ foliis, flosculis cauliculis adhærentibus B. pin. ♀

Alfne foliis Trissaginis Icon. Lob. chamædryfolia flosculis pediculis oblongis insidentibus B. pin. ♀

Alfne triphyllos cœrulea B. pin. Elatine triphyllos hist. Lugd. ♀

Alfne scandens baccifera B. pin. Cucubalus Plinii hist. Lugd. ☉ Alfne

Alfne altissima nemorum B. pin. major
Dod. ♀

Alfne media B. pin. minor Dod. ♀

Alfne minor multicaulis B. pin. minima
Dod. ♀

Alfne petræa minima Tab. minor Lini ca-
pitulis B. pin. ♀

Alfne affinis Androsace dicta major B. pin.
Androsace altera Matthioli Clus. ♀

Alfne spergula dicta major B. pin. Sagine
spergula Obs. Lob. ♀

Alfne spergulæ facie .s. Spergula minor
subcœruleo flosculo B. prodr. ♀

* Alfne spergula flo. violacio major C. B.
P. spergula marina Dal. ☉

* Alfne spergula semine foliaceo nigro.
☿ ♀

* Alfne spergula, semine foliaceo subfus-
co. ☿ ♀

Alfne fontana Tab. aquatica media B.
pin. ♀

Alfne littoralis foliis portulacæ B. pin. Al-
fines Pelagicum genus Clus. ☉

Alfne nodosa Germanica B. prodr. ♀

Alfne tenuifolia muscosa B. pin. muscosa
hist. Lugd. ♀

Alfne

Alfine inaperto flore. Noctiflora minima

⊗ ♀

Alfine hirsuta magno flore B. pin. Auricula muris quibusdam Dod. Gall.ed. ♀

* **Alfine hirsuta viscosa altera C. B. P. ♀**
Folia hujus angustiora & saturatius vi-
rentia sunt.

Althæa, Ibisus Dod. vulgaris Clus. Althæa Dioscoridis & Plinij B. pin. ☉

Althæa arborea Olbiæ Lob. frutescens folio acuto, parvo flore B. pin. ☉

Althæa Theophrasti flore luteo B. pin. Abutilon Avicenzæ hort. Eyst. ♀

* **Althæa flo. luteo minimo, semine rostrato. ⊗ ♀**

Alysson Galeni Dod. verticillatum foliis profundè incisis B. pin. ☉

Amaranthus maximus B. pin. Quinua .s. Blitum majus Peruanum Clus. Idem semine rubro. ⚔

Amaranthus coccineus elegans maximus Park. ♀

Amaranthus maximus semine nigro. ⊗ ♀
Amaranthus

- Amaranthus spicis viridibus.* ☉ ♀
Amaranthus cristatus Camerarii hort. Eyst.
 paniculâ incurvâ B. pin. ♀
Amaranthus purpureus Dod. paniculâ con-
 glomeratâ B. pin. ♀
Amaranthus spicatus hort. Eyst. simplici
 paniculâ B. pin. ♀
Amaranthus tricolor hort. Eyst. Icon. Lob.
 folio variegato B. pin. ♀
 * *Amaranthus spica erecta viridi.* ☉ ♀
 * *Amaranthus spica erecta obsoletè rubra*
 ☉ ♀
 * *Amaranthus spica erecta rubra, semine*
 albo. ☉ ♀
 * *Amaranthus auriculatus luteus Christa-*
 tus. ☉ ♀
 * *Amaranthus auriculatus luteus spicatus*
 ☉ ♀
 * *Amaranthus auriculatus Phoeniceus spi-*
 catus. ☉ ♀
 * *Amaranthus auriculatus Phoeniceus cri-*
 status. ☉ ♀
Ambrosia campestris repens B. pin. *Coro-*
nopus repens Lob. hist. Lugd. ♀
Ammi vulgare Dod. majus B. pin. ♀
Ammi Matth. ed. B. ♀ A-

Amygdalus Dod. sativa B. pin.

Amygdalus pumila ☿ ⊙

* *Amygdalus* putamine fragili. ☿

Anagallis phœniceo flore B. pin. mas phœnicea Icon. Lob. ♀

Anagallis flore cœruleo B. pin. foemina cœrulea Icon. Lob. ♀

Anagallis tenuifolia Monnelli Clus. app. alt. ⊙

Anagallis lutea nemorum B. pin. flavo flore Clus. ⊙

Anagallis omnium minima. ☿ ♀

Anagallis aquatica major folio oblongo B. pin. Berula major Tab. ⊙

Anagallis aquatica minor folio subrotundo B. pin. aquatica .s. Beccabunga Germanorum Ad. Lob. ⊙

Anagallis aquatica folio rotundo non crenato B. pin. aquatica tertia Icon. Lob. ⊙

Anagallis aquatica angustifolia B. pin. aquatica quarta Icon. Lob. Eadem flore albo. ⊙

Anagyris Dod. foetida B. pin.

Anagyris non foetida major vel Alpina B. pin. Laburnum Dod. Gall. ed.

Anchusa

**Anchusa puniceis floribus B. pin. minor .f.
Alcibiadion, vel Onochiles Lob. ☉**

**Anchusa lignosior angustifolia Ad Lob.
angustifolia B. pin. ☉**

**Androsæmum Dod. maximum frutescens B.
pin. ☉**

**Androsæmum Campoclarense Col. Ascy-
rum .f. Hypericum bifolium glabrum non
perforatum B. pin. ☉**

**Androsæmum alterum Apulum Col. per-
foliatum & perforatum B. pin. ☉**

**Androsæmum alterum hirsutum Col. hirsu-
tum B. pin. ☉**

**Androsæmum foetidum .f. Tragodes hort.
Eylt. ☉**

**Anemone tenuifolia flore simplici dilutè
purpureo. ☉**

Anemone tenuifolia flore simplici igneo. ☉

**Anemone tenuifolia flore simplici viola-
ceo. ☉**

**Anemone tenuifolia flore simplici albo, cir-
ca caulem purpurascente. ☉**

**Anemone tenuifolia flore simplici ex albo
rubescente. ☉**

Anemone

Anemone tenuifolia flore simplici subalbido. ☉

Anemone tenuifolia flore simplici dilutè violaceo. ☉

Anemone flore pleno coccineo foliolis interiorius ianthinis, *Amarantbe.* ☉

Anemone flore pleno foliis & foliolis coccineis. *Double rouge.* ☉

Anemone flore pleno ex viridi rubescente, foliolis interiorius viridibus. ☉

Anemone ex albo & igneo variegata, *Orlate Romaine.* ☉

Anemone Orlate magis albescens, *Orlate d'Angleterre.* ☉

Anemone flore pleno flammeo. ☉

Anemone flore pleno dilutè violaceo. ☉

Anemone flore pleno exiguo albo. ☉

Anemone flore pleno hyacinthino. *Illustre de Leon.* ☉

Anemone florum mali persicæ quoad colorem æmula. ☉

Anemone multiplex flore Ranunculi. ☉

Anemone tenuifolia hermaphrodita. ☉

Anemone tenuifolia scala dicta. ☉

Anemone tenuifolia Aurelianensis flore pleno eleganter variegato. ☉

Anemone

Anemone tenuifolia flore pleno coccineo
 Passæi Icon. tenuifolia multiplex purpu-
 rea B. pin. *Cramoisine*. ☉

Anemone latifolia pavo minus polyphylla
 B. pin. hortensis latifolia pavo major se-
 cunda Clus. ☉

Anemone tertia Matth. ed. B. Sylvestris pri-
 ma Clus. Sylvestris alba major B. pin. ☉

Anethum Dod. hortense B. pin. ♀

Angelica major Dod. sativa B. pin. ♀

Angelica sylvestris Dod. Sylvestris major
 B. pin ♀

Angelica sylvestris minor .s. erratica B. pin.
 Podagraria Germanica .s. Belgica Obs.
 & Icon. Lob. ☉

Angelica montana maxima. Archangelica
 Dod. Clus. ♀

Angelica lucida Canadensis Cornuti. ♀

Anisum Dod. ♀

Anonis spinosa flore purpureo B. pin. Ano-
 nis Fuchf. Dod. Eadem flore albo quæ
 Anonis flore albo Tab. ☉ Eadem non
 spinosa purpurea. ☉ A-

Anonis floribus luteis exiguis. Ononis lutea
sylvestris minima Col. ☉

Anonis non spinosa flore luteo variegato B.
pin. Ononis flore luteo variegato non
spinosa hort. Eyst. ☉

* Anonis frutescens verna filiqua hirsuta
pendula. ☿ ☉

* Anonis filiqua hirsuta pendula flo. luteo,
viscosa minor flo. pendulo B. prod. ♀

* Anonis filiqua hirsuta pendula, flo. pur-
pureo; minima hirsuta Cherleri J. B. ♀

Anonis mitis annua purpurea. ☿ ♀

Anthyllis prior lentifolia maritima Peplios
effigie Ad. & Icon, Lob. Portlandiæ len-
tifolia Penzæ hist. Lugd. ☉

Anthyllis marina incana alsinifolia Narbo-
nensium Lob. maritima alsinifolia B.
pin. ☉

Antirrhinum majus rotundiore folio B. pin.

Cynocephalus Plinij hist. Lugd. ♀

Antirrhinum Dod. majus alterum folio
longiori B. pin. ♀

Idem quod
Antirrhinum flore albo hort. Eyst. ♀

Antirrhinum flavescens Dod. descr. ♀

B

An-

- Antirrhinum ex dilutè albo purpur af-
cens Dod. descr. ♀
- Antirrhinum arvense majus B. pin. primum
Matth. ed. B. Idem flore albo. ♀
- Aparine Dod. vulgaris B. pin. ♀
- Aparine semine lævi, lævis Park. desc. ♀
- Aparine fructu verrucoso. semine coriandri
saccharati Park. desc. ♀
- Apios Americana Cornuti. ☉
- Apium hortense Dod. hortense .s. Petrose-
linum vulgò B. in pin. ♀
- Apium vel Petroselinum crispum B. pin.
Petroselinum crispum Cam. hort. med. ♀
- Apium hortense maximum B. prodr. ♀
- Apium montanum folio tenuiore B. pin.
Petroselinum Dalechampii hist. Lugd. ♀
- Apium montanum folio ampliore B. pin.
Oreoselinum Oluf. ☉
- Apium sylvestre .s. Thysselinum Dod. syl-
vestre lacteo succo turgens B. pin. ☉
- Apium palustre & Apium officinarum B. pin.
Elegselinum Dod. ♀
- Apium Macedonicum B. pin. Petroselinum
Mace-

Macedonicum Ad. Lob. ☞

* Apium peregrinum i. Clusii peregrinum fol. subrotundis C. B. P. ☉

Apocynum folio subrotundo B. pin. primum latifolium Clus. ☉

Apocynum folio oblongo B. pin. Periploca serpens angustiore folio Obs. & Icon. Lob. ☞

Apocynum majus Syriacum rectum Cornuti. ☉

Apocynum rectum minus Canadense Cornuti. ☉

* Apocynum tertium latifolium Clus. hist; Periploca prior Dod. ☉

* Apocynum Canadense foliis Androsemi. ☞ ☉

* Apocynum Canadense angustifolium flo. aureo. ☞ ☉

* Apocynum Canadense maximum flore minimo herbaceo. ☞ ☉

Aquifolium Matth. ed. B. Ilex aculeata bac-cifera folio sinuato B. pin.

Aquilegia Fuchs. sylvestris B. pin. ☉

Eadem quæ

B 2

Aqui-

Aquilegia flore albo simplici hort.
Eyst. ☉

Aquilina rubra Icon. Lob. ☉

Aquilegia pumila præcox Canadensis Cornuti. ♀

Aquilegia hortensis multiplex flore magno
B. pin. **Aquileia multiplici flore cœruleo**
Dod. ☉

Aquilegia flore pleno albo hort. Eyst. ☉

Aquilegia flore pleno incarnato hort. Eyst.
☉

Aquilegia flore pleno varicolori. ☉ ☉

Aquilegia flore roseo multiplici B. pin. stel-
lata flore purpureo hort. Eyst. ☉

Aquilegia stellata flore violaceo hort. Eyst.
☉

Aquilegia stellata flore albo. ☉

Arbutus Dod. folio serrato B. pin.

Argemone capitulo torulis canulato Obs.

Lob. capitulo breviori B. pin. ♀

Argemone capitulo longiore Obs. Lob. B.
pin. ♀

* **Argemone capitulo Longiori glabro.**

☉ ♀

Ari-

Arisarum angustifolium Dod. *angustifolium*
Dioscoridis fortè B. pin. ☉

Aristolochia rotunda Dod. *rotunda flore*
ex purpurâ nigro B. pin. ☉

Aristolochia longa Dod. *longa vera* B. pin. ☉

Aristolochia clematidis recta B. pin. *Clematidis vulgaris* Clus. ☉

Aristolochia, Pistolochia dicta B. pin. *Pistolochia* Clus. ☉

Aristolochia, Pistolochia Cretica B. pin.
Pistolochia altera semper virens Clus. app.
 prim. ☉

Artemisia Matth. ed. B. vulgaris major B.
 pin. ☉

* *Artemisia variegatis foliis.* ☉ ☉

Arum venis albis B. pin. ☉

Arum venis albis lituris nigris signatum. ☉

Arum Fuchf. vulgare non maculatum B.
 pin. ☉

Arum maculatum maculis nigris B. pin. *maculatum* Tab. ☉

Arum maculatum maculis candidis B. pin.
 Cast. descr. ☉

Arum indicum amplo flore. ☉ ☉

Arum Ægyptium minus Vesslingii Obs. in
prosp. Alp. ☉

Arum maximum Ægyptiacum, quod vulgò
Colocasia B. pin. *Colocassia Ægyptia*
florida Vesslingii Obs. in prosp. Alp. ☉

Arundo vallatoria .s. *phragmites* Obs. &
Icon. Lob. *vulgaris* .s. *phragmites* Dios-
coridis B. pin. ☉

Arundo donax .s. *Cypria* Dod. *sativa* B.
pin. ☉

Arundo Indica variegata .s. *Laconica*
Theophrasti Cornuti ☉

Arundo Indica florida, *Cannacorus* quorun-
dam. Obs. & Icon. Lob. *Indica latifolia*
B. pin. *Canna Indica rubra* hort. Eyst. ☉

Arundo Indica latifolia flore luteo puncta-
to B. pin. *Canna Indica lutea punctata*
hort. Eyst. ☉

Asarum Død. B. pin. ☉

Asarum Canadense Cornuti. ☉

Asclepias Fuchs. albo flore B. pin. ☉

Asclepias angustifolia flore flavescente. ☉

Ascle-

Asclepias nigro flore B. pin. *altera flore nigro* Obs. Lob. ☉

Ascyrum Matth. ed. B. Dod. Lob. ☉

Asparagus hortensis Dod. *sativa* B. pin. ☉

Asparagus marinus Clus. *maritimus crassifolius* B. pin. ☉

Asparagus foliis acutis B. pin. *Corruda prior* Clus. ☉

Asperula odorata flore albo Dod. *Asperula s. Rubeola montana odora* B. pin. ☉

Asperula cœrulea Dod. *cœrulea arvensis* B. pin. ♀

* *Asperula verticillata Latifolia* C. B. P. *cruciata muralis* Col. ♀

Asphodelus albus ramosus mas B. pin. *major albus hort.* Eyst. ☉

Asphodelus albus non ramosus B. pin. *Hastula regia s. Asphodelus* Matt. ed. B. ☉

Asphodelus luteus Dod. *luteus & flore & radice* B. pin. ☉

Asphodelus foliis fistulosis B. pin. *minor* Clus. *Phalangium Cretæ Salonensis* Ad. Lob. ♀

B 4

Asple-

Asplenium Dod. Ceterach officinarum B.
pin. ☉

Aster luteus foliolis ad florem rigidis B. pin.

Aster primus Clus. ☿

Aster cernuus Col. atticus foliis circa florem
mollibus B. pin. ☿

Aster montanus luteus salicis glabro folio
B. pin. Austriacus secundus Clus. ☉

Aster conyzoides odoratus luteus hort.
Ey st. ☉

Aster conyzoides Monspel. ☿ ☿

Aster atticus supinus Dod. luteus supinus
B. pin. ☿

Aster luteus alatus Cornuti. ☉

Aster atticus Dod. atticus cœruleus vulga-
ris B. pin. ☉

Aster præcox flore cœruleo majore. ☿ ☉

Aster elatior flore cœruleo minore. ☿ ☉

Aster montanus cœruleus magno flore foli-
is oblongis B. pin. Alpinus cœruleo flore
.s. septimus Clus. ☉

Aster minor Narbonensium Tripolii flore,
Linariæ folio Lob. Tripolii flore B. pin.
☉

Aster flore Tripolii latifolius. ☿ ☉

Asteriscus

Asteriscus latifolius autumnalis Cornuti. ☉

Aster serotinus. Canadensis angustifolius
flo. cœruleo. ☿ ☉

Aster flore Bellidis sylvestris minoris. ☿ ☉

Aster Canadensis annuus. ☿ ☿ vide *Senecio*, ☿

Astragalus Bæticus Clus. *Bæticus lanuginosus*
radice amplissima. B. pin. ☉

Astragalus Monspeliensis Clus. ☿

Astragalus sylvaticus Thal. *sylvaticus foliis*
oblongis glabris B. pin. ☉

* *Astragalus Monspeliensium* J. B. ☉

• *Atractylis* Dod, *lutea* B. pin. ☿

Atriplex sativa alba Icon. Lob. *hortensis*
alba f. pallidè virens B. pin. ☿

Atriplex hortensis rubra B. pin. *rubra* Tab.
☿

Atriplex sylvestris vulgatiore sinuata Lob.
sylvestris folio sinuato candicante B. pin.
☿

Atriplex sylvestris latifolia B. pin. *Pes anferinus*
Dod. ☿

Atriplex sylvestris latifolia acutiore folio
B.

B. pin. *Chenopodium, Pes anserinus* secundus Tab. ♀

Atriplex sylvestris Mori fructu major, *spinachia* Baptist. ferarii. ♀

Atriplex sylvestris fragifera media, syl. *baccifera* Clus. hist. ♀

Atriplex sylvestris fragifera minor lappulas habens B. prodr. ♀

Atriplex foetida B. pin. *vulvaria* Tab. ♀

Atriplex sylvestris *Polygoni*, aut *helxines* foliis Obs. & Icon. Lob. angusto oblongo folio B. pin. ♀

Atriplex folio hastato .s. deltoide. ☉ ♀

Atriplex marina Dod. *maritima laciniata* B. pin. ♀

* *Atriplex procumbens* folio sinuato crasso. ☉ ♀

* *Atriplex halimi* folio C. B. P. *halimoides* Lob. Obs. ♀

* *Atriplex maritima* sinuato folio C. B. prod. ♀

Avena Dod. *vulgaris* .s. *alba* B. pin. ♀

Avena nigra B. pin. ♀

Azedarach Dod.

B

B

BALSAMINA cucumerina punicea Obs.
& Icon. Lob. rotundifolia repens .f.
mas B. pin. ♀

Balsamina foemina persicifolia Obs. & Icon.
Lob. foemina B. pin. ♀

* Balsamina lutea .f. Noli me tangere C.
B. P. Impatiens herba Dod. ♀

Barba caprae Fuchs. floribus oblongis B.
pin. ☉

Barba caprae floribus compactis B. pin. ul-
maria Clus. ☉

Barba Jovis hist. Lugd. B. pin.

Bellis major Dod. sylvestris caule folioso
major B. pin. ☉

Bellis Alpina major rigido folio B. prodr.
☿ ☉

* Bellis latoribus ferratis foliis, radice re-
pente. ☿ ☉

Bellis ramosa umbellifera Cornuti. ♀

Bellis media hist. Lugd. sylvestris media
caule

caule carens B. pin. ☉

Bellis minor sylvestris Fuchsi hist. Ludg.

Sylvestris minor B. pin. ☉

* Bellis pratensis duplici florum serie. ☿

☉

Bellis hortensis multiplici flore Obs. Lob. ☉

Bellis minor flore multiplici albo hort. Eyst.

☉

* Bellis hortensis flo. herbaceo. ☿ ☉

* Bellis hortensis flo. prolifero. ☿ ☉

Bellis cœrulea caule folioso B. pin. cœrulea

.s. Globularia Monspeliaca Icon. Lob. ☉

- Bellis cœrulea montana frutescens B. pin.

Scabiosa decima .s. repens Clus. ☉

Bellis lutea foliis profundè incisis major B.

pin. Chrysanthemum segetum Obs. &

Icon. Lob. ☿

* Bellis tanaceti fol. glabris. ☉ Vide tana-

cetum inodorum.

* Bellis tanaceti fol. hirsutis. ☉

Berberis dumetorum B. pin. vulgaris Clus.

* Beta marina spontanea Lob. Obs. ☿

Beta alba Matth. ed B. alba vel pallefcens

quæ cicla officinarum B. pin. ☿

Beta

Beta rubra vulgarior Obs. & Icon. Lob. ru-
bra vulgaris B. pin. ♀

Beta rubra radice Rapæ B. pin. rubra Ro-
mana Dod. ♀

Beta rubra radice Rapæ costâ & foliis lati-
oribus. ♀

Beta sicula costâ amplâ aureâ. ☉ ♀

Beta Cretica semine aculeato B. prodr. ♀

Betonica Dod. purpurea B. pin. ☉

Betonica flore albo Matth. ed. B. alba B. pin.
☉

Betonica major Danica Park. ☉

* Betonicæ folio alopecuros quorundam
J. B. ☉

Betula Dod. B. pin.

Bistorta Dod. major radice minus intorta
B. pin. ☉

Bistorta major radice magis intorta B. pin.
Serpentaria mas, sive Bistorta Fuchf. ☉

* Bistorta minor nostras Park. ☉

Blattaria Fuchf. Matth. ed. Blattaria folio
longo laciniato B. pin. ♀

Blattaria alba, Verbasculum Tab. alba B.
pin. ♀ Blattaria

- * *Blattaria folio verbasci incano*, amplo luteo flore. ☉ ♀
- * *Blattaria perennis* flo. cœruleo. ☉ ☉
- * *Blattaria perennis* flo. carneo. ☉ ☉
- * *Blattaria perennis* flo. Gilvo. ☉ ☉

Blitum album Matth. ed. *B. album majus*
B. pin. ♀

Blitum minus Dod. *album minus* *B. pin.* ♀

Blitum polyspermon Tab. *B. pin.* ♀

Blitum rubens Dod. *rubrum majus* *B. pin.* ♀

Blitum rubrum supinum Icon. Lob. *rubrum minus* *B. pin.* ♀

Botrys Dod. *ambrosioides vulgaris* *B. pin.* ♀

Botrys ambrosioides Mexiocana *B. pin. app. descr.* ♀

Botrys chamaedryoides *B. pin. Chamaedrys laciniatis foliis* Obs. & Icon. Lob. ♀

Brassica capitata albida Dod. *capitata alba*
B. pin. ♀

Brassica Sabauda Hyberna Icon. Lob. *alba capite oblongo non peritus clauso* *B. pin.* ♀

Brassica capitata polycephalos hist. Lugd. ex

ex capitibus pluribus conglobata B. pin.

♀

Brassica rubra capitata Dod. B. pin. ♀

Brassica gongyloides Matth. ed. b. ejusdem
pin. ♀

Brassica dicta, Napobrassica B. pin. ♀

Brassica cauliflora Dod. B. pin. ♀

Brassica vulgaris sativa Dod. alba vel viri-
dis B. pin. ♀

Brassica rubra B. pin. Cumana .f. rubra Dod.
Gall. ed. ♀

Brassica crispa Matth. ed. B. alba crispa B.
pin. ♀

Brassica asparagodes Dalechampii hist.
Lugd. asparagodes crispa B. pin. ♀

Brassica fimbriata Obs. & Icon. Lob. B. pin.
♀

Brassica Anglica minima Ad. Lob. fimbri-
ata pumila B. pin. ♀

Brassica Selinisia latifolia Tab. Lato Apii
folio B. pin. ♀

Brassica selinoides Dod. angusto Apii folio
B. pin. ♀

Brassica Sylvestris Dod. arvensis B. pin. ♀

Brassica marina sylvestris monospermos Pe-
ne hist. Lugd. maritima B. pin. ○

Brassica

Brassica sylvestris perfoliata Dod. *Campestris perfoliata flore albo* B. pin. ♀

Brassica sylvestris foliis circa radicem cichoraceis B. pin. *Sinapi album hist.* Lugd. ☉

Brassica sylvestris foliis integris, & hispidis B. pin. *Turritis* Icon. Lob. ☉

* *Brassica syl. ramosa tota pene Glabra* B. pin. *Turritis maj. plateau* Clus. ☉

Brunella major folio non dissecto b. pin.

Brunella Dod. *Eadem flore albo.* ☉

Brunella folio laciniato B. pin. *Symphytum petraeum* Obs. & Icon. Lob. *Eadem flore albo, & roseo.* ☉

Brunella hyssopyfolia B. phytop. ☉

Brunella caerulea magno flore hort. Eyst. B. pin. ☉

* *Brunella Alpina folio glabro, angusto integro.* ☉

Bryonia alba Dod. *aspera .s. alba baccis rubris* B. pin. ☉

Bryonia sylvestris, Sigillum Mariæ Ad. Lob. *laevis .s. nigra racemosa* B. pin. ☉

Buglossum latifolium, Borrago B. pin. *Borr-rago*

- Borrago Dod. Idem flore albo. ♀
- Buglossum sempervirens Ad. & Icon. Lob.
latifolium sempervirens B. pin. ☉
- Buglossum sempervirens minus, Symphy-
tum pumilum repens Borriginis facie
Obs. & Icon. Lob. ☉
- Buglossum angustifolium majus B. pin. an-
gustifolium Obs. & Icon. Lob. ♀
- Buglossum minus sativum Dodonæi hist.
Lugd. angustifolium minus, B. pin. ♀
- Buglossum sylvestre minus B. pin. minus syl-
vestre Dodonæi hist. Lugd. ♀
- Buglossum sylvestre caulibus procumbenti-
bus B. pin. Alyssum Germanicum echioi-
des Obs. & Icon. Lob. ♀
- * Buglossum Lusitanicum bullatis foliis.
☉ ♀
- * Buglossum procumbens annum pullo
minimo flo. ☉ ♀
- * Buglossum luteum minimum nobis,
Echioïdes lutea Apula minima campe-
stris. Col. ♀
- Bulbocastanum majus folio Apii B. pin.
Bulbocastanum Dod. ☉

Bulbus eriophorus Clus, eriophorus Orientalis B. pin. ☉

Buphtalmum lanuginosum foliis millefolii
B. pin. **Chrysanthemum valentinum**
Clus. ☉

Bupleurum angustifolium Dod. folio subrotundo .f. vulgatissimum B. pin. ☉

Bupleuron angustissimo folio B. pin. minimum Col. ♀

Bursa pastoria Dod. pastoris major folio sinuato B. pin.

Bursa pastoria minor Dod. ♀

Bursa pastoris major loculo oblongo B. pin.

Draba minima muralis discoïdes Col. ♀

Bursa pastoris minor loculo oblongo B. pin.

Paronychia alpine folia Obs. & Icon. Lob. ♀

Bursæ pastoris similis siliquosa major B. pin.

Aizoon telephium Dalechampii hist.

Lugd. ♀

Buxus Fuchf. arborescens B. pin.

Buxus humilis Dod. descr. foliis rotundioribus B. pin.

Buxus foliis aureis ☉

C

C

- * **C**ACALIA tomentosa B. prod. ☉
 * Cacalia glabro folio Clus. ☉
 * Cacalia foliis crassis hirsutis B. pin. Ghi-
 ni Lugd. ☉
- * Cachris forulaceis foliis sem. fungoso
 lævi. ☉ ☉
 * Cachris Peucedani folio semine fungoso
 sulcato lævi. ☉ ☉
 * Cachris Peucedani folio semine fungoso
 sulcato aspero. ☉ ☉

Cæpa capitata Matth. ed. B. vulgaris B. pin.

Cæpa sectilis Matth. ed. B. ☉

Cæpa Afcalonica Matth. ed. B. sterilis B.
 pin. ☉

* Calceolus Mariæ luteus C. B. Pin. desc.

☉

* Calceolus Mariæ albus C. B. P. desc. ☉

C 2

Calamintha

Calamintha montana vulgaris Obs. & Icon.

Lob. vulgaris, vel officinarum Germaniæ

B. pin. ☉

Calamintha montana præstantior hort. Eyst.

magno flore B. pin. ☉

Calamintha vulgaris exiguo flore B. pro-

dr. ☉

Calamintha arvensis verticillata B. pin.

aquatica Matthioli hist. Lugd. ☉

* **Calamintha altera gravi odore Pulegii**

Lob. adv. odore Pulegii s. nepeta C. B. P. ☉

Caltha vulgaris B. pin. **Calendula** Dod.

Eadem flore citrino. ☿

Caltha polyanthos major B. pin. **Calendula**

lutea flore pleno hort. Eyst.

Eadem quæ

Calendula sativa polyanthos melina

Tab. ☿

Caltha arvensis B. pin. **Calendula arvensis**

Tab. ☿

Caltha palustris Dod flore simplici B. pin. ☉

Caltha palustris flore pleno Clus. ☉

Campanula minor rotundifolia Obs. &

Icon. Lob. minor rotundifolia vulgaris

B.

B. pin. Eadem flore albo. ☉

Campanula minor rotundifolia Alpina B.
pin Clus. descr. ☉

Campanula maxima foliis latissimis B. pin. ☉

Campanula hortensis Rapunculi radice B.
pin. Trachelium in maritimis Ad. Lob. ☉

Campanula hortensis folio & flore oblongo
B. pin. Viola mariana Dod. Eadem
flore subalbido, ♀

Campanula vulgatio foliis Urticæ B. pin.
Cervicaria major Dod. Eadem duplici
florum serie, & flore albo. ☉

Campanula foliis Echii B. pin. Cervicaria
major tenuifolia Thal. Echium menta-
num Dal. hist. Lugd. ♀

Campanula pratensis flore conglomerato B.
pin. Trachelium minus hist. Lugd.
Eadem flore albo. ☉

Champhorata hirsuta B. pin. Monspeliaca
Icon. Lob. ☉

Camphoratæ congener B. pin. Anthyllis al-
tera Italorum Obs. & Icon. Lob. ♀

Cannabis mas hist. Lugd. sativa B. pin. ♀

Cannabis foemina hist. Lugd. ♀

C 3

Cannabis

Cannabis lutea sterilis Contareni prosp.
Alp. exot. ☉

Capparis retuso folio Obs. Lob. Spinosa
fructu minore folio rotundo B. pin. ☉

Capparis fabago Dod. portulacæ folio B.
pin. ☉

Carduus pratensis Tragi, Acanthii facie Ad.
Lob. ☉

Carduus bulbosus Monspel. Ad. & Icon.
Lob. pratensis Asphodeli radice latifoli-
us B. pin. ☉

Carduus vinearum repens folio Sonchi B.
pin. Ceanothos Theophrasti Col.
Idem flore albo. ☉

Carduus mollis foliis Helenii B. pin. mollis
Camerarii Clus. ☉

Carduus albis maculis notatus vulgaris B.
pin. Leucographus Dod. ♀

* **Carduus Mariæ hirsutus cap. minore.**
⚔ ♀

* **Carduus Mariæ non maculatus.** ⚔ ♀

Carduus albis maculis notatus exoticus B.
pin. lacteus Syriacus Cam.

Idem flore albo. ♀

Carduus

Carduus albis maculis notatus exoticus minor Gataclites J. B. ♀

Carduus sphærocephalus Dod. sphærocephalus latifolius vulgaris B. pin. ☉

Carduus sphærocephalus cœruleus minor B. pin. **Crocodilium Monspeliensium** Dal. hist. Lugd. ☉

Carduus sphærocephalus acutus Dod. **Sphærocephalus capitulo longis spinis armato** B. pin. ☉

* **Carduus sphærocephalus annuus** Boeticus minor. ♂ ♀

Carduus eriocephalus Dod. capite rotundo tomentoso B. pin. ♀

Carduus asininus capite maj. nutante. **Onopyxus tertius** Dalech. hist. Lugd. ♀

Carduus asininus capite maj. nutante flore albo. **Acanthium sylvestre flore albo hort.** Eyst. ♀

Carduus asininus capitulis parvis. **Sylvestris primus** Dod. ♀

Carduus spinosissimus vulgaris, **Polyacantha Theophrasti** Obs. & Icon. Lob. **Spinosissimus angustifolius vulgaris** B. pin. ☉

Carduus Polyacanthæ æmulus capite nutante. ♂ ♀

Carduus lanceolatus Tab. lanceatus latifolius B. pin. Idem flore albo. ♀

Carduus stellatus Dod. stellatus foliis papaveris erratici B. pin. Idem flore albo ♀

Carduus stellatus luteus foliis cyani B. pin. Spina solstitialis Dod. ♀

Carduus solstitialis capitulis minus spinosis. Spina solstitialis mitior Apula Col. ♀

* **Carduus Leucoii** foliis, subtus incanis. ♂ ♀

Carlina herbariorum Obs. Lob. acaulos magno flore B. pin. ☉

Carlina caulescens magno flore B. pin. elatior, Chamæleon albus vulgaris Clus. ☉

Carlina acaulos minore purpureo flore B. pin. **Carduus acaulis** Septentrionalium Obs. & Leon. Lob. ☉

• **Carpinus** Matth. ed. B. Dod.

Carum Dod. Cuminum pratense, Carvi officinarum B. pin. ♀

Caryophyllata Dod. vulgaris B. pin. ☉

Caryophyllata vulgaris majore flore B. pin. Sylvestris Fuchs. ☉ Cary-

- Caryophyllata montana prima** Clus. aquatica nutante flore B. pin. ☉
- Caryophyllata montana minor** flore nutante. ☉
- Caryophyllata major rotundifolia** Obs. & Icon. Lob. alpina lutea B. pin. ☉
- Caryophyllata alpina omnium minima** Pon. descr. mont. Bald. alpina minor B. pin. ☉
- Caryophyllus maximus ruber** B. pin. maximus plenus flore rubro hort. Eyst. ☉
- Caryophyllus multiplex** flore albo hort. Eyst. ☉
- Caryophyllus multiplex maximus variegatus** hort. Eyst. ☉
- Caryophyllus hortensis simplex** flore majore B. pin. Caryophylleus flos simplex Dod. ☉
- Caryophyllus arborescens Creticus** B. prodr. Sylvestris arboreus Prosp. Alp. de exot. ☉
- Caryophyllus simplex** flore minore pallide rubente B. pin. Sylvestris tertius flore pallido suaverubente Icon. Lob. ☉
- Caryophyllus simplex supinus latifolius** B. pin. minimus pulchellus supinus maculis aureis, argenteisve aspersus Icon. Lob. ☉
- Caryophyllus**

Caryophyllus barbatus flore multiplici B. pin. armerius pleno flore Clus. Idem flore albo. ☉

Caryophyllus barbatus hortensis latifolius B. pin. Viola barbata latifolia hist. Lugd. Idem qui

Flos armerius ruber hort. Eyft. ☉

Flos armerius albus ejusdem.

Flos armerius variegatus ejusdem.

Caryophyllus barbatus sylvestris B. pin. Viola barbata angustifolia hist. Lugd. ☿

Caryophyllus sylvestris prolifer B. pin. armeria prolifera Icon. Lob. ☿

Caryophyllus montanus primus Tab. sylvestris vulgaris latifolius B. pin. ☉

Caryophyllus flore tenuissimè dissecto B. pin. Caryophylleus minor Dod. ☉

Idem qui

Caryophyllus plumarius albus Tab.

Caryophyllus omnium humillimus. ☿ ☉

Caryophyllus pratensis flore laciniato simplici .s. flos cuculi B. pin. Odontitis Plinii simplici flore Clus. ☉

Idem flore albo.

Caryophyllus pratensis flore pleno B. pin. Odontitis pleno flore Clus. ☉

Caryophyllus

- Caryophyllus sylvestris* alter flore laciniato
odoratissimo B. pin. *Sylvestris* sextus
Clus. ☉
- Caryophyllus holostius* Icon. Lob. *arvensis*
hirsutus flore majore B. pin. ☉
- Caryophyllus holostius tomentosus angu-*
stifolius B. prodr. ☉
- Caryophyllus arvensis umbellatus* folio gla-
bro B. pin. *Alpine verna* Dal. hist. Lugd.
♀
- Caryophyllus arvensis glaber* flore majore
B. pin. *Gramen leucanthemum* Dod. ☉
- Caryophyllus arvensis glaber* flore minore
B. pin. *Gramen floridum minus* Tab. ☉
- Caryophyllus holostius Alpinus* *gramineus*
B. prodr. ☉
- Caryophyllus montanus major* flore globo-
so B. pin. *Statice* hist. Lugd. ☉
- Caryophyllus montanus minor* flore globo-
so B. pin. *Gramen polyanthemum minus*
Dod. ☉
- Caryophyllus minimus* flore globoso. ☉
- Caryophyllus minimus muralis* B. pin. *Tu-*
nica minima hist. Lugd. ♀

Castanea

Castanea Dod.

Castanea equina Clus. folio multifido B. pin.

Caucalis maxima spondylii aculeato semine B. pin. major Clus. vide Tordylium. ♀

Caucalis arvensis echinata latifolia B. pin. echinophora quarta major πλατύφυλλον purpurea Col. Eadem flore albo. ♀

Caucalis arvensis echinata magno flore B. pin. albo flore Clus. ♀

Caucalis arvensis echinata parvo flore & fructu B. pin. echinophora tertia λεπτόφυλλον purpurea Col. ♀

Caucalis Monspeliaca echinato magno fructu B. pin. Lappa boaria Plinii hist. Lugd. ♀

Caucalis nodoso echinato semine B. prodr. ♀

Caucalis folio Peucedani B. pin. Anglica Tab. ☉

Cedrus folio Cupressi major fructu flavescente B. pin. Oxycedrus Lycia Dod.

*** Cedrus folio cupressi minor C. B. P.**

Centaurium majus folio in lacinias plures diviso B. pin. magnum Dod. ☉

Centauri-

Centaurium foliis Cinaræ Cornuti. ☉

* **Centaurium Rha-capitatum fol. Enulæ**
Lugd. ☉

Centaurium majus luteum Cornuti. Alpi-
num luteum B. prodr. ☉

Centaurium minus Dod B. pin. Idem quod

Centaurium minus album Tab. ♀

Centaurium luteum perfoliatum B. pin.
parvum flavo flore Clus. ♀

Centaurium luteum pusillum B. pin. lute-
um novum Col. ♀

Centaurium minimum purp. ☿ ♀

Cepæa Clus. ♀

Cerasus fructu acidulo Dod, descr. **Cerasus**
austera Matth. Ed. B.

Cerasa crassa carne dura B. pin. **Duracina**
hist. Lugd. descr.

Cerasus Dod. major, ac sylvestris fructu sub-
dulci nigro colore inficiente B. pin.

Cerasus hortensis flore roseo B. pin. multi-
flora Tab.

Cerasus foliis laurino B. pin. **Laurocerasus**
Clus.

Cerasus pumila B. pin. **Chamæcerasus** Dod.
Cerasus

Cerasus racemosa sylvestris fructu non edibili B. pin. *Cerasus avium racemosa* Icon. Lob.

Ceraso affinis B. pin. Mahaleb Matthioli hist. Lugd.

Cerithe quorundam major versicolore flore Clus. *Cerithe*, sive *Cynoglossum montanum majus* B. pin. ♀

Cerithe major quorundam flore ex rubro purpurascente Clus. descr. flore ex rubro purpurascente B. pin. ♀

Cerithe quorundam major flavo flore Clus. flore flavo asperior B. pin. ♀

Charophyllum sativum B. pin. *Cherifolium* Dod. ♀

Charophyllum sylvestre B. pin. *Anthriscus* Plinii hist. Lugd. ♀

Chamæcerasus alpina fructu rubro gemino duobus punctis notato B. pin. *Xylosteum alterum* Dod.

Chamæcerasus dumetorum fructu gemino rubro B. pin. *Xylosteum* Dod.

Chamæcistus

Chamæcistus vulgaris flore luteo B. pin. primus Clus. ☉

Chamæcistus foliis minoribus, & incanis B. pin. quintus Clus. quoad figuram, quartus deser. ☉

Chamæcistus foliis Myrti minoris incanis B. pin. tertius Clus. ☉

Chamæcistus angustifolia B. pin. sextus Clus. ☉

* **Chamæcistus Halimi folio.** ☉ ☉

* **Chamæcistus parvo flo. luteo** J. B. an **Serpilli folio nigricante et hirsuto flo. aureo odorato eidem.** ☉

Chamæcistus annuus. ☉ ☉

Chamædryas repens minor Dod. B. pin. Eadem flore albo. ☉

Chamædryas alpina cisti flore B. pin. montana frutescens durlor Ad. Lob. ☉

Chamædryas alpina minima hirsuta B. prodr. ☉

Chamædryas spuria major angustifolia B. pin. Veronica supina facie Teucree praetensis Icon. Lob. ☉

Chamædryas spuria minor rotundifolia B. pin. Teucrium officinarum Obs. Lob. ☉

Chamægenista

Chamægenista foliis Genistæ vulgaris B. pin.
prima Clus. ☉

Chamægenista sagittalis B. pin. secunda
Clus. ☉

Chamæiris variegata B. pin. cœruleo, & vi-
olaceo colore hort. Eyst. ☉

Chamæiris minor flore purpureo B. pin. *Iris*
minor Dod. ☉

Chamæiris flore pallidè luteo B. pin. ☉

Chamæiris flore obsoleto pallido B. pin.
latifolia minor sexta Clus. ☉

* *Chamæleon niger cortusi* Dod. *niger*
Lob. Obs. ☉

Chamæmelum vulgare Dod. *vulgare leu-*
canthemum Dioscoridis B. pin. ☉

Chamæmelum nobile .s. odoratius B. pin.
odoratum Dod. ☉

Chamæmelum nobile flore multiplici B. pin.
Romanum flore multiplici hort. Eyst. ☉

Chamæmelum nudum capitulo aphylo B.
pin. *Anthemis chrysanthemos Penæ &*
Lobellii hist. Lugd. ☉

Chamæmelum inodorum B. pin. *Cotula*
non

non foetida Dod. Gall. ed. Idem flore pleno. ☉

Chamamelum foetidum B. pin. **Cotula foetida** Dodonæi hist. Lugd. ♀

Chamæmespilus Gesneri Clus. **Epimelis** hist. Lugd.

Chamæpitys moschata foliis serratis B. pin. Spuria prior, sive **Anthyllis altera** Dod. ☉

Chamæpitys lutea vulgaris .s. folio trifido B. pin. **Ajuga** .s. **Chamæpitys mas** Dioscoridis Obs. & Icon. Lob. ♀

Chamæsyce Dod. B. pin. ♀

Chamelæa tricoccos hist. Lugd. B. pin. ☉

Chelidonium majus vulgare B. pin. majus Dod. ☉

Chelidonium majus foliis quernis B. pin. majus laciniato flore Clus. ☉

Chelidonium majus foliis tenuissimè dissectis. ☉ ☉

Chelidonium maximum Canadense Σουλον Cornuti descr. ☉

D.

Cheli-

Chelidonium minus hist. Lugd. *Cheledonia*
rotundifolia minor B. pin. ☉

* *Chelidonium minus* flo. pleno Park. ☉

Chondrilla juncea viscosa arvensis B. pin.
viminea viscosa Penæ hist. Lugd. ☉

Chondrilla viscosa humilis B. prodr. ♀

Chondrilla verrucaria foliis intubaceis vi-
ridibus B. pin. *Cichorium verrucatum*,
Zacyntha Clus. ♀

Chondrilla cœrulea altera cichorii sylve-
stris foliis B. pin. *cœrulea cichorii sylve-*
stris laciniosis foliis Obs. Lob. ☉

Chondrilla foliis laciniatis serratis purpu-
rascente flore B. pin. *rara purpurea* Lo-
belii hist. Lugd. ♀

Chondrilla cœrulea cyani capitulo B. pin.
Sesamoïdes parvum Matth. ed. B. ☉

Chrysanthemum flore partim candido par-
tim luteo B. pin. *Creticum mixtum hort.*
Eyft. ♀

Chrysanthemum majus folio profundius
laciniato magno flore B. pin. *luteum hort.*
Eyft. ☉

Chrysanthemum alpinum incanum foliis
lacini-

laciniatis B. pin. alpinum primum Clus. ☉
 Chrysanthemum tenuifolium Hispanicum.

☿ ☉

Chrysanthemum alpinum foliis Abrotani
 multifidis B. pin. Achillea montana Pe-
 næ hist. Lugd. ☉

* Chrysanthemum Myconi Lugd. Bellis
 lutea fol. subrotundis C. B. P. ♀

* Chrysanthemum tenuifolium Eyst. Bup-
 thalmum Matthioli Lob. ♀

Cicer arietinum Dod. sativum B. pin. Idem
 flore & fructu rubro B. pin. descr. ♀

* Cicer Arietinum fructu nigro. ♀

Cicer sylvestre herbariorum Obs. Lob. syl-
 vestre foliis oblongis hispida majus B.
 pin. ♀

Cichorium latioris folii Dod. sativum B.
 pin. ♀

Cichorium sylvestre Matth. ed. B. sylve-
 stre .i. officinarum B. pin. Idem flore
 albo & purpureo. ♀

Cichorium montanum angustifolium hirsu-
 tie asperum B. pin. Hieracium intyba-
 ceum alperum Tab. ☉

D 2

Cicuta

- Cicuta Dod. major B. pin. ♀**
Cicuta minor Petroselino similis B. pin. Cicutaria fatua Ad. & Icon. Lob. ♀
 * **Cicutaria latifolia foetidissima Ger. Sefeli Peleponense Lugd. ☉**
Cicutaria palustris tenuifolia B. pin. Phelandryum Dod. ☉
- Cinara hortensis foliis non aculeatis B. pin. non aculeata Dodonæi hist. Lugd. ♀**
Cinara hortensis non aculeata capite subrubente. ♀
Cinara hortensis aculeata B. pin. Scolymus Dioscoridis, Cactos Theophrasti Clus. ♀
Cinara maxima Anglica Icon. Lob. Scolymus. s. Cinara maxima hort. Eyst. ♀
Cinara spinosa cujus pediculi esitantur B. pin. Carduus aculeatus Matth. ed B. ♀
- Cirsium maximum Asphodeli radice B. pin. maximum montanum incano folio bulbosa radice quintum Clus. descr. ☉**
Cirsium majus singulari capitulo magno, vel incanum variè dissectum B. pin. Anolicum Obs. & Icon. Lob. ☉

Cistus

Cistus mas folio oblongo incano B. pin. mas
primus Clus. ☉

Cistus fœmina folio salviæ B. pin. fœmina
Clus. ☉

Cistus folio salicis B. pin. humilis annuus fo-
lio salicis humilis Obs. Lob. ♀

Cistus annuus flore guttato Ponzæ descr.
mont. Bald. flore pallido punicante ma-
cula insignito B. pin. ♀

Idem flore non maculoso.

Cistus ledon foliis laurinis B. pin. Cisti ledi
primi altera species Clus. descr. ☉

Cistus ledon quintum Clus. ledon Narbo-
nense Tab. ☉

* **Cistus mas folio rotundo hirsut.** C.B.P.
folio rotundiore Matth. Lugd. ☉

* **Cistus Rosmarini folio.** ☉

Clematitis sylvestris latifolia B. pin. Atra-
gene Theophrasti Clus. ☉

Clematis .s. flammula repens B. pin. Flam-
mula Dod. ☉

Clematis .s. flammula recta B. pin. Flam-
mula altera surrecta Obs. Lob. ☉

Clematitis cœrulea erecta B. pin. cœrulea
pannonica hort. Eyst. ☉

Clematit̄is cœrulea vel purpurea repens B.
pin. peregrina purpurea simplici flore
hort. Eyst. ☉

Clematit̄is cœrulea flore pleno B. pin. pere-
grina purpurea flore pleno hort. Eyst. ☉

* **Clematis peregrina flore parvo rubro.** ☉

* **Clematis peregrina flore parvo albo.** ☉

Clematit̄is trifolia flore roseo clavato B. pin.
Granadilla, Flos passionis hist. Mex. ☉

Clematis, seu flos passionis flore viridi. Mu-
rutuæ species foliis hederæ scandentis
Georgii Marcgravii. In hist. Bras. ☉

Clematis tetraphyllos Americana. ☉ ☉

Clematis daphnoïdes minor B. pin. Cle-
matis daphnoïdes Dod. ☉

Clematis daphnoïdes flore purpureo hort.
Eyst. ☉

Clematis daphnoïdes major Dod. B. pin. ☉

Clinopodium Matth. Clus. Origano simile
B. pin. ☉

Clinopodium vulgare Clus. arvense Ocimi
faciæ B. pin. ♀

* **Clinopodium Austriacum** Pona. ☉

Cneorum Matthioli Clus. Thymelææ affinis
faciæ externa B. pin. ☉. Cne-

Cneoron album folio Oleæ argenteo molli
B. pin. Dorycnium Plateau Clus. ☉

Cnicus vulgaris Clus. fativus, s. Carthamum
officinarum B. pin. ♀

Cnicus caeruleus asperior B. pin. alter Clus.
caeruleo flore. ☉

Cnicus sylvestris hirsutior s. Carduus bene-
dictus B. pin. Carduus benedictus Dod. ♀

Cochlearia Dod. folio subrotundo B. pin. ♀

* **Cochlearia Armorica** flore parvo sub-
purpureo. ☉ ☉

* **Cochlearia Britannica** Lob. Dod. folio
sinuato C. B. P. ☉

Colchicum commune B. pin. vulgare flore
purpurascete hort. Eyst. vulgare album
eiusdem. ☉

Colchicum commune folio lineis albis pi-
cto. ☉ ☉

Colchicum polyanthes lato hellebori albi
folio B. pin. Byzantinum *ελαπύραλλον* Clus. ☉

Colchicum candidum (multiflorum) B. pin.
Pannonicum *πολύανθες* albo flore Clus. ☉

Colchicum variegatum Cornuti. ☉

- Colchicum pleno flore** Clus. B. pin. ☉
Colchicum luteum majus B. pin. **Narcissus autumnalis major** Clus. ☉
 * **Colchicum foliorum oris luteis.** ☉ ☉

Colocynthis pyriformis .s. pepo amarus B. pin. **pyriformis** Obs. Lob. **Pseudocolocynthis pyri formâ hort.** Eyst. ♀

Colutea vesicaria Matthioli hist. Lugd. **vesicaria** B. pin. ☉

Colutea filiquosa .s. scorpioides major B. pin. **Scorpioides prima elatior** Clus. ☉

* **Colutea scorpioides maritima glauco folio** B. in prod. ☉

* **Colutea humilis Buxi foliis nobis , Anonimos flore coluteæ** Clus. **Pseudochamaebuxus** Eyst. ☉

Consolida media pratensis cœrulea B. pin. **Bugula** Dod. **Eadem flore albo & carneo** ☉

Consolida media foliis hirsutis. Eadem flore albo & carneo. ☉

Consolida regalis hortensis flore minore B. pin.

- pin. Delphinium elatius simplici flore
Clus. Eadem flore albo & carneo. ♀
- Consolida regalis multiplicato violaceo
flore hort. Eyst. ♀
- Consolida regalis multiplicato incarnato
flore hort. Eyst. ♀
- Consolida regalis flore pleno albo hort.
Eyst. ♀
- Consolida regalis flore pleno rubro hort.
Eyst. ♀
- Consolida regalis flore multiplici cinericeo
hort. Eyst. ♀
- Consolida regalis flore pleno variegato. ♂
♀
- Consolida regalis arvensis B. pin. Flos re-
gius sylvestris Dod. ♀
- Consolida regalis latifolia parvo flore B.
prodr. ♀
- * Consolida regalis hortensis flore minore
versicolori. ♂ ♀
- Convolvulus major albus B. pin. Smilax læ-
vis major Dod. ⊙
- Convolvulus minor arvensis B. pin. Smilax
lævis minor Dod. ⊙
- * Convolvulus virginianus nobis Battatas
cammotes

cammbotes Hispanorum Clus. fifarum Peruvianum Ger. Tab. ☉

Convolvulus minor semine triangulo B. pin. Helxine cissampelos altera Atriplicis effigie Lob. ♀

Convolvulus caeruleus hederaceo anguloso folio B. pin. asureus .s. caeruleus Obs. Lob. ♀

Convolvulus purpureus folio subrotundo B. pin. Indicus flore violaceo hort. Eyst. ♀

Convolvulus peregrinus caeruleus folio oblongo B. pin. & prodr. ♀

Convolvulus minimus spicaefolius Obs. Lob. Linariae folio B. pin. ☉

Convolvulus minor argenteus radice repente. ☉ ☉

Convolvulus hederaceus perennis. ☉ ☉

Conyza major vera Ad. Lob. mas Theophrasti, major Dioscoridis B. pin. ☉

Conyza minor vera Ad. Lob. foemina Theophrasti, minor Dioscoridis B. pin. ♀

Conyza major vulgaris B. pin. Baccharis Monspeliensium Obs. & Icon. Lob. ☉

Conyza pannonica laevigata B. pin. tertia Austriaca Clus. ☉

Conyza

Conyza

Conyza cœrulea acris B. Pin. *Erigeron*
quartum Dod. ☉

Conyza helenitis pilosa Icon. Lob. *alpina*
pilosissima B. pin. ☉

Conizis affinis B. pin. *Britannica* Gesneri &
Lugdunensium Ad. Lob. ☉

Conyza media vulgaris Clus. *media* Astrucis
flore luteo, vel *tertia* Dioscoridis B.
 pin. ☉

Conyza minima Dod. *major flore globoso*
 B. pin. ♀

Conyza palustris ferratifolia B. pin. *Lingua*
major Dal. hist. Lugd. ☉

Conyza marina hist. Lugd. ☉

* *Corchoros Plinii* Lob. Lugd. *melochia*
s. corchorus Park. ♀

Coriandrum Fuchs. *majus* B. pin. ♀

* *Coriandrum sylvestre foetidissimum* C.
 B. P. *sylvestre* Myconi Lugd. ♀

Coris cœrulea maritima B. pin. *Coris quo-*
rundam Clus. ☉

Cornus mas hist. Lugd. *hortensis mas* B. pin.
 Cor-

Cornus fœmina B. pin. **Virga sanguinea**
Dod.

Coronopus Matthioli hist. Lugd. hortensis
B. pin. ♀

Coronopus maritima major B. pin. **Planta-**
go marina Obs. & Icon. Lob. ☉

Corylus Clus. sativa fructu albo minore .s.
vulgaris B. pin.

Corylus sativa fructu oblongo rubente B.
pin. **domestica** fructu oblongo rubro
Clus. descr.

Corylus sylvestris B, pin. **Avellana nux**
sylvestris Fuchf.

Cotinus Matth. ed, B. **Coggyria** Clus. ☉

Cotonaster folio oblongo ferrato B. pin.
Cotonaster forte Gesneri Clus. ☉

Cotyledon Dod. major B. pin. ☉

Cotyledon radice serpente. ☉ ☉

Cotyledon media foliis oblongis ferratis
B. pin. minus hort. Eyft. **Palmaria** Tab. ☉

Cotyledon minor foliis subrotundis ferratis
B. prodr. ☉ **Coty-**

Cotyledon stellata B. pin. **Aizoon peregrinum** Cam. ♀

Cratægus Theophrasti hist. Lugd. **Sorbus torminalis** Dod.

Crithmum s. fœniculum maritimum minus B. pin. **marinum** Dod. ☉

Crithmum chrysanthemum Dod. **maritimum flore Asteris attici** B. pin. ☉

Crithmum spinosum Dod. **maritimum spinosum** B. pin. ☉

Crocus sativus Matthioli hist. Ludg. **sativus** B. pin. ☉

* **Crocus albus sativus** C. B. P. descr. ☉

Crocus vernus latifolius flore purpureo versicolore Clus. **vernus latifolius purpureus variegatus** B. pin. ☉

Crocus vernus latifolius flore purpureo magno B. pin. Clus. descr. ☉

Crocus vernus latifolius albo flore Clus. ☉

Crocus flore argenteo lineis violaceis striato Icon. Passæi. ☉

Crocus vernus latifolius flavo flore Clus. **vernus latifolius flavus** B. pin. ☉

Crocus

Crocus vernus latifolius pallido flore Clus.
 descr. latifolius pallidus B. pin. ☉

Crocus vernus latifolius flavo varius B. pin.
luteus lineis nigris Swert. ☉

Cruciata Dod. hirsuta B. pin. ☉

Cucumis sativus hist. Lugd. sativus vulgaris
B. pin. ♀

Cucumis anguinus flexuosusve Obs. Lob.
flexuosus B. pin. ♀

Cucumis sylvestris Dod. sylvestris asininus
dictus B. pin. ♀

Cucurbita lagenaria Obs. & Icon. Lob. la-
genaria flore albo folio molli B. pin. ♀

Cucurbita longior Dod. oblongo flore albo
folio molli B. pin. ♀

Cucurbita capitata Tab. B. pin. ♀

Cuminum femine longiore B. pin. sativum
Dod. ♀

Cuminum sylvestre capitulis globosis B. pin.
sylvestre, Dod. ♀

Cupressus Dod.

Cupressus

Cupressus foemina Dod. descr.

Cyanus montanus latifolius vel **Verbasculum cyanoïdes** B. pin. major Dod. ☉

Cyanus fegetum B. pin vulgaris **Obs& Icon**
Lob. ♀

Cyanus hortensis flore simplici caeruleo, albo, purpureo. ♀

Cyanus floridus odoratus Turcius .s. Orientalis Park. flore albo & carneo. ♀

Cyanus repens latifolius B. pin. peramarus repens capitulis squarosis Sesamoïdis parvi Ad. Lob. descr. ☉

Cyclamen vulgare hort. Eyst. orbiculato folio infernè purpurascete B. pin. Idem flore albo. ☉

Cyclamen vernalis hort. Eyst. folio anguloso B. pin. ☉

Cyclamen serotinum foliis hederaceis hort. Eyst. hederæ folio B. pin. ☉

Cyclaminum Orientale Cornuti. ☉

* **Cyclamen Persicum odoratum.** ☉

Cymbalaria Matthioli hist, Lugd. ☉

Cyno-

Cynoglossum Dod. majus vulgare B. pin. ♀

Cynoglossum sylvaticum rubente caule B. pin. **Cynoglossa** montana maxima frigidarum regionum Col. ♀

Cynoglossum Creticum argenteo angusto folio B. pin. Creticum primum Clus. ♀

* **Cynoglossum** semper virens C. B. Prod. **Cynoglossa** altera fol. virente Col. ♀

Cynoglossum minus B. pin. **Lappula** rusticorum, **Elatine** Tragi hist. Lugd. ♀

Cynosorchis militaris major B. pin. **Orchis** strateumatica, sive stratiotes major, .s. militaris Obs. & Icon. Lob. ☉

Cynosorchis militaris pratensis humilior B. pin. minor flore incarnato hort. Eyst. ☉

Cynosorchis latifolia spicâ compactâ B. pin. **Cynosorchis** tertia Dod. ☉

Cyperus rotundus inodorus Germanicus B. prodr. ☉

Cyperus longus Dod. odoratus radice longâ .s. **Cyperus** officinarum B. pin. ☉

Cytisus Maranthæ Matthioli Obs. Lob. incanus siliquis falcatis B. pin. ☉

Cytisus

Cytisus incanus Creticus B. pin. Ebenus
Cretica Prosp. Alp. exot. ☉

Cytisus supinus infernè, & filiquis molli hir-
sutie pubescentibus B. pin. septimus hort.
Eyst. ☉

Cytisus glabris foliis, subrotundis, pediculis
brevissimis B. pin. quintus rotundifolius
Tab. ☉

* **Cytisus incanus** Austriacus folio oblongo
C. B. P. 5 Clus. hist. ☉

* **Cytisus glaber** nigricans C. B. P. 4 Clus.
hist. ☉

D.

DAUCUS montanus Apii folio major
B. pin. Selinoïdes secundus Obs. &
Icon. Lob. ☉

Daucus Alsaticus B. prodr. ☉

Daucus pratensis Dal. hist. Lugd. pratensis
millefolii palustris folio B. pin. ☉

Dens caninus purpurascente flore Clus. la-
tiore rotundioreque folio B. pin. ☉

E

Dens

Dens leonis Dod. latiore folio B. pin. ☉

Dentaria *εισέρυμ* ☉ Clus. heptaphyllos B. pin. ☉

Dentaria baccifera Clus. heptaphyllos baccifera B. pin. ☉

Dentaria *τρίφυμ* ☉ Clus. triphyllos B. pin. ☉

* Dentaria monophyllos, anapodophyllon quibusdam. ☉ ☉

* Dentariæ affinis, Echii flore, capsula rotunda. ☉ ☉

Digitalis purpurea Dod. purpureo folio aspero B. pin. ☉ Eadem flore albo.

Digitalis major lutea, vel pallida parvo flore B. pin. quarta Dod. descr. ☉

* Digitalis lutea amplo flore Ponæ lutea magno flore C. B. P. ☉

Digitalis latifolia flore ferrugineo. ☉ ☉

Digitalis angustifolia flore ferrugineo B. pin. ferruginea Icon. Lob. ☉

Digitalis foliis maximè serratis. ☉ ☉

Digitalis foliis subrubentibus Lyfimachiaë facie. ☉ ☉

Dipsacus sativus Dod. B. pin. ☿

Dipsacus

Dipsacus sylvestris Dod. sylvestris aut virga
pastoris major B. pin. ♀

Dipsacus sylvestris capitulo minore; vel
virga pastoris minor B. pin. tertius Dod. ♀

Doronicum latifolium Clus. radice scorpii
B. pin. ☉

Doronicum Plantaginis folio B. pin. minus
officinarum Obs. & Icon. Lob. ☉

Doronicum Plantaginis folio alterum B.
pin. Alisma Matth. ed. B. hort. Eyst. ☉

Doronicum maximum foliis caulem am-
plexantibus B. pin. septimum Austriacum
Clus. ☉

Doronicum foliis subtus lanuginosis. ☿ ☉

Doronicum Americanum laciniato folio B.
pin. app. Aconitum helianthemum Cana-
dense Cornuti. ☉

* **Doronicum Americanum** minus fol. ob-
scurius virentibus. ☿ ☉

Draba umbellata, vel **Draba major** capi-
tulis donata B. pin. prima vulgaris Clus. ☉

Draba alba siliquosa repens B. pin. tertia
succulento folio Clus. ☉

Draba lutea siliquis strictissimis B. pin. lutea
Matth. ed. B. ☉

Draba filiquosa floribus violaceis. Forte
Leucovium marinum alterum latifolium
 Obs. Lob. ☞

Dracunculus hortensis B. pin. *Draco herba*
 Dod. ☉

Dracunculus pratensis serrato folio B. pin.
Ptarmica Fuchsii hist. Lugd. ☉

Dracunculus pratensis flore pleno B. pin.
Ptarmica vulgaris flore pleno Clus. ☉

Dracunculus polyphyllus B. pin. *Dracon-*
tium majus Dod. ☉

* *Dracunculus* .s. *Serpentaria Triphylla*
Brassiliana B. prodr. ☉

E.

E*CHIUM scorpioides arvense* B. pin.
Myosotis hirsuta reptans Obs. Lob. ☞

Echium scorpioides palustre B. pin. *Myo-*
sotis scorpioides partim repens partim
erecta Icon. Lob. *Idem flore albo.* ☉

Echium vulgare Clus. B. pin. ☞

Echium procumbens flosculis atrorubentibus. ☞ ☞ *Elatine*

Elatine folio subrotundo B. pin. Veronica
fœmina Fuchf. ♀

Elatine folio acuminato in basi auriculato
flore luteo B. pin. altera Dod. ♀

* Elychrysum .f. stæchas Citrina altera Lob.
Icon. Lugd. ☉

* Elychrysum .f. stæchas Citrina Cretica
amplo flore J. B. Creticum Eyst. ♀

Ephemerum non lethale Matthioli hist.
Lugd. ☉

Epimedium Dod. ☉

* Equisetum arvense longioribus setis C.
B. P. Park. segetale Ger.

* Equisetum pratense longiss. setis C. B.
P. palustre maj. Tab. palustre Ger.

* Equisetum nudum Ger. Junceum Lugd.
trag.

Erica vulgaris glabra B. pin. prior Dod. ☉
Erica floribus ex summis caulibus pendulis.
Eadem flore albo. ☉

Erica major scoparia foliis deciduis B. pin.
coris folio quarta Clus. ☉

Erica pumila calyculato Unedonis flore
Icon. Lob. humilis cortice cinericeo Ar-
buti flore B. pin. Eadem flore albo ☉

Erica supina maritima Anglica Park. ☉

Eruca sativa Fuchf. *latifolia alba sativa* Di-
oscorid. B. pin. ♀

Eruca latifolia B. prodr. ♀

Eruca sylvestris Dod. *sylvestris major lutea*
caule aspero B. pin. ☉

Eruca palustris minor Tab. *sylvestris minor*
luteo parvoque flore B. pin. ☉

Eruca vinealis parvo flore. An *sylvestris*
minor lutea Bursæ pastoris folio B.
prodr. ♀

Eruca lutea latifolia .s. *Barbarea* B. pin.
Barbarea Dod. ♀

Eruca Tanaceti foliis. ☉

* *Eruca Monspeliaca* siliqua quadrata E-
chinata C. B. P. sinapi Echinatum
Lugd. ♀

Eruca maritima Italica siliquâ hastæ cuspidi
simili B. pin. - *Cakile Serapionis* Obs.
Lob. ♀

* *Eruca*

* *Eruca Maritima* Anglica Park. marina
Cakile Serapionis Lob. ♀

* *Eruca*.s. *Barbarea* perennis, sem. cras-
 siore. ☞

Eryngium marinum Dod. maritimum B.
 pin. ☉

Eryngium campestre Dod. vulgare B. pin. ☉

Eryngium montanum Amethystinum B. pin.
 totum cœruleum hort. Eyst. ☉

* *Eryngium montanum* Pannonicum al-
 bum Clus. descr. ☉

Eryngium montanum minimum capitulo
 magno B. pin. *Carduncellus montis Lupi*
 Ad. Lob. ☉

Eryngium minimum mitius capitulo mag-
 no. ☞ ☉

Eryngium ex plani semine degener. ☞ ☉

Eryngium arvense foliis Serræ similibus B.
 pin. quartum Dod. ☉

Erysimum vulgare B. pin. *Irio*, s. *Erysimum*
 Dod. ♀

Erysimum latifolium majus glabrum B. pin.
Irio Apulus alter lævi folio *Erucae* Col. ♀

* *Erysimum angustifolium* majus C. B. P.

Rapistrum sylvestre Irionis folio Coli ♀
 * Erysimum Polyceration vel corniculatum C. B. P. Irio alter Matth. Lugd. ♀

Euonymus Dod. vulgaris granis rubentibus
 B. pin.

Euonymus latifolius B. pin. primus .s. latifolius Clus.

Eupatorium vulgare Matth. ed. B. cannabinum B. pin. ☉

Eupatoria foliis Enulæ Cornuti. ☉

Eupatorium cannabinum chrysanthemum
 Tab. ♀

Eupatorium cannabinum Americanum flore aureo. ☿ ♀

Eupatorium veterum .s. Agrimonia B. pin.
 Græcorum .s. Agrimonia Dod. ☉

Eupatorium odoratum B. pin. alterum odoratum, & aromaticum Col. descr. ☉

* Eupatorium odoratum santonicum Lob.
 Advers. ☉

* Eupatorium capite nutante C. B. Chrysanthemum J. B. ♀

* Eupatorium Chrysanthemum, canadense præaltum, alato caule nobis. After virginicus

gineus luteus alato caule Park. descr. ☉

- Euphrasia Dod. officinarum B. pin. ♀
 Euphrasia minus ramosa flore ex cœruleo
 purpurascente hort. Eyst. unicaulis B.
 pin. descr. ♀
 * Euphrasia unicaulis spicata. Trixago
 apula unicaulis Col. ♀
 Euphrasia lutea viscata. ☿ ♀
 Euphrasia pratensis rubra B. pin. secunda
 Dodonæi, sive Cratæogonon alterum
 quorundam Obs. Lob. ♀
 Eufragia major sylvestris purpurea Col.
 Italica latifolia altera B. pin. ♀
 Euphrasia pratensis lutea B. pin. Sideritis
 pratensis lutea hist. Lugd. ♀

F.

- * **F**A B A major fructu rubro C.B. Pin. ♀
 Faba Fuehs. major recentiorum Obs.
 & Icon. Lob. ♀
 Faba minor .s. equina B. pin. Bona .s. phase-
 lus minor Dod. descr. ♀

Faba

Faba sylvestris Græcorum Obs. & Icon. Lob.
 sylvestris fructu rotundo atro B. pin. ☞
 Vide vicia.

Fagus Dod.

Ferrum equinum filiquâ singulari B. pin.
 equinum Obs. & Icon. Lob. ☞

* **Ferrum equinum** Polyceraton Col. E.
 quinum filiquâ multiplici C. B. P. ☞

Ferrum equinum Germanicum filiquis in
 summitate B. pin. equinum capitatum
 Col. ☉

Ferrum equinum Gallicum filiquis in sum-
 mitate B. pin. Lotus enneaphyllos Dal.
 hist. Lugd. ☉

Ferula galbanifera Obs. & Icon. Lob. feru-
 lago latiore folio B. pin. ☉

Ficus Dod. communis B. pin. fructu rubro
 & albo.

Ficus Indica Dod. folio spinoso, fructu ma-
 jore C. B. Pin. Indica major Park. ☉

* **Ficus Indica** minor Park. Theat. Indica
 fol. spinoso fructu minore C. B. P. ☉

Fili-

- Filipendula** Dod. vulgaris B. pin. ☉
Filix foemina Dod. ramosa major pinulis
 obtusis non dentatis B. pin. ☉
Filix floescens Tragi hist. Lugd. ramosa non
 dentata florida B. pin. ☉
Filix mas Dod. non ramosa dentata B. pin. ☉
Filix mas aculeata major B. prodr. ☉
Filix baccifera Cornuti. ☉
Filix non ramosa petiolis tenuissimis, & te-
 nuissimè dentatis B. pin. **Filicula** petræa
 prima Tab. ☉
 * **Filix arborea** Tragi. ☉
 * **Filix palustris aculeata.** ☉ ☿

- Foeniculum** Dod. vulgare Germanicum B.
 pin. ☉
Foeniculum dulce B. pin. **Foeniculum .f.**
Marathrum vulgatus dulce Ad. Lob.
 descr. & Icon. ☉

- Fœnum Græcum** Dod. sativum B. pin. ☿
Fœnum Græcum sylvestre alterum poly-
cration B. pin. **Hedysarum minimum** hist.
 Lugd. ☿

- Fragaria Fuchs.** vulgaris B. pin. ☉
Fraga candida Dod. descr. ☉ **Fra-**

Fragaria fructu parvi Pruni magnitudine B. pin. *Fraga fructu magno hort.* Eyst. ☉

Fragaria flore duplici foliorum serie. ☿ ☉

Fragaria fructu rubro folioso. ☿ ☉

Fragaria sterilis B. pin. *sylvestris minimè vesca .s. sterilis* Icon. Lob. ☉

Fragaria sterilis incana. ☿ ☉

Fraxinella Clus. *Dictamus albus vulgò .s.*

Fraxinella B. pin. ☉

Fraxinella niveo flore Clus. descr. ☉

Fraxinus Dod. *excelsior* B. pin.

Fraxinus florifera. ☿

Fritillaria præcox purpurea variegata B. pin. *Meleagris* Dod. ☉

Fritillaria pyrenæa Clus. hist. app. *flore minore* B. pin. ☉

* *Fritillaria coronæ imperialis facie, pullo flore Hispanica umbellifera swertii umbellifera* Park. Parad.

* *Fritillaria præcox alba* C. B. P. *alba* Park. Parad.

Frumentum Indicum Maiz dictum B. pin. Turcicum

- Turcicum Dod. Idem granis rubis. ♀
 Frumentum Sarracenicum Matth. ed. B.
 Fegopyrum Dod. ♀
 Frumentum Indicum spicâ articulatâ, pe-
 renne. ☞ ☉
- Fumaria Dod. officinarum & Dioscoridis
 B. pin. Eadem flore albo. ♀
 Fumaria minor tenuifolia P. pin. Capnos
 tenuifolia Clus. ♀
 Fumaria filiquosa sempervirens Cornuti. ☉
 Fumaria bulbosa radice non cava minor B.
 pin. Radix cava minor Dod. Eadem
 flore albo. ☉
 Fumaria bulbosa radice cava major B. pin.
 Radix cava major Clus. Eadem flore
 albo. ☉
 Fumaria tuberosa insipida Cornuti. ☉
 * Fumaria tenuifolia semine compresso
 lini instar. ☞ ♀
 * Fumaria Claviculis donata C. B. P. Cap-
 nos altera Belgica flore albo Clus. ♀

G.

G.

- G**ALEGA Dod. vulgaris B. pin. ☉
 Galega flore albo hort. Eyst. ☉
 Galegæ affinis, Sophera dicta B. pin. Sophe-
 ra Prosp. Alp. de plant. Ægyp. ♀
 * Galegæ affinis, Sesban Prosp. Alpini de
 plantis Ægyp. ♀
- Gallium Dod. luteum B. pin. ☉
 Gallium palustre album B. pin. album
 Tab. ☉
 Gallium album tripetalon. ☉ ☉
- Genista spinosa major longioribus aculeis B.
 pin. spinosa Dod. ☉
 Genista spinosa brevioribus aculeis, an Ge-
 nistella minor aspalathioïdes B. prodr. ☉
 Genista spinosa minor Germanica B. pin.
 Genistella Dod. aculeata Obs. & Icon.
 Lob. ☉
 Genistella spinosa Corrudæ similis. Scorpius
 Theophrasti hist. Lugd. Nepa Theo-
 phrasti Ad, Lob. ☉

Genista

Genista angulosa, & scoparia B. pin. angulosa .s. vulgaris hist. Lugd. ☉

Genista tinctoria Germanica B. pin. tinctoria Dod. ☉

* Genista purgans J. B. ☉

* Genista Acacia trifolia C. B. Acacia Diosc. Ger. ☉

Gentiana major lutea B. pin. Gentiana Dod. ☉

Gentiana Asclepiadis folio B. pin. secunda foliis Asclepiadis Dod. descr. ☉

Gentianella Alpina angustifolia magno flore B. pin. helvetica Icon, Lob, major verna Clus. ☉

Gentiana cruciata B. pin. Cruciata .s. Gentiana minor Dod. ☉

Gentiana palustris angustifolia B. pin. Pneumonanthe Cord, hist. ☉

Geranium batrachiodes folio Aconiti B. pin. secundum *βατραχίωδες* minus Clus. ☉

Geranium batrachioides flore albo hort. Eyst. ☉

Geranium batrachiodes flore variegato B. pin. Anglicanum variegatum hort. Eyst.

☉

Gera-

- Geranium batrachoïdes alterum longius**
 radicum Icon. Lob. batrachiodes odo-
 ratum B. pin. ☉
- Geranium sanguineum maximo flore B. pin.**
 septimum hæmatodes Clus. ☉
- Geranium batrachiodes, Gratia Dei Ger-**
 manorum Lob. B. pin. tertium batrachi-
 odes majus Clus. ☉
- * **Geranium batrachiodes minus annum**
 purpurocæruleum. ☿ ♀
- * **Geranium batrachoïdes minus perenne**
 versicolor. ☿ ☉
- Geranium montanum fuscum B. pin. fuscum**
 hort. Eyst. ☉
- Geranium tuberosum Dod. tuberosum ma-**
 jus B. pin. ☉
- Geranium nodosum B. pin. quintum nodo-**
 sum Plateau Clus. ☉
- Geranium lucidum saxatile B. pin. saxatile**
 hort. Eyst. ♀
- Geranium folio Malvæ rotundo B. pin. Pes**
 columbinus Dod. ♀
- * **Geranium Melachoïdes flore albo. ☿ ♀**
- Geranium folio Malvæ rotundo minus B.**
 pin. descr. ♀
- Geranium columbinum tenuius laciniatum**
 B.

- B. prodr. Idem flore albo. ♀
- Geranium folio Althææ B. pin. malacoïdes
Obs. & Icon. Lob. ♀
- Geranium cicutæ folio moschatum B. pin. su-
pinum Dod. ♀
- Geranium Coriandri folio odorum B. pin.
Apulum Coriandri folio alterum odo-
rum Col. ♀
- Geranium Cicutæ folio minus & supinum B.
pin. minus vel arvense Tab. ♀
- Geranium arvense album Tab. ♀
- Geranium robertianum Dod. robertianum
primum B. pin. ♀
- * Geranium Rubertianum flore albo. ♂ ♀
- Geranium Creticum annum hamatodes
Icon. Lob. latifolium longissimâ acu B.
pin. ♀
- Geranium triste Cornuti. Ⓞ
- Geranium flore versicolore. Ⓞ
- Geranium foetidum Park. Ⓞ
- Gingidium umbellâ oblongâ B. pin. Vifnaga
Matth. ed. B. ♀
- Gladiolus floribus uno versu dispositis ma-
jor B. pin. Narbonensis Obs. & Icon. Lob.
- Ⓞ F Gladi-

Gladiolus flore albo Swert. ☉

Gladiolus floribus uno versu dispositis minor B. pin. *minimus* Lob. Ad. part. alt. ☉

Glaux maritima B. pin. *exigua maritima*
Obs. & Icon. Lob. ☿

* *Glaux major flore herbaceo.* ☿ ☉

Glycyrrhiza capite echinato B. pin. *echinata*
Dodonæi hist. Lugd. ☉

Glycyrrhiza vulgaris Dod. *filiquosa vel*
Germanica B. pin. ☉

Glycyrrhiza sylvestris hist. Lugd. *sylvestris*
floribus luteopalescentibus B. pin. ☉

Gnaphalium maritimum B. pin. *marinum*
tomentosum hist. Lugd. ☉

Gnaphalium Americanum Clus. *latifolium*
Americanum B. pin. ☉

Gnaphalium vulgare majus B. pin. *Filago*
.s. Impia Dod. ☿

Gnaphalium medium B. pin. *Filago minor*
Dod. ☿

Gnaphalium minus repens B. pin. *minimum*
Icon. Lob. ☿

Gnaphalium roseum B. prodr. ☿

Gnapha-

Gnaphalium majus lato oblongo folio B.
pin. **Gnaphalium Plateau secundum**
Clus. ♀

* **Gnaphalium 3 Plateau Clus.** ♀

Gnaphalium Anglicum vel Belgicum folio
longiore Icon. Lob. majus angusto, ob-
longo folio alterum B. pin. ☉

Gnaphalium montanum flore rotundiore B.
pin. **montanum variegatum hort.** Eyst. ☉

Gossipium .f. Xylon Dod. **Gossipium fru-**
tescens semine albo B. pin. ♀

Gramen caninum arvense .f. Gramen Dicf-
coridis B. pin. **caninum medicatum** Obs.
Lob. ☉

Gramen caninum vineale B. prodr. ☉

Gramen caninum longius radicatum majus
& minus B. pin. **canarium longius radi-**
catum latiore paniculâ Ad. Lob. part.
alt. ☉

Gramen caninum supinum minus B. pin.
caninum supinum Icon. Lob. ☉

Gramen nodosum avenaceâ paniculâ B. pin.
nodosum hist. Lugd. ☉

Gramen tremulum Hispanicum maximum
Park. ♀

F 2

Gra-

- Gramen tremulum majus B. pin. leporinum,
& tremulum Tab. ♀
- Gramen tremulum minus paniculâ parvâ B.
prodr. ♀
- Gramen filiceum .s. polyanthes hist. Lugd.
paniculis elegantissimis, .s. Heragrostis
major B. pin. ♀
- Gramen minimum Dalechampii hist. Lugd.
minimum paniculis elegantissimis B. pin. ♀
- Gramen pratense paniculatum molle B.
prodr. lanatum Dal. hist. Lugd. ☉
- Gramen pratense vulgatius hist. Lugd. pra-
tense paniculatum majus latiore folio,
via Theophrasti B. pin. ☉
- Gramen pratense paniculatum medium B.
pin. pratense secundum Dod. ☉
- Gramen pratense paniculatum minus B. pin.
paniculatum minus album Tab. ☉
- Gramen paniculâ multiplici B. prodr. Mon-
spessuli vulgò duriusculum minus nomi-
natum. ♀
- Gramen arvense paniculâ crispâ B. prodr.
minimum xerampelinum Narbonense I-
con, Lob. ♀
- Gramen segetum paniculâ arundinaceâ B.
pin. agrorum venti Spica Icon. Lob. ♀
- Gramen

- Gramen paniculatum folio variegato** B. pin. fulcatum vel striatum album Icon. Lob. ☉
- Gramen palustre paniculatum altissimum** B. pin. aquaticum arundinaceum paniculatum Tab. ☉
- Gramen pratense cristatum .s. spicâ cristatâ læve** B. pin. cristatum ejusdem prodr. ☉
- Gramen Caryophyllatæ foliis spicâ divulsâ** B. pin. Caryophylleum Tab. ☉
- Gramen typhoïdes maximum spicâ longissimâ** B. prodr. ☉
- Gramen typhoïdes spicâ multiplici** B. pin. typhinum tertium Tab. ☉
- Gramen alopecuroïdes spicâ asperâ** B. prodr. ☿
- Gramen pratense tomentosum paniculâ sparsâ** B. pin. eryophoron Dod. ☉
- Gramen sparteum spicatum latifolium** B. pin. Spartum nostras alterum Icon. Lob. ☉
- Gramen sparteum pennatum** B. pin. Spartum Austriacum pennatum Clus. ☉
- Gramen foliolis junceis brevibus minus** B. pin. exile durius Icon. Lob. ☉
- Gramen junceum folio articulato aquaticum** B. pin. aquaticum alterum Icon. Lob. ☉

- Gramen juncoïdes junci sparsâ paniculâ
Park. ☉
- Gramen junceum spicatum .f. triglochis B.
pin. Calamagrostis quarta hist. Lugd. ☉
- Gramen cyperoïdes latifolium spicâ rutâ
.f. caule triangulo B. pin. cyperoïdes
hist. Lugd. ☉
- Gramen cyperoïdes spicâ pendulâ breviorē
B. pin. Pseudocyperus Dod. ☉
- Gramen cyperoïdes paniculâ sparsâ majus
B. pin. cyperinum majus Tab. ☉
- Gramen cyperoïdes palustre majus spicâ
compactâ B. pin. cyperinum palustre
Tab. ☉
- Gramen cyperoïdes palustre majus spicâ
divisâ B. pin. cyperoïdes parvum aqua-
ticum Icon. Lob. ☉
- Gramen cyperoïdes maximum foliis & ca-
rinâ ferratis. ☉
- Gramen cyperoïdes maritimum B. pin. ma-
ritimum hist. Lugd. ☉
- Gramen arundinaceum enode majus mon-
tanum B. pin. arundinaceum montanum
Tab. ☉
- Gramen nemorosum caliculis paleaceis B.
pin. junceum bufonium Tab. ☉
- Gramen

- Gramen hirsutum latifolium majus B. pin.
hirsutum nemorosum Icon. Lob. ♀
- Gramen hirsutum angustifolium majus B.
prodr. ♀
- Gramen hirsutum capitulis Psvllii B. pin.
exile hirsutum cyperoïdes Icon. Lob. ♀
- Gramen palustre aculeatum, vel minus Ger-
manicum B. pin. palustre echinatum Icon.
Lob. ☉
- Gramen daçtylon folio arundinaceo majus
B. pin. legitimum Clus. ☉
- Gramen daçtylon folio latiore B. pin. Ischæ-
mon Plinii .i. daçtylon hist. Lugd. ☉
- Gramen daçtylon scoparium B. pin. scopa-
rium Ischæmi paniculis Gallicum Ad.
Lob. part. alt. ☉
- Gramen daçtylon esculentum B. pin. Gra-
men mannæ primum Dod. ♀
- Gramen paniceum spicâ longis aristis ar-
matâ B. pin. Panici effigie gramen aristis
circumvallatum Icon. Lob. ☉
- Gramen paniceum spicâ simplici B. pin. Pa-
nici effigie gramen simplici spicâ Icon.
Lob. ☉
- Gramen miliaceum Icon. Lob. sylvaticum
paniculâ miliaceâ sparsâ B. pin. ☉

Gramen hordeaceum minus & vulgare B.
 pin. hordeaceum, **Holcus Plinii hist.**
 Lugd. ♀

Gramen loliaceum spicâ longiore B. pin.
 Lolium Dod. ♀

Gramen loliaceum minus spicâ simplici B.
 prodr. ♀

Gramen festucarium. Festuca graminea glu-
 mis hirsutis B. pin. **Bromos sterilis altera**
 Icon. Lob. ♀

Gramen festucarium. Festuca avenacea ste-
 rilis elatior B. pin. **Bromos herba Dod.** ♀

Gramen festucarium. Festuca graminea glu-
 mis vacuis B. prodr. ♀

Gramen avenaceum altero alteri innato
 Park. ♀

Gramen avenaceum squamosâ glumâ
 Park. ♀

* **Gramen Phalaroides perenne tuberosâ**
 radice. ☉ ☉

* **Gramen Festucarium capitulis duris, Æ-**
 gylops Narbonensis Lob. ♀

* **Gramen Miliaceum sylvaticum.** ♀

* **Gramen echinatum tribuloïdes Col.** ♀

Gramen Parnassi Dod. albo simplici flore
 B. pin. ☉

Grati-

Cratiola Dod. centauroïdes B. pin. ☉

Grossularia simplici acino, vel spinosa syl-
vestris B. pin. Uva crispa Dod. ☉

* **Grossularia**, Uva crispa, fructu albo &
Margaritis simili C. B. P. ☉

† **Grossularia** Uva crispa fructu rubro. ☉

Grossularia rubra hist. Lugd. multiplici a-
cino .s. non spinosa hortensis rubra .s.
Ribes officinarum B. pin. ☉

Grossularia hortensis fructu **Margaritis** si-
mili B. pin. **Ribes** fructu albo hort. Eyst. ☉

Grossularia hortensis majore fructu rubro
B. pin. **Ribes** major fructu rubro hort.
Eyst. ☉

Grossularia non spinosa fructu nigro B. pin.
Ribes fructu nigro Dod. ☉

* **Grossularia** ribes fructu rubro, folio
Uvæ crispæ. ☉

H.

H.

HALIMUS latifolius .f. fruticosus B.
pin. primus Clus. ☉

Halimus .f. Portulaca marina B. pin. Por-
tulaca marina, an Crithmum Dioscoricis
Icon. Lob. ☉

Hedera arborea B. pin. corymbosa Obs.
Lob. ☉

Hedera helix Dod. major sterilis B. pin. ☉

Hedera terrestris vulgaris B. pin. terrestris
Dod. Eadem flore carneo. ☉

Hedera saxatilis magno flore B. pin. Asa-
rina Lobelii hist. Lugd. ☉

Hedera trifolia Canadensis Cornuti. ☉

Hedera quinquefolia Canadensis Cornuti. ☉

* Hedera corymbosa fructu luteo, Hedera
Dionysii, & chrysocharpos Lugd. ☉

* Hedera trifolia Canadensis folio sinuato,
☉ ☉ ☉

Hedysarum triphyllum Canadense Cornu-
ti. ☉

Helenium Dod. vulgare B. pin. ☉

Helenium

- Helenium Indicum maximum** B. pin. Flos
folis major hort. Eyst. ♀
- Helenium Indicum ramosum** B. pin. Flos
folis prolifer hort. Eyst. Idem semine al-
bo, cinericeo, & striato. ♀
- Helenium Indicum tuberosum.** Flos solis
Farnesianus, Aster pervanus tuberosus
Col. ☉
- Helenium Canadense præaltum alato cau-
le.** ☿ ☉
- Helenium Canadense præaltum Vosacan-
dictum.** ☿ ☉
- Helenium Canadense humilium latifolium**
☿ ☉
- Helichrysum foliis oblongis Stæchadi ci-
trinæ similibus** B. pin. Chryfocome pe-
regrina hort. Eyst. ☉
- Helichrysum .f. Stocchas citrina augustifolia**
B. pin. Stæchas citrina Dod. ☉
- Heliotropium majus Clus. majus Dioscori-
dis** B. pin. ♀
- Heliotropium minus tricoccum, Clus. tri-
coccum** B. pin. ♀

Helleborus

Helleborus niger foetidus B. pin. **Helleboraster maximus** flore & semine prægnaus
Obs. & Icon. Lob. ☉

Helleborus niger hortensis flore viridi B. pin. **niger adulterinus hortensis** Fuchf. ☉

Helleborus niger flore roseo B. pin. **niger legitimus** Clus. ☉

Helleborus niger flore roseo minor Belgicus. ☉

Helleborus niger trifolius Ald. hort. Farn. ☉

Helleborus niger Saniculæ folio major B. pin. **Astrantia nigra** Obs. & Icon. Lob. ☉

Helleborus Saniculæ folio minor B. prodr. ☉

Helleborus Hippocratis Tab. **niger tenuifolius** Buphtalmi flore B. pin. ☉

Helleborus albus flore subviridi B. pin. **albus** flore herbaceo hort. Eyft. ☉

Helleborus albus flore atrorubente B. pin. hort. Eyft. ☉

Helleborine latifolia montana B. pin. **Epipactis latifolia** hort. Eyft. ☉

Helleborine angustifolia palustris .s. pratensis B. pin. **Helleborine, sive Epipactis recentiorum** Obs. & Icon. Lob. ☉

Helleborine flore albo, vel **Damasonium**
non-

montanum latifolium B. pin. *Epipactis angustis foliis hort.* Eyst. ☉

Helleborine montana angustifolia purpurascens B. pin. recentiorum sexta Clus. ☉

Helleborine herbaceo flore. ☉ ☉

* Helleborine .f. calceolus marianus, vide calceolus mariz.

Hesperis hortensis B. pin. *Viola matronalis* flore albo hort. Eyst. Eadem flore purpureo quæ

Viola matronalis flore purpureo hort. Eyst. ☉

Hesperis flore pleno albo. *Viola matronalis* flore multiplici Cornuti descr. ☉

* Hesperis Syriaca Eyst. peregrina siliquis articulatis C. B. P. ♀

* Hesperis sylvestris hirsuta foliis Hieracii B. prodr. ♀

Hieracium majus folio Sonchi, vel Hieracium Sonchites B. pin. majus Fuchf. ☉

Hieracium majus foliis Sonchi femine curvo B. pin. Creticum pro *Endivia lutea* missum Cam. descr. *Sonchus asper laciniatus Creticus* B. prodr. ♀

Hiera-

Hieracium arborescens palustre B. pin. **Sonchus lævior** **Astriacus altissimus quintus** Clus. ☉

Hieracium Apulum flore suaverubente Col. **dentis leonis folio flore suaverubente** B. pin. ♀

Hieracium odore Apuli suaverubentis. ☿
♀

Hieracium dentis leonis folio monoclonon B. pin. **intybaceum** Tab. ☉

Hieracium dentis leonis folio hirsutie asperum minus laciniatum B. pin. & prodr. ☉

Hieracium dentis leonis folio hirsutie asperum magis laciniatum B. pin. ☉

Hieracium minus dentis leonis folio oblongo glabro B. pin. **Hyoseris angustifolia** Tab. ☉

Hieracium minus folio subrotundo B. pin. **minimum nonum** Clus. ♀

Hieracium maximum asperum Chondrillæ folio B. prodr. ♀

Hieracium Chondrillæ folio glabrum B. pin. **aphacoïdes** Tab. ♀

Hieracium Chondrillæ folio glabro radice succisâ majus B. pin. **minus præmorsâ radice** Obs. & Icon. Lob. ☉

Hiera-

Hieracium capitulum inclinans semine ad-
unco B. pin. facie Hedychnois Icon.
Lob. ☿

Hieracium filiquâ falcata B. pin. Narbo-
nense falcata filiquâ Lobelii hist. Lugd. ☿

Hieracium echioïdes capitulis cardui bene-
dicti B. pin. echioïdes, Buglossum lute-
um Tab. ☿

Hieracium octavum folio Hedychnoidis
Clus. montanum dentis leonis folio in-
cano, vel laciniatum lanuginoso folio B.
pin. ☉

Hieracium phlomoïdes Tab. Alpinum lati-
folium hirsutiae incanum flore magno B.
pin. ☉

Hieracium montanum tomentosum. An vil-
losum quintum Clus. ☉

Hieracium montanum majus latifolium
Tab. montanum latifolium glabrum ma-
jus B. pin. ☉

Hieracium murorum folio pilosissimo B. pin.
Corchorus Dal. hist. Lugd. ☉

Hieracium murorum folio non maculato
minus piloso. ☿ ☉

Hieracium fruticosum latifolium foliis den-
tatis glabrum B. pin. majus latifolium vel
secundum

- secundum Clus. descr. frutescens latifolium polyanthos hort. Eyst. ☉
- Hieracium Sabaudum Penæ & Lobelii hist. Lugd. fruticosum angustifolium majus B. pin. ☉
- Hieracium montanum alterum λευπτομακρόφυλλον Col. ♀
- * Hieracium foliis & floribus Dentis leonis bulbosi semine curvo. ☉ ♀
- * Hieracium angustifolium glabrum .s. Pilosilla major glabra. ☉ ☉
- * Hieracium calice barbato Col. proliferum falcatum C. B. P. ♀
- * Hieracium ramosum magno flore B. in prodr. 14 ♀
- * Hieracium Pulmonaria non maculata indefectis foliis. ☉ ♀
- Holosteum hirsutum albicans minus B. pin. Salmanticense minus Clus. ☉
- Holosteum strictissimo folio majus B. pin. Serpentina Matthioli Dod. ☉
- Holosteum strictissimo folio minus B. pin. Serpentina omnium minima Lobelii hist. Lugd. ☉
- Holosteum Alsinæ flore. ☉ ☉

Holoſteo

Holosteo affinis, *Cauda muris* B. pin. *Cauda murina* Dod. ♀

Hordeum polystichum hybernum B. pin. *polystichum* Fuchf. ♀

Hordeum distichon Dod. B. pin. ♀

Horminum Creticum Prosp. Alp. de exot. *lativum* B. pin. ♀

Horminum Sclarea dictum B. pin. *Sclarea* Matth. ed B. Obs. Lob. ☉

Horminum luteum glutinosum B. pin. *Colus Jovis* Obs. & Ad. Lob. ☉

Horminum sylvestre latifolium verticillatum B. pin. *sylvestre tertium* Clus. ☉

Horminum pratense foliis ferratis B. pin. *sylvestre* Fuchf. hist. Lugd. *Idem flore albo* ☉

Horminum angustifolium laciniatum flore cœruleo. An *sylvestris* quarti, quinta species Clus. ☉

Horminum Lapathi unctuosifolio. ☉ ☉

* *Horminum flore minore folio integro*.

☉ ☉

* *Horminum flore minore dilute cœruleo folio sinuato*. ☉ ♀

G

* *Hormi-*

- * *Horminum* flore majore amplo violaceo
Lobis punctis aureis notatis. ♂ ♀
- * *Horminum* flore majore *Salviæ* folio forte
Marum *Ægyptiacum* Prosp. Alp. ♀
- * *Hormium* flore majore sylvestris 5 altera
species Clus. ☉

Hyacinthus comosus major purpureus B.
pin. *comosus spurius hort.* Eyst. Idem
flore albo & carneo. ☉

Hyacinthus Sannesius comâ paniculosâ Col.
paniculâ cœruleâ B. pin. ☉

Hyacinthus racemosus cœruleus major B.
pin. *botryoïdes cœruleus hort.* Eyst. ☉

Hyacinthus racemosus cœruleus minor lati-
folius B. pin. *botryoïdes cœruleus hort.*
Eyst. ☉

Hyacinthus botryoïdes floribus albis hort.
Eyst. ☉

Hyacinthus racemosus cœruleus minor jun-
cifolius B. pin. *racemosus* Dod. *comosus*
minor Obs. Lob. ☉

Hyacinthus racemosus moschatus B. pin.
Muscari obsoletiore flore Clus. ☉

Hyacinthus racemosus moschatus luteus B.
pin. *Muscari flavo flore* Clus. ☉

Hyacin-

Hyacinthus oblongo flore cœruleus major
 B. pin. Anglicus & Belgicus Obs. & Icon.
 Lob. ☉

Hyacinthus Belgicus candidus Icon. Lob. ☉

Hyacinthus floribus Campanulæ utrinque
 dispositis B. pin. Neapolitanus Swert. ☉

Hyacinthus oblongo cœruleo flore minor
 B. pin. minor Hispanicus Clus. cur. post.
 descr. Ger. Icon. ☉

Hyacinthus orientalis albus primus B. pin.
Orientalis niveus Clus. ☉

Hyacinthus brumalis orientalis Gemmæ ex
 Lobelio hist. Lugd. ☉

Hyacinthus orientalis maximus B. pin. ☉
Orientalis polyanthos Clus. ☉

Hyacinthus orientalis flore duplici hort.
 Eyst. B. pin. ☉

Hyacinthus orientalis flore cœruleo pleno
 hort. Eyst. ☉

Hyacinthus stellatus vulgaris Clus. *stellaris*
trifolius B. pin. ☉

Hyacinthus stellatus albo flore Clus. *Ident*
flore carneo. ☉

Hyacinthus stellatus cineracei coloris Clus.
stellaris Sommeri Ger. *Stellaris spicatus*
cinereus B. pin. ☉

Hyacinthus stellatus lilifolius Clus. **Stellaris**
foliis & radice Lili B. pin. ☉

Hyacinthus stellaris autumnalis minor B.
pin. autumnalis minor Dod. ☉

Hyacinthus stellatus Peruvianus Clus. **Indicus**
bulbosus stellatus B. pin. Idem flore al-
bo. ☉

Hyacinthus Indicus tuberosa radice Clus.
Indicus tuberosus flore Hyacinthi orient-
talis B. pin. ☉

Hyoisycamus vulgaris vel niger B. pin. niger
Dod. ♀

Hyoisycamus albus Dod. albus major vel
tertius Dioscoridis B. pin. ♀

Hyoisycamus aureus Prosp. Alp. exot. ♀

Hypecoon legitimum Clus. **Hypecoum** B.
pin. ♀

Hypericum Dod. vulgare B. pin. ☉

Hypericum minus supinum, vel **supinum**
glabrum B. pin. **minimum supinum Sep-**
trionale Icon. Lob. ☉

Hypericum supinum tomentosum alterum
Clus. supinum Dod. ☉

Hype-

Hypericum frutescens Americanum flore albo Park. **Pruno sylvestri affinis Canadensis** B. pin. app. ☉

Hyssopus vulgaris Dod. officinarum **œrulea .s. spicata** B. pin. ☉

Hyssopus rubro flore hort. Eyst. B. pin. ☉

Hyssopus flore albo hort. Eyst. **vulgaris alba** B. pin. ☉

* **Hyssopus hirsuta & striata.** ☉

Hyssopus latifolia B. prodr. ☉

Hyssopus angustifolia spicato flore Clus. **angustifolia spicata** B. pin. ☉

Hyssopifolia .s. Gratiola minor B. prodr. **Gratiola minor** Matth, ed. B. ☉

I.

JACEA **Austriaca villosa** capite Clus. **latifolia capite hirsuto** B. pin. ☉

Jacea Lusitanica sempervirens. ☉ ☉

Jacea nigra Dod. **nigra laciniata** B. pin. ☉

Jacea lutea capite spinoso B. pin. **luteo flore** Clus. ☉

G 3

Jacea

Jacea cyanoïdes echinato capite B. pin.
Stœbe Salmantica secunda Clus. *Cyanoïdes flos* Dod. ☉

Jacea latifolia purpurea capitulo spinoso F.
 prodr. ☉

Jacea capite longis aculeis spinoso B. prodr.
 ☉

Jacea montana incana capite Pini B. pin. ♀

Jacea Oleæ folio capitulis simplicibus B.
 pin. *Ptarmica Austriaca* Dod. Clus. ♀

Jacea Oleæ folio minore flore B. pin. *Ptarmicæ Austriacæ species* Clus. cur. post. ♀

* *Jacea Babylonica* B. prodr. ☉

* *Jacea fruticans Pini folio* C. B. *Stœbe*

capitata Korismarini folio Pona. ☉

* *Jacea integri folia humilis* C. B. ☉

* *Jacea pumila* Adv. Lob. ☉

Jacobæa Dod. vulgaris laciniata B. pin. ☉

Jacobæa foliis amplioribus incanis. ☉

Jacobæa maritima B. pin. *Cineraria* hist.

Lugd. ☉

* *Jacobæa Crithmi litorei foliis.* ☉ ☉

* *Jacobæa Senecionis folio.* ☉ ♀

Jasminum Dod. vulgatus flore albo B.
 pin. ☉ *Jasmi-*

Jasminum humilium magno flore B. pin. Gelsimum Catalonicum hort. Eyst. ☉

Jasminum humile luteum B. pin. flore luteo hort. Eyst. ☉

Jasminum luteum vulgò dictum bacciferum B. pin. Polemonium Monspeliensium Icon. Lob. ☉

Jasminum flavum odoratum. Gelsimum Indicum flavum odoratissimum Bapt. Ferr. ☉

Jasminum purpureum praelongis siliquis. Gelsimum hederaceum Indicum Cornuti. Indicum flore phoeniceo Bapt. Ferr. ☉

Iberis Cardamantica Obs. Lob. Iberis latiore folio B. pin. ☉

* Iberis Nasturtii folio Matth. ed. B. ♀

* Iberis virginiana latifolia ramosa. ♂ ♀

Ilex major glandifera Dod. folio rotundiore molli modicèque sinuato B. pin.

Ilex minor coccigera Dod. aculeata cocciglandifera B. pin.

Imperatoria Matthioli hist. Lugd. major B. pin. ☉

Intybus sativa latifolia, .s. *Endivia vulgaris*
B. pin. *Intybum sativum* Dod. ♀

Intybus sativa angustifolia B. pin. minor
Matth. ed. B. ♀

Intybus crispa B. pin. *Intubum crispum* hist.
Lugd. ♀

Iris nostras vulgaris Icon. Lob. *vulgaris Obs.*
eiusdem vulgaris Germanica .s. sylvestris
B. pin. ☉

Iris alba florentina B. pin. *florentina hort.*
Eyst. ☉

Iris latifolia major .s. Susiana Clus. *Susiana*
flore maximo ex albo nigricante B. pin. ☉

Iris Dalmatica major hist. Lugd. *Asiatica*
cœrulea polyanthos B. pin. *Eadem flore*
violaceo, & dilutius violaceo. ☉

Iris exotica Camis major latifolia 14^o Clus.
latifolia odore Oxyacanthæ B. pin. ☉

Iris latifolia pannonica colore multiplici B.
pin. *major latifolia* 15^o Clus. ☉

Iris palustris lutea Tab. *Acorus adulterinus*
B. pin. ☉

Iris Tripolitana Clus. *descr. media longissi-*
mis foliis lutea B. pin. ☉

Iris sylvestris Byzantina peramoena Icon.
Lob.

- Lob. pratensis angustifolia non foetida**
altior B. pin. ☉
- Iris angustifolia prunum redolens minor B.**
pin. perpusilla sylvestris angustifolia Obs.
Lob. ☉
- Iris bulbosa latifolia .s. prima Clus. bulbosa**
latifolia acaulos odora B. pin. Eadem
flore albo. ☉
- Iris Persica variegata præcox Bapt. Ferr. ☉**
- Iris bulbosa Anglicana flore cœruleo hort.**
Eyft. ☉
- Iris bulbosa Anglicana major flore candido**
hort. Eyft. ☉
- Iris bulbosa violaceo flore Clus. foliis cepa-**
ceis maculatis flore purpureo inodoro
B. pin. ☉
- Iris bulbosa latifolia vulgò dicta Iris l' Ab-**
bé. ☉ ☉
- Iris alba oris cœruleis Swert. & Rob. in**
horto Valet. ☉
- Iris bulbosa lutea varicolor B. pin. ☉**
- Iris tuberosa Belgarum Icon. Lob. tuberosa**
folio anguloso B. pin. ☉
- * **Iris tuberosa matitima C. B. P. ☉**
- * **Iris bulbosa lutea major. ☉ ☉**

Isatis

Isatis lativa, vel latifolia B. pin. *Glastum fativum* Obs. & Icon. Lob. ☞

Jujubæ majores oblongæ B. pin. *Ziziphus rutila* Clus.

Juncus acutus paniculâ sparsâ B. pin. *acutus* Dod. ☉

Juncus maximus .s. Scirpus major B. pin. *Holoschoenus* Dod. ☉

Juncus lævis paniculâ sparsâ major B. pin. *lævis* Dod. ☉

Juncus lævis paniculâ non sparsâ B. pin. *lævis glomerato flore* Icon. Lob. ☉

Juncellus omnium minimus Ad. Lob. descr. ☉

Juncus capitulis Equiseti major B. pin. *clavatus Dalechampii* hist. Lugd. ☉

Juncus Lithospermi femine. ☞ ☉

* *Juncus acutus caule triangulo* B. in prodr. ☉

* *Juncus acutis Sorghi capitulis.* ☞ ☉

Juniperus Dod, *vulgaris fruticosa* B. pin.

K.

K.

KALI geniculatum majus B. pin. Sali-
cornia Dod. ♀

Kali spinoso affinis B. pin. Tragum Matth.
ed. B. ♀

* Kali sempervirens grandius perpetuum
B. prodr. descr. ○

* Kali minus Gesn. hort. album Ger. ♀

L.

LACTUCA sativa B. pin. sativa folio Sca-
riolæ Obs. & Icon. Lob. ♀

Lactuca Romana dulcior nigriore, & Sca-
riolæ hortensis folio, semine nigro Ad.
Lob. folio obscurius virente, semine ni-
gro B. pin. ♀

Lactuca maculosa B. pin. fusci ac veluti
purpurei coloris .f. ex albido rubicunda
Dod. descr. ♀

Lactuca capitata Dod. B. pin. ♀

Lactuca

- Lactuca Italica laciniata** B. prodr. ♀
Lactuca crispa Dod. B. pin. ♀
Lactuca crispa secunda Tab. ♀
Lactuca sylvestris costâ spinosâ B. pin. syl-
 vestris Dod. ♀
Lactuca sylvestris odore viroso B. pin. a-
 grestis Ad. & Icon. Lob. ♀
Lactuca montana purpureocœrulea major B.
 pin. **Sonchus montanus purpureus** πλε-
 πταλον Col. ☉

**Lamium purpureum foetidum folio subro-
 tundo** B. pin. **Urtica iners altera** Dod.
 Idem flore albo. ♀
Lamium purpureum, vel album non foetens
 folio oblongo B. pin. **Urtica iners** s.
Lamium primum Dod. Idem flore lu-
 teo. ☉
Lamium folio oblongo luteum B. pin. lute-
 um Icon. Lob. ☉
Lamium maculatum, & albâ lineâ notatum
 B. pin. **Lamium Plinii Campoclarense &
 montanum** Col. ☉
Lamium foliis caulem ambientibus majus
 B. pin. **Ballote crispa major hist** Lugd. ♀
Lamium maximum sylvaticum B. pin. Ur-
 tica

tica herculea Tragi hist. Lugd. Galeopsi legitima Clus. ☉

Lamium maximum sylvaticum alterum B. pin. Galeopsis maxima pannonica Clus. ☉

Lamium montanum Melissæ folio B. pin. Melissophyllum verum Fuchs. Idem flore albo quod

Lamium pannonicum primum albo flore Clus. ☉

Lamium peregrinum .s. Scutellaria B. pin.

Lamium astragaloides Cornuti. Cassida Col. ☉

* Lamium Parietariæ facie. ☿ ☉

Lapathum sativum Dod. utr. ed. Hippolapathum hortense hist. Lugd. ☉

Lapathum hortense .s. Spinacia femine spinoso B. pin. Spinacia hist. Lugd. ♀

Lapathum hortense s. spinacia femine spinoso B. pin. Spinachia femine non spinoso Matth. ed. B. ♀

Lapathum folio acuto plano B. pin. sylvestre .s. Oxylapathum Dod. ☉

Lapathum folio acuto crispo B. pin. acutum crispum Tab. ☉

Lapathum sanguineum Obs. Lob. folio acuto rubente B. pin. ♀ La-

Lapathum acutum minimum Icon. Lob.
minimum B. pin. ☉

Lapathum unctuosum B. pin. Bonus henri-
cus Matth. ed. B. ♀

Lapathum folio subrotundo B. pin. folio
minus acuto Icon. Lob. fidium instar. J.
B. ☉

Lapathum rotundifolium Cam. Hippola-
pathum rotundifolium montanum B.
pin. ☉

Lapathum aquaticum folio cubitali B. pin.
Hydrolapathum majus Obs. Lob. ☉

Lappa major, Arcium Dioscoridis B. pin.
Bardana, sive Lappa major Dod. ♀

Lappa minor, Xanthium Dioscoridis B. pin.
Xanthium Fuchf. ♀

Larix Dod.

Laserpitium Gallicum B. pin. è regione
Massiliae repertum Ad. Lob. ☉

Laserpitium alterum. ☉ ☉

* *Laserpitium fol. Lobatis augustis.* ☉ ☉

* *Laserpitium fol. Lobatis latioribus sem.*
crispo, costus amara sem. crispo J. B. ☉

Lathy-

(III)

Lathyrus major B. pin. **Cataputia vulgaris**
hort. Eyst. ♀

Lathyrus sativus flore fructuque albo B.
pin. **Aracus** s. **Cicera** Dod. Idem flore
purpureo. ♀

Lathyrus sylvestris minor B. pin. **Catanance**
Dodonæi hist. Lugd. ♀

Lathyrus latifolius B. pin. **Clymenum** Mat-
thioli Clus. ☉

Lathyrus latifolius annuus fliquâ hirsutâ.
☉ ☉

Lathyrus sylvestris luteus foliis viciæ B. pin.
Legumen terræ glandibus simile Dod. ☉

Lathyrus arvensis repens tuberosus B. pin.
Terræ glandes Dod. ☉

Lathyrus flore obsoleto, fliquâ pisi mino-
ris. ☉ ♀

Lathyrus Baticus flore luteo Park. ♀

* **Lathyrus Narbonensis angustifol.** major
J. B. ☉

* **Lathyrus angustifol. Baticus elegans** fi-
liquis Orobi Park. ♀

* **Lathyrus**, fliquâ breviori,
fol. tenuiori, flore rubro. J. B. ♀

* **Lathyrus**, fliquâ pisi minoris
flore rubro. ☉ ♀ * La-

* *Lathyrus* $\alpha\epsilon\tau\eta\beta\lambda\omicron\sigma\sigma$, sem. hexedro, flore
cœruleo. ♂ ♀

* *Lathyrus* $\lambda\omicron\tau\eta\beta\lambda\omicron\sigma\sigma$, sem. rotundo, flore
rubello. ♂ ♀

Lavandula latifolia B. pin. *Nardus Italica*.
Matth. ed. B. ☉

Lavandula angustifolia B. pin. altera Dod.
Eadem flore albo quæ

Lavandula alba Icon. Lob. ☉

Lavandula folio dissecto B. pin. *Lavendula*
multifido folio Clus. ♀

Laureola Dod. sempervirens flore viridi,
quibusdam *Laureola mas* B. pin. ☉

Laureola folio deciduo, flore purpureo B.
pin. *Mezereum Germanicum* Obs. Lob.
Idem flore albo B. pin. descr. ☉

Laurus vulgaris B. pin. *Laurus* Matth. ed. B.

Laurus tinus cœruleâ baccâ Icon. Lob. syl-
vestris *Corni feminae foliis subhirsutis* B.
pin,

* *Laurus Indica* hort. Fernesiani.

Laurus Alexandrina fructu pediculo infi-
dente B. pin. *Hippoglossum* Dod. ☉

Laurus

Laurus Alexandrina fructu folio infidente
 B. pin. Alexandrina vera hist. Lugd. ☉

Laurus Alexandrina fructu longis pediculis
 caulibus alligato, ☿ ☉

Lenticula palustris quadrifolia B. pin. Lem-
 na Theophrasti hist. Lugd. ♀

Lens vulgaris B. pin. minor Dod. ♀

Lens major Tab. B. pin. ♀

Lentiscus Dod. vulgaris B. pin.

Leontopetalon Dod. ☉

Lepidium Plinii Dod. latifolium B. pin. ☉

Lepidium annuum Lobelii hist. Lugd. gla-
 stifolium B. pin. ♀

Lepidium, Dentellaria dictum B. pin. Plum-
 bago quorundam Clus. ☉

Leucoium bulbosum vulgare B. pin. bul-
 bosum hexaphyllum Dod. ☉

Leucoium bulbosum trifolium minus B. pin.
 bulbosum triphyllum Dod. ☉

Leucoium incanum majus B. pin. candidum
 majus Dod. ☉ H Leu-

Leucoium purpureum vel rubrum B. pin.
flore rubro simplici hort. Eyst. Idem,
quod violaceum Tab. ☉

Leucoium incanum majus variegatum sim-
plici flore B. pin. ☉

Leucoium incanum majus multiplex B. pin.
flore pleno albo, rubro pleno hort. Eyst.
Idem flore pleno violaceo. ☉

Leucoium incanum majus variegatum ple-
no flore B. pin. purpureum variegatum
flore pleno hort. Eyst. ☉

Leucoium maritimum sinuato folio B. pin.
marinum majus Clus. ☉

Leucoium maritimum angustifolium B. pin.
marinum minus Clus. ☉

Leucoium alyssoides clypeatum majus B.
pin. Alysson Dioscoridis Dod. ♀

Leucoium incanum siliquis rotundis B. pin.
marinum Patavinum Obs. & Icon. Lob.
Eruca peregrina Clus. ☉

Leucoium album odoratissimum folio viri-
di B. prodr. ☉

Leucoium luteum magno flore B. pin. flos
Keiri simplex medius hort. Eyst. ☉

Leucoium luteum vulgare B. pin. luteum
Dod. ☉

Leu-

Leucoium luteum sylvestre angustifolium
B. pin. sylvestre Clus. ☉

Leucoium flore luteo pleno majus hort.
Eyst. B. pin.

Idem flore pleno variegato. ☉

Leucoium flore luteo pleno minus hort.
Eyst. ☉

* **Leucoium montanum flore pedato Col.**
☉

Libanotis latifolia altera .f. vulgatio B.
pin. Sefeli Æthiopicum herba Dod. ☉

Libanotis latifolia Aquilegiæ folio B.
prodr. ☉

Libanotis Ferulæ folio, semine anguloso B.
pin. Cachrys verior, Libanotis Galeno
Obs. Lob. ☉

Libanotis Ferulæ folio & semine B. pin.
Panaces Asclepium Dod. ☉

Ligusticum vulgare, An Libanotis fertilis
Theophrasti B. pin. Levisticum vulgare
Dod. ☉

Ligusticum, quod Sefeli officinarum B. pin.
Siler montanum Dod. ☉

Ligusticum .f. Siler montanum angustifoli-
um B. prodr. ☉

H 2

Li-

Ligustrum Matth. ed. B. Germanicum B.
pin.

Ligustrum foliis laciniatis B. pin. nigrum
Prosp. Alp. de exot. Agem Lilag Persa-
rum Cornuti.

Lilium candidum Dod. album flore erecto
& vulgare B. pin.

Lilium album inodorum flore pleno. ☉

Lilium purpurocroceum majus B. pin. He-
merocallis Matth. ed. B. ☉

Lilium floribus reflexis montanum B. pin.
montanum flore purpurascente puncta-
tum hort. Eyst. ☉

Lilium floribus reflexis alterum lanugine
hirsutum B. pin. flore purpurascente non
punctatum hort. Eyst. ☉

Lilium floribus reflexis albis non punctatis
B. pin. montanum minus album non pun-
ctatum hort. Eyst. ☉

Lilium purpuro-sanguineum flore reflexo B.
pin. Hemerocallis Chalcedonica purpu-
ro-sanguinea polyanthos Obs. Lob. ☉

Lilium flavum angustifolium B. pin. monta-
num flavo flore Lobel. Ad. part 2^a. ☉

Lilium .s. Corona imperialis B. pin. Corona
imperialis Dod. ☉ Li-

- Lilium .f. Corona imperialis flore luteo B.**
pin. descr. & Clus. descr. ☉
- Lilium .f. Corona imperialis duplici corona**
B. pin. Corona imperialis florum classe
• duplici hort. Eyst. ☉
- * **Lilium .f. Corona imperialis fol. vario**
☉ ☉
- Lilium Persicum Dod.** ☉
- Lilium luteum Asphodeli radice B. pin. Li-**
liasphodelus luteo flore Clus. ☉ **Angu-**
stifolius flore luteo.
- Lilium rubrum Asphodeli radice B. pin. Li-**
liasphodelus puniceus Clus. descr. ☉
- * **Liliasphodelus latifolius flore luteo.**
☉ ☉
- * **Lilium .f. Martagon Canadense.** ☉ ☉
- Lilionarcissus Indicus Bapt. Ferr.** ☉
- Lilium convallium Matth. ed B. album B.**
pin. ☉
- Lilium convallium flore rubente B. pin. flo-**
re suaverubente Icon. Lob. ☉
- Lilium convallium minus B. pin. Monophyl-**
lon Matth. ed. B. ☉
- Limonium Matth. ed. B. maritimum majus**
B. pin. ☉

- Limonium parvum Bellidis minoris folio B.**
 pin. pumilum Clus. descr. ☉
Limonium Rauwolfii .s. peregrinum Clus.
 cur. post. peregrinum foliis Asplenii B.
 pin. ♀

Linaria latifolia Dalmatica magno flore B.
 prodr. ♀
Linaria Bellidis folio B. prodr. purpurea o-
 dorata Obs. & Icon. Lob. ☉
Linaria scoparia B. pin. Osyris Dod. ♀
Linaria vulgaris lutea flore majore B. pin.
 prima Dod. ☉
Linaria lutea flore minimo B. pin. ♀
Linaria aurea Tragi Obs. & Icon. Lob.
 folioso capitulo luteo major B. pin. ☉
Linaria folioso capitulo luteo minor B. pin.
 aurea minor Tab. ☉
Linaria purpurea major odorata B. pin.
 altera purpurea Dod. ☉
Linaria arvensis cœrulea erecta B. prodr. ♀
Linaria montana flosculis albicantibus B.
 pin. Anthyllis montana hist. Lugd. ☉
Linaria quadrifolia lutea B. pin. tetraphylla
 lutea Col. ♀
Linaria cœrulea repens B. pin. Osyris pur-
 purocœrulea

purocœrulea repens Icon. Lob. Eadem
flore albo. ☉

Linaria minima hirsuta flore cbsoluto. ☉ ☿

Linaria minor cœrulea recta Park. ☿

* *Linaria minor viscosa* flore luteo. ☉ ☿

* *Linaria Armorica* flore saturate vio-
laceo. ☉ ☿

* *Linaria major angustifolia glabra* flore
luteo maj. ☉ ☿

Lingua cervina officinarum B. pin. *Phyllitis*
Dod. ☉

Lingua cervina multifido folio B. pin. *Phil-
litis laciniata* Dod. ☉

Linum sativum Dod. B. pin. ☿

*Linum sylvestre luteum foliis subrotun-
dis* B. pin. *Campanula lutea linifolia* Pe-
næ hist. Lugd. ☉

Linum maritimum luteum B. pin. *marinum
luteum Narbonense* Obs. & Icon. Lob. ☉

*Linum sylvestre angustifolium floribus di-
lutè purpurascens, vel carneis* B. pin.
sylvestre sextum angustifolium Clus.
descr. ☉

Linum sylvestre minus B. pin. *Chamælinum*

- .s. *Linum sylvestre perpusillum* Obs. &
Icon. Lob. ♀
- Linum pratense flosculis exiguis* B. pin.
sylvestre catharticum Ger. *Linocarpos*
Thal. ♀
- * *Linum annuum luteum folio latiore.* ☉
♀
- * *Linum annuum luteum folio angustiore.*
☉ ♀
- * *Linum perenne cœruleum sativo æmu-*
lum. ☉ ☉
- * *Linum minimum stellatum* B. prodr. ♀
- Lithospermum arundinaceum* Dal. hist.
Lugd. arundinaceum forte Dioscoridis
& *Plinii* B. pin. ♀
- Lithospermum majus erectum* B. pin. minus
Dod. ☉
- Lithospermum minus repens latifolium* B.
pin *repens majus* Clus. ☉
- Lithospermum arvense radice rubra* B pin.
nigrum Dal. hist. *Lugd.* ♀
- Lithospermum Linariæ folio Germanicum*
B. pin. *Linaria altera botryoïdes montana*
Col. ♀

Lonchitis

Lonchitis aspera Dod. minor B. pin. ☉

Lotus hortensis odora B. pin. *Trifolium odoratum alterum* s. *Lotus sativa* Dod. ♀

Lotus s. *Melilotus pentaphyllos minor glabra* B. pin. *Trifolium corniculatum primum* Dod. ☉

Lotus pentaphyllos minor hirsutus siliqua angustissima B. pin. *Trifolium corniculatum minus pilosum ejusdem* prodr. descr. ☉

Lotus pentaphyllos siliquosus villosus B. pin. *hæmorrhoidalis major* s. *Trifolium hæmorrhoidale majus* Park. ☉

Lotus siliquosus glaber flore rotundo B. pin. *Lybica* Dal. hist. Lugd. ☉

Lotus fruticosus incanus siliquosus B. pin. *asperior fruticosa* s. *Narbonensis incana* Obs. & Icon. Lob. ☉

Lotus pratensis siliquosus luteus B. pin. *trifolia pratensis siliquosa Monspeliensium* Icon. Lob. ☉

Lotus raber siliqua angulosa B. pin. *tetragonolobus Camerarii hort.* Eyst. ♀

Lotus siliquis Ornithopodii B. pin. *peculiaris siliquis Ornithopodii* Cam. ♀

Lotus

Lotus pentaphyllos vesicaria B. pin. **Trifolium halicacabum** Cam. ♀

* **Lotus siliquis singularibus, binis Ternisve** J. B. ♀

Loto affinis vulneraria pratensis B. pin. **Anthyllis leguminosa Belgarum** Obs. & Icon. Lob. ☉

Loto affinis hirsuta flore subrubente B. pin. **Anthyllis leguminosa purpurascente flore** Clus. descr. ☉

Lotus arbor Obs. Lob. **Lotus fructu Ceraci** B. pin.

Lotus latifolia Africana B. pin. **Guajacum Patavinum** Obs. & Icon. Lob.

Lupinus sativus Dod. **sativus flore albo** B. pin. ♀

Lupinus sylvestris flore cœruleo B. pin. **sylvestris** Dod. ♀

Lupinus flavo flore Clus. **sylvestris flore luteo** B. pin. ♀

Lupinus Indicus Cornuti peregrinus major, vel villosus cœruleus major B. pin. **Sativus major hort.** Eyst. ♀

* **Lupinus medius cœruleus** Park. ♀

Lupulus

Lupulus Dod. Lupulus mas B. pin. ☉

Luteola Obs. & Icon. Lob. Luteola herba
salicis folio B. pin. ♀

Lychnis hirsuta flore coccineo major B. pin.
Flos Constantinopolitanus miniatus hort.
Eyst. Eadem quæ

Flos Constantinopolitanus incarnatus
hort. Eyst.

Flos Constantinopolitanus albus hort.
Eyst. ☉

Lychnis Chalcedonica flore pleno minia-
to. ☉

Lychnis coronaria Dod. coronaria flore ru-
bro simplici hort. Eyst. coronaria Diof-
coridis sativa B. pin. ☉

Lychnis coronaria flore albo simplici hort.
Eyst. ☉

Lychnis coronaria flore incarnato punctato
hort. Eyst. ☉

Lychnis coronaria flore rubro pleno hort.
Eyst. ☉

Lychnis sylvestris alba multiplex B. pin. ○
cimoïdes majus Matthioli hist. Lugd. ☉

Lychnis sylvestris alba multiplex B. pin.
sylvestris

sylvestris flore pleno albo hort. Eyst. ☉
Lychnis sylvestris, seu *aquatica* purpurea
simplex B. pin. *sylvestris rubello* flore
 Obs. Lob. ☉

Lychnis segetum major B. pin. *Pseudome-*
lanthium Matth. ed. B. ♀

Lychnis segetum rubra foliis *Perfoliatæ* B.
 pin. *Vaccaria* Dod. Eadem flore albo. ♀

Lychnis sylvestris quæ *Been album* vulgò
 B. pin. *Behen album*, s. *Polemonium* Dod.
 ☉

* *Lychnis, Papaver spumeum angustifo-*
lium glabrum flore purpureo. ☿ ☉

* *Lychnis Papaver spumeum latifolium*
vulgare hirsutum. ☿ ☉

Lychnis sylvestris latifolia calyculis turgi-
 dis striatis B. pin. *sylvestris secunda* Clus.
 Eadem flore albo. ♀

Lychnis noctiflora B. pin. *Ocimoïdes no-*
ctiflora Cam. *Ocimaltrum noctiflorum*
 flore albo hort. Eyst. ☉

Lychnis maritima repens B. pin. *marina* An-
 glica Ad. Et Icon. Lob. ☉

Lychnis montana viscosa alba latifolia B.
 pin. *sylvestris nona* Clus. ☉

Lychnis sylvestris viscosa rubra angustifolia

folia B. pin. viscosa sylvestris flore incarnato hort. Eyst. ☿

Lychnis sylvestris viscosa rubra altera B. pin. sylvestris tertia Clus. ☿

Lychnis viscosa purpurea latifolia lævis B. pin. Muscipula flore rubro hort. Eyst. Eadem flore albo, quæ

Muscipula flore albo hort. Eyst. ☿

Lychnis viscosa flore muscoso B. pin. Sefamoides magnum Salmanticum Clus. ☉

Lychnis plumaria Tab. ☉

Lychnis sylvestris lanuginosa minor B. pin. sylvestris hirta minima Obs. & Icon. Lob. ☿

Lychnis, vel Ocimoïdes repens montanum B. pin. Ocimoïdes repens Polygoni folio Ad. Lob. ☉

Lychnis Alpina glabra Caryophylli holostii flore. ☿ ☉

Lychnis viscosa minor saxatilis. ☿ ☉

Lychnis Alpina pumila folio gramineo .f.

Muscus Alpinus Lychnidis flore B. pin.

Ocimoïdes muscosus Ponæ descr. mont.

Bald. ☉

* Lychnis flore muscoso capillaceo. ☿ ☿

* Lychnis maritima repens strictissimis foliis. ☿ ☉

* Lych-

* *Lychnis minor Alpina glabra foliis longis, an Caryophylli minima species flore albo* J. B. ☉

* *Lychnis minor Alpina hirsuta petalis non bifidis latiori fol.* ☿ ☉

* *Lychnis minor Alpina hirsuta petalis non bifidis juniperinis fol. .s. auricula muris pulchro flore, fol. tenuissimo* J. B. ☉

Lycium facie Pruni sylvestris .s. Italicum B. pin. *Spina infectoria pumila secunda* Clus.

Lycopsis B. pin. *altera Anglica* Obs. & Icon. Lob. ♀

Lycopsis Monspeliaca floribus dilutè purpureis. ♀

Lycopsis Monspeliaca floribus albis. ☿ ♀

Lysimachia lutea Fuchs. *lutea major* quæ *Dioscoridis* B. pin. ☉

Lysimachia lutea corniculata B. pin. app. ♀

* *Lysimachia corniculata minor lutea Canadensis.* ☿ ♀

* *Lysimachia lutea flore globofo* Park. Ger. ☉

Lysima-

- Lyfimachia filiquosa hirsuta magno flore B.**
 pin. purpurea Fuchf. ☉
- Lyfimachia filiquosa hirsuta parvo flore B.**
 pin. filiquosa secunda Tab. ☉
- Lyfimachia filiquosa glabra major B. pin.**
 filiquosa Obs. & Icon. Lob. ☉
- Lyfimachia filiquosa glabra minor B. pin.**
 minor Tab. ☉
- Lyfimachia Chamænerion dicta latifolia B.**
 pin. Chamænerion hort. Eyst. Onagra
 hist. Lugd. ☉
- Lyfimachia Chamænerion dicta angustifo-**
 lia B. pin. Pseudolyfimachium purpureum
 minus Dod. ☉
- Lyfimachia spicata purpurea B. pin. purpu-**
 rea communis major Clus. ☉
- Lyfimachia purpurea spicata lanuginosa:**
 ☉ ☉
- Lyfimachia spicata cœrulea B. pin. cœruleo**
 flore Clus. ☉
- Lyfimachia cœrulea galericulata, vel gra-**
 tiola cœrulea B. pin. galericulata Obs.
 & Icon. Lob. ☉
- Lyfimachia galeata minor purpurea. Gra-**
 tiola latifolia Ger. ☉

M.

M.

M AJORANA vulgaris B. pin. Majorana
 .s. Martm Dod. ☉

Malva sylvestris folio rotundo B. pin. syl-
 vestris pumila Dod. ☉

Malva sylvestris folio sinuato B. pin. sylve-
 stris procerior Dod. Eadem flore al-
 bo. ☉

Malva foliis crispis B. pin. crispa Dod. ♀

Malva trimestris Clus. ♀

Malva folio vario B. prodr. ☉ ♀

Malva rosea folio subrotundo B. pin. hor-
 tensis flore simplici rubro, incarnato, &
 albo hort. Eyst. ☉

Malva rosea folio subrotundo flore pleno
 B. pin. hortensis flore pleno rubro, atro-
 rubente hort. Eyst. ☉

Malva rosea multiplex flore albo incarnato
 hort. Eyst. ☉

Malva hortensis flore luteo simplici. Eadem
 flore pleno. ☉

Malva rosea folio ficus B. pin. rosea simplex
 peregrina Tab. ☉

Malva

Malva Hispanica. ♂ ♀

* *Malva Betonicae folio.* ♂ ♀

* *Malva marina arborea nostras* Park. ♀

Malus Dod. hist. Lugd.

Malus cydonia fructu oblongo; *cydonia foemina* Rob. Steph. præd. rust.

Malus cydonia fructu rotundo. *Cotonea* Dod.

Malus medica B. pin. *citria malus* Clus.

Malus Limonia Dod. *Limonia acida* B. pin.

Malus aurantia Dod. *aurantia major* B. pin.

Malus aurantia humilis B. pin. *Poma aurantia nana dicta hort.* Eyft.

Malus Adami B. pin. *Assyria* Dod.

Malus punica Dod. *punica sativa* B. pin.

Malus punica flore pleno. *Balaustia hort.* Eyft.

Malus Persica Dod. *Persica molli carne, & vulgaris & alba* B. pin.

Malus Persica succo quasi sanguineo B. pin.

Malus Persica dura carne candida aliquando ex albo subrubente B. pin. *Persica duracina alba* Tab.

Malus Armenia major hist. Lugd. *Mala*

Armeniaca majora B. pin.

I.

Malus

Malus Armenia minor hist. Lugd. Armeniaca minor B. pin.

Mandragora mas Fuchs, fructu rotundo B. pin. ☉

Mandragora foemina Clus, fructu pyri B. pin. ☉

Marum, Mastic Gallorum, & Anglorum
Ad. Lob. Sampsuchus, .s. Marum Mastichen redolens B. pin. ☉

* Marum Prosp. Alpini. ☉

Marrubium Cardiaca dictum B. pin. Cardiaca Dod. ☉

Marrubium aquatile Dod. palustre glabrum B. pin. ☉

Marrubium nigrum foetidum, Ballote Dioscoridis B. pin. Ballote .s. Marrubium nigrum Dod. Idem flore albo. ☉

Marrubium nigrum rotundifolium B. pin. Ocimastrum Valentinum Clus. ☉

Marrubium nigrum longifolium B. pin. Herba venti, Parietaria Cordi hist, Lugd. ☉

Marrubium album vulgare B. pin. album
Obs. & Icon, Lob. Marru-

- Marrubium album villosum B. prodr. ☉
 Marrubium album latifolium peregrinum
 B. pin. candidum alterum Hispanicum
 Obs. & Icon. Lob. ☉
 * Marrubium aquatile foliis tenuius disse-
 ctis. ☉
 * Marrubium album angustifolium pere-
 grinum C. B. P. rectum Dod. Ger. ☉

 Matricaria Dod. vulgaris B. pin. ☉
 Matricaria flore pleno B. pin. duplici flore
 Icon. Lob. ☉
 Matricaria maritima B. pin. Parthenium
 maritimum minimum hist. Lugd. ☉
 * Matricaria nuda nobis, bullatis foliis
 Park. descr. ☉

 Melampyrum purpurascens coma B. pin.
 Melampyrum Triticum vaccinum Obs.
 & Icon. Lob. ☿
 Melampyrum cristatum flore purpureo. J.
 B. ☿
 Melampyrum luteum latifolium B. pin. Cra-
 teogonon Obs. & Icon. Lob. ☿
 Melampyrum perpusillum luteum Ad. Lob.
 luteum minimum B. pin. ☿ Vide Ra-
 nunculus. I 2 Me-

Melilotus officinarum Germaniæ B. pin.
 Germanica Obs. & Icon. Lob. ♀
Melilotus procera filiquis longioribus. An
 meliloti tertium genus Dod. descr. ♀
Melilotus major candida Tragi B. pin. ♀
Melilotus Italica folliculis rotundis B. pin.
 Italica Cam. ♀

Melissa Dod. hortensis B. pin. ☉
 * *Melissa Romana* hirsutior. ☿ ☉
Melissa peregrina folio oblongo B. pin.
 Moldavica flore cœruleo, albo hort.
 Eyst. ♀
Melissa Moluccana odorata B. pin. Con-
 stantinopolitana Matth. ed. B. ♀
 * *Melissa Moluccana* spinosior Lob. Ad. ♀
Melissa Bætica. ☿ ♀

Melo hist. Lugd. vulgaris B. pin. ♀
Melo rotundus parvus B. pin. saccharatus I-
 con. Lob. ♀

Melopepo clypeiformis B. pin. Cucurbita
 laciniata hist. Lugd. ♀
Melopepo compressus B. pin. compressus
 alter Tab. ♀

Mentha

- Mentha hortensis corymbifera* B. pin. *Costus hortensis* hist. Lugd. ☉
- Mentha hortensis verticillata* Ocimi odore B. pin. *Romana angustifolia* .s. *Mentha cardiaca* Ad. & Icon. Lob. ☉
- Mentha crispa verticillata* B. pin. *sativa Dodonæi prima* hist. Lugd. ☉
- Mentha rotundifolia crispa spicata* B. pin. altera Dod. ☉
- Mentha crispa Danica*, aut *Germanica speciosa* Park. ☉
- Mentha rotundifolia spicata altera* B. pin. *Sisymbrium hortense* Matth. ed. B. ☉
- Mentha spicata folio variegato* B. pin. *Menthastrum niveum Anglicum Penæ & Lobelii* hist. Lugd. ☉
- Mentha sylvestris longiore folio* B. pin. *Menthastrum* Dod. ☉
- Mentha montana verticillata* B. pin. *Menthastrum secundum montanum* Clus. ☉
- Mentha tuberosâ radice* B. pin. *Menthastrum tertium tuberosâ radice* Clus. ☉
- * *Menthastrum tuberosâ radice flore violaceo majus*. ☉ ☉
- * *Menthastrum tuberosâ radice flore violaceo minus*. ☉ ☉

Menthastrum glabrum floribus violaceis.



*Mentha rotundifolia palustris .s. aquatica
major B. pin. Silymbrium Dod. ⊙*

*Mentha cataria vulgaris & major B. pin.
Cattaria herba Dod. ⊙*

Mentha cataria minor B. prodr. ⊙

* *Mentha cataria folio longiori Dod. ⊙*

* *Mentha cataria media tenuifolia Hispanica Clus. ⊙*

*Mercurialis mas Dod. testiculata .s. mas Di-
oscoridis & Plinii B. pin. ♀*

*Mercurialis foemina Dod. spicata .s. foemi-
na Dioscoridis & Plinii B. pin. ♀*

*Mercurialis montana testiculata B. pin. Cy-
nocrambe, Mercurialis sylvestris Dod. ⊙*

*Mercurialis montana spicata B. pin. Cyno-
crambe foemina Matth. ed. B. ⊙*

*Mespilus Dod. Germanica folio laurino non
ferrato B. pin.*

*Mespilus aronia Dod. Apii folio laciniato
B. pin.*

*Mespilus Apii folio sylvestris spinosa .s.
Oxyacantha B. pin. Spina acuta Dod.*

Meum

Meum Dod. foliis Anethi B. pin. ☉

Meum adulterinum Matth. ed. B. latifolium adulterinum B. pin. ☉

Milium Dod. semine albo B. pin. ♀

Milium semine luteo B. pin. ♀

Milium semine nigro B. pin. nigrum Dod. ♀

Milium arundinaceum subrotundo semine
Sorgo nominatum B. pin. Melica .s. Sor-
gum Dod. ♀

Millefolium vulgare album B. pin. **militaris**
.s. **Millefolium terrestre vulgare** Obs.
Lob. ☉

Millefolium vulgare purpureum minus B.
pin. terrestre purpureis floribus Obs. &
Icon. Lob. ☉

Millefolium rubro flore Clus. purpureum
majus B. pin. ☉

Millefolium odoratum minus Monspeliensium. ☉ ☉

Millefolium album foliis minus dissectis. ☉ ☉
☉

Millefolium tomentosum luteum B. pin. luteum Obs. Lob. ☉

* **Millefolium Taneceti foliis flore purpureo.** ☉ ☉

* *Millefolium Tanacetifolium* flore albo.



Mollugo Dod. *montana angustifolia*, vel
Gallium album latifolium B. pin. ☉

Moly latifolium liliflorum B. pin. *Moly*
Theophrasti Clus. Idem flore albo. ☉

• *Moly latifolium Indicum* B. pin. *Indicum*
Clus. ☉

Moly montanum latifolium flavo flore Clus.
hist. app. alt. *latifolium luteum* odore
Allii primum B. pin. ☉

Moly Dioscoridis Clus. *angustifolium um-*
bellatum B. pin. ☉

Moly moschatum capillaceo folio B. pin. &
prodr. ☉

* *Moly Indicum* Dod. *caucaphon voca-*
tum Lob.

Morus Dod. fructu nigro B. pin,

Morus candida Dod. fructu albo B. pin.

Myagrūm siliquā longā B. pin. alterum
Thlaspi effigie Obs. Lob. ♀

Myagrūm sativum Matth. ed. B. ejusdem
pin. ♀ * *Mya-*

- * *Myagrurn sylvestre minus* B. pin. ♀
Myagrurn monospermon latifolium B. pin.
 & prodr. ♀
Myagro similis filiquâ rotundâ B. prodr. ♀
Myrrhis Dod. major, vel Cicutaria odorata
 B. pin. ☉
Myrrhis sylvestris seminibus lævibus B. pin.
Myrrhis Fuchf. hist. Lugd. ☉
 * *Myrrhis perennis alba fol. hirsutis.* ☿ ☉
 * *Myrrhis perennis alba foliis hirsutiori-*
bus. ☿ ☉
 * *Myrrhis perennis alba foliis hirsutissimis.*
 ☿ ☉
 * *Myrrhis perennis lutea Daucoïdes.* ☿ ♀
 * *Myrrhis annua nodosa semine aspero.*
 ☿ ♀
Myrrhis sylvestris seminibus asperis B. pin.
sylvestris nova Æquicclorum Col. ♀
Myrtus latifolia Romana B. pin. Romana
 Matth. ed. B. ☉
Myrtus flore pleno Cornuti. ☉
Myrtus minor vulgaris B. pin. Tarentina
 hist. Lugd. ☉
 * *Myrtus latifolia maxima* Park. Clusii
 hist. fol. confertim nascentibus Laurinis.
 N.

N.

NA P U § Dod. fativa B. pin. ☞

Narcissus mediopurpureus Dod. albus circulo purpureo B. pin. ☉

Narcissus Orientalis medius totus albus polyanthos hort. Eyst. Orientalis medius albus B. pin. ☉

Narcissus totus albus major B. pin. Orientalis polyanthos minor totus albus hort. Eyst. ☉

Narcissus medioluteus Dod. pallidus circulo luteo B. pin. ☉

Narcissus medioluteus Donas Narbonensium Icon. Lob. medioluteus copioso flore odore gravi B. pin. ☉

Narcissus de Argiers polyanthos totus luteus hort. Eyst. luteus polyanthos Lusitanicus B. pin. ☉

Narcissus latifolius flore prorsus flavo Clus. luteus Constantinopolitanus B. pin. ☉

Narcissus angustifolius flavus magno calice B. pin. juncifolius primus amplo calice Clus. ☉

Nar-

Narcissus juncifolius major Dod. *juncifolius oblongo calice luteus major* B. pin.

⊙

Narcissus juncifolius flore rotundo roseo B. pin. *juncifolius flore rotundo circinato* Swert. ⊙

Narcissus maximus pallidus amplo calice flavo Clus. cur. post. descr. *latifolius pallidus calice amplo alter* B. pin. ⊙

Narcissus latifolius sulphureus, vel *albus brevi calice* B. pin. *sulphurei coloris brevi calice* Swert. ⊙

Narcissus luteus sylvestris Dod. *sylvestris pallidus calice luteo* B. pin. ⊙

Narcissus major totus luteus calice prælongo B. pin. *Pseudonarcissus major Hispanicus* Clus. ⊙

Narcissus totus luteus florum foliis reflexis B. pin. *totus luteus oblongo calice, & reflexis foliis hort.* Eyst. ⊙

Narcissus oblongâ tubâ totus albus Swert. *albus oblongo calice* B. pin. ⊙

Narcissus montanus alter flore fimbriato B. pin. *montanus juncifolius minimus alter flore luteo fimbriato* Mutoni Icon. Lob.

⊙

Narcissus

* *Nasturtium hortense latifolium* B.
prodr. ♀

* *Nasturtium Alpinum insipidum* Ger.
Tab. *Cardamine Alpina insipida* Col. ♀

* *Nasturtium sylvestre minus* B. prodr. ♀

Nerion floribus rubescentibus B. pin. flore
rubro hort. Eyst.

Nerion floribus albis B. pin. *Nerion* .s. *Rhododendron*
flore albo hort. Eyst.

Nicotiana major latifolia B. pin. *Nicotiana*
.s. *Tabacum hist.* Lugd. ♀

Nicotiana major angustifolia hort. Eyst. B.
pin. ♀

Nicotiana minor B. pin. *minor* .s. *Hyoscyamus*
luteus hort. Eyst. ♀

Nigella arvensis cornuta B. pin. *Melanthium*
sylvestre Dod. ♀

Nigella latifolia flore majore simplici cœ-
ruleo B. pin. *Melanthium Hispanicum*
majus hort. Eyst. ♀

Nigella flore majore pleno cœruleo B. pin.
Melanthium Damascenum flore pleno
hort. Eyst. ♀

Nigella

Nigella flore minore pleno & albo B. pin:
citrina Ad. Lob. descr. Eadem flore sim-
plici semine nigro. ♀

* **Nigella sylvestris** flore luteo pallido. ♂
♀

Nummularia Dod. major lutea B. pin. ⊙

Nummularia flore purpurascente B. prodr.

⊙

Nux juglans Dod. **Nux juglans** s. **Regia**
vulgaris B. pin.

* **Nux juglans** putamine fragili & fructu
tenero C. B. P.

* **Nymphæa** maj. alba C. B. Pin. alba
Matth. Dod. candida Fuchf.

* **Nymphæa** maj. lutea C. B. P. lutea Dod.
Fuchf.

* **Nymphæa minima** alba C. B. P. morsus
Ranæ Dod. Lob. Icon.

Q.

O.

OCHRUS folio integro capreolos emittente B. pin. *Ervilia sylvestris* Dod. ♀

Ocimum caryophyllatum maximum B. pin. *latifolium magnum hort.* Eyst. ♀

Ocimum Citri odore B. pin. *Citratum .s. Citri odore hort.* Eyst. ♀

Ocimum vulgatus B. pin. *Basilicum .s. Ocimum medium vulgatus hort.* Eyst. ♀

Ocimum medium foliis ex nigro virescentibus flore albo & violaceo. ♀

Ocimum Anisi odore B. pin. hort. Eyst. ♀

Ocimum minimum B. pin. *minimum caryophyllatum hort* Eyst. ♀

Ocimum minimum foliis rubescentibus. ♂
♀

* *Ocimum rubrum pleno flore.* ♂ ♀

Oenanthe Apii folio B. pin. *secunda* Matth. ed. B. hist. Lugd. ☉

Oenanthe angustifolia Obs. & Icon. Lob.

☉

Oenanthe

Oenanthe aquatica B. pin. *Juncus odoratus*
aquatilis Dod. ☉

* *Oenanthe Chærophylli foliis* C.B.P. *Ci-*
cutæ facie Ad. Lob. *Succo viroso cicutæ*
facie Lobelio J. B. ☉

Olea Dod. *sativa* B. pin.

Olea sylvestris folio duro subtus incano B.
pin. *sylvestris* Clus.

Olea Bohemica .s. Elæagnos Matth. ed. B.
sylvestris folio molli incano B. pin.

Onobrychis Dod. *foliis Vicieæ, fructu echi-*
nato major B. pin. *Caput gallinaceum*
Belgarum Obs. & Icon. Lob. ☉

Onobrychis fructu echinato minor B. pin.
Caput gallinaceum minus ejusdem prod.
descr. ☉

* *Onobrychis floré saturate rubro.* ☉

Onobrychis femine clypeato aspero major
B. pin. *Hedysarum clypeatum flore sua-*
viter rubente hort. Eyst. ♀

Onobrychis arvensis, vel Campanula arven-
sis erecta B. pin. *Viola pentagonia, Pen-*
tagonium Tab. ♀

* *Onobrychis viola pentagonia perfoliata.*

☉ ♀

K

* Ono-

* *Onobrychis viola pentagonia latiori folio oblongo.* ♂ ♀

Ophioglossum Dod. vulgatum B. pin. ☉

Ophrys Plin. *Ophris* Fuchs *bifolia* B. pin. ☉

Orchis morio mas foliis maculatis B. pin.
Testiculus morionis mas Dod. ☉

Orchis morio femina B. pin. *Testiculus morionis femina* Dod. Eadem flore roseo & albo. ☉

Orchis flore simiam referens B. pin. altera
oreades cercopithecophora Col. ☉

Orchis odore hirci longiore, angustioréque folio B. pin. *saurodes*, vel *scincophora lacertarum amulatione* Gemmæ Obs. & Icon. Lob. ☉

Orchis hermaphroditica secunda Gemmæ
f. psychodes diphylla Obs. & Icon. Lob.
bifolia altera B. pin. ☉

Orchis hermaphroditica flore flavescente.
Forte, Serapias batrachites vel myodes
 Icon. Lob. ☉

Orchis .f. Testiculus minor violaceis floribus
Cord. fucum referens major foliis superioribus

perioribus candidis & purpurascensibus
B. pin. ☉

Orchis melitias, s. Apis cadaverulum ex-
primens Obs. & Icon. Lob. fucum referens
flore subvirente B. pin. ☉

Orchis mulcæ corpus referens minor, vel
galea & alis herbidis B. pin. Orchis Sey-
rapias tertius Dod. ☉

Orchis ornithopora, vel ornithes folio levi
Obs. & Icon. Lob. papilionem expansum
herbacei coloris referens B. pin. ☉

Orchis spiralis major. Tetrorchis, vel Tri-
orchis alba Gemmæ hist. Lugd. Trior-
chis, vel Tetrorchis alba odorata major
B. pin. ☉

Orchis spiralis minor s. Testiculus odoratus
Obs. & Icon. Lob. Triorchis alba odo-
rata minor B. pin. ☉

Orchis palmata pratensis latifolia longis
calcaribus B. pin. Satyrium basilicum mas
Dod. ☉

Orchis palmata pratensis maculata B. pin.
Satyrium basilicum femina Dod. Eadem
flore candido Dod. descr. ☉

Orchis palmata minor calcaribus oblongis
B. pin. Palma Christi minor mas Tab.
Eadem flore albo, ☉ K 2 Or-

Orchis palmata palustris latifolia B. pin. *Satyrium basilicum foliosum* Dod. ☉

* *Orchis hermaphroditica* flore luteo pallido. ☉

* *Orchis palmata* flore Fusco. ☉

Origanum sylvestre .f. *vulgare* Dod. *sylvestre*, *Cunila bubula* Plinii B. pin. Idem flore albo, quod

Origanum album Tab. *sylvestre album* B. pin. ☉

Origanum heracleoticum Matth. ed. B. hist. *Lugd. heracleoticum*, *Cunila gallinacea* Plinii B. pin. Idem flore albo. ☉

Origanum fistulosum *Canadense* Cornuti. ☉

Origanum cognata *Zatarendi* B. pin. *Zatarendi*. *Origanum Indicum* Vest. Obs. in *Prosp. Alp.* ☉

* *Origanum sylvestre humile* B. prodr. ☉

Ornithogalum umbellatum medium angustifolium B. pin. *Bulbus leucanthemus minor* .f. *Ornithogalum* Dod. ☉

Ornithogalum angustifolium majus floribus ex albo virescentibus B. pin. *Asphodelus bulbosus* Galeni Dod. ☉

Ornithogalum

Ornithogalum spicatum flore viridi lactescente B. pin. pannonicum albo flore

Clus. ☉

Ornithogalum Neapolitanum Clus. app. alt. exoticum magno flore, minore innato B. pin. ☉

* **Ornithogalum Arrabicum** Clus. Eyft. ☉

Ornithogalum angustifolium bulbiferum B. pin. angustifolium campestre luteum minimum bulbiferum Col. ☉

Ornithopodium Dodonajus B. pin. ♀

* **Ornithopodium alysioides** nobis, scorpioides leguminosa Lab. ♀

* **Ornithopodium alysioides minus** nobis scorpioides altera leguminosa J. B. ♀

* **Orobanche planta clandestina** Lugd.

app. ☉

* **Orobanche radice dentata major** C. B. P.

Dentaria Clus. ☉

* **Orobanche radice dentata minor** C. B. P.

Dentaria Clus. ☉

Orobis filiquis articulatis semine majore B.

pin. receptus herbariorum Obs. & Icon.

Lob. ♀

K 3

Oro-

Orobis pannonicus primus Clus. Sylvaticus
purpureus verus B. pin. ☉

Orobis sylvaticus foliis Viciae B. pin. A-
stragaloides altera herbariorum Icon.
Lob. ☉

Oxyacantha Dioscoridis .f. Spina acuta py-
ri folio B. pin. Pyracantha Ad. Lob.

PÆONIA mas Dod. folio nucis Oest. hort.
folio nigricante splendido que mas B.
pin. ☉

Pæonia communis vel scemina B. pin. rubra
flore simpliciter hort. Eyst. ☉

Pæonia promiscua .f. neutra Obs. Lob. fœ-
mina altera B. pin. ☉

Pæonia folio subtus incano flore albo, vel
pallido B. pin. mas flore albo hort. Eyst.
☉

Pæonia polyanthos flore rubro hort. Eyst.
fœmina flore pleno rubro majore B. pin.
☉

Pæonia

Pæonia pleno flore albescente, minor Cassi
 flore exalbido pleno, major & minor B.
 pin. ☉

Palma minor B. pin. **Camariphes** Dod. ☉

Panaces carpinon .s. racemosa Canadensis
 Cornuti. ☉

Panax Pastinacæ folio, An Syriacum Theo-
 phraſti B. pin. **Panaces peregrinum** Dod. ☉

Panicum Dod. **Germanicum, .s. paniculâ**
 minore B. pin. ♀

Panicum Italicum, .s. paniculâ majore B.
 pin. **fativum** hist. Lugd. ♀

Papaver hortense semine albo B. pin. **album**
fativum Icon. Lob. ♀

Papaver hortense nigro semine B. pin. **ni-**
grum fativum Dod. ♀

Papaver cristatum floribus & semine album
 B. pin. **fimbriatum, aut cristatum album**
 Icon. Lob. ♀

Papaver cristatum floribus rubris semine
nigro B. pin. **fativum rubrum fimbriatum**
 Dal. hist. Lugd. ♀

Papaver laciniatum rubrum unguibus purpureis hort. Eyst.

Papaver hortense flore simplici dilutissime violaceo. ♀

Papaver hortense flore simplici placide rubro unguibus plumbeis. ♀

Papaver flore multiplici purpurascens hort. Eyst. ♀

Papaver flore miniato pleno hort. Eyst. ♀

Papaver flore pleno violaceo. ♀

Papaver flore pleno, argentei coloris hort. Eyst. ♀

Papaver flore pleno album B. pin. polyanthos Tab. ♀

Papaver flore pleno incarnato hort. Eyst ♀

Papaver flore pleno rubro hort. Eyst. ♀

Papaver flore pleno dilute violaceo. ♀

Papaver erraticum majus B. pin. erraticum Dod. ♀

Papaver erraticum flore pleno B. pin. Idem flore pleno igneo, flore pleno rubro, & crispo. ♀

*** Papaver erraticum Pyrennum flore flavo C.B.P. Argemone Cambrobritannica Park. ○**

Papaver corniculatum luteum B. pin. corniculatum majus Dod. ○ * Pa-

* *Papaver corniculatum phoeniceum* hirsutum C. B. flore phoeniceo Clus. ♀

* *Papaver corniculatum violaceum* C. B. Lob. ♀

Papaver spinosum B. prodr. ♀

Parietaria Dod. officinarum, & *Dioscoridis* B. pin. ☉

Pastinaca tenuifolia sylvestris *Dioscoridis*, vel *Daucus officinarum* B. pin. *Daucus vulgaris* Clus. ♀

Pastinaca sylvestris hirsuta echinato fructu B. pin. *Daucus* λασόκευλ ☉ Thal. ♀

* *Pastinaca tenuifolia lucida*. ☉ ♀

Pastinaca tenuifolia sativa, radice lutea, vel alba B. pin. *tenuifolia sativa* Dod. ♀

Pastinaca tenuifolia sativa, radice atropubente B. pin. *sativa rubens* Dod. ♀

Pastinaca tenuifolia radice & umbellâ luteâ. ☉ ♀

Pastinaca sativa latifolia Dod. B. pin. ♀

Pastinaca sylvestris latifolia Dod. *Elaphoboscum* Matth. ed. B. ♀

Pedicularis Alpina Filicis folio minor B. pin.

pin. Alecatorolophos secunda Clus. descr.



Pedicularis pratensis purpurea B. pin. Fistularia Dod. ♀

Pedicularis pratensis lutea, vel crista Galli B. pin. Crista Galli Dod. ♀

* Pentaphylloides fragariae folio. ☞ ⊙

Peplus Dod. Peplus .s. Esula rotunda B. pin. ♀

* Peplis Clus. hist. maritima folio obtuso C. B. P. ♀

Pepo major oblongus Dod. oblongus B. pin. ♀

Pepo rotundus major Dod. compressus major B. pin. ♀

Pepo rotundus minor Dod. compressus minor B. pin. ♀

Pepo rotundus Melonis effigie B. pin. Indicus minor rotundus Tab. ♀

Pepo rotundus Aurantii formâ B. pin. Cucurbita Aurantii formâ hort. Eyst. ♀

Pepo minor clypeatus B. pin. Indicus minor clypeatus Tab. ♀

Pepo

Pepo minor angulosus B. pin., *Indica minor angulosus* Tab. ♀

Perfoliata Dod. *vulgarissima .s. arvensis* B. pin. ☉

Perfoliata montana Cam. *montana latifolia* B. pin. ☉

Perfoliata minor angustifolia Bupleuri folio B. pin. *minima Bupleuri folio* Col. descr. ♀

Periclymenum non perfoliatum Septentrionalium Obs. & Icon. Lob. *non perfoliatum Germanicum* B. pin. ☉

Periclymenum perfoliatum ferotinum flore rabro. ☉

Periclymenum perfoliatum B. pin. *perfoliatum calidarum regionum* Obs. & Icon. Lob. ☉

Persicaria Dod. *mitis maculosa, & non maculosa* B. pin. *Eadem flore albo.* ♀

Persicaria urens .s. hydropiper B. pin. *Hydropiperi* Dod. ♀

Persicaria pusilla repens Obs. & Icon. Lob. *minor* B. pin. ♀

Peta-

Petasites Dod. major & vulgaris B. pin. ☉

Petasites flore albo hort. Eyst. minor B. pin. ☉

Petasites minor folio *Tuffilaginis*. ☉

Peucedanum majus *Italicum* *Lobellii* hist. Lugd. B. pin. ☉

Peucedanum Dod. *Germanicum* B. pin. ☉

* *Peucedanum* minus fol. *Lobatis* angustis. ☉

* *Peucedanum* minus C. B. Pin. *selinum montanum* *Clus.*

Phalangium parvo flore non ramosum B. pin. non ramosum Dod. ☉

Phalangium parvo flore ramosum B. pin. ramosum Dod. ☉

* *Phalangium* *Allobrogicum*. ☉

Phalangium *Virginianum* *Tradescanti* Ger. Idem flore albo. ☉

* *Phalangium* *Virginianum* amplo flore rubro. ☉

* *Phalangium* *Virginianum* amplo flore caeruleo .f. *Azureo*. ☉

Phalaris Dod. major semine albo B. pin. ☉

* *Phalaris*

* Phalaris minore semine nigro. ☞ ☞

Phaseolus vulgaris Obs. & Icon. Lob. Dolichus .f. Phaseolus Dod. fructu albo, cœruleo, nigro, flavo, obsoleto, amethystino, cineraceo, albo nigris lituris distincto, purpureo nigris lituris variegato.

☞

Phaseolus flore puniceo Cornuti. Idem fructu albo, & variegato. ☞

Phaseolus minimus fructu viridi ovato. ☞

☞

* Phaseolus minor Colossinus filiquis longissimis. ☞ ☞

* Phaseolus minor albus, macula nigra umbilico notato J. B. ☞

Phillyrea Clus. latifolia spinosa B. pin.

Phillyrea folio leviter ferrato B. pin. secunda Clus.

Phillyrea folio Ligustri B. pin. tertia Clus.

Phillyrea angustifolia prima B. pin. quarta Clus.

Phyllum marificum Clus. testiculatum B. pin. ☉

Phyllum

Phyllum foeminificum Clus. spicatum B. pin.
⊙

Picea hist. Lugd. major prima, s. *Abies rubra* B. pin.

Pilosella major Dod. *major repens hirsuta* B. pin. ⊙

Eadem folio variegato. ⊙

Pilosella major repens minus hirsuta B. pin.

Lactucella sylvestris repens Cam. descr.

⊙

Pilosella Indica Cornuti descr. *Hieracium peregrinum hort. Eyst.* ⊙

* *Pilosella umbelifera Macrocaulos* Col. ⊙

* *Pilosella major glabra*. ☉ ⊙

Pimpinella, Saxifraga major umbellâ candidâ B. pin. *major Fuchf.* ⊙

Pimpinella, Saxifraga major altera B. pin. *minor Fuchf.* ⊙

Pimpinella, Saxifraga minor B. pin. *crispa* s. *petræa* Tab. ⊙

Pimpinella sylvestris, Sanguisorba major Dod. *Pimpinella, Sanguisorba major* B. pin. ⊙

Pimpi.

Pimpinella maxima Canadensis Cornuti. ☉

Pimpinella maxima Canadensis spicâ longâ
rubrâ. ☿ ☉

Pimpinella maxima Canadensis spicâ rubrâ
glomeratâ. ☿ ☉

Pimpinella, Sanguisorba minor hirsuta B.
pin. *Pimpinella, Sanguisorba* Dod. ☉

Pimpinella, Sanguisorba minor lævis B. pin.
☉

Pimpinella agrimonoïdes. ☿ ☉

Pinus domestica Matth. ed. B. sativa B. pin.

Pinus sylvestris montana Matth. ed. B. syl-
vestris B. pin.

Piper Indicum vulgatissimum B. pin. Indi-
cum medium hort. Eyst. *Capficum, Piper*
Indicum Obf. Lob. ♀

Piper Indicum propendentibus filiquis ob-
longis recurvis B. pin. *Capficum* recurvis
filiquis Dod. ♀

Piper Indicum filiquis flavis hort. Eyst. ♀

Piper Indicum propendentibus filiquis ro-
tundis B. pin. *Indicum cordatum* hort.
Eyst. ♀

Piper Indicum filiquis surrectis, & oblongis
B.

B. pin. Indicum medium longum erectum hort. Eyst. Idem fructu flavo. ♀
 Piper Indicum minimum erectum hort. Eyst. ♀

Piper Indicum siliquis surrectis Cerasi formâ B. pin. Capsicum minimis siliquis Dod. ♀

Pistacia Matth. ed. B. peregrina fructu racemoso .s. Terebinthus Indica Theophrasti B. pin.

Pistacia sylvestris B. pin. Staphylodendron Matth. ed. B. ☉

Pistacia Virginea sylvestris trifolia. ☿ ☉

Pisum majus quadratum B. pin. majus Dod. ♀

Pisum umbellatum B. pin. proliferum Tab. ♀

Pisum hortense majus B. pin. ramulare hist. Lugd. Idem fructu rubro variegato B. pin. descr. ♀

Pisum arvense B. pin. minus Dod. ♀

Pisa sine cortice duriore B. pin. leptoloba Cam. ♀

Pisa nana rotunda. ☿ ♀

* Pisum

* *Pisum sylvestre* *Viciae* fructu. ☿ ♀
Pisum repens perenne, aliud *maritimum*
Britannicum Park. ☉

Pisum vesicarium fructu nigro alba macula
 notato B. pin. *cordatum* Ad. & Icon.
 Lob. ♀

Plantago maxima tota glabra B. prodr.
maxima Hispanica Cornuti. ☉

Plantago latifolia sinuata B. pin. *major*
 Dod. ☉

Plantago latifolia incana B. pin. *media*
 Dod. ☉

Plantago latifolia rosea flore expanso B. pin.
rosea hort. Eyft. ☉

Plantago latifolia rosea floribus quasi in spi-
 ca dispositis B. pin. *rosea spicata hort.*
 Eyft. ☉

Plantago latifolia incana spicis variis B. pin.
peregrina latifolia Gareti Clus. ☉

Plantago quinquenervia Obs. & Icon. Lob.
angustifolia major B. pin. ☉

* *Plantago marina*, *quinquenervia incana*
 ☿ ☉

Plantago aquatica latifolia B. pin. *aquatica*
 Dod. ☉

L

Plantago

Plantago aquatica angustifolia B. pin. *aquatica humilis angustifolia*, & *longifolia*
Icon. Lob. ☉

Plantago aquatica stellata B. pin. *Damafo-
nium stellatum* hist. Lugd. ♀

Platanus Dod. Clus.

* *Platanus Virginiana* Park. ☉

Polium Lavendulæ folio B. pin. *recentio-
rum foemina Lavendulæ folio* Obs. &
Icon. Lob. ☉

Polium montanum luteum B. pin. *luteum*
Dal. hist. Lugd. ☉

Polium montanum album B. pin. *montanum*
primum Clus. ☉

Polium montanum secundum flore albo
Clus. descr. ☉

* *Polium rubrum majus flore dilutiori*,
☉ ☉

* *Polium rubrum minus, montanum* 5
purpureum Clus. hist. ☉

Polygala vulgaris B. pin. *Flos ambarvalis*
Dod. Eadem quæ

Polygala cœrulea Tab.

Polygala alba Tab. ♀

Po-

Polygala repens nivea B. pin. *repens nuperorum* Obs. & Icon. Lob. ♀

Polygala Valentina Clus. altera B. pin. ☉

Polygonatum Dod. *latifolium vulgare* B. pin. ☉

Polygonatum latifolium flore majore odore B. pin. *latifolium* Fuchs. Dod. ☉

Polygonatum latifolium hellebori albi foliis B. pin. *tertium latiore folio* Clus. descr. ☉

Polygonatum latifolium ramosum B. pin. *ramosum* Dod. ☉

Polygonatum angustifolium non ramosum B. pin. *angustifolium* Fuchs. hist. Lugd. ☉

Polygonatum spicatum sterile Cornuti. ☉

Polygonatum ramosum flore luteo majus Cornuti. ☉

Polygonum latifolium B. pin. *Polygonum mas* Dod. ♀

Polygonum maritimum latifolium B. pin. *marinum prius* Dal. hist. Lugd. ♀

Polygonum flosculis herbaceis ex alis prodeuntibus. *Polycarpum* hist. Lugd. ♀

Polygonum flosculis albis in summitate.

Saxifraga Anglica Ad. Lob. ♀

Polygonum Caryophylli holostii flore. ♂

♀

Polygonum palustre alsinifolium, Saxifraga

palustris alsinifolia Ger. ♀

Polygonum montanum minimum niveum

Obs. Lob. minus candicans B. pin. ♀

Polygonum littoreum minus flosculis spadiceo-albicantibus B. prodr. descr. ♀

Polygonum minus .s. Millegrana major B.

pin. *Herniaria* Dod. ♀

Polygonum minus .s. Millegrana major foliis glabris B. pin. descr. ♀

Polygonum minus maritimum incanum. ♂

♀

Polygonum minimum .s. Millegrana minima

B. pin. *Millegrana minima* Icon. Lob. ♀

* *Polygonum marinum minus Serpilli fol.*

C. B. P. ♀

Polypodium majus Dod. vulgare B. pin. ○

Populus alba Dod. B. pin.

Populus nigra Dod. B. pin.

Populus tremula B. pin. *Lybica* Dod.

Porrum

Porrum commune capitatum B. pin. capitatum Fuchf. ♀

Porrum folio latissimo B. pin. Syriacum Tab. ♀

* **Porrum sylvestre Vinearum** C. B. P. Ampeloprasum Lugd. ♀

Porrum sectivum juncifolium B. pin. Schœnoprasum Dod. ☉

Portulaca hortensis Fuchf. latifolia .f. fativa B. pin. ♀

Portulaca hortensis folio flavo. ☉ ♀

Portulaca sylvestris Dod. angustifolia .f. sylvestris B. pin. ♀

* **Portulaca minima alba.** ☉ ♀

* **Potamogeton salicis fol.** C. B. Pin. potamogeton Dod. ☉

Potentilla Fuchf. Argentina .f. Potentilla Dod. ☉

Poterion Obs. & Icon. Lob. Poterio affinis, foliis Pimpinellæ, spinosa B. pin. ☉

Prunus Dod.

Prunus fructu rotundo nigropurpureo dulci B. pin. *Prunus myrobalanus* Clus.
Prunus sylvestris Obs. & Icon. Lob. B. pin.

Pseudodictamnus verticillatus inodorus B. pin. *Pseudodictamnus* Dod. ☉

Psyllium Plinianum forte, radice perenni
 supinum Obs. & Icon. Lob. majus supinum B. pin: ☉

Psyllium Dod. majus erectum B. pin. ☿

* *Ptarmica Virginiana folio Helenii*. ☿
 ☉

* *Ptarmica foliis scabrosæ* B. prodr. ☉
 Vide *dracunculus*.

Pulegium latifolium B. pin. *regium* hist. Lugd. Idem flore albo. ☉

Pulegium angustifolium B. pin. *cervinum* hist. Lugd. Idem flore albo. ☉

* *Pulegium densi saraclicis* Park. ☉

Pulsatilla Dod. folio crassiore, & majore flore B. pin. ☉

Pulsatilla flore albo B. pin. albo *Lobelii* hist. Lugd. ☉ Py-

Pyrola Dod. rotundifolia major B. pin. ☉

Pyrus Dod. fativa B. pin.

Pyrus sylvestris B. pin. **Pyra sylvestria** Tab.

Q.

* **QUADRIFOLIUM** albo flore phæum
Fuchf. Lugd. ☉ A luxuriante natura à Trifolio in quadrifolium maculatum, degenerans.

Quercus cum longo pediculo B. pin. **Hemeris etymodrys** hist. Lugd.

* **Quercus vulgaris** brevi pediculo.

* **Quercus**, incanis subtûs foliis, pediculo brevi.

* **Quercus** incanis subtûs foliis, longo pediculo.

* **Quercus** calyce echinato, glande majore.

Quinquefolium majus repens B. pin. majus
luteum Fuchf. ☉

L 4

Quinque-

Quinquefolium minus repens lanuginosum
luteum B. pin. Pentaphyllum .s. Quin-
quefolium minus Tab. ☉

Quinquefolium folio argenteo B. pin. ere-
ctum incanum Matth. ed. B. ☉

Quinquefolium rectum luteum B. pin. Pen-
taphyllum majus Obs. Lob. ☉

Quinquefolium montanum erectum hirsu-
tum luteum B. prodr. ☉

* Quinquefolium siliquosum Prosp. Alp ☿

* Quinquefolium Alpinum repens seroti-
num. ☿ ☉

* Quinquefolium Canadense erectum. ☿
☉

Quinquefolium fragiferum B. pin. fragife-
rum quintum Clus. ☉

Quinquefolium fragiferum repens Tab.
Pentaphyllum supinum Potentillæ facie
Clus. Quinquefolio fragifero affinis B.
pin. ☉

Quinquefolium palustre rubrum B. pin. ru-
brum Dodonæi hist. Lugd. ☉

R.

R.

RANUNCULUS sylvarum Clus. nemorosus Obs. Lob. Anemone nemorosa flore majore B. pin. Idem flore roseo. ☉

* Ranunculus nemorosus flore pleno albo.

☉

Ranunculus nemorosus luteus B. pin. Icon. Lob. ☉

Ranunculus auricomus dulcis Tragi Icon. Lob. nemorosus vel sylvaticus folio rotundo B. pin. ☉

Ranunculus nemorosus Thalictri folio B. pin. præcox secundus Thalictri folio Clus. ☉

Ranunculus Thalictri folio minor Asphodeli radicibus Park. Oenanthe Myconi hist. Lugd. malè à B. pin. Oenanthe hederæ foliis. ☉

Ranunculus nemorosus Muscatellina dictus B. pin. Moschatella Cord. hist. ☉

Ranunculus pratensis surrectis cauliculis Obs. & Icon. Lob. pratensis erectus acris B. pin. ☉

Ranun-

- Ranunculus pratensis erectus dulcis** B. pin.
hortensis erectus flore simplici luteo hort.
 Eyst. ☉
- Ranunculus pratensis reptante cauliculo**
 Obs. & Icon. Lob. **pratensis repens hirsutus** B. pin. ☉
- Ranunculus pratensis repens hirsutus maculatus.** ☉ ☉
- Ranunculus bulbosus** Obs. & Icon. Lob.
pratensis radice verticilli modo rotundâ
 B. pin. ☉
- Ranunculus hortensis erectus flore pleno** B.
 pin. **erectus hortensis flore pleno luteo**
 hort. Eyst. ☉
- Ranunculus pratensis reptante cauliculo**
flore pleno. An **Ranunculus hortensis inclinans** B. pin. ☉
- Ranunculus dulcis flore pleno** B. pin. **dulcis multiflorus** Tab. ☉
- Ranunculus tuberosus flore multiplici** Dod.
radice tuberosâ flore pleno, & prolifero
 B. pin. ☉
- Ranunculus folio Aconiti flore albo multiplici** B. pin. **niveus polyanthes Lobelii**
 hist. Lugd. ☉
- Ranunculus arvensis echinatus** B. pin. **arvorum** Icon, Lob. ♀ Ra-

Ranunculus Creticus echinatus latifolius
 Prosp. Alp. de exot. **Stellatus echinatus**
Creticus B. pin. ♀

Ranunculus palustris Apii folio lævis B. pin.
palustris rotundiori folio Obs. & Icon.
Lob. ♀

Ranunculus longifolius palustris major B.
pin. lanceatus major Tab. ☉

Ranunculus longifolius palustris minor B.
pin. flammeus aquaticus angustifolius
Obs. & Icon. Lob. ☉

Ranunculus palustris ferratus B. pin. aqua-
tilis angustifolius ferratus Obs. & Icon.
Lob. ☉

Ranunculus montanus folio gramineo B.
pin. pumilus gramineis foliis Icon. Lob.
☉

Ranunculus Illyricus major Clus. deser. la-
nuginosus angustifolius grumosa radice
major B. pin. ☉

Ranunculus Illyricus Dod. lanuginosus an-
gustifolius grumosa radice minor B. pin.
☉

Ranunculus lanuginosus Apii folio, Aspho-
deli radice B. pin. alter saxatilis Aspho-
deli radice Col. Idem flore pleno. ☉

Ranunculus

- Ranunculus Asiaticus** grumosa radice flore phoeniceo ruberrimo hort. Eyst. Idem flore flavo, subalbido. ☉
- Ranunculus Creticus** grumosa radice flore niveo hort. Eyst. ☉
- Ranunculus creticus latifolius** Clus. Asphodeli radice Creticus B. pin. ☉
- Ranunculus Asiaticus** grumosa radice flore flavo rubris venis distincto Clus. cur. post. ☉
- Ranunculus Asiaticus** flore albo colore suaviter rubente per oras mixto B. pin. descr. ☉
- Ranunculus Asiaticus** grumosa radice, flore pleno Clus. Asphodeli radice flore pleno sanguineo B. pin. ☉
- Ranunculus** flore pleno ruberrimo hort. Eyst. Asphodeli radice flore subphoeniceo rubente B. pin. ☉
- Ranunculus Asiaticus** grumosa radice, flore pleno sanguineo prolifero hort Eyst. Asphodeli radice prolifer miniatus B. pin. ☉
- Ranunculus Asiaticus** grumosa radice flore ex flavo, & rubro mixto pleno. ☉
- Ranunculus Constantinopolitanus** gigas flore coccineo. ☉ ☉ ☉ Ra-

Ranunculus Constantinopolitanus gigas flore byssino. ☞ ☉

Ranunculus montanus Aconiti folio albus flore majore B. pin. albus flore simplici Icon. Lob. ☉

Ranunculus montanus Aconiti folio albus flore minore B. pin. Aconitum batrachioides Ad. & Icon. Lob. ☉

Ranunculus montanus Aconiti folio flore globofo B. pin. **Ranunculus flore globofo** Dod. ☉

* **Ranunculus annuus arvensis** flore minimo luteo. ☞ ☿

* **Ranunculus grumosa radice** .f. pthora valdensium Clus. ☉

* **Ranunculus præcox rutæ folio** 1° Clus. ☿

* **Ranunculus ferulaceus spica falcata nobis** perperam, **Melampyrum perpufillum** Lob. ☿

* **Raphanus sylvestris major** flore luteo. ☞ ☉

* **Raphanus aquaticus minimus luteus.** ☞ ☉

Raphanus niger B. pin. Icon. Lob. ☿

Raphanus minor oblongus B. pin. **Radicula sativa minor** Dod. ☿ Ra-

Raphanus rusticus .s. vulgaris Matth. ed.
 B. rusticus B. pin. ☉

Raphanus aquaticus foliis in profundas lacinias divisis B. pin. & prodr. ☉

Raphanus aquaticus alter B. pin. & prodr.
Rapistrum aquaticum Tab. ☉

* **Rapistrum monospermum** B. prodr. ♀

Rapistrum arvorum Obs. & Icon. Lob. flore luteo B. pin. ♀

Rapistrum flore albo, siliquâ articulatâ B. pin. flore albo Erucae foliis Icon. Lob. ♀

Rapistrum flore albo, siliquis in rotundum articulatis, alterum arvorum Park. ♀

Rapistrum maximum monospermum Cornuti. ♀

* **Rapum vulgare album rotundum**. ♀

* **Rapum vulgare album oblongum**. ♀

* **Rapum luteum**. ☉ ♀

Rapunculus esculentus B. pin. **Rapunculum** Dod. ♀

Rapunculus minor foliis incisif B. pin. Erini .s. **Rapunculi** minimum genus Col. phytob. ♀

Rapunculus

Rapunculus spicatus B. pin. alopecuroïdes longiori spicâ Clus. Idem flore albo. ☉

Rapunculus folio oblongo spicâ orbiculari B. pin. Rapuntium corniculatum montanum Col. ☉

Rapunculus scabiosæ capitulo cœruleo B. pin. Rapuntium montanum capitatum Col. ♀


Rapunculus persicifolius magno flore B. pin. Campanula persicifolia nostras Obs. & Icon. Lob. Idem flore albo. ☉

Rapunculus nemorosus angustifolius magno flore, major B. pin. sylvestris major hort. Eyst. ♀

Rapunculus hortensis latiore folio .s. Pyramidalis B. pin. lactescens campanula major Lobelii hist. Lugd. ☉

* **Rapunculus Creticus campanula Pyramidalis altera** C. B. P. Petromarula Cretica J. B. ☉

Rapuntium maximum coccineo spicato flore Col. in hist. Mex. .s. Flos Cardinalis Barberini. Trachelium Americanum flore rubro Bapt. Ferr. ☉

Rapuntium urens Soloniense violaceo flore.
 ☉ **Reseda**

Reseda vulgaris B. pin. Plinii neoterico-
rum Belgis, *Eruca peregrina* vel *Canta-*
brica Icon. Lob. ♀

Reseda latifolia flore flavo. ⚔ ♀

Reseda foliis Calcitrapæ flore albo. ⚔ ♀

Resedæ affinis, *Phyteuma* B. pin. *Phyteuma*
Monspeliensium Icon. Lob. ♀

Reseda alba minor B. pin. *Sesamoïdes par-*
vum Salmanticum Clus. ☉

Rhamnus spinis oblongis flore candicante B.
pin. primus Clus.

Rhamnus Salicis folio angusto fructu flaves-
cente B. pin. Germanicus Matth. ed. B.

Rhamnus folio subrotundo fructu com-
presso B. pin. *Paliurus* Dod.

Rhamnus catharticus B. pin. hist. Lugd. so-
lutivus Dod.

Rhamnus catharticus minor B. pin. *Spina*
infectoria pumila prima Clus.

Rhaponticum Prosp. Alp. de exot. folio
lapathi majoris glabro B. pin. ☉

Rhodia radix Dod. Clus. ☉

Rhus

Rhus folio ulmi B. pin. Rhus Obsoniorum
& Coriariorum Clus. ☉

Rhus Virginianum B. pin. app. ☉

Rhus myrtifolia Monspeliaca B. pin. myr-
tifolia Monspeliensium Ad. & Icon. Lob.

☉

Rhus myrtifolia Belgica B. pin. Chamælæ-
agnus Dod. ☉

Ricinus Dod. vulgaris B. pin. ♀

Ricinus Americanus major semine nigro B.
pin. Syriacus Cam. descr. ♀

* Ricinus minimus Americanus minor C.
B. P. ♀

Rosa rubra B. pin. provincialis Dod. descr.

☉

Rosa rubra pallidior B. pin. Damascena
rubra hist. Lugd. descr. ☉

Rosa purpurea B. pin. pallida Ad. Lob. ☉

Rosa versicolor B. pin. prænestina versico-
lor Clus. descr. ☉

Rosa maxima multiplex B. pin. centifolia
Batavica Clus. ☉

Rosa alba vulgaris major B. pin. alba flore
simplici hort. Eyft. ☉

M

Rosa

- Rosa flore pleno albo hort. Eyst. ☉
 Rosa moschata simplici flore B. pin. muscata
 alba Tab. ☉
 Rosa moscata flore pleno B. pin. muscata
 alba multiplex Tab. ☉
 Rosa spinis carens flore majore B. pin. sine
 spinis Clus. ☉
 Rosa sylvestris vulgaris flore odorato in-
 carnato B. pin. sylvestris Dod. ☉
 Rosa sylvestris flore pleno B. pin. sylvestris
 odorata flore multiplici Icon. Lob. ☉
 Rosa sylvestris foliis odoratis B. pin. Eglen-
 teria hort. Eyst. ☉
 Rosa odore Cinamomi flore pleno B. pin.
 Cinamomea pleno flore Clus. ☉
 Rosa lutea simplex B. pin. lutea hist. Lugd.
 ☉
 Rosa lutea multiplex B. pin. lutea maxima
 flore pleno hort. Eyst. ☉
 Rosa punicea Cornuti descr. ☉
 Rosa sylvestris pomifera minor B. pin. pin-
 pinellæ folio Ger. ☉
 * Rosa versicolor .s. Striata omnium mini-
 ma. ☉ ☉ ☉

Rosmarinus hortensis angustiore folio B.
 pin.

pin Rosmarinum coronarium Dod. ☉
 Rosmarinus hortensis folio aureo. ☉ ☉
 * Rosmarinum latifolium Park. ☉

Rubia tinctorum sativa B. pin. Rubia major
 Clus. ☉

Rubia sylvestris hist. Lugd. sylvestris as-
 pera, quæ sylvestris Dioscoridis B. pin. ☉

Rubia cynanchica B. pin. Gallium tetra-
 phyllon montanum cruciatum Col. ☉

Rubia angustifolia spicata B. prodr. ♀
 * Rubia spicata Crética Clus. ♀

Rubeola arvensis cœrulea repens B. prod. ♀

Rubeola repens lutea foliis spinosis B. pin.

Rubia minima Obs. & Icon. Lob. ♀

* Rubeola maritima lutea. ☉ ☉

* Rubeola minima alba. ☉ ♀

Rubus Dod. vulgaris .s. Rubus fructu ni-
 gro B. pin. ☉

Rubus vulgaris spinis carens. ☉ ☉

Rubus repens fructu cæsis B. pin. reptans
 Ad. Lob. ☉

Rubus idæus spinosus B. pin. Rubus idæus
 Dod. Idem fructu albo Clus. descr. ☉

M 2 Rubus

Rubus idæus lævis B. pin. *Rubus idæus* Placæ Clus. ☉

Rubus odoratus Cornuti. ☉

Ruscus Matth. ed. B. *Ruscum* Dod. ☉

Ruta hortensis latifolia B. pin. *graveolens hortensis* Dod. ☉

Ruta sylvestris major B. pin. *sylvestris graveolens* Dod. ☉

Ruta sylvestris minor B. pin. *montana legitima* Clus. app. alt. *Peganion Narbonensium* .s. *Rutula* Ad. Lob. ☉

* *Ruta Syriaca* Adv. Lob. *Harmala* Dod.

♀

Ruta muraria Dod. B. pin. ☉

S.

S.

SABINA Dod. folio Tamarisci Dioscoridis
B. pin. ☉

Salix vulgaris alba arborescens B. pin. alba
perticalis vulgaris hist. Lugd.

* **Salix latifolia** inferne incana J. B.

* **Salix latifolia** pumila folio rotundo J. B.

* **Salix angustifolia** hirsuta alba J. B.

* **Salix angustifolia** fol. crispis subtus al-
bicantibus J. B.

* **Salix angustifolia** Amygdalinis fol. J. B.

* **Salix angustifolia** lutea rubrave J. B.

* **Salix angustifolia** humilis repens.

Salvia major Matth. ed. B. Dod. major, An-
sphaelus Theophrasti B. pin. Eadem fo-
liis ex luteo variegatis, ex purpureo &
albo variegatis. ☉

Salvia minor aurita, & non aurita B. pin.
minor Dod. Eadem foliis ex albo vi-
rescentibus. ☉

Salvia Cretica non pomifera Clus. ☉

M 3

* **Salvia**

* *Salvia ferrata crispa* J.B. *latifolia ferrata*
B. prodr. ☉

Sambucus Fuchf. fructu in umbella nigro B.
pin. ☉

Sambucus fructu in umbella viridi B. pin.
Sambuci altera species Dod. descr. ☉

Sambucus racemosa rubra B. pin. *montana*
racemosa Ad. & Icon. Lob. ☉

Sambucus folio laciniato B. pin. *lacinioso*
folio Dod. ☉

Sambucus aquatica flore simplici B. pin. *a-*
quatica hist. Lugd. ☉

Sambucus aquatica flore globoso pleno B.
pin. *rosea hort* Eyst. ☉

Sambucus humilis. *Ebulus* B. pin. *Ebulus*
Dod. ☉

Sanicula Dod. *officinarum* B. pin. ☉

Sanicula Alpina lutea B. pin. *Auricula urfi*
Dod. *Eadem flore pallido & aureo.* ☉

Sanicula Alpina purpurea B. pin. *Auricula*
urfi flore purpureo Icon. Lob. *Eadem*
flore atropurpureo, albo. ☉

Sanicula Alpina flore variegato B. pin. *Au-*
ricula urfi tertia Clus. descr. ☉

* Sani.

* *Sanicula montana* flore calcari donato
C. B. P. *pinguicula* Clus. hist.

Sanicula Alpina foliis *Borraginis villosa* B.
pin. *Auricula urfi Myconi* hist. Lugd. ☉

Sanicula montana latifolia laciniata B. pin.
Cortusa Matthioli hist. Lugd. ☉

Sanicula montana Americana .s. *Cortusa*
Americana stapelii in Theoph. ☉ ☉

Sanicula montana rotundifolia major B.
pin. *montana secunda* Clus. *guttata* Cam.
☉

Sanicula montana crenata umbilico pallido.
☉ ☉

Sanicula montana crenata umbilico rubro.
Sedum montanum ferratum guttato flore
Park. ☉

Saponaria Dod. *major lævis* B. pin. ☉

Saponaria flore pleno Cornuti descr. ☉

Saponaria concava Anglica B. prodr. ☉

Satureia Dod. *domestica hort. Eyst. hor-*
tensis .s. *Cunila sativa Plinii* B. pin. ♀

Satureia montana B. pin. *Thymbra* Dod.
perenni radice. ☉

Saxifraga rotundifolia alba B. pin. alba
Chelidonides Obs. & Icon. Lob. ☉

Saxifraga aurea Dod. *rotundifolia aurea* B.
pin. ☉

* *Saxifraga aurea longifolia humilior.* ☿
☉

Scabiosa vulgaris major Dod. *pratensis hirsuta* quæ officinarum B. pin. Eadem
flore albo. ☉

Scabiosa montana calidarum regionum Obs.
& Icon. Lob. *fruticans angustifolia alba*
B. pin. ☉

Scabiosa prolifero flore Clus. *prolifera* B.
prodr. *prolifera folio latiore ejusdem*
pin. ♀

Scabiosa Alpina centauroïdes hort Eyst.
Alpina foliis Centaurii majoris B. pin. ☉

Scabiosa latifolia rubra non laciniata se-
cunda B. pin. *rubra Austriaca* Icon Lob.
☉

Scabiosa argentea angustifolia B. prodr. ☉

Scabiosa peregrina rubra capitulo oblongo
B. pin. *Indica flore saturatè rubro hort.*
Eyst. Eadem quæ

Scabiosa Indica flore dilutè rubro
hort Eyst. ♀ Sca-

Scabiosa capitulo globoſo major B. pin.
minor .ſ. Columbaria Obſ. & Icon. Lob.

⊙

Scabiosa capitulo globoſo minor B. pin. an-
guſtifolia flore ſubcœruleo hort. Eyſt.
Eadem flore albo, & roſeo. ⊙

Scabioſa ſtellata folio laciniato major B.
pin. major Hispanica, .ſ. prima Cluſ. ♀

Scabioſa ſtellata folio non diſſecto B. pin.
arborea Proſp. Alp. de exot. ⊙

* Scabioſa gramineis foliis glabris. ♂ ⊙

* Scabioſa diſſectis fol. flore amplo ſemine
lanuſinoſo. ♂ ⊙

* Scabioſa 2 Hispanica Cluſ. ♀

* Scabioſa minima annua ſemine anguloſo.

♂ ♀

Scammonia Syriaca B. pin. Scammonium
Dod. ⊙

Scammonia Monſpeliaca foliis rotundiori-
bus B. pin. Scammonium Monſpeliense
Ad. & Icon. Lob. ⊙

Scandix ſemine roſtrato vulgaris B. pin.
Scandix, Pecten Veneris Dod. ♀

Scilla

Scilla Dod. vulgaris radice rubra B. pin. ☉

Scolymus Theophrasti, *Eryngium luteum*
Monspeliensium Obs. & Icon. Lob. *Sco-*
lymus chrysanthemus B. pin. ☉

Scolymus chrysanthemus annuus. ☿ ♀

Scordium Dod. B. pin. ☉

Scordium alterum .s. *salvia agrestis* B. pin.

Salvia sylvestris Bock. ☉

Scordium semine talari, flore cœruleo.

Idem flore roseo. ☿ ☉

Scorpioïdes Bupleuri folio B. pin. repens

Bupleuri folio Obs. & Icon. Lob. ♀

Scorpioïdes siliquâ crassâ Boëlii Ger. app.

♀

Scorpioïdes siliquâ striatâ minus hirsutâ. ☿

♀

Scorpioïdes Matthioli Dod. portulacæ fo-
 lio. B. pin. ♀

Scorzonera latifolia sinuata B. pin. major

Hispanica prima Clus. ☉

Scorzonera foliis nervosis B. pin. Germa-
 nica angustifolia Tab. ☉

Scor-

Scorzonera pulverifera. ☞ ⊙

Scorzonera latifolia humilis nervosa B. pin.
humilis latifolia pannonica secunda Clus.

⊙

Scorzonera angustifolia prima B. pin. hu-
milis angustifolia pannonica tertia Clus.

⊙

* *Scorzonera angustifolia subcœrulea* C.
 B.P. *angustifolia elatior pannonica quar-*
ta Clus. ⊙

* *Scorzonera sem. lanuginoso nobis, Tra-*
gopogon hirsutum Apulum humile Col.

⊙

Scrophularia Dod. *nodosa foetida* B. pin. ⊙

Scrophularia aquatica major B. pin. *Beto-*
nica aquatilis Dod. ⊙

Scrophularia folio Urticæ B. pin. *peregrina*
 Cam. ♀

Scrophularia flore luteo B. pin. *Lanium*
pannonicum secundum exoticum Clus. ♀

Scrophularia foliis & caule hirsutis. ☞ ⊙

Scrophularia ruta canina dicta vulgaris B.
 pin. *Ruta canina* Clus. ⊙

* *Scrophularia Sambuci fol.* Park. ⊙

* *Scutellaria*

* *Scutellaria Americana* Malvæ folio. ♂
 ○

Secale Fuchf. hybernum vel *majus* B. pin.

Securidaca lutea major B. pin. vera Clus. ♀

Securidaca dumetorum major flore vario
 filiquis articulatis B. pin. *Hedysarum*
purpureum Tab. ○

Securidaca minor lutea filiquis articulatis,
 ♂ ♀

Sedum majus arborescens flosculis candidis
 B. pin. *Sempervivum* .f. *Sedum arbo-*
rescens majus Dod. ○

Sedum majus Fuchf. majus vulgare B. pin.
 ○

Sedum minus teretifolium album B. pin.
Sempervivum minus alterum Dod. ○

* *Sedum longifolium* Citrino flore. ♂ ○

* *Sedum arvense* flore rubente B. prodr.
 ♀

* *Sedum teretifolium majus album.* ♂ ○

Sedum minus teretifolium album alterum
Sempervivum minus æstivum Obs. & L-
 con. Lob. ♀

Sedum

Sedum minus folio circinato B. pin. *Aizoon dasphyllum* Dal. hist. Lugd. ☉

Sedum minus luteum folio acuto B. pin. *Aizoon hæmatoïdes* Icon. Lob. Idem flore albo. ☉

Sedum minus luteum ramulis reflexis B. pin. *Aizoon scorpioides* Icon. Lob. ☉

Sedum minus causticum hort Eyst. *Sempervivum minus vermiculatum acre* B. pin. ☉

Sedum minus, s. *Vermicularis insipida hort.* Eyst. *Sempervivum minus vermiculatum insipidum* B. pin. ☉

Sedum minus fruticosum B. pin. *minimum arborescens vermiculatum* Obs. & Icon. Lob. ☉

Sedum Alpinum hirsutum luteum B. pin. *Phyllum thelygonon* hist. Lugd. ☉

Sedum Alpinum foliolis crenatis asperis B. prodr. ☉

Sedum Pyrenæum ferratum longifolium. ☉ ☉

Sedum Pyrenæum ferratum flore albo punctis purpureis consperso. ☉ ☉

Sedum montanum tomentosum B. pin. *Sempervivum rubrum montanum* γρασάλωδες Col. ☉ *Sedum*

Sedum tridactylites *Alpinum majus album*
B. pin. *Saxifraga alba petræa* Pon, descr.
mont. Bald. ☉

Sedum tridactylites tectorum B. pin. *Paro-*
nychia altera rutaceo folio Obs. & Icon,
Lob. ☿

Selinum Sii foliis Ger. Park. ☿

Senecio minor vulgaris B. pin. *Erigerum*
minus Dod. ☿

Senecio incanus pinguis B. pin. *Erigerum*
majus Dod. ☿

* *Senecio Jacobææ fol. nobis, fortê folio*
non laciniato J. B. ☿

* *Senecio Canadensis acris alba* ☿ ☿

Serpyllum vulgare majus B. pin. *album*
primum vel secundum Tab. ☉

Serpyllum foliis citri odore B. pin. *citratum*
hort. Eyst. ☉

Serpyllum vulgare minus B. pin. *vulgare*
Dod. Idem *flore albo, quod*

Serpyllum minus flore albo Tab. ☉

Serpyllum latifolium hirsutum B. prodr. ☉

Serpyllum angustifolium hirsutum B. pin.
pannonicum tertium Clus. ☉ Ser-

Serratula Matth. ed. B. Dod. ☉

Serratula foliis non incis. *Tinctoria* prima Tab. ☉

Seseli montanum *Cicutæ folio glabrum* B. pin. primum montanum pannonicum Clus. ☉

Seseli Creticum Dod. *Creticum minus* B. pin. Vide *tordylium*. ♀

Seseli Æthiopicum frutex Dod. *Æthiopicum Salicis folio* B. pin. ☉

Seseli Massiliense foeniculi folio B. pin. *Massiliense foeniculi folio crassiore* Icon. Lob. ☉

Seseli foliis tenuioribus. *Fœniculus tortuosus* Dal. hist. Lugd. ☉

Seseli palustre lactescens B. prodr. & pin. ☉

Seseli pratense *Lobelii hist* Lugd. *pratense*, *Silaus forte Plinii* B. pin. ☉

Sideritis foliis hirsutis profundè crenatis B. pin. *Monspeliaca scordioïdes floribus luteis* Ad. & Icon Lob. ☉

Sideritis vulgaris prima Clus. ☉

Sideritis Alpina hyssopifolia B. pin. *montana* Icon. Lob. ☉

Sideritis

Sideritis Alpinæ trixaginis foilo B. pin. &
 prodr. ♀

Sideritis arvensis latifolia glabra B. pin. A-
 lyssum majus Tab. ♀

Sideritis arvensis angustifolia rubra B. pin.
 Ladanum segetum hist. Lugd. Eadem
 flore albo. ♀

Sideritis glutinosa odorata. ☞ ○

* *Sideritis salviæ folio nostras donato*
 Park. ○

* *Sideritis verticillis spinosis* J. B. ♀

Siliqua edulis B. pin. *Ceratonia* Dod. Ca-
 robe vulgò.

Siliqua sylvestris rotundifolia B. pin. *Arbor*
Judæ Dod.

Sinapi Rapi folio B. pin. *fativum* *Erucae*
 aut *Rapi folio* Obs. & Icon. Lob. ♀

Sinapi Erucae folio B. pin. *sylvestre* Dod. ♀

Sinapi siliquâ hirsutâ B. pin. *fativum* alte-
 rum Icon. Lob. app. ♀

* *Sinapi siliquâ hirsutâ, semine rubro.* ☞
 ♀

Sisarum Dod. *Germanorum* B. pin. ○

Sison

Sison .f. Petroselinum Macedonicum Do-
donæi hist. Lugd. Sison quod Amomum
officinis nostris B. pin. ♀

Sium Dod. Sion .f. Apium palustre foliis ob-
longis B. pin. ⊙

Sium alterum Olusatrici facie Obs. & Icon.
Lob. Sium erucæ folio B. pin. ⊙

Sium repens umbellis ad geniculos disposi-
tis. ☞ ⊙

* Sium minimum ferulaceis foliis. ☞ ⊙

Smilax aspera rutilo fructu Clus. aspera fru-
ctu rubente B. pin. ⊙

Smilax aspera nigro fructu Clus. aspera mi-
nûs spinosa fructu nigro B. pin. ⊙

Smyrniium Fuchf. Hipposelinum Theophra-
sti, vel Smyrniium Dioscoridis B. pin. ⊙

Smyrniium Creticum Matth. ed. B. Aman-
montis Dod. peregrinum rotundo folio
B. pin. ♀

Solanum officinarum B. pin. hortense Fuchf.
Dod. Idem baecis nigris. ♀

Solanum vesicarium Dod. B. pin. Idem fo-
liis variegatis. ⊙ N So

Solanum vesicarium Indicum B. pin. halicacabum, sive Solanum Indicum Carr. hort. Eyst. ♀

Solanum Virginianum vesicarium fructu luteo. Virginianum .s. halicacabum, .s. Alkekengi Virginense Park. ♀

Solanum lethale, Belladonna Clus. Solanum μικροκίον B. pin. ⊙

Solanum somniferum Clus. somniferum verticillatum B. pin. ⊙

Solanum fruticosum bacciferum B. pin. Amomum Plinii Obs. Lob. ⊙

Solanum quadrifolium bacciferum B. pin. Herba Paris Dod. ⊙

Solanum scandens .s. Dulcamara B. pin. Dulcamara Dod. Idem flore albo quod Dulcis amara flore albo hort. Eyst. ⊙

Solanum scandens foliis ex albo variegatis. ☿ ⊙

* Solanum Virginianum flore cœruleo. ☿ ⊙

* Solanum Virginianum flore albo. ☿ ⊙

* Solanum marinum humile flore cœruleo. ☿ ⊙

* Solanum marinum humile flore albo. ☿ ⊙

Solanum'

- Solanum tuberosum* esculentum Matth ed.
 B. Arachidna Theophrasti forte, Pappas
 Peruvianorum Clus. ☉
- Solanum racemosum* Indicum. Magnum
 Virginianum rubrum Park. ☉
- Solanum* foliis & caule spinosis. ☿ ☉
- Solanum pomiferum* fructu rotundo striato
 molli B. pin. Pomum amoris hist. Lugd.
 ♀
- * *Solanum* Pomum amoris fructu striato
 molli aureo. ☿ ♀
- Solanum pomiferum* fructu rotundo parvo
 molli. ☿ ♀
- Solanum pomiferum* fructu rotundo striato
 duro B. pin. Mala Æthiopica Dod. ♀
- Solanum pomiferum* fructu oblongo B. pin.
 Mala insana Dod. ♀
- Solanum* pomo spinoso rotundo longo flore
 B. pin. Strammonia Fuchf. Dod. ♀
- Solanum foetidum* pomo spinoso oblongo
 B. pin. Datura Turcarum hort. Eyst.
 Idem flore violaceo. ♀
- Solanum foetidum* pomo grandibus aculeis
 donato. ☿ ♀
- Solanum foetidum* pomo spinoso rotundo
 semine pallido B. pin. Datura Ægyptia
 N 2 Vell.

Vesl. Obs. in prosp. Alp. Idem triplici
calice. ♀

Solanifolia Circaei dicta major B. pin. Cir-
caea lutetiana Obs. & Icon. Lob. ☉

Solanum Mexiocanum flore magno B. pin.
Admirabilis Perüana rubro flore Clus.
Idem flore luteo, luteo ex rubro mixto,
albo rubris lineis distincto. ♀

Soldanella Dod. maritima minor B. pin. ☉

Soldanella Alpina minor Clus. Alpina ro-
tundifolia B. pin. ☉

Sonchus asper non laciniatus B. pin. asperior
Lobellii hist. Lugd. ♀

Sonchus asper laciniatus & non laciniatus B.
pin. asper Dod. ♀

Sonchus lævis laciniatus latifolius B. pin. læ-
vis Dod. ♀

Sonchus lævis laciniatus muralis parvis flo-
ribus B. pin. alter folio, profundis laciniis
sinuato hederaceo Obs. & Icon. Lob. ☉

Sonchus angustifolius maritimus B. prodr.
♀

Sonchus lanatus Dal. hist. Lugd. villosus lu-
teus major B. pin. ♀

* Sonchus

* *Sonchus Austriacus lævis tertius cœruleo flore* Clus. hist. ☉

Soncho affinis, Lamprolana domestica B. pin.
Lamprolana Dod. ♀

Sorbus Dod. *fativa* B. pin.

Sorbus sylvestris foliis domesticæ similis B.
pin. *Ornus* Dod.

* *Sparganium ramosum, & non ramosum*
C. B. P. *platanaria* Dod. ☉

Spartium arborescens seminibus lenti similibus B. pin. *Genista Italica* Dod. ☉

* *Spartum 2 Clus. hist. Spartum Monospermon Hispanicum flore luteo* Park. ☉

Sphondylium Dod. *vulgare hirsutum* B. pin.
♀

* *Sphondylium hirsutum fol. angustioribus* B. pin. ♀

* *Spiræa Theophr. fortè Clus. frutex spicatus foliis Salignis ferratis.* C. B. Pin.

Stachys Fuchf. Dod. major Germanica B.
pin. ☉

N 3

Stachys

Stachys Cretica B. pin. **Pseudostachys Cretica** ejusdem prodr. ☉

* **Stachys Cretica angustifolia nobis**, **Pseudostachys** B. prodr.

* **Stachys fol. obscure virenti flore ferrugineo.** ☿ ☉

Stachys palustris foetida B. pin. **Clymenum minus** Dal. hist. Lugd. ☉

Staphisagria Fuchf. Dod. ☿

Stœbe major foliis cichoraceis mollibus lanuginosis B. pin. **Salmantica prima** Clus. Eadem flore albo. ☉

Stœbe caliculis argenteis B. pin. **Salmantica tertia** Clus. **argentea Salamantica minor** Obs. & Icon Lob. Eadem flore albo. ☉

Stœbe incana Cyano similis tenuifolia B. pin. **Austriaca humilis** Clus. descr. ☉

* **Stœbe humilis** Clus. **incana tenuifolia-cyano similis** C. B. P. ☉

Stœchas Arabica Cord. hist. **brevioribus ligulis** Clus. **purpurea** B. pin. ☉

* **Stœchas folio ferrato** Ger. Dod. **folio crispo** Clus. hist. ☉

Styrax

Styrax hist. Lugd. folio mali cotoneæ B.
pin.

Suber latifolium perpetuo virens B. pin.
Phellos .f. suber Dod.

Succisa Fuchf. glabra B. pin. Eadem flore
albo, roseo. ☉

Symphytum, Consolida major B. pin. majus
.f. *Consolida major* Matth. ed. B. Idem
flore purpureo, pallido. ☉

Symphytum tuberosum majus Clusf. majus
tuberosa radice B. pin. ☉

Symphytum maculosum .f. Pulmonaria la-
tifolia B. pin. *Pulmonaria vulgaris ma-*
culoso folio Clusf. Idem flore albo. ☉

Symphytum .f. Pulmonaria angustifolia ru-
bente cœruleo flore B. pin. *Pulmonaria*
foliis Echii Icon. Lob. ☉

Syringa cœrulea B. pin. flore cœruleo hort.
Eyft. *Lillach* Dod. Eadem flore albo quæ
Syringa flore lacteo hort. Eyft.

Syringa Italica flore simplici albo hort. Eyft.
alba .f. Philadelphus Athenæi B. pin.

T,

TAMARIX Narbonensis hist. Lugd. altera folio tenuiore .s. Gallica B. pin.

Tanacetum Dod. vulgare luteum B. pin. ☉

Tanacetum crispum Dod. foliis crispis B. pin. ☉

Tanacetum minus album odore Camphoræ B. pin. minus Dod. Achillea .s. millefolium nobile Tab. ☉

Tanacetum montanum purpureum. Vide Millefolium. ☉

Tanacetum montanum inodorum minore flore B. pin. inodorum Dod. ☉

Tanacetum inodorum flore majore B. pin. inodorum primum Clus. Vide bellis. ☉

Tanacetum .s. flos Africanus major flore pleno B. pin. Othonna major polyanthos Obs. & Icon. Lob. ♀

Tanacetum Africanum majus simplici flore B. pin. Flos Africanus major simplici flore luteo Icon. Lob. ♀

Tanacetum Africanum .s. flos Africanus minor

nor B. pin. Caryophyllus Indicus flore
luteo rubescente simplici minor hort.
Eyst. Idem flore pleno qui Caryophyllus
Indicus plenus flore luteo rubescente
minor hort. Eyst. ♀

Tanacetum .s. flos Mexicanus flore fistuloso
simplici B. pin. Caryophyllus Mexicanus
fistuloso flore, simplex Col. ♀

Tanacetum .s. flos Mexicanus flore fistuloso
pleno B. pin. Caryophyllus Mexicanus
alter polyanthos fistuloso flore Col. ♀

Taxus Dod.

Telephium vulgare B. pin. album Fuchf. ☉

Telephium purpureum majus B. pin. pur-
purascens Fuchf. ☉

Telephium purpureum minus B. prodr. ☉

Telephium latifolium peregrinum B. pin.
primum Hispanicum Clus. ☉

Telephium repens folio deciduo B. pin.
Sextum, Cepæa Pancii Clus. ☉

* Telephium Portulacæ folio. ☿ ☉

* Telephium peregrinum rubens. ☿ ☉

Telephium repens folio non deciduo B.
pin. legitimum Imperati septimum Clus.
☉ Tere-

Terebinthus Dod. vulgaris B. pin.

Teucrium B. pin. vulgare fruticans .s. primum Clus. Chamædrys assurgens Dod.

⊙

* **Teucrium** fruticans flore purpureo. ☉

⊙

* **Teucrium Bæticum** fruticans Clus. hist. Bæticum Ger. Tab. ⊙

Thalictrum majus filiquâ angulosâ, aut striatâ B. pin. Ruta pratensis herbariorum Obs. & Icon. Lob. ⊙

Thalictrum pratense maximum Monspeliensium asperioribus foliis. ☉ ⊙

Thalictrum majus florum staminibus purpurascentibus B. pin. quartum Dod. descr. ⊙

Thalictrum Canadense Cornuti. ⊙

Thalictrum minus Dod. B. pin. Hypecoum hist. Lugd. ⊙

Thalictrum minimum foetidissimum B. prodr. ⊙

Thapsia latifolia villosa B. pin. prima Clus.

⊙

Thapsia

Thapsia Carotæ folio B. pin. vulgaris *Carotæ effigie* Obs. & Icon. Lob. ☉

Thlaspi arvense filiquis latis B. pin: *latius* Dod. ♀

Thlaspi vulgatum serrato folio Matth. ed. B. ♀

Thlaspi arvense perfoliatum majus B. pin. *Oleraceum* Tab. ♀

Thlaspi umbellatum arvense Iberidis folio B. pin. *amarum* Tab. ♀

* *Thlaspi Iberidis folio tenuissimè diviso.*
☉ ♀

Thlaspi umbellatum Creticum Iberidis folio B. pin. *Candix umbellatum Iberidis folio* Obs. & Icon. Lob. ♀

Idem flore albo, quod Cappadocicum flore albo hort. Eyst. ♀

Thlaspi Alpinum Bellidis cœruleæ folio B. pin. *montanum Bursæ pastoris fructu* Col. ☉

Thlaspi montanum sempervirens B. pin. *montanum candidum* hist. Lugd. ☉

Thlaspi parvum saxatile flore rubente B. pin. *Lithothlaspi quartum carnosum rotundo folio* Col. ☉

Thlaspi

- Thlaspi montanum incanum luteum** B.
 prodr. **Supinum luteum** Icon. **Lob.** ☉
- Thlaspi, Alyssum dictum campestre minus**
 B. pin. **Alyssum minus** Dal. hist. **Lugd.** ☿
- * **Thlaspi Alyssum minimum.** ☿ ☿
- Thlaspi maritimum** Dal. hist. **Lugd.** **Thlaspi**
Alysson dictum maritimum B. pin. ☿
- Thlaspi clypeatum Clus. biscutatum aspe-**
rum hieracifolium & majus B. pin. ☉
- Thlaspi biscutatum annuum. Leucojum A-**
lyssoides umbellatum montanum Col. ☿
- Thlaspi clypeatum Serpylli folio** B. pin.
Ionthlaspi minimum spicatum lunatum
 Col. ☿
- Thlaspi fruticosum spinosum** B. pin. fruti-
 cosum spinosum **Narbonense** Obs. & I-
 con. **Lob.** ☉
- Thlaspi incanum Machliniense Clus. fruti-**
 cosum incanum B. pin. ☉
- Thuya Theophrasti** B. pin. **Arbor vitæ**
Dod.
- Thymelæa** **Dod. foliis lini** B. pin. ☉
- Thymelæa foliis candicantibus serici instar**
mollibus B. pin. **Tartonraire Gallopro-**
vinciæ

vinciæ Massiliensium Ad. & Icon. Lob. ☉

Thymus Fuchs. vulgaris folio tenuiore B.
pin. ☉

Thymus vulgaris latiore folio B. pin. Thy-
mum durius Dod. ☉

Thymum cephaloton Dod. Thymus capi-
tatus qui Dioscoridis B. pin. ☉

Thymum Creticum frutescens. Marum for-
te Matth. ed. B. hist. Lugd. ☉

Tilia Dod. foemina folio majore B. pin.

Tithymalus characias amygdaloïdes Obs.
& Icon. Lob. B. pin. ☉

Tithymalus characias rubens peregrinus B.
pin. characias Monspeliensis Clusii &
Matthioli Icon. Lob. ☉

Tithymalus characias folio lanuginoso B.
pin. characias secundus Clus. descr. ☉

Tithymalus characias angustifolius B. pin.
myrsinites tertius angustifolius Tab. ☉

Tithymalus characias radice repente. ☉
☉

Tithymalus myrtifolius arboreus B. pin. ar-
boreus Prosp. Alp. de exot. dendroïdes
Matth. ed. B. ☉

Ti-

- Tithymalus myrsinites** Dod. myrsinites la-
tifolius B. pin. ☉
- Tithymalus myrsinites** fructu verrucæ si-
mili B. pin. verrucosus Dalechampii hist.
Lugd. ☉
- Tithymalus maritimus** B. pin. paralius ex
locis maritimis Dod. ☉
- Tithymalus maritimus** .s. *Esula* rara Vene-
torum flore albo. ☉
- Tithymalus latifolius** Hispanicus B. pin.
platyphyllos Clus. ☉
- Tithymalus helioscopius** Dod. B. pin. ♀
- Tithymalus cyparissias** Fuchf. Dod. B. pin.
Idem capitulo rubente. ☉
- Tithymalus leptophyllos** Matth. ed. B. hist.
Lugd. **Tithymalus** .s. *Esula* exigua B.
pin. ♀
- Tithymalus foliis Pini** forte Dioscoridis Pi-
tyusa B. pin. *Esula* minor Dod. ☉
- Tithymalus palustris fruticosus** B. pin. *Esula*
major Dod. ☉
- Tithymalus montanus non acris** B. pin. *E-*
sula dulcis Tragi hist. Lugd. ☉
- Tithymalus foliis brevibus aculeatis** B. pin.
Pityusa Matth. ed. B. ♀
- Tithymalus Epithymi** fructu Col. Peplios
altera species B. pin. ☉ *Ti-

* *Tithymalus linariæ fol. flore lunato* Col.

⊙

* *Tithymalus salicis fol.* ☉ ⊙

* *Tithymalus caracias pyriformi radice.*

☉ ⊙

* *Tithymalus Esula exigua fol. obtusifis* B.
in prodr. ☉

* *Tordylion majus* vide *Caucalis major*
Clus. ☉

* *Tordylion minimum Apulum* Col. vide
Seseli Creticum minus. ☉

* *Tordylion Syriacum sem. Granulato* no-
bis, *Gyngidium* I. Dod. *Gyngidium*
latifolium Syriacum Park. *Caucalis Sy-*
riaca cum maximo sem. J. B. ☉

Tormentilla Dod. *sylvestris* B. pin. ⊙

Tormentilla Alpina folio sericeo B. pin.
candida Dal. hist. Lugd. *Heptaphyllon*
Clus. ⊙

Trachelium umbelliferum cœruleum Pon.
Cervicaria Valerianoïdes cœrulea B.
pin. ⊙

Tragacantha

Tragacantha Matth. ed. B. hist. Lugd. B.
pin. ☉

Tragopogon pratense luteum majus B. pin.
luteum Obs. & Icon. Lob. ☿

* **Tragopogon pratense minus** Park. descr.

☿

* **Tragopogon laciniatum luteum** C. B. P.

☿

* **Tragopogon Coronopi folio minus.** B.
pin. ☿

Tragopogon Coronopi folio B. pin. ☿

Tragopogon gramineo folio radice villosa
B. pin. **Barbula hirci minor** Tab. ☿

Tragopogon purpureocœruleum Porri folio
B. pin. **purpureum hort.** Eyst. **Idem flore**
dilutiore. ☿

Tragopogon gramineis foliis hirsutis B. pin.
alter gramineo folio suaverubente flore
Col. ☿

Tragoriganum Prosp. Alp. exot. ☉

Tribulus terrestris Dod. **terrestris Ciceris**
folio fructu aculeato B. pin. ☿

Trichomanes

- Trichomanes Fuchf. Dod. Trichomanes
 polytrichum officinarum B. pin. ☉
 * Trichomanes ramosum C. B. P. ☉
 Trichomanes minus & tenerius B. pin. mi-
 nor mas Tab. candidum Thal. ☉

 Trifolium bituminosum Dod. bitumen re-
 dolens B. pin. ☉
 Trifolium pratense purpureum B. pin. pra-
 tense Dod. ☉
 Trifolium pratense album Fuchf. B. pin. ☉
 Trifolium pratense luteum capitulo brevi-
 ore B. pin. pratense luteum Fuchf. ☉
 Trifolium pratense luteum capitulo Lupuli
 vel agrarium B. pin. luteum minimum
 Penz & Lobelii hist. Lugd. ☿
 Trifolium pratense majus caule fistuloso
 foliis subtus punctatim nigris. ☿ ☿
 Trifolium montanum purpureum majus B.
 pin. majus secundum Clus. descr. ☉
 Trifolium montanum purpureum folio a-
 cuto crenato B. prodr. ☿
 Trifolium montanum album B. pin. majus
 primum Clus. ☉
 Trifolium Alpinum flore magno radice sub-
 amarâ. Angustifolium Alpinum Pon.
 O descr.

- descr. mont. Bald. ☉
 Trifolium spicâ subrotundâ rubrâ B. pin.
 Lagopus major folio Trifolii Dod. ♀
 Trifolium spicâ oblongâ rubrâ B. pin. ma-
 jus tertium Clus. ☉
 Trifolium montanum spicâ longissimâ ru-
 bente B. pin. Lagopus altera folio pin-
 nato Obs. & Icon. Lob. ☉
 Trifolium lagopoïdes flore pallidè luteo.
 ☉ ☉
 Trifolium montanum angustissimum spica-
 tum B. pin. Lagopus altera angustifolia
 Ad. & Icon. Lob. ♀
 Trifolium arvense humile spicatum, .s. La-
 gopus B. pin. Lagopus .s. Pes leporis
 Matth. ed. B. Obs. & Icon. Lob. ♀
 Trifolium stellatum B. phytop. ♀
 Trifolium Salmanticensi affine. ☉ ♀
 Trifolium fragiferum Clus. cur. post. Idem
 flore albo. ☉
 Trifolium album angustifolium floribus ve-
 lut in capitulum congestis B. pin. Do-
 rycenium Monspelienfium Icon. Lob. ☉
 Trifolium nodiflorum. ☉ ♀
 Trifolium cochleatum fructu latiore B. pin.
 cochleatum primum Dod. ♀
 Trifolium

Trifolium cochleatum turbinatum .s. fructu
compresso oblongo B. pin. *Medicæ spe-*
cies secunda Ad. Lob. ☿

Trifolium cochleatum fructu globoso pla-
no. ☿ ☿

* *Trifolium cochleatum spinosum majus*
spinis sursum, & deorsum tendentibus.
☿ ☿

* *Trifolium cochleatum spinosum minus*
nigrum ciliare. ☿ ☉

* *Trifolium cochleatum spinosum minus,*
polycarpon minus hispidum. ☿ ☿

* *Trifolium cochleatum spinosum minus*
coronatum Cherleri J. B. ☿

Trifolium cochleatum maritimum tomen-
tosum B. pin. *Medica marina* Clus. ☉

Trifolium cochleatum fructu nigro hispido
B. pin. *cochleatum alterum* Dod. ☿

Trifolium cochleatum folio cordato macu-
lato B. pin. *Medica Arabica* Cam. ☿

Trifolium cochleatum echinatum minus B.
prodr. ☿

Trifolium cochleatum glomerulis Person-
æ Cherleri J. B. ☿

Trifolium echinatum arvense B. pin. *Tri-*
bulus terrestris minor repens hist. Lugd.

☿

☉ 2

Tri-

Trifolium subterraneum Tricoccon. ☞ ♀

Trifolium filiquâ cornutâ .s. **Medica** B. pin.
Medica Dod. ☉

Trifolium sylvestre luteum filiquâ cornutâ,
 vel **Medica frutescens** B. pin. **Medica**
 flavo flore Clus. flore albo, cinereo, vio-
 laceo nigricante, herbaceo, purpureo. ☉

* **Trifolium vesicarium rubello flore**. ☞
 ♀

* **Trifolium capitulo glomerato rigido** J.
 B. ♀

* **Trifolium corniculatum lusitanicum flo-**
 re rubro Park. in app. ad **Theatr.** ♀

Trifolium acetosum vulgare B. pin. aceto-
 sum Dod. Idem flore purpurascente. ☉

Trifolium acetosum corniculatum B. pin.
Oxys flavo flore Clus. ♀

* **Trifolium acetosum corniculatum Indi-**
 cum erectum. ☞ ♀

Trifolium hepaticum flore simplici B. pin.
Hepatica trifolia cœruleo flore Clus. ru-
 bro flore ejusdem flore albo hort. Eyst.

☉

Trifolium hepaticum flore pleno B. pin.
Hepatica trifolia cœruleo pleno flore
 Clus. ☉

Tripolium

Tripolium Dod. *majus cœruleum* B. pin. ☉

Triticum Hyberum aristis carens B. pin.

Triticum Dod. ♀

Triticum spicâ multiplici B. pin. Icon. Lob.

♀

Triticum aristis longioribus spicâ albâ B.
pin. *Typhinum quartum* Tab. ♀

Tulipa Dod. *Tulipa Turcarum* Gesn. app.
ad Cord. hist. ☉

Tulipa serotina *πλουκλαδης* major Clus. *sero-*
tina ramosa major B. pin. ☉

Tulipa serotina flore pleno B. pin. ☉

Tulipa dubia pumilio Clus. *pumilio latifo-*
lia rubra B. pin. ☉

Tulipa Apenninea Clus. *minor lutea Italica*
B. pin. vulgò *Bononiensis*. ☉

Tulipa Persica hort. Eyft. variegata Persica
B. pin. ☉

Tussilago Fuchf. *vulgaris* B. pin. ☉

O 3

V.

V.

VALERIANA hortensis Dod. hortensis,
Phu folio Olusatri Dioscoridis B. pin.

⊙

Valeriana foliis calcitrapæ B. pin. annua .s.
æstiva Clus. ♀

Valeriana sylvestris major B. pin. sylvestris
Dod. ⊙

Valeriana Græca Dod; cœrulea B. pin. E-
adem flore albo quæ

Valeriana Græca flore albo hort. Eyst.

⊙

Valeriana palustris minor B. pin. Phu mini-
mum Matth. ed. B. ⊙

* Valeriana Urticæ folia flore albo Corn.

* Valeriana Alpina sylvestris prima lati-
folia Clus. ⊙

Valeriana rubra Dod. B. pin. Eadem flore
albo. ⊙

Valeriana rubra angustifolia B. prodr. ⊙

Valeriana campestris inodora major B. pin.
album olus Dod. ♀

Valerianella

Valerianella altera nudo umbilicato, & brevi semine Col. ♀

Valerianella cornucopioïdes echinata Col. echinata B. pin. ♀

Valerianella altera tenuifolia semine scabiosæ stellato Col. semine stellato B. pin. ♀

* Valerianella nostras major scabiosæ semine. ⚔ ♀

* Valerianella semine hirsuto minore rotundo. ⚔ ♀

* Valerianella Indica Clus ♀

* Valerianella vulgaris major serotina. ⚔ ♀

* Valerianella umbilicato nudo semine oblongo. ⚔ ♀

Valerianella semine, acinis uvarum simili .s. hirsuto, extremo umbilicato. ⚔ ♀

Verbascum mas latifolium luteum B. pin. mas & candela regia Obs. Lob. ♀

Verbascum fœmina flore luteo magno B. pin. album fœmina luteo flore Dod. Gall. ed. ♀

Verbascum ramosum floribus luteis parvis. Candidum fœmina Fuchf. ♀

Verbascum ramosum floribus parvis albis. ⚔ ♀

Verbascum nigrum Dod. nigrum flore ex
luteo purpurascente B. pin. ♀

Verbascum perenne nigrum floribus albis.



* **Verbascum nigrum Papaveris cornicu-**
lati folio C. B. P. laciniatum Lugd. ♀

Verbascum salvifolium fruticosum luteo
flore Ad. & Obs. Lob. latis Salviæ foliis
B. pin. ⊙

Verbascum salvifolium fruticosum flore
purpureo. ⊕ ⊙

Verbascum angustis Salviæ foliis B. pin.
Phlomis Lychnitis Clus. ⊙

Verbasculum pratense odoratum B. pin.
Primula veris flavo flore elatior Clus. ⊙

Verbasculum pratense, vel sylvaticum ino-
dorum B. pin. **Primula veris pratensis ino-**
odora luteo-pallida Obs. & Icon. Lob. ⊙

Verbasculum sylvarum majus singulari flore
B. pin. **Primula veris pallido flore hu-**
milis Clus. ⊙

Verbasculum Constantinopolitanum. Car-
chichæ Turcarum Cornuti. Idem flore
albo, sulphureo, dilutè violaceo ⊙

Verbasculum sylvestre magno, pleneque
flore

flore B. pin. Primula veris flore pleno hort. Eyst. ☉

Verbasculum proliferum B. pin. Primula veris gemino flore hort. Eyst. ☉

* Verbasculum majus umbellatum purpureum. ☉

* Verbasculum majus umbellatum album. ☉

* Verbasculum proliferum C. P. B. flore alteri, altero innato purpureo. ☉

* Verbasculum proliferum C. P. B. flore alteri, altero innato luteo. ☉

* Verbasculum minus Alpinum umbellatum purpureum. ☉

* Verbasculum minus Alpinum umbellatum album. ☉

Verbena communis flore cœruleo B. pin. Verbenaca recta Dod. ☉

Verbena Urticæ folio. ☉ ☉

* Verbena nodiflora Matth. ed. B. repens nodiflora Park. ☉

Veronica mas supina & vulgatissima B. pin. mas serpens Dod. ☉

* Veronica spicata angustifolia flore carneo. ☉ ☉ Vero-

Veronica spicata minor B. pin. recta minima Clus. Eadem spicâ roseâ. ☉

Veronica pratensis serpyllifolia B. pin. minor serpyllifolia Obs. & Icon. Lob. ☉

Viburnum Matth. ed. B. Lantana Dod. ☉

Vicia Dod. sativa vulgaris semine nigra B. pin. ♀

Vicia maxima dumetorum B. pin. Cracca major Tab. Eadem flore albo. ☉

Vicia Sepium folio rotundiore acuto B. pin. Aphace Fuch. ♀

Vicia multiflora B. pin. Aracus Tab. ☉

Vicia sylvestris lutea filiquâ hirsutâ B. pin. ♀

Vicia lutea foliis Convolvuli minoris B. pin. Orobanche legumen hist. Lugd. ♀

Vicia semine rotundo nigro B. pin. Craccæ primum genus Dod. ♀

Vicia segetum cum filiquis plurimis hirsutis B. pin. Aracus .s. Cracca minima Obs. & Icon. Lob. ♀

Vicia filiquis glabris flore violaceo. Minima cum filiquis Glab. J. B. ♀

Vicia minima præcox Soloniensis. ☉ ♀

Vicia

Vicia Sesamacea Apula Col. ♀

* *Vicia maxima* annua foliis ferratis perperam authoribus, faba Græcorum. ♀

Viola martia purpurea flore simplici odoro.
B. pin. nigra .s. purpurea Dod. ☉

Viola martia alba B. pin. candida Dod.
descr. martia flore albo hort. Eyst. ☉

Viola martia inodora sylvestris B. pin. syl-
vestris inodora Dod. ☉

Viola martia multiplici flore B. pin. *Viola*
flore multiplici Dod. Eadem flore ple-
nocinereo. ☉

Viola Alpina rotundifolia lutea B. pin.
montana prima Clus. ☉

* *Viola Granadilla* folio. ☉ ☉

* *Viola longifolia* montana lutea grandi-
flora Cam. C. P. B. *Viola montana* 3.
alterum Genus Clus. hist. ☉

Viola tricolor erecta B. pin. assurgens tri-
color Dod. ☉

Viola tricolor Dod. tricolor hortensis re-
pens B. pin. ♀

Viola bicolor arvensis B. pin. Sylvestris I-
con Lob. ♀

Viola

Viola lunaria major filiquâ rotundâ B. pin.

Lunaria Græca annua hort. Eyst. ♀

Viola lunaria major filiquâ oblongâ B. pin.

Lunaria Græca perennis hort. Eyst. ⊙

Virga aurea major vel *Doria* B. pin. *Herba Doria* Dod. ⊙

Virga aurea latifolia serrata B. pin. aurea margine crenato Dod. ⊙

Virga aurea foliis lævibus non serratis. ☞ ⊙

Virga aurea angustifolia serrata B. pin. *Solidago Sarracenicæ* Dod. ⊙

Virga aurea Americana foliis serratis subtus nervosis. ☞ ⊙

Virga aurea Americana hirsuta. ☞ ⊙

Virga aurea Limonii folio paniculâ uno versu dispositâ. Mexicana B. pin. app. ⊙

Virgo aurea humilis. ☞ ⊙

* *Virga aurea* longis glabris foliis nervosis. ☞ ⊙

* *Virga aurea* serratis foliis hirsutis. ☞ ⊙

* *Virga aurea* *Solidago* aurea foliis minùs spissis. ☞ ⊙

Vitex

Vitex Dod. foliis angustioribus Cannabis
modo dispositis B. pin. Eadem flore al-
bo. ☉

Vitis vinifera Fuchf.

Vitis Corinthiaca.

Vitis laciniatis foliis Cornuti.

Vitis sylvestris, Labrusca B. pin. Labrusca
Tragi hist. Lugd.

Vitis idæa foliis oblongis crenatis fructu
nigricante B. pin. Vaccinia nigra Dod. ☉

Vitis idæa foliis subrotundis non crenatis
baccis rubris B. pin. Vaccinia rubra Dod.
☉

Ulmus Dod. campestris & Theophrasti B.
pin.

Ulmus montana B. pin. secunda Dod. descr.
latifolia.

Urtica urens maxima B. pin. sylvestris as-
perior Obs. Lob. ☉

Urtica urens minor B. pin. minor acrior
Obs. & Icon. Lob. ☿

Urtica urens pillulas ferens B. pin. Romana
Fuchf. ☿ Ur-

Urtica racemosa Canadensis. ☉ ☽

Urtica aculeata foliis serratis B. pin. Can-
nabis sylvestris hist. Lugd. ☽

Urtica aculeata foliis serratis altera B. pin.
sylvestris spuria tertia Icon. Lob. ☽

X.

XYRIS Matth. ed. B. Spatula foetida
Fuchs. ☉

Y.

YUCA foliis Aloës B. pin. Yuca Ad,
Lob. part. alt. ☉

Z.


Z.

ZE A, Brisa dicta vel monococcus Ger-
manica B. pin. Monococcon Dod.
♀

*Zea Amylea, vel Zeopyrum Amyleum C.
B. P. Triticum trimestre Cordi. ♀

Zeopyron Dod. Zeopyrum .s. Triticospel-
tum B. pin. ♀

PLAN-



1111



PLANTARUM
IN
HORTO REGIO
BLESENSI

Aucto, Contentarum:

Nemini hucusque Scriptarum;

Brevis & succincta Delineatio.

A.

⌘ **A**CANTHIUM lusitanicum :
Vulgari Acanthio simile, nisi
quod folia habeat, magis incana,
albidiora, densioreque lanugine obdu-
cta;

ſta ; caules emittit altioreſ, aliquandò quinoſ, ſenſve pedes altos. Capita habet minora, cœterâ vulgari ſimile.

☞ **Acanthium** Illyrico accedens capitibus minoribus, flexuoſis : Illyrico adeo accedit, ut niſi propiùs intuenti, non animadvertitur differentia, caules emittit, non, tam ſpinis armatoſ : Capita habet minora, quaſique, cernua & flexuoſa.

☞ **Aconitum**, ſpica florum Pyramidalis : Quoad folia & radiceſ ; aliorum Aconitorum more, provenit. Solummodò ſpicam fert, florum cœruleorum cucullatorum, ad baſin latioreſ ; quæ tandem, in **Mucronem** deſinit Pyramidalem ; atque hac notâ quam facillime à cœteris ſuæ ſortis diſtinguitur.

☞ **Ageratum** purpureum villoſum : Ab **Agerato** purpureo Dalechampii hiſt. Lugd. neutiquam diſcrepat, niſi quod folia & cauleſ ejuſ, villiſ obducuntur ; vulgariſ autem purpurei Dalechampii, folia ſunt viridia glabra.

☞ **Alaternus**, foliis ex albo variegatiſ : Folia habet partim alba partim viridia.

☞

☉ Alaternus, foliis ex luteo variegatis :
 Hujus folia, partim sunt lutea, partim
 viridia. Utriusque folia sic sunt varie-
 gata, ex calce radici supposita, aut pari
 mixtura calcis cum terra ruderosa, ita
 plurimæ aliæ plantæ, ex hac, aut simili
 mixtura, variegantur in foliis ; ut sola-
 num lignosum seu dulcamara, clematis
 daphnoïdes, Ilex baccifera, ligustrum,
 Hyssopus, Rosmarinum, pilosella & cœ-
 teræ ludente sic natura : insuper nota ex
 seminibus prædictarum, satis ; provenire
 plantas, quæ pristinum recuperant sta-
 tum, viridémque induunt colorem ; ést-
 que quasi morbus superveniens foliis, à
 succo, radicibus attracto ; qui pangendo,
 in perennibus durat ; satiatione evanes-
 cit.

☉ Alcea vesicaria capitis bonæ spei : A
 vulgari Alcea venetorum, in paucis
 differt, nisi quod caulem producat re-
 ctum, firmum, pedalem aut sesquipeda-
 lem ; folia habet firmiora rotundiora
 & Glabriora florémque majorem, ele-
 gantiorisque coloris, cœterâ ei par.

☉ Alchimilla minor: Vulgari Clus. in omnibus accedit, nisi partium parvitate. Est enim triplo vulgari, in omnibus minor, ejusque folia dilutius virent.

☉ Alsine inaperto flore .s. unicaulis noctiflora: Caules producit triunciales, quorum nodis apponuntur bina foliola, è regione disposita, mucronata, linguæ passerinæ similia, in caulum summis nascuntur flores, singuli, quinque petalis albis, ad medium bifidis (aliarum Lychnidum & alsinarum more) constantes. Qui vix interdiu, lucente sole conspiciuntur: propter tenuitatem partium: hoc valde familiare est, pluribus Lychnidum. Crescit in arvis, sylvosis humidis & udis.

☉ Alsine spergula, semine foliaceo nigro; circulo membranaceo albo, cincto: Vulgari spergulæ, quoad reliquas omnes partes, adeo est similis, ut passim in agris arenosis conspiciere licet, nec distingui à vulgari poterit nisi semine, quod est compressum foliaceum seu membranaceum, album exterius, circularitèr cingens in medio, semen nigrum.

nigrum. Reperitur & alia, prope rupellam: cujus semen in medio est compressum fuscum, circulo pariter foliaceo albo cinctum; vulgaris autem spergulæ semen est rotundum, Alfinis vulgaris modo.

☉ Althæa peregrina, semine rostrato, flore luteo minimo: Hujus folia sunt quasi carpini foliorum æmula, bina è regione, caulem ambientia, rotundum, sesquipedalem, in cujus summis fastigiis, innascuntur flosculi lutei, minores, quibus deciduis succedunt, arctè in circumlum disposita, semina, aculeis pungentia; Unde rostrati ei nomen imposuimus.

☉ Amaranthus spica erecta: Est flore obsoletè rubro, viridique, cujus utriusque semen est nigrum; vel spica est erecta, cujus semen est album.

☉ Amaranthus auriculatus: Species est Amaranthi; quinquagesimo septimo anno, supra millesimum, sexcentesimum, detecta; & ex Americæ insulis adjacentibus, in Angliam delata. Cujus singula folia, ad appositionem, bina habent foliola Lobata, s. auriculata, qua nota, ab

omnibus aliis (multos ante annos) detectis, differt estque à flore .s. spica florum, aut luteus, aut stramineus, ruber aut phoeniceus, spicatus vel cristatus.

☞ Amygdalus pumila : Bipedalem habet altitudinem, vix pollicarem crassitiam, obtinent ejus caudices, in quorum summis alis, sub exitum hyemis conveniunt flosculi Colossini coloris, minores; Amygdali majoris more; quibus succedunt pariter fructus parvi triplo minores, Amygdali vulgaris fructu.

☞ Anagallis omnium minima : Planta est in humidis proveniens, vix biuncialis, flosculos gerit cœruleos, vulgaris Anagallidis triplo minores; capsulas seminales pariter minores.

☞ Anonis purpurea non spinosa : A vulgari nulla nota differt nisi quod spinis Careat.

☞ Anonis montana præcox, purpurea frutescens : Suffrutex hic, est Bipedalis, Trifolii species, perpetua fronde virens, flores fert pendentes leguminosos .s. Papileaceos, elegantè purpureos : exunte hyeme floret; quorum singulis succedunt

cedunt singulæ siliquæ, hirsutæ biunciales, natricis Plinii siliquis, multò crassiores, semina in se continentemajora; deliquia (cœterarum Anonidum, seminum more) patientia, qua nota specifica, indigitantur Anonides, à cœteris, trifoliorum classibus. Perperàm ergò Parisiensibus Botannicis, cicer perenne (me discipulo sub Vespasiano Robino) dicebatur.

☉ Anonis purpurea, erecta annua mitis: Hujus caules sunt Bipedales nonnunquam Tripedales erecti, in quorum summis fastigiis spicatim, proveniunt flosculi. Dilutè purpurei, quibus fatiscen-
tibus succedunt, Siliculæ lentiformes, erectæ, vulgaris Anonidis ritu, semina in se continentem, deliquium patientia, quæ est nota essentialis, & Generica, Anonidum omnium. Et præcipuè, hac nota ab omnibus aliis trifoliis distinguitur: ut clarius docebimus, in universali nostra Historia Plantarum, per Tabulas cognationis dispositarum.

☉ Apocynum Canadense foliis Androsami: Planta est radice longè latèque

per terram subtūs repente, prædita; caules suggerente Bipedales, quibus binatim, adhærent folia Androsæmi foliorum adinstar: in caulium summis enascuntur flores obsoletè rubri. Quoad formam, aliorum Apocynorum floribus accedentes. Quibus euānidis succedunt, siliquæ oblongæ, in medio crassæ, membranacæ, Asclepiadis aut Apocyni vulgaris, ritu, semina continentes compressa, subrufa, intermixta, materiæ cuidam papposæ succum lacteum Apocynorum more, quælibet pars rupta fundit.

☞ Apocynum Canadense, angustifolium flore aurantio: Hæc Apocyni species vix Bipedalem, excedit altitudinem, folia gerit, angusta longiora multò Apocyno surrecto umbellifero Cornuti; in caulium summis fastigiis, flores aureos aut aurantii coloris gerit. Quibus singulatim, succedunt siliquæ membranacæ, papposæ materiæ, intermixta semina compressa rufa (cœterorum ritu) gerentes.

☞ Apocynum Virginianum, flore herbaceo siliqua longissima: Hujus folia sunt

funt lata glabra Bedelzar Arabum foliis, magnitudine accedentia. Caules habet ternos quaternos, pedes altos: subrubros, in summis alis caulium proveniunt flosculi herbacei, ejusdem cum cæteris suæ fortis, formæ; sed multò minores, quibus flaccidis succedunt siliquæ, Dodrantes tenuissimæ, papposam materiam, & semina compressa, aliorum more continentes. Lactescit etiam aliorum Apocynorum & Asclepiadum modo.

☉ Argemone capitulo longiori, glabro: Folia habet magis dissecta, quam sunt papaveris Rhæadis folia, minùs autem, quam sunt Argemones; capitulo hirsuto. Florem fert Phœniceum, cui succedit capitulum biunciale, glabrum, per loculamenta triangulæria, continens minuta semina, aspera, aliorum papaverum tum Argemonarum modo.

☉ Artemisia foliis variegatis: Sola variegatione foliorum, à vulgari Artemisia differt.

☉ Arum Indicum bicubitale, amplo flore: Folia habet ampla, cannacori æmula, è quorum gremio, surgit caulis bicubitalis,
in

in summo gerens florem amplum, album
Lilii candidi flore multò majorem, uni-
folium cui deciduo, succedunt, race-
matim, in spica, grana plurima rubra,
spicatum se invicem contingentia, vul-
garis (ut paucis dicam) ritu, disposita.

☞ Aster serotinus, angustifolius, Cana-
densis flore cœruleo: Planta est longè
latè que serpens, caules emittit tripeda-
les, foliis angustis glabris, saturè viren-
tibus, è regione dispositis onustos. E
summis caulium exeunt flosculi, cœrulei;
sub exitum æstatis, aut ineunte hyeme,
aliquando tardiùs: cœterorum more, in
pappum abeuntes.

☞ Aster præcox, flore cœruleo majore:
Hæc, Canadensis seu exotici asteris, est
species, caulis humilior flos major (si
comparetur cum sequenti congenerè)
media æstate floret cœrulei coloris est.

☞ Aster elatior flore cœruleo minore,
Bellidis minoris: Hic longè sub terram
hac, Illac, repit serpitve; caules emittit
tripedales, foliis angustis glabris, saturè
virentibus, è regione dispositis, onustos.
Flores sustinentes, (quoad magnitudi-
nem)

nem) Bellidis minoris, sed cœrulei coloris, versus hyemis initium (cœterorum more) in pappos abeunt.

☉ After Tripolii flore latifolius: Hic omninò accedit minori, Narbonensium. Si non quod folia producat glabriora & latiora, floresque paulò majores, deniq; tota Planta est major, quoad omnes ipsius partes.

☉ After Conyzoides Monspeliensium: Est planta Bipedalis, cujus folia sunt villosa .s. lanuginosa, Conyzæ in modum, quin & contrectata ejus folia, Conyzæ odorem spirant. In summis, caulium fastigiis, flores fert luteos, multos, imo ad alas foliorum, quibus deciduis, succedunt semina solida Angulosa, qua nota debet jure merito appellari, Chrysanthemum Conyzoides Monspeliensium. Conyzoides apte dicitur, quia Conyzæ habet odorem. Monspeliensis dicitur quia frequentèr circa oppidum illud reperitur. Omnis asteris flos, abit in pappos, qua sola nota essentiali & generica, differt aster, à Corymbosis seu Corymbiferis, quippe producentibus, flores

flores etiam stellatos, quemadmodum aster, sed semina solida, ergò potiore jure Chrysanthemum Conyzoides Monspeliensium denominabitur, ut clariùs demonstrabimus in tabulis nostris cognationis. Conyzæ fundit odorem, sed nec odor nec sapor, nec color indignant plantas, per se, sed per accidens tantùm: ad designandas species, subalternas inserviunt. Idem dicendum de astere luteo, foliolis ad florem rigidis, itè de astere cernuo col. seu foliis circa florem mollibus; paritè de astere Attico supino Dod. & multis aliis hujus Farinæ, ab Authoribus, asterum classi assignatis, ut prolixius in Tabulis affinitatis seu cognationis, clare demonstrabimus.

☞ Aster ramosus annuus Canadensis : Hæc planta folia producit oblonga, in margine sinuata, supernè hirta, caules edit Bipedales ramosos, flores albos, Bellidis instar. Qui abeunt in pappos: ergò aptiùs retulimus, ad suæ classis consortes. Nempe pappescentes, vide Bellis ramosa umbellifera Cornuti in horto Regio Blesensi.

Atriplex

⌘ Atriplex folio hastato seu Deltoide :
 Hæc atriplicis species passim in fossis.
 Suburbanis provenit , folio est Trian-
 gulari acuto, mucronato, hastæ cuspidi
 simili : caulibus procumbentibus, pe-
 dalibus & sesquipedalibus ; pediculis
 longisinnixo. In quorum summis alis,
 semina multa proveniunt : singula binis
 foliolis (ut in Atriplice fativo, Polygani
 folio, marino, aliisque) inclusa.

⌘ Atriplex proeumbens folio sinuato
 crasso : Planta pedalis, procumbens,
 folia habet sinuata in margine, ut plu-
 rimùm & caules & folia sunt rubra ; se-
 mine onerantur summi caules, racemoso,
 cœterarum sylvestrium more.

B.

B.

- ☞ **B**ELLIS pratensis duplici petalorum serie: Non alià ratione differt à Bellide pratensi vulgari, nisi quod natura luxuriante, duplicem petalorum latorum, umbonem luteum cingentium, seriem profert.
- ☞ Bellis hortensis flore Herbaceo: Hortensi in omnibus convenit, nisi quod florum petala, in folia herbacea degenerent.
- ☞ Bellis hortensis flore prolifero: Hæc notu facilima, ex primo intuitu, quia plures flores exeuntes, ex uno, (Calendulæ proliferæ more) producit.
- ☞ Bellis ramosa umbellifera Cornuti: Cum ejus flos abit in pappos, ad Asteris classem retulimus vide suprâ, Aster ramosus annuus Canadensis.
- ☞ Bellis Virginiana densiori folio: Folia habet latiora, serrata, densiora, quam ulla, Bellidum sylvestrium majorum: majorésque fert flores. Forte Bellis alpina Cas. Banh, in prodr. ☞

☉ Bellis radice repente, foliis latioribus ferratis: Hæc omnium Bellidum majorum, folia habet latiora magisque ferrata, flores itidem maximos, radices longe latèque subter terram, repentes.

☉ Bellis montana minor & major Tanaceti folio: Vide Tanacetum montanum inodorum flore majore & minore in horto Regio Blæsensi aucto. An non potiore jure Bellis Tanaceti folio, designatur. Examinent quicumque voluerint.

☉ Beta radice vulgaris, costa ampla aurea: Hujus folia sunt Platyneura, aliquando aurea, aliquandò rubra, nunquam alba.

☉ Blattaria folio verbasci, flore luteo amplo: Hæc folia habet verbasci, Incana mollia, mucronata, è quorum gremio exit caulis, Bipedalis aut Tripedalis, in fastigio, gerens flores luteos, amplos verbasci instar. Quibus tamen deciduis succedunt, capsulæ bivalves, seu binis loculamentis, distinctæ. Non in Pyramidem verbasci capsularum more, sed sunt crassæ, rotundæ; qua nota sola à verbasco distinguitur Blattaria.

☉

☉ *Blattaria purpurea* radice perenni
 Folia edit incanè viridia, sinuata, floscu-
 los cœruleos, quatuor petalis conflatos
 quibus deciduis succedunt capsulæ, pri-
 oris capsularum æmulæ, similiaque in se
 continentia semina. Datur & hujus spe-
 cies foliis majoribus, *Symphyti* foliis,
 quam proxime accedens, quæ flores e-
 dit elegantè carneos vel gilvos. Cap-
 sulasque edit minores; natura est ad e-
 intenta productioni, hujus: longè la-
 téque rependo ut vix in Gallia, multè
 minùs in Anglia, semen suum perficeat.

☉ *Blitum Polyspermon*, folio elatine
 subrotundo: Hæc *Bliti* species folia ha-
 bet, hirta, seu villosa, subrotunda, quem-
 admodùm elatine folio subrotundo:
 binatim è regione, cingunt, caules pe-
 dales & sesquipedales; ad alas, enascun-
 tur racematim semina multa subnigra
 aut fusca, lata tumidiuscula: viridibus
 capsulis minimis (*Atriplicis* aut *Bliti*
 modo) contenta.

☉ *Branella Alpina*, glabro folio, angu-
 sto, integro: Folia edit mucronata,
 glabra, angusta rigida, caulibus semi-
 pedalibus

pedalibus è regione adnascantia : quorum summis apicibus verticillatim, dense dispositi, innascuntur flores, galeati cœrulei, nonnunquam purpurei, qui decidui, capsulas verticillatas, in spicam degenerentes, relinquunt : aliarum prunellarum more.

☞ Brunella Bætica annua foliis laciniatis : Folia inferiora profert sinuata, per terram strata, caulescente planta : folia edit laciniata è regione disposita. Summis caulibus innascuntur, verticillatim amplii flores cœrulei, qui exsiccati, relinquunt spicatim, seu densissime dispositas capsulas verticillatas quinquesariam in margine partitas, vide Melissa Bætica in horto Regio Blesensi aucto, cum qua nullam habet affinitatem sed omnino Brunellæ accedit. Ut clarius postea docebitur.

☞ Buglossum Iustanicum bullatis foliis : Hæc Buglossi species, folia (si feratur autumno) exeunte hyeme profert viridia, bullis albis elegantè conspersa : è quorum medio, exit caulis, dodrantalis, aliquando pedalis, per terram stratus,

Q. tus,

tus, in summitate, sustinens flores elegantè cœruleos, parvos quadripartitos, quibus deciduis, succedunt semina, viperini capitis æmula, aliorum Buglossorum more. Hujus est, & alia varietas, priori in omnibus similis, nisi, quod flores edit rubros striis albis, elegantè pictos.

☞ Buglossum procumbens annuum, pullo minimo flore: Hujus cauliculi bipedales per terram strati sunt, folia gerunt villosa, floresque minimos; pulli seu obscure ferruginei coloris; Buglossi in modum, undè aptius Buglossum minimum procumbens, pullo flore, dicitur. Quam Echium; quia Echium, seu Lycopsis, flore donatur corniculato integro: qua nota, ab invicem distinguentur, Buglossum: Echium seu Lycopsis, ut in Tabulis nostris cognationis, clarius patebit. Vide Echium procumbens, flosculis atrorubentibus; in horto Regio Blazensi aucto.

☞ **Buxus** foliis aureis: Sola variegatione foliorum, à vulgari differt: quod in multis aliis arboribus, fruticibus, & subfruticibus, plantisque, accidit. C.

C.

☞ **C**ACHRYS peucedani foliis, semine fungoso sulcato: Hujus folia sunt dissecta, peucedani instar, caules bipedales, umbellas sustinent luteas, quibus fatiscentibus, floribus singulis, succedunt bina semina, striata, fungosa substantia inclusa, oblonga, nucis Myristicæ, ferè magnitudine, Melonum instar sulcata, à lævitate una, semine sulcato lævi, altera semine sulcato aspero dicitur. Hinc, duæ species, sola feminis fungosa substantia, lævi & aspera sulcata, distinctæ, utraque species, folia gerit peucedani. Vide Libanotis Cachrifera, seu Cachrys verior, in horto Regio Blesensi aucto; cujus folia sunt ferulacea, aut foeniculacea semina itidè striata gerit, substantia fungosa, plana, inclusa, nucis Myristicæ paritèr ad formam, & quasi magnitudinem.

☞ Calceolus mariæ luteus: Folia vulgaris edit, flores ejusdem formæ nisi

Q 2

quod

quod luteos gerit, éstque Helleborines species, à forma floris, sic denominatur Calceolus mariæ.

☉ Campanula .s. viola pentagonia perfoliata : Hujus folia sunt ferrata, subrotunda, binatim ex aduerso, caulem ambiunt Dodrantaletm: ita, ut ab ipso caule perforari, videantur. In summis, caulium, nascuntur flores, Campanulati, violæ Pentagoniæ vulgaris æmali, quibus succedunt Siliculæ pares, Triplici loculamento distinctæ, semina Pellucida, subrufa, paria, cum vulgaris, Campanulæ feminibus : continentes.

☉ Campanula .s. viola Pentagonia, folio oblongo latiori : Hæc vulgari perquam similis, nisi quod folia edat longiora, latioraque : totaque planta est major vulgari. Reperimus & vulgarem, intra Yata, Regiæ Chambort, flore cœruleo pleno, utraque hæc species lactescit aliarum Campanularum more. Vide Onobrychis arvensis in horto Regio Blesensi aucto.

☉ Carduus Leucographis .s. mariæ hirsutus, capitulo minore: Hic Carduus folia edit

edit longiora, & angustiora, obscure maculata, secundo anno caulem emittit Bipedalem, aut Tripedalem, in cujus cimis nascuntur capita, minora, purpureos ferentia, tubulos, seu, flores; quibus fatiscentibus, succedunt, semina rotunda, Crassa, & solida; annua est planta,

☞ **Carduus mariæ non maculatus:** Carduo vulgari mariæ, in omnibus accedit; nisi quod folia edit maculis .s. lineis albis, destituta.

☞ **Carduus Leucii foliis:** Planta est pedalis aut sesquipedalis, cujus caulem ambiunt ex adverso disposita, bina folia Leucii murorum seu Keiri instar: supernè viridia, subtùs seu infernè incana, ad quorum appositionem sunt binæ spinæ. Flosculos gerit minimos, purpureos, qui in pappos resoluti, relinquunt semina Crassa, magna satis, pro plantæ tenuitate.

☞ **Carduus exoticus minor, albis maculis notatus:** Hic autumnò sese ferit. Atque per hyemem, folia per terram strata gerit; laciniata, elegantèr lineis albis notata. Caules pedales & sesquipedales, caput-

caputque parvum rubrum fert, cui pap-
pescenti, succedunt, semina glutinosa,
pappo, inclusa. An Carduus Galactites
Joh. Bath. passim secus vias, prope Mon-
spessulum reperitur.

☞ Carduus Polyacanthæ æmulus, seu
alatus; Polyacanthæ capitulis æmulus:
Hic Carduus ad Tripedalem, nonnun-
quàm ad quadripedalem assurgit alti-
tudinem. Caulem habet, quatuor alis
undulatis cinctum, folia obscurius vi-
rent, in margine crispa, rarioribus &
mitioribus spinis, quam Polyacantha,
armatur: Hic Carduus passim, se-
cùs viarum margines, circa Londinum,
Blæsas, parisiis, & cœtera (id genus)
loca, provenit copiose. Flosculos capi-
tatos, in caulium fastigiis gerit, rubicun-
diores pauloque majores, Polyacanthæ
Theophr. saturatius rubescunt flores:
nonnunquam variat flos, colore albo,
cœterorum carduorum rubro colore,
præditorum; more.

☞ Carduus Sphærocephalus annuus Bæ-
ticus minor: Hic cœteris Carduis Sphæ-
rocephalis, minor est. Vix Bipedalem
excedit

excedit altitudinem: flores cœruleos minores, globulatim fert; capita etiam minora, sed semina multò, cœteris suæ familias seminibus majora fundit.

☞ Caryophyllata montana minor, flore nutante purpureo: Hæc à Caryophyllata majori vulgari; flore purpureo nutante descripta, differt, in hoc, quod folia edat glabra, minutiùsque dissecta; totaque planta minor est.

☞ Caryophyllus omnium humillimus & minimus: Hic in montibus Pyrenæis, & alpibus prævenit, pediculos profert unciales & biunciales, sustinentes flosculos minutes, rubros, laciniatos, folia gerit tenuia, muscosa, undè muscosus appellari, meretur.

☞ Caryophyllus marinus minimus flore globoso: Hic, folia tenuia, ternas quaternas uncias, longa, flores globosos, omnium hujus generis, minimos fert, eorum qui in maritimis nascuntur. Arearum aut Ambulacrorum margines, hoc conseri (cum propter perennitatem foliorum, tum amœnitatem florum per æstatem durantium) solent.

☉ *Centaurium purpureum minimum*: Caules biunciales vel triunciales raram fert, flores purpureos, semina & capsulas seminales, centaurii vulgaris minoris modo, fert. In humidis (circa stagna) locis, provenit.

☉ *Centaurium luteum minimum*: Hæc plantula etiam in humidis vegetat: vix palmatis est; flosculos gerit luteos; capsulas, plurima minuta semina (vulgaris more) in se continent, habet: Fortè luteum novum colum.

☉ *Chamæcistus halimi folio oblongo*: Hic subfrutex ad pedalem ut plurimum aliquando bipedalem assurgit altitudinem; folia profert oblonga, mucronata, incana, halimi instar. In glareosis & arenosis, circa caput Cenomanorum, copiosè conspicitur flores fert luteos, quibus labentibus, succedunt capsulæ, triangulares; minuta multa subrufa semina in se continent cæterorum Chamæcistorum ad modum. Vide Petrum Belonium Cenomanum.

☉ *Chamæcistus annuus erectus*: Hic caules rectos palmares & sesquipalmares,

res, producit; flosculos minimos luteos, quinque petalis, luteis, donatos profert. Quibus deciditibus, succedunt (aliorum more) capsulæ triquetrae. Ad cellam Eremitarum, Milliari, Blesis distitam; prope pagum dictum la Chaussée & circa pictavium copiosè reperitur; est minor species Cisti, folio Salicis Clus. ad pedalem altitudinem rectè ascendentem, circa pictavium reperimus.

☉ Chamæmelum inodorum; seu cotula inodora semine nigro: In ora maritima Armorica, satis frequens occurrit; hæc planta, cujus folia, sunt Cotulæ vulgaris foetidæ foliis, magis dissecta, Foeniculi, quasi modo, obscuriùs virent: quin & florum petala, sunt multò ampliora, longiora; discum luteum cingentia. Quibus fatiscitibus succedunt semina nigra, estque hujus species, quæ in hortis colitur, & Cotula inodora flore pleno dicitur, quæ pangendo, propagatur. Semen itidè habet nigrum, quemadmodùm, observavimus & penes nos impresentiarùm habemus, plurimæ sunt plantæ præcipuè annuæ, etiamsi flore pleno

pleno donentur, tamen semen produ-
cunt. Ut clariùs Eucleabimus in Hi-
storia generali, seu universali, Planta-
rum: per Tabulas cognationis, seu af-
finitatis, disponendarum.

☞ *Chelidonium majus*, foliis tenuissimè
dissectis: Sola foliorum incisione, multò
tenuius, dissectorum à *Chelidonio* foliis
quernis differt: nam florem fert, laci-
niatum itidem; quare ex hujus semine,
creditur esse degener planta. Nam se-
men ex hoc collectum, & à me satum:
Chelidonium foliis quernis laciniato
flore, produxit.

☞ *Chrysanthemum Hispanicum*, tenui-
folium: Folia habet minùs tenuiter dis-
secta, quam *Achillea montana*, florem-
que duplò majorem: utrumque & hoc
& *Achillea montana*: *Chrysanthemum*,
ferulaceis foliis nobis dicitur.

☞ *Chrysanthemum Canadense latifoli-
um altissimum*: Ad quinos senosve o-
ctonos nonnunquam pedes, assurgit
caulis, crassius, supra pollicarem crassi-
tudinem, quem cingunt alternatim, folia
rugosa oblonga, lata, plantaginis majoris
(quoad

(quoad formam) majora. In summis caulium fastigiis, fert flores luteos discum luteum ambientes: (numisma, dimidium taleri) vix æquantes; quibus exsiccatis succedunt semina angulosa, quasi floris solis semina; sed minora.

☉ Chrysanthemum Canadense latifolium humilius: Hoc vix Tripedalem excedit altitudinem, foliis, priori, quam proximè accedit, flores multò minores; semina paritèr minora: e jusdem tamen figuræ, cum præcedentis semine.

☉ Chrysanthemum Americanum laciniato folio majus: Caules producit tricubitales, ad quorum nodos, apponuntur folia laciniata, magna, dilutè viridia: flores fert Corymbiferos luteos, quibus deciduis, succedunt semina quadrangula, oblonga; quæ declarant, non esse Doronicum. Cum omnis Doronici flos abit in pappos.

☉ Chrysanthemum Americanum laciniato folio, obscuriùs virenti, minus: Hoc à priori differt quod sit humilius, folia gerit minora, magis laciniata, & obscuriùs virentia, floresque minores, utrumque

utrumque & superius, & hoc semen fert solidum quadrangulum; neutrum pro Doronico haberi debet. Ut vult Johan. Parkinson, cum utriusque semen sit solidum, Chrysanthemi more; multò minùs, est Aconitum ut vult Jacobus Cornutus; omnis Aconiti flos est Cucullatus, producens siliquas membranaceas, quaternas quinas: multa minuta semina rugosa, in se continentes .s. nigra .s. rufa, ergò aptius, denominatur Chrysanthemum, & redarguendi sunt authores, qui non norunt distinguere inter alterem, Doronicum, Conyzam, Helenium & cœteras pappescentes, & Corymbosas: solida producentes semina. Atque hæc dixisse impræsentiarum sat. est.

☞ Chrysanthemum Canadense minus, alato caule: Hæc Chrysanthemi species, folia habet glabra, angusta, secundum longitudinem caulium, producta, adè ut alatus caulis dici possit. Caules habet Bipedales Tripedales, flores sustinent luteos: quibus deciduis succedunt, semina solida quadrangula, minimè autem in pappos abeunt Asteris instar: ergò malè

malè à Jacobo Cornuto Aster alatus luteus dicitur, ut videre est in horto Regio Blesensi aucto, & in Parkinsono sub Asteris nomine, quam bene Judicent lectores.

☉ Chrysanthemum Canadense bidens, alato caule: Omnium Chrysanthemorum exoticorum, altissimum est hoc; caules edit senos septenos, nonnunquam duodenos excedentes pedes, quibus, adhærent folia aspera, oblonga, ad appositionem, alas constituentia, secundum longitudinem; caulis. Undè alato caule dicitur: flores in cimis caulium, Corymbatim sent, luteos; umbonem luteum cingentes, valdè exiguos, pro magnitudine plantæ vix Calendulæ flores æquant: quibus fatiscentibus succedunt semina, subrotunda compressa, binis aculeis, in superiore parte seminis, prædita. Undè bidens (ad instar Chrysanthemum Cannabini) appellandum, judicavimus. Malè sub Helenio Canadensi in horto Regio Blesensi. Quædam horum nominantur ut hoc Helenium Canadense præaltum, alato caule Aster virgineus

gineus luteus, membranaceo caule Park. ex semine. Chrysanthemum Canadense bidens, melius nominatur; legentium & perpendentium, esto iudicium.

☞ Chrysanthemum Cannabinum Americanum: A nostrate, cognitu facile, quippe caules edit quadripedales, subrubentes firmiores & rectiores, flosculos, ex multis staminulis luteis, conflatos habet: & semina bidentia, multò, vulgaris Chrysanthemi Cannabini, seminibus majora; vestibis paritèr adhærentia, pari modo ut nostras fert: malè in horto Regio Blesensi pro Eupatorio, cum authoribus aliis scribitur. Ut postea ad Oculum demonstrabitur.

☞ Cicer arietinum, fructu nigro: Solo fructus colore, à Cicere arietino fructu rubro, & fructus ipsius parvitate, & figura, utriusque enim flores sunt rubri.

☞ Clematis peregrina flore parvo: Hæc Clematidi peregrinæ in omnibus accedit: nisi quod flores profert duplò minores, aut rubros aut albos: semina paritèr minora, ejsdem cum priorum seminibus, formæ.

☞

☞ *Clematis Tetraphyllos Americana*:
 Ex inspectione quaternorum foliorum
 cruciatim dispositorum, citò dignosci-
 tur; nec semen nec florem nobis con-
 spicere licuit: scandere (adhibito bacu-
 lo) observavimus.

☞ *Clematis Hederæ folio*: Planta est
 scandens & circa perticam sese invol-
 vens ad altitudinem quingentorum pedum,
 plus minusve ascendit; cujus folia sunt
Hederæ, æmula, latiora; flores fert mi-
 nores, herbaceos; fructum nunquam
 vidi. Malè citatur in horto Regio Ble-
 senci. *Convolvulus Hederaceus* peren-
 nis, cum *Convolvulo* propriè dicto, la-
 ctescente, florem unifolium gerente, nul-
 lam habet affinitatem, nisi quod scan-
 dit.

☞ *Cochlearia, armorica* flore parvo,
 subpurpureo: Hæc minor est species,
Batavicæ; folia ei similia edit, sed mi-
 nora, angulosa, flores etiam minores,
 subpurpureos, seu dilutè purpureos;
 quibus succedunt, *Siliculæ* bivalves,
 minores aliarum *Cochleariarum* more,
 semina in se minora paritèr continentes.

☞

☞ *Consolida regalis hortensis*, flore minore versicolore : Seu *Delphinium minus versicolor* : folia habet, hortensis *Delphini* vulgaris foliis tenuius dissecta, flores minores rubros, Striis nigris maculatos; & eo ipso nomine, ab aliis quam facillimè distinguitur.

☞ *Convolvulus minor argenteus*, s. *incanus* radice repente : Radices ut cæteri, ejus classis, sub terram, repentes, habet : folia producit subrotunda, incana : flores, Colossinos, seu purpureos & albos, quorum singulis succedunt semina, nunc plura, nunc pauciora, angulosa : passim, ad oram maritimam, circa *Ruppellam*, spontè provenit.

☞ *Conyza acris*, annua, alba : Planta est *Bipedalis*, cujus folia sunt oblonga, serrata in margine; villosa : flores gerit ramatim, in summis caulibus, albos : erigeri, seu *Conyzae acris* cœruleæ, more, quin *Acria* Gustui, ejus folia masticata; statim apparent. Flores decidui in pappos abeunt, & vento Asportata semina, copiosè sese ferunt, per agros, tam in sylvis quam vinetis *Galliæ*, *Angliæ* passim.

sim. Aster Canadensis annuus, malè in horto Regio Blesensi aucto nuncupatur, quin & parisiensibus, Aster Canadensis (me discipulo) dicebatur, sed cum non stellatum gerit florem, sed Erigeri aut potius Conyzzæ cœruleæ, cui sapor acris accedit, aptius (mea opinione) Conyza acris alba; quam appositè Canadensis dicitur (cum passim reperire est) Judicent lectores.

☉ Cotyledon, radice tuberosa, longa, repente: Hæc Cotyledonis species priori, ab Authoribus discriptæ, quam proximè accedit, nisi quod folia gerit majora, spissiora, nec circularitè, scutellam .s. Cotyledonem effingunt: Sed juxta, pediculi, superiorem partem aperta; nec circularitè clausa, prioris & majoris modò, quin & radicem, non promit rotundam & tuberosam, rapi instar, sed longitudinalitè porrectam, & sub terram repentem, à qua exeunt fibræ multæ exiles, quibus nutritur radix. Flores & semina vulgaris modo, habet.

R

☉

☞ Cynoglossum folio molli, incano, flore
 cœruleo striis rubris variegato: Hæc
 Cynoglossi species, folia vulgaris foliis,
 multò producit minora, mollia, inca-
 na. Caules profert Bipedales, quorum
 summis innascuntur: flores dilutè cœ-
 rulei, striis rubris variè ducti: quorum
 singulis deciduis, succedunt quaterna
 semina (vulgaris & aliorum more) aspe-
 ra vestibis adhærentia, multò minora,
 rotunda: passim secus vias; circa Blasas
 provenit.

D.

☞ **D**ENTARIA Monophyllos, Anapo-
 daphyllon parisiensibus: Nomina-
 batur; planta est vernalis, caulem è
 terra Palmarem erigens, cujus apici in-
 nitur folium sub exortum complicatum
 processu temporis extensum, orbicula-
 ritè, rotundum, sinuatum, in margine,
 ad caulis prædicti exortum, è terra pro-
 umpit pediculus, triuncialis plus mi-
 nusve;

nusve; sustinens. Florem, quinque petalis albis, donatum; cui deciduo succedit capsula, nucis Avellanæ magnitudine, multa minuta in se continens semina.

☉ Dentariæ affinis, Echii flore, capsula rotunda: Hæc planta ineunte vere, folia promit, sub exortum, Astransiæ aut Diapensiæ similia, tandem Dentariæ referunt folia, inter quæ exit caulis Palmaris, flores sustinens quaternos, quinos, albos Echii floribus similes; quibus evanescentibus succedunt capsulæ rotundæ Anagallidis capsularum instar: semina solida in se continentes, asperulæ odoratæ seminibus quasi paria.

☉ Digitalis, Virginiana Lysimachiaæ facie, foliis subrubentibus, flore violaceo minore: Hæc Digitalis species, caules promit Bipedales subrubentes, quos ambiunt per intervalla bina folia mucronata, Limonii majoris (primo ortu) foliis haud absimilia, inter quæ sese erigit caulis cubitalis, lignosus, rotundus, purpurascens: cui ad singula genicula, ex adverso bina adnascuntur folia, Lysimachiaæ quodammodo, æmula, arctè adeo

R 2

caulem

caulem cingunt, ut perfoliata planta, dici meritò possit: ex alis ad genicula superiora, enascuntur pediculi, alios procreantes, quibus innascuntur flores, calice & forma Dactylothecae seu digitalis ferrugineae minoris, æmuli, dilute violacei, ore non aliter, quinque incisuris, tribus propendentibus, duabus erectis, diviso; per margines hirsuto: in fundo autem tubi seu floris, quatuor staminula arcuata latent, horum singulorum extremo, aliarum digitalium more, duo apponuntur testiculi rubelli, lentiformes, in superiore floris parte. Est autem stilus (propendens versus inferiorem partem) luteus lanuginosus. Succedunt, post evanidum florem Thecae bicapsulares in mucronem acutum bifurcatum desinentes: continentes in se semina infinita minuta, digitalium omnium more.

☞ Digitalis foliis maximè serratis: Vide, galeata & verticillata, Persicæ foliis, digitalis æmula: post Horminum & Hyssopum infra.

☞ Digitalis latifolia flore ferrugineo: Hæc Digitalis, folia profert oblonga, sulcata,

fulcata, nervosa, multò digitalis ferrugineæ angustifoliæ foliis latiora, è quorum gremio sese erigit caulis Bipedalis, sustinens fastigiatim complures flores, (Dactylotheecæ vulgaris, instar, elegantis ferruginei coloris) majores; in quorum singulorum locum succedunt Thecæ, bicapsulares mucronatæ, & acutè bifidæ, crassiores, digitalis angustifoliæ, flore ferrugineo, capsulis. Semina itidè paria, hinc inde in duplici loculamento, rufa, sed majora, continentes.

☉ Doronicum foliis subtùs lanuginosis: Hujus caules sunt pedales, folia suprâ obscurius virentia, subtùs incana, oblonga: flores fert luteos stellatos (aliorum more) seminaque abeuntia in pappos.

R 3

E.

E.

☞ **E**CHIUM procumbens, flosculis atro-rubentibus, procumbens annuum: Vide Buglossum pullo minimo flore; in horto Regio Blesensi aucto.

☞ **E**ruca tanacetii foliis: Hæc folia profert incana viridia; tanacetii foliis (quoad dispositionem) haud ab similia, ex quorum gremio exit caulis, sesquipedalis, in cuius summis, nascuntur flosculi lutei, quatuor petalis conflati, quibus pereuntibus singulis, singulæ, superveniunt siliquæ biunciales, bivalves, septo membranaceo medio, utramque seriem seminum, hinc inde terminante. Tota planta Gustui calida & acris: quemadmodum reliquæ erucarum species. Antequam hæc planta caulescat, caulesque & siliquas producat, folia sunt adeo tanacetii foliis proxima, ut nisi gustus, in opem vocetur, difficile erit terminatu. Sub quo genere militare debet: sed flores & siliquæ bivalves, statim ad Tetrapetalas,

trapetalas, filiquosas, referri debere, indicant.

☉ *Eruca vinealis*, parvis luteis floribus: Hæc *Eruca* species est annua, inter vinea proveniens, folia edit glabra sinuata, binas vel ternas uncias longa: ex horum sinu, exeunt, cauliculi per terram strati, in summis caulium fastigiis, gerentes flosculos parvos, luteos, quatuor petalis, constantes: quibus succedunt filiquæ unciales & biunciales: seriem duplicem seminum continentes (aliarum filiquosarum more) septo medio membranaceo eandem, dirimente. Nec tactum manuum patiuntur maturæ, aliarum *Eruca*rum more. Nec mihi videtur sylvestris minor lutea folio *Bursæ pastoris*, *Banh.* in *Prodr.* cum ejus folia neutiquàm ad *Bursæ pastoris*, folia accedunt.

☉ *Eruca Barbareæ æmula major*: Hujus folia sunt majora, caules altiores, filiquæ crassiores, seminaque grandiora. Etenim planta est perennis: quibus notis, quam facillimè, ab *Eruca Barbarea*, dicta: distinguitur.

Ⓔ Eryngium ex plani semine degener :
 Hoc Eryngium ex plani Eryngii semine,
 sato pullulavit, & folia produxit non
 integra, ferrata ut planum, sed multifida,
 & variè secta, florem cœruleum & se-
 mina paritèr, neutiquam ab Eryngio,
 plano discrepantia, edidit.

Ⓕ Eryngium pannonicum latifolium,
 album, differt à panonico Clusii solo,
 florum colore.

Ⓖ Euphrasia lutea viscata, ferrata pra-
 tensis : Planta est Dodrantalıs in pratis
 & humentibus agris proveniens, intra
 septa Regiæ, Chambort, passimque ali-
 bi, cujus folia sunt ferrata longa, tactui
 viscosa, in summis alis caulium flosculos
 gerit, satis amplos (pro tenuitate plan-
 tæ) luteos, Galeatos, qui flaccidi relin-
 quunt, capsulas oblongas, continentes
 infinita semina minuta : Euphrasiæ vul-
 garis modo.

F.

F.

☉ **F**RAGARIA sterilis incana : Hæc Fragariæ species sterilis dicitur ; quia fraga non edit, sed semina sicca, ut reliquæ pentaphylli species, folia habet tripartita ut Fragaria, sed incana aut pubescentia, nec alia nota, à Fragaria sterili vulgari differt : copiosè in sylvis adjacentibus, pictavio, reperitur. An leucas Dioscoridis Lob. dubitatur.

☉ Fragaria pentaphylli fructu : Hæc Fragariæ species, sub exortum, folia omninò tripartita, & Fragariæ vulgaris æmula gerit ; sed caules emittit pedales, & sesquipedales, erectos : ut pentaphyllum majus ; Fragariæ folio, meritò dici possit. Flores luteos, capsulas seminales, & semina ibidem contenta, pentaphylli sunt æmula. Vide pentaphylloides hort. Regii Bles. aucti.

☉ Fraxinus florifera Botryoides : Hæc à vulgari Fraxino parum differt ; primo intuitu, quoad foliorum dispositionem,

&

& corticem; sed florum profert racemos; Dodrentales albos, pendentes: siliquas seminales nondum vidimus.

☉ Fritillaria ramosa, seu Liliū Persicum minus: fōlia profert omninò, Liliū Persici florum æmula, sed angustiora, caules edit pedales, in quorum summitate proveniunt ramatim seu Corymbatim, flosculi quini, seni pendentes, pullo colore præditi, Liliū Persici instar.

☉ Frumentum Indicum, spica articulata, radice perenni Spicam longam semipedalem per articulos, semiunciales aut unciales, dispositam gerit, qua sola nota (juncta duratione) facile cognoscitur.

☉ Fumaria tenuifolia, semine compresso, lini instar: Hæc Fumariæ species, folia omnium tenuissima gerit, caules promit palmares & sesquipalmares, in quorum summis proveniunt (aliarum more) flosculi Corniculati, ex albo elegantèr purpurei, quibus decidentibus, subveniunt semina, compressa, tumidiuscula lini instar, nec capsulas vulgaris Fumariæ ritu, producit. Et ideò indescriptam esse judicavimus: à semine primo intuitu, cuilibet

cuilibet obvia : crescit in Galloprovincia, & Gallia Narbonensi.

G.

☞ **C**ALLIUM album tripetalon : Hæc Gallii species folia gerit, oblonga & angusta, vulgaris Gallii haud absimilia, flores fert multò minores. Tribus tantùm petalis donatos. Qua nota, ab aliis suæ classis (quippe quatuor petalis donantur) faciliè distinguitur.

☞ Geranium Batrachoïdes, minus, perenne versicolor : Hoc folia habet minora, minúsque incana, Ranunculi Batrachoïdis instàr, maculis nigris .f. fuscis notata ; flores fert in summis ramis, striatos, ex albo & nigro ; quemadmodùm Romanum versicolor Park. floribus cadentibus succedunt semina quina minora, subrufa, rostrum brevius aculeatum terminantia.

☞ Geranium Batrachoïdes minus annuum purpurocœruleum : Hujus folia omninò

ninò Ranunculi Batrachoidis; sunt æmula, flores fert magnos, purpurocœruleos, quibus deciduis succedunt semina paritèr quina, nigra; rostrum Grinum biunciale, terminantia, ad basin. Hoc solum Batrachoides, annum est, & ideò inter cœtera notu, facilius.

☉ Geranium Malachoides, seu Malvæ folio rotundo, flore albo: Hoc solo florum, colore albo, differt à pede Columbino Dod. seu Geranio Malvæ folio rotundo vulgari B. P.

☉ Geranium Robertianum, flore albo: Solo itidè m florum colore, à vulgari rubro differt.

☉ Glaux. major, palustris, flore herbaceo: Hæc in fluviis & ad margines fluviorum: per prata labentium, provenit; caules habet pedales, aquis inatantes, à quorum geniculis nodisve, demittuntur fibræ, in aquam, quarum beneficio nutritur tota planta; ad singula genicula oriuntur bina folia, pulegii Regalis foliis latiora, glabra, mucronata; in caulium alis superioribus, emergunt flores, herbacei coloris qui relinquunt in capsulis oblongis

oblongis, Caryophylli aromatici magnitudine ; in singulis infinita semina minuta, subviridia : etiam, Euphrasie ad modum, continentur.

☞ Gramen Phalaroides perenne, tuberosa radice : Spicam fert, Phalaridis spica, tenuiorem longiorem ; seminaque multò sunt minora. Radices habet tuberosas, lucentes, perlarum instar, per nodos, Typhini graminis radici similes : perennis est planta.

☞ Grossularia .s. Ribes fructu rubro, Uvæ crispæ folio : Frutex hic ad tripedalem assurgit altitudinem cortice refert Ribem, foliis Uvam crispam, fructum fert Ribis, rubrum, racematim, seu. Botryos in modum dispositum.

H.

H.

☉ **H**EDERA trifolia Canadensis; folio sinuato: Hæc à Hedera trifolia Canadensi Cornuti differt in hoc, quod folia, habet minora, tripartita, in margine autem sinuata, quod non conspiciere licet, in Hedera trifolia Canadensi Cornuti.

☉ Helenium Indicum tuberosum, radice oblonga: Sola radicum longitudine; (quæ ad semipedem aliquandò accedit) ab Helenio (seu potius Chrysanthemo) tuberoso, radice rotunda, differt.

☉ Helleborine, herbaceo flore: Ex primo intuitu florum, cognoscitur. Hæc Helleborines species; in collibus, sylvis. Ubi sylvæ sunt cœduæ, cernere ipsam frequentèr licet.

☉ Helleborus niger, flore roseo, minor Belgicus: Hic, omnibus suis partibus, foliis, caulibus, flore, est vulgari hortensii, seu legitimo, minor: florem fert ex albo roseum.

☉

☉ Hieracium flore parvo luteo, apuli, flore suaverubenti, odore æmulum : Hæc Hieracii species aded odore, Hieracio apulo, flore suaverubenti Col. accedit. Quippe Amygdalas amaras redolet utrumque : ut idem odoratui appareret, sed hoc folia habet angusta, flores minimos luteos, quibus evanidis succedunt, in Calycis, margine exteriori, incurva quasi rostra. In viarum marginibus passim reperitur circa Blesas. Hæc duplici nota, odore & rostris incurvis, in marginibus Calycis, exterioribus : cognitu cuius obvium.

☉ Hieracium, foliis & floribus dentis Leonis bulbosi, semine curvo : A semine curvo facile distinguitur, hoc Hieracium ab omnibus aliis, suæ classis.

☉ Hieracium angustifolium glabrum, seu pilosella major glabra : Caules edit Bipedales, ramosos : folia angusta glabra. Atque sola glabritie, quam facilimum erit, à cæteris hujus ordinis, (quippe villis scatentibus) ipsum distinguere.

☉ Hieracium (pulmonaria non maculata, dictum)

dictum) indiffectis foliis: In sylvis montosis, & collibus sylvestris: Hæc pulmonariæ species, provenit. Foliis nullis maculis conspersis, in margine integris. Hinc à cœteris, notu, non est difficile.

☉ Horminum majus, ampló flore violaceo, Lobis florum, punctis aureis notatis: Hoc Horminum folia profert hirsutiora, cœteris suæ sortis; (excepto solo Æthiopico) ad basin angulosa: inter quæ exeunt, caules Bipedales, aliquandò tripedales, quadrati, quos (ad genicula) amplectuntur, binæ folia Dodrantalia (ut superius dictum) auriculata. In summis caulium, verticillatim proveniunt flores ampli, violacci, Lobis florum, lateralibus; punctis aureis aut purpureis, notatis; floribus singulis evanidis, succedunt in capsulis magnis, semina crassa nigra quaterna ut plurimum, majora, cœterorum omnium Horminorum, seminibus. Atque punctis aureis aut purpureis & semine majore.: notu facile, à sequenti, cum quo majorem habet affinitatem.

☉ Horminum lapathi unctuosi folio, seu, majus

majus hastato folio: Hoc folia habet hirsuta, angulosa aut auriculata ad basin, ut superius. In mucronem desinunt, hastæ instar cuspidis, quin & forma lappathi unctuosi, folia representat. Flores fert magnos, omninò violaceos, semina, in omnibus prioris seminibus minora, & subfusi coloris.

☞ Horminum napi folio: Ex divisione foliorum, napi foliis similia & florum parvitate, lavendulæ, instar. Satis notum facile.

☞ Horminum Salviæ folio: Hoc Horminum adeò Salviæ majoris foliis habet similia ut principio, à satione. Salviæ (primo intuitu) videretur species: Flores fert purpureos majores. Odore, Horminum sese declarat. Fortè hæc Hormini species est quæ, à prosp. alpino; marum Ægyptiacum denominatur.

☞ Horminum minus, folio sinuato, flore minore dilutè cœruleo: Caules quadratos, pedales, hirsutos, producit; procumbentes, rariùs ramosos: foliis nonnihil hirsutis (pollicarem latitudinem vix excedentibus) oneratos; uncias

S

tres

tres longis, in margine sinuatis. Cauliculi, floribus rarius dispositis ornantur, dilutè violaceis, Lavendulæ florum æmulis. Quibus decidentibus, succedunt in singulis capsulis, quaterna semina minor, nigra aut fusca rotunda. Sylvestris quarti, quinta species Clus. passim hïc in Anglia secus fluvium Thamisin, copiosè provenit, folia habet majora sinuosa, saturatiùs viridia. Caules fert quadratos (ut verticillatæ Galeatæ fere omnes) pedales & sesquipedales erectos. Quorum summis ramis, innascuntur flores paulò majores magisque saturè violacei, quàm prioris descripti, sunt flores, sed florum magnitudine, quàm proximè accedunt.

☞ *Hyssopus hirsuta* : Ab *Hyssopo latifolia vulgari*, sola hirsutie foliorum : Quemadmodùm, *striata seu aurea*, à variegatione ; distinguitur à vulgari ; hoc accidit in multis aliis tam arboribus, fruticibus, & plantis, ut superiùs diximus

☞ *Galeata & verticillata, Persicæ foliis, digitalis æmula* : Hęc *Galeata & verticillata*

cillata planta, adeò similia producit folia, foliis, Persicæ mali, quoad formam & ferraturam, ut nihil magis, flores autem fert Galeatos, subpurpureos, amplos, quorum singulis succedunt, quaterna semina angulosa, in capsulis quinque partitis in margine, verticillatarum & Galeatarum propriè sic dictarum more. Nec Thecam bicapsularem, pyramidalemve: Hinc indè, infinita semina minuta, subrufa, continentem habet. Ergo perperâm Botanicis hucusque, passim pro digitali Persicæ foliis, habetur. Vide digitalis, foliis maximè ferratis: in horto Regio Blesensi aucto.

S 3 I.

I.

⚔ JACEA lusitanica sempervirens : Planta est tripedalis, folia habet, cœteris, suæ sortis, latiora, durabiliora, per hyemem totam ut plurimum durant; flores, & semina habent majora. Quibus notis, à reliquis, speciebus facile distinguitur.

⚔ Jacobæa foliis amplioribus incanis : Ad sylvarum & vinetorum margines provenit hæc Jacobæa : foliis Jacobææ vulgaris, foliis multò; sunt latiora, minusque secta, quin & ipsis sunt multò magis incana. At Jacobææ marinæ foliis, multò minus sunt incana : medium inter utramque (quoad canitiem) obtinet locum ; flores & semina paria.

⚔ Jacobæa Crithmi litorei foliis: Planta est Bipedalis, folia angusta, crassa, oblonga, viridia, Crithmi Chrysanthemi maritimi instar, habet : florem fert luteum Jacobææ, stellatum : cujus petala lata lutea, cingunt discum luteum, ex plurimis staminulis luteis, conflatum :
(aliarum

(aliarum Jacobæarum more) flos abit in pappos.

☞ Jacobæa Senecionis folio : Observa, Jacobææ notam genericam & essentialem (quâ distinguitur à Senecione) esse, quod flos Jacobææ, constet multis petalis latis & planis : cingentibus discum, ex plurimis staminulis luteis, conflatum. Senecionis autem flos tantum componitur, ex staminulis plurimis luteis ; nullis petalis planis, latis, easdem cingentibus, qua ratione hæc concluditur esse vera & genuina, Jacobææ species ; cum Jacobææ habeat florem stellatum : ut supra satis dictum. Quoniam folia omninò dissecta habet, ut Senecio : Jacobæa Senecionis folio, aptè dicitur. Desumpta denominatione, à nobiliore parte. Flore videlicet.

☞ Iberis Virginiana, latifolia ramosa : Folia fert Iberidis vulgaris foliis, latiora. Caulesque edit altiores & fruticosiores ; annua est etiam planta, & hac nota à vulgari facillè distinguitur.

L.

☞ **L**AMIUM parietariæ facie : in omnibus Lamio vulgari accedit. Facile autem dignoscitur, ex primo intuitu, à foliorum cum parietariæ foliis, similitudine.

☞ Laserpitium alterum, foliis Lobatis angustis, dilutè virentibus : A Laserpitio Gallico distinguitur, quod folia produci dilutius virentia, quam Gallicum, cujus folia, sunt lucide atrovirentia.

☞ Lathyrus latifolius, luteus, annuus, siliqua hirsuta : Hic Lathyrus inter Sata Blesis adjacentia, frequentèr satis, provenit ; florem fert dilutè luteum (aliorum more) papileaceum cui, succedit siliqua longa, hirsuta, qua nota præcipuè distinguitur ; à suæ classis, reliquis.

☞ Lathyrus latifolius, flore obsoleto, siliqua Pisi minoris : In arvis satis, circa Rupellam, frequens nobis obvius fuit, hic Lathyrus : florem subrubrum vel obsoleti coloris gerit ; cui succedit siliqua

qua sesquiuncialis, duplici ala, cavâ parte (qua semina quaterna quina junguntur) prædita.

☉ Lathyrus angustifolius λεπτολόγος, femine rotundo, flore rubello : Hæc Lathyræ species, folia ut sequens, gerit angusta, Graminea, longa, caulem pedalem & sesquipedalem, habet : in cujus cimis nascuntur flores Rubelli, obsoleti coloris. Quorum singulis, succedit siliqua rotunda, multò sequentis, siliqua longior : in qua continentur semina dena, duodena rotunda.

☉ Lathyrus angustifolius λεπτολόγος, femine hexedro, flore cœruleo : Lathyrus hic folia habet angustissima, Graminea, florem fert cœruleum, papileaceum : (cœterorum more) cui succedit siliqua, longa, tenuis : continens minuta semina, angulosa cubum .i. hexedram, referentia.

☉ Laurus Alexandrina, fructu longis pediculis, caulibus, alligato : Sola hac nota distinguitur ; quod fructuum seu baccarum pediculi, unciales aut biunciales, à cauliculis pendent, in reliquis

autem, folio aut pediculo, baccaë, frutisque insident.

☉ *Liliasphodelus*, latifolius flore luteo, sola magnitudine foliorum & florum ab angustifolio differt.

☉ *Lilium* .s. *Martagon Canadense*: Elegancia florum, elegantè à natura punctatorum: facilè distinguitur; à cœteris suæ familias.

☉ *Linaria minima hirsuta*, flore obsoleto: Hæc tenuis *Linariæ* species, folia habet quodammodò *Antirrhini* æmula, florem habet subnigrum (insoleti coloris) sed omninò *Linariæ*, quippe rictum habet anteriùs, & calcari donatur posterius capsulamque binis loculamentis, distinctam habet. Septo membranaceo utrumque disterrnante: malè ab authoribus pro *Antirrhino* minimo, appinguitur: in satis arvis, passim occurrit.

☉ *Linaria minor viscosa*, flore luteo: Hæc *Linariæ* species, folia edit hirsuta, viscosa, caules semipedales, in quorum cimis, flores fert *Linariæ*, luteos: quibus evanescentibus, succedunt capsulæ, aliarum more. Continentes semina nigra

gra compressa, seu foliacea, non autem ut *Linaria vulgaris*, rotunda: (hinc nota duo reperiri genera *Linariæ*, quorum unum fert semen compressum, nigrum, foliaceumve, alterum rotundum, ut prolixius alibi, in Tabulis nostris, cognitionis, deducemus) in Arenosis maritimis *Armoricæ* provenit hæc *Linaria*.

☉ *Linaria Armorica*, flore saturè violaceo: Hæc folia producit glabra, angusta: caules pedales, quibus innascuntur flores, saturatè violacei, parvi, parvas relinquentes capsulas, *Linariæ* in modum.

☉ *Linaria angustifolia glabra*, flore luteo majore: Hujus folia sunt quasi *Psyllii* foliorum æmula, longiora. Caulem producit, sesquipedalem, cujus cimis innascuntur, flores lutei multò majores, pro tenuitate plantæ, quàm in ulla alia *Linaria*. Circa *Burdegalam*, in satis, provenit.

☉ *Linum sylvestre* annum, luteum, folio latiore & angustiore: Spontè in humidis sylvis, utraque hæc species crescit, solo hoc discrimine quod, unius folia sunt

funt latiora, alterius angustiora. Vix Dodrentalem altitudinem excedit, utraque species.

☉ *Linum perenne cœruleum, sativo æmulum*: Hoc in omnibus sativo accedit nisi quod est perenne.

☉ *Lychnis flore muscoso capillaceo*: Habet caules sesquipedales, *Lychnidis* (*sesamoïdes Clusio*) dictæ, æmula. Sola hac nota ab omnibus *Lychnidum* speciebus differt quod non (aliarum more) florem, quinis petalis, ad medium bifidis, gerat. Sed florem edit ex plurimis capillis muscosis, herbacei coloris.

☉ *Lychnis Alpina glabra, Caryophylli holostei flore*: A foliis glabris *Caryophyllorum*, foliorum æmulis, biuncialibus aut triuncialibus, notu perquam facilis, flores fert minores albos, quinis petalis, ad medium bifidis constantes; capsulam seminalem, & semina aliarum more producit.

☉ *Lychnis minor viscosa Saxatilis; Caryophylleis foliis*: Hæc inter Saxosa, provenit, *Pyrenæorum montium* & in *Alpium jugis*, folia habet glabra, mucronata,

ronata, Caryophylli instar : Caules vix semipedales profert : ad singula internodia (ut in pluribus aliis Lychnidum speciebus) visco obductos ; quo muscæ captantur, unde viscosa dicitur.

☉ Lychnis maritima repens, strictissimis foliis : Hujus cauliculi per terram sunt strati, quibus strictissima, innascuntur folia, flores fert albos minores, quibus pereuntibus, succedunt capsulæ, aliarum Lychnidum more, & semina ibidem contenta. Provenit in sabuletis maritimis armoricæ, & circa Rupellam. Hæc planta.

☉ Lychnis incana longiori folio, petalis non bifidis : Hæc Lychnidis species, quod folia edit longiora, incana, & florum petala, habet non bifida, notu facilima, nec novi ullam, hujus generis speciem aliam, quæ petala gerit non bifida : præter auriculam muris, pulchro flore, folio tenuissimo. Joh. Bauh. in Ericetis sabulosis, sex milliaria, à Burbonum capite, distantibus, reperitur, satè frequentèr.

☉ Lychnis (papaver spumeum) latifolia vulgaris,

vulgaris, hirsuta: Hæc sola foliorum hirsutie, à papavere spumeo, vulgari glabro, differt; inter sata, valdè frequentèr occurrit.

☞ *Lychnis* (papaver spumeum) angustifolia glabra, flore purpureo, ab angustifolia vulgari glabra, floris colore, solummodò differt.

☞ *Lycopsis* Monspeliaca, floribus dilutè purpureis & albis: Ad tripedalem asurgit altitudinem, flores Corniculatos dilutè rubros & albos, aliorum *Echiorum* aut *Lycopsium* more habet, quaterna, dicidentes relinquunt semina; viperini capitis, figuram referentia. Nota essentialis & generica quâ distinguitur *Echium* seu *Lycopsis*. A *Buglossa* seu *Anchusa*, est hæc. Quòd hujus flores quinque petalis constant: illius autem flores sunt Corniculati. Quod cuilibet observanti & propiùs intuenti, quam facillimè apparet.

☞ *Lysimacha* Corniculata, lutea Canadensis minor seu angustifolia: Hæc sola foliorum angustia, aliarum suarum partium; florum scilicet & capsularum seminalium,

minalium, parvitate differt, à *Lyfimachia Corniculata lutea* majori *Cornuti*.

☞ *Lyfimachia purpurea spicata lanuginosa*, feu folio subrotundo incano: A *Lyfimachia spicata communi purpurea Clus.* differt, quod hujus folia sunt glabra, oblonga, mucronata; illius vero incana feu lanuginosa, subrotunda, cœtera ei par.

M.

☞ **M**ALVA *Betonicæ* folio: Cauliculos profert pedales & sesquipedales per terram stratos quibus adhærent alternatim, folia oblonga, *Betonicæ* foliorum instár. Flores fert amplos Rubellos; semina, nec ad maturitatem pervenêre.

☞ *Malva Hispanica*: Hæc *Malvæ* species folia producit mollia, undulata in margine. Superiùs, micis sulphureis ad solem, lucentibus donata sunt. Caules edit bipedales, aut tripedales, flores & semina

femina aliarum Malvarum modo. Perennis est planta: quin & perpetua fronde viret. Ut Althæa Olbiæ, in meridionalibus saltem regionibus.

☉ Marrubium aquaticum seu aquatile foliis tenuius dissectis: Hæc Marrubii species, longè lateque radices suas, hæc, illac serpendo, spargit: Caules fert tripedales ut vulgare. Folia autem duplò aut triplò tenuius, vulgaris foliis, sunt dissecta. In omnibus aliis, vulgari congruit.

☉ Melissa Romana hirsutior: Hæc folia profert multò vulgaris foliis latiora, multòque hirsutiora, quin & tota planta, multò est major vulgari, ad ternos, quaternos (aliquandò) assurgit pedes. Hujus semen, ut & aliarum plantarum (in horto Regio Blesensi aucto, contentarum) multa, ad me missa fuerunt semina. A doctissimo & peritissimo Botanico, Domino Jacobo Barillier, in sacra sancta Theologia Doctore, ordinis prædicatorum socio, dignissimo, ad mineram Romæ, pro eo tempore commorante: cui immortales debemus gratias.

☉

⌘ Melissa Batica : Vide Brunella Batica supra : Cum non habet odorem Melissæ, nec flores Galeatos, rariùs per verticillos dispositos ut Melissa. Sed verticillos densissimè dispositos : & quasi (prunellæ in modum) in spicam degenerantes, prout clariùs deducemus in Tabulis nostris, cognationis. Pro prunella habeatur.

⌘ Millefolium tanaceti foliis : Hujus folia sub exortum, antequam, caulescat planta, adeò sunt Tanaceti, foliorum æmula, ut non nisi ab oculato Botanico, distingui possint; nisi gustus & olfactus, vocentur in opem. Sed postquàm produxerit caulem & Corymbum, Millefolii in modum, semenque paritèr Millefolii. Sese declarat verum & genuinum Millefolium. Estque flore albo & purpureo. Vide Tanacetum montanum purpureum : in horto Regio Bles. non aucto. Quàm inneptè Botanicis, Tanacetum dicitur, videat lector & examinet mecum.

⌘ Myrrhis perennis lutea daucoïdes : Hujus folia quàm proximè dauco, seu pastinacæ

pastinacæ tenuifoliæ, accedunt, quin & flores habet luteos, semina rostrata striata, Myrrhidis. Montanæ, seminibus longiora at minùs tumida habet. Perfecto semine, sese renovat ex eadem radice.

☉ Myrrhis nodosa annua, semine aspero: Hujus caules ad internodia crascescunt, nodosque gerunt pyriformes, flores gerit albos, in summis caulium bipedalium. Quibus exeuntibus, succedunt semina rostrata bina, striata, aspera, in convexa parte; imo multò sunt, reliquis crassiora. Unde à nodositate caulium flore albo, & semine striato aspero, quàm facillimè, à reliquis Myrrhidum speciebus distinguitur. Hoc addito, quod sit annua planta. Nota quod omnis Myrrhidis, semina bina sint striata; Ceresfolii autem lævia nigra, ergò Myrrhis Fuchs. seu sylvestris seminibus lævibus B. Pin. est Chærophyllum sylvestre. At Anthriscus Plinii historiæ Lugd. est Myrrhis sylvestris, non Chærophyllum sylvestre. Quia semina habet striata, hoc adde quod nodos gerit pyriformes.

☉

☉ Myrrhis perennis montana alba : Hæc Myrrhidis species affurgit, ad binos ternosve pedes, caules producit striatos, flores (aliarum suæ classis more) albos : quibus succedunt semina rostrata, striata. Semiuncialia exterius lutea : cava parte qua junguntur, subcœrulea ; est foliis hirsutis & hirsutioribus, cujus folia medio modo, secta sunt, satis lata. Est & tertia hujus species, cujus folia sunt tenuius dissecta.

☉ Myrtus aurantiæ folio : Hujus folia sunt aurantiæ foliorum, colore & consistentia, aded æmula, nisi quod sint multò minora, & angustiora. Ut malum aurantium minorem (antequam flores & fructum edit) nullus dicere vereretur. An Myrtus latifolia Park, Clus, hist. dubitatur.

T

N.

N.

⚔ **N**ASTURTIUM pratense flosculis mi-
 nimis : Pedalem & sesquipedalem
 habet altitudinem hæc planta : folia
 quàm tenuitè dissecta, flosculos mini-
 mos albos quatuor petalis (aliarum
 siliquosarum, tetrapetalarum more)
 constantes producit ; quorum singulis
 succedunt siliquæ biunciales, bivalves,
 septo medio membranaceo, distermi-
 nante : duplicem seriem, seminum, cœ-
 terorum (suæ classis) more. Quin &
 matura semina, manuum tactu ; per
 terram sparguntur. Unde noli me tan-
 gere dicitur. Fortè Nasturtium sylvest.
 minus Bauh. in Prodr.

⚔ **N**igella sylvestris, flore luteo pallido ;
 Seu Lychnis (Pseudomelanthium) dicta
 solo, florum colore, à vulgari Pseudo-
 melanthio, differt.

O.

O.

- ☞ **O**CYMMUM minimum foliis rubescen-
 tibus: Ex satiatione, tanta est vari-
 etas horum, ut folia aliquandò rubef-
 cant, aliquandò sunt luteopallida, ut
 plurimùm viridia. Aliquandò integra,
 nonnunquam ferrata, ita ut ex satiatione,
 concludo esse lusum naturæ, ut in multis
 aliis annuis.
- ☞ Onobrychis, flore saturatè rubro :
 Ab Onobrychide vulgari, solo florum
 colore differt.
- ☞ Onobrychis, viola Pentagonia dicta,
 vide Campanula .s. viola Pentagonia.
-

P.

- ☞ **P**ASTINACA tenuifolia lucida: Vul-
 garis Pastinacæ, folia sunt hirta, hu-
 jus folia sunt glabra & lucida, sola luci-
 ditate & glabritie foliorum, à vulgari
 faciliè distinguitur.

- ☞ *Pastinaca tenuifolia*, radice & umbella lutea : Facile ab hortensi & sylvestri, distinguitur; quippe harum umbellæ, colore sunt albo illius umbellæ sunt colore luteo, præditæ.
- ☞ *Pentaphylloides Fragariæ folio* : Vide *Fragaria Pentaphylli* fructu.
- ☞ *Pentaphylloides*, *Argentinae* facie, nobis : *Pentaphyllum supinum potentillæ facie* Clus.
- ☞ *Pentaphylloides*, *Ulmariae* facie, nobis : *Pentaphyllum fragiferum* 5. Clus. cum duæ posteriores p'antæ, costas seu nervos medios, longos habent, quibus quina, interdum plura foliola, adhærent è contrario, inter se foliorum exortu, nascentia : uno extremum claudente. *Potentillæ* .s. *Argentinae* ; ritu. Ergo, cum florem & semen, aliorum *Pentaphyllum* more, perficiunt. Folia autem *Pentaphylli* non habent, *Pentaphylloides* nuncupari velim.
- ☞ *Petasites minor*, folio *tussilaginis* : *Petasitis* folia sunt scabra aspera. Hujus autem, sunt prona parte viridia, supina, incana, *tussilaginis* instar, & nisi quod florem

florem producit Petasitis, esset vera tus-
silaginis species.

☉ Peucedanum minus foliis Lobatis an-
gustis: Hæc umbella, folia producit
quina, sena, nunc plura, nunc pauciora,
è regione Rachi seu nervo medio, ad-
nascentia, uno extremum claudente, è
quorum medio sese erigit Caulis Bipe-
dalis, sustinens flores luteos, umbellæ in
modum; semina fert membranacea, ro-
tunda, Peucedani vulgaris instar.

☉ Phalangium Virginianum, amplo flo-
re: A Phalangio Virginiano tradescan-
thi, sola amplitudine, florum & seminum
differt. Estque flore rubro, cœruleo &
azureo.

☉ Phalaris, semine minore nigro: Hæc
semen, producit, minus Phalaridis vul-
garis, semine, quod & nigrum est, qua
nota, facilè, distinguitur à Phalaride
Dod.

☉ Phaseolus minor Colossinus, filiquis
longissimis: Hic Phaseolus ut & sequens,
vix pedalem aut sesquipedalem exce-
dunt altitudinem; Hic florem Colossi-
num: fructumque minorem Colossinum,
T 3 . . . filiquas,

filiquas, senas, septenas uncias longas fert, strictissimas. Non scandit nec sequens.

☉ Phaseolus, filiquis rotundis Viciæ, fructu ovali viridi: Hæc Phaseoli species, vix pedalem excedit altitudinem, flores fert herbacei coloris; aut subvirides, papiliaceos, filiquas Viciæ in modum, rotundas, quaternas uncias aliquandò excedentes: semina oblonga, viridia, ovalia; in se continentia.

☉ Pilosella major glabra: Hæc à majori repenti hirsuta Bauh. in Pin. differt sola glabritie.

☉ Pimpinella maxima, spica longa rubra: Hæc à sanguisorba differt, quod spicam gerit, ipsa longiorem, ternis, quaternis unciis constantem, hujus est & alia species, ei omninò accedens, nisi quod spica sit brevi, Glomerata, rubra paritèr, utraque, folia gerit longiora, & magis serrata, quàm Pimpinella sanguisorba.

☉ Pimpinella Agrimonoides: Hujus folia (prima facie) Agrimonix foliis quàm proximè accedunt: aspera, villosa sunt, Rachi

Rachi seu nervo medio (aliarum Pimpinellarum more) adhærent, uno extremum claudente gratissimum, contréctata spirant odorem, caules pedales habet: in horum citis proveniunt, spicæ Glomeratæ, seminibus striatis (gratissimi odoris) onustæ.

☉ Pifa nana rotunda : Omnium, suæ familias sunt minima, & humillima. Pifa hæc, nec prolixiore egent descriptione.

☉ Pisum sylvestre Viciæ fructu : Primo intuitu, à folliculo seu siliqua Viciæ dignoscitur.

☉ Pistachia Virginiana, sylvestris trifolia: Vel primo intuitu à foliorum (ternatim) dispositione, seminumque in vesicis parvitate, notu, à vulgari, perquam facilis.

☉ Plantago marina quinquenervia incana : Hujus folia Plantaginis quinquenerviæ vulgaris, in omnibus, accedit: nisi quod sint minora & villis adè obducuntur, ut incana, aut cinere obducta videantur.

☉ Polium rubrum majus, flore dilutior: Hujus folia, Polii lutei vulgaris, foliis

foliis, quàm proximè accedunt, & quoad magnitudinem, serraturam & incanitiem. Florem fert majorem, dilutiùs rubrum, quàm quintum Clus.

☞ Polyganum minus maritimum incanum: Hujus folia sunt Polygoni marini vulgaris, multò minora, cinerei coloris, aut incana lanugine, obducta videntur.

☞ Portulaca minima flore albo: Hæc plantula est uncialis, in humidis arvis, ineunte æstate, per terram strata: folia producit semiuncialia angusta, quodammodò crassa. Flosculos ad nodos producit albos. Quibus deciduis, succedunt, minutula semina, Portulacæ, seminibus omnimodè conformia, nigra itidem.

☞ Portulaca hortensis flore flavo: Solo foliorum colore, à Portulaca hortensi, seu culta differt.

☞ Potamogeton Virgineanum: Bipedalis aut tripedalis est planta: folia gerit latiora, obscurè virentia; spicas triunciales, albis floribus rarò ibidè dispositis, onustas fert, non autem compactim spicæ in modum. Semina habet triquetra, ut Perlicaria & Polygonum.

☞

- ☞ **Ptarmica Virginiana folio Helenii :**
 Hæc est Corymbosa, Bipedalis planta,
 cujus caulibus, adnascuntur, folia lata
 & oblonga, Helenii foliis haud ab similia,
 flores fert (corymbatim) albidos, semi-
 naque, Ptarmicæ vulgaris, seminibus,
 omnino similia unde ei nomen imposui-
 mus.
-

Q.

- ☞ **QUERCUS vulgaris brevi pediculo :**
 Hæc facile discernitur. In sylvis
 annosis, Gallix passim ; à vulgari, longo
 pediculo, vel ipso aspectu. Folia habet
 sinuata ; prona & supina parte, viridia.
- ☞ **Quercus foliis subtus incanis, brevi
 pediculo. Datur & alia longo pediculo.**
 Utraque folia habet angusta, sinuata,
 subtus incana.
- ☞ **Quercus Calyce Echinato, glande
 majore : Hæc à glandis magnitudine, &
 Calyce Echinis donato, inter cœteras
 suæ familias (in sylvis annosis, Gallix)
 cognitu perfacilis.**

☞

☞ **Quinquefolium alpinum repens, ferotinum:** Hæc Quinquefolii species, sub exitum autumnii floret, caules per terram stratos gerit, sustinentes flores luteos.

☞ **Quinquefolium Canadense erectum:** Hujus caules sunt Bipedales, erecti, flosculos gerunt magnos, luteos, capsulas feminales, aliorum more.

R.

☞ **RANUNCULUS arvensis annuus flore minimo luteo:** Hic Ranunculus folia gerit hirsuta, tripartita, caules edit per terram sparsos, quorum summis caulibus innascuntur, flosculi lutei, minimi, quinque (aliorum more) petalis donati. Quibus deciduis, succedunt racematim, semina minora, spinosa aliorum more.

☞ **Ranunculus nemorosus flore albo pleno:** Hic sola plenitudine florum differt, à nemoroso, flore albo simplici.

☞

☉ Ranunculus nemorosus flore pleno violaceo : Hic paritèr plenitudine florum, & colore violaceo, differt, à nemoroso simplici. Quoad folia & radices idem.

☉ Ranunculus Ceratophyllos, seminibus falcatis, in spicam addactis : Foliis est ter, tripartitis : Cornu cervi quodammodò referentibus è quorum medio exeunt cauliculi plurimi, triunciales, singuli, singulos sustinentes flosculos (aliorum Ranunculorum more) quinque luteis petalis constantes ; ambientibus rudimentum viride, quod tandem in spicam degenerat uncialem ; seminibus falcatis onustam. Annua est plantula, præcox. Mense Martio floret, in segetibus, Galloprovinciæ, & Narbonensis Galliæ, satis frequentèr : perperam à Lobelio in adversariis pagina II. appingitur pro Melampyro perpusillo ; cum Melampyrum (in genere) sit planta Galeata, toto Cœlo, ab hoc Ranunculo, discrepans. Cumque omninò propiùs ad Ranunculorum classè accedit. Magis appositè Ranunculus dicitur. Vide Hallucinationes

lucinationes Caspari Bauh. in Pin. pag. 234. colum. 2. plant. 6.

☉ Raphanus sylvestris major flore luteo: Folia sunt longa, ferrata: aquis innant. Flore est luteo, sed dum recedunt aquæ, mutant incisuram foliorum; florem fert luteum; (ut ante dictum) siliquas seu potius siliculas fert, aliorum (suæ classis) more.

☉ Raphanus minimus luteus Nasturtii folio: Hæc planta florem fert Tetrappetalum, luteum; Thecamque seu siliculam, bicapsularem: radicem etiam edit longè latèque repentem, ut Raphanus vulgaris, quin & uda, humidaque amat loca. Quæ omnia Raphani sese declarant speciem: folia autem gerit Nasturtii tenuitèr divisa, seu dissecta, flores factis amplis luteos, pro exiguitate plantæ. Vix, palmares aut sesquipalmares edit caules, quorum summis, (post deciduos flores) succedunt siliculæ bicapsulares.

☉ Rapuntium Soloniense, violaceo Galeato flore: Hæc Rapunculi species, radicem habet, asclepiadis; caules emittit bipedales, quorum summis fastigiis, eorumque

rumque alis, innascuntur flores Galeati, cœrulei: Rapuntii Americani, (quod flos Cardinalis Columnæ dicitur) omnino æmuli. Quibus flaccescentibus, succedunt capsulæ triangulares, (aliorum Rapunculorum more) continentes semina pellucida rufa. Tota planta percalida est, & Masticata linguam, urendo, pungit. Crescit in humidis ericetis & sylvis annosis, passim in agro Solonienti, alibique in Gallia. Malè à Casparo Bauh. in Pin. pag. 110. collocatur pro draba, flore cœruleo Galeato. Quum nil habet affinitatis, cum siliquosis, cujus draba est species. Rapuntium Galeatum sese declarat, ex succo lacteo emanante ex qualibet parte rupta; adde capsulam seminalem, & semina. Rapunculorum classi accedentia.

⌘ Reseda latifolia, flore flavo: Hæc Resedæ species, folia gerit lata, obscure virentia; caules edit Bipedales, in quorum summis nascuntur flores flavi (aliorum Resedarum more) spicatum dispositi: quibus evanidis succedunt, Thecæ, seminales tricapsulares, ut etiam, reliquis, suæ familias; contingit. ⌘

- ☉ **Reseda foliis Calcitrapæ, flore albo :**
 Hæc Reseda , folia gerit omnimodè di-
 visa, quemadmodùm Reseda vulgaris ;
 caules edit sesquipedales, in quorum fa-
 stigiis, nascuntur, flores albi, staminulis
 multis purpureis donati. Quibus succe-
 dunt Thecæ tricapsulares ; seu tribus
 loculamentis distinctæ ; semina multa
 nigra in se continentes.
- ☉ **Ricinus minimus :** Omnibus suis par-
 tibus : cedit, majori & medio, quoad
 semina, folia & caulium altitudinem.
- ☉ **Rubeola maritima lutea :** Hæc Ru-
 beolæ species, in ora maritima, Armori-
 cæ. Radice longè latèque repente, re-
 perire est, passim. Flore donatur luteo
 minimo (quatuor petalis conflato) flori
 unicuique, succedunt bina semina testi-
 culata, Rubeolæ more.
- ☉ **Rubeola minima alba :** Plantula est
 in viis aridis , conspectui, satis obvia :
 flore minimo albo, tetrapetalo aliarum
 more, foliis spinosis donatur. Florum
 singulis, succedunt bina semina testicu-
 lata ; cœterarum more.

S.

S.

☞ **S**ANICULA montana crenata, umbilico pallido: Species est Saniculæ montanæ Guttatæ, cujus folia sunt oblonga tenuia, ferrata, è quorum medio; foliis crenatis (Rosæ instâr) septo: exit cauliculus Dodrantalis, ruber, sustinens plurimos flores albos, (aliarum more) punctatos, umbilico pallido affectos. Quorum singulis cadentibus succedunt filiquæ singulæ bifurcatæ, aliarum Sanicularum, montanarum, & Saxifragæ Chelidonidis more, nam hæc est vera & genuina Saxifraga montana, à flore & capsula seminali, seminibus inibi contentis, datur plantæ jam delineatæ, species minor, quoad folia & caules.

☞ Saxifraga aurea Lichenis facie: Hæc Saxifragæ aureæ, species, satis frequenter reperitur in rivulis aquæ dulcis, à fontibus jugibus manantibus. Folia gerit oblonga, ferrata hirta per terram strata. Flosculos in alis, luteos; quin & primo intuitu,

intuitu, à Saxifraga aurea montana rotundifolia, discernitur, à foliorum, densa dispositione, & forma longa, cum alterius, montanæ, sint rotunda & rariora.

☉ Scabiosa Gramineis foliis glabris: Hæc aded est similis, Scabiosæ: argenteo, folio, quod hæc, folio glabro sit. Altera, folio argenteo, seu, incano prædita. Utraque est Calyce membranaceo, & semine lanuginoso, donata.

☉ Scabiosa foliis dissectis, flore amplo, Calyce membranaceo, semine lanuginoso: Hæc folia, admodum tenuitèr dissecta, Columbariæ adinstar habet; sed flores gerit amplos, dilutè cœruleos, quorum singulis succedunt, semina lanuginosa, Calyce amplo membranaceo, donata.

☉ Scabiosa minima, annua, erecta semine anguloso: Vulgaris instar, hæc Scabiosæ species est. Pedales & sesquipedales profert caules, erectos. Folia, vulgaris quodammodò æmula, sed multò minorra. Flores itidè multò minores, carnos: quin & semina habet, vulgaris ritu, angulosa.

☉

☉ Scorzonerā nostras, pulverifera : Hæc
 in pratis humidis & udis, Italiæ Galliæ
 & Germaniæ, inter perfectas nostrates
 provenit, in pratis inquam & sylvis hu-
 midis ; secus fluviorum margines, sitis ;
 à nostrate perfectum florem & semina
 gerente , in hoc solo, differt, quod in
 hujus caulium summis, nascitur, globu-
 lus, Bellidis majoris more, Calyculo in-
 expanso : in cujus sinu, loco floris con-
 tinetur pulvis ferrugineus, ad Cynabe-
 ris colorem, valde accedens. Subtilitate
 nulli, peritissimi artificis manus indu-
 stria, facto, secundus. Imò brevi, partim
 pluviis ingruentibus, partim humidis
 deciduis (nocte) vaporibus, accedente
 solis diurno calore, in materiam fæci
 vini similem, exsiccatam, degenerat :
 Quam Tartarum vini, acetarii, nomi-
 nant : qua tandem decidente, apparet
 apex cauliculi, ad modum dentis Leonis
 (caput Monachi dicti) floribus & pappo
 suo exutus. Scorzoneram ritè dici ar-
 guunt partium dispositio & omnimoda
 cum Germanis seu nostrate conforma-
 tio, excepto Apice. Pulverifera dicta,
 V quod

quod loco floris & consequentèr seminum, pulverem (ferruginei coloris) in Calyculo caulium, Apici innascenti, gerat. Viget in omnibus pratis humidis Galliaè indifferentèr cum nostrate, seu Germanica dicta. Apex autem pulverifer, ab Aprili medio, usque ad idus Maii exactas, perseverat, nec ultra hoc tempus, ipsum conspiciere licet, cum sit tantum vitium naturæ, à Cælo aut solo proveniens. iisdem viribus, & radix & folia sunt prædita, quibus & nostras perfectæ, ut ex radicis, foliorum colore, sapore, succoque lacteo, totiusque plantæ consistentia, colligere licet; idem observare licet in Tragopogo & aliis, ut sæpe nobis fuit obvium, in peregrinationibus nostris Botanicis, serenissimi, principis Gastonis Franciaè, impensis & liberalitate factis.

⚔ Scrophularia foliis & caule hirsutis :
 Hæc Scrophulariæ species folia habet hirsuta, lanuginosa, Urticæ quasi æmula, quin & caules producit multò humiliores, vulgaris caulibus; paritèr hirsutos, flores & capsulas bivalves Pyramidales, vulgaris more habet. ⚔

☉ *Scutellaria Americana*, *Malvæ folio* :
 Planta est emittens folia, quodammodò
Malvæ foliorum æmula (quoad figuram)
 sed majora è quibus profilit caulis, ses-
 quipedalis, rectus, plurimos in fastigio
 fundens flores verticillatos Galeatos,
 quibus evanidis succedunt capsulæ, tali
 instar, qui supponitur, mulierum Cal-
 ceis, si posteriùs inspiciatur capsula, si
 autem superiùs consideratur capsula se-
 minalis, Scutellam omninò refert, cavi-
 tate sua, in superiore parte. Nos hanc
 exoticam addimus novo generi à nobis
 designato. Scutellariam appellando ex
 variis nominibus, ab authoribus Bota-
 nicis, varijs in locis dispositis : ut cuilibet
 consideranti, clarissimè apparebit ex
 doctrina de Hallucinatione Caspari
 Bauh. in Pin. tam in denominandis quàm
 digerendis plantis. Nos omnes plantas,
 capsulas seminales, Scutellatas, ad eun-
 dem modum efficientes Scutellatas ap-
 pellavimus, & *Scutellariæ*, novum ge-
 nus creavimus.

☉ *Securidaca peregrina* : Fortè *Pares-
 feux Galicæ* id est planta sensibilis pygra

Legumen est, cujus unicuique, foliorum Rachi, seu nervo medio; è regione, plurima adnascuntur folia, dena duodena, uno extremum claudente. Nec siliquam nec semen observavi. In horto Regio Blesensi floruit, sed per rigorem tempestatis, anni periit sine siliqua aut femine. Pigrè seu lentè se movet, tacta.

☉ Securidaca minor lutea, siliquis articulatis: Vide Ornithopodium *Συριεστος* minus nobis. Scorpioides altera Johan. Bauh. in horto Regio Blesensi aucto.

☉ Sedum longifolium Citrino flore: Hæc sedi species, à sedo longo folio vulgari, solo, floris Citrini colore; differt. Quippe vulgare teritefolio; aureo seu luteo donatur flore, semen & capsula seminalis, hujus & illius, eadem; frequentèr reperitur in rupibus Saxosis, ad dextram Viæ communis, eundo Blesis, in oppidum, pictonum caput; vix milliare, ab oppido distantibus.

☉ Sedum teretifolium majus flore albo: A præcedenti solo floris colore differt. Circa Rupellam, frequens satè in tectis, & summis murorum, reperitur.

☉

⌘ Senecio Jacobææ folio: Hujus folia omninò sunt Jacobææ, in modum secta, ipsis in omnibus similia, at dum florem edit, Senecionem se prodit, quia Senecio florem fert, multis staminibus luteis conflatum. Sine foliis latis, stellatim aut rotatim, ipsa stamina cingentibus, quod videre est in hujus flore.

⌘ Sideritis glutinosa, bitumen redolens: Hæc Sideritidis species, Dodrantis est altitudinis, cujus folia, ex adverso sita, sunt hirta, glutinosa Caulibus (binatim) adhærentia, contacta manibus, & naribus admotis: bitumen redolent, flores albos & semina reliquarum Sideritidum modo fert.

⌘ Sinapi filiqua hirsuta, semine rubro: Hæc Sinapi species à vulgari, filiqua hirsuta, semine albo, solo seminum colore differt.

⌘ Sium minimum ferulaceis foliis: Sium hoc ad margines fluviorum, per siccitatem æstatis, exsiccatorum reperitur. Vix palmarem excedit altitudinem: folia gerit ferulacea seu Fœniculacea, crassa biuncialia, aut triuncialia: pediculos

parùm aut nihil Palmum superantes, edit. In quorum fastigiis nascuntur flosculi umbellati albi, quorum singulis deciduis succedunt bina semina, minuta, striata, aliarum hujus generis umbellarum more.

☉ Solanum foliis & caule spinosis: Hujus folia sunt lata, angulosa, sinuatave, spinis armata, quemadmodùm etiam caules, spinis armantur, flores fert Solani modo, aut potiùs borraginis, semina nunquam observare licuit quippe perennis est planta, radice per terram longè latèque repentè, dotata. Ideò natura, minùs productioni seminum intenta, quod in pluribus repentibus observavimus.

☉ Solanum fœtidum pomo grandibus aculeis donato: At nobis, pomo aculeis crassioribus & longioribus donato: Hæc Solani species, & folia & flores vulgaris foliis & floribus, multò gerit minora, poma autem aculeis, multò crassioribus & longioribus prædita, fert.

☉ Solanum pomiferum fructu rotundo, parvo, molli, rubro, plano: Vulgò pomum

num amoris hoc, dicitur authoribus. Fructu est cerasi instar (quoad magnitudinē) nunc, luteo, nunc, rubro est colore.

☞ Solanum pomum amoris, fructu, striato molli, aureo: Hujus pomum, seu fructus, solis striis, à molli aureo plano majore differt.

T.

☞ **T**ELEPHIUM Portulacæ folio: Hæc Telephii species, sola crassitie, seu spissitudine foliorum, Portulacæ æmulorum, à cæteris suæ classis, facile distinguitur.

☞ Teucrium regium purpureum: Hæc Chamædryos species, multò altior est vulgari, humilior Teucrio frutescenti vulgari: flosculos gerit amplos rubros, Galeatos. Quibus pereuntibus subveniunt semina itidē magna: folia sunt Lucida, obscuréque virentia.

- ☞ *Thalictrum pratense maximum, Moris-*
speliensium asperioribus foliis seu : Folio
rugoso ; nobis. Hæc Thalictri species
ad ternos quaternos, pedes ascendit.
Folia, rugis scatentia, gerit, in superiori,
seu prona superficie, dilutiùs virent,
quam, pratense vulgare. Muscarium seu
Muscosos flores edit luteos, semina ru-
gosa (aliorum more) & striata, (excepto
Thalicthro Canadensi, Cornuti : quod
semina gerit triangula) omnia Thalictra
habent semina striata.
- ☞ *Thlaspi Iberidis folio, tenuissimè di-*
viso : Hoc, omninò Thlaspi Iberidis
folio accedit ; in omnibus, nisi quod fo-
lia habeat, multò tenuius dissecta. Flo-
res & semina, cœterasque partes mino-
res.
- ☞ *Thlaspi Alyssum minimum : Hæc*
Thlaspios species, est à flore, semine om-
nibusque suis partibus à prioribus, (ma-
jore & minore videlicet) notu facilis,
propter exiguitatem partium.
- ☞ *Tithymalus Caracias lanuginosus :*
Hic Tithymalus passim in sylvis Galliæ
Solonientis, provenit, & à foliis lanugi-
ne

ne obductis, à cœteris, suæ fortis faciliè cognoscitur.

☉ Tithymalus Caracias radice repenté : Folia gerit oblonga, radicem longè latèrque serpentem producit qua nota distinctu est facilis.

☉ Tithymalus Caracias radice pyriformi : Sola radicem tuberositate pyriformi, dignoscitur inter omnes Tithymalos (Caracias) dictos.

☉ Tithymalus Caracias, Salicis minoris folio : Hic à similitudine, foliorum Salicis longifoliæ vimineæ, notatu facilissimus.

☉ Tithymalus Linariæ folio, lunato flore : A foliis Linariæ similibus & flore, Lunæ crescentis, referente figuram ; absque longa verborum serie, faciliè dignoscitur.

☉ Thymum Creticum frutescens : Planta, est seu potiùs Suffrutex, sesquipedalis, nudos edens cauliculos, foliolis longis, Satureiæ omninò similibus, onustos, quin & odorem fragantissimum, inter Thymi & Satureiæ, medium, suggerit.

☉ Tragopogon pratense luteum minus :
Hæc

Hæc Tragopogi species, sola partium suarum, præcipuè florum & seminum, foliorumque parvitate, à majore differt describitur à Parkinsono, in Theat. Botanico.

☞ Trifolium bitumen redolens majus : Hoc à minore omnibus suis partibus magnitudine solummodò distinguitur, præcipuè florum & seminum.

☞ Trifolium pratense majus album, caulibus fistulosis, foliis subtùs punctatis nigris : Hoc Trifolium, in pratis udis & humidis crescit. Cauliculos profert procumbentes, cava seu fistulosos, pedales & sesquipedales, in quorum, summis alis exeunt flores subalbidi, seu Ochroleuco colore præditi. Planta hæc ad extremum pediculorum, producit terna folia subtùs maculata, maculis nigris seu fuscis obducta.

☞ Trifolium album, subterraneum, Tricoccon, regium : Hoc Trifolium paritèr in udis & humentibus arvis seu pratis provenit. Ineunte æstate flores fert albos, quorum singulis deciduis succedunt, involucria, reticuli in modum, facta.

αα. *Continentia terna semina; ut plurimum, statim evanescenti flore, in terram descendunt rudimenta seminum, seseque ibidem condunt, in ibique perficiuntur, ideo subterraneum nuncupavimus. A trinis seminibus (ut plurimum, nisi Cœlum & solum refragentur) Tricoccon diximus; denique regium addidimus, quoniam, ab ipsa celsitudine ejus regia, aurelianensi duce (ut plurimæ aliæ plantæ hic scriptæ) primò detectum fuit.*

☉ *Trifolium nodosum capitulis Thymi: Perexigua est hæc species Trifolii sub exitum hyemis: Palmares & sesquipalmares, edens cauliculos per terram stratos, ad quorum singulos nodos, nascuntur flosculi minimi, quibus deciduis, succedunt vascula plurima, simul ad nodos juncta: Thymi capitulis similia.*

☉ *Trifolium Salmanticensi affine: Hæc Trifolii species, Salmanticensi Clus. ad eò accedit ut idem videatur, nisi quod, (quoad omnes partes) sit minus.*

☉ *Trifolium vesicarium ampullatum, Rubello flore: In humidis Sabulosis in ora maritima Armoricæ, & prope Rupellam,*

pellam, copiosè satis pullulat hæc Trifolii species, vix Dodrantalem excedit altitudinem, imò, frequentèr ad palmarem vix pervenit. Flosculos globatim gerit elegantes, dilutè rubri coloris. Quibus evanescentibus, succedunt ampullæ, in modum vesicarum membranacearum; continentes, semina subflava, Trifolii fragiferi instár.

☞ Trifolium cochleatum majus, fructu globoso plano: Fructum fert Cochleatum planum, globuli instar: hoc Trifolium. Et eo nomine à cæteris Cochleatis, perquàm facilè notu.

☞ Trifolium Cochleatum, spinosum, majus, spinis sursùm & deorsùm tendentibus: Hujus fructus est Cochleatus, Cerasi magnitudine, spinis, sursùm & deorsùm tendentibus atque hac nota, facilè cognoscitur; est & hujus alia species fructu Cerasi, itidem magnitudine, spinis rectis cujus folia sunt, cordata maculata. Medicæ Arabicæ, Camerarii instár.

☞ Trifolium Cochleatum, spinosum minus, nigrum Ciliare: Hæc Trifolii species,

cies, inter Cochleatas, radice est perenni, longè latèque repente, medicæ falcatae vulgaris more; in summis caulium Bipedalium, multa vascula, seu fructus Cochleatos, spinosos congestim fert nigros; Ciliares (guillandino, satis appositè, medica Ciliaris dicta) quia ciliorum pilis nigris, perquam sunt similia. Unde à radice perenni, repente: Quod solummodò, medicæ marinæ incanæ & Ciliari huic medicæ guillandini, convenit, inter omnes medicas Cochleatas, facillè cognoscuntur: cæteræ quippe annuæ sunt.

☞ Trifolium Cochleatum spinosum minus *δυσέρπον*, seu *αλυγέρπον* hæc parva Trifolii species, mille passus à capite Blesensium, prope Cellam, Eremitarum, copiosissimè provenit. Est vix triuncialis, in Aridis illis locis seu collibus Saxosis: fructum fert rotundum, Cochleatum (ad Pisi majoris magnitudinem) spinosum, binatim è nodis Caulium (per terram stratorum) exeuntem.

☞ Trifolium Lagapoides, flore pallido luteo: seu Ochroleucon: Hoc in sylvis meridio-

meridionalibus, Blesensibus, satis copiose provenit. Folia edit terna, incana lanugine obsita: in fastigio caulium erectorum, Dodrantalium, proveniunt, spicæ oblongæ, Lagopi instar: coloris subalbidi seu potius (ut cum Clusio loquar) ex *οχραύρα* compositæ. Semina & seminales capsulas aliorum, suæ familias more, producit.

☉ Trifolium Acetosum, Corniculatum Indicum, rectum: Hujus caules eriguntur rectâ & ad pedalem, altitudinem, folia, flores & siliquas seu Cornicula fert, repentis lutei minoris, quoad omnes suas partes, multò majora. Nota insuper hoc exoticum esse, cum repens luteum minus passim in Britannica Gallica, seu Armorica provenit.

V.

V.

☉ **V**ALERIANELLA nostras, major Scabiosæ semine : Hæc à Valerianella Scabiosæ semine, à doctissimo Fabio columna descripta & picta, sola magnitudinæ feminum, præcipuè differt : quod, duplò sunt majora, ipsius feminibus, à colum. descripti.

☉ Valerianella, semine hirsuto, extremo umbilicato : Hæc semina gerit (quoad formam seu figuram) Uvarum acinis, similia. Sed hirta & ad extremum umbilicata, seu magis cava.

☉ Valerionella semine hirsuto minore rotundo : Hujus semen est hirsutius, prioris feminibus, valdè caucalis minoris semini (quoad figuram) accedens. Spontè provenit in picardiæ novalibus.

☉ Valerionellæ vulgaris, species major Serotina, præcox : Vulgari (dicta lactuca agnina Gerardo) præcocior est ; verna est planta, ineunte vere flores fert, subcœruleos, semina compressa, tumidiuscula

uscula tamen habet, statimque disparet. At hæc, cum frumento sub finem æstatis, maturescit. Sesquipedalis est planta, erecta, inter sata crescit, flores fert albos. Semina, prioris vulgaris seminibus, duplò majora, & multò crassiora & rotundiora producit. In satis arvis, intra septa Regiæ Chambort & alibi circa Blesas, inter sata reperitur: satis frequenter.

☉ Verbasum ramosum, floribus albis parvis: Folia gerit quasi Cinere obducta, cauliculos edit Bipedales, & Tripedales ramosos: sustinentes plurimos, flores albos, parvos. Quorum, singulis deciduis, succedunt: Valvulæ bicapsulares, mucronatæ, duplici loculamento distinctæ, minuta semina subrufa, hinc indè continentes aliorum more.

☉ Verbasum perenne nigrum floribus albis: Hæc Verbasci species folia gerit subviridia, flores gerit, itidem albos, minutos, quibus pariter, succedunt capsulæ bivalves, minutè semina minuta (ut cœtera suæ familias) in se continentes perennis est planta.

☉

☉ Verbena Urticæ folio : Planta est Bipedalis, aliquandò altior, è regione ; ad caulium. Nodos, quadratorum, bina nascuntur folia, mucronata, Urticæ majoris foliis, haud absimilia ; sed saturatiùs virent, quoad flores, & semina, Verbenæ vulgari, in omnibus accedit.

☉ Veronica spicata, flore purpureo : Hæc à vulgari, flore cœruleo, solo florum colore differt.

☉ Vicia maxima annua, foliis ferratis : Hæc solis foliorum incisuris, ferræ, similibus, à vulgari Vicia maxima, annua (perperàm, authoribus Faba Græcorum dicta) differt, cum hæc capreolis doneatur, Viciam sese declarat, porrò nec siliquam, nec fructum, Fabæ, conformes habet. Judicent lectores attenté. Plura addere non expedit impræsentiarum.

☉ Vicia præcox verna, minima Soloniensis, semine Hexedro : Hæc omnium hujus seriei, est planta minima, sub exitum hyemis, in pratis, contra Regiam Chambort, floret. Florem fert dilutè rubentem, siliquam vix pollicarem edit quin & semina angulosa, minuta, Hexe-

X

dram

dram referentia, unde ei nomen à nobis inditum, datur & Lathyrus, Gramineis foliis, ejusdem formæ, quasi gerens semina, Hexedram referentia: de quo supra diximus.

☉ Vicia siliquis glabris, flore violaceo: Est Viciæ .s. Craccæ minimæ species, siliquis glabris Joh Bauh.

☉ Viola Granadillæ folio: Hæc Viola exotica, semine & floribus, nostrati vulgari, Martiæ, omninò conformis est similem violaceo colore præditum, fert florèm: Sed folia habet lata, sinuosa, in plurimos Lobos profundos divisa Granadillæ seu floris passionis, Granadillæ majoris modo, unde ei nomen; datum.

☉ Virga aurea foliis lævibus, non ferratis: Hæc folia gerit læviora longioraque, vulgaris Virgæ aureæ foliis: sed nullam, in margine patiuntur ferraturam.

☉ Virga aurea Americana, foliis ferratis angustis, subtùs nervosis: Hujus folia sunt subtùs adeò nervosa, & eminentèr angusta, maximèque ferrata, quin & radicem habet odoratissimam; hisce notis notu facilis. ☉

⚔ Virga aurea Americana hirsuta, radice odorata, foliis serratis: Hujus folia superiùs, quasi pube obducuntur, & hac nota cognitu inter cœteras, (junge quod sint multò latiora, multoque profundiùs serrata, superioris foliis) facilis est.

⚔ Virga aurea humilis Alpina: Hæc in omnibus vulgari accedit; sola parvitate discrepans, est enim Virga aurea vulgari triplò minor. Cœtera ei par.

⚔ Virga aurea, altera Solidago Saracenicæ: Foliis minùs spissis, constat, quàm Solidago vulgaris. Ad altitudinem, quatuor plùs minusve pedum, assurgit. Frequentèr nobis fuit obvia, in declivibus, Regionis illius Galliæ (Morvan dictæ) inter Burgundiam & Barboniam sitæ.

⚔ Urtica racemosa Canadensis: Hujus folia sunt multò obscuriùs virentia, quàm Urticæ nostratis majoris: insuper hujus folia non pungunt, quippe non copiosè pube pungente, arman- tur: in cœteris, ei, semine & floribus par.

X 2

Obser-

(325)

Observationes Generaliores

EX

Horto REGIO

BLESENSI

Anno, collectæ:

BOTANICÆ

Rei, studiosis, necessariæ, &
cognitu perutiles.

Arbores, perpetua fronde, virentes.

Pomifera.

MALUS Aurantia. Malus Limonia.
• Malus Citria.

Conifera & Resinifera.

Abies.
Picea.

Pinus.
Pinaster.

X 3

Cedrus

Cedrus Libani, .s. Conifera.	Cupressus scemina.
Cupressus mas.	Cupressus humilis .s. Cedrus Lycea.

Glandifera.

Ilex Glandifera.	Suber.
------------------	--------

Baccifera.

Laurus vulgaris.	Juniperus.
Laurus Indica Baptist. Ferrarii.	Myrtus.
Laurus tinus e jusque species.	Alaternus.
Agrifolium .s. Ilex Baccifera.	Phillyrea.
	Pyracantha.
	Taxus.
	Hedera arborea.

Alia varia.

Cerasus Lauri folio.	Buxus.
Thuya .s. Arbor vitæ.	Akacia Syriaca.
Arbutus.	

Resinifera foliis deciduis.

Larix.	Lentiscus.
Terebynthus.	Styrax.

Frutices

*Frutices & subfrutices perpetua fronde
virentes*

B Arba Jovis.	Chamæcistus.
Cytisus Maranthæ.	Anonis montana purpurea.
Genista Hispanica.	Caryophyllus Creticus.
Genista vulgaris.	Cneorum Matth.
Jasminum lateum	Ruscus.
Rosmarinum.	Hypoglossum .f. Laurus
Rosa sempervirens.	Alexandrina ejusque
Sabina.	species.
Rhus Myrsifolia .	Hissopus.
Althæa arborea Olbiæ.	Lavendula.
Malva Hispanica.	Thymum.
Sedum vermiculatum	Satureia sempervirens.
Salvia Verbasci folio &	Pimpinella spinosa .f. Po-
ejus species.	terion.
Atriplex Halimus, & Por-	Ruta.
tulaca marina.	Clematis Daphnoïdes
Chamælea tricoccus.	major & minor.
Laureola.	Abrotanum.
Erica ejusque species.	Absinthium.
Alstragalus Baticus.	Smilax aspera.
Chamædrys Arborescens	Stœchas Arabica.
& vulgaris.	Thymelæa.
Colutea ejusque species.	Tragacantha.
Cistus mas.	
Cistus femina eorumque	
species.	

X 4

Herb.s

Herbæ perpetua fronde virentes.

- S**alvia hortensis ejusque species.
 Polium ejusque species.
 Majorana.
 Marum Syriacum.
 Marum, Mastic. Gallo-
 rum.
 Hedera terrestris.
 Lamium luteum variegatum.
 Bugula.
 Prunella.
 Serpillum.
 Ageratum.
 Aloë Americana.
 Aloë vulgaris.
 Yuca.
 Keiri Arabum ejusque species.
 Leucoium marinum incanum ejusque species.
 Leucoium viridi folio odoratissimum.
 Draba repens.
 Nasturtium aquaticum.
 Thlaspi spinosum luteum.
 Thlaspi supinum luteum.
- Cochlearia.
 Anagallis aquatica.
 Azarum Canadense.
 Azarum vulgare.
 Bellis.
 Auricula urfi.
 Primula veris.
 Caryophyllus ejusque species.
 Caryophyllus Holosteus tomentosus.
 Caryophyllus minor marinus Globosus.
 Armerius.
 Lychnis Cotonaria .s. Coronaria.
 Sedum vulgare.
 Sedum Arborefcens.
 Sedum Rosaceum ferratum ejusque species.
 Sedum Vermiculatum ejusque species.
 Telephium ejusque species.
 Tithymalus Caracias ejusque species.
 Tithymalus Myrsinites , &c. Sani-

Sanicula.
Pſyllium ſempervi-
rens.

Chamæmelum nobile.

Coris cœrulea.

Cymbalaria Italica.

Eryngium marinum.

Ficus Indica } major.

.ſ. Opuntia. } minor.

Gentianella verna.

Hypericum perfoliatum

& perforatum,

Fragaria.

Jacea luſitanica ſemper-
virens.

Scabioſa Cretica Arbo-
reſcens.

Trifolium hæmorrhoi-
dale.

Antirrhinum.

Champhorata Monſpeli-
enſium,

Carthamus cœruleus.

Capillares omnes.

Filices quædam.

Polypodium.

Plantæ ſuccum Lacteum fundentes.

Ficus ejuſque ſpe-
cies.

Verium .ſ. Laurus Ro-
ſea.

*Ha dua Arbores ſuc-
cum reddunt; hujus
viridis illius lacteus,
emanat.*

Apocynum ejuſque ſpe-
cies.

Aſclepias ejuſque ſpecies.

Convolvulus ejuſq; ſpe-
cies.

Rapunculus ejuſque ſpe-
cies.

Campanula, Trachelium
.ſ. Cervicaria ejuſque
ſpecies.

Viola pentagonia, Ono-
brychis dicta, ejuſque
ſpecies.

Cichoreum Intybus ſeu
Endivia

Endivia ejusq; species.

Lactuca ejusque species.

Sonchus ejusque species.

Chondrilla ejusque species.

Hieracium ejusq; species.

Pilosella ejusque species.

Dens Leonis ejusq; species.

Tragopogon ejusq; species.

Scorzonera ejusque species.

Carduus Scolymus seu
Eryngium luteum.

Seseli palustre lactescens.

Thysselfium Dod.

Plurima umbella montana, ex radice incisa,

succum fundunt lacteum.

Papaver ejusque species.

Rhæas ejusque species.

Argemone ejusque species.

Tithymalus ejusque species.

Elula & ejus species.

Catapucia, peplus, peplis,
Chamaesyce.

*Haec duo Planta sequentes
succum fundunt
rubentem.*

Beta rubra.

Lapathum sanguineum.

Chelidonium majus succum reddit aurum.

Planta

*Plantæ tuberosæ .f. tuberosa radice
prædita.*

A NEMONE, omnesque ejus species.

Pulsatilla.

Ranunculus { Asiaticus.
Illyricus.
Mohtanus.
Grumofus, tuberosus.
Chelidonium minus.
Alphodeli radice.
Rutæ folio, &c.

Geranium { Triste Cornuti.
Tuberosum.
Batrachoides.
Hamatodes, &c.

Coty. { radice rotunda.
ledon { radice oblonga.

Rhodia radix.

Telephium e jusq; species.

Saxifraga alba Chelidonides.

Bulbocoffanum.

Orchis { Testiculata.
Palmata, diversæ earundem, omnes species.

Dens Caninus.

Dentaria.

Fumaria { Canadensis tuberosa : Cornut.
radice { zava,
non cava.

Bistorta e jusque species.

Doronicum { radice { Bra-
chiata.
Scorpioides.

Chrysanthemum radice { rotunda } vide
ce { oblonga } Battatas.

Aconitum e jusque species & anthora.

Pimpinella sanguisorba.

Scrophularia.

Panax Coloni .f. Sideritis strumosa.

Cariophyllata.

Tormentilla.

Lathyrus { nostras.
v. Apios } Americana Corn.
Sylv. repens Park.
Cycla-

Cyclamen ejusque species.

Arum.

Arisarum.

Dracuntium.

Symphytum tuberosum.

Solanum tuberosum vide

Battatas.

Calceolus mariz.

Orobanche seu Rapum

Genizæ & Dentaria.

Tithymalus } Apios.
 } Pyrifor-
 } micaradice.

Polygonatum .f. sigillum

Salomonis.

Accorus verus.

Iris tuberosa ejusq; species.

Aristolochia } rotunda.
 } longa.

Battatas

Indiæ Occidentalis .f. Inhame Orientalis lusitanorum, species Convolvuli lactescens. Canadensis, Chrysanthemi species Virginiana, Solani species.

Bryonia } alba.
 } nigra.

Gramen } Nodosum.
 } Typhodes seu
 } Perlarum in-
 } star.

Cyperus } sedulis Thrafi.
 } litoreus inodorus.
 } alizque ejus species.

Nymphæa lutea major.

Plantæ,

*Plantæ, Carnosa radice, præditæ:**Coniformes seu Pyramidales.*

A Sphodelus { albus.
 { luteus.
Alectorolophos alpina.
Rapuntium, Trachelium,
Campanula eorumque species.

Napus.

Rapum radice { longa.
 { rotunda.

Raphanus fativus { ruber
 { niger.

Raphanus rusticanus & sylvestris.

Beta rubra radice Rapæ.

Lapatham, ejusque species.

Oxalis ejusque species.

Dens Leonis.

Tragopogon.

Scorzonera.

Centaurium majus ejusque species.

Carlina.

Eryngium.

Fœniculum.

Sisarum.

Ænanthe ejusque species.

Apium ejusque species.

Pastinaca sativa, latifolia.

Pastinaca sativa tenuifolia, Carota.

Omnes Umbella montana, luteos gerentes flores, radicem habent crassam, carnosam, Coniformem s. Pyramidalem cum medulla duriore in medullis: Lactescunt ut plurimum.

Nardus radice { Olivari.
 { oblonga.

Circium ejusque species.

Valeriana.

Filipendula.

Mentha tuberosa.

Pœonia ejusque species.

Mandragora.

Mirabilis peruviana.

Arbores

Arbores Calide.

Ficus.

Nerium.

Bacciferae Calide.

Terebinthus.

Mezereon Germanicum.

Lentiscus.

Chamelæa tricoccus.

Laurus domestica.

Thymelæa.

Laureola, sempervirens.

Rhamnus solutivus.

Coniferae & Resiniferae Calide.

Abies.

Thuya .f. Arbor vitæ.

Picea.

Cupressus.

Pinus.

Cedrus Lycia; cupressi
minor species.

Pinaster.

Cedrus Libani .f. Coni-
fera.

Juniperus.

Larix.

Sabina.

Styrax seu Storax.

Subfrutices Calidi.

Rosa ejusque species.

Asclepias ejusque species.

Apocynum ejusque spe-
cies.

Clematis ejusque species.

Lupulus.

Plantæ

Planta Calida.

Convolvulus ejusq; species.
 Nasturtium Indicum.
 Glycyrrhiza vulgaris.

Melilotus ejusq; species.
 Foenugracum.
 Iris tuberosa.

Bulbosa Calida.

Crocus autumnalis, sal-
 tem ejus stamina.

Cepa.

Allium.

Moly.

Porrum.

Scilla.

Lilium album.

Narcissus.

Hyacinthus.

Rapunculus seu Campa-
 nula ejusque species.

Trachelium seu Cervi-
 caria ejusque species.

Gratiola.

Hypericum.

Ruta.

Siliquosa, tetrapetala Calida.

Brassica.

Sinapi.

Eruca.

Nasturtium siliquosum.

Draba siliquosa.

Erysimum seu Irio.

Napus.

Rapum.

Rapistrum.

Raphanus sativus .s. Ra-
 dicula.

Leucoium.

Hesperis.

Dentaria.

Siliculosa

Siliculosa tetrapetala Calida.

Thlaspi.
 Nasturtium siliculosum.
 Bursa pastoris.
 Cochlearia.
 Iberis.
 Lepidium.
 Draba siliculosa.
 Raphanus sylvestris.
 Raphanus hortensis seu
 Rusticanus.
 Myagrum.

Rapistrum Monosper-
 mon.
 Coronopus Ruellii.
 Veronica ejusq; species.
 Polygala.
 Persicaria urens.
 Agrimonia.
Lactescentes Cichoracea
& papposa, per se om-
nes (quippe amara)
sunt Calida.

Corymbifera Calida.

Conyza.
 Abrotanum.
 Absinthium.
 Artemisia.
 Tanacetum.
 Matricaria.
 Chamæmelum.
 Millefolium.

Parmica.
 Ageratum.
 Pimpinella & Agrimo-
 noides Col.
Umbellifera omnes sunt
magis aut minus Ca-
lida.

Verticillata Galeata, Calida.

Mentha.
 Calamintha.
 Clinopodium.
 Pulegium.

Marrubium.
 Dictamnus verus.
 Pseudodictamnus.
 Bætonica.

Stachys.

Stachys.
 Sideritis.
 Lamium.
 Melissa.
 Tragoriganum.
 Origanum.
 Salvia.
 Horminum.
 Acinos.
 Melissa peregrina.
 Polium.

Chamædrys.
 Chamæpitys.
 Rosmarinum.
 Hyssopus.
 Lavendula.
 Stachas.
 Majorana.
 Thymum.
 Serpillum.
 Satureia.
 Ocimum.

Caldæ variarum classium.

Centaurium minus.
 Pulsatilla.
 Anemone ejusque species.
 Ranunculi omnes, exceptis Perpaucis.
 Arum.

Arisarum.
 Dracunculus major.
 Capsicum ejusque species.
 Tithymali omnes, Esulæ
 & Cataputia.
 Sedum vermiculatum acre.

Y

Purgantes

*Purgantes omnes sunt Calidæ: vide
infra Purgantes.*

Plantæ Frigidæ:

Pomiferæ Scandentes.

MELO.
Cucurbita.

Pepo.

Citrullus .s. Anguria.

Cucumis.

*Dum succo alimentitio
abundant, refrigerant,
at semina (quippe oleo
abundant) exsiccata,
calesciunt: Contra
commune Dogma.*

Beta.

Blitum.

Mercurialis.

Spinachia.

Lapathum.

Acetosa.

Bistorta.

*Lactescentes Cichoracea
& papposa per acci-*

*dens sunt Frigida,
dum succo alimentitio
abundant: at quatenus
amara Calesciunt, &
aperiunt.*

Acanthus.

Plantago.

Holoosteum.

Coronopus, species Plat-
taginis.

Psyllium.

Viola.

Malva.

Althæa.

Mercurialis.

Mandragora.

Hyoscyamus,

Portulaca.

*Sedum ejusque species
omnes, præter acre.*

Telephium

Telephium.

Coryledon.

Saxifraga } Chelidonides
Aurea.

Sanicula.

Papaver ejusque species,

*per accidens dum succo
alimentitio abundant;
ut & Cichoracea &
papposa lactescentes re-
frigerant: de quibus ali-
bi prolixius discutietur.*

Arbores, frutices, subfrutices, &

Plantae purgantes.

S Orbus, ornus dicta, ex
qua manna elicitur.

Tamarindus.

Cassia solutiva.

Rhamnus Catharticus.

Malus Persica ejus flos.

Senna.

Genista.

Rosa } pallida } utrius-
} alba Mos- } que
} chata } flos.

Laureola.

Mezereon Germanicum.

Chamaeæa Tricoccus.

Tarton Rare.

Alypum montis Cete.

Plantae purgantes succo.

Aloë vera.

Convolvulus ejusque spe-
cies (per excellentiam

scammonia Syriaca s.

Antiochana est hujus

*Species, ex qua fit di-
agredium.*

Cucumis Asininus ex quo
extrahitur elaterium.

Tithymalus, Esula & Ca-
taputia: quorum suc-
co lacteo, adulteratur
diagredium.

Purgantes Radice.

Filix fœmida.	<i>thum, Rhabarbarum</i>
Polypodium.	<i>est præstantissimum.</i>
Lapathum ejusq; species:	Helleborus niger & al-
<i>per excellentiam Lapa-</i>	<i>bus.</i>

*Purgantes, aut vomitum cientes foliorum
infusione, aut decoctione.*

Sedum vermiculatum,	Centaurium minus.
Narcissus.	Linum Catharticum.
Gratiola.	Cnicus s. Carthamus,
Brassica rubra, crispa.	<i>semine purgat.</i>

Plantæ Venenatæ.

N erium.	Cicuta.
Apocynum.	Pyrethrum.
Asclepias.	Solanum lethale.
Lolium.	Aconitum.
Colchicum.	Fungi lethales.

Plantæ

*Plantæ Vulnerariæ.***P**impinella.

Apium.

Cicuta.

Marrubium.

Betonica.

Stachys.

Syderitis.

Salvia.

Horminum.

Hedera terrestris.

Chamædrys.

Chamæpitys.

Bugula, Brunella.

Bellis.

Millefolium.

Verbena,

Polygonum,

Polygonatum.

Alchimilla.

Sanicula.

Caryophyllata.

Plantago.

Psyllium.

Aristolochia.

Cynoglossum.

Symphytum.

Pulmonaria.

Nicotiana.

Crassula seu Telephium.

Sedum.

Scabiosa.

Consolida regalis.

Virga Aurea, Doria, &

Solidago Saracenicæ.

*Plantæ Culinariæ.**Legumina, fructus horum inserviunt Culina.***P**haseolus,

Pisum.

Lathyrus,

Ochrus.

Lens,

Faba.

Lupinus.

Glycyrrhiza. Hujus radix expeditur in Culina & Pharmacia.

Y 3

Plantæ

Plantæ Culinariæ.

Cærealea, horum grana inserviunt Culinae.

Triticum.

Secale.

Hordeum.

Oriza.

Avena.

Panicum.

Milium.

Panicum Indicum, Maiz
dictum.

Plantæ Culinariæ.

*Bulbi & folia, harum inserviunt Culinae, &
Pharmacis:*

Cepa.

Allium.

Moly.

Porrum.

Scilla.

Plantæ Culinariæ.

*Radices harum inserviunt Culinae.*Rapuuculus seu Campa-
nula.

Napus.

Rapum.

Rapha-
nusSativus .s. Ra-
dicula.
Niger Icon,
Lob.

Raphanus rusticanus.

Beta rubra Romana, seu
Rad. Rapæ.

Trogoogon.

Scorzonera.

Chrysanthemum tubero-
sum, *vide* Battatas de
Cannada.Solanum Esculentum, *vid.*
de Battatas de Virgi-
nea.Convólulus, Indiæ Oc-
cidentalis Inhame, *vi-*
de Battatas *suprà.*

Sisarum.

Sifarum.

Pastinaca latifolia.

Pastinaca tenuifolia seu

Carota.

Apium seu Petroselinum.

Plantæ quarum folia inserviunt Culinae, cocta.

Brassica & ejusque species.

Thlaspi Holeraceum.

Nasturtium hortense.

Eruca sativa.

Beta vulgaris sativa.

Bonus Hendricus.

Spinachia.

Lapathum:

Acetosa.

Lactuca ejusque species.

Cichoreum, Intybus seu

Endivia.

Tragopogon.

Scorzonera.

Calendula, hujus etiam flores.

Urtica minor & major.

Apium ejusque species,

Cerefolium.

Myrrhis odorata.

Tanacetum.

Mentha.

Majorana.

Rosmarinum.

Thymum.

Satureia.

Borrago.

Buglossum.

Portulaca.

Plantæ quarum folia usurpantur in Acetariis.

Lactuca.

Acetosa.

Cichoreum.

Pimpinella spicata minor,

Brassica minor (Broccoli Italici) dicta.

Valerianella seu Lactuca agnina.

Viola pentagonia.

Y 4

Coronopus

Coronopus hortensis.
Sedum vermiculatum in-
spidum, ejusq, species.

Nasturtium } hortense.
 } aquaticum.

Ptermica .s. Dracunculus
hortens. Astragon di-
ctus.

Cerrefolium.

Myrrhis nova æquicolo-
rum & odorata.

Apium.

Cinera aculeata Hispa-
nica.

Apium Italicum seu Se-
leri.

Lactuca Romana.

Cichoreum crispum.

Harum quatuor folia &
costæ seu Nervi medi,
dealbata, evadunt te-

nera.

Chrith- } Umbelliferum.
mum } Chrysanthemasi.

Folia utriusque sale, &
aceto condita, Mense
inferviunt, hyeme pro
acetario: quemadmo-
dum,

Flores in expansi Cappa-
ris, Geniste, & Na-
sturtii Indici, eodem
modo sale, & aceto
Macerati hyemalibus
Embammatis infervi-
unt ut & fungi Escu-
lenti.

Cucumis, hujus fructus,
rudimenta: sale, aceto
& semine Anethi, con-
diuntur & Mense in-
feruntur.

Plantæ Culinaræ.

Quarum semina Culine inferviunt.

Sinapi.

Eruca.

Feniculum.

Cuminum.

Carui.

Anisum.

Coriandrum.

Anethum.

Plantæ.

Plantæ Culinariæ.

Harum Turiones inserviunt Culina.

Asparagus.

Lupulus.

Sambucus.

Capficum, hujus filiquarum aut capsularum pellicula, loco Piperis in Gallaprovincia, Gallia Narbonensi, aliisq; locis, inserviunt Culi-

na. Quin & in Africa aceto, sale & Saccharo condiuntur, & ab incolis avidè expetuntur pro Cordiali optimo.

Cinera sativa, capita hujus, Culina inserviunt.

Plantæ Culinariæ.

Harum Fructus pulposi inserviunt Culina, Mensæve.

MELO.
Pepo,
Cucumis.

Citrullus seu Anguria.
Cucurbita.

Arbores

Arbores Pomiferae, quarum Fructus inserviunt Culinae, Mensae.

MALUS ejusque variae species.

Pyrus ejusque diversae species.

Malus { Aurantia.
Limonia.
Citria.

Malus { Cydonia.
Punica.

Sorbus.

Ficus.

Mespilus.

Morus.

Arbores, Osseam nucem, carne obductam, habentes; quarum Fructus exterior & interior inserviunt Mensae.

Malus { Persica ejusque diversae species.
Armeniaca.

Prunus & ejus variae species.

Cerasus ejusque variae species.

Olea.

Palma.

Arbores Nuciferae, harum fructus interior, inservit Mensae seu Culinae.

Amygdalus.
Nux juglans.

Corylus.
Castanea.

Arbores

*Arbores seu potius Frutices, quorum Fructus
inserviunt Culina, Mensæve.*

Berberis.

Labrusca.

Vitis vinifera.

Rubus Idæus.

Rubus.

Ribes.

Uva crispa.

Myrtillus Germanorum.

Fragaria, hujus planta,

*fraga, inserviunt Men-
sæ.*

FINIS.

Hallucinationes
CASPARI BAUHINI
I N
PINACE,

Tam in digerendis,
Quam denominandis Plantis :

I T E M
Animadversiones, in tres Tomos, universalis
Historiæ, Plantarum ;

JOHANNIS BAUHINI.

Quibus accessit
Dialogus inter Socium Collegii REGII
LONDINENSIS, Gresham dicti, & Botanographum
REGIUM.

Preludiorum Botanicorum pars altera.

AUTHORE
ROBERTO MORISON Medico & Pro-
fessore Botanico, serenissimo CAROLO secundo, magnæ
Britannia, &c. REGI.

*Doctis (in Arte) scribo :
Indoctos docebo.*



Hallucinationes

CASPARI BAUHINI

I N

PINACE,

Tam in digerendis,

Quam denominandis Plantis.

Pag. 27.



Sesamum & Erysimum cœreale, malè inter cœrealia propriè dicta, ob usum collocantur post Lappathum, Acetosam, Bistortam, quippe semine triangulari præditum Erysimum cœreale, collocari debet. Ad siliquosas Heteroclitas seu impropriè dictas, transmittatur Sesamum.

Pag.

Pag. 34. Co'umn. I. *Acorus adulterinus*, malè à Bauhinò, cum *Acoro julifero* seu vero, collocatur, cum *adulterinus*, *Iridis florem* gerit; ad *Iridum latifoliarum* classem, cum *Ger.* & *Eyst.* relegandus, ut rationi consentaneum videtur.

Pag. 40. Col. II. *Iris tuberosa* amandetur ad *Iridum tuberosarum* classem, nec aptè collocatur inter *Iridem bulbosam* & *Sicyrinchium*.

Pag. 47. Col. II. Plant. III. *Hyacinthus Indicus tuberosa radice*, malè inter *bulbosas* propriè dictas collocatur.

Pag. 80. *Lilium Asphodeli radice*, aptiùs (mea opinione) cum *Asphodelo* & *Phalangio*, pag. 28, vel 29. collocaretur.

Pag. 89. Bauhin. collocat *Rapum*, & pagina 95. collocat *Rapistrum Napum*, & interjicit pag. 92, 93, 94. *Campanulatas*, *Rapunculos* scilicet, & *Campanulas*, *Trachelium* ve; *siliquosas* à *siliquosis* disjungit, quod non est faciendum. Insuper *Rapistri siliquæ* sunt *crassæ fungosæ, articulatae*, ideo aptiùs post *Raphanum fativum*; vel *radiculam*, collocaretur *Rapistrum*.

Pag. 91. Col. I. Pl. VIII. *Batatas Camotes Hispanorum*

Hispanorum Clus. hist. est verus & genuinus Convolvulus, quare malè cum Aloë inter filiquosas collocatur, quamvis radices illius sunt edules. De his quæ vidi & colui, judicium fero, de aliis exoticis in illo capite, mihi nunquam visis: nihil dico.

Pag. 92. Col. I Plant. XIII. Campanula lutea Linifolia Ger. repetitur p. 214. col. I. pl. IX. sub Campanula lutea Linifolia Adv. Lob. Linum sylvestre luteum foliis subrotundis C. B. Pin. cujus vera est species & flore & semine; Campanula autem non est, quia nec lactescit nec semen minimum Lucidum (aliarum Campanularum more) fert.

Pag. 94. Col. II, Pl. X. Campanula foliis Echii C. B. Pin. & Trachelium *θυραειδες* Clus. ipsi Cam. & pag. 254. col. II. pl. VII Echium Alpinum luteum C. B. Pin. Trachelium *θυραειδες* Clus. Trachelium seu Campanula est, quippe lactescit non autem Echium; bis tamen repetitur.

Pag. 95. Col. II. Pl. V. Rapistrum Italicum filiquis longissimis C. B. Pin. sylvestre Irionis folio Col. Idem repetitur pag. 101. col. II. pl. V. Erysimum angustifolium majus C. B. Pin. Rapistrum sylvestre Irionis folio Col.

Z

Pag.

Pag. 95. Col. I. Pl. I. Rapiſtrum flore luteo C. B. Pin. eſt vera Sinapi ſpecies, (Rapiſtrum eſt ut plurimum ſiliqua articulata) ergò ad ſiliquofas Tetrapetalas, Sinapi. Erucam, Naſturtium, Drabam cum reliquis ſequentibus, amandetur. Rapiſtrum Monospermum cum non ſit ſiliquofa Tetrapetala planta; ſed, ſiliculofa, ad calcem ſiliculofarum, debet referri.

Pag. 96. Col. II Pl. V. & pag. 97. Raphanus ruſticanus & aquatici duo, non debent collocari inter Raphanos. Cum ſiliquas Raphani ſativi, ſeu radiculae non ferant, ſed caſpulas binas ſiliculasve Lepidii aut Iberidis inſtar.

Pag. 97. Col. I. Pl. III. Dentillaria (mea opinione) non ad Lepidium referri debet, cum nec florem nec caſpulam feminalem, conformem Lepidii caſpulis, aut ſiliculis habeat.

Ibidem Lepidium & Iberis malè collocantur inter ſiliquofas cum caſpulares ſeu ſiliculofae ſint, debent ad calcem Thlaſpios transferri.

Pag 98. Dracunculus, ejuſque ſpecies; malè collocantur inter caſpulares & ſiliquofas

quosas à C. B. in Pin. quare ad Corymbosas .i. Corymbiferas, veluti ageratum, Millefolium & hujusmodi affines; relegentur Dracunculus hortensis, & Ptarmicæ.

Pag. 99. Col. I. Pl. X. Eruca maritima Italica, siliqua hastæ cuspidi simili C. B. Prodr. Cakile Serapionis Lob. duæ plantæ diversæ, quoad semina confunduntur à Bauhino, una semen fert planum; altera, cuspidi hastæ simile: ut clarè videre licet figuram in Prodr. à Bauhino exhibitam, eamque si quis cum Lobelii figura in Iconibus comparet.

Pag. 100. Reseda & luteola cum non sint Tetrapetalæ filiquosæ, malè disponuntur inter Erucam & Erysimum, Tetrapetalas filiquosas.

Pag. 101. Col. II. Pl. V. Erysimum angustifolium majus C. B. Pin. Rapisstrum sylvestre Irionis folio Col. Bis repetitur, nempe suprâ pag 95. col. II. pl. V. & hic p. 101. col. II. pl. V.

Pag. 101. Persicaria seu Hydropiper malè inter Tetrapetalas filiquosas collocatur cum sit semine triangulari prædita, ad Lapathum, Bistortam, Polygonum, aliasque (ejus generis) referri debet.

Pag. 102. Piper Indicum cum non sit planta Tetrapetala filiquosa, malè hic collocatur à Bauhino, potiùs ad Solanum referatur; cujus, est species à flore & semine, feminisque Thecis, seu involucris. Si objiciatur qualitas Urens; quæ non reperitur in ulla Solani specie, facillè respondetur Ranunculos quosdam, esse insipidos seu dulces; quamvis maxima eorum pars, sit caustica prædita facultate.

Pag. 103. Nasturtium hortense latifolium & crispum malè illic disponuntur, cum non sint filiquosæ, ut cœteræ illius sectionis, sed filiculosæ, ergò ad filiculosarum classem amendantur.

Pag. 104. Col. II. Nasturtium Petreum folio bursæ pastoris; item Nasturtium pumilum venum; Nasturtium Alpinum capsula Nasturtii hortensis; & Nasturtium Osyridis folio, cum sint filiculosæ plantæ, ad Thlaspios; Drabæ, Cochleariæ Bursæ pastoris calcem, aut classem, referantur; non autem confundendæ cum filiquosis.

Pag. 106. Col. II, Pl. V. Thlaspi umbellatum Nasturtii folio Monspeliacum C. B. Pin. Narbonense umbellatum Tab. Ger. eadem
 planta

planta repetitur pag. 107. col. II. plant. III.
 Thlaspi Alyslum dictum maritimum C. B.
 Pin. Umbellatum Narbonense Ger.

Pag. 108, & 109. Bursæ pastoris, similis
 filiquosa major & minor, non debent inter
 Bursæ pastoris species recenseri cum non
 sint filiculosæ: amendantur ad filiquosas.
 Ibidem Myagrum filiqua longa, ad filiquo-
 sas referatur cum Gerardo: dicatur Eruca
 sylvestris angustifolia.

Pag. 109. Drabæ filiculosæ ad filiculo-
 sas & Tetrapetalas plantas: filiquosæ ad
 filiquosas referantur, ut Tollatur confusio
 generum.

Pag. 110. Col. II Pl. VIII. Draba flore
 cœruleo Galeato, malè denominatur Dra-
 ba à Bauhino, cum nec sit planta Tetrape-
 тала, filiquosa; nec filiculosa. Rapunculi
 species est; Galeato flore violaceo: quem-
 admodùm flos Cardinalis colum. est Galea-
 to Coccineo flore. Vide Rapuntium Urens
 Soloniense in horto Regio Blesensi aucto,
 & inter plantas non scriptas à me exhibitas.

Pag. 110. Alliaria malè inter Drabam
 & Cochleariam collocatur: ad filiquosas
 nempè Hesperides seu violam Matronalem
 referatur.

Pag. 113. Isatis malè illic collocatur, inter Tetrapetalas siliquosas, & multò ineptius, Anil ob usum colorandi, cum sit perfectè planta leguminosa.

Pag. 114, & 115. Spinachia malè pro genuino Lapatho recensetur cum non habeat semina triquetra, Lapathi instar, jungi debet Lapatho, quemadmodum bonus Hendricus.

Pag. 116. Col. I. Pl. V. Graviter Hallucīnatum fuisse C. Bauhinum in Pinace conjicio, dum inter Lapatha collocat Apocynum Syriacum, seu Bedelzar Arabum, cum ne vel notulam Lapathorum generi communem, habeat: sed Apocynum à lacte (dum rumpitur) manante, siliquisque Sericea lanugine, refertis, seminibusque. Apocynum sese prodit, vel Medriocritè in arte Botanica versato; ad Apocyni classem, referri debere apparet. Hujus, lanugine Sericea, Togæ cubicularis pretiosiores apud Turcas componebantur calidæ & læves, quæ ab aliquot annis non pretiosa illa intertextura quæ Gallicè dicebatur Wat. ex seminalibus hujus Bedelzar involucris, præparata; sed Gossipio seu Xylo ex America insulis.

infulis adjacentibus: nunc communiter fiunt. Prædictæ Togæ cubiculares & vili pretio vaneunt.

Pag. 117. Col. II. Pl. V. Rhaponticum folio Helenii incano, malè hic disponitur cum Rhabarbaro (quod per excellentiam Lapathum est,) ergo reddi debet ad calcem plantarum capitatarum (quarum flores abeunt in pappos) ut sunt jacea Stœbe Cyanus, &c. Ibidem idem dicendum de Centaurio majore, ejusque speciebus quæ omnes debent amandari ad classem antedictam. Observa insuper Rhabarbarum esse per excellentiam optimum Lapathorum; à semine triangulari Lapathi simili.

Pag. 123. Col. II. Pl. III, & IV. Lactuca montana purpurocœrulea, major & minor, malè inter Lactucas collocantur, cum & semen & conformationem partium, cum Soncho habent.

Pag. 124. Lampfana non est tam Soncho affinis quam Cichoreo: quippe ut Cichoreum femina solida, angulosa, non autem in pappos abeuntia (ut Sonchus) producit. Ergo magis appositè dixisset C. Bauhinus Cichoreo affinis Lampfana domestica.

Pag. 122, & 131. Jacobæa & Senecio cum sunt stellatæ & pappescentes debent ad stellatas & pappescentes, Asterem, Conyzam, Doronicum, Helenium, &c. Non autem jungi cum lactescentibus, papposis.

Pag. 126. Col. II. Pl. I. Hieracium majus folio Sonchi, vel Hieracium Sonchites potiùs Sonchus dici debet quam Hieracium, nam Sonchus est ut plurimum altior, caulis fistulosior folia læviora, flos ejus Hieracii flore citiùs evanescit: per terram (aliorum Sonchorum more) ejus radix repit.

Pag. 126. Col. I. Pl. I, II, III. Cichoreum sylvestre luteum & quæ sequuntur sunt Hieracia, quia pappescunt.

Pag. 127. Hieracia quatuor priora primæ Col. sunt verè Sonchi à semine & tota facie & modo crescendi.

Pag. 228. Col. I. Pl. I. & II. Hieracium semine adunco C. Bauh. Hieracium falcatum col. I. pl. II. & Hieracium minimum nonum Clus. pag. 127. col. II. pl. VIII. & quæcunque alia reperiuntur Hieracia, quorum flores non abeunt in pappos, ut horum trium ad Cichoreum reducantur quia Cichoreum, à lactescentibus papposis hac sola nota differt.

fert. Quod ejus flos non abit in pappos idem esto judicium de Chondrilla verrucaria seu Zazinta pag. 130. col. I. pl. IX. cum non pappescit : non est Chondrilla. Sit cum Clusio Cichoreum verrucarium idem dicendum de Lamprolana, quæ est magis affinis Cichoreo, quam Soncho : propter semen Solidum angulosum, Cichorei semini, simile.

Pag. 130. Chondrilla Verrucaria ad Cichoreum mandetur ; propter prædictam rationem & jungatur prædictis Hieraciis. Eaque appellando sic ; Cichoreum falcatum, Cichoreum semine adunco ; Cichoreum minimum, caule ad florem tubuloso, mutato nomine Hieracii, in Cichoreum ut diximus antè.

Pag. 130. Col. II. Pl. VI. Chondrilla cœrulea Cyani capitulo : cum hujus semen non abit in pappos non est Chondrilla, ergò ad Cichoreum cum prædictis reducendum judicarem ; cum Lactescit, nec flos ejus abit in pappos, nec potest esse Cyanus, nec Chondrilla ut clariùs deducemus in Tabulis affinitatis nostris.

Pag.

Pag. 130. Col. II. Pl. III. Chondrilla rara purpurea cum non Lactescit per antedictam rationem, nec pappescit, non debet admitti pro Chondrilla. Ad Centaurium capitatum reducerem, & Centaurium capitatum ciliare annuum foliis laciniatis serratis appellari velim.

Pag. 131. Col. I. Pl. III. Senecio pinguis incanus; Jacobææ est species, cum Jacobææ more, florem gerit stellatum multis petalis latis, discum luteum ex multis staminibus conflatum, cingentibus. Nota insuper hac p. 131. malè collocari (ut alibi diximus) Jacobæam & Senecionem cum lactescentibus papposis, cum ad pappescentes non lactescentes pertineant: eumque eis collocari debent.

Pag. 132. Col. II. Pl. I, & II. Tanacetum montanum inodorum flore majore & minore. Sunt Bellidis Leucanthemæ species: nec cum Tanaceto aliquid habent affinitatis nisi in dispositione foliorum: ergò alibi aptiùs disponi poterant, sub nomine Bellidis Tanaceti folio: Desumendo nomen à potiore & nobiliore parte, flore scilicet, seu modo florendi.

Pag.

Pag. 138. Col. I. Ambrosia Campestris repens, Coronopus Ruellii: Malè cum Ambrosia odorata collocatur, cum sit planta Tetrapetala siliculosa, subjungitur debet siliculosis Drabæ, Cochleariæ, Thlaspi, Veronicæ, &c.

Pag. 138 Colum. II. Pl. III. Botrys Chamædryoides malè ad Botryos classem à Bauhino reducitur, cum sit ex flore & semine seminumque capsulis, Chamædryos ad hujus classem (cum Mattheolo) redigo. Nota quod Botrys Ambrosioides appositè quadrat; cum Atriplice, quoad dispositionem florum & seminum, & si Atriplex odorata diceretur per me non stabit. Quemadmodum fecimus nos in dispositione Atriplicis in Tabulis cognationis nostris.

Pag. 141. Col. II. Pl. IV. Millefolium aquaticum foliis Abrotoni, Ranunculi flore & capitulo C. B. Pin. Ranunculus Tricophyllon aquaticus medio-luteus Col. bis repetitur hic & pag. 180. col. II, pl VI. Ranunculus aquaticus capillaceus C. B. Pin. Ranunculus Tricophyllon aquaticus medio-luteus Col. Etiam si Bauhinus bis citavit Columnam, debuit in posteriori loco tantum

~~Hallucinationes~~

CASPARI BACHINI

IN

PINACE,

Tam in figura,

Quam dominanda Plastica:

ITEM

Animadversiones, in tres Tomos, ~~in~~ *in* ~~duos~~ *duos*
libros, Plastica:

JOHANNIS BACHINI

Quibus accit

Dialogus inter Socios Collegii REGII
LONDINENSIS, *Composuit, & Illustravit*
REGIUM

Preludiorum Botanice, & Astronomie

AVTEGRII

ROBERTO MORIENI *Medici & Phy-*
sessore Regio, & Professori Astronomie, & Astronomie
Regio, &c. REGII

Doctus (in Arte) ;
Inuolens dicitur.

tantum citari. Sunt duæ, Ranunculi species, omnino distinctæ. Ut quilibet observare possit; cum intuendo figuram Columnæ & Icon. Lob. atque copiosè uterque hic Ranunculus in aquis paludosis conspicitur, vegetans.

Pag. 142. Consolida Regalis & *pag. 144, & 145.* aquilegia & Nigella debent ad venenatas, & siliquiferas amandari ut clariùs demonstrabimus postea.

Pag. 144. Chelidonium majus cum sit planta Tetrapetala, siliquosa, ad Tetrapetalas siliquosas, esset referendum.

Pag. 146. Col. II. Pl. III. Cuminum sylvestre capitulis globosis C. B. Pin. non est Umbella propriè loquendo cum non habet bina semina simul juncta, sed cum folia Umbellæ in modum disposita habet, ad calcem Umbellarum: cum Pimpinella amandetur.

Pag. 147. Col. II. Pl. VII. Chaa malè à Casp. Bauh. in Pin. pro Fœniculi specie exhibetur: cum ejus folia ex Japonia Sinensiumque, finibus, ad nos delata, aqua macerata & extensa, latiora sunt; Bellidis foliis, declarantque hanc, non esse Umbellam, ferulaceis Fœniculaceisve foliis præditam.

Pag.

Pag. 147. Anethum ad umbelliferas, (quarum semina sunt rotunda & foliacea) esset referendum: nulla habita ratione foliorum Fœniculo, accedentium.

A pag. 147, ad pag. 165. Aded confusus est ordo Umbellarum: Bauhini nec confusio tolli poterit, quoad Tabulas, cognationis affinitatisve nostras, publico, exhibuerimus.

Pag. 148. Pyrethrum flore Bellidis non obstante caustica facultate, ad Corymbosas seu Corymbiferas est referendum: non inter Umbellas collocandum.

Pag 149. Col II. Pl. III. Peucedanum, est Umbella, Gramineis foliis, semine folioso subrotundo prædita, parùm ergò rationi congruit; Peucedanum minus Cas. B. Pin. esse Peucedanum: cum nec Graminea habet folia, nec semina foliacea, seu compressa, sed striata, & folia tenuitèr divisa. Selinum montanum pumilum (cum Clusio) aptiùs designabitur.

Pag. 150. Nota Bauhinum quatuor genera distincta Umbellarum, sub uno & eodem genere (Dauco scilicet) comprehendisse. Quæ suis sunt reddendæ ordinibus: ut ex doctrina nostra, alibi tradenda (quin &

& hic) cuilibet perspicuum evadet.

Daucus foliis Fœniculi tenuissimis, ad Daucum seu Carotam vel Pastinacam tenuifoliam, reduci potest, quippe semina villosa, (Dauci vulgaris in modum) producit. Tres autem sequentes Umbellæ; (sub Dauci nomine) cum sint foliis ferulaceis, & semine striato minore donatæ; pro Dauco montano, seu Saxifraga tenuifolia haberi possunt. Quippe quod, Saxifragiæ tertiæ Matth. seu Dauci montani (Baumino sic dicti) habent, & folia & semina striata minora. Sex autem sequentes (incipiendo à Dauco montano, Apii folio majore) cum sint semine compresso foliaceo, subrotundo, ut Peucedanum vel Oreoselinum, ad Umbellæ, foliis plurifariam divisis, semineque foliaceo rotundo, ditatas: sunt religandæ. Ultimus seu 13. Daucus pratensis, Millefolii palustris folio C. B. Pin. Daucus pratensis Dalechampii hist. Lugd. ex radicum & seminum striatorum structura, declarat sese esse Oenanthen. Unde nobis, potiore jure, Oenanthe Millefolii foliis (in pratis humidis vegetans, more aliarum suæ classis) denominabitur. Hæc diximus ut legentibus & profundius intuentibus

entibus, innueremus, malè distributam, hanc Dauci subalternam sectionem, à Casp. Bauhino : dum 4. distincta genera Umbellarum (ut suprâ clarè docuimus) sub uno & eodem militare vult signo.

Pag. 151. Cpl. I. Pl. II. Pastinaca tenuifolia sylvestris Umbella majore C. B. P. sylvestris Daucoïdes apula Col. Hæc planta ex semine oblongo aspero etiamsi folia gerit Pastinacæ tenuifoliæ : sese declarat potiùs, ad Myrrhidis classem pertinere.

Pag. 151. Col. I. Pl. VI. Pastinaca sylvestris angustifolia, fructu Echinato C. B. Pin. Pastinaca Echinophora apula Col. à semine debet hæc planta Umbellifera ad Crithmum maritimum, spinosum, sibi confimile ; ad finem Umbellarum remitti : cum Pastinacæ marinæ seu Chritmi marini spinosi habeat seminis involucrum, spinosum ; femaque paritèr striatum, eodem debet referri.

Pag. 151. Col. II. Pl. IV. Gingidium, folijs Pastinacæ latifoliæ C. B. Pin. Gingidium 1. Dod. malè huic generi adaptatur, cum non sit semine striato minore (ut Gingidium) præditum, nec etiam caucalis dici debet.

Ut

Ut plurimi Neotericorum scriptorum dixere: cum semen non habet Echinatum; caucalidum more. Ergò concludendum cum dispositione seminis foliacei, subrotundi, in margine granulati (Tordylly apuli majnimi Col. more) tum positione foliorum Lobatorum, sub Tordylly signo militare debere: & magis appositè Tordilium Syriacum, semine majore granulato; designabitur.

Pag. 152. Col. II. Pl. III. Chærophylo nonnihil similis C. B. Pin. Perchepier Anglorum Lob. Cerefolium est Umbella, foliis plurifariam divisis, semineque rostrato prædita. Ergò Perchepier Anglorum, Chærophylo, nihil similis, potius quam nonnihil similis Bauhino. Non est Umbella, ergò longè arcenda, sed cum in omnibus & per omnia Alchimillæ, illi conveniunt notæ essentielles: eò mandanda, cum doctissimo Fab. Columnâ.

Pag. 152. Col. I. Caulis major Clus. hist. malè à Bauhino, pro Caulalidis specie habetur, cum ejus semen non sit (Caucalidum ritu) Echinatum: quod, est generica & essentialis Caulalidis nota. Aliò referenda

danes aptius quam ad *Turdylion* (cum docto Jacobo Plateau, qui ejus semen ad clusium misit) referri posse autumnò.

Pag. 152. Col. II. Pl. XII. *Caucalis folio Peucedani* C. B. Pin. *Caucalis Anglica* Lob. cum hæc Umbella sit semine minore striato donata. *Dauci montani* aut *Saxifragiæ* 3. *Matth.* in modum: ad ejusdem speciem a mandari debet: ne utiquam ad *Caucalidem*, cujus non fert Symbolus.

Pag. 153. Col. II. Pl. VI. *Apium montanum folio ampliori* C. B. Pin. & *montanum nigrum* C. B. in Pin. *Oreoselinum Parisiense* Lægd. & *Apium sylvestre lacteo succo turgens*, & *Apium peregrinum Cicutæ folio* C. B. Pin. omnes hæc quatuor *Apii* species, ne utiquam sunt genuina *Apia*, quippè *Apium* est planta umbellifera, semine striato minore, ornata; at priores sunt semine foliaceo subrotundo affectæ. Ergò aliò transmittendæ; ut in *Tabulis nostris cognationis*, præstabitur. Nota insuper ibidem *Bauhinum*, duas distinctas constituere species: *Oreoselinum montanum folio ampliori*, & *Parisiense nigrum*; quæ, una & eadem est planta; diversa, tantum notata libus.

Pag. 156. Post Imperatoriam admitti debet Imperatoria nigra, Tab. pagin. 186. col. I. pl. V. contenta, Astringia nigra Eob. Icon. & Obs. Elleborus niger Saniculæ folio, major & minor C. B. Pin. malè hæc planta in Ellebori classe collocatur, cum Umbellæ, omnes habeat conditiones requisitas, flores in Umbella, Pentapetalos, quorum singulis evanescentibus, succedunt, bina semina oblonga aspera, quod clariùs intuentibus apparebit, quoniam è summo fastigio Caulium exeunt; foliola subviridia, latiuscula, stellatim cingentia basin, radiorum semiuncialium, sustinentium flosculos minimos, pentapetalos: Persicæ florum coloris. Astringiæ nomen sortita est hæc planta, quoniam folia in 5. Lobos obscuriùs virentes (Saniculæ instar) divisa gerit. Saniculæ illi adaptarunt nomen sed Imperatoria nigra, Astringia dicta, Saniculæ folio, potiore jure denominabitur.

Pag. 157. Col. I. Pl. II. Libanotis major & altera seu vulgatio, cum utriusque semina ex pluribus alis foliaceis, rotæ molen dinæ fluviatilis instar; constant: easdem declarant, ex Laserpitii familia oriundas; seu
genus

genus suum desumere, quippe eadem, cum illis (quoad formam & figuram) sunt semina.

Pag. 158. Col. II. Pl. VI. **Panax Asclepium** semine folioso C. B. Pin. **Panax Asclepium Apulum** Col. cum semen habeat rotatum, seu circularitèr ala foliacea cinctum, Thapsiæ more, ad Thapsiam redigatur: non autem ad Libanotidem, cujus semen, nulla ala membranacea pellucida cingitur.

Pag. 160. Col. I. Pl. VI. **Pimpinella sanguisorba major, minor, hirsuta & minor lævis, & omnes quot fuerint sanguisorbæ Pimpinellæve, quum non sunt Umbellæ (propriè loquendo) non debuerint locari inter Umbellas (propter foliorum cum Pimpinella Saxifraga, similitudinem) sed ad calcem Umbellarum, cum aliis ejusdem Farinæ, amandari: propter similem foliorum, Lobatorum dispositionem.**

Pag. 161. Col. II. Pl. VII. **Cicutaria palustris tenuifolia non habet bina semina, simul juncta aliarum Umbellarum more, ergo non est Umbella propriè dicta.**

Pag. 161. Col. I. **Seseli Creticum majus; Creticum minus; Creticum fructu majore;**

A a a

Creti-

Creticum minimum; Cum Sefelios, nota essentialis & Generica, sit. producere semen striatum; atqui hæ quatuor plantæ umbelliferæ, semina produunt foliacea, seu membranacea, rotunda; ergo debent collocari cum congeneribus suis: Pastinaca latifolia, Sphondylho, &c. sub Torodylii nomine Generico.

Pag. 162. Col. I. Pl. XI. Sefeli palustre lactescens, propter præcedentem rationem, à Sefelios familia avertendam, & ad Umbellas, semine foliaceo subrotundo foliis plurifariam divisis (cum Oreofelino & Thyffelino) revocandum esse judico.

Pag. 162. Oenanthe Apii folio Casp. B. Pin. angustifolia Lob. nota quod C. Bauhinus pro Synonymo attulit Cuminum bulbosum Plinii Col. quod est bulbocastanum aut saltem ejus species, nihil habens affinitatis cum Oenante, ut ait doctissimus Columna.

Pag. 163. Col. I. Pl. V. Oenanthe Hederæ folio C. B. Pin. Oenanthe Myconihist. Lugd. non est Umbella, cum flores & semina Ranunculi producat. Optimè Ranunculus Thalictri folio, Asphodeli radice, cum Parkinsono nominabitur. *Pag.*

Pag. 163. Col. II. Pl. VII. Filipendulâ vulgaris, cum non sit Umbella, sed tantum à foliorum cum Umbellis similitudine; ad finem Umbellarum (tanquam affinis) debet collocari. Ibidem Pedicularis seu Alec-
 rolophos, cum sit Galeata, ad finem Galeatarum, verticillatarum, collocanda. Ibidem Barba Capræ, cum sit tantum Umbellis affinis, à dispositione foliorum, cum Thalic-
 ctro, Filipendula, Pimpinella, &c. In fine Umbellarum addenda: Ergò inconsideratè, laboriosissimus Bauhinus, Filipendulam pediculari & Barbam Capræ, interjecit inter Oenanthen & Valerianam, propriè dictas Umbellas: cum nil habent hæ plantæ, commune, cum propriè dictis Umbellis, nisi folia, quæ, non sunt primò & principalitèr, partes essentielles, nisi per accidens tantum; inservientes fructificationi. Nota insuper Plant. IX. & X. ejusdem Columnæ ad caput sequens, debere referri.

Pag. 164. Col. II. Pl. VII. Valeriana Græca; propter antedictam rationem, ab ipso doctissimo & laboriosissimo Casp. Bauhino, illic observatam: est aliò remittenda. Observa hanc Valerianam, nil habere

cum Valeriana propriè dicta, commune, præter folia; ergò ad finem itidèm Umbellarum, cum cœteris (propter conformitatem foliorum) referri debet.

Pag. 165. Col. I, & II. Valerionellæ omnes, non sunt Umbellæ propriè loquendo, quia non habent bina semina (aliarum Umbellarum propriè sic dictarum more) simul juncta.

Pag. 168. Col. II, Pl. I. Solanifolia Circoea dicta, major & minor: quâ similitudine Solanis annumerantur, non possum assequi. Semen fert verrucosum; ergò ad Agrimoniâ, Saniculam vulgarem ibidèm: (in locis Udis, sylvosis & umbrosis) habitantem, referatur. Ibidèm. Qua ratione mirabilia Peruviana, ad Solanum reduci possunt; non satis assequor. Est planta certè Heteroclitâ: quemadmodum plurimæ aliæ exoticæ. Solano etenim satis malè cohæret. Nos exactiùs exhibebimus (in Tabulis nostris cognitionis, universalis nostræ methodi) hujus dispositionem.

Pag. 172. Hypecoum malè inter Papaver & Argemonen collocatur: exilis cum sit planta, foliis, Fumariæ adinstâr, dissectis; fliquas

filiquas edit longas articulatas, est Heteroclitia planta hæc.

Pag. 176. Col. II. Pl. V. Anemone nemorosa, flore majore Casp. Bauh. Pin. à quinta Plant. secundæ Columnæ, pag. 176. ad Pl. X. secundæ Columnæ pag. 177. Ranunculi omnes sunt. Cum, omnium flores abeunt in semina aculeata racematim compacta, sive orbicularitèr sive spicatim. Anemones propriæ dictæ, flos abit in pappos, ventoque aufertur. Ergò omnes contentæ à V. Pl. Col. II. pag. 176. ad X. Pl. Col. II. pag. 177. sub Anemone, perperam disponuntur, debent conjungi cum Ranunculo nemoroso luteo, pag. 178. Col. I.

Pag. 180. Col. II. Plant. VI. Ranunculus aquaticus medioluteus Col. bis repetitur hic & suprâ pag. 141. vide Millefolium aquaticum foliis Abrotani, Ranunculi flore & capitulo.

Pag. 180. Col. I. Plant. VI. Ranunculus aquaticus Cotyledonis, folio, Casp. B. Pin. Cotyledon aquatica Dod. cum semen non gerat Ranunculi, non est reputandus pro Ranunculo, ideò aliò remittendus; nec aptiùs quàm ad aquaticas Heteroclitias plantas referri potest.

Pag. 179. Colum. II. Pl. VI. Ranunculus Aconiti folio, flore albo multiplici C. B. Pin. debet transferri ad Columnam primam pag. 182. & jungi Plantæ VII. nempé. Ranunculo montano Aconiti folio, albè flore majore C. B. Pin.

Pag. 182. Colum. II. Pl. IX. Ranunculus montanus Aconiti folio, flore globofo C. B. Pin. est potiùs Aconiti species, cum siliculas seu Thecas seminales, membranaceas, Aconiti ritu habet, semenque inibi contentum. Nec semina racematim in capitulum pungens compacta: ut Ranunculus gerit. Quare ad Aconiti classem retulimus appellando Aconitum, Ranunculoides secundum, quemadmodum Aconitum hyemale, à flore Ranunculi, Aconitum Ranunculoides primum seu hyemale; Thecas seminales. Utrumque Aconiti more habet.

Pag. 183. Colum. II. Pl. XVI. Aconitum racemosum, Christophoriana, dictum. Male inter Aconita recensetur, cum nec florem Cucullatum, nec Thecas membranaceas (aliorum Aconitorum more) gerit: sed cum sit planta baccifera; ad Solani potiùs genus referenda.

Pag.

Pag. 184. Col. I. Pl. I. Aconitum Parda-
leanches seu Thora major & minor, sunt
Ranunculi species; ergo ad Ranunculi ge-
nus, montani pag. 182. pertinent, atque ibi
locari debent.

Pag. 184. Doronicum cum simplicata
stellata, pappescens amandetur ad Confor-
tes, Asterem, Conyzam, Helenium, Tripo-
lium, paginis 265, & 266.

Pag. 286. Col. I. Pl. V. Helleboruspiger
Saniculæ folio major & minor, debentque
mandari ad Imperatoriam, inter Umbellitas,
cujus sunt species: vide pag. 156, ubi pro-
lixius illic egimus.

Pag. 186. Col. I. Pl. IX. Helleborus ni-
ger tenuifolius Buphthalmi flore, sub eo-
dem genere militat cum Adonide; cuius
est species, utraque, Ranunculorum classi
accedere debet.

Pag. 197. Tussilago Petasites & Ca-
calia, ad pappescentes amandentur, scilicet
Eupatorium, virgam auream, Stoechadem
Citrinam, Serratulam, 263. pag.

Pag. 201. Col. II. Pl. I. Leucoium Alyf-
soides Clypeatum majus C. B. Pin. Alyssum
Dioscoridis Dod, debet cum Lunaria Græ-
ca

ca collocari: item *Leucoium incanum* filiquis rotundis C. B. Pin. *Eruca peregrina* Clus. debent omnes hæ *Leucoii* species *platanolobi*, subjungi *Leucoiis* filiquosis.

Pag. 200, 201, 202. Malè collocantur *Leucoium filiquosum* & *viola matronalis* hic. Cùm ad filiquosas reliquas tetrapetalas debent transferri. Videlicèt *Sinapi*, *Erucam*, *Irionem*, sive *Erysimum*, &c. p. 99.

Pag. 210. Col. I. Pl. VII. *Caryophyllus pratensis* flore laciniato simplici, seu flos *Cuculi* C. B. Pin. malè inter *Caryophyllos* collocatur, à *Bauhino*, cum omninò sit *Lychnis*, à flore, semine & capsula *Pyriformi*.

Pag. 210. Col. II. *Caryophyllus holo-stius* ejusque sequaces, usque ad *Caryophyllum montanum*. *Alsines* & *Lychnidis Seriei*, debent adjungi: Quum flores gerant quinque petalis, ad medium bifidis, constantes: capsulasque *Pyriformes*. Non autem *Caryophylli* in modum *Cylindriacas*.

Pag. 211. Col. I. Pl. I. *Linaria scoparia* est planta sui generis: nec præter folia, aliquam affinitatis notam habet cum *Linaria*. Ibidem, idem dicendum de *Osyride frutescente* *Baccifera*, C. B. Pin. seu *Casia Poëtica* *Monspeliensium* *Lob.*

Pag.

Pag. 213. Col. II. Pl. XV. Linaria montana flosculis albicantibus C. B. Pin. Anonymos tenuifolia Clus. per eandem rationem antedictam, non est Linaria.

Pag. 213. Col. I. Pl. VI, & VII. Linaria folioso capitulo luteo, major & minor: nil nisi folia Linariæ gerunt. Florem virgæ aureæ instar, ex plurimis staminulis, luteis conflatum, habent; qui postea abit in pappos: ergò jure merito, virga aurea folliis Linariæ appellabitur. Linariæ nota essentialis, est flos Calcari donatus, rictum compressus, habet flos. Semen, binis capsulis, Apum alvearia referentibus inclusum habet Linaria; ut in descriptionibus observavimus; & ut prolixius trademus, quando notas essentielles & genericas unicuique generi adaptabimus, in Tabulis nostris cognationis. Linaria autem scoparia: Olyris baccifera frutescens: Linaria montana seu Anonymos Clus. Linaria aurea Trag. cum nihil horum possident, alibi sunt collocandæ.

Pag. 214. Col. II. Pl. VI. Linum minimum stellacum non est Linum: à nota essentiali Lino convenienti, cum nec florem, nec semen Lini habet, Ibidem Col. I. Pl. IX.

Linum

Linum sylvestre luteum foliis subrotundis
C. B. Pin. Campanula lutea linifolia Lob.
 bis repetitur, hic & suprâ pag. 93. **Colum. I.**
Pl. XIII. nimirum **Rapunculus nemorosus,**
angustifolius parvo flore **C. B. Pin. Cam-**
panula lutea linifolia Lob. **Ger.** vide suprâ
 pag. 93.

Pag. 215. Col. II. Pl. V. **Polygala repens**
nivea **C. B. Pin. repens** Lob. non debet flori
Ambervalli jungi sed **Polygono (Herniaria)**
 dicto. **Ibidem Onobrychis Arvensis** seu
Campanula Arvensis erecta **C. B. Pin.** cum
 sit **Campanula (à flore)** plantaque lactes-
 cens, florem, capsulam seminalem, trique-
 tram, & semina pellucida (ut **Campanula**)
 gerit: **Campanulis** debuisset jungi.

Pag. 216. Stoechas Arrabica, Laven-
dula & pag. 217. Rosmarinum, malè clau-
 dunt sectionem, cum sequentem, verticilla-
 tarum galeatarum, sectionem debeant in-
 cipere; quippè verticillatæ galeatæ, ver-
 ticillatis galeatis (in eâdem sectione) ad-
 dendæ.

Pag. 218. Col. II. Pl. XIII. **Hyssopifolia**
C. B. Pin. cum nec sit planta galeata nec
 galeatæ aut verticillatæ fort capsulam, pa-
 rum

rūm aut nihil cum Hyssopo habet affinitatis aliò ergò releganda: Fortè ad Euphrasiam.

Pag. 221. Col. 1, & 11. Pl. 1, & 11. Ageratum foliis ferratis & non ferratis C. B. P. malè inter galeatas & verticillatas plantas collocantur, cum sint Corymbiferae .s. Corymbosae. Adde quod odor & sapor, non considerantur in disponendis plantis. Ibidem Ageratum ferratum Alpinum C. B. Pin. Ageratum purpureum Lugd. malè etiam hic disponitur: cum non sit Galeata planta, nec capsulas Galeatae in modum verticillatim gerit. Aliò etiam releganda eòdem cum Hyssopifolia ad fidem Euphrasiae amandatur. Capsulas fert longas innumeris seminibus minutulis, scatentes ut Euphrasia, sed nec hæc, nec Hyssopifolia, florem habent Galeatum, sed quinque petalis distinctis conflatum.

Pag. 222. Col. 1 Pl. 1. Dictamnus albus vulgo, seu Fraxinella C. B. Pin. Fraxinella Dod. cum nil habeat affinitatis, nec in foliis nec in floribus, multò minùs in capsulis seminalibus, cum verticillatis Galeatis, aliò est remittenda, nec aptiùs. (mea opinione) quam ad sectionem venenatarum, siliquis membra.

membranaceis præditarum ; Aconitum (videlicet) Delphinium, Staphydem-agriam, &c. (id genus) aliás.

Pag. 225. Col. I. Pl. II. Clinopodium arvense Ocymi facie C. B. Pin. planta est verticillata ; verticillis per Caules rariùs dispositis, donata, per intervalla : at majus .s. vulgare verticillos densiùs dispositos, per intervalla habet : Ergò ad Ocymi finem referri potest : Est enim Ocymi sylvestris species. Origanum Canadense fistulosum Corn. in ejus locum sufficio : tanquam plantam (inter odoriferas) magis illi convenientem, eandem appellando, Clynopodium Canadense fistulosum, & non Origanum, cum quo nil habet affine.

Pag. 225. Col. II. Pl. V. Clinopodium Alpinum hirsutum C. B. Pin. Clinopodium Alpinum Ponæ bis repetitur hic, & p. 247. *Col. II. Pl. VI.* Teucrium Alpinum coma purpureo-torrulea C. B. Pin. Clinopodium Alpinum Ponæ.

Pag. 226. Col. I. Pl. II. Mentha hortensis Corymbifera C. B. Pin. costus hortorum Lob. malè à Bauhino ob odorem, Menthæ Seriei adjungitur, cum jure merito ad Corymbosas,

rymbosas, five Corymbiferas, videlicet Tanacetum, Ageratum Millefolium, &c. (id genus) alias plantas Corymbosas, debet amandari.

Pag. 229. Col. I. Pl. VI. Calamintha arvensis verticillata C. B. Pin. malè inter Calaminthæ species recensetur, quippè Calaminthæ verticilli, rariùs disponuntur, hujus verticilli, densiùs, per intervalla dispositi sunt. Ideò qui Mentham (Sisymbrium) hortensem & sylvestrem, cum Mentha pulegii odore, & Mentha aquatica exigua & pulegio sylvestri Lugd. conjunxerit: assignando toti generi nomen Menthæ densiùs verticillatæ, meliùs egerit.

Pag. 231. Col. I. Pl. V, & VI. Lamium maculatum C. B. Pin. & Lamium linea alba notatum C. B. Pin. pro una, duæ in medium adferuntur plantæ, cumque cuilibet propiùs consideranti, una & eadem apparebit planta. Ineunte enim hyeme, albis maculis, folia consperguntur. Exeunte autem hyeme, linea alba, per folii Nervum medium discurrente, notantur: æstate una & altera, spoliata, folia habet viridia. Ibidem Lamium foliis Caulium ambientibus
maius

maius & minus, pro una & eadem habeantur planta, cum specifica, qua distinguantur, nulla assignatur nota.

Pag. 231. Col. II. Pl. XI. Lamium peregrinum, f. Scutellaria C. B. Pin. Astragaloides Cornuti. A forma capsulæ seminalis, apprimè referente imaginem aut formam tali vulgaris, qui mulierum calceis subjicitur: quæ exsiccata & apperta, Scutellam exprimit, unde ei nomén novum genus constituens Scutellaria; dictum, ad finem Galeatarum & verticillatarum, rejiciendum: qui construxerit, gratum opus fuerit; quinque sunt plantæ quæ sub novo hoc genere militare possunt, sub nomine Scutellariæ, gratiola latifolia Ger. Lyfimachia Galeiculata Lob. Scordium Berardi seu Scordotis Plin. Clus. Scutellaria Americana Malvæ folio. Et Lamium peregrinum seu Scutellaria C. B. Prodr. & si quæ aliæ verticillatæ Galeatæ hujus Farinæ detegantur, huc paritèr revocandæ sunt.

Pag. 232. Col. II. Pl. I. Urtica aculeata foliis serratis, & altera foliis non serratis, malè Urticæ nominantur, cum sint verticillatæ, Galeatæ propriè loquendo, ergo ad

ad Sideritidis classsem jure pertinent. Ibi-
dè Urtica urens maxima, minor, & pilulas
ferens; cum non sint galeatæ, sed verticil-
latæ, aliquomodo racemi, verticillatim
disponuntur, ergo ad finem galeatarum,
verticillatarum remittantur.

Pag. 232. Alyssum verticillatum foliis
profundè incisis, malè disjungitur à Mar-
rubio; cum sit omnibus suis partibus, verum
& genuinum Marrubium.

Pag. 233. Euphrasia ejusque species,
cum sint galeatæ, sed non verticillatæ pro-
priè loquendo, ad finem verticillatarum &
galeatarum rejici debent: Ut clariùs de-
monstrabimus in Tabulis nostris cognatio-
nis.

Pag. 234. Nota Bauhinum inadverten-
tèr, confundere Euphrasiam majorem syl-
vestrem purpuream & latifoliam, cum sint
duæ distinctæ plantæ; ut apparet ex dua-
bus diversis Iconibus Columnæ: Ut cuili-
bet intuenti Fab. Columnam; evidentèr
apparet.

Ibid. Melampyrum ejusq; species, cum sint
galeatæ plantæ, sed non verticillatæ propriè
dictæ; ad calcem galeatarum fuerunt re-

jiciendæ; & non confusè (cum Bauhino) in medio sectionis collocandæ.

Pag. 234. Col. II. Pl. VI. Melampyrum luteum minimum C.B.P. Perpusillum luteum Lob. Adv. quam inconsideratè Bauhinus, Sequendo Lobellium, hanc plantam (quam depictam in adversariis exhibuit Lobellius) denominat Melampyrum, legentium frequentia esto judicium. Melampyrum est planta galeata tritici referens grana. Hæc autem tenella planta, Ranunculi est species, à gustu, sapore, flore, quinis petalis, plurima staminula cingentibus, conflato. Cui deciduo, succedit spica coniformis, falcata gerens semina: Folia fert ferulacea. Nec apparentè Lobellius, qui primus erravit, omnesque alios authores errare fecit: florentem hanc vidit plantam, multo minùs bene observavit spicam, (etiãsi pictam in adversariis exhibet) quæ neutiquàm refert Melampyri spicam; hæctenùs de hac planta egimus, inter non scriptas à nobis exhibitas.

Pag. 235. Serratula malè disponitur hic in medio galeatarum, verticillatarum: cum ejus flos abit in pappos, plurimis staminulis fistulosis,

fistulosis, virgæ aureæ modo, constat. Ergo ad virgam auream, ejusque classem transponi ibique collocari debet. Ibidem Scrophularia, cum nec sit galeata nec verticillata planta, sed bicapsularis; plurima minuta in se continens semina, ad classem bicapsularium, releganda floret: Nempè digitalem, verbascum, Blattariam, &c. (id genus) aliás.

Pag. 240, Col. II. Pl. I, II, III. Verbascum latis Salviæ foliis C. B. Pin. & angustis Salviæ foliis C. B. Pin. & acuto Salviæ folio C. B. Pin. perperam hæ plantæ à Bauhino & authoribus aliis, ad Verbascum reducuntur; ab incana lanugine foliorum, Verbasci foliis quodammodo accedentium; cum Verbasci omnis, flos est integer, in margine quinquefariam divisus, cui deciduo succedit bicapsularis Theca, seminalis. Multa hinc inde continens semina minutula, ut videre licet in digitali, Blattaria, Scrophularia, Gratiola, Hyperico &c, id genus, aliis ejusdem classis. Sed more nostro denominatio desumi debet à nobiliore parte, flore seu florendi modo: Cum galeatum & verticillatum dispositum fert florem. Adinstar Salviæ,

capsulasque seminales gerit *Salviæ*, quatuor semina oblonga, angulosa. Verticillatarum omnium ferè ritu, *Salvia fatua*: cuilibet hæc nostra dicta consideranti apparet. Et ideò *Salvia sylvestris Verbasci latis foliis*; & *Salvia sylvestris Verbasci angustis foliis*; & *Salvia sylvestris Verbasci acuto folio*; Imposterùm à nobis designantur.

Nota quod *Verbasum* & *Blattaria*, pag. 239, & 240. malè inter verticillatas disponuntur, cum ad capsulares bivalves debeant amandari; quod præstabimus in generali nostrâ historia plantarum, per Tabulas cognitionis disponendarum.

Pag. 241. *Æthiopsis*, (sine ratione) disjungitur ab *Horminis*: Cum omnes, *Hormini* habeat partes; *Horminum Æthiopicum* incanum appelletur.

Pag. 245, & 246. Nota *Lyfimachia* caput, seu distributionem esse confusissimam apud *Bauhinum* in *Pinace*. Primò, occurrit *Lyfimachia lutea major*; quæ florem quinis aut Senis petalis constantem fert; cui flaccido succedit, capsula rotunda; *Pisi* medii magnitudine in qua continentur, minuta plurima rotunda semina. *Ephemerum*,
flore

flore & semine & capsula seminali, valdè huic *Lyfimachia* accedit. Secundò, occurrit *Lyfimachia Virginiana*, florem magnum, Unifolium seu Monopetalum convolvulorum more; cui deciduo, succedunt Cornicula coniformia, maturo semine, in plurimas sese findunt partes, & copiosè semina emittunt: ex loculamentis, adinstar *Papaverum Corniculorum*. Tertio loco, occurrunt *Lyfimachia* propriè dictæ filiquosæ, quarum flores exeunt in summitate filiquæ; quaternis, quinis petalis constantes; quibus Marcescentibus, succedunt filiquæ biunciales triunciales, sese in quinque distincta loculamenta, aperientes, & semina plurima papposa (ut *Salix*) fundunt. Quarto loco, sese offert nobis consideranda, *Lyfimachia spicata purpurea*, florem fert galeatum rubrum; cui succedit capsula seminalis (*Euphrasie* instar) continens plurima semina minuta; atque eò nomine haud abs re, esse judicarem; eandem *Euphrasiam* perennem aquaticam, flore purpureo, denominari. Quinto loco, nobis consideranda exhibetur, *Lyfimachia spicata cœrulea*, quæ aliarum *Veronicarum*

more, florem fert tetrapetalum: cui succedit silicula, bicapsularis, Bursæ pastoris seu Veronicæ similis: & est Veronica spicata cœrulea recta. Sextò, *Lysimachia cœrulea galericulata* vel *Gratiola cœrulea* Casp. B. Pin. *Lysimachia galericulata* Lob. hæc est galeata verticillata, scutellata, per consequens ad novum genus verticillatarum referri debet. Et *scutellaria palustris cœrulea* nobis dicenda: ita hæc diviso *Lysimachia* ad sex diversas classes distinctas, pertinet; variè à nobis per Tabulas cognationis, distribuenda.

Pag. 247. Col. II. Pl. V. Clinopodium Alpinum Ponæ bis repetitur, hic & pag. 225. Col. II. Pl. V. vide supra paginam 225.

Pag. 247, 248, 249. Teucrium, Scordium, Chamædrys, Chamæpitys malè hic cum *Lysimachia veronica*, inter veronicam & *Alfinen*, collocantur; cum inter galeatas, verticillatas, propriè dictas: essent collocandæ.

Pag. 248. Col. I. Pl. V. Chamædrys Alpina Cisti flore C. B. Pin. *Camædrys montana frutescens durior* Ad. Lob. cum hæc planta nec florem galeatum, nec capsulam seminalem

lem verticillatim dispositam habeat; Chamædryos non potest dici: cum autem florem gerit, sex petalis albis conflatum, cingentibus discum medium, cui evanescenti succedunt globuli, hirsuti, Caryophyllatæ more, ergò appositè satis appellabitur Caryophyllata; Chamædryos, folio duriori.

Pag. 248. Col. II. Pl. VIII. Chamædryos unicaulis spicata Bauh. in Pin. Trixago Apula unicaulis Col. hæc florem gerit galeatum luteum, sed capsulam habet & semina inibi contenta, Euphrasæ: non est Chamædryos, quia non habet capsulas in margine quinquefariam divisas, continentes singulas, quaterna semina. Appelletur ergò Euphrasia Apula unicaulis magis apté. *Ibidem Pl. XII.* Chamædryos spuria major latifolia C. B. Pin. Veronica maxima Lugd. usque ad Plantam XVIII. omnes hæc ad Veronicæ classem debent amandari; cum omnes, Veronicæ gerunt tesseram, flores (scilicet) tetrapetalos, siliculas bicapsulares, Veronicæ more. Nec Chamædryos species, accenseri possint: quippè nec galeatæ nec verticillatæ sint.

Pag. 250. Col. I. Pl. I, II, III, & IV. *Alfinae Hederulæ folio* Casp. B. Pin. *Veronicæ folio flosculis Cauliculis adhærentibus* C. B. Pin. *Chamædrifolia flosculis oblongis pediculis infidentibus*; & *Alfinae Triphyllos cœrulea*. Hæ omnes quatuor, notam essentialem *Veronicæ* habent; nempe flores tetrapetalos, & siliculas bicapsulares, septo medio membranaceo, duplicem seriem seminum determinante: ergò sunt veræ & genuinæ *Veronicæ* annuæ. Sic nobis denominanda, *Veronica Hederulæ folio*; *Veronica flosculis adhærentibus, cauliculis*; *Veronica Chamædrifolia flosculis pediculis longis infidentibus*; & *Veronica Triphyllos cœrulea*; ex dictis patet, omnes esse veras & genuinas *Veronicas* annuas; non autem ad *Alfines*, genus pertinent: Ut clarius alibi docebimus.

Pag. 150. Col. II. Pl. VI. *Alfinae scandens baccifera* C. B. Pin. *Cacubalus Plinii*, est *Alfinae Heteroclita*: Folia & flores habet *Alfines*, fructum seu baccas, *Solani*.

Pag. 151. Col. I. Pl. XVI. *Alfinae affinis Androsace dicta major* C. B. Pin. *Androsace*
face

face altera Matth. nec florem nec capsulam
 feminalem, fert Alfines; nota essentialis
 Alfines est, habere florem quinque petalis
 conflatum; quorum singula sunt bifida,
 Lychnidis more; cui evanescenti, succedit
 capsula, Pyriformis continens plurima se-
 mina rotunda: Quod non conspici licet
 in hac planta, magis accedit ad auriculam
 Ursi. Multas alias plantas pusillas adjunxit
 Bauh. hęc quę propter exilitatem (quam-
 vis sunt Heteroclitę) aliò impręsentiarum
 non remittemus. Ibidem Col. II. Pl. VI.
 Alfine litoralis Portulacę foliis C. B. Pin.
 Alfines Pelagicum genus Clus. nota quod
 sit Rubię genus, ex semine.

Pag. 152. Col. I. Pl. I. Anagallis aqua-
 tica major, folio subrotundo Casp. B. Pin.
 aquatica minor folio subrotundo; aquatica
 major folio oblongo; aquatica minor fo-
 lio oblongo; aquatica folio rotundo non
 crenato; & aquatica angustifolia: Omnes
 hęc sex plantę, cum florem gerant tetrape-
 talum, siliculasque bicapsulares, Veronicę
 (procul dubio) sunt verę & genuinę spe-
 cies. Ideo Veronicę appellentur aquaticę;
 sicque denominentur. Veronica aquatica
 major

major folio subrotundo; Veronica aquatica minor folio subrotundo; aquatica major folio oblongo; aquatica minor folio oblongo; aquatica folio rotundo non crenato; & Veronica aquatica angustifolia: & sic tolletur. gravis lapsus; Bauhini & cœterorum authorum. Quam habent affinitatem cum Anagallide videant oculati Botanici, & diligentèr examinent mecum.

Pag. 252, & pag. 253. Elatine ejusque species: quum calcari & rictu hiante; & capsula seminali, duplici loculamento distincta, præditæ sint. Quæ est nota generica & essentialis Linariæ; Linariæ sese veras & genuinas arguunt esse species; quod benè innotuit doctissimo Fabio Columnæ, dum Elatinen, Linariam Hederulæ folio appellat. *Ibidem pag. 253. Col. II. Pl. II.* Elatine folio acuminato; in basi auriculato *C. B. Pin. Linaria Hederulæ folio Col. bis* repetitur, hîc & *pag. 306. Linaria Hederulæ folio Col. Cymbalaria C. B. Pin.* Nota in super Cymbalariam esse veram & genuinam Linariæ speciem. Quia Linariæ nota essentialis & generica, omninò ei quadrat.

Pag.

Pag. 254. Col. II. Pl. VII. Echium Alpinum luteum C. B. Pin. Trachelium *Dioscoridis* Clus. & Campanula foliis Echii C. B. Pin. Trachelium *Dioscoridis* Clus. ipsi Cam Pag. 94. Col. II. Pl. X. bis repetitur. Campanula est: (quippe lactescit, semenque rufum, pellucidum habet) non vero Echium.

Pag. 257. Col. II. Pl. X. Cynoglossum minus C. B. Pin. Cynoglossa minor montana serotina altera Plinii Col. & pag. eâdem Columna, eâdem Pl. VII. Cynoglossum medium C. B. Pin. Cynoglossa minor montana serotina altera Plinii Col. eâdem planta, bis repetitur.

Pag. 258. Col. I. Lithospermum arundinaceum forte Dioscoridis & Plinii Lachryma Jobi Dod. frumentum est. Proinde ad cœrealia amandetur; quippe cum Lithospermo ordinario nil habet affine.

Ibidem Pag. 258. Col. II. Pl. VII. Lithospermum arvense radice rubra C. B. Pin. Anchusa degener facie Milii Solis Lob. ad Anchusam referatur, cum nec florem nec semen fert Lithospermi.

Pag. 259. Col. I. Pl. I. Lithospermum Linariæ folio, Germanicum C. B. Pin. Linaria

naria altera botryoïdes montana Col. planta est *Heteroclita*: nil cum *Lithospermo* vulgari habet commune: nisi seminis durtiëm. Estque sui generis planta. *Ibidem* Col. II. Pl. V. *Symphytum minus Borriginis* facie C. B. Pin. *Borrigo minima* herbariorum Lugd. malè à *Bauhino* inter *Symphyta* collocatur, cum ex flore, tum ex semine, sit vera *Borriginis* species.

Pag. 260. *Consolida media* sive *Bugula* & *consolida minor* sive *Brunella*, malè disjunguntur à verè *galeatis* & *verticillatis*, quum iis, nota essentialis & generica, *galeatarum* & *verticillatarum*, perfectè convenit. Ergo ad *Sectionem quartam Bauhini* pag. 217. cum cæteris suæ conditionis amendantur.

Pag. 262. *Bellis* malè hic collocatur: quare ad *Corymbosas* referatur *leucanthemas*; *Chamæmelum*, *Cotulam*, &c.

Ibidem. *Pilosella* ejusque species malè hic collocantur, cum sint plantæ lactescentes, earumque flores abeunt in pappos, cum *Pilosella* sit omnibus notis parvum *Hieracium*: ad finem *Hieracii* pag. 129. releganda. Nec cum *Bellide* aut *Gnaphalio*, quid habet affinitatis,

Pag.
†

Pag. 266. Asteris omnis, flos debet abire in pappos; non minùs quam Conyza. Hæc est nota essentialis Asteribus, & cœteris stellatis pappescentibus, communis. Ast. quatuor à me observantur Asteres, recitati à Bauhino in Pinace, quorum, flores non abeunt in pappos: suntque hi; Aster foliis ad florem rigidis: Aster Atticus foliis circa florem mollibus C. B. P. seu Cernuus Col. Aster luteus folio glabro & crenato C. B. P. Atticus Dod. & Conyzoides Monspeliensium. Ergò eò ipso nomine quod, semina, solida gerant, à papposis, per consequens ab Asteribus arceantur: prædictæ quatuor plantæ: & ad Corymbiferas relegandæ.

Pag. 272. *Col. II. Pl. II, & III.* Jacea Oleæ folio, flore majore & minore, & Oleæ folio capitulis compactis; cum Jaceæ flos, abit in pappos; harum autem flores non abeunt in pappos, sed semina producunt solida, angulosa longa: Ergò non sunt verè Jaceæ, aliò relegentur. Nec aptiùs (meâ opinione) quàm ad Corymbiferas seu Corymbosas ianthemas; referri posse ipsas Autumnno. *Ibidem Col. II. Pl. V.* Jaceæ, Oleæ folio affinis C. B. Pin, Dorynium Dioscoridis

dis forte Ponæ Italicè & Cneoro albo affinis C. B. Pin. Dorycnium forte Dioscoridis Ponæ Italicè pag. 463. Col. II. Pl. III. bis repetitur, eadem planta pro duabus diversis, duobus diversis locis, collocata.

Pag. 274, & 275. Tragopogon & Scorzonera; cum sunt plantæ lactescentes papposæ, ad congeneres, Lactucam, Sonchum, Chondrillam, Hieracium, Pilosellam & dentem Leonis, referantur; quæ continentur à pag. 123. usque ad Paginam 131. *Ibidem* Caltha & Helenium Indicum, seu flos Solis, malè hic disponuntur cum ad Corymbosas pertineant. Helenium vulgare ad papposas stellatas, Asterem, Conyzam, Doronicum, Crithmum, Chrysanthemum, mandari debet.

Pag. 276. Col. I. Pl. IX. Caltha palustris capsulas efficit seminales, ut Ranunculus globosus Aconiti in modum: & semina ibidè contenta, paria; non autem ut Caltha vulgaris.

Pag. 276. Col. I, Pl. I. Helenium ad non lactescentes, quæ tamen abeunt in pappos; ut ad Asterem, Conyzam, & ejus Farinæ pappescentes, (ut supra dictum) debet relegari. Helenium Indicum, seu Chrysanthemum

themum peruvianum, ad Corymbiferas seu Corymbosas, transmitti debet, ergò malè confunduntur. Helenium Indicum seu flos Solis, cum Helenio vulgari, cujus flos abit in pappos; ut antè dictum.

Pag. 277. Perfoliata & Bupleurum, cum sint Umbellæ perfectæ; quia flores, quinque petalis constantes, producunt, in summis radiis caulium, quorum singulis evanidis, succedunt bina semina, simul juncta; ergò debebant inter Umbellas, suæ classis plantas; collocari. Quid quæso connexionis habent Perfoliata & Bupleurum, cum Centauryo minore.

Pag. 278. Gratiola cum sit planta in udis pratis, vegetans: Tubiformem florem galeatæ, aut potiùs parvæ digitalis instar gerens; cui tamen succedit Theca seminalis, bicapsularis, digitalis, omninò instar; continens multa minuta semina: hac ratione, aptiùs cum suæ sortis plantis, collocanda; nempe digitale, Verbascum, Blatteria, Scrophularia, Hyperico, &c.

Pag. 280. Col. II. Pl. II. Coris cœrulea maritima C. B. Pin. Coris Monspelica Ad. Lob. florem fert galeatum, sed capsulam habet

habet peculiarem, differentem, ab omnibus galeatarum, verticillatarum, capsulis seminalibus. Ideò amandari ad calcem galeatarum, cum Scutellaria & Euphrasia, debet.

Pag. 281. Polygonum latifolium C.B.Pin. & polygonum maritimum latifolium C. B. Pin. cum semina gerant triquetra; ad suæ fortis stirpes relegentur Persicariam, frumentum Saracenicum, &c.

Pag. 281, & 282. Polygonum & anthyllis, proptèr exilitatem, plantarum harum, difficilè admodùm est, ipsas ad idem genus reducere, quia magna est earum differentia, cum in flore, tum in semine.

Pag. 284. Col. I. Pl. X. Sedum minus fruticosum, C. B. Pin. Sedum minimum arborescens vermiculatum Lob. malè ab Authoribus ad sedum refertur, cum nil nisi folia; cum sedo minore longifolio commune habeat; florem & semen, Kali gerit, dicique debet Kali frutescens omnium maximum.

Pag. 284. Col. II. Pl. XI. Sedum Alpinum luteum C.B.Pin. Phyllon thelygonon dalechampii in dioscoridem Lugd. hæc planta quamvis folia gerat vermiculata hirta, sedi

fedi montani minoris, more, florem tamen fert tetrapetalum cui succedit filicula oblonga Paronychiæ, Alfines folio instar. Est enim hujus species, foliis crassis hirtis: non autem fedi.

Pag. 285. Col. II. Pl. VI. Cotyledon stellata C. B. Pin. Aizoon peregrinum Cam. hæc planta nec florem, nec involucrum feminum aliter gerit, quam Sedum seu Sempervivum minus. Ergo pertinet ad Sedi classem, est enim perfectè Sedum annum stellatum.

Pag. 285. Col. I. Pl. II. Cotyledon media foliis subrotundis C. B. Pin. Cotyledon altera quarta Clus. hist. Cotyledon media foliis oblongis ferratis C. B. Pin. & Cotyledon media subhirsuta floribus punctatis C. B. Pin. Cotyledon altera 5. Clus. hist. Hæ tres non sunt verè Cotyledonis .s. Umbilici veneris species, nec à flore, nec à capsulis seminalibus. Florem gerunt quinque petalis constantem: cui succedit involucrum feminis bifurcatum: quemadmodum, Saniacula montana, Saxifraga Chelidonides, gerunt. Suntque omnes plantæ, ejusdem generis.

Pag. 287. Col. II. PLVI. Telephium repens folio non deciduo C. B. Pin. septimum five legitimum Imperati Clus. hist. malè hìc collocatur pro Telephio, cum neutiquàm iis accedit, nec flore nec semine, est potiùs Polygoni species.

Pag. 287. Scorpioïdes Bupleuri folio, ejusque species, item Portulacæ folio, cum florem edunt Papiliaceum, leguminum more; folliculos, per articulos (suo, quoque modo) incurvos, & in singulis articulationibus semina: quæ mansa, perfectè leguminum præbent saporem. Idè ad leguminum classem, siliquis articulatis, præditam, remitto.

Pag. 288. Cepæa Matth. Sedi vera est species: Proindè Sedis jungenda, nec hìc per se collocanda. Ibidè Crithmum maritimum majus & minus C. B. Pin. & maritimum spinosum. Cum sunt perfectæ Umbellæ, malè ab ipsis Umbellis disjunguntur, & hìc collocantur: Item Crithmum maritimum flore Asteris Attici, malè hìc jungitur duobus Crithmis Umbellis. Quare amandetur ad Asterum classem, & pappefcentes stellatas plantas.

Pag.

Pag. 294. Col. I. & II. Scammonia *Montspeliaca* foliis rotundioribus C. B. Pin. & *Montspeliacæ* affinis, foliis acutioribus, quum flores & siliquas lanigeras; Apocyni in modum, gerant: ad Apocyni classem debent amandari: Item Scammonia *Syriaca*, cum sit perfectè *Convolvulus*, ad *Convolvuli* seriem releganda.

Pag. 295. Col. I. Pl. IV. *Convolvulus* minor semine triangulo C. B. Pin. *Helxine Cissampelos* *Lugd.* malè. inseritur inter *Convolvulos*. *Convolvulus* enim est planta lactescens, florem fert *Monopetalum* unifolium seu integrum, capsulas subrotundas, semina angulosa nigra, continentia. At hæc, nec lactescit, nec florem habet *Monopetalum* unifolium, quin & semen fert triangulare. *Frumenti Saracenicæ*, est vera species; Nil commune cum *Convolvulo* habet; nisi quod vicina quælibet amplectatur & scandat.

Pag. 295. *Soldanella* vel *Brassica* maritima major & minor. Cum lactescunt & florem, & capsulam seminalem & semina, *Convolvulorum* habent: *Convolvulis* adscribantur. *Ibidem* *Soldanella Alpina* ro-

tundifolia major & minor, nil cum Soldanella præcedente, habent affine: nisi folia (quod multis semper imposuit) cum sint filiquosæ, aut Corniculatæ: alibi ad finem filiquosarum, (improprie sic dictarum) collocandæ essent.

Pag. 303, & 304. Polygonatum, Liliun convallium, Monophyllum, Laurus Alexandrina: ad nervosas bacciferas debent relegari.

Pag. 306. Hedera terrestris vulgaris quum sit galeata, verticillata, ad classem galeatarum verticillatarum debet remitti. Quare Bauhinus hîc collocavit post Hedera Corymbosam; nullam ego reperio congruentiam nisi in serpendo, similitudinem: Ita infinitæ congeneres (etiãsi natura diversæ) à nascendi modò disponerentur. Ibidem pag. 306. Cymbalaria, cum florem calcari donatum habet, qui compressus rictum edit, & capsulam duplici loculamento, constantem; septo membranaeo medio, idem diremente producit. Ut cæteræ omnes Linariæ; porro semina minuta suffulca, ejusdem formæ cum Linariæ semine sunt. Igitur debet collocari inter
Linarias:

Linarias: cum doctissimo Fabio Columna. Bis repetitur, hîc & pag. 253. ut supra, loco allegato, ostendimus.

Pag. 306. Balsamina rotundifolia repens, sive mas C. B. Pin. Balsamina Cucumerina punicea Adv. Lob. mas Ger. cum sit Cucumis, ad Cucumeris classem debet referi. Ibidem Balsamina foemina C. B. Pin. foemina Persicæfolia Lob. & Balsamina lutea seu noli me tangere C B. Pin. cum utraque hæc planta, florem gerat calcari, seu Corniculo donatum, rictum habet peramplum paritèr utraque: utriusque flori deciduo, succedit siliqua, quinis loculamentis donata, quæ (maturò semine) tacta sese contrahit, & semina vi spargit. Ad finem siliquosarum, inter siliquosas minùs propriè dictas collocari debent.

Pag. 309. Gramen parnassi, albo simplici, & pleno flore ad Pyrolam referantur. Ibidem Saxifraga rotundifolia alba C. B. Pin. alba Chelidonides Lob. hæc ad Saniculam montanam, ut ante dictum, cum qua omninò quadrat: & (flore & semine) remittatur.

Pag. 309. *Chelidonia minor* : cum omnibus suis partibus essentialibus (id est flore & semine) Ranunculis quadret, si debet accenseri, & meritò Ranunculus grumosa radice, folio lato, rotundo, (cum doctissimo Dalechampio) appellari.

Pag. 315. Col. I. Pl. VI. *Malva folio vario* C. B. Pin. *Malva trimestris* vel *pumila* Clus. nota, *Bauhinum* duas omninò distinctas *Malvas*, pro una & eadem producere : in *Pinace*. Cum *Malva folio vario*, ab ipso depicta & descripta in *Prodromo* sit. Nemo inficias ibit ipsam longè diversam, à *Malva trimestri* seu *pumila* Clus. examinantium judicium, penes esto veritas; utramque colui, & observavi, quin & ipsissimæ (primò intuitu) figuræ duæ, Clusii & Bauhini in *Prodromo* : ipsum convincunt.

Pag. 317. *Corchorus* sive *Melochia*, cum sit planta siliquosa suo modo (ut *Balsamina*) quæ (maturo semine) siliquam findit quinquefariam : & plurima semina subviridia fundit, ergò collocanda, ad calcem siliquosarum, minùs propriè dictarum.

Pag. 320. *Cannabis* malè à *verticillatis* (etiã si non sit *galeata* est tamen *verticillata*)

lata) disjungitur. Ibidem Eupatorium Cannabinum C. B. Pin. Eupatorium Avicennæ Col. malè hîc disponitur, cum sit papposa planta, ad papposas (nempe virgam auream ferratulam & cœteras hujus ordinis) referenda.

Pag. 321. Col. I. Pl. I. Cannabina aquatica, folio tripartitò diviso, & folio non diviso C. B. Pin. Eupatorium Cannabinum fœmina Septentrionalium Lobel. Cannabinum Chrysanthemum Tab. hæ plantæ cum sint Corymbiferæ, ad Corymbiferas remittendæ. Ergò malè hîc (habita ratione nominis Eupatorii, ut, ubique Casparum Bauhinum & Authores, facere observavimus, nulla habita ratione notæ Genericæ & essentialis: quæ toti generi convenire debet) collocantur.

Pag. 321. Eupatorium veterum sive Agrimonia C. B. Pin. Eupatorium Dioscoridis & Avicennæ Colum. & odoratum C. B. Pin. quantum discrepant à duobus præcedentibus Eupatoriis, penes lectorem esto judicium. Ibidem Agrimonoïdes Colum. foliorum aliquam, cum præcedentibus, Agrimoniis, similitudinem habet; sed semen, C c 4 florem,

florem, capsulamque seminalem diversimodè factam.

Ibidem. Potentilla, cum florem & fructum, capsulamque seminalem, semen, granulatum continentem : ad eundem modum, cum Fragaria sterili, Pentaphyllo, Pentaphylloïde habet : Eisdem jungi debet, nec per se hìc locari.

Pag. 322. Dentaria cum sit planta tetrapetala & siliquosa, malè hìc à Bauhino locatur, inter Caryophyllatam & Epimedium, à quibus toto Cœlo differt : ergò siliquosis congeneribus suis, Leucoio, Hesperidi associari debet. Vide pag. 201, 202.

Pag. 323, & 324. Pœonia & Staphis Agria, ad venenatas siliquiferas, Aconitum, Delphinium, &c. amendantur.

Pag. 324. Leontopetalon, cum siliquosa sit planta, transmittatur ad calcem siliquosarum venenatarum. Ibidem Staphis Agria, cum capsulas seminales, accedentes ad Aconitum habet, cum ipsis, disponatur versus finem ejus sectionis.

Pag. 326. Col. I. Quinquefolium fragiferum C. B. Pin. 5. fragiferum Clas. Quinquefolium fragifero affine C. B. Pin. Pentaphyllum

phyllum supinum Potentillæ facie Lobel. Icon. cum utraque hæc planta costas longas habet, quibus quinque interdum plura, folia adhærent, è contrario, inter se foliorum exortu, nascentia : uno extremum claudente. Potentillæ seu Argentinæ ritu : Ego (cum florem & semen, aliorum Pentaphylorum more, perficiunt, folia autem aliter disposita habent) Pentaphylloides nuncupari velim ; novum constituendo genus.

Pag. 326. Col. II. Pl. VII. Quinquefolium Lupini folio C. B. Pin. Pentaphyllon *πενταφυλλον* Thalii est planta siliquosa non leguminosa, proinde hinc averruncanda. Lupinus peregrinus Pentaphyllos C. B. Pin. Lupinus Arrabicus sive Pentaphyllum peregrinum Ponæ Italicè, pag. 348. Colum. II. Pl. V. eadem planta duobus his suprà dictis locis repetita, non potest pro Quinquefolio propriè loquendo accenseri ; Pentaphyllum esse fateor sed Heteroclitum ; multò minùs est Lupinus, cum nec florem Papileaceum, nec siliquam leguminosam fert.

Pag. 326. Col. I Pl. III. Tormentilla Alpina folio Sericeo C. B. Pin. Candida Dalechampii hist. Lugd. cum omnibus suis partibus

partibus essentialibus, flore & femine, Alchimillam æmulatur. Rectè concluditur (cum doctissimo Fabio Columna) esse Alchimilla.

Pag. 327. Col. I. Pl. II. Trifolium palustre Casp. Bauh. Paludosum Lob. cum Trifoliis leguminosis nil habet affine; nisi quod folia gerat terna: ergò remittendum ad aquaticas plantas, tanquam Heteroclitum.

Pag. 327. Trifolium, Medica, Lotus, Melilotus quæ continentur à pag. 327. usque ad pag. 331. ad finem leguminum pag. 353. debent collocari: cum omnia Trifolia sint legumina Trifoliata, aut Trifolia leguminosa, ex florum structura & seminum sapore, cuilibet gustanti & propiùs consideranti innotescet. Nos prolixius alibi (de horum Sympathia seu Identitate, quoad notam Genericam & essentialem) tractabimus.

Pag. 328. Col. I. Pl. VI. Trifolium montanum Lupulinum III, in Prodr. non debet disjungi à Lupulino vulgari, quamvis montanum: Nam locus non debet considerari ubi spicæ seu capituli similitudo datur.

Pag. 328. Col. I. Pl. I. Trifolium pratense luteum, capitulo breviori C. B. Pin. Meleloti

Meleloti exigua vel minor species. Thal. floret ut Melilotus spicatum, semina rugosa dura Meliloti instar, producit; rectè igitur pro Meliloto habenda; cum Trago.

Pag. 329. Col. I. Pl. X. Trifolium album angustifolium, floribus veluti in capitulum congestis C. B. Pin. Dorycnium Monspeliensium Adv. Lob. cum hæc planta sit Lotus ex appositione foliorum, nempe terna habet in extremo pediculo, bina ad appositionem Caulis. Ut cernere licet, quemadmodum, in aliis, qua nota distinguitur Lotus. Addenda esset Loto Lybicæ, Dalechampii hist. Lugd. pag. 332. Col. II. Pl. X. & Loto Pentaphyllo filiquoso villosa C. B. Pin. Loto Hæmorrhoidali majori seu Trifolio Hæmorrhoidali majori Park. immediatè ante Pl. IX. in Col. I. paginæ 332;

Pag. 330. Col. I. Trifolium acetosum, etiamque Hepaticum, malè interjiciuntur hîc inter Trifolia leguminosa (quia nil simile nisi folia, habent terna communia, cum Trifolio leguminoso) videlicet inter Trifolium & Melilotum.

Pag. 331. Col. II. Pl. VI. Lotus hortensis odora C. B. Pin. Melilotus vera Tab. singularis

singularis Alpini, Ponæ: est vera & genuina Meliloti species, à spicæ florum, & seminum dispositione, juncto odore: Meliloto, inter Trifolia leguminosa, semper debito.

Pag. 332. Col. I. Pl. VI. Lotus Pentaphyllos vesicaria C. B. Pin. Trifolium Halicacabum sive vesicarium Cam. Omnis Lotus constat quinque foliis, tribus in extremo, pediculi; & duobus parvis, juxta appositionem, ad caulem. Hujus foliorum nervus, medius ornatur, binis ternisve foliolis ex adverso sitis, magno uno & longo extremum, claudente, Anthyllidis, vulgaris etiam ritu. Ergò aptius Loto affinis, Anthyllis Bætica vesicaria dicenda; quam Lotus, propter rationem antè dictam.

Pag. 333. Col. I. Pl. XII, & XIII. Rubia latifolia spicata & angustifolia spicata: cum Rubiæ propriè dictæ, nota Generica sit, baccas aut semina rotunda, binatim testiculorum instar; ferre. Legentium judicium, penes sit fides; num spicata major & minor (nisi à dispositione foliorum stellatim radiantium caulem) Rubiæ nomen mereantur.

Pag. 336. Ruta, Thalictrum malè inter stellatas

stellatas (à foliis) Gallium, cruciatam & legumina disponuntur. Cùm Ruta, aptius collocabitur post bicapsulares cum, fit Tetralobos seu Quādrīcapsularis. Thalictrum amandetur, ad Umbellarum finem, inter alias affines: propter similitudinem foliorum cum quamplurimis, Umbellarum, cœterâ nil habent affine quoad partes essentielles, flores, & semina, binatim semper juncta, quod contingit in omnibus & singulis Umbellis, cujusque, sint semina figuræ, ut clariùs patefiet in Tabulis nostris cognationis, in divisione Umbellarum.

Pag. 337. Faba malè recencetur, pro legumine Capreolis donata: ergò ad legumina, filiquas erectas habentia; nobiscum referatur, Lupinum, Glycyrrhizam, Galegam.

Pag. 338. Col. II. Faba sylvestris fructu rotundo atro C.B. Pin. sylvestris Dod. nulla Fabarum, Capreolis donatur; hæc Capreolis scatet, proinde rectiùs vicia omnium maxima diceretur (mea opinione:) adde quod nec filiquam seu folliculum; nec fructum fert Fabæ in modum: sed Viciæ omninò æmulum.

Pag.

Pag. 343. Col. I. Pl. X. Pisum cordatum Adv. Lob. Vesicarium fructu nigro, alba macula notato C. B. Pin. malè inter legumina Papillacea & siliquosa seu folliculacea collocatur; cum, leguminibus, nec flore nec siliqua quadrat; quippè vesicam, nucis juglandis magnitudine trifariam divisam, terna in se continentem semina producit, rotunda nigra, cor album lateralitèr, referentia; nec Masticata, leguminis habent saporè: collocetur post Convolvulos cum Nasturtio Indico. Heteroclitia etiam est planta, hoc sufficit impræsentiarum.

Pag. 348. Col. II. Pl. V. Lupinus peregrinus Pentaphyllos, bis repetitur. Vide suprâ pag. 326. Col. II. Pl. VII. Quinquese-
lium Lupini folio C. B. Pin.

Pag. 348. Lupinus malè illic disponitur, cum debeat adjungi Fabæ; quippè quod siliquas habet erectas; per intervalla, tumidiusculas ubi sunt femina, depressas in interstitiis. Ibidem malè dirigitur, seu locatur, Foenugræcum, cum sit Trifolium, ergò amandetur ad Trifolium cujus est species.

Pag. 349. Col. I. Pl. II. Astragalus Mon-
spelianus Clus. hist. Securidaca lutea minor,
Corniculis

Corniculis recurvis C. B. Pin. hæc est planta annua, florem fert Ochroleucum seu pallidè luteum. Secundus est **Astragalus Monspessulanus** Johan. Bauh. purpureus, hist. Lugd. pag. 351. Col. II. Pl. V. an **Astragalus parvis foliis** Hedyfari, seu **Securidacæ** hist. Lugd. in Appendice. Hic, est valde restibilis, in multos annos durat : flore est elegantè purpurocœruleo. Tertius est **Astragalus erectus** annuus nobis ; **Vicia Sesamacea** Apula Col. Ornithopodio , affinis **hirsuta**, fructu stellato C. B. Pin. pag. 350. Col. II. Pl. V. Hæc flore est etiam pallidè luteo, filiquas fert triplò majores filiquis, priorum. Nota stellam leguminosam & **Viciam Sesamaceam** Apulam Col. esse duo distincta & divisa legumina, etiamsi pro uno & eodem à Bauhino ponantur. Quartus **Astragalus** est perennis, flore luteo pallido nobis : **Glycyrrhiza sylvestris** floribus luteo pallefcentibus C. B. Pin. pag. 552. Col. II. Pl. III. **Astragalus Monspeliacus** Joh. Bauh. citatur à Casp. Bauhino in Pinace, pag. 351. Col. II. Pl. V. **Astragalus villosus** floribus globosis C. B. Pin. purpureus hist. Lugd. non est idem, cum **Astragalo Monspelliano** Clus.

Clus. ex supra dictis. Hæc quatuor legumina, cum sub eodem vexillo militent, ad idem & novum constituendum genus elegimus; ex longe diversis (ut observare licet in Bauhino) locis coegimus, à forma seminum, *Officula Sesamacea*, articulis digitorum pedum, substrata, referentium. *Legumina Sesamacea seu Astragaloïdea*, filiqua Gemella: Seu brevius, *Astragalus filiqua Gemella* dici possunt. Nec norim, in tota familia leguminum, folliculaceorum caterva: præter hæc quatuor, quæ filiquas triangulares curvas & inflexas, falcis instar, duplici Serie juuctas, duplici membranacea Tunica, duplicem dirimente seriem seminum seu fructuum. Hisce addi potest, sed alterius figuræ, *Hedysarum peregrinum*, seu *Securidaca peregrina* Clus. hist. quatenus etiam folliculum profert, Spadæ Piscis, Rostri instar, aut Serræ utrinque Dentatæ, similem: duplicem etiam seminum Seriem, planorum fert. Sicque constituto novum genus.

1. *Astragalus Monspeffulanus* perennis, flore purpurocœruleo: nobis. *Purpureus* hist. Lugd. vide pag. 351. Col. I. Pl. V.
2. *Astra-*

2. *Astragalus Monspelianus* annuus, flore luteo pallescenti : nobis. Monspelianus Clus. hist. vide pag. 349. Col. I. Pl. II.
3. *Astragalus erectus* annuus, flore luteo pallescente : nobis. *Vicia sesamacea* Apula Col. vide pag. 350. Col. II. Pl. V.
4. *Astragalus reptans* perennis, flore Ochroleuco seu luteo-pallido : nobis. *Glycyrrhiza sylvestris* sive *Glauz vulgaris*. Vide pag. 352. Col. II Pl. III.
5. *Astragalus*, siliquis *Serræ* similibus : nobis. *Securidaca peregrina* Clus. hist. vide pag. 349. Col. I. Pl. III.

Proprium est & leguminose illi plantæ (quæ Tragacantha dicitur) siliquas seu folliculos, semiunciales, inter folia & aculeos, (post flores à longo tempore deciduos) producere. Duplici Serie seminum & ideò prioribus quo àd siliquarum, & seminum inibi contentorum, similitudinem : valdè accedit. Nec unquam memini hujus Farinæ, septimum legumen observasse.

Pag. 349. *Securidaca vera* : folliculum longè diversum habet ab *Astraguli Monsp-*

D d , peliani

peliam Clus. folliculo; nota, ab utraq; securidacam dumetorum, filiquis suis articulatis, multùm differe. Nos quemadmodum superiore observatione novum constituimus genus Astragalorum, ab identitate seu similitudine non solum florum, (qui in omnibus quasi leguminibus sunt pares) sed & filiquarum Gemellarum. Et hìc idem intendimus legumina filiquis articulatis, longis rotundis, striatis, prædita, eodem revocare & communi nomine Baptizare, etiamsi sub diversis, apud Authores nominibus, diversis in locis reperiantur.

1. Securidaca dumetorum major flore vario C. B. Pin. vide pag. 349. Col. I. Pl. IV.
2. Securidaca Eneaphyllos, filiquis in summitate: nobis. Lotus malè Dalechamphio; nec benè ferrum equinum. C. B. Pin. ibidem Col. II. Pl. IV. cum sequenti.
3. Securidaca Valentina: nobis. Polygala Valentina; 1. Clus. vid. 349. Col. II. Pl. II.
4. Securidaca Scorpioïdes major: nobis. colatea Scorpioïdes Ad. Lob. vide pag. 397. Col. I. Pl. II.

Omnes

Omnes hæc plantæ (quævis ab Authoribus variis in locis ut à Bauhino variè denominentur) leguminosæ sunt, habentque pro nota essentiali & Generica, hæc, quòd omnium & singularum, sub ipsarum capitulis contentarum, siliquæ, exsiccata, per articulos rumpuntur, in singulis interstitiis, singula semina oblonga, Cylindrica continentur.

Pag. 350. Tribulus terrestris, malè hic inter legumina propriè dicta collocatur, cum nec florem, nec siliquam, nec semen, habet conformia, ipsis. Ideò propter dispositionem foliorum, Rachi seu nervo medio adhærentium, uno extremum Claudente, (leguminum multorum more) ipsis adjungatur, Tribulus terrestris, sub finem.

Pag. 350. Col. II. Pl. V. Stella leguminosa Lob. non est eadem cum Vicia Sesamacea Apula Col. ut cernere licet plantas crescentes: imò & Icones Clus. & Columnas differentiam facile detegunt.

Pag. 360. Malè collocavit Bauhinus, Herbam minosam post Polypodium, inter idem & Muscum, cum sit legumen, ad legumina esset referenda.

Pag. 376. Cardui cum sunt plantæ capi-

tatæ perfectæ, quarum flores abeunt in pappos, Spinis ut plurimum armantur. Ergò malè locantur post Muscum, Fucum & Fungum (imperfectas plantas;) debebant collocari immediatè post capitatas pappascentes, non Spinosas ut Jaceam, Stœben, Cyanum, Centarium majus, &c. Sola hæc est differentia, quòd maxima pars Carduorum sit Spinis armata, passim, exceptis quibusdam. Quin et sunt quædam genera Carduorum, quorum capita non abeunt in pappos, sed solida efficiunt semina; & idcirco sunt Cardui minùs propriè dicti. Ut clariùs postea innotescet.

Pag. 382. Bauhinus, inter Carduos Sphærocephalos (saltèm in eâdem sectione) Collocat Carduum Erioccephalum; sed Carduus Sphærocephalus non est Carduus propriè dictus (ut clarissimè docebimus, in doctrinâ de Carduis, in Tabulis nostris cognationis) ergò malè, his adjungitur Carduus Erioccephalus (cum sit perfectè Carduus) Carduo Sphærocephalo, ejusq; generi, quia ei deest secunda conditio ad constituendum Carduum propriè dictum.

Pag. 383. Acanthus sativus & aculeatus

NON

non sunt Cardui, nec à flore nec à semine nec ab aliarum partium, suarum dispositione, alterutè est, Carduus. Ideo malè in medio Carduorum, disponuntur; substitui possunt ad finem Carduorum, quia Acanthus, aculeatus est spinosus. Sunt enim à tota facie, florum, seminum & capsularum seminalium formâ & figurâ plantæ peculiare & heteroclitæ.

Pag. 386. Col. II. Pl. IX. Eryngium arvense foliis Serræ similibus C. B. P. Eryngium quartum Dod. malè hic inter Eryngia disponitur, cum ne vel minimam notulam fert ejusdem. Perfecta est umbellifera planta, & rectè ab Oculatissimo Dalechampio in historia sua Lugd. Ammi quorundam nuncupatur. Nota insuper Eryngium, omnesque ejus species non esse Carduos propriè dictos, quia eorum flores non abeunt in pappos, quæ est secunda conditio requisita ad Carduos propriè dictos constituendos. Ut prolixius postea significabimus.

Pag. 386. Camphorata malè inter Ericam & Sabinam collocatur, cum sit herba, perennis, una in agris Galliæ Narbonensis & Gal-

in provincia frequens reperitur. Altera annua est, & passim in Vinetis berbitur.

Pag. 387. Col. I. Pl. VI. *Carduus Stellatus* luteus *Cyanifolius* C. B. *Pin.* *Spina Solstitialis* Dod. confundit hic *Bauhinius*, *Spinam Solstitionalem Dodonæi*, cum *Carduo Stellato minore Col.* qui, & *Spina Solstitialis minor Apula*, eidem nuncupatur; & planè est omninò diversa à priorè, quoad alas magis undulatas, capita habet minora, & semina papposa pariter minora; utrumque colui, ad aliquot annos.

Pag. 338. *Tragacantha* est planta leguminosa: filiqua seu folliculo brevi *Gemella* prædita, duplicem Seriem seminum, continente, proinde ad legumina *Asfragaloidæa*, seu *Asragalos* filiqua *Gemellâ*, referri debet. Vide *Asragalos*, supra; non autem ad *Carduos* pertinet, nihil enim conforme habet cum ipsis: *Summitates Ramorum* seu *Nervorum sustinentium*, multa folia hinc inde è Regione disposita: *Exsiccata*, pungunt. Quapropter *Bauhinus* hic collocavit, non video: remittatur ad suas congeneres plantas, (legumina videlicet *Sesamoidæa* s. *Asragalos* filiqua *Gemellâ*.) novum genus
facientes,

facientes, ex nobis. Ibidem Col. II. Pl. II. Poterio affinis spinosa foliis Pimpinellæ C. B. Pin. Pimpinella spinosa Cam. ~~χάλυξ~~ Anguillaræ Poterium Dalechamp. in hist. Clus. Hæc est vera Pimpinella, ut cuilibet intuenti cernere licet, ex dispositione foliorum, modo florendi; semina globatim rotunda fert. Ejus Nervi exsiccati pungunt: non tamen Carduis debet associari, sed cum Pimpinellâ disponi.

Ibidem. Anonis haud appositè adjungitur Carduis, propter Nervos ad extremum pariter exsiccatos (vulgaris saltem Anonidis) pungentes. Sed cum Anonis sit Trifolium, ab omnibus partibus essentialibus, debet Trifoliis annumerari, ut clarius demonstrabimus: cum Trifoliorum diversa subalterna genera, methodicè per Tabulas cognationis exhibuerimus.

Pag. 389. Cytisus Maranthæ Lugd. incanus filiquis falcatis C. B. Pin. Cytisus omnis vulgò sic dictus, filiquas profert longas, compressas, planas, aut hirsutas, seu hirsutie pubescentes, continentes in se semina compressa tumidiuscula: Genistæ vulgaris penè ritu. Atqui hic filiquam producit parvam,


curvam seu falcatam, quæ ex Libro naturæ, propius accedit, ad Medicam falcatam: quod me impellit ad judicandum facilius & certiùs, Medicæ frutescentis esse speciem, quam Cytisi, utraque & Cytisus & Medica est Trifolium; ergò cui magis accedit in siliquis ei est magis affinis ex doctrina nostra. Et si, Medica, frutex incana perpetua fronde virens appellaretur: per me non stabit. Judicent; qui hæc legerint, an rationi consentaneum sit, quòd dico.

Cytisus incanus Creticus C. B. Pin. Ebenus Cretica Prosp. Alpin. exot. Ebenus secundus floribus purpureis Joh. Bauh. à quo figuratur. Ex antè dictis de Cytiso Maranthæ. Hæc planta non est Cytisus: sed species elegantissima Lagopi maximis; & potest dici Lagopus Creticus frutescens, folio candidante. Semen collègi apud Dominum Morinum natu minimum, atque satum semine, ex Italia ad me misso è terra pullulavit, sed rigore hyemis sequentis, periit; vidi ad aliquot annos, apud Dominum Morinum natu minimum, habitantem in suburbio Divi Germani.

Page

Pag. 520. Col. II. in appendice C. Bauh. ad Pin. Doronicum Americanum laciniato folio C. B. Pinacis appendice: Cum omnis Doronici (proprie dicti) flos abit in pappos. Quæ est nota Generica & essentialis Doronici. Hujus autem plantæ semina sunt solida, quadrangula Chrysanthemum ad instar. Quare potiore jure, Chrysanthemum Americanum majus, laciniatis foliis appellabitur. Multò minùs accedit ad Aconiti classem: quippè Aconitum florem fert Cucullatum, cui succedunt capsulæ plurimæ membranacæ: minuta semina, aspera, continent, idè non potest dici, Aconitum Helianthemum Canadense: ut volunt alii.

Animad-



Animadversiones

IN

Tres TOMOS Historiæ

UNIVERSALIS

PLANTARUM,

JOHANNIS BAUHINI

Animadversiones in Tomum primum, Hi-
storiæ universalis Plantarum, Jo-
hannis Bauhini.

Pag. 374.
Partis Se-
cundæ.



YTISI facie, Alyssum
fruticans Lobel. quo-
rundam. Malè inter
Cytisos collocatur à
Johanne Bauhino : cum sit filiculosa planta,
non verò leguminosa. Ibidem : Trifolium
fruticans

fruticans: malè collocatur inter legumino-
sas plantas, cum sit Baccifera planta Trifo-
lia: ad Jasminum referri debet.

Pag. 520. Partis prima. Vitis Idæa an-
gulosa describitur, appingitur autem, Echii
aut Anchusæ Icon.

Pag. 460. Part. pr. Polygonum marianum
angustifolium Dalechampii; malè inter
Arbores collocatur, cum sit suffrutex tan-
tùm.

Pag. 553. Part. pr. Sambucus Rosea de-
scribitur; apponitur autem Sambuci aqua-
tica Icon, eadem figurâ, ad *pag. 552.* trans-
positâ, & Roseæ, figurâ ad *pag. 553.* transla-
tâ, tolletur lapsus,

Pag. 596. Part. pr. Dorycnium Imperati
& Alypum Mospelianum, malè collocan-
tur hic, cum sint tantùm plantæ (ut & plu-
rimæ aliæ suffrutices illæ collocatæ) inter
Arbores.

Animad-

*Animadversiones in Tomum Secundum
Historiæ universalis Plantarum; Jo-
hannis Bauhini.*

Pag. **C**ISTUS Ledum IX. Clus. & Ledum
12. **T**hymi foliis Clus. nec à flore nec
à capsulâ seminali aut semine, sunt habendî
Cisti.

Pag. 23. Rosmarinus sylvestris quorun-
dam; matè sic nominatur, cum à flore &
capsulâ seminali, sit perfectus Cistus. Idem
dicendum de duobus sequentibus *pag.* 24, &
25. nil enim habent essentialitèr, cum Rose-
marino, nec in flore nec in capsulâ seminali,
commune. Ibidem: Libanotidis species
Rondeletii, est Anchusa lignosior Lobelii,
quare ad Anchusam amandetur, nullâ habi-
tâ ratione conformitatis in foliis.

Pag. 354. Lotus Corniculata glabra, &
hirsuta minor, describuntur: duæ itidèm
apponuntur figuræ, quarum prior est vitio-
sa, (quippè Medicam cochleatam, hispida
refert) posterior est Loti glabræ, vera fi-
gura.

Pag.

Pag. 391. Epimedium quorundam, Columna prima, ejusdem paginae, describitur: appingitur autem Anonis seu Resta bovis: & Columna secunda ejusdem paginae, Anonis describitur. Appingitur Epimedium: hæduæ figuræ transferantur, hujus eò, illius hæc, translata figuræ: tolletur lapsus.

Pag. 398. Penultima pagina adversa Libri XVII. Caryophyllata vulgaris flore luteo parvo describitur: appingitur Hepatica Trifolia.

Nota à pag. 398. Sedecim paginas ad finem istius Libri, eodem numero continuò notari.

Pag. 459. Gramen repens cum panicula Graminis Mannæ describitur. Securidææ appingitur figura.

Pag. 446. Gramen versicolor describitur: & pag. 476, Gramen striis pictum describitur. Eadem figura, duabus diversis descriptionibus, appingitur.

Pag. 491. Gramen majus aquaticum Lob. describitur. Appingitur autem Potamogeton.

Pag. 508. Gramen Triglochin: & Hyacinthi parvi facie, Gramen Triglochin, U-
nius

nus ejusdemque plantæ, Graminis Triglochidini videlicet florentis, & semen ferentis, figura: pro duabus, toto Cœlo differenti- bus plantis, ponitur; duabus diversis affig- natis descriptionibus.

Pag. 590. Leucoii Hexaphylli, duæ ap- ponuntur Icones: ultima vitiata est, loco floris appingitur bulbis.

Pag. 611. Describitur Paucratium Mon- spessulanum; appingitur Phalangium non ramosum.

Pag. 803. Campanula Lychnidea: Non est Lychnis, quia non habet florem quinque petalis conflatum; sed integrum seu Mono- petalum, ut Convolvulus. Et si lactescit, est Convolvulus, mea opinione, nec florem pro- ducit Campanulæ in modum, quia, omnis Campanulæ .s. Trachelii Campanulati flos, in margine est quinquepartitus.

Pag. 810. Describitur Rapunculus flore globofo purpureo. Appingitur Campanula minor rotundifolia Alpina Bauh. in Pin.

Pag. 814, & 815. Jasminum Mexicanum five flos Mexicanus multis. Malè collocatur post bicapsulares plantas: Cum sit planta sui generis: five Heteroclita,

Pag.

Pag. 826. Campanula Serpilli folio Joh. Bauh. malè etiam hìc collocatur, post digitalom seu bicapsulares, quum cum Campanula p. 796, & 797. in initio Libri XX^m. debet poni.

Pag. 817. Campanula Linifolia lutea : cum in hallucinationibus Casp. Bauh in Pin. à nobis exhibitis, suprâ, clarè satis docuimus, esse Linum; non potest esse Campanula, cum non lactescit, nec capsulam habet seminalem, nec semen Campanulæ, sed Lini; ergò ut superiùs diximus, ad Linum esset referenda hæc planta.

Ibidem. Quo jure Soldanella montana, hìc collocatur à Joh. Bauh. non satis comprehendo; cum ad calcem siliquosarum aptiùs reduceretur.

Pag. 837. Turritis pulchra nova : non habet florem tetrapetalum, nec est siliquosa planta : ergò malè inter siliquosas collocatur.

Pag. 898, & 899. Telephium scorpioïdes, & scorpioïdes ex sententiâ veterum; cum flores gerant Papiliaceos, ut cœtera legumina, seminaque articulatim oblonga, perfectum leguminum saporem Masticata, suggerentia:

fuggerentia: Amandari debent ad finem plantarum filiquosarum Papiliacearum; leguminum scilicet. Non autem ad finem filiquosarum plantarum, tetrapetalarum. **Ibidem**, describitur Scorpioïdes montanum, appingitur Graminis alicujus figura. **Ibidem**: Hypecoon filiquosum describitur. Papaveris malè picti, sativi, appingitur figura:

Pag. 902. Coralloïdes minor bulbifera describitur. Apponitur Rhodia Radix ex Frago.

Pag. 903. Lysimachia lutea describitur. Appingitur autem Nasturtii figura.

Pag. 927. Nasturtium vel Thaspi maritimum describitur. Graminis Sparti autem apponitur figura.

Pag. 939. Draba multis; flore albo describitur. Duæ autem figuræ, diversæ apponuntur, Drabæ videlicet luteæ, siliquis strictissimis Cam. & Nasturtii Babylonici Lob. quarum prior (quia filiquosa) est rejicienda. Altera (quia siliculosa) est vera & genuina.

Pag. 941. Dentillaria Rondeletii; cum non sit planta siliculosa (quamvis caustica) alibi debet poni.

Pag. 982. *Melochia*, sive *Corchorus*; cum sit planta filiquosa, *Heteroclita*: Ad finem plantarum filiquosarum tetrapetalasum, debet poni. Non immediatè ante *Lapathum* propter usum, quia est *Olus Judaicum*.

Pag. 984. *Lapathum* vulgare, folio obtuso describitur; appingitur. *Lapathi* minimi *Tab.* figura seu *Icon*.

Animadversiones in Tomum Tertium Historiae universalis Plantarum: Johannis Bauhini.

Pars Prima.

Pag. 6. **S**CABIOSA peregrina rubra, quibusdam Indica describitur: At figuratur *Circium*.

Pag. 12. *Scabiosa* globularis, quam ovinam vocant: Hæc inter *Scabiosas* non debet locari; cum omnes conditiones, *Rapunculo* essentielles possideat (nempè lactescit, florem

florem habet Corniculatum, multorum aliorum Rapunculorum more: semenque producit subrufum, pellucidum) ad Rapunculorum classem, releganda esset hæc planta.

Pag. 13. Aphyllantes seu Globularia Bellidi similis, & Aphyllanti affinis, Scabiosa quinta Clus. Bellidi affinis. Hæ duæ, cum non habent notam Genericam, Scabiosæ; sed omninò accedunt Bellidum classi, aptius eò relegantur.

Pag. 25. Xeranthemum seu Ptarmica quorundam, & pag. 26. Xeranthemi fortè species & Catanance Dalechampii, flore Cyani, folio Coronopi; & pag. 27. Catanance affinis, Sesampoides parvum, flore magis completo Cam. Omnes hæc plantæ, cum non pappescunt, non fuissent hic collocandæ; Xeranthemi species ad Corymbosas, solida producentes semina amandentur. Catanance utraque, ad Cichorii genus (quippè lactescit, & Solida producit semina, non autem papposa) cuius, ex nostrâ doctrinâ superius traditâ in hallucinationibus Caspari Bauhini, est vera & genuina species.

Pag. 30. Scabiosa squammata argentea. Malè à Johanne Bauhino, pro Scabiosa recensetur,

censetur, cum Scabiosæ caput non abit in pappos, sed in Solida semina. Hujus autem abit in pappos, ergo est aut Jaceæ at Stœbes species.

Pag. 71, & 72. Spina alba, quibusdam, capite Echinato & Echinopus minor, vulgò Authoribus, Cardui Sphærocephali dicuntur. Itè*m pag. 73, 74, & 75.* Dipsaci species malè hîc collocantur, in medio Carduorum propriè sic dictorum: quia non abeunt in pappos eorum capita, ut omnis Cardui perfecti caput: Suntque minùs propriè Cardui, ut & Eryngium, Scolymus: quod alibi clariùs deteximus. Idem esto iudicium de Spina lutea seu Scolymo, *pag. 84.* & de Eryngio *paginis 85, 86, 87, & 88.* Amanentur ad calcem Carduorum propriè dictorum. Nota insupèr *pag. 86.* Eryngium cœruleum describitur à Johan. Bauhino, & Plomos Lychnitis appingitur.

Pag. 106. Cithmum marinum tertium, Mattheoko flore luteo Bupthalmi; cum sit planta Stellata pappescens, ad Stellatas pappescentes debet relegari, non autem hîc in medio plantarum Corymbiferarum .s. Corymbosarum collocari: quæ Solida angulosa producant semina. *Pag.*

Pag. 108. Helenium seu Enula Campana (per antedictam rationem) ad pappescentes congeneres debet amandari, non autem hinc locari; ut alibi in hallucinationibus Casp. Bauh. observavimus.

Pag. 113. Bellis flore viridi describitur. Thlaspios, Myagri aut potius Erucae peregrinae Clus. appingitur figura seu Icon.

Pag. 144. Ageratum purpureum Dalechampii; cum non sit corymbosa planta, malè hinc collocatur. Ad finem Euphrasiae cum Hyssopifolia Bauh. in Prodr. amandetur.

Pag. 151. Heliochrysos Tragi sive Linaria tertia; cum hæc planta pappescit & florum tubulos, virgæ aureæ in modum producit; virgæ aureæ sit species, Linariæ foliis. Sumendo denominationem à potiore & nobiliore parte, scilicèt florum seu florendi modo. Nec Linaria debet appellari, ut prolixè satis in hallucinationibus supra exhibitis in capite Bauh. in Pin. de Linariâ docuimus.

Pag. 163. Pilosella Phlomodis exotica; cum lactescit & pappescit, debet ad suæ sortis familiam relegari: nempè Chondril-

Iam, Hieracium, Pilosellam, Dentem Leonis, &c. lactescentes, pappescentes.

Pag. 195. & inde ad pag. 200. Quâ ratione, ductus Joh. Bauhinus, subjungit Rutam Corymbosam, non capio; cum Rutæ omnis, involucri sit quadricapsulare. Multò magis ipsum miror, dum *pag. 201. usquè ad pag. 206.* collocat Fumariam. Quin & in hujus Serie disponit Ranunculi speciem, Muscatellinam, à denticulatione, (junctâ quâdam cavitate) radicis, nullâ habitâ ratione floris & seminum, nempe notæ essentialis. Deindè, quare subjungit fini Libri **XXVI.** Melanthium, & consolidam regalem, non video; cum sint aliò à nobis aptiùs relegandæ.

Tomi tertii pars Secunda.

Pag. 6, & 7. **A**NETHUM & Anetho similis planta, semine lato laciniato; cum sint Umbellæ, semine membranaceo subrotundo præditæ: Malè inter Fœniculum & sequentes Umbellas (quippè semine striato donatæ sunt) collocantur.

Pag.

Pag. 8. Millefolium aquaticum, Fœniculo simile umbelliferum; non est perfecta Umbella. Millefolii aquatici species est: ergò ad aquaticas esset mandanda.

Pag. 9. Describitur Daucus pratensis Dalechamp. foliis Millefolii: appingitur Filipendulæ figura seu Icon.

Pag. 23. Cuminum sylvestre primum valdè odoratum, globulosum, non est Umbella propriè dicta, (quia non habet bina semina simul juncta, quæ est nota Generica & essentialis toti Umbellarum Sereî conveniens) ut in hallucinationibus Casp. Bauhini, suprà satis dilucidè docuimus.

Pag. 33. Sefeli Massiliense nuperorum folio aliquatenus simili visnagæ; cum semina habet membranacea, oblonga; ad sui generis Umbellas (non autem inter Umbellas semine striato tumidiusculo ditatas) referri debet. ut clariùs in universali nostrâ Umbellarum distributione deducemus.

Pag. 36. Peucedanum malè itidèm, inter Umbellas, semine striato tumidiusculo donatas, locatur: ex dictis suprà. Deniquè adèò confusè Umbellas disponit Joh. Bauhinus: ut impossibile sit ipsas corrigere

perfectè, quoàd Tabulas nostras cognationis, seu affinitatis exhibuerimus.

Pag. 40, & 41. Libanotis Cachryophoros, quibusdam floribus luteis & Libanotis Cachrys Hispanica; cum semen gerant fungosum exterius ad nucis parvæ Myristicæ magnitudinem, & figuram ovalem: ex quâ notâ peculiari ego creo novum genus Umbellarum; quod Cachrys seu Libanotis Cachryopfera appellabitur. Ut clariùs elucescet, ex divisione Umbellarũ, in decē classes distribuendarum; sic à naturâ notatarum, ut apparebit in Tabulis nostris cognationis.

Pag. 43. Nota Joh. Bauhinum à *pag. 43.* ad *pag. 53.* duo genera Umbellarum inadvertentè confudisse, quorum unius semen est compressum, membranaceum, subrotundum ut serularum omnium. Alterius semen est alâ foliaceâ membranaceâ cinctum: ut Thapsiæ ejusque specierum omnium.

Pag. 64. Pastinacæ sativæ, sive Carotæ rubræ, luteæ & albæ ultima Icon. ex tribus; non indigitat Pastinacam tenuifoliam; Pastinacam potiùs latifoliam, seu Elaphoboscum Matth. representat. Ideò malè pro Pastinaca tenuifolia, hìc ponitur: quare
ad

ad pag. 151. debet referri ; ubi eadem Icon. cum alterâ ejusdem speciei conspicitur.

Pag. 74. Percipier Anglorum quibusdam ; cum sit Alchimillæ species (ut in hallucinationibus Casp. Bauhin. clarè fati, supra docuimus) non debet inter Umbellas collocari.

Pag. 79. Gyngidium Matth. cum sit semine minore striato, foliis tenuissimè dissectis, præditum. Malè à Joh. Bauhino inter Umbellas rostratas Scandicem, Myrridem ; & Umbellas aculeatas, Caucalidem scilicèt seu Lappulam (ut cum Johanne Bauhino loquar) disponitur.

Pag. 83. Caucalis Hispanica semine rugoso, & ab illâ paginâ prædictâ, usquè ad pag. 86. Umbellæ omnes illic contentæ : (cum nota Caucalidis seu Lappulæ : est, semine aculeato, seu hispido donari, ut prolixius alibi trademus, ex Libro naturæ instructi) semine foliaceo, seu membranaceo subrotundo ditantur, sub eodem vexillo cum congeneribus suis debent Militare. Videlicèt Sphondylis, Pastinaca sativa latifolia, Panace peregrino & cœteris (id genus) aliis cognatis, à naturâ signatis : Ut
magis

magis dilucidè offeremus, in Tabulis affinitatis nostris.

Pag. 91. Coriandrum: Coriandrum minus odorum, & Coriandrum sylvestre; cum genus Umbellarum per se constituunt, nempe semine rotundo testiculato præditum: Malè hic collocantur cum per se debent locari. Nota Umbellas sequentes usque ad *paginam 113.* esse omnes semine striato minore præditas; quæ non debebant disjungi à consortibus præcedentibus, semine itidem striato donatis.

Pag. 113, usque ad pag. 120. Malè Sanguisorba ejusque species hic collocantur; cum non sint Umbellæ propriè dictæ, sed plantæ spicatae, aliquam in foliorum, conformationem cum Pimpinellâ, Saxifragâ umbellata habent. Idèò rejiciendæ essent ad calcem Umbellarum propriè sic dictarum (propter similitudinem foliorum) cum Filipendulâ, Barbâ Capræ, Valerianâ Græcâ, Thalictrò, &c. ejusdem Farinæ. Omninò, non fuerunt disponendæ à Joh. Bauhino inter Umbellas semine minore striato ditatas.

Pag. 137. Lasepitiium, proprium constituit genus Umbellarum: Quippè ejus semen, pluribus

ribus alis, foliaceis seu membranaceis, alæ molendinæ fluviatilis instar, (quandò binatim jungitur ante exsiccationem) constat. Quà notâ essentiali & Generica, indigitatur peculiare hoc genus Umbellarum.

Pag. 149, 150, & 151. Pastinaca sativa latifolia: cum suæ sortis Umbellis lobatis, semine foliaceo, compresso, subrotundo præditis (ut supra dixi) disponi debuit. Non inter Umbellas semine striato minore ornatas; ut Sisarum post se, & Levisticum ante se.

Pag. 164, & 165. Libanotis Theophrasti, Sefeli Æthiopicum Mattheolo; & Libanotidi Theophrasti quorundam valdè similis; Costus amara dicta semine crispo: Hæ duæ Umbellæ, ex Libro naturæ, Laserpitii, gerunt tesseram (id est semina sunt ejusdem formæ) ergò jure merito, à nobis recensentur Laserpitia.

Pag. 183. Phellandrium, vel Cicutaria aquatica quorundam; non est Umbella propriè loquendo: Quia omnes Umbellæ, habent bina semina simul juncta, cujuscumque figuræ aut formæ sit semen; atque propter defectum hujus præcipuæ, universalis

salis & essentialis conditionis; minùs propriè dici debet Umbella: In cœteris omnibus, est Umbellæ æmula, hæc Cicutaria aquatica.

Pag. 186. *Thapsia latifolia* & *Carotæ facie*, semen gerunt striatum, oblongum; alâ membranaceâ cinctum; Quâ notâ peculiari distinguitur, ab omnibus subalternis generibus Umbellarum; & idèd nos sic distinguemus in Tabulis (exhibendo Genericam & essentialem hanc notam;) nostris distributivis, Umbellarum: confusè omninò ab Authoribus, hucusque exhibitarum. Nota insupèr *pag.* 50. *Thapsiæ majoris* seu *Turbith Garganici*, semen latissimum benè repræsèntari: Sed vitiosè *Sileris* aut *Cachryos*, *Peucedani foliis*, appingitur folium.

Pag. 189. *Filipendula* describitur; *Dauci* autem *pratensis* apponitur figura.

Pag. 193. *Oenanthe Myconi*: Malè hìc, inter Umbelliferas, disponitur; cum sit *Ranunculi*, *Asphodeli radice* species; ut ex flore & semine, totaque facie apparet. Quare ad *Librum XXX.* inter congeneres releganda est hæc planta.

Pag.

Pag. 282, 285, & 286. usque ad pag. 287, 288, 289, 290. Sive sub Teucro, sive Chamædre, omnes hæ plantæ nominentur, sunt veræ & genuinæ Veronicæ species; quippè sunt tetrapetalæ filiculosæ, septo medio membranaceo, discriminante duplicem Seriem seminum, ut videre licet in filiculosis tetrapetalis; ut Bursâ pastoris, Thlaspi, Cochlearia, Nasturtio hortensi, Drabâ filiculosa, Lepidio, Iberide, &c.

Pag. 290. Chamædrys Alpina, flore Fragariæ albo describitur: Hormini appingitur figura.

Pag. 291. Scutellaria Teucroii facie & *pag. 293.* Scorodotis, seu Scordium folio Salviæ. Nota has verticillatas & Galeatas, ad finem verticillatarum & galeatarum rejici debere. Quia capsulas seminales non more aliarum, quinquefariam in margine divisas gerunt; sed Scutellæ in modum: undè novum genus creavimus ex pluribus hinc illinc, ex Authoribus variis collectum. Vide, & consule hallucinationes Casp. Bauh. à nobis exhibitas.

Pag. 307. Verbascum sylvestre Monspe-liensium flore luteo hiante; describitur.

At

At umbellifera appingitur planta, fortè Scandix.

Pag. 321. Describitur Galeopsis, sive Urtica iners, &c. & pag. sequenti appingitur Balsaminæ Persicæfoliæ (fortè) figura florentis.

Pag. 323, & 324. Locusta herba, & Locusta altera foliis serratis: Malè hîc committuntur, ad finem galeatarum, verticillatarum, cum quibus nil planè habent affines; remittantur ad pag. 212. & claudant Sectionem Umbellarum; etiãsi non sint Umbellæ perfectè. Quia non habent bina semina simul juncta, quæ est nota essentialis & Generica omnibus & singulis Umbellis, perfectè sic dictis conveniens. Tamen florent quodammodò Umbellarum more & earundam folia, aliquatenùs Valerianæ Alpinae accedunt.

Pag. 348. Flos Cuculi, flore multiplici purpureo, & altero albo describitur. appingitur Alfine minimæ species.

Pag. 362. Alfine major, repens, perennis describitur: Apponitur Polygalæ luteæ Icon.

Pag. 364. Alfine minima describitur:
Appingitur

Appingitur odoptidis flore pleno Icon. hujus figura ad pag. 348. illius ad paginam 364. transferatur, & tolletur lapsus.

Pag. 366. Alsinæ foetidæ quodammodò similis laciniata; delineatur seu describitur: Phaseoli autem apponitur figura seu Icon.

Pag. 367. Alsinæ ferrato folio hirsutiori, floribus & loculis Cauliculis adhærentibus; Alsinæ oblongo folio ferrato, flore cœruleo. Et pag. 368. Alsinæ folio profundè secto, flore purpureo seu violaceo; Item Alsinæ genus, Fuchsio folio Hæderulæ hirsuto: Omnes hæ quatuor plantulæ; cum singulæ singulos edunt flosculos (cujuscunque coloris) quatuor petalis constantes, singulis earum floribus succedunt filiculæ bicapsulares, Veronicæ in modum. Ut satis clarè in hallucinationibus Casp. Bauhini, in Pin. nobis solummodò observatis; ostendimus. Inadvertentè omnes quasi Authores, hucusque has; Alsinæ species constituère. At pro Alsinæ speciebus, non sunt reputandæ; cum Alsinæ flos constat quinque petalis, ad medium bifidis; cui deciduo succedit capsula coni instar. Ergò intuendo Librum naturæ Veronicæ species sunt annuæ: Consule hallucinationes

lucinationes Casp. Bauh. à nobis suprà editas. Muta Alfines nomen, & denominando ipsas, Veronicam; habes naturæ intentum.

Pag. 375. Polygoni, duæ appinguntur Icones, quarum posterior est vitiosa.

Pag. 381. usque ad pag. 385. In quibus omnibus continentur Androsæmum, Ascyrum, Hypericum; quæ omnia malè illic constituantur inter Polygonum, & Polygalam: Cum sint bicapsulares, Pyramidales seu Coniformes (quoad involucria seminum) essent relegandæ ad digitalem, Verbascum, Blattariam, Gratiolam, &c. ut suprà docuimus; in hallucinationibus Casp. Bauh.

Pag. 382. Hypericum Ascyrum dictum; Caule quadrangulo describitur: appingitur Ocymoides non speciosum, seu Lychnis sylvestris, alba noctiflora Cam. hujus Icon. ad *pag. 344.* & illius ad *pag. 382.* transmittatur, & sic tolletur error Joh. Bauh.

Pag. 386. Onobrychis lutea Dalechamp. describitur; at appingitur Alfines majoris repentis, perennis, Icon. hujus Icon. ad *pag. 362.* illius, ad prædictam 386. transferatur; & inadvertentia Joh. Bauhini auferetur. Nota ibidem insuper Joh. Bauh. haud appositè

positè Polygonon pro Polygala scripſiſſe.

Pag. 410. Pulsatilla alba describitur. Appingitur autem alterius plantæ Icon.

Pag. 414. Ranunculus cum flore in medio folio, radice tuberoſa; cum non producat ſemina Ranunculi in modum, ſed Aconiti: Unde à ſiliquis Aconiti & flore Ranunculi, Aconitum Ranunculoïdes 1. appellamus in hallucinationibus Caſp. Bauh. ſicut per eandem rationem Ranunculus flore globoſo quibuſdam, trollus flos *pag.* 419. à ſiliquis longis membranaceis Aconitum Ranunculoïdes 2. appellamus: Conſule hallucinationes Caſp. Bauh. à nobis ſuperius editas.

Pag. 421, & 422. Scrophularia maxima radice fibroſa, describitur; appingitur autem Sideritis Monſpeliaca. Nota inſuper, malè Scrophulariam inter galeatas verticillatas collocari, cum ſit planta bicapsularis ut alibi docuimus.

Pag. 426. Sideritis Monſpeliaca describitur; appingitur autem Scrophularia maxima radice fibroſa. Hujus Icon. ad *p.* 422. & illius ad *pag.* 426. transferatur, & corrigetur error.

Nota inſuper, quæ ſtirpes continentur à

F f

pag.

pag. 421. Libri XXX. usque ad pag. 468. ejusdem Libri, debent referri ad Libros XXVIII, & XXIX. videlicet, quæ continentur à pag. 421. ubi intuenti sese offert *Scrophularia vulgaris major*, usque ad pag. 449. ubi legitur *Bangue*; debent mandari ad Lib. XXVIII. pag. 323. ubi legitur *Galeopsis*. Quippe quod *verticillata* & *galeata*. *verticillatis* & *galeatis* essent addenda. Quæ autem continentur à pag. 450. ubi in conspectum sese dat *Linum*: usque ad pag. 467. ubi legitur *Reseda*: Debent referri ad Libri XXIX. pag. 371. ubi legitur *Numularia*.

Pag. 434. *Gratiola*, malè à Joh. Bauhino (cum sit bicapsularis Coniformis planta, ad *Scrophulariam*, *Verbascum*, *Blattariam*, &c. referenda foret) inter *verticillatas* & *galeatas* plantas disponitur.

Pag. 446. *Urtica minor annua*, hujus Icon est vitiosa.

Pag. 455. *Alfina verna glabra*, malè hìc à Joh. Bauhino collocatur, inter *Lini* species: Quia est perfecta *Alfina* à flore, quin petalis ad medium bifidis & capsulâ seminali, *Alfinarum* more, factis donata.

Pag. 456. *Passerina Tragi*, & pag. 455. *Passerina*

Passerina Lobellii neutra harum est Linaria, nec à flore, nec à semine: Nil habent commune cum Linaria nisi folia; sunt plantæ sui generis & Heteroclitæ.

Pag. 461. Linariæ similis; duæ adferuntur in mediâ figuræ, quarum neutra est Linaria, prior refert Polygalam, Altera est Anonymos Clus. seu Heteroclitæ cujus folia quodammodo Linariæ foliis sunt similia. Idem dicendum venit, de Linaria belvidere.

Pag. 463. Antirrhinum vulgare, hujus tres apponuntur Icones: quarum, prior est Junci cum utriculis: (Casp. Bauh. in Prodr.) Icon.

Pag. 468. Scrophularia minor Lib. XXX. debet amandari, ad pag. 420. ubi legitur Ranunculus. Post admissos alios ejusdem generis, in appendice ad Tomum tertium, contentos.

Pag. 471. Caltha palustris flore multiplicato: Cum siliquis plures oblongas, membranaceas, femina in se continentes nigra; producit Caltha palustris: Benè meâ opinionè, subungi debet Aconito flore Ranunculi in medio folio: quod continetur pag. 414.

Pag. 482, & 483. *Chelidonia major* & eadem folio laciniatomalè, collocantur hìc; cum ad siliquosas tetrapetalas plantas debent referri. Quæ continentur in Tomi 2. Lib. XXI. tetrapetalæ siliquosæ, tetrapetalis siliquosis jungendæ sunt: cum in Tomi 3. Libro XXX. nil habent affinitatis. Nec cum genere antecedente Ranunculo, scilicèt, nec cum genere sequente aquilegia: Sed sunt tetrapetalarum siliquosarum veræ & genuinæ species; ut cuilibet consideranti, cerne-re licet.

Pag. 484, & 485. *Aquilegia* cum sit planta siliquis membranaceis plurimis, *Aconiti* & *Delphinii* adinstar, debuit iisdem subjungi.

Pag. 486, & 487. *Thalictrum* ejusque species; à similitudine foliorum, in ipsorum dispositione, cum plurimis Umbellis conveniunt. Idem contingit *Filipendulæ Ulmaria*, seu *Barbæ Capræ*, aliisque; jure accidentali, possunt ad finem Umbellarum disponi: ut superiùs clarè satis ostensum fuit.

Pag. 489. *Leontopetalon* cum sit planta *Heteroclita*, ad finem *Ranunculorum* potest amandari.

Pæonia

Pæonia ejusque species, adjungantur iis quæ plurimas siliquas membranaceas habent; ut *Delphinio*, *Aconito*, *Aquilegiæ*, *Staphidi Agriæ*, cæterisque illius *Farinæ*: ut nos conclusimus.

Pag. 496. *Primula veris*, caulifera, proli-fera, odorata describitur. Appingitur con-fusè cum *Primula veris* floribus plenis ex singularibus pediculis.

Pag. 497. *Primula veris* floribus plenis ex singularibus pediculis, describitur. At appingitur *Umbellifera Primula veris* con-fusè cum prædictâ.

Pag. 521. *Gentiana folio convoluto*, est à flore & capsulâ seminali etiamque semine *Lychnidis* (*Saponariæ dictæ*) species genui-na; neutiquam est *Gentiana*. Ergò malè hic cum *Gentianæ* speciebus locatur; rele-gari debet ad *Lychnidum* classem. *Sapo-nariam* nempè, eandem cum *Casp. Bauhino Saponariam* concavam nuncupando.

Pag. 524. *Gentianæ* species, *Calathiana* quibusdam radice perpetua, sive palustris describitur: duæ autem *Gentianæ*, omninò diversæ *Icones* apponuntur; prior vera, alterius est *Gentianæ punctato flore Clus. Icon.*

Pag. 533. *Bifolium majus*, sive *Ophrys major* quibusdam: *Malè* hic locatur, cum *melius* congruit cum *Helleborine*; *cujus* est multò magis *æmula*, quoad omnes suas partes.

Pag. 538. *Bistorta*, cum sit *semine* triangulari donata; magis *appositè* disponeretur post *Lapathum acetosam*, &c.

Pag. 563. *Tussilago*, & à *pag.* 563. usque ad *pag.* 569. in quibus continentur *Tussilago*, *Petalites*, *Cacalia*; quæ omnes, cum *pappescunt* & non *lactescunt*, debent *pappescentibus*, non *lactescentibus* subjungi: *Videlicèt* *Jacobææ*, *Senecioni*, *Gnaphalio*, *Stœchadi Citrinæ*, &c.

Pag. 579. *Buglossum vulgare*, majus & minus, utrumque *flore duplici*: *malè* figuram exhibet *Joh. Bauhinus* *Buglossi vulgaris*, *flore simplici*.

Pag. 588. *Echium tenuifolium* describitur. *Appingitur* *Buglossi* species, *latiore folio*: *observa* hoc *discriminis* *intercedere* inter *Buglossum*, seu *Borraginem*, & *Echium* sive *Lycopsin*, *Buglossi* seu *Borraginis* *flos* *conflatur* ex *quinis* *petalis* *acutangulis*, *cingentibus* ad *basin* *fimbriam* *villosam*; in *cujus*

ius medio totidè prominent Apices conjunctim, aculeum referentes; sed Echii seu Lycophios flos, est corniculi aut tubuli instar, oblongus, in superiore floris parte longius porrectus; in inferiore margine brevior; utriusque (floribus discussis) in vasculis, tria vel quatuor semina conjunctim posita sunt, oblonga, rugosa: veluti semina Consolidæ majoris.

Pag. 590. Cynoglossa fortè Topiaria Plinio, seu Echium lappulatum quibusdam, describitur; sed perperam appingitur Cynoglossa, folio virenti Joh. Bauhini.

Pag. 592. Lithospermum majus Dodonæi flore purpureo, semine Anchusæ describitur. Sedi autem aliqua appingitur species; nempe Sedum Alpinum minimum foliis cinereis, flore candido, descriptum in *pag. 692.* hujus Icon. ad *pag. 692.* illius autem Icon. ad *pag. 596.* transferatur, facile emendabitur error.

Pag. 598. Cynoglossum vulgare malè exhibetur; quia Icon. est vitiosa.

Pag. 600. Cynoglossa folio virenti Joh. Bauhini describitur. Appingitur autem Cynoglossa fortè Topiaria Plinio, seu Echium

F f 4 lappula.

lappulatum quibusdam, hujus Icon, pag. 600. contenta, ad pag. 590. amandetur: & illius huc transferatur, & sic corrigetur lapsus.

Pag. 637. Buphthalmum Dodonæi aliis Confiligo tenuifolia, cum sit planta Corymbosa, semine Adonidis Emulo prædita, ad Corymbosas debet amandari.

Pag. 638. Sanicula foemina quibusdam, aliis helleborus niger; cum sit planta umbellifer, aut clarè satis docuimus in hallucinationibus Casp. Bauh. ad Umbellas esset releganda, cum Tabernemontano, eamque appellando Imperatoriam nigram.

Pag. 641. Staphis Agria, cum sit planta gerens plures siliquas, membranaceas continentes semina dura, lucida, nigra; relegetur ad Aconitum, Delphinium, Aquilegiam, &c.

Pag. 643. Ricinus cum sit planta tricoecos, & simili purgandi virtute prædita, cum Tithymalo, ejusque speciebus; debet ipsis subjungi.

Pag. 650, & 651. Thora folio Cyclaminis, & Thora Apula folio Alchimillæ; cum sint Ranunculi, à flore & semine; non est dubitandum quin debeant relegari ad Ranunculorum classem.

Pag.

Pag. 660. *Aconitum racemosum*, actæa quibusdam; cum hæc planta sit baccifera, Solano magis accedit (mea opinione) quam *Aconito*, ut suprà innuimus.

Pag. 678. *Portulaca hortensis*, *latifolia* describitur. Appingitur autem *Menianthes*, seu *Trifolium paludosum*.

Pag. 680. *Sedum Echinatum* vel *stellatum* flore albo describitur; vitiosa appingitur Icon. fortè alicujus *Polygoni*.

Pag. 684. *Cotyledor*, altera olim *Mattheolo*; non est *Cotyledonis* propriè dictæ species; sed florem fert *Sedi* aut *Saniculæ montanæ*, capsulamque paritèr in superiore parte bifurcatam, in qua plurima continentur semina tenuissima.

Pag. 685. *Cymbalaria flosculis purpurascens*, neutiquàm huc pertinet, sed debet jungi *Linariæ* familiæ. Cujus fert tesseram seu notam Genericam: ut suprà in hallucinationibus *Casp.* *Bauh.* satis evidentèr à nobis deducitur.

Pag. 692. *Sedum Alpinum* minimum foliis cinereis, flore candido describitur. Appingitur autem *Lithospermon majus* *Dod.* flore purp. semine *Anchusæ*. Vide *pag.* 592.
fiat

fiat transpositio Iconum, & tolletur lapsus.

Pag. 710, & 711. Lunaria Botrytis ejusque species, malè hic digeruntur; cum sint perfectæ filices, inter filices collocentur.

Pag. 722. Spergulæ tres Icones, malè illiè disponuntur inter Rubiæ species. Quia Spergulæ, à flore & capsulâ seminali, sunt Alines perfectæ species. Ergò ad Alines classem debent relegari; nullâ habitâ ratione foliorum, per intervalla stellatim positorum.

Pag. 728. Drypis Theophrasti, cum sit Carduus, malè hic inter Asparagum & Equisetum digeritur; & à suæ sortis familiâ disjungitur: Ergò ad Carduorum seriem debet jure mandari.


Pag. 754. Trichomanes, sive Polytrichum describitur. Appingitur autem Cardui alicujus Icon.

Pag. 762. Phyllon, Thelygonon Dalechampion, cum filiculam habet bicapsularem, septo membranaceo, duplicem determinante seriem seminum; Paronychiæ muralis adinstar, aptè (meâ sententiâ) Paronychia foliis crassis, hirtis diceretur. Ibidem Tridactylites Alpina: florem & capsulam
femina-

seminalem habet ; ut Sedum Tridactylites
tectorum : Ergò ad Sedi classem esset re-
leganda, & non hic collocanda hæc plan-
tula.

Pag. 868. in appendice ad Tomum tertium.
Auricula urfi orbiculata, ferrata coloris ru-
bicundi describitur. Appingitur autem
vitiosa Icon: fruticis scilicet alicujus, ra-
mus.

Ad



Ad virum insignissimum, Doctissi-
 mum & vitæ integerrimum, Dignissi-
 mumque Dom. *Johannem Fell*, in sacro-
 sanctâ Theologiâ Doctorem, Collegii
 ædis *Christi* Decanum & Universitatis
Oxonienfis Procancellarium vigilantis-
 simum S. P. D. Author.

Clarissime Vir,

♦♦♦♦OST reditum meum, Oxoniâ Londi-
 ♦♦♦♦P num, amicorum quorundam Precibus
 ♦♦♦♦♦ sollicitatus : ut præludia Botanica hæc
 ♦♦♦♦♦ Mea, typis committerem : quæ jam
 tandem prelo excessere. Quæque viam, ad
 methodum nostram novam (cujus tibi exem-
 plar ostendi) præsternunt : novam appello
 quia nemini hucusque cognita : antiqua tamen
 quia à tertio die creationis mundi, eadem
 semper fuit, quæ hodie est. Reverende Vir, non
 ita pridem (ut nosti) invisebam splendida ve-
 stra & magnifica ædificia ; Collegia, Scholas,
 Bibliothecam,

Bibliothecam, Theatrum, publicis aedibus designatum, vix adhuc finitum. Liberalitate & sumptibus, Reverendissimi in Christo Patris, Archiepiscopi Cantuariensis; Gilberti Shelden, ejusdemque Universitatis Cancellarii dignissimi; à fundamentis erectum. In Symbolum gratitudinis suae, erga almam matrem suam: cui presentem ingenii Culturam debet. Magnificum hoc Theatrum (omnium in Europâ facile primum) ut & omnes graviore cura Universitatis; vigilantia, labore & inspectione tuâ, (nec auribus tuis jam do) diriguntur. Dum fabricam & structuram omnium (inquam) horum publicorum edificiorum, animo volvo: Nihil unquam apud exteras nationes, ipsis comparandum, audaciter asserere audeo. Sed dum numerosam Doctissimorum, in omni literarum genere, hominum illic Congregationem penitus considero: Dumque omnes eâdem suspendo bilance, Dialogum hunc, inter Socium Londinensis Collegii Regii, & Me: nulli aptius, quam tibi inscribere; ratum & statutum habeo. Solutiones quarundam questionum propositarum; inter prandendum, Domi tuae, sub idem tempus; invenies. Cum de methodo Authorum, in re
Botanicam,

Botanicam, hucusque scribentium; tuam, de Plantis imperfectis agit: Estque hic totus ferè scopus totius Dialogi. Accipe igitur, hilari animo, hæc nostra alterna colloquia Botanica. Tu qui me benignè recepisti, omni humanitatis officio, me affecisti: dum apud vos conversarer. Utinam vobis aut vestris inservire possim commodis: Me invenietis paratissimum; Vale. Et ut diu vivas, Deus optimum, maximum precor:

Vir Reverende



Doctissime,

Tuus obsequentissimus




Observantissimus servus,

ROBERTUS MORFON.



DIALOGUS
INTER
SOCIUM,
COLLEGII REGII
LONDINENSIS,
GRESHAM dicti:
ET
BOTANOGRAPHUM
REGIUM.

Socius. Botanographus.

Socius.  ANDO ad meas pervenit au-
res, imo jam cum in memo-
riam revoco, ex tuo ore
hausi: Te excogitasse, aut
saltem incidisse in methodum generalem
omnium stirpium, per Tabulas quasdam
cogna.

cognitionis, seu affinitatis; sed quid sibi velint hæ Tabulæ, nondùm assequor. Quare velim, ut paucis privatim inter nos de eisdem conferamus. *Botanographus*. Methodum me observasse fateor: Estque, omnium, quæ unquam adhuc fuerunt exhibitæ: præstantissimæ & certissimæ: est quippe à naturâ data, à me solummodò (citra iactantiam) primum observata, quamque publici juris facere brevi, in me suscepi. Si Mœcenates faverint, nostris conatibus & lucubrationibus per aliquot annos à nobis exantlatis. *Soc.* Volumina multa magna evolvi, de re Botanicâ: Sed methodum stirpium hucusque desidero; quæ multum conduceret ad citiùs & certiùs vastum illum Oceanum, plantarum seu Stirpium addiscendum. Insupèr Calcaria adderet multis nobilibus, doctisque hominibus, plantas è terrâ pullulantes avidiùs contemplari & divinum artificium summoperè mirari: sed quid quæso tu dicis, qui tres modios salis in Galliâ comedisti: de historiâ universali Plantarum, Lugdunensi; à Dalechampio editas. *Botan.* Fateor me fœlicitèr in Galliâ vixisse multaque illic evolvisse volumina,

cum

cum magna, tum parva, de arte (aut scientiâ si mavis) Botanicâ sub auspiciis serenissimi principis Galtonis Franciæ: qui in re Botanicâ fuit peritissimus, omnium Stirpium, diligentissimus scrutator, & oculatissimus observator. Sed ut tibi satisfiat, redeo ad Gal- lum nostrum Botanicum, Dalechampium: fateor Dalechampium fuisse Medicum insignem, & perdoctum Botanicum. Quin & opera ejus, Botanicis multùm profuere: sed quod ut plurimùm mortalibus contingit; ipse præmaturâ morte abreptus, chartas suas & Icones à Mattheoli, Lobelii, Dodonæi, & Clusii hæredibus; suis sumptibus emptas, & collectas: in musæo suo, post se reliquit. *Soc.* Quomodò ergò prodiit in lucem historia illa Lugdunensis? *Botan.* Paucis id tibi perstringam: Hæredes ejus aliquot post mortem annos, cum Typographis lucrum faciendi avidi; ipsis pretio. & chartas & Icones prædictorum Authorum vendidêre. Typographi autem, rem totam Medico cuidam (istius oppidi) dicto Molinæo, commisêre. Hic cum Typographis, aut saltem eorum crumenâ consultans, talem, qualem præ manibus habemus, historiam Lugdunensem

G g

edidit.

edidit. Primò Latinè, deindè Gallicè, & in duos Tomos, in folio distinxit: Utraque editio est vitiosa & depravata, ut colligere potest quivis; ex animadversionibus Caspari Bauhini in historiam Lugdunensem, ubi quingentæ plus minusve plantæ, bis terve reperiuntur. *Soc.* Animadversiones, Casp. Bauh. in historiam Lugdunensem vidi, ipsamque historiam perlustravi; & gravitè Authorem, Molinæum sic à te designatum, hallucinatum esse observavi: sed ad propositum redeamus. Quid dicis quæso, de methodo Dalechampii? *Botan.* Est nulla, aut saltem parùm idonea, ad methodicè plantas discendas. *Soc.* At ego (ni fallor) aliquam observavi methodum, & ut puto à locis natalibus, seu natalitiis desumptam. *Botan.* Æquum dicis. Oblivioni tradideram; sed jam revoco in memoriam. *Soc.* Sed quid tu de ista methodo sentis? *Botan.* Est planè ex meà sententià rejicienda. *Soc.* Quare? *Botan.* Quia plantas per natales (ut plurimùm) seu natalitia loca disponit: Et ego libentè à te peterem; quid quæso debet impellere vel mediocritèr Botanicæ rei scientem, disjungere Ranunculum à Ranunculo: an quia quidam crescunt
in

in summis Alpium jugis & Pyrenæis montibus, alii in sylvis, sive annosis, sive cœduis, alii descendunt ad prata & loca campestria; novalia & arva scilicet; alii denique in palustribus & aquosis locis proveniunt: Sed cum omnes habent tesseram seu symbolum Ranunculi, debent simul disponi in unâ aut alterâ Tabulâ cognationis. *Soc.* Quid tu vis, per tesseram .s. symbolum? *Botan.* Ego per tesseram intelligo notam Genericam, & essentialem; toti Seriei Ranunculorum convenientem, ubicunque locorum crescentium. *Soc.* Quænam est nota essentialis Ranunculorum. *Botan.* Est habere florem ex quinis, ut plurimum (Asiaticos excipio, qui à luxuriante naturâ sex, septem, octo; nunc plura, nunc pauciora producant) petalis conflatum; eidem flori, succedit, racematim, aliquando orbicularitèr, aliquando longitudinalitèr, spica; ex seminibus compressis, acutis compacta. *Soc.* Jam intelligo quid sit nota Generica hujus longè patentis generis: ego nunquam hoc observavi ante hanc tuam deductionem; sed in pratis & sylvis, imò in hortis ipsis suburbanis, diligentius impostèrùm observabo. Unus mihi restat scrupulus, qui

me malè habet, de temperamento Ranuncu-
 lorum. Suntne omnes calidi, & causticæ
 facultatis, quod nobis innotuit primò (nisi
 me animus fallit) ex Mendicis publicis, qui
 Ranunculum foliis, tibiis applicatis, exu-
 unt cuticulam seu epiderma; imò nonnun-
 quam cutis ipsius & muscutorum magnam
 partem, eamque ulcerant, ad prætereuntium
 movendam commiserationem, & ad vilem
 stipem seu Eleemosynam obtinendam? *Bo-
 tan.* Hoc lippis & tonsoribus notum: hoc
 præstant viles animæ; Mendici: Confiteor
 maximam Ranunculum partem, esse cau-
 sticâ facultate præditam, sed non omnes.
Soc. Qui sunt illi, qui non sunt calidi? *Bo-
 tan.* Ipsæ Authorum denominationes hoc tibi
 indicant, ut Ranunculus Holeraceus, Ra-
 nunculus dulcis Tragi, Ranunculus Muscha-
 tella, dictus, &c. advocetur gustus in opem.
Soc. Ego constantèr asseveravi, causticam fa-
 cultatem fuisse de essentiâ omnium Ranun-
 culorum. *Botan.* Contrarium vides, & ego
 Anthoram, quamvis contrariam habeat vir-
 tutem (si credendum est veteribus scriptori-
 bus) ex Aconitorum genere, à flore Cuculla-
 to, & Thecis membranaceis, seminibus An-
 gulosis

gulosis, subrotundis, asperis (aliorum Aconitorum more) esse concludo. Quin & insuper, si bene observaveris, Delphinium, aut Consolidam regalem, per eandem rationem, Aconiti ferre tesseram, percipies: & ideò ego sic Tabulas cognationis .s. affinitatis construendas suscepi, sequendo ductum naturæ, solâ naturâ monstrante mihi methodum & viam; à fine ultimo petitam. Videlicet fructificationis similitudine, ut prolixius alibi ex me audies, ut plenè satisfiat tibi: secundam, adferam in medium instantiam. An tu liberè disjungeres Lapathum aquaticum, seu Hydrolapathum, à Lapatho diversi generis suburbano, aut montanum, seu Lapathum Monachorum, ab utroque prædicto genere, Lapathorum? Quia in montibus celsis Alpium provenit: sicut Rhabarbarum in Thraciæ montibus altis. *Soc* Quid, tu Rhabarbarum statuis Lapathum itidè? *Botan.* Nil aliud est *κατ' ἕξιν*, quàm omnium Lapathorum optimum. *Soc.* At Casp. Bauh. disjungit & per se collocat, nec in medium producit aliquem Authorum .s. veterum .s. Neotericorum, Lapathum appellantem: Sed ab omnibus Rha, & Rhaponticum seu Rhabarbarum dicitur.

Botan. Ego nunquam essentiam plantarum, desumendam ab Authorum denominatione putavi, sed à florum formâ, & seminum conformatione: vide pag. 117. Col. II. Pl. V. in hallucinationibus Casp. Bauhini à nobis exhibitis, præludiorum Botanicorum nostrorum, parte secundâ: Et videbis quam confusè Casp. Bauh. digerit capita illa duo de Lapatho, & Rha ejusque speciebus. *Soc.* Ergò tu concludis, Rhabarbarum esse Lapathum, à fine ultimo, id est, similitudine seminum triangularium, ut sunt omnium Lapathorum, semina triangularia. s. triquetra, rubra aut nigra. *Botan.* Quid ni? noli quæso de hoc dubitare. *Soc.* Potestne alias dare instantias? *Botan.* Centum, imò sexcentas si velis. *Soc.* Aliam audire libentèr velim. *Botan.* Nostine vulgarem & putidam illam plantam (ejusq; species varias) quæ Atriplex dicitur? *Soc.* Nihil meliùs. *Botan.* Nondumne percipisti à semine; duo esse ejus genera; ab Authoribus nunquam (ante me) observata? *Soc.* Hoc me latet. *Botan.* Ego paucis tibi apperiam: primò, si observasti Atriplicem hortensem, rubram & albam; semina spicatum producit, in summis caulium, singula, bi-

nis

nis foliolis inclusa. *Soc.* Quid tùm sequetur?
Botan. Observa in fimetis & stercolinis fossif-
 que suburbanis, Londinum circumjacenti-
 bus, esse plures hujus generis species sub-
 alternas; quæ habent semina singula binis
 foliolis inclusa, ut *Atriplex folio hastato* .s.
Deltoïde, in horto *Regio Blesensi* aucto; e-
 tiam *Atriplex Polygoni folio*, *Halimus* seu
Portulaca Marina, sic *Authoribus* denomina-
 tæ; Sunt veræ & genuinæ *Atriplicis* spe-
 cies, quemadmodum *Atriplex Halimi folio*:
 quia hæ novissimæ *Atriplicis* species ad o-
 ram maritimam, aliæ prædictæ in fimetis
 & *Stercoratis* suburbanis locis, aliæ priùs
 dictæ in hortis cultis proveniunt; nonne de-
 bent ibidè digereri seu collocari, quondo-
 quidem eandem gerunt tesseram; seu notam
 essentialem? *Soc.* Do manus, jam abundè
 mihi satisfactum esse puto de methodo de-
 pravatâ *Dalechampii*; atque uno verbo ve-
 lim aliquid mihi dicas de methodo *Parkin-
 soni* nostri, qui satis ingentem farraginem
 plantarum, omnium *Authorum* antè se scri-
 bentium, in magnum volumem congeffit
 compilavitque. *Botan.* *Parkinsonum* labo-
 riosum fuisse senem, multa que transcripsisse

fateor, quin & numerum auxit; sed magis confundit genera plantarum quàm quivis, dum novam vult (ex proprio cerebro) cedere methodum. *Soc.* Quomodò hoc quæso demonstras? *Botan.* Observasne ipsum à plantarum seu stirpium viribus vel facultatibus, classes suas desumpsisse. *Soc.* Atquæ hæc videtur mihi optima methodus. *Botan.* Est Medicis aliquomodò utilis & necessaria, sed non est à naturâ desumpta; non est de essentiâ primò & principalitèr plantæ; purgare, necare, .s. occidere, calefacere, aut frigefacere, &c. sed secundariò & accidentalitèr, ut clariùs tibi alibi ostendemus. *Soc.* Ego omnes purgantes, simul collocatas, optimam semper putavi methodum, pro istâ saltem classe. *Botan.* Ne multis verbis tempus teramus; Vis ut uno verbo dicam? quod sentio repugnat methodo naturæ & per consequens nostræ, per Tabulas cognationis digerendæ, & ut capias faciliùs quod propono, libenter à te peterem, quam affinitatem habet Rhabarbarum, seu Rhaponticum quod Lapathum supra (si memor es) à fine ultimo, scilicèt fructificatione, clarè satis fuisse demonstravi: quid inquam affinitatis habet Rhabarbarum, cum scammo-

niâ

niâ Antiochena, quæ est Convolvulus? Ob
 usum succi lactei, qui ex eodem manat. Qui-
 que diagredium post præparationem dici-
 tur: Est per excellentiam, omnium Convol-
 volorum præstantissimus: aut dic mihi. Cucu-
 mis Asininus, ex quo Elaterium Medicorum
 antiquorum extrahitur; secundum methodũ
 naturæ, nil habet affine cum prædictis stirpi-
 bus? Fateor quod eum Colocynthide, & à
 naturâ, & à virtute disponi debet: Deindè
 vide differentiam Tithymalorum, Esulæ, &
 coet. (id genus) aliarum, tricoccarum lactes-
 centium, à Jalapio, Senna, Tamarindo, Casia.
 Quæ cū prædictis & postea nominandis, nul-
 lam habent inter se connexionem, si exacta &
 omnium perfectissima methodus naturæ con-
 sideretur: purgare enim hisce nominatis, &
 multis aliis in observationibus nostris gene-
 ralioribus, ex horto Regio Blesensi aucto col-
 lectis; hisce inquam purgare accidentalitèr
 datur à naturâ. Ita secundariò .s. accidenta-
 litèr à purgante facultate possunt omnes hæ
 ad unam classem reduci; sed ex Libro naturæ,
 habitâ ratione finis ultimi, scilicèt fructifica-
 tionis; toto Cælo differunt. Quod non te-
 jam potest latere, post tam proximam, de hac
 re,

re, ratiocinationem. *Soc.* Video & concedo novam illam Parkinsoni, non veram & genuinam (secundum naturæ intentum) esse methodum : properemus ad alios ; ne dialogus in immensum excrescat. *Soc.* Quid dicis quæso de magno illo volumine duobus Tomis immensis, distincto ? Quod, hort. Eyst. nuncupatur. *Bot.* Laudo liberalitatem istius Episcopi magnoperè, qui tantum impensarum liberè fecit ; ut publico prodesset. Nullus inquam, Icones omnes, æri tam affabrè & elegantè insculptas (heu nimis tamen magnas) tam gloriosè & sumptuosè edidit. *Soc.* Sed ad rem : Quid dicis de methodo ipsius Bessleri ; qui Librum compilavit ? *Botan.* Vis ut apertè loquar ? Quod sentio, nosti (si benè meministi) Besslerum compilatorem, seu directorem, prædicti Libri ; per anni quatuor tempestates, plantas suas digessisse : ut cupictoribus, prædictum Librum evolventibus & intuentibus plus prodesset, quam Botanicæ scientiæ, studiosis. *Soc.* Certè Icones istius Libri, seu hort. Eyst. (si mavis) elegantè sunt designatæ & sculptæ, & pro proportione plantarum quarundam minorum : Sæpè reperitur nimis magnæ. Insuper fateor Librum

brum illum principum & magnatum musæis, & acupictorum seu acupicticum, cubiculis valdè esse necessarium. *Botan.* Utinam haberem ego talem patronum, ego methodum naturæ, de quâ suprâ diximus suppeditarem & patronus designatores, & sculptores conduceret & pretium persolveret. *Soc.* Ego id cordicitus optarem, & optare debent omnes quotquot in Europâ extant Botanicæ rei amatores. Sed quid dicis de Matth. Medico Italico, nullamne ille proposuit methodum? *Botan.* Ille & multi alii suo tempore, Coætanei Botanici, similitudinem foliorum .s. partium accidentalium ritè, & attentè observantes, plantas multas ad eandem classem reduxère, quæ aliò à nobis sunt relegandæ. *Soc.* Tu appellas folia, partes accidentales stirpium? *Botan.* Sunt tantum; quemadmodum radix, Fibræ .s. Nervi, caules: cur non folia? Hoc ego paucis deducam, radix ex terræ superficie, tanquam matrice, attrahit nutrimentum seu alimentum, caules vehunt ad omnes partes, per ductus illos sive canales, qui Fibræ .s. Nervi dicuntur; folia arcent calorem & frigus: ergò per accidens omnes inserviunt productioni seminis; ejusdemque perfe-

perfectiōni. *Soc.* Cui usui data sunt folia, præter ad arcendum frigus & calorem, & ad Dod. ductum .s. vehiculum Nervorum per omnes partes plantæ. *Botan.* Inserviunt ad subalternas species constituendas etiã, aliquando multa genera intermedia designantur ab accidentali à similitudine foliorum. *Soc.* Certè ego, certum indicium Genericum à similitudine foliorum peti existimavi. *Botan.* Et ego hoc observavi in multis Authoribus scribentibus aliquot abhinc annis, imò non ita pridem, in Libro quodam ab Authore, vestri Collegii Socio edito, in quo exhibetur methodus, per Tabulas, disponentes classes plantarum, à similitudine foliorum, sumptarum. Ego tantum confusum Chaos: illic, de plantis legi, nec quicquam didici, ut monstrabo tibi & lapsus & confusionem, aliàs. Quia degrediendum nunc, non est. *Soc.* Ego vix clarè percipio quid tibi vis dum folia non vis, inservire ad digestionem plantarum? *Botan.* Ego nunquam hoc dixi; sed audi attentè non inficias eo, folia multùm conferre ad species intermedias denominandas, sed non ad Genericam, & essentialem assignandam notam. *Soc.* Clariùs velim te temetipsum

sum exprimere. *Botan.* Quandoquidem exempla clarè docent, quædam adferam, in medium: quæ te convincent, plantas, non denominari debere à primo intuitu, seu conformatione foliorum, ad se invicem. *Soc. Adfer* quæso in medium exempla illa tua. *Botan.* Audi ergo attentè. Observastine in citatione Authorum apud Casp. Bauh. complurima Ranuncolorum genera subalterna, ab accidentalibus (foliis scilicèt) partibus, desumpta, ut exempli gratiâ, Ranunculus Gramineis foliis, apparet Botanicis non mediocritè versatis in arte: Gramen sub pedibus: sed simulac florem Mense Junio produxerit luteum, quin is petalis conflatum, & semina Ranunculi in modum; Nemo dubitabit ipsam illam plantam esse Ranunculi speciem, ipsamquè nominare Ranunculum; & ut multa paucis comprehendam, observa mecum: Ranunculus Plantaginis folio, Ranunculus Rutæ folio, Ranunculus Beupleuri folio, Ranunculus Thalictri folio, Ranunculus Aconiti folio, rotundo folio & dissecto folio. Antequam maxima pars horum floreas semenque produxerit, non debent nominari à primo intuitu foliorum, per terram stratorum,

ruta, ne primus pro Gramine, secundus pro
 Plantagine, tertius pro Ruta, quartus pro
 Thalicthro habeatur, & ita deinceps: sed se-
 cundario à similitudine foliorum, ad species
 subalternas determinandas; ergò clariùs, jam
 luce meridiana, vides notam Genericam
 nunquam desumi à similitudine foliorum, sed
 (ut antè à me dictum) diversas species eju-
 dem generis constituit, diversa foliorum si-
 militudo seu facies. *Soc.* Video clarè & per-
 spectè in hoc genere, videlicèt Ranunculo-
 rum: Folia tantum per accidens & secunda-
 rio (quoad formam & figuram) inservire ad
 species designandas; sed an hoc contingit
 passim in omnibus, plantarum generibus?
Botan. Passim, ubi numerosæ sunt species ut
 hic. *Soc.* Sed dantur ne plures species inter-
 mediæ diversæ, sub diversis omnino generi-
 bus, quæ folia habent conformia, & à se in-
 vicem vix cognoscibilia. *Botan.* Ausculta
 paucis, attentissimè observabis mecum. Mil-
 lefolium Tanaceti foliis; flore purp. & alb. &
 Erucam Tanaceti foliis: Utraque notatur à
 me non scripta, in horto Regio Blesensi au-
 cto, Tanacetum inodorum Bauh. in Pin Bel-
 lis Tanaceti folio nobis: Hæ tres plantæ, notæ
 Gene-

Generica & essentiali, toto Cœlo differunt, à fine ultimo petitâ. Sed hæ tres plantæ, dum primo è terrâ pullulant, & antequam caulescant: intuendo, acutâ acie oculorum; propter conformitatẽ (alarum Rachi seu Nervo medio adhærentium & dissectarum) in foliis, non possunt facilè distingui; sed paulatim caulescente primâ plantâ, & florente, semenque postquam ad maturitatem produxerit eadem: Millefolium, Tanaceti foliis sese declarat, sumendo denominationem, à nobiliori parte, sine ultimo scilicèt, & folia alata dissecta, Tanaceti adinstar designant, pro quâ specie Millefolii, haberi debet. Secunda paritèr planta, ad flores vergens, sese tetrapetalam & siliquosam prodit: addè acrem & calidam qualitatem, si Masticetur; gustusque vocetur in opem; Eruca statim apparet: folia Tanaceti instar inserviunt ad spècificam hanc Erucæ speciem designandam. Tertia florens, Bellidis adinstar, discum fert luteum, quem cingunt, circularitèr seu stellatim, lata alba folia; unde Bellis Tanaceti folio dicitur: eam denominando à parte essentiali; flore videlicèt, aptiùs ad genus Bellidum à me reducitur; & folia

Ta.

Tanaceti in modum, constituunt specificam
 ejus Bellidis notam. *Soc.* Jam tandem per-
 cipio folia non esse de essentiâ plantarum,
 ex exemplis satis ingeniosè à te allatis. *Bo-
 tan.* Gaudeo me nullam posticam dubio tuo
 reliquisse. *Soc.* Quid dicis de methodo Joh.
 Bauhini, qui historiam universalem, planta-
 rum seu Stirpium in tres Tomos digestam,
 scripsit? *Botan.* Vis certè ut ingenuè fatear,
 quod res est; omnium Authorum, ante se
 scribentium, optimam reliquit methodum.
Soc. Nihilne corrigendum aliis reliquit? *Bo-
 tan.* Imò multa, ut videbis ex animadversio-
 nibus meis in historiam universalem ejusdem
 Joh. Bauh. ibi multa transpono, diruo gene-
 ra; alia de novo creo & constituo; denique
 omninò novam condam & componam me-
 thodum, meliorem, facilioremque. Quâ,
 plus addiscet methodicè. Botanicus discendi
 cupidus; biennii spatio, quam ego ad de-
 cennium didicerim. *Soc.* Utinam eandem
 præ manibus haberemus, & optarem tibi
 publicam Cathedram, ex quâ, tam vivâ vo-
 ce; indoctos præsentis doceres, quàm scrip-
 tis è longinquò doctis scriberes. *Botan.* Ego
 me semper divinæ providentiæ me commisi,

&

& adhuc idem præsto. *Soc.* Quid tibi videtur de prolixitate Johannis Bauh. in describendis aut potiùs transcribendis, aliorum Authorum plantis. *Botan.* Tediosum ipsum puto in hoc, ipsumque dum dicta & scripta aliorum, in medium producit; citando dicta, & allegando scripta Mattheoli, Fusch. Lob. Dod. Clus. & cæterorum tam, veterum quam Neotericorum scriptorum, in tria immensa volumina seu (si mavis) tres Tomos, ejus Historia universalis accrevit. *Soc.* Sed quid quæso emolumenti advenit, Reipublicæ Botanicæ; dum tantam molem seu farraginem, dictorum Authorum in in tam vastam historiam congeffit. *Botan.* More Germanorum & Teutonum, ut se laboriosum & diligentem indefessumque collectorem, seu compilatorem posteris monstraret seu exhiberet. *Soc.* Te verum dicere passim observo & in hoc tibi assentior: sed tu qui exactiori trutinâ, omnes Botánicos perpendisti; quot quæso addidit plantas, nondùm descriptas, aut non sculptas ab aliis Authoribus Botanicis, scribentibus ante se. *Botan.* Ego nondùm calculum exactè inivi. *Soc.* Proculdubio con-

H h

jectu-

jecturam veram facere potes; & fortasse exactum, etiam plantarum ab ipso edditarum numerum, nobis exhibere potes. Vide Schedulas tuas de hoc recollectas. *Botan.* Nisi me memoria fallit plantæ à solo Johanne Bauhino in Tomo secundo suo, & tertio, figuratæ, non excedunt centum, septuaginta tres. *Soc.* Exhibeas quæso easdem nominatim cum pag. ipsius Tomi primi, sive secundi, sive tertii. *Botan.* Quid hoc proderit Republicæ Botanice; & quod non amo, in aliis, sed vitupero; committam ipse: Hoc est ut appertis verbis tibi dicam, transcriberem. *Soc.* Est notare tantum quot accessere ab ipso Bauhino tanto operi, quod quinquaginta annorum fuisse, ipse asserit. *Botan.* Forte morem geremus amicis tuis precibus. *Soc.* Sed si recte impræsentiarum recordor; dum cederemus sermones Botánicos, nos, inter nos: Tu certio rem me fecisti, te habuisse plantas non scriptas; cuiquam Authorum; ducentas quinquaginta. Quarum nobis destinaveras succinctam, & curtam delineationem. *Botan.* Hoc hætenus; in præludiis meis Botanicis præstiti.

præstiti. *Soc.* Ego plurimi facio, Enchiridium tuum Botanicum, Manuale continens præludiorum Botanicorum tuorum, partem primam, & alteram. *Botan.* Fortè plus emolumenti & voluptatis ex lectione hujus Libelli, Botanicæ rei amatoribus & reverâ studiosis proveniet. Quam ex tediosorum prædictorum ingentium voluminum contemplatione & evolutione, quæ nauseam etiam ingeniosis lectoribus (expertus loquor) pariunt. *Soc.* Omittamus prædictos omnes prolixos transcriptores, & accedamus ad Casparum Bauhinum, quæ est tua sententia de Pinace suo. *Botan.* Plus ille laboravit quàm omnes suprà citati Authores. Nomina omnium Authorum, Stirpes diversimodè nominantium, in medium producit; ipsos concordare facit. Quod non minimum præstitit: ad evitandam confusionem ex multiplici Nomenclatura Authorum, enatam. *Soc.* Sed de ejus methodo, in digerendis plantis: tuum judicium tua existimatio valebit. *Botan.* Vide hallucinationes Casp. Bauh. in Pin. in præludiorum Botanicorum meorum parte posteriore; Ibì observo ipsius hallucinationes

nationes in Pin. tam in denominandis, quam digerendis plantis, ubi diruo, ædifico genera; muto genera cum generibus, de his consule locum citatum. *Soc.* Utinam haberemus ad manum tuam methodum promptam; designatam & impressam quâ instructi, methodicè possimus plantarum seu stirpium, addiscere affinitates seu cognationes. *Botan.* Brevi, si Deus dederit & Mœcenas sese obtulerit, (per me non stabit) habebitis. *Soc.* Unde tu hanc methodum didicisti, quæ non reperitur apud omnes prædictos Authores. *Botan.* Ex Libro naturæ. *Soc.* Quid tu appellas Librum naturæ. *Botan.* Ego appello Librum naturæ, id quod omnibus innotescet. Quam facillimè postquam præludia mea diligentèr evolverint, & historiam universalem plantarum seu stirpium meam methodicè dispositam; viderint. *Soc.* Quid intelligis per methodum universalem. *Botan.* Ego intelligo novam methodum per Tabulas cognationis, seu affinitatis disponendam. *Soc.* Quid tibi vis per Tabulas cognationis seu affinitatis; nunquam ego legi de tali methodo apud Authores. *Botan.* Nec ego:

ego: ergò non esset nova; etiam si fuit ab incunabulis mundi (ut imposterùm audies) sed nemini adhuc detecta ante me: & neutiquàm dubito, quin illa methodus, & tibi & aliis omnibus φιλοσόφους; (ubicunque locorum viventibus) satis grata futura sit. *Soc.* Valdè cuperem eandem illam methodum videre, & optarem, ut ex tuâ Pharetrâ illa sagitta, à tot & toties expedita, exiret. Nam sæpiùs tecum inivi colloquium, de arte nostrâ Botanicâ; satis adhuc ut video confusa: Aliquid ex te aliàs hausi, utinam & mihi & Publico ubique terrarum, brevì proficias; sed dum recordor, & ne mente excedat, Mattheolus Italus ille Medicus, qui confusam edidit plantarum historiam, multa appinxit falsa arboribus ut ipsas congruere faceret, cum antiquorum descriptionibus. *Botan.* Hoc non me latet, sed quod magis miror: Imperatorem, Reges & Principes, & magnates omnes, totius penè Europæ, contribuentes habuit, hæc ipse jactitat in Præfatione Libri sui. *Soc.* Utinam Reges & magnates hujus sæculi, Chalcographorum, & Typographorum labores, tuosque com-

H h 3 pensarent;

penfarent; ut methodo illâ novâ, & in-
 auditâ; à naturâ datâ: Et à te folummo-
 do (citrà jaçantiam) obfervatâ: fruere-
 tur, totus terrarum orbis; ut in arte Bo-
 tanicâ, quondâm Italia, Germania, Gal-
 lia gloriatæ funt; fine methodo. Itidêm
 nobifcum, cum methodo, gloriari Britan-
 nia noftra poffit: Jam tandem unam à te
 fciscitarer quæftionem; antequam dece-
 das: plantæ poffuntne fine femine; aut
 fatione feminis, provenire, fponfe è vi-
 fceribus terræ, tanquam ex matrice. *Botan.*
 Jam grandem mihi proponis quæftionem
 quæ anxios, & ad folutionem tardos
 reddere potefit, & focios Parifienfes & Lon-
 dinenfes; imò vexaret fortaffis, focios
 Lyncæos Romæ olim viventes. *Soc.* à te
 hanc nunc expoftulo, tu qui tot femina
 collegifti, feminafti, recondidifti in promp-
 tuario tuo feminario; ex horto Regio
 Blefenfi: totius Europæ, non ita pridêm,
 fub obitum principis, Mœcenatis ipfius;
 refertiffimo: Earundem omnium ftirpium
 (quotquot illic femina; tulere) dicis te
 habere bis Mille quingentarum vegetan-
 tium femina. Iterùm, jam ad rem; putasne
 tu

tu tellurem, tanquam ex propria matrice, plantas sine semine aut satione producere?

Botan. Certè lupum auribus teneo, an laterem lavabo, an oleum & operam perdam mihi adhuc incertum. dicam tamen quod sentio. Primò exordiamur à divinis oraculis, ubi affirmant in Genesios cap. I. versibus 11, & 12. producat terra Gramina, & herbas reddentes semina sua: & Arbores ferentes fructus secundum earum genera seu species, continentes in se semina, vidit Deus quod hoc fuit bonum, &c.

Soc. Ex hac citatione divinæ Scripturæ innuere videris: omnia vegetantia seu stirpes seu Arbores ex proprio semine, à Deo, tertio die creata produci; in sæcula, sæculorum, ad finem mundi: Ex diversorum tam generum, quàm specierum, diversis seminibus à Deo datis, provenientium.

Botan. Hoc ego ità intelligo & longâ experientiâ edoctus, observavi, à minimâ plantulâ, seu Graminis herbâ (ut cum Virgilio loquar:) usque ad Libani Cedros. *Soc.* Sed multæ conspiciuntur plantæ, quæ spontè proveniunt sine flore, capsulâ seminali. *Botan.* Ego fateor plurima esse genera & in-

finitas species (si ita loqui licet) sub ipsis
 contentas, quæ ex mixturâ salis, & sulphu-
 ris è terra aquavæ producuntur, sponte &
 sine semine; ego autem, has omnes imper-
 fectas appello plantas vegetantes. *Soc.*
 Quas tu appellas perfectas; quas imper-
 fectas. *Botan.* Perfectas appello quæ flo-
 rent; capsulas producunt seminales, &
 semina inibi contenta. *Soc.* Jam capio
 quid velis, sed unum à te peterem. Capil-
 lares omnes, ut Phyllitis, sive Scolopen-
 dria, asplenium, Coterach, Ruta muraria,
 Polypodium & Filices omnes, cæteræque
 (id genus) aliæ: suntne perfectæ plantæ?
Botan. Imò sunt, quia habent flores (qui
 fugiunt quasi obtutum) & semina, quasi
 pulvisculum in dorso alarum. *Soc.* Hoc
 tu appellas semina: Capillarium, & earun-
 dem familias. *Botan.* Quidni appellarem,
 & quemadmodum non omnis fert omnia
 tellus. Idem hoc semen si aquosis & um-
 brosis sylvis, vetustis muris aqua riguis
 committatur, pullulat, producitque sui ge-
 neris plantam: Si propriam sortiatur ma-
 tricem. *Soc.* Quid tibi videtur de junco,
 an est planta perfecta. *Botan.* Perfecta
 certè

certè omninò, nam floret & semina (ut plurimum) triangularia producit. *Socius*. Collegistine unquam junci semen. *Botan.* vigesimè, & habeo penes me in promptuario meo seminali, dena aut duodena distincta, juncorum seminum genera; aut si mavis species appellare, per me licet. *Socius*. Hoc ego nondum adverteram. *Botan.* Hoc clarè tibi demonstrabitur quando velis. *Soc.* quas quæso, appellas tu imperfectas plantas? *Botan.* quæ (ut supra dixi) sponte sine semine proveniunt: ex quadam commixturâ salis .s. fixi .s. volatilis, sulphuris; junctâ terrâ ruderosa, stercorali denique, aut aquâ stagnante, vel fluente; & in motu perpetuo ut marina, vel fluviatili: seu dulci fontali. *Soc.* Recense quæso quædam imperfectarum plantarum genera, si lubet. *Botan.* In superficie terræ maxima pars omnium muscorum, sive in sylvis annosis, sive densis & umbrosis, sive in vetustis arboribus, muris antiquis, casularum tegumentis aut Lapidum saxorumve superficiebus crescentium. *Soc.* Ergò, generalitèr (ut percipio ex te) omnes musci sunt plantæ imperfectæ. *Botan.* Ego hoc

hoc non affero. *Soc.* An dantur musci qui florent & semen suum perficiunt. *Botan.* Etiam plurimi ut polytrichum utrumque, majus & minus Apulei. Muscus clavatus, muscus abietinus & multi alii, quos in sylvis annosis & umbrosis observare licet: lichen piliatus, stellatus itidem. *Soc.* Ego hoc observabo exactius. *Botan.* Fac quæso. *Soc.* Quid dicis de fungorum Clusii ingenti catervâ. *Botan.* Sunt excrescentiæ terræ: (sive sunt edules sive lethales) nec semen nec florem habent sed sponte noctè unâ aut alterâ è terra emergunt; ex quadam commixtione Salis, sulphuris, junctâ terræ pinguedine ex stercore quadrupedum orta. *Soc.* Ego hæc omnia vera esse persuasum mihi satis habeo: & est consentaneum rationi; Sed quid inferis de tuberibus terræ. *Botan.* Tubera terræ in gremio terræ superficiali producantur sponte: sine radice, caule, fibris, aut foliis. *Soc.* Quomodo augentur aut ad talem magnitudinem crescunt. *Botan.* Per juxtapositionem: ut minera, & lapides terræ. *Socius.* Sit ita: Non reperiuntur hic in Anglia. *Botan.* Neutiquam, nec in borealibus

bus Galliae tractibus. *Soc.* Nunquamne reperisti in meridionalibus tuis peregrinationibus, sub auspiciis serenissimi principis Gastonis Franciae. *Botan.* Etiam in agro pictaviensi, Burgundia, quin & Galloprovincia, & Gallia Narbonensi reperiuntur, frequentér. *Soc.* Quomodo deteguntur? *Botan.* A porcis sive suis. *Soc.* Participem, me fac hujus venationis tuberum. *Botan.* Paucis tibi dicam, instinctu quodam naturæ, porci sive sues odoratu superficiale[m] terræ partem, detegunt; & statim terram evolvunt quoad appropinquant ad tuber ipsum, & statim subulcus accurrit, & abigit pedo aut baculo suo pastorali, porcum; & lævissimo labore colligit tubera: Ecce habes quod vidi, in agro pictaviensi & habui ex relatione subulcorum aliorum. *Soc.* At ut ego audivi valdè avide expetuntur, à magnatibus Galliae, Italiae, qui Embammatis variis, gulam irritantibus utuntur. *Botan.* Ita est. *Soc.* Sed quid tibi videtur Corallum & Pseudocorallum & ejus generis aliæ complurimæ, maritimæ in fundo maris vegetantes, dum in loco nativo sunt; adhuc sunt

sunt molles ; sed extra mare durescunt & colorem mutant. *Botan.* Idem mihi dicendum videtur, quod de diversitate numerosa, fucorum marinorum ; (si mavis algæ marinæ) qui omnes crescunt in fundo maris , & tempestatibus, propriis sedibus avulsi : Ad oram maritimam ejiciuntur multifformes, & diversarum proportionum. Præcipuè hyemali tempore, versus oram maritimam, Borealium regionum.

Soc. Ego multas facie diversas fucorum marinorum species, nunc penes me, in musæo meo habeo ; tibi in hoc accedo : puto certo certius, has omnes sive algæ, sive fucorum marinorum species, esse plantas maritimas imperfectas : Quandoquidem, nec florent nec semen producunt. *Botan.* Si non longè fallor ; sunt & plantæ imperfectæ in fluviis & fontibus aliisque rivulis.

Soc. Benè observas ut conferva, lenticula & ejus generis aliæ multæ aquaticæ, aquis innatantes sine flore, sine semine : Jam abundè mihi satisfactum puto ; de imperfectis plantis, tam terrestribus, quam aquis marinis, sive dulcibus, stagnantibusve innascentibus ; sed quoniam advesperascit :

&

& tu longè hinc distas, putasne plantas perfectas, spontè & sine semine produci posse, in locis ubi semen nunquam fuit factum? *Botan.* Suprà si satis meministi, hanc quæstiunculam examinavimus, & firmitè credidi, quod tibi hæctenus asseveravi, & certè sæpè sæpiùs affirmavi, constantè: serenissimo principi Gastoni Franciæ Domino, Domino meo (dum in vivis erat) colendissimo: Et proh dolor! dum jam est mortuus, nunquam fatìs mihi deplorandus. Vivus, sæpè sæpius, nos colligere fecit plantas omnes, quæ è rimis lapidum, quibus tegebatur palatium, Regia Chambort, dictum. Multæ fuerunt pappescentes illic vegetantes; ut Senecio, Jacobæa, Conyza acris cœrulea, Lactuca sylvestris, & complures species Hieracii, Dens Leonis, &c. (id genus) aliæ papposæ multæ, quas omnes non mirabar, illuc à semine per aera volitante, dilatas fuisse: Sed & plantas complures, solida gerentes semina, illic promiscuè reperimus, ut Lapathum, Cerasum arbusculam, Prunum, rubum utrumque, & Rosam sylvestrem. *Soc.* At undè venère ad tantam altitudinem illa solida semi-

semina? concedo pappescentia semina, per
 aerem volitare, & in altum attolli; &
 longè latèque portari posse: sed quomodo
 solida illa & quodammodo gravia, semi-
 na; potuerint illuc volitare, nondum ca-
 pio. *Botan.* Ego paucis meam opinionem,
 notam tibi faciam: Pluriès observavi, in
 altis & vetustis turribus, Campanilibus-
 que Templorum, arbusculas imò Arbores,
 è fissuris sive rimis lapidum crescentes. E-
 go puto nucleos (si fuerunt nuciferæ) glan-
 des (si fuerunt glandiferæ) aliaque supra-
 citata, solida semina ab avibus talia loca
 frequentantibus, fuisse translata, in rimas
 lapidum fortè fortuna eadentia, aut ab avi-
 bus illie dormientibus, & noctu quiescenti-
 bus evacuata, germine intacto, seu inconco-
 cto pullularunt: atque hoc de aliis semini-
 bus omnibus, in talibus convenientibus lo-
 cis, asserere audactè, tibi audeo. *Soc.* Habet
 umbram rationis, sed non plenè mihi sa-
 tisfacit, illa tua ratio: Progrediamur ad
 illam relationem tuam; quam ex te domi-
 meæ, superiori anno audivi. *Botan.* Quæ-
 nam fuit illa relatio. Oblivioni tradidi,
 nisi mihi in memoriam revoces. *Soc.* Fuit
 obser-

observatio de conflagratione seu incendio, totius Europæ, Emporii celeberrimi Londini scilicet: Majoris, saltèm ditioris ejus partis. *Botan.* Jam subit animum & eandem iterùm paucis tibi perstringam: Si benè meministi, secundo die Septembris, Anno Domini, 1666. incepit incendium illud luctuosum & ad triduum, aut quatrimum duravit. Nec ope humanâ (divinitus evenit, quum non est malum in civitate, quod non fecit Dominus) extingui poterat: Nam Æolus apperto ventorum carcere (ut ita loquar) regnabat: per triduum aut quatrimum illud. Post octomestrem spatium, per rudera ducentorum jugerum, solo æquatatorum, mihi perambulanti versus excambium vetus nunc. Antè illud tempus; Collegium Greshamianum dictum tendenti, in vestigiis, ædificiorum & tectorum, mihi tanta sese objecit copia, Erysimi illius, quod irio lævis Apulus alter Fabio Columnæ dicitur: Et eodem revertens, mensibus duobus post hoc, ad eum densè pullulavit, ut falce quasi Triticum, aut secale demeti potuerit. *Soc.* Quid inde

inde sequetur, unde provenisse tantam copiam istius Irionis? putastu; an à semine seu satione. *Botan.* Quid quæso, te movet ad talem proponendam quæstionem, cum ædificia omnia circa ædem Divi Pauli, & alibi passim in meditullio celeberrimi Emporii Londini, à Mille aut saltèm, aliquot centenis annis: Fuère constructa & tectis conservata. *Soc.* Ergò tanta copia illius seminis, latebat in cellis & cavearum fundis, & soli & pluvix exposita, fructificavit. *Botan.* Unum hoc addam: Ego non sum Plinius, ut ex aliorum relatione mundo imponam, nec Mattheolus ut appingam ea quæ nunquam extiterè: Sed ut vis appertis verbis nec Calamistratis: meum tibi dicam animum. *Soc.* Dicas quæso? *Botan.* Nullum est semen plantæ, quod producit (conservatum quàm diligentissimè) post decennium; perraro post quinquennium: multò minùs post centenos aliquot, & Mille annos. *Soc.* Ergò aliquis semina istius plantæ, per rudera sparsit. *Botan.* Non credo imò, certò scio tantam istius Irionis, seminis copiam non fuisse in tota insula Britannia, imò nec in Gallia: dubito

dubito an in Germania & Italia ipsa; (cujus Neapolis est regnum, ubi frequentèr crescebat tempore Fab. Columnæ) unquam floruit tanta istius plantæ copia, ergò etiam si seminatores fuissent (ex tuâ opinione, post hæc tibi à me auditâ) non poterat tanta copia istius individualis speciei, seminis; à tot Regnis suppeditari. *Soc.* De hoc non multum nunc dubito: Sed quid concludis, sis rationi consentaneus. Unde provenit tanta copia istius Irionis, forte sponte. Sub idem tempus, ibidem vidisti & observasti multas alias plantas, pappescentes, imo gramineas, aliasque diversarum classium. *Botan.* Vidi & attentè observavi. *Soc.* Undè hæc aliæ venere. *Botan.* A semine volatili pappescenti quod potest (ut supra clarè satis docui) ad multa Milliaria, vento transferri, & in altum attolli & ubicunque ceciderit, germinat & fructificat. *Soc.* De pappescentibus non dubito quod dicis, insuper Gramina, densè satis proveniunt; in qualibet terra si negligatur: quare non potest tuum Erysimum, seu Iriolævis Apulus alter in ruderibus Londinensibus, sponte etiam provenire. *Botan.* Non

est par ratio inter Gramina & Erysimum hoc : Quia Graminum semina sparguntur passim ; est omnium vegetantium plantarum, in omnibus regionibus, frequentissima & facilius sese propagat. *Soc.* Est planta tamen perfecta, ex suprâ dictis à te : ergò à semine, multiplicatur. *Botan.* Hoc ego semper credidi, & in hanc horam credo. Unum à te sciscitari velim, putasne hanc plantam, Irionem lævem Apulum Col. à quovis hortulano, aut incola hujus civitatis satam, in ruderibus fuisse. *Soc.* Neminem hujus insulæ primò tam curiosum, secundò nec tanta ejus plantæ seminis, copia instructum fuisse, pro certo ratum & statutum habeo. Quis tam stolidus aut malè feriatuſ homo, si semina ad manum haberet (quod impossibile suprâ demonstratum est) ruderibus ducentorum jugerum terræ, solo æquatorum, committeret. Ergò cum nec à satione, nec à semine, ad aliquot centenos annos in ruderibus latente, produci poterat ; hujus plantæ tanta copia. Unde concludere vis, tantam ipsius multitudinem provenisse. *Botan.* Certè ut supra dixi ex sale partim volatili, partim fixo, salpetro, sulphure

sulphure, & ex terra sive calcosa aut ruderosa & aqua, mixtaque materia, quocunque modo appelles, per me non stabit. Nescio quid mihi persuasum habere debeo, adhuc. Probabile certè est, hanc plantam tam copiosè provenisse spontè; Ut supra dictum fuit. Sed hæc opinio apperit januam ad Philosophastros contemplativos, qui indifferentè credunt cujusslibet generis plantas, Arbores, frutices, suffruticesve, ex terra tanquam matrice, sponte sine semine provenire. Sed hæc opinio (ut mihi videtur) repugnat sacræ Scripturæ, & rationi. Hæc per dialogum inter nos dixisse, impræsentiarum, sat esse puto. Quod restat de hac materia; Sociis virtuosis, Parisiensibus & Londinensibus, viris nobilissimis, clarissimis & Doctissimis (ex quorum numero, te esse scio) discutiendum relinquo. Vale mi Doctissime vir.

FINIS.

Errata in præludiis Botanicis contenta.

Pagina 1. linea 7. lege Abrotanum. p. 5. l. 18. l. nonum. p. 17. l. 13. l. Anthyllis. *ibidem* l. 19. Antirrhinum majus passim. pro ♀ l. ☉. p. 19. l. 6. pro ♀ l. ☉. p. 26. l. 18. l. Halimoides. p. 34. l. 3. & passim l. Buphthalmum. p. 39. l. 2. l. Galactites. p. 46. l. 14. l. Cerefolium. p. 51. l. 16. pro ♀ l. ☉. p. 53. l. 5, & 6. *deleatur* humilis. p. 55. l. 11. pro ☉ l. ♀. p. 67. l. 4. pro ♀ l. ☉. *ibid.* l. 14. l. Doronicum foliis viridibus, subtus lanuginosis. p. 68. l. 2. l. Leucoium. p. 69. l. 5, & 7. l. Elichrysum. p. 77. l. 1. l. rubris. p. 81. l. 4. l. Geranium. p. 91. l. 7. l. Peruanus. p. 96. l. 11. l. Pilosella. *ibid.* l. 17. pro ♀ l. ☉. p. 97. l. *antepenult.* pro ♀ l. ☉. p. 110. l. 4. pro ♀ l. ☉. p. 109. l. 18. l. semine rotundo p. 110. l. 6. Lapathū fidiū instar, l. nobis. Pulchrū sinuatū Bononiense J. B. p. III. l. II. pro ☉ l. ♀. p. 123. l. 22. l. fyl alba simplex. p. 128. l. 10. *del.* ☉. p. 129. l. 1. pro ♀ l. ☉. p. 129, & 130. l. Armeniaca. p. 129. l. 12. l. Aurantia. p. 137. l. 14. pro ♀ l. ☉. p. 145. l. 16. pro ☉ l. ♀. p. 149. l. 19, & 20. pro ἀρούρα. 3. l. 1^a. & 2^a. p. 160. l. 13. l. Virginiana. p. 160. l. 18. l. densis furculis. *ibid.* l. 12. l. Scabiosa. p. 173. l. 16. l. 1^{us}. Clus. & pro ♀ l. ☉. p. 178. l. 2, & 4. l. Moschata. *ibid.* l. 21. l. Pimpinellæ. p. 197. l. 14. l. Sphodylium. p. 270. l. 2. pro ☉ l. ♀. p. 213. l. 2. l. Hybernum. p. 218. l. 6. l. sem nigro p. 231. l. *ult.* l. Androsæmi. p. 243. l. 14. l. Cachryophora. p. 168. l. 8. l. Malacoïdes. p. 171. l. 12. l. hac duplici nota. p. 258. l. 17. l. innititur p. 276. l. 10. l. folia. p. 280. l. 1, & 2.

2. l. fructusve. p. 281. l. 13. l. relinquentes. p. 282. l. 2.
l. Dodrantalem. p. 295. l. 14. l. Pistacia. p. 307. l. penult.
l. Gallicè & pigra. p. 305. l. antepenult. l. Germanica.
p. 318. l. penult. l. Britannia. 319. l. 19. l. prior vulga-
ris. p. 320. antepenult. l. minutæ. p. 340. l. 1. l. radice. p.
341. l. penult. l. expetitur. p. 371. l. antepenult. l. proprie
dicta. p. 372. l. 11. l. averruncandum. p. 384. l. 13. l. fe-
cerit. p. 392. l. 11, & 12. l. denominandæ. p. 417. l. 17.
l. folliculos. p. 419. l. 23. l. mimosam. p. 440. l. 10. l. Ca-
chryphora. *ibid.* l. 18. l. ferularum. p. 464. l. 7. l. præ-
stantissima & certissima. *ibid.* l. penult. l. edita. p. 476.
l. 3. Dod. *deleatur.* *ibid.* l. 7. pro à l. videlicet. p. 488. l.
12. l. Ceterach. p. 496. l. 16. l. vis ut apertis.

VIRIS



VIRIS CLARISSIMIS

In re

BOTANICA,

Facile inter primos Magistris.

ABELI BRUNTER Medico & Botanico, *Celsitudini* E. Regiæ.

NICOLAO MARCHANT Apothecario, Botanico *Celsitud.* E. Regiæ.

Collegis suis, Horti Regii *Blesensis*
Collectoribus & coexaminatoribus dignissimis: Author hæc scribit.

Collegæ dignissimi,

CUM Hortum Regium, Blesensem, trecentis sexaginta plantis, plus minusve auctum animadverteram: que fuere à nobis recuperata & collecta ab anno 1655.

(quo anno Hortum Regium Blesensem, Typis pro secundâ vice commisimus) usque ad annum 1660, quo extinctus est serenissimus noster Mæcenæ & Patronus, verè Regius, dignissimus

nissimus Princeps. Cum hunc catalogum cum
auctario à quamplurimis passim desiderari
observaverim. Eundem auctum, cum dura-
tionis notulis, aliisque notis seu charactis-
mibus, nulli cuiquam Botanicorum hucusque usita-
tis, in lucem edere decrevi. Partim ut Bo-
tanicorum tam hic, quàm alibi terrarum de-
gentium, precibus satisfacerem; partim ut
nobismetipsis satisfaceret; quippe sudoribus &
laboribus nostris per decennium exantlatis,
collectæ & examinatæ fuerunt quotquot hic
exstant plantæ. Quum sub auspiciis serenissi-
mi Domini nostri, Galtonis Franciæ, &c.
hæc à me incepta & hic elaborata & finita;
ne blattis & tineis diutius committerentur,
in Botanicorum rem esse mecum non dubi-
tabitis: Quare publici juris facere animum
induxi meum. Porro plantas non scriptas in
eodem Horto Regio Blæsensi aucto 260 con-
tentas, breviter & succinctè delineatas ex-
hibeo: Cum observationibus generalioribus
plantarum ex eodem Horto Regio Blesensi
aucto excerptis, rei herbariæ amantibus
necessariis & cognitu perutilibus. Halluci-
nationes Caspari Bauhini tam in digerendis
quàm denominandis plantis. Animadver-
siones itidem in Johannis Bauhini tres To-
mos

vos historiae suae universalis edidi: Unà cum
Dialogo inter Philobotanum D. B. popula-
rem meum Societatis Regiae Socium & me-
metipsum. Ubi passim in hac meâ doctrinâ
præsterno viam ad methodum novam & in-
auditam quam brevi (si Deus dederit) lucem
videre spero. Vobis hæc scribere (quicquid
æquum est) judicavi. Vestrum judicium, vestra
existimatio valebit. Sublimiora sub Auspiciis
serenissimi CAROLI Secundi, magnæ Bri-
tanniæ, Franciæ & Hiberniæ Regis Do-
mini nunc nostri; jam penè in promptu
habeo. Videlicet, classes Stirpium, per Tabu-
las cognationis seu affinitatis dispositas. Diu
Valetè

Collegæ dignissimi,

Vester Collega,

Collector & cœexaminator

Robertus Morison M. D.
Botan. Celsitud. E. Regiæ
Bæsis degens.

Österreichische Nationalbibliothek



+Z159586207



