

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

Институт эволюционной морфологии и экологии животных
им. А. Н. Северцова

УДК 591.524.21

Фауна и экология почвенных беспозвоночных Московской области.

М.: Наука, 1983

Книга содержит результаты исследования закономерностей распределения, биологии и экологии отдельных групп почвенных беспозвоночных. Часть работ посвящена исследованию влияния на почвенную фауну таких факторов, как удобренние пахотных земель, беспорядочный и организованный выпуск сельскохозяйственных животных, распашка целинных и залежных земель в условиях различных физико-географических районов Московской области.

Для зоологов, энтомологов, почвоведов, биологов — преподавателей ВУЗов, аспирантов и студентов.

Фауна и экология почвенных беспозвоночных Московской области

Ответственный редактор
академик М. С. ГИЛЯРОВ

**ФАУНА И ЭКОЛОГИЯ ПОЧВЕННЫХ БЕСПЗВОНОЧНЫХ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Утверждено к печати Институтом морфологии и экологии животных
им. А. Н. Северцова Академии наук СССР

Редактор издательства Э. А. Вишнякова. Художник Е. Н. Волков.
Художественный редактор Н. Н. Власик. Технические редакторы Ф. М. Хенок,
Т. А. Калинина

Корректоры Г. Н. Джиговская, К. П. Лосева

ИБ № 27316

Сдано в набор 06.12.82. Полиграфия 14.04.83. Т-05591. Формат 60×90^{1/16}.
Бумага для глубокой печати. Гарнитура литературовая. Печать высокая. Усл. печ л. 13,5.
Усл. кр.-отт. 13,75. Уч.-изд. л. 16,9. Тираж 1000 экз. Тип. зак. 2045. Цена 2 р. 60 к.

Издательство «Наука», 117864, ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90
Ордена Трудового Красного Знамени Первая типография издательства «Наука»
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

Москва 1983

Ф 200500000—246 300-83—11 © Издательство «Наука», 1983 г.
042(02)—83

Автор пользуется случаем выразить глубокую признательность своему научному руководителю А. Д. Петровой-Никитиной за постоянную помощь и поддержку, благодарен О. Ю. Орлову за любезное предоставление места в лаборатории на территории Звенигородской биологической станции МГУ и за постоянное внимательное отношение к данной работе, а также М. Г. Вахрамеевой за помошь в выборе биотопов и определения растений, а также К. Ю. Еськову за проверку определений ряда пауков.

Литература

- Беэр С. А. О сезонной динамике численности наземных пауков Подмосковья. — Науч. докл. высш. школы. Биол. Науки, 1965, № 4, с. 29—31.
Беэр С. А. О наземной фауне пауков Московской области. — Зоол. журн., 1968, т. 47, № 1, с. 131—134.
Губанов И. А., Новиков В. С., Тихомиров В. Н. Определитель высших растений средней полосы Европейской части СССР. М.: Просвещение, 1981. 286 с.
Лакин Г. Ф. Биометрия. М.: Высш. школа, 1980. 293 с.
По природным зонам. Смешанные леса. М.: Изд-во МГУ, 1974, вып. 2, 302 с.
Черкес Ю. И. Основные синэкологические характеристики почвенных беспозвоночных и методы их анализа. — В кн.: Методы почвенно-зоологических исследований. М.: Наука, 1975, с. 160—216.
Штернберг М. Т. Структура и динамика фауны пауков подстилки лиственничного сибирского резервата «Морисцала». — Тр. Зоол. ин-та АН СССР, 1979, т. 85, с. 54—59.

Каталог пауков (*Arachnida, Aranei*) Московской области

К. Г. Михайлов

Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова

Фауна пауков Московской области неоднократно исследовалась рядом авторов. В каталоге Д. Е. Харитонова [1932, 1936] для области указано 345 видов пауков (с учетом современной синонимии — 324 вида). В работе С. А. Беера [1968] указано 17 новых для области видов, в определителе В. П. Тышенко [1971] — еще шесть. Тем не менее некоторые пауки, например обитатели лесной подстилки, болот, изучены недостаточно. Наименее исследованы мелкие пауки семейств Linyphiidae и Eggonidae — типичные обитатели подстилки.

При составлении настоящего каталога автор имел возможность использовать неопубликованные материалы Л. Б. Рыболова и А. А. Захарова. Учтена также публикующаяся в этом сборнике работа по паукам подстилки [Михайлов, 1983] и неопубликованные ранее материалы автора.

Всего в каталоге приведено 420 видов пауков, из них 48% —первые для Московской области. 25 видов указаны как новые для области в статье К. Г. Михайлова [1983].

Распространение пауков приводится по районам со следующими сокращениями: М. обл — Московская область, М — Москва, Кл — Клинский район, Дм — Дмитровский район, Иc — Истринский район, Д — Долгопруденский район, Мыт — Мытищинский район, П — Пущинский район, Мож — Можайский район, Руз — Рузский район, Од — Одинцовский район, Б — Балашихинский район, Н-Ф — Наро-Фоминский район, В — Видновский район, Л — Люберецкий район, Рам — Раменский район, Под — Подольский район, Ч — Чеховский район, Серп — Серпуховский район, Ст — Ступинский район, Каш — Каширский район, Оз — Озерский район, Кол — Коломенский район, З — Зарайский район. В некоторых случаях приводятся данные о распространении пауков по уездам, например: М. у — Московский уезд. Сомнительные определения отмечены вопросительным знаком.

В квадратных скобках указаны номера цитированной литературы; в круглых скобках цифрами указаны следующие используемые материалы: 22 — сборы А. А. Захарова (Учинское водохранилище, определение К. Ю. Еськова), 23 — сборы Л. Б. Рыбалова (Приокско-Террасный заповедник, определения В. И. Овчаренко, К. Ю. Еськова и В. Я. Фета), 24 — коллекция К. Г. Mikhailova (определение его же).

Автор пользуется случаем выразить благодарность А. А. Захарову и Л. Б. Рыбалову за любезное предоставление неопубликованных материалов, А. Д. Петровой-Никитиной за постоянную помощь в работе и советы при оформлении рукописи.

Отряд Aranei — пауки

Araneidae

Amaurobius pallidus L. Koch, 1868. — ?М. [13].

Titanoeeca schineri L. Koch, 1872. — М. обл, ю. часть [14, 18], Оз [15].

Dictynidae

Brigittea latens (Fabricius, 1775) (= *Dictyna latens*). —

Серп [4].

Dictyna arundinacea (L., 1758) (= *D. benigna* Simon). — М. обл [2], Мыт [24], П [8], Од [7], Под [13], Серп [13], Оз [15].

D. major Menge, 1869. — Серп [23].

D. pusilla Thorell, 1856. — М. у. [4], М [4], Дм [4], Иc [1], Д [4], Пол [5], Серп [23].

D. uncinata Thorell, 1856. — Д [4], Мыт [24], П [8], Б [4], Пол [5], Ст [4], Серп [23].

Lathys puta (O. Pickard-Cambridge, 1863) (= *Lethia puta*). — М. обл, ю. часть [14, 18], Ст [15].

Marilyna bicolor (Simon, 1870) (= *Dictyna bicolor*). — ? Пол [5].

Mimetidae

Ero furcata (Villers, 1789) (= *Ero variegata*). — М. обл [2], Од [7], Н-Ф [4], Серп [23].

Ero tuberculata (De Geer, 1778) (= *Ero tuberculosa*). — М. обл [2].

Photoidae

Photcus phalangooides (Fuesslin, 1775). — М. обл [2], М [4], П [8, 9].

Salticidae

Aelurillus festivus (C. L. Koch, 1834). — Серп (23), Оз [15].

Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) (= *B. depressus*). — М. обл [12], Серп (23).

Bianor autoinctus (Ohlert, 1865) (= *Ballus aenescens*, Oedipus aenescens). — П [8], Оз [15].

Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757). — М. обл [2], П [8].

D. rufus (Sundevall, 1832). — М [13], Руз [13], П [8], Серп (24).

Euophrys erraticus (Walckenaer, 1826) (= *Attus erraticus*). — М [13], Иc [1], П [8], Пол [13], Ч [13], Серп (23).

E. frontalis (Walckenaer, 1802). — Серп (23).

E. petrensis C. L. Koch, 1837. — [8].

E. uafra (Blackwall, 1867) (= *E. finitima*). — Оз [15].

Evarcha arcuata (Clerck, 1757) (= *Attus arcuatus*, *A. farinosa*, *Ergane arcuata*, *Euophrys pallidicola*). — М. обл [2], М [13], П [8, 9, 11], Од [7], Пол [13], Ч [13], Серп [13], (23, 24), Оз [15].

E. falcata (Clerck, 1757) (= *Attus falcatus*, *Ergane falcata*). — М. обл [2, 15], П [8], Од [7], Пол [13], Серп [13] (23). — [23].

E. laetabunda (C. L. Koch, 1848) (= *Euophrys westringi*). — Оз [15].

Heliophanus aeneus (Hahn, 1831) (= *H. muscorum*). — Од [7], Пол [5], Серп [13].

H. auratus C. L. Koch, 1835. — П [8], Серп (23).

H. cupreus (Walckenaer, 1802) (= *Attus cupreus*). — М. обл [2], М [13], П [8], Серп (23), Оз [15].

H. dubius C. L. Koch, 1835. — П [8], Од [7], Серп (23).

H. flavipes (Hahn, 1831). — М [13], Серп (23, 24), Оз [15].

Marpissa muscosa (Clerck, 1757) (= *Marpissa muscosa*). — М. обл [2, 19].

M. radiata (Grube, 1859). — М [4], Дм [4], П [8, 11].

Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) (= *Salticus formicarius*, *S. tirolensis*). — М. обл [2], П [9].

Neon laevis (Simon, 1871). — Серп (23).

N. reticulatus (Blackwall, 1853). — П [8], Од [7], Серп (23).

Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802). — Ст [4].

Salticus cingulatus (Panzer, 1797) (= *Epiblemm cingulatum*). — М [4], П [8], Серп (24).

Salticus scenicus (Clerck, 1757) (= *Attus scenicus*, *Epiblemmum scenicum*). — М. обл [2], М [13], П [9], Од [7], Пол [13].

Серп [13].

Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) (= *S. olearii*, *Epiblemmum tenerum*). — П [8], Б [4].

Siticus caricus (Westring, 1861). — П [11].

Siticus floricola (C. L. Koch, 1837) (= *Attus floricola*, *Euophrys floricola*). — М. обл [2], П [8], Од [7], Серп (23), Кол. у [4].

S. penicillatus (Simon, 1875) (= *Attulus penicillatus*). — М. обл [12].

S. terebratus (Clerck, 1757) (= *Attus terebratus*). — М. обл [2], Д [4], П [8].

S. zimmermanni (Simon, 1877). — Пол [4].

Synageles hilarulus (C. L. Koch, 1846) (= *Salticus hilarulus*). — М. обл [2].

S. venator (Lucas, 1836). — П [8], Пол [5].

Гнапосиды

Catiliepis nocturna (L., 1758) (= *Melanophora nocturna*). — М. обл [2], Серп [4] (23).

Drassodes lapidus (Walckenaer, 1802) (= *Drassus lapidicola*). — М. обл [2].

Drassodes villosus (Thorell, 1856) (= *Drassus villosus*). — М. обл [2], М [4].

Gnaphosa bicolor (Hahn, 1831). — М. обл [19], Серп (23), Гт [15].

C. lucifuga (Walckenaer, 1802) (= *Pythonissa lucifuga*). — М. обл [2, 19], П [8, 11], Оз [15].

G. montana (L. Koch, 1866) (= *Pythonissa montana*). — М. обл [2].

G. muscorum (L. Koch, 1866). — М [13], Ру3 [13].

Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) (= *Drassus cognatus*). — М. обл [2], М [13], Серп (23).

H. signifer (C. L. Koch, 1839). — Серп (23).

H. silvestris (Blackwall, 1833). — Серп (23).

H. soorense (Strand, 1900). — Серп (23).

Micaria albotriata L. Koch, 1878. — П [8].

M. fulgens (Walckenaer, 1802). — М. обл [2].

M. pulicaria (Sundevall, 1831) (= *M. nitens*, *Melanophora pulicaria*). — М. обл [2], П [8].

Scotophaeus loricatus (L. Koch, 1866) (= *Drassus loricatus*). — М. обл [2].

S. scutulatus (L. Koch, 1866). — М [24].

Zelotes apicorum (L. Koch, 1876) (= *Prosthesima apicorum*). — Гт [8].

Z. bimaculatus (C. L. Koch, 1837) (= *Melanophora bimaculata*). — М. обл. [2].

Z. clivicola (L. Koch, 1870). — Серп (23).

Z. electus (C. L. Koch, 1839). — Серп (23).

Z. petrensis (C. L. Koch, 1839). — Серп (23).

Z. praeficus (L. Koch, 1866) (= *Prosthesima praefica*). — Д [4], Б [4].

Z. pusillus (C. L. Koch, 1833) (= *Melanophora pusilla*). — М. обл [2], Серп (23).

Z. subterraneus (C. L. Koch, 1833) (= *Melanophora subterranea*, *M. petiveri*). — М. обл [2], Серп (23).

Ануфаениды

Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802). — М [6], Д [4], П [8], Од [7], Пол [4], Серп (23), Кол. у [4].

Спарасиды

Micrommata virescens (Clerck, 1757) (= *M. viridissima*, *M. ornata*, *Sparassus smaragdulus*). — М. обл [2], М [13], П [8], Пол [5], Серп [13], Кол [15].

Томисиды

Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837). — П [8], Од [7] (24).

Diae dorsata (Fabricius, 1777). — М. обл, ю. часть [14, 18], Серп (23), Оз [15].

Misumena vatia (Clerck, 1757) (= *M. pallida*). — М. обл [2], М [13], и [1], Мыт [13], (24), П [8, 9], Од [7], Пол [5, 13], Серп [13].

Misumenops tricuspidatus (Fabricius, 1775) (= *Diaea tricuspidata*). — М. обл [2].

Oxyptila blackwalli Simon, 1875. — Оз [15].

O. brevipes (Hahn, 1826) (= *Xysticus incertus*). — М. обл [2].

O. horticola (C. L. Koch, 1837) (= *Xysticus horticola*). — М. обл [2], Серп (23).

O. praticola (C. L. Koch, 1837). — М [6, 13], Ие [1], Мыт (22, 24), П [8], Ру3 [13], Од [7], Ч [13], Серп (23), Оз [15].

O. rauda Simon, 1875. — Серп (23).

O. trux (Blackwall, 1846). — Ие [1], Мыт (22).

Philodromus aureolus (Clerck, 1757) (= *Ph. caespiticulus*, *Ph. longipalpis*, *Ph. reussi*). — М. обл [2, 4], ю. часть [14, 18], М [4, 6], Кл [4], П [8, 9, 11], Од [7], Пол [5], Серп [4, 13], Серп. у [4].

Ph. collaris C. L. Koch, 1835. — М [13].

Ph. dilutus Thorell, 1875. — Серп [15].

Ph. dispar (Walckenaer, 1826). — М. обл [19], Од [15], Оз [15], Кол [15].

Ph. emarginatus (Schrank, 1803) (= *Artanes pallidus*, *A. griseus*). — М. обл [2], ю. часть [14, 18], М [6], П [8], Пол [5], Гт [15], Оз [15].

Ph. fallax Sundevall, 1832. — М. обл [12].

Ph. fuscomarginatus (de Geer, 1778) (= *Ph. cinereus*, *Artanes fuscomarginatus*). — М. обл [2, 19], П [8], Серп (23, 24), Гт [15], Оз [15].

Ph. histrio (Latreille, 1819). — Л [4].
Ph. marginatus (Clerck, 1757) (= *Artanes jesunus*). — М. обл
 [2], П [8], Пол [13], Сепр (23).
Ph. poecilus (Thorell, 1872) (= *Ph. tigrinus*, *Artanes poecilus*). — М. обл [2, 19].
Ph. vagulus Simon, 1875 (= *Ph. alpestris*, *Xysticus alpestris*). — М. обл [19], Сепр [13].
Pistius truncatus (Pallas, 1772). — М. обл [19].
Thanatus arenarius Thorell, 1872. — Пол [13], Сепр (23).
Th. formicinus (Clerck, 1757). — П [8], Сепр [13].
Thomisus onustus (Walckenaer, 1805) (= *Th. albus*). —
 М. обл [12], Сепр (23).
Tibellus macellus (Simon, 1875). — М [13].
T. maritimus (Menge, 1875) (= *T. oblongus*, nec Walckenaer,
 1802). — М [4], Пол [5], Сепр. у [4].
T. oblongus (Walckenaer, 1802) (= *T. parallelus*). — М [13],
 Мът (24), П [8], Оп [7].
Tharus piger (Walckenaer, 1802) (= *Monaeses cuneolus*). —
 М. обл, ю. часть [14, 18], Сепр [13, 15], Оз [15].
Xysticus acebrus Thorell, 1872. — М. обл [19].
X. audax (Schrank, 1803) (= *X. pini*, *Thomisus pini*). — М. обл
 [2, 19], Мът (24), П [8, 9, 11], Оп [7], Сепр [15] (23).
X. bifasciatus C. L. Koch, 1837. — М. обл [2, 19], П [8, 9, 11],
 Пол [13].
X. calcaratus (Westring, 1861). — М. обл [19], Каш [15].
X. cambridgei (Blackwall, 1858) (= *X. lactator*). — Сепр (23),
 Пол [13], Оз [15], Кол [15].
X. cristatus (Clerck, 1757) (= *Thomisus cristatus*). — М.
 обл [2], М [13], Мът (22), П [9], Оп [7], Пол [5, 13].
X. erraticus (Blackwall, 1834). — М [13], П [8].
X. gallicus Simon, 1875. — М. обл, ю. часть [14, 18].
X. kempeleni Thorell, 1872 (= *X. frater*). — М. обл [2], М [15],
 Пол [15], Пол [15], Ч [15], Сепр [15].
X. kochi Thorell, 1872. — М [13], Ис [1], П [8], Сепр [13, 15].
X. laetus Thorell, 1875. — М. обл, ю. часть [14, 18].
X. lanio C. L. Koch, 1835. — Сепр (23).
X. lateralis Hahn, 1831. — Сепр [14, 18].
X. lineatus (Westring, 1851). — М. обл [2, 19], Сепр (23).
X. luctuosus (Blackwall, 1836). — М. обл [19], П [8], Б [4],
 Од (7), Сепр (23).
X. marmoratus Thorell, 1875. — М. обл [19], Пол [13].
X. ninni Thorell, 1872. — М. обл [19].
X. parallelus Simon, 1873. — ? Ст [15].
X. robustus (Hahn, 1831) (= *X. fuscus*, *X. fucatus*). — М. обл [2],
 Пол [13].
X. sabulosus (Hahn, 1831) (= *X. Gловерi*). — ? М. обл [19],
 Ст [15], ? Оз [15].
X. setosus (Westring, 1851). — М. обл [19].

X. striatipes L. Koch, 1870. — М. обл [19], П [8, 11], Пол [13],
 Сепр [15].
X. ulmi (Hahn, 1831) (= *Thomisus ulmi*). — М. обл [2], Ис [1],
 Мът (24), П [8, 9, 11], Од [7], Пол [13], Ч [13], Сепр [13],
 (23), Ст [15].

Clubionidae
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) (= *A. haglundi*). —
 М. обл [2], П [8], Сепр (23).
A. proxima O. Pickard-Cambridge. 1871. — Сепр (23).
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) (= *Ch. carni-
 ѡex*). — М. обл [2], П [8], Пол [5], Сепр [13], Оз [15],
 Кол [15].
Ch. punctorum (Villers, 1789) (= *Ch. nutrix*). — М. обл [2],
 Пол [13].
Clubiona brevipes Blackwall, 1841. — М [13].
C. caerulescens L. Koch, 1866 (= *C. saxatilis*). — П [8, 9, 11],
 Од [7], Пол [5], Ч [13], Сепр [13, 15] (23).
C. comta C. L. Koch, 1839. — Мът (22), Сепр. у [4].
C. corticalis (Walckenaer, 1802). — П [9].
C. decora Blackwall, 1859. — М [4], П [4].
C. diversa (O. Pickard-Cambridge, 1862). — Пол [5].
C. frutetorum L. Koch, 1866. — М. обл [2], Ис [1], П [8], Пол [5].
C. germanica Thorell, 1870. — П [8, 9], Од [7], Н-Ф (24),
 Пол [5].
C. lutescens Westring, 1851. — М. обл [2], М [4, 6], Ис [1], П [8],
 Од [7], Пол [4], Сепр (23), Кол. у [4].
C. neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862. — М [4], П [8], Б [4].
C. pallidula (Clerck, 1757). — М. обл [2], М [13], П [8, 9],
 Од [7], Пол [13], Оз [15].
C. phragmitis C. L. Koch, 1843. — М. обл [2], М [6], П [8, 11].
C. rectusa O. Pickard-Cambridge, 1863. (= *C. grisea*). — М [4],
 М. у [4], П [8], Од [7], Пол [5], Сепр [4] (23), Сепр. у [4].
C. similis L. Koch, 1866. — М. обл [2].
C. stagnatilis Kulczyński, 1897. — Мът (24), П [8], Од [7],
 Сепр [4].
C. subsultans Thorell, 1875 (= *C. erraticata*). — М. обл [2],
 М [6], Ис [1], П [8], Py3 [13], Н-Ф (24), Сепр (23).
C. terrestris Westring, 1851. — П [9].
C. trivialis C. L. Koch, 1843. — М. обл [19], Оз [15].
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) (= *L. domesticum*). —
 Оз [15].
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835). — П [8].
Zoridae
Zora nemoralis (Blackwall, 1861). — Сепр (23).
Z. spinimana (Sundevall, 1832) (= *Z. maculata*). — М. обл [2],
 Ис [1], П [8], Пол [13], Сепр (23).

Theridiidae

- Achaeareana lunata* (Clerck, 1757) (= *Theridion formosum*, *Th. sisypnum* Walckenaer, nec Clerck). — М. обл [2], Иc [4],
 Д [4]. — Мышт (24), П [8, 9, 11], Од [7], Пол [5].
- A. riparia* (Blackwall, 1834) (= *Theridion riparium*, *Th. saxonica*). — М. обл [2], ю. часть [14, 18], Ст [15].
- A. tepidariorum* (C. L. Koch, 1841) (= *Theridion tepidariorum*, *Th. simulans*). — М. обл [2], Д [4], Од [7].
- Crustulina guttata* (Wider, 1834) (= *Theridion guttatum*). — М. обл [2], П [8], Серп (23).
- Dipoena torva* (Thorell, 1875) (= *Lasaeta torva*). — П [8].
- D. tristis* (Hahn, 1831) (= *Theridion triste*, *Lasaeta tristis*, *Eucharia triste*). — М. обл [2], П [8], Ч [13], Ст [15].
- Enoplognatha ovata* (Clerck, 1757) (= *Theridion luneatum*, *Th. ovatum*, *Th. redimitum*, *Philonetis lineata*). — М. обл [2], М [3], Иc [1], Мышт (24), П [8, 9, 11], Од [7], Пол [5], Серп [13], Оз [15].
- Euryopis flavomaculata* (C. L. Koch, 1836). — Серп (23).
- Episinus truncatus* Latreille, 1809. — М. обл [2], ? Оз [15].
- Photcomma gibbum* (Westring, 1851). — М. обл [19], Оз [15].
- Robertus arundineti* (O. Pickard-Cambridge, 1871). — Од [7].
- R. lividus* (Blackwall, 1836) (= *Pedanostethus lividus*). — М [4], Иc [1], Мышт (22), П [8], Од [7], П [4], Серп (23), 3 [17].
- R. neglectus* (O. Pickard-Cambridge, 1871). — Мышт (22).
- R. scoticus* Jackson, 1914. — Серп (23).
- Steatoda bipunctata* (L., 1758) (= *Theridion bipunctatum*). — М. обл [2], М [6], П [8, 9], Од [7], Пол [5, 13], Серп [13].
- S. castanea* (Clerck, 1757) (= *Eucharia castaneum*, *Teutana castanea*). — М. обл [2], П [8], Руз [13], Пол [5, 13].
- S. grossa* (C. L. Koch, 1838) (= *Theridion versum*, *Teutana grossa*). — М. обл [2], М [4], П [8], Серп [4].
- S. phalerata* (Panzer, 1801) (= *Asagena phalerata*). — П [8].
- Theridion bellicosum* Simon, 1873 (= *Th. venustum*). — М. обл [2].
- Th. bimaculatum* (L., 1767) (= *Th. reticulatum*). — М. обл, ю. часть [14, 18], П [8, 11], Од [7], Пол [13], Ч [13], Серп [13], (23).
- Th. cinereum* Thorell, 1875. — М. обл, ю. часть [14, 18], ? Оз [15].
- Th. denticulatum* (Walckenaer, 1802). — М. обл [2], П [8], Б [13], Пол [5].
- Th. impressum* L. Koch, 1881. — П [8, 9].
- Th. inocuum* Thorell, 1875. — М. обл, ю. часть [14, 18], Оз [15].
- Th. montanum* Emerton, 1882. — Од [7].
- Th. pictum* (Walckenaer, 1802). — М. обл [2], Мышт (24), П [8, 9, 11], Руз [13], Б [13], Пол [13], Ч [13], Серп [13], Оз [15].
- Th. sisypnum* (Clerck, 1757). — М [6], П [8], П [8, 9], Руз [13].
- Од [7], Пол [5], Серп [13], Оз [13].
- Th. varians* Hahn, 1831. — М. обл [2], М [13], П [8, 9, 11].
- Од [7], В [13], Серп [13], Оз [15].

Oxyopidae

- Oxyopes ramosus* (Martini et Goeze, 1778). (= *O. lineatus*). — М. обл [2], Иc [1], П [8], Серп [13].
- Argyronetidae*
- Argyroneta aquatica* (Clerck, 1757). — М. обл [2], М [4], М. у [3], П [8, 9], Од [7], П [4], Рам [10], Пол [4], Серп. у [4].
- Agelenidae*
- Agelenia labyrinthica* (Clerck, 1757). — М. обл [2].
- Cicurina cicurea* (Fabricius, 1793) (= *C. cicur*). — М [6], П [8], Серп (23).
- Cryphoeca siticola* (C. L. Koch, 1834). — М [6], Мышт (22).
- Tegenaria agrestis* (Walckenaer, 1802). — М. обл [2].
- T. domestica* (Clerck, 1757) (= *T. civilis*, *T. derhami*). — М. обл [2], М [4], П [8], Руз [4], Пол [5], Серп [4].
- Hahniidae*
- Antistea elegans* (Blackwall, 1841). — П [8], Серп (23).
- Hahnia nava* (Blackwall, 1841). — Мышт (22).
- H. onoridum* Simon, 1875. — Серп (23).
- H. pusilla* C. L. Koch, 1841. — Иc [1], Од [7], Серп (23).
- Lycosidae*
- Acantholycosa lignaria* (Clerck, 1757). — П [8], Серп (23).
- Alopecosa aculeata* (Clerck, 1757) (= *Tarentula aculeata*). — Иc [1], П [8], Руз [13], Серп (23).
- A. cuneata* (Clerck, 1757) (= *Tarentula cuneata*). — П [8], Руз [13].
- A. cursor* (Hahn, 1831). — М. обл [12].
- A. fabrilis* (Clerck, 1757) (= *Tarentula fabrilis*). — Руз [13].
- A. inquilina* (Clerck, 1757) (= *Lycosa inquilina*, *Tarentula inquilina*). — М. обл [2], П [8], Од [7], Кол [15].
- A. mariae* (F. Dahl, 1908) (= *Tarentula striatipes* Doleschall, nec C. L. Koch). — М. обл, ю. часть [14, 18], Ст [15].
- A. pinetorum* (Thorell, 1856) (= *Tarentula pinetorum*). — Б [4].
- A. pulverulenta* (Clerck, 1757) (= *Tarentula pulverulenta*). — М [13], П [8], Од [7], Пол [13], Ч [13], Серп (23), Оз [15].
- A. solitaria* (Herman, 1876) (= *Tarentula solitaria*). — М. обл, ю. часть [14, 18], Оз [15].
- A. sulzeti* (Pavesi, 1873). — Серп (23).
- A. trabalis* (Clerck, 1757) (= *Lycosa trabalis*, *Tarentula trabalis*). — М. обл [2, 4].
- A. vivax* (Thorell, 1875) (= *Tarentula vivax*). — Ст [15].
- Arctosa cinerea* (Fabricius, 1777) (= *Trochosa cinerea*). — М [4], Серп [4].
- A. figurata* (Simon, 1876) (= *Trochosa sabulonum*). — Б [4].
- A. leopardus* (Sundevall, 1832) (= *Pirata leopardus*). — П [8], Руз [13].

- A. maculata* [Hahn, 1822] (= *Trochosa amygdacea*). — II [8], Оз [15], Кол [15].
- A. perita* (Latreille, 1799) (= *Lycosa picta*, *Trochosa picta*). — М. обл [2], М [4].
- A. stigmosa* (Thorell, 1875) (= *Trochosa stigmata*). — Серп [13], Оз [15].
- Lycosa radiata* Latreille, 1817 (= *Tarentula radiata*). — М. обл, ю. часть [14, 18], Кол [15].
- L. singoriensis* (Laxmann, 1770) (= *Trochosa singoriensis*). — ? М [4].
- Pardosa agrestis* (Westring, 1861) (= *Lycosa agrestis*, *L. monticola* nec Clerck, *P. monticola* nec Clerck). — М. обл [2], Иc [1], П [8], Руз [13], Серп. у [4].
- P. agricola* (Thorell, 1856) (= *Lycosa agricola*, *L. arenaria*). — М. обл [2, 19], Иc [1], Оз [15].
- P. amentata* (Clerck, 1757) (= *Lycisa amentata*, *L. saccata*). — М. обл [2], М [13], П [8], Од [7], Пол [5, 13], Серп [13], (23).
- P. atrata* (Thorell, 1873). — Мыт [20].
- P. elegans* (Thorell, 1875) (= *Lycosa elegans*). — 3 [21].
- P. ferruginea* (L. Koch, 1870) (= *Lycosa ferruginea*). — М. обл, ю. часть [14, 18], Иc [1], Серп [13].
- P. hortensis* (Thorell, 1872) (= *Lycosa annulata*). — М [13].
- P. lugubris* (Walckenaer, 1802) (= *Lycosa lugubris*, *L. chelata*). — М. обл [2, 19], Мыт (24), П [8, 9, 11], Од [7], Пол [5], Серп (23), Ст [15].
- P. nigriceps* (Thorell, 1856) (= *Lycosa nigriceps*). — М. обл.
- P. nebulosa orientalis* Kroneberg, 1875 (= *P. orientalis*). — 3 [17].
- P. paludicola* (Clerck, 1757) (= *Lycosa paludicola*). — М [13], П [8], Руз [13], Серп [13], Ст [15].
- P. palustris* (L., 1758) (= *P. tarsalis*, *Lycosa palustris*, *L. tarsalis*). — М. обл [2], М [4], Дм [4], Иc [1], П [8, 11], Од [7], Пол [5].
- P. prativaga* (L. Koch, 1870) (= *Lycosa prativaga*, *L. riparia*, *pec C. L. Koch*). — Мыт (24), П [8], Од [7], Пол [5], Серп (23), Серп. у [4].
- P. proxima* (C. L. Koch, 1848) (= *Lycosa proxima*). — М. обл [2].
- P. pullata* (Clerck, 1757) (= *Lycosa pullata*). — М. обл [2], М [4], Дм [4], Иc [1], Д [4], П [8, 11], Серп (23), Ст [4].
- Pardosa riparia* (C. L. Koch, 1833) (= *Lycosa riparia*, *L. cursoria*). — М. обл, ю. часть [14, 18], П [8], Серп (23), Оз [15].
- P. schencki* Lessert, 1904. — Серп (23).
- P. sphagnicola* (F. Dahl, 1908). — Од [7].
- P. wagleri* (Hahn, 1822) (= *Lycosa wagleri*). — Оз [15].
- Pirata hygrophilus* Thorell, 1872. — ? М (6), Иc [1], П [4, 8, 9], Од [7], Л [4], Пол [4, 5], Серп (23).

- P. piraticus* (Clerck, 1757) (= *Lycosa piratica*). — М. обл [2], П [8, 11], Руз [13], Од [7], Оз [15].
- P. piscatorius* (Clerck, 1757) (= *Lycosa piscatoria*). — М. обл [2], Иc [1], П [8, 9, 11], Од [7].
- P. uliginosis* (Thorell, 1856). — Од [7].
- Trochosa ruricola* (De Geer, 1778) (= *Lycosa ruricola*). — М. обл [2], М [4], Иc [1], П [8, 9, 11], Л [4], Пол [5], Серп. у [4], Ст [4].
- T. spinipalpis* (F. O. Pickard-Cambridge, 1905). — Од [7], Серп (23).
- T. terricola* Thorell, 1856 (= *Lycosa terricola*). — М. обл [2], М [13], Иc [1], П [8, 11], Од [7], Пол [5], Серп (23).
- Xerolycosa miniata* (C. L. Koch, 1834) (= *Tarentula minuta*). — М. обл [19], П [8], Серп (23), Ст [15], Оз [15].
- X. nemoralis* (Westring, 1861) (= *Tarentula nemoralis*). — М. обл [19], П [8], Оз [15].
- Pisauridae**
- Dolomedes fimbriatus* (Clerck, 1757) (= *D. limbatus*). — М. обл [2], М [13], Дм [4], Мыт (24), П [4, 8, 9], Од [7], Рам (24), Пол [25, 13], Серп [13], (23), Ст [15].
- D. plantarius* (Clerck, 1757). — Мож. у [4], П [9], Од [7], Серп (23).
- Pisaura mirabilis* (Clerck, 1757) (= *Ocypate mirabilis*). — М. обл [2], М [6], Руз [13], Пол [5].
- Araneidae**
- Aculepeira ceropegia* (Walckenaer, 1802) (= *Epeira ceropegia*, *Aranea ceropegia*). — М. обл [2], М. у [4], Мыт (24), Пол [5].
- Araneus alsine* (Walckenaer, 1802) (= *Epeira alsine*, *Aranea alsine*). — М. обл [2], П [8, 9], Од [7], Пол [5], Ч [3].
- A. angulatus* Clerck, 1757 (= *Epeira angulata*, *Aranea angulata*). — М. обл [2], М [13], Иc [1], П [8, 9], Од [7], Пол [5, 13], Серп [13], Оз [15].
- A. diadematus* Clerck, 1757 (= *Epeira diademata*, *Aranea diademata*). — М. обл [2], М [13], П [8, 9], Руз [13], Од [7], Пол [5, 13].
- A. gibbosus* (Walckenaer, 1802) (*Epeira arbustorum*). — Ч [13].
- A. marmoreus* Clerck, 1757 (= *Epeira marmorea*, *Aranea marmorea*, *A. pyramidata*). — М. обл [2], М [13], П [8, 9], Од [7, 13], В [13], Пол [5, 13], Серп [13].
- A. omoedus* (Thorell, 1870). — Од [7].
- A. pallasi* (Thorell, 1875) (= *Epeira pallasi*). — М. обл, ю. часть [14, 18], Пол [13], Серп [15], Од [15].
- A. quadratus* Clerck, 1757 (= *Epeira quadrata*, *Aranea quadrata*). — М. обл [2], П [8, 9], Од [13], Пол [5].
- A. redii* (Scopoli, 1763) (= *Epeira redii*, *E. sollers*). — М. обл [2, 19], П [8, 9], Од [15].

- A. sturmi* (Hahn, 1831) (= *Epeira sturmi*, *Aranea sturmi*). — М [4], Дм [4], Иc [1], П [4, 8], Од [7], Пол [5]. Сепр (23).
A. triguttatus Fabricius, 1793 (= *Epeira agalena*). — М. обл [2].
A. ulrichi (Hahn, 1834) (*Aranea Ulrichii*). — П [9].
Aranella alpica (L. Koch, 1869) (= *Epeira alpica*). — Мыт (22), П [4].
A. cucubitina (Clerck, 1757) (= *Epeira cucubitina*, *Aranea cucubitina*, *Araneus cucurbitinus*). М. обл [2], М [6], Иc [1], Мыт (24), П [8, 9], Од [7], В [13], Пол [5, 13], Сепр [13], Оз [15].
A. displicata (Hentz, 1847) (= *Epeira westringi*). — М. обл [2, 19], М [6], П [9], Од [7], Оз [15].
A. inconspicua (Simon, 1874) (= *Epeira inconspicua*, *Aranea inconspicua*). — М. у [4], Кл. у [4], П [9], Руз [4].
Cercidia prominens (Westring, 1851). — П [8], Ст [15].
Cyclosa conica (Pallas, 1772). — М (6), Мыт (22), П [8, 9], Руз [13], Од [7], Пол [5], Ч [13].
C. ocellata (Walckenaer, 1802). — М. обл, ю. часть [14, 18], Ст [15], Оз [15], Кол [15].
Hypsosinga abovittata (Westring, 1851) (= *Singa abovittata*). — М. обл [19], Ст [15].
H. heri (Hahn, 1831) (= *Singa heri*). — М. обл [15], М [13].
H. pygmaea (Sundevall, 1831) (= *Singa trifasciata*). — М [13], Сепр (23).
H. sanguinea (C. L. Koch, 1845) (= *Singa sanguinea*, *Araneus sanguineus*). — Мыт (24), П [8, 9], Од [7], Рам [4], Сепр (23), Сепр. у [4].
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) (= *Zilla acalypha*). — М. обл [2], Мыт (24), П [8], Пол [5, 13], Ч [13], Сепр [13], Оз [15].
Meta menglei (Blackwall, 1869) (= *M. segmentata* var. *menglei*). — Иc [1], П [8, 9], Од [7], Пол [5], Гт [15].
M. segmentata (Clerck, 1757). — М [3], Иc [1], Руз [9], Мыт (24), П [8, 9], Од [7], Оз [15].
Nuctenea cornuta (Clerck, 1757) (= *Epeira cornuta*, *Araneus cornutus*, *A. foliatus*). — М. обл [2], М [13], Иc [1], Мыт (24), П [8, 9], Од [7], Оз [15].
N. ixobola (Thorell, 1873) (= *Epeira ixobola*). — М [4].
N. patagiata (Clerck, 1757) (= *Epeira patagiata*, *Aranea patagiata*, *Araneus patagiatus*). — М. обл [2], М [13], Иc [1], П [8, 9], Руз [13], Од [7], (24), Пол [5, 13], Сепр [13], Оз [15].
N. sclopetaria (Clerck, 1757) (= *Epeira sclopetaria*). — М. обл [2].
N. silvicultrix (C. L. Koch, 1835) (= *Epeira silvicultrix*, *Araneus silvicultrix*). — М [4], Мыт (24), П [8], Од [7].

N. umbratica (Clerck, 1757) (= *Epeira umbratica*). — М. обл [2, 19].
Singa hamata (Clerck, 1757) (= *S. melanocephala*, *Aranea hamata*, *Araneus hamatus*). — М [13], Мыт (24), П [8], Од [7], Пол [5], Ч [13], Сепр [13], Оз [15].

S. nitidula C. L. Koch, 1845 (= *Aranea nitidula*, *Araneus nitidulus*). — М. обл [2], ю. часть [14, 18], П [8], Пол [5], Сепр [13].

Zilla diodia (Walckenaer, 1802) (= *Z. albomaculata*). — М. обл [2].
Zygiella stroemi (Thorell, 1870) (= *Araneus stroemi*, *Zilla stroemi*). — П [8], Од [7], Ч [13].

Tetragnathidae

- Arundognatha striata* (L. Koch, 1862) (= *Eugnatha striata*). — П [8], Г [4].
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823. — М. обл [2], М [6], П [8, 9], Од [7], Пол [13], Сепр [23].
P. degeeri Sundevall, 1829. — М. обл [2], М [6], Иc [1], Мыт (22), П [8], Од [7], Пол [13], Сепр [13].
P. listeri Sundevall, 1829 (= *P. tristriata*). — М. обл [2], М [13], П [8], Пол [5, 13], Сепр (23), Гт [15].
Tetragnatha dearmani Thorell, 1873 (= *T. punctipes*). — П [9], Од [7].
T. extensa (L., 1758). — М. обл [2], М [? 6, 13], Иc [1], П [8, 9], Од [7], Пол [5, 13], Сепр [13], Гт [15], Оз [15], Кол [15].
T. montana Simon, 1874 (= *T. solandri*). — М [6], М. у [4], П [4], П [8, 9], Пол [5], Сепр [4], (23).
T. obtusa C. L. Koch, 1837. — П [8], Сепр [4].
T. pinicola (L. Koch, 1870). — М. обл [4], М. у [4], Г [4], П [4], Сепр [4].

Nesticidae

- Nesticus cellulanus* (Clerck, 1757) (= *Theridium cellulanum*). — М. обл [19], Мыт (22), Оз [15].

Linyphiidae

- Agyneta conigera* (O. Pickard-Cambridge, 1863). — Сепр (23).
A. subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863). — Мыт (22), Сепр (23).
Allomengea scopigera (Grube, 1859). — Од [7].
A. warburtoni (O. Pickard-Cambridge, 1889). — Сепр (23).
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871). — М [6].
B. convexus (Westring, 1851) (= *Linyphia convexa*). — Руз [13].
B. gracilis (Blackwall, 1841). — Мыт (22).

- B. *nigrinus* (Westring, 1851) (= *Linyphia nigrina*). — М. обл [2], М [6], Иc [1], П [8], Од [7], Под [13], Серп (23).
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1832) (= *B. stramineus*, *Linyphia atticeps*). — М. обл [2], М [6], Иc [1], Мыт (22), П [8], Од [7], Под [13], Серп (23).
B. index (Thorell, 1856). — М. обл [12].
B. luteolus (Blackwall, 1833) (= *Linyphia luteola*). — М [6], Иc [1], Мыт (22), Од [7], Под [13].
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) (= *Linyphia bicolor*, *Tmeticus bicolor*, *Centromerus bicolor*). — М. обл [2], М [6], Иc [1], Мыт (22), П [8].
Centromerus aequalis (C. L. Koch, 1841). — Иc [1], Мыт (22), Од [7], Серп (23).
C. arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873). — Мыт (22), Од [7], Серп (23).
C. expertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) (= *Tmeticus expertus*). — М [6].
C. incilium (L. Koch, 1881). — Иc [1], Мыт (22).
C. pubulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) (= *Tmeticus pubulator*). — М [6].
C. prudens (O. Pickard-Cambridge, 1875). — Иc [1],
C. sylvaticus (Blackwall, 1841) (= *Tmeticus sylvaticus*). — М [6], Иc [1], Мыт (22), П [8], Серп (23).
Diplostyla concolor (Wider, 1834) (= *Linyphia concolor*, *Erigone concolor*, *Bathyphantes concolor*, *Stylophora concolor*). — М. обл [2], М [6], Иc [1], Мыт (22), Руз [13], Од [7], Серп (23).
Donacochara speciosa (Thorell, 1875). — Иc [1].
Drapetisca sociatis (Sundevall, 1832) (= *Linyphia socialis*). — М. обл [2], П [8], Од [7], (24), Под [13].
Drepanotylus uncatus (Thorell, 1872) (= *Hilaia uncata*). — Серп (23), Серп. у [4].
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) (= *F. frenata*, *Linyphia frenata*). — М. обл [2], Иc [1], Мыт (22), Од [7], Серп (23).
Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834) (= *Linyphia frutetorum*). — Од [15].
Helophora insignis (Blackwall, 1841) (= *Linyphia insignis*, *L. pallescens*). — М. обл [2], М [4, 6], Иc [1], П [4], Мыт (22), П [8], Од [7], Серп (23), Ст [4].
Koestneria dorsalis (Wider, 1834) (= *Bathyphantes dorsalis*). — П [8], Од [7], Под [5].
Labulla thoracica (Wider, 1834) (= *Linyphia thoracica*). — М. обл [2], Од [15].
Leptophantes alacris (Blackwall, 1853). — Мыт (22), Од [7], Серп (23).
L. angulipalpis (Westring, 1851). — Мыт (22), П [8], Од [7], Серп (23).
L. annulatus (Kulczynski, 1882). — П [8].
L. collinus (L. Koch, 1872). — М [6], Серп [4].

- L. cristatus* (Menge, 1866). — М [6], Иc [1], Мыт (22), Од [7].
L. ericaceus (Blackwall, 1853). — Серп (23).
L. flavipes (Blackwall, 1854). — Серп (23).
L. leprosus (Ohlert, 1867). — П [4], П [8], Од [7].
L. mengei Kulczynski, 1887. — Од [7], Серп (23).
L. minutus (Blackwall, 1833) (= *Linyphia minuta*). — М. обл [2], Серп (23).
L. nebulosus (Sundevall, 1829) (= *Linyphia crypticola*).
L. obscurus (Blackwall, 1849). — М [6], Мыт (22).
L. pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871). — Иc [1], Мыт (22), Серп (23).
L. tenebricola (Wider, 1834) (= *Linyphia tenebricola*). — М. обл [2], М [6], Иc [1], Мыт (22), П [8].
L. tenuis (Blackwall, 1852) (= *L. tenebricola* var. *tenuis*). — Иc [1], Оз [15].
L. zimmermanni Bertkau, 1890. — Иc [1].
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851). — Серп (23).
Linyphia hortensis Sundevall, 1829. — М. обл [2], Иc [1], Под [13], Серп (23).
L. triangularis (Clerck, 1757). — М. обл [2], Иc [1], П [8, 9], Од [7], Под [5, 13], Оз [15].
Macrargus boreus Holm, 1968. — Мыт (22).
M. multessimus (O. Pickard-Cambridge, 1875). — Мыт (22).
M. rufus (Wider, 1834). — М [4], Иc [1], Мыт (22), П [8], Од [7], Серп (23), Серп. у [4].
Maro minutus O. Pickard-Cambridge, 1906. — Мыт (22), Од [7].
M. sublestus Falconer, 1915. — Од [7].
Meioneta gulosa (L. Koch, 1869). — Од [7].
M. rurestris (C. L. Koch, 1836) (= *Micryphantes fuscipalpis*, *M. rurestris*). — М [4], Мыт (22), Серп (23), Оз [4].
M. saxatilis (Blackwall, 1844). — Иc [1], Мыт (22).
Microlynxius pusilla (Sundevall, 1829) (= *Linyphia pusilla*). — М. обл [2, 19], М [6], Иc [1], Мыт (24), П [8], Од [7], Оз [15].
Micronetta viaria (Blackwall, 1841). — Мыт (22), П [8], Од [7], Серп (23).
Neriene clathrata (Sundevall, 1829) (= *Linyphia clathrata*). — М. обл [2], М [6, 13], П [8], Руз [13], Од [7], Серп (23).
N. emphana (Walckenaer, 1842) (= *Linyphia emphana*). — Иc [1], П [8, 9], Од [7], Под [5, 13], Серп [13].
N. marginata (C. L. Koch, 1834) (= *Linyphia marginata*, *L. triangularis* Blackwall, пес Clerck). — М. обл [2], Иc [1], Мыт (24), П [8, 9], Од [7], Ч [13], Серп [13].
N. montana (Clerck, 1757) (= *Linyphia montana*). — М. обл [2], М [6, 13], Мыт (24), П [8, 9], Руз [13], Од [7], Оз [15].

- N. peltata* (Wider, 1834) (= *Linyphia peltata*). — М. обл [2], Кн [4], Д [4], Од [7], Пол [5].
Phalothrix hardyi (Blackwall, 1850). — Мышт (22), Сепр. у [4].
Pityohyphantes phrygiana (C. L. Koch, 1836) (= *Linyphia phrygiana*). — ? М [6], П [8, 9], Руз [13], Пол [13], Сепр (23).
Porrhomma pallidum Jackson, 1913. — Мышт (22), Сепр (23).
P. pygmaeum (Blackwall, 1834). — Мышт (22), Од [7].
P. rosenhaueri (L. Koch, 1872). — Иc [1], П [8].
Rhabdoria diluta (O. Pickard-Cambridge, 1875) (= *Sintula diluta*). — М [4].
Stemonyphantes lineatus (L., 1758) (= *S. bucculentus*, *Linyphia bucculenta*). — М. обл [2], М [4], П [8];
Tapinopa longidens (Wider, 1834). — Иc [1], П [8], Од [7], Сепр (23).

Erigonidae

- Araeoncus crassiceps* (Westring, 1861) (= *Erigone crassiceps*). — М. обл [2], М [6], Иc [1], Д [4].
Asthenargus paganus (Simon, 1884). — Сепр (23).
Ceratinella brevipes (Westring, 1851). — Од [7].
C. brevis (Wider, 1834) (= *Erigone brevis*). — М. обл [2], Иc [1], Мышт (22), П [8], Сепр (23), 3 [17].
Collinsia distincta (Simon, 1884). — Сепр (23).
Cornicularia cuspidata (Blackwall, 1833). — Од [7], Сепр [23].
C. karpinskii (O. Pickard-Cambridge, 1873). — Иc [1].
C. unicornis (O. Pickard-Cambridge, 1861) (= *Erigone unicornis*). — М. обл [2].
C. vigilar (Blackwall, 1853) (= *Walckenaera vigilax*). — П [8], Сепр (23).
Dicyrbium nigrum (Blackwall, 1834). — Мышт (22), Сепр (23).
D. tibiale (Blackwall, 1836). — Иc [1].
Diplocentria bidentata (Emerton, 1882). — Од [7].
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) (= *Erigone bicor-nis*). — М. обл [2], Сепр (23).
D. latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863). — М [6], Иc [1], Мышт (22), Од [7].
D. picinus (Blackwall, 1841). — Иc [1], Мышт (22), Од [7], Сепр (23).
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) (= *Erigone bifrons*). — М. обл [2], Д [4], Пол [5], Сепр (23).
D. elevatus (C. L. Koch, 1838). — ? П [8].
Enidia bituberculata (Wider, 1834) (= *Erigone bitubercu-lata*). — М. обл [2].
E. cornuta (Blackwall, 1833) (= *Dicyphus cornutus*). — П [8].
Entelecara acuminata (Wider, 1834) (= *Erigone atlifrons*). — М. обл [2], М [6], П [8].
E. congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879). — Сепр (23).

- E. erythropolis* (Westring, 1851) (= *Erigone erythropolis*). — М. обл [2], Од [7].
E. flavipes (Blackwall, 1834) (= *Erigone implana*). — М. обл [2].
Erigone atra Blackwall, 1833 (= *E. vagabunda*). — М. обл [2], М [4], Мышт (22), П [8], Од [7], Сепр. у [4].
E. dentipalpis (Wider, 1834). — М. обл [2], М [4], Иc [1], П [8], Сепр (23), Сепр. у [4].
E. longipalpis (Sundevall, 1830). — М. обл [2].
Erigonella hematis (Blackwall, 1841). — Мышт (22), Од [7].
E. ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871). — Од [7], Сепр (23).
Erigonidium graminicolum (Sundevall, 1829) (= *Erigone graminicola*, *Tmeticus graminiculus*). — М. обл [2], П [8], Од [7], Пол [5].
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) (= *Tmeticus dentatus*). — М [4], Сепр (23).
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841). — Иc [1], Од [7], Сепр (23).
G. rubens (Blackwall, 1833) (= *Erigone rubens*). — М. обл [2], Сепр (23).
Gongylidium murcidum Simon, 1884. — Од [7].
Gongylidium rufipes (L., 1758) (= *Erigone rufipes*). — Иc [1], П [8], Од [7], Ч [13], Сепр (23).
Hylyphantes nigritus (Simon, 1881) (= *Porrhomma nigrita*). — М. обл [4], Иc [1], Сепр (23).
Maso sundevallii (Westring, 1851) (= *Erigone sundevalli*). — Мышт (22), П [8], Од [7], Ч [13], Сепр (23).
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854). — Од [7], Сепр (23).
M. subaequalis (Westring, 1851). — Иc [1].
Minyriolus pusillus (Wider, 1834). — Мышт (22), Од [7], Сепр (23).
Moebelia penicillata (Westring, 1851). — Од [7], (24).
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853). — Сепр (23).
Oe. apicatus (Blackwall, 1850) (= *Kulczynskielium apica-tum*). — М [4], Сепр. у [4].
Oe. fuscus (Blackwall, 1834) (= *Kulczynskielium fuscum*). — М [4], Дм [4], Од [7].
Oe. retusus (Westring, 1851) (= *Kulczynskielium retusum*, *Gongylidium retusum*, *Stylothorax retusus*). — М [4, 6], Б [4], Сепр (23), Сепр. у [4].
Oe. tuberosus (Blackwall, 1841) (= *Kulczynskielium tubero-sum*). — М [4], Сепр. у [4].
Panamomops mengei Simon, 1926. — Сепр (23).
P. sulcifrons (Wider, 1834). — Од [7].
Pelecopsis nemoralis (Blackwall, 1841) (= *Lophocarenum ne-morale*). — М [4].
P. radicicola (L. Koch, 1872) (= *Lophocarenum radicicola*). — Иc [1]. Сепр (23).

- Peronocranium ludicum* (O. Pickard-Cambridge, 1861). — Иc [1].
- Pocadicnemis pumila* (Blackwall, 1841). — М [4], Серп [4], (23).
- Prosoptilheca monoceros* (Wider, 1834) (= *Cornicularis monoceros*). — М [4].
- Savignya frontata* Blackwall, 1833 (= *Diplocephalus frontatus*). — Од [7], Серп [4], (23).
- Silometopus elegans* (O. Pickard-Cambridge, 1872). — Серп (23).
- S. reussi* (Thorell, 1871) (= *Cnephilacotes laesus*). — П [8].
- Tapinocyba biscissa* (O. Pickard-Cambridge, 1872). — Мыт (22).
- Tapinocyba pallens* (O. Pickard-Cambridge, 1872) (= *Coloboscyba pallens*). — Иc [1], Мыт (22), Од [7], Серп (23), 3 [17].
- Tapinocyboidea pygmaea* (Menge, 1869). — Мыт (22), Серп (23).
- Tibioplus diversus* (L. Koch, 1879). — Серп (23).
- Trigelinus furcillatus* (Menge, 1869). — Серп (23).
- Tiso vagans* (Blackwall, 1834) (= *Erigone longimana*). — М. обл [2], Мыт (22).
- Trachymella nudipalpis* (Westring, 1851) (= *Walckenaera nudipalpis*). — М [6].
- T. obtusa* (Blackwall, 1836). — Од [7], Серп (23).
- Trematocephalus cristatus* (Wider, 1834) (= *T. perforatus*). — М. обл [4], П [8], Од [7], Серп (23).
- Trichoncus saxicola* (O. Pickard-Cambridge, 1861) (= *Erigone saxicola*). — М. обл [2].
- Trichopterna cito* (O. Pickard-Cambridge, 1872) (= *Lophocarenum cito*). — М [4], Серп (23).
- T. meneei* (Simon, 1884). — Серп (23).
- Troxochrus scabriculus* (Westring, 1851) (= *Erigone scabricula*). — М. обл [2], Од [7].
- Wideria antica* (Wider, 1834) (= *Erigone antica*, *Walckenaera antica*). — М. обл [2], Серп [4], (23).
- W. cucullata* (C. L. Koch, 1836) (= *Walckenaera cucullata*). — М [4], Серп (23).
- W. fugax* (O. Pickard-Cambridge, 1871). — Серп (23).
- W. melanosephala* (O. Pickard-Cambridge, 1881). — Иc [1], Серп (23).

Литература

- Беэр С. А. О наземной фауне пауков Московской области. — Зоол. журн., 1968, т. 47, № 1, с. 131—134.
- Васнер В. А. Акантин. — В кн.: Дигубский И. А. *Primitiae Faunae Mosquensis: Опыт каталога представителей московской фауны*. 2-е изд. М., 1892, с. 117—120.
- Васнер В. А. Список и описание коллекции по биологии пауков. — Коллекция Зоол. кабинета Варш. ун-та, 1895, 4, с. 1—20.
- Грезе Н. С. Дополнения к списку пауков Московской губернии. — Дневник Зоол. отд. О-ва любителей естествознания, 1911, т. 3, № 10, с. 55—61.
- Грезе Н. С. Пауки (Аганеа): Список пауков, собранных в Подольском уезде. — Естеств.-ист. коллекция гр. Е. П. Шереметевой, 1914, 8, с. 1—15.
- Грезе Н. С. Пауки, собранные на снегу. — Изв. Моск. этномол. о-ва, 1915, Т. 1, с. 116—123.
- Михайлов К. Г. Пауки (Arachnida, Aranei) лесной подстилки Звенигородской биостанции МГУ. — В кн.: Фауна и экология почвенных беспозвоночных Московской области. М.: Наука, 1983.
- Перелешина В. И. Фауна пауков окрестностей Большевской биостанции. — Зап. Болш. биост., 1928, № 2, с. 1—74.
- Покровский С. В. Фауна пауков бассейна реки Клязьмы. — Зап. Болш. биост., 1925, № 1, с. 19—25.
- Российский Д. М. Материалы к познанию фауны беспозвоночных Москвы реки. — Дневник Зоол. отд. О-ва любителей естествознания, 1902, № 6, Приложение, с. 3—38.
- Свическая В. И. Биологические наблюдения над пауками. — Зап. Болш. биост., 1935, № 7, 8, с. 173—190.
- Тышленко В. П. Определитель пауков Европейской части СССР. Л.: Наука, 1971, 281 с.
- Фрейберг П. Р. Аканса Московской губернии по материалам, собранным Комиссией для исследования фауны Московской губернии летом 1893 г. — Зап. Дальневосточн. Зоол. отд. О-ва любителей естествознания, 1894, т. 2, № 1, 2, с. 4—11.
- Фрейберг П. Р. Об особенностях фауны пауков берегов Оки. — Дневник зоол. отд. О-ва любителей естествознания, 1895, т. 3, № 3, с. 19, 20.
- Фрейберг П. Р. Аканса, собранные на левом берегу Оки. — Дневник Зоол. отд. О-ва любителей естествознания, 1897, т. 2, № 5, с. 23—39.
- Харитонов Д. Е. Каталог русских пауков. М., Л.: Изд-во АН СССР, 1932, 206 с.
- Харитонов Д. Е. Дополнение к каталогу русских пауков. — Учен. зап. Перм. ун-та, 1936, т. 2, № 1, с. 167—225.
- Freiberg P. Über die Eigenthümlichkeit der Araneidenfauna der Oka-Ufer im Gebiet der Moskauer Gouvernements. — Zool. Anz., 1894, 17, N 462, S. 430—431.
- Freiberg P. Über neues Material zur Araneinen-Fauna des Gouvernement Moskau. — Zool. Anz., 1895, 18, N 492, S. 500.
- Sytshewskaja V. J. Etude sur les Araignees de la Kamtschatka. — Folia zool. hydrobiol., 1935, 8, N 1, S. 80—103.
- Thorell T. Verzeichniss Südrussischer Spinnen. — Horae Soc. Ent. Ross., 1875, 11, S. 39—122.

Комплексы жужелиц (Coleoptera, Carabidae) в лесах подзоны широколиственных-еловых лесов

С. Ю. Грюнтал
Лаборатория лесоведения АН СССР, Москва

Сведения о распределении жужелиц в лесах подзоны широколиственных-еловых лесов Советского Союза приведены в ряде работ отечественных исследователей [Перель, 1962; Шарова, 1971; Грюнтал, 1978а, и др.]. Однако большинство почвенных зоологов изучали комплексы жужелиц выборочно в отдельных лесных ландшафтах (хвойных, лиственных) без учета типологической классификации лесных биогеоценозов. В нашу задачу входило изучение комплексов жужелиц в типичных для подзоны плакорных экотопах и выяснение роли жужелиц как индикаторов лесных биогеоценозов.