[Михайлов К.Г.] 1995. [О поведении пауков] // Природа. Вып. 12. С. 83.

возник по причине поджога с прилегающих ферм или от молнии, а ветер, дующий в разных направлениях, перекрыл животным пути отхода. Случившаяся трагедия выявила проблемы, которые возникают, когда животные резерватов оказываются в замкнутом пространстве.

Wildlife conservation. 1994. V. 97. № 6. P. 8 (США).

●

В индийском штате Арунахал-Прадеш, вблизи бирмано-китайской границы, создается Национальный парк Намдафа площадью 2000 км^2 с тигровым резерватом. Общество научных исследований за счет гранта, полученного от «Дарвиновской инициативы по выживанию видов» (Darwin Initiative for the Survival of Species) уже профинансировало две экспедиции для их организации.

Полагают, что Национальный парк Намдафа станет самым северным в мире заповедником вечнозеленого тропического леса, где под защиту возьмут 150 видов деревьев и 3000 видов других растений. Это единственный в мире национальный парк, в котором одновременно будут обитать четыре вида крупных кошек — тигр, леопард, снежный барс и дымчатый леопард.

Geographical Magazine. 1995. V.67. № 2. P.7 (Великобритания).

●

Оказывается, самки пауков могут иногда предпочесть искусственное изображение натуральному самцу! Эксперименты с одним из североамериканских видов пауков-скакунчиков показали, что его самка проявляет внимание к компьютерной анимации (мультипликации) самца, если изображение движется быстрее, чем в норме.

Michigan Academician. 1994. V.26, № 2. P.406 (США).

●

В Мировом океане, по данным 1994 г., наиболее загрязнены нефтью воды Персидского залива. Ежегодно в него попадает более 1 млн. баррелей (1 баррель = 158.98 дм^3 или 0.14 т сырой нефти). Сбросы с танкеров, утечки из нефтепроводов и терминалов, нефтяные разливы различного масштаба и происхождения привели к тому, что нефтяное загрязнение этой акватории в 100 раз превышает средние значения. Такая ситуация вряд ли вызывает удивление: более сотни танкеров ежесуточно проходит через Ормузский пролив, доставляя потребителям почти пятую часть всего мирового экспорта нефти.

Science et vie. 1995. № 931. P.22 (Франция).

●

Специалисты Исследовательской лаборатории ВМФ США считают, что 20 тыс. лет назад из Северного Ледовитого океана через пролив Фрама в Северную Атлантику дрейфовали огромные айсберги: их надводная часть достигала 30 м, а подводная — порядка 700 м. О таких размерах говорят почти 20-метровые по глубине борозды на океанском дне, протянувшиеся на многие километры. Такие борозды могли возникнуть при движении тех айсбергов, подводная часть которых (так называемые «кили») превышала глубину океана по пути дрейфа.

Geographical Magazine. 1995. V.LXVII. № 1. P.10 (Великобритания).