

СОДЕРЖАНИЕ

Стрепет (Вместо предисловия)	 3
-------------------------------------	---------------

Фауна и население птиц

Белик В.П., Шергалин Е.Э., Франкьен И.Ж. М.М. Алфераки ... 5 – Птицы Нижнего Дона: Non-Passeriformes	
Белик В.П. К летней фауне хищных птиц и сов54 Богдинско-Баскунчакского заповедника	
Русанов Г.М., Литвинова Н.А., Гаврилов Н.Н., Бондарев Д.В.,...60 Литвинов К.В. Современное состояние колониальных гнездовый веслоногих и голенастых птиц, и проблемы их охраны в дельте Волги	

Экология и поведение птиц

Белик В.П. К изучению динамики ареала78 соловьинной широкохвостки в Восточной Европе	
---	--

Охрана птиц

Тильба П.А., Мнацеканов Р.А. Состояние гнездового92 поселения белоголового сипа на хребте Ахмет-Скала (Западный Кавказ)	
Белик В.П. Полевой тетерев: история, современное98 распространение и биология на юге России	

Краткие сообщения

Холбоев Ф.Р. Динамика численности зимующих и гнездящихся.107 птиц в городах Кызылкумского региона	
Музаев В.М. Малый пестрый дятел – новый вид ..112 в фауне Калмыкии	
Маловичко Л.В., Гаврилов А.И. О встречах египетской ..117 цапли на водоемах Кумо-Манычской впадины	

Фауна и население птиц

УДК 598.2: (471.61)

М.М. Алфераки – Птицы Нижнего Дона: **Non-Passeriformes**

В.П. Белик, Е.Э. Шергалин, И.Ж. Франкьен
Мензбировское орнитологическое общество
Музей русской культуры г. Сан-Франциско, США
vpbelik@mail.ru, zoolit@mail.ru, yvesf@yandex.com

M.M. Alferaki – The Birds of the Lower Don River Area. – Belik V.P., Shergalin J.E., Frankien Y.J. – The diary materials of M.M. Alferaki on non-passerines birds (169 species), collected during 1903-1919 in the south of Rostov Region and adjacent regions are represented in the article. The diaries of M.M. Alferaki – the nephew of the famous Russian ornithologist S.N. Alferaki (1850-1918) – are discovered recently in the archives of the Museum of Russian Culture in San-Francisco, USA, before unknown to science. The information of distribution, character of presence, comparative number, phenology of migration and breeding ecology (for some species) and people's (folk) name of birds at the beginning of the 20th century are given for each species on the base of M.M. Alferaki data in the article. Materials of M.M. Alferaki cover the vacuum existed in science on the information on avifauna of extensive steppe region in the south of Russia for the beginning of the 20th century and allow to study on certain material the transformation of avifauna, happened here during the 20th century.

Key words: avifauna, non-passerines birds, Rostov Region, Russia.

Два года назад в журнале «Стрепет» (том 8, вып.2, стр.114-124) была опубликована статья, посвященная натуралисту и охотнику Михаилу Михайловичу Алфераки (1889-1958), в которой рассказывалось о судьбе неизвестного доселе орнитолога из Приазовья (Франкьен, Шергалин, 2010). Это был племянник знаменитого российского орнитолога и энтомолога Сергея Николаевича Алфераки (1850-1918), родившийся в 1889 г. в Санкт-Петербурге, а скончавшийся в 1958 г. в Пирее, в эмиграции в Греции.

Михаил Михайлович Алфераки оставил после себя обширные орнитологические дневники (рис.1), на основе которых планировал подготовить книгу "Птицы Дона". К сожалению, эта его задумка не была осуществлена, и лишь совсем недавно его дневники удалось случайно обнаружить в Америке в Музее русской культуры в г. Сан-Франциско, США. Материалы этих дневников и легли в основу данной работы.




Рис. 1. Первая страница из первой тетради дневников М.М. Алфераки "Птицы Дона"
The first page from the first notebook of M.M. Alferaki diaries "The Birds of the Don River Area"

Михаил Михайлович не был профессиональным зоологом. Он пошел по военной стезе. Но с малых лет, очевидно, под влиянием своего дяди, стал интересоваться охотой и рыбалкой, а затем полевой зоологией. Он старательно заносил в охотничий дневник все сведения о птицах Нижнего Дона, как собранные им самим, так и полученные от других натуралистов и своих многочисленных друзей-охотников. Примечательно, что М.М. Алфераки проводил наблюдения за птицами и в период Гражданской войны, когда Земля Войска Донского стала местом кровопролитных боев, и одни и те же станицы многократно переходили из рук в руки. Последние записи в дневнике были сделаны в январе 1920 г., уже по дороге к г. Новороссийску, в эвакуацию. А начало ведения дневников относится к 1903 г., когда автору исполнилось всего 15 лет.

М.М. Алфераки принимал активное участие в Великой войне (1914-1917), а в Гражданскую (1917-1920) служил в тылу, и всё это время его дневники пополнялись записями. Сейчас кажется чудом, что они благополучно сохранились, пережив две войны и эвакуацию. Хорошо известно, что эмигранты были ограничены в массе и габаритах забираемых с собою вещей и потому брали в дорогу, как правило, только самое необходимое, ценное и важное. Для подавляющего большинства из них это были драгоценности (если таковые были), документы и семейные альбомы. Михаил Михайлович увез с Родины свои полевые дневники. И этот факт говорит, очевидно, об их важности в его жизни.

Поскольку детей у М.М. Алфераки не было, то мы вряд ли сможем когда-нибудь выяснить все подробности его биографии и узнать те черты характера и образа жизни, которые позволяли ему сочетать наблюдения за птицами со службой в Армии, а затем в охране рыбных промыслов на Дону. Знакомясь с дневниками М.М. Алфераки, мы должны быть искренне признательны его супруге – Татьяне Петровне Алфераки (Яновой), которая передала эти дневники на сохранение Анатолию Стефановичу Лукашину. Татьяна Петровна вполне понимала и поддерживала увлечения мужа, с которым нередко выезжала на охоту и даже снимала шкурки с птиц, добытых для коллекции. В своем письме А.С. Лукашину от 25.03.1958 Михаил Михайлович Алфераки пишет: «К моему горю мне пришлось отдать эту коллекцию в один из областных музеев перед моим отъездом из России...». Местонахождение этой коллекции нам еще предстоит выяснить. И как хочется надеяться, что она сохранилась, несмотря на две минувшие Мировые войны!

В своих дневниках, описывая географическое распространение птиц на юге Европейской России, М.М. Алфераки часто цитирует работы известных российских зоологов: "Птицы России" М.А. Мензбира, статьи и книги С.Н. Алфераки, В.Г. Аверина, Г. Сарандинаки, А.А.

Браунера, Г.А. Боровикова, Г.И. Радде, Н.А. Северцова. Он постоянно ссылается также на сведения из неопубликованной рукописи С.Т. Павлова о птицах Области Войска Донского, на наблюдения других знакомых охотников и жителей Донской области.

Вслед за обширными цитатами из М.А. Мензбира, Михаил Михайлович обычно дает замечания и дополнения своего тестя – Петра Ивановича Янова, касающиеся, в основном, птиц Сальских степей в Приманычье, где находился "зимовник" – имение Яновых. Из корреспондентов по числу ссылок, безусловно, лидирует С.Т. Павлов. Например, в первой тетради дневников с материалами по 32 видам гагар, поганок, веслоногих, голенастых и гусеобразных птиц (рис.2) выписки из книги М.А. Мензбира приводятся 30 раз, наблюдения П.И. Янова – 18 раз, а С.Т. Павлова – 20 раз. На работы С.Н. Алфераки (1910), своего дяди, в первой тетради Михаил Михайлович ссылается 7 раз, на статью В.Г. Аверина (1911) – 5 раз, тогда как опросные сведения жителя стан. Новониколаевской, охотника Н.И. Гринева он упоминает 10 раз, а охотника из г. Новочеркасска Ф.Ф. Абухова – 6 раз.

К сожалению, нам не удалось установить все детали биографии Сергея Тихоновича Павлова – куратора зоологической коллекции в Музее донского казачества в г. Новочеркасске. Непродолжительное время он жил в Москве, где в начале 1910-х годов работал редактором журнала «Семья охотников» и состоял в переписке с С.А. Бутурлиным (Шергалин, в печати). Многие корреспонденты М.М. Алфераки участвовали в Гражданской войне на стороне Белой армии, иногда занимали довольно высокие военные посты, и после Гражданской войны вынуждены были покинуть Родину. Некоторые из них знамениты в истории Белого движения. В этом нет ничего удивительного, так как тесть М.М. Алфераки – П.И. Янов – был генералом, и многие его друзья-охотники тоже носили лампасы. По части из этих эмигрантов нам удалось собрать дополнительные сведения, и они будут приведены в Приложении к данной статье.

Дошедшие до нас дневники М.М. Алфераки представляют собой специальные повидовые выписки из охотничьего дневника, зачастую с обобщениями в виде кратких очерков, которые автор начал целенаправленно делать, очевидно, в последние годы жизни в России, а заканчивал уже в эмиграции. После тяжелого ранения 31 августа 1915 г. в боях под Вильно в Первую мировую войну, М.М. Алфераки вынужден был оставить службу в Армии, первое время, по-видимому, инспектировал войсковые конные заводы области Войска Донского, а в 1918 г., при атамане А.П. Богаевском, был назначен на должность Начальника по охране рыбных ловель в гирлах Дона (заповедные воды дельты Дона и Таганрогского залива Азовского моря).




Рис. 2. Содержание первой тетради дневников М.М. Алфераким "Птицы Дона"
Contents of the first notebook of M.M. Alferaki diaries "The Birds of the Don River Area"

В дельте Дона М.М. Алфераки с 10.08.1918 по 26.12.1919 систематически, почти ежедневно вел наблюдения за птицами и собрал, пожалуй, самый значительный объем сведений о фауне Донской области. Но затем под давлением наступавших частей Красной Армии он со своей командой отступил к Кубани, откуда попал в Турцию, а потом в Грецию.

Дневниковые материалы М.М. Алфераки имеют для нас необычайную ценность, поскольку позволяют в какой-то мере заполнить зияющую брешь в наших познаниях орнитофауны степного юга России конца XIX – начала XX вв. По многим соседним регионам на тот период уже имелись крупные обобщающие сводки, в полной мере характеризовавшие состояние их орнитофауны. Так, по Воронежской губернии были опубликованы исследования Н.А. Северцова (1855), С.И. Огнева и К.А. Воробьева (1923), по Нижнему Поволжью вышли обстоятельные работы М.Н. Богданова (1871), В. Яковлева (1872), В.А. Хлебникова (1890, 1928) и В.Н. Бостанжогло (1911), по Ставрополью – Н. Динника (1886), по Крыму – А.М. Никольского (1891), по восточной и южной Украине – Н.Н. Сомова (1897), Б.С. Вальха (1900, 1911), Г.А. Боровикова (1907).

По степному же Придонию в тот период были выполнены всего две специальные работы студентов Новороссийского и Харьковского университетов Г. Сарандинаки (1909) и В.Г. Аверина (1911), и в них была описана орнитофауна лишь небольших районов на южном берегу Таганрогского залива и на Северском Донце в устье р. Деркул.

В небольшой заметке А.А. Браунера (1907) содержались сведения также о птицах среднего течения р. Егорлык на самом юге нынешней Ростовской обл. Обстоятельный же обзор С.Н. Алфераки (1910) по орнитофауне Восточного Приазовья тоже касался, в основном, ограниченной территории на северо-восточном побережье Азовского моря и был сделан, к тому же, очень конспективно.

Исследования М.М. Алфераки охватили почти весь юг области Войска Донского: от Кривой косы на северном побережье Азовского моря (ныне Донецкая обл. Украины), Миусского лимана, Таганрога и Провалья (каменистые степи на Донцеком кряже, теперь Луганская обл. Украины) до стан. Верхне-Курмоярской в Калачской излучине Дона (ныне Волгоградская обл.) и Манычских степей на границе с Калмыкией (рис.3). На Нижнем Дону обширные материалы были собраны в дельте, а также у г. Новочеркасска в Аксайском займище, в устьях Маныча и Сала. Отрывочные данные были получены, кроме того, с Северского Донца и со Среднего Дона (Воронежская и Волгоградская обл.). Во многих районах М.М. Алфераки неоднократно бывал сам – в разные сезоны года, подолгу, в течение 10-15 лет. Кроме того, он постоянно записывал опросные данные профессиональных охотников и местных

любителей птиц, знакомился с имевшимися на Дону частными орнитологическими коллекциями.




Рис. 3. Границы области Войска Донского с округами.

Borders of area of the Don Cossacks with districts.

- 1 – Кривая коса; 2 – Миусский лиман; 3 – г. Таганрог; 4 – стан. Митякинская;
 5 – Провалье; 6 – Горное лесничество; 7 – г. Новочеркасск; 8 – стан. Багаевская;
 9 – стан. Семикаракорская; 10 – р. Кугульта; 11 – стан. Великокняжеская;
 12 – Манычская лечебная станция; 13 – стан. Верхне-Курмоярская.

На врезке – современные границы Ростовской области.

On insertion – the current borders of the Rostov Region

Всё это позволило накопить в дневниках достаточно полные материалы по орнитофауне степного Придонья, прежде всего по 169 видам охотничьих и других крупных неворобьиных птиц. Мелкие же воробьиные, сбор которых сопряжен с рядом ограничений, были изучены несколько хуже, кроме, быть может, некоторых певчих птиц, массово отлавливавшихся для традиционного содержания в неволе. Но фауна воробьиных птиц, по сравнению с охотничьими и другими крупными видами, на юге России не испытывала тогда столь глубокой трансформации, связанной с интенсивным хозяйственным освоением степной зоны в конце XIX – начале XX вв., и начала меняться, в основном, лишь во второй половине XX века.

Следует отметить еще один важный момент, касающийся дневниковых материалов М.М. Алфераки. Автор приводит в них детальные, многолетние сведения по срокам миграций многих видов птиц, которые позволяют теперь судить об изменениях в их фенологии и характере пребывания в связи с трансформациями климата, ландшафтов и других природных условий степного юга. Очень интересны также собранные автором народные названия многих видов, дающие возможность выяснять их значение в жизни местного населения (казаков, калмыков, украинцев), а также восстанавливать научные названия отдельных видов в более ранних публикациях по фауне Дона, в которых отсутствовала латинская номенклатура (Номикосов, 1884; Кондратьев, 1885; и др.).

Отдельно следует сказать, что в дневниках М.М. Алфераки, помимо донской фауны, приводятся интересные сведения и о птицах ряда других регионов, в частности – дельты Терека, где автор коллектировал птиц с 11.09. по 04.10.1912. Чрезвычайно любопытны также материалы о грифах, наблюдавшихся в начале XX в. в окрестностях г. Одессы, которые автор получил от Н.И. Куриса (Алфераки, Белик, Франкьен, Шергалин, 2012). Как писал М.М. Алфераки, за 15 лет он побывал на охоте в 35 губерниях и областях России, в том числе на Среднем Урале, на Ладожском озере, на болотах Волыни и Польши, не говоря уже о дельте Дона, задонских степях и косах Азовского моря... (Франкьен, Шергалин, 2010).

За последнее столетие на Нижнем Дону изменились многие географические названия, что необходимо иметь в виду при знакомстве с материалами М.М. Алфераки. Так, станица Новониколаевская – теперь это г. Новоазовск Донецкой области Украины; стан. Великокняжеская – г. Пролетарск на Западном Маныче; стан. Верхне-Курмоярская когда-то находилась в устье р. Аксай-Курмоярский Котельниковского р-на Волгоградской обл., но в середине XX в. была затоплена водами Цимлянского водохранилища. Все даты в тексте указываются по **старому стилю**,

как они приведены в дневниках М.М. Алфераки. В квадратных скобках в тексте даны авторские пометки.

Сканирование всех дневников выполнил архивариус Музея русской культуры в г. Сан-Франциско Ив Жанович Франккен, сделавший их достоянием орнитологов Северной Евразии, а обработку дневниковых материалов провел В.П. Белик.

* * *

Гагара краснозобая (*Gavia stellata*)

С.Н. Алфераки (1910) имел всего один экземпляр этого вида, купленный осенью в г. Таганроге. М.М. Алфераки не видел этой гагары на Дону вовсе. Сейчас в Ростовской обл. она тоже чрезвычайно редко отмечается как залетная птица (Белик, 1992).

Гагара чернозобая (*Gavia arctica*)

С.Н. Алфераки (1910) не встречал этот вид в Приазовье; он получил лишь один экземпляр, добытый поздней осенью на р. Самбек близ г. Таганрога. С.Т. Павлов отмечал этих гагар только на пролете. М.М. Алфераки наблюдал гагар (sp.) неоднократно: 02.11.1915 на Миусском лимане – 4 птицы; 06.11.1915 на лимане у Кривой косы – несколько птиц; 25.10.1918 и 27.10.1919 одиночные чернозобые гагары плавали на Дону в дельте. Кроме того, у местных охотников имелись 4 чучела чернозобых гагар, добытых весной и осенью у с. Синявского в дельте Дона, у г. Новочеркасска в Донском займище и у стан. Великокняжеской на Маныче.

Поганка малая (*Podiceps ruficollis*)

М.М. Алфераки специально отметил, что ни разу не встречал этот вид, хотя часто охотился в дельте Дона, на Кривой косе, Миусском лимане, лиманах Маныча, в Донских займищах. В настоящее время эта поганка регулярно гнездится по Нижнему Дону и Манычу (Белик, 2000).

Поганка черношейная, ушастая (*Podiceps nigricollis*)

Нырок, нырец, дёмка, нырок истик.

С.Т. Павлов сообщал, что этот вид обычен на прудах коннозаводчиков в Сальском округе; весьма обычен также в пойме Дона у г. Новочеркасска. В начале июня 1917 г. очень много птиц было на прудах в Сальском округе. Много поганок наблюдалось также 05.08.1913 на большом лимане на Кривой косе. Одиночные птицы и пары изредка встречались в других местах. Осенью последняя птица добыта 14.11.1919 в дельте Дона.

Поганка красношейная, рогатая (*Podiceps auritus*)

Отмечена всего 3 раза в дельте Дона: 21.07.1919 добыт одиночный самец; 20.10.1919 птица добыта из пары; 05.11.1919 убита еще одна одиночная птица. В настоящее время этот вид изредка встречается на Дону в период миграций (Белик, 2000).

Поганка серошекая (*Podiceps grisegena*)

Сравнительно редкая птица, встречающаяся несравненно реже большой и ушастой и, пожалуй, реже рогатой поганки. С.Т. Павлов добыл самца 02.05.1901 на Маныче у стан. Великокняжеской. В Сальском округе, проехав с 31 мая по 3 июня 1917 г. около 200 верст лошадьми, М.М. Алфераки встретил лишь одну серошекую поганку, плававшую на пруду по р. Мокрая Кутульта.

Поганка большая (*Podiceps cristata*)

Поганка, нырок, нырец, жеребец, американец, нырок-ушан.

В большом числе гнездится по соленым лиманам Маныча и пресным прудам Сальского округа. Обычна по озерам и лиманам поймы Дона у г. Новочеркасска. В дельте Дона, несмотря на обширность и разнообразие угодий, гнездится редко. Обычна на большом лимане на Кривой косе. Во время пролета, особенно осенью, многочисленна по Дону, по всем озерам, лиманам, прудам и даже небольшим степным речкам, где летом отсутствует. В гирлях Дона осенью иногда появляется в громадном числе и держится стайками по рукавам и на взморье до ледостава. Последние птицы отмечались 11.11.1915; 07.11.1918; 28.11.1919.

Пеликан розовый (*Pelecanus onocrotalus*)

Бабá.

С.Т. Павлов сообщал, что 28.04.1912 добыл самку из стаи, пролетевшей у стан. Великокняжеской, а над лиманом Маныча у балки Сибберты в апреле - мае по утрам ежедневно парила стая до 400 пеликанов, выбиравших удобное место для охоты на многочисленных сазанов, нерестившихся по мелким заливам. Стая из 30 птиц 23.06.1919 охотилась в дельте Дона на взморье. В начале 1900-х годов пеликаны, по опросным данным, были там еще очень обычны, и на них велась регулярная охота для сбора шкур на бурки. В начале 1910-х годов в мае, во время спада воды, пеликаны часто прилетали также в устье Маныча, а затем появлялись там поздней осенью, задерживаясь на 2-3 недели на больших рыбных лиманах у хут. Балабинка. Но их гнездовый там не было.

Баклан большой (*Phalacrocorax carbo*)

Баклан.

По опросным данным, бакланы гнездились на пустынных островах Азовского моря у стан. Новониколаевской на Кривой косе. В начале июня 1913 г. на р. Миус к с. Троицкому во время "низовки" [западный ветер с моря] залетела стайка из 2 взрослых и 3 молодых птиц, возможно – выводок. В дельте Дона 28-29.09.1916 наблюдались стаи по 20-100 птиц, массово летевших на юго-запад. Но в 1918-1919 гг. они встречались там редко. В низовьях Маныча эти птицы не гнездились, но были очень обычны весной и осенью, изредка встречались летом. В окрест-

ностях стан. Романовской [Волгодонский р-н] несколько стай наблюдалось 11.08.1918 на отмелях Дона.

Баклан малый (*Phalacrocorax pygmaeus*)

В дневнике М.М. Алфераки, который был знаком с этим видом по охотам в устье Терека, есть запись о встрече одиночного малого баклана 14.09.1916 на взморье в дельте Дона.

Выпь большая (*Botaurus stellaris*)

Бугай (укр. крестьяне), *водяной бык* (казаки).

С.Т. Павлов писал, что бугай живет всюду, где есть заросли камыша или куги: на соленых лиманах Маныча, по бокаям на побережье Азовского моря, в прогноинах* Донских гирл, по многочисленным озерам Донского займища, по небольшим степным рекам. По мелким речкам Таганрогского округа (Миус, Еланчики, Сарматская) встречается редко, лишь на больших болотах. Много выпей токовало 14.05.1916 на Лимане в стан. Новониколаевской. Прилет первых птиц, по Г. Сарандинаки (1909), отмечен 28.02.1906, но обычно они появляются в конце 1-й декады марта и даже позже. Несколько птиц было встречено 22.03.1917, а первое токование отмечено 22.03.1918 и 31.03.1919, но обе эти весны были поздние.

Выпь малая (*Ixobrychus minutus*)

Малый бугай, *водяной бык*.

Обычный гнездящийся вид лиманов Ростовского и Черкасского округов, а также плавных, заросших камышом степных речек южной части Таганрогского округа: Миуса, Неклиновки, Сарматской, Самбеку, всех трёх Еланчиков. На р. Миус у с. Троицкого 26.06.1916 найдено гнездо с 6 пуховыми птенцами, сделанное на ветке ивы над водой. Два птенца уже выбрались из гнезда на ветки (рис.4).

Кваква (*Nycticorax nycticorax*)

Квак, *квачка*, *квачёк*.

По сведениям С.Т. Павлова, в дельте Дона на старых ивах одного из "садов" по гирлу Егурча в 1912 г. найдена колония, в которой было не менее 100 гнезд. Местами кваквы гнездились также в плавнях по "прогоям". Гнездились они также на большом лимане у стан. Новониколаевской, часто встречались в пойме Дона, но на Маныче наблюдались сравнительно редко. Кваквы изредка встречались также по лесистым балкам в Провальской степи и в других местах Донской области. Весной первые птицы отмечены 23.03.1918. Осенний пролет в дельте

* "Камыш" – тростник (*Phragmites communis*), "куга" – рогаз (*Thipha* sp.); "бокаи" – мелководные илистые озёрки среди лугов; "прогноины" – неглубокие, замкнутые, заросшие розогом, загнивающие понижения или озёрки в пойме.

Дона в 1919 г. закончился, в основном, к концу 1-й декады сентября.

Цапля желтая (*Ardeola ralloides*)

С.Н. Алфераки (1910) на Нижнем Дону не встречал этих цапель, и лишь в начале 1900-х годов в дельте Дона была добыта 1 птица. М.М. Алфераки в начале июня 1918 г. добыл самца желтой цапли также на степном пруду в Провальской степи, а в течение июня - июля 1919 г. в дельте Дона было зарегистрировано до 10 встреч этих цапель, в том числе 13.06.1919 – группы по 2-3-4 особи. При этом 5 птиц было добыто. Кроме того, С.Т. Павлов получил молодую птицу, добытую в середине августа на Дону у стан. Багаевской.



Рис. 4. Гнездо малой выпи, найденное 26.06.1916
The Little Bittern nest found 26.06.1916

Цапля белая большая (*Egretta alba*)

Белая чепура, большая белая цапля.

Довольно обычна в дельте Дона, регулярно встречаясь местами в одиночку и небольшими группами. Здесь в колонии серых цапель 14.07.1919 найдены 2 гнезда белой цапли, в одном из которых еще находились пуховики. Общая численность птиц в колонии была значительно больше. По опросным данным, эти цапли гнездились в пойме Дона у г. Новочеркасска. На Маныче были обычны весной и осенью, а летом встречались очень редко. Весной первые цапли в дельте Дона встречены 09.04.1919, а последние записи в дневнике датированы 15.09.1916; 04.09.1918; 08.09.1919. После сентября птицы не встречались.

Цапля белая малая (*Egretta garzetta*)

Малая белая чепура, малая белая цапля.

По наблюдениям С.Т. Павлова, гнездится в дельте Дона и по бо-

каям у стан. Новониколаевской, но с каждым годом становится всё реже. В 1918-1919 гг. в дельте Дона М.М. Алфераки зарегистрировал всего 5 встреч, в том числе 13.06.1919 стайку из 7 особей. По опросным данным, в небольшом числе гнездится у г. Новочеркаска, часто встречается у стан. Багаевской, но на Маныче обычна только весной и осенью.

Цапля серая (*Ardea cinerea*)

Чепура, цапля, чапля.

Обычная, а в подходящих местах многочисленная гнездящаяся птица Таганрогского, Ростовского, Черкасского и Сальского округов. В некоторых местах (Кривая коса, дельта Дона, лиманы Маныча и Донского займища) гнездится [встречается] большими колониями. Обычна по всем, даже небольшим степным речкам, крупным и глухим прудам и озерам. Численность заметно колеблется по годам, причем асинхронно с рыжей цаплей. В дельте Дона среди непролазных зарослей старого "камышы" 14.07.1919 найдена колония около 10 гнезд. Весенний прилет на Маныче и в дельте Дона отмечен 29.03.1918 и 25.03.1919.

Цапля рыжая (*Ardea purpurea*)

Рыжая чепура, цапля, чапля.

В Таганрогском, Ростовском, Черкасском и Сальском округах обычна на гнездовье как по обширным болотам, так и по небольшим степным речкам. Обычно встречается в одиночку и парами, но в кормных местах собирается в стаи. Много птиц держится в дельте Дона и на Маныче.

Колпица (*Platalea leucorodia*)

Колт, колтик.

По сообщению С.Т. Павлова, колония была известна на заросших камышом малодоступных "прогноинах" в Донских гирлах выше "Комитета", где колпицы регулярно отмечались также летом 1919 г. По опросным данным, они встречались по Дону в устье Маныча, в значительном числе гнездились выше, у стан. Верхне-Курмоярской, и по озерам урочища Цаган-нор уже в Астраханской губернии, но с каждым годом их было всё меньше. Выраженный пролет в дельте Дона наблюдался во 2-й половине марта, отлёт осенью – в основном в начале сентября, но однажды пара встречена 17.10.1910.

Каравайка (*Plegadis falcinellus*)

Каравайка (казаки), черный кронинеп (крестьяне), ибис-каравайка.

По опросным данным, в середине XIX в. была довольно обычна на Маныче, но потом исчезла; в конце XIX в. довольно много караваек держалось в "Бирючьем куту" в устье р. Тузлов у г. Новочеркаска; в середине мая 1911 г. стайки наблюдались у оз. Монастырского в пойме Дона близ г. Аксая. В начале XX в. залетные птицы изредка отмечались

на Маныче у стан. Великокняжеской, где 03.05.1911 был добыт самец, 16.09.1911 – молодая птица, а 17.08.1919 встречены 25-30 птиц, а также в дельте Дона (08.09.1912) и на Кривой косе (30.08.1913; 12.04.1914).

Аист белый (*Ciconia ciconia*)

Черногуз, чернохвост.

Изредка отмечались залетные птицы: 02.05.1918 аист пролетел через Дон у стан. Манычской; 16.04.1919 вечером птица кружилась над стан. Елизаветовской в дельте Дона. По опросным данным, в пойме Дона у г. Новочеркасска аисты встречались почти ежегодно: их дважды добывали в мае у стан. Заплавской; в августе встречали у стан. Багаевской; стая из 20-30 птиц кормилась 21.07.1904 в степи по р. Юта [Аюта-?] близ г. Новочеркасска. С 1907 г. аисты стайками по 3-15 особей регулярно встречались на пролете в степи по Манычу у стан. Великокняжеской. В.Г. Аверин (1911) наблюдал пару аистов 14.05.1910 у стан. Митякинской, но их гнездовый там не было.

Аист черный (*Ciconia nigra*)

По словам С.Т. Павлова, стайки по 5-13 особей неоднократно встречались у стан. Кочетовской на Нижнем Дону. А.Г. Корнелио добыл аиста осенью 1904 г. у Ростова. Пара птиц встречена 20.08.1919 также на лиманах Маныча. М.М. Алфераки видел черного аиста лишь однажды 21.06.1918 в Грушевой балке в Провальской степи. Это была линная самка с грязно-кирпично-красными ногами и клювом, кормившаяся по ручью среди густого байрачного леса, с выюном в зобу.

Фламинго (*Phoenicopterus roseus*)

Красный гусь.

По сведениям С.Н. Алфераки, относящимся к 1889 г., на Кривой косе фламинго был добыт из пары, а у стан. Старочеркасской эти птицы появлялись "не особенно редко, но в малом числе".

Казарка черная (*Branta bernicla*)

По опросным данным, есаул стан. Новониколаевской, расположенной у Кривой косы, в октябре 1910 г. добыл 20 белолобых казарок, среди которых оказались также 3 черные казарки. Еще одна черная казарка была добыта осенью 1906 г. в дельте Дона (Сарандинаки, 1909).

Казарка краснозобая (*Rufibrenta ruficollis*)

По сообщению С.Т. Павлова, пролетает весной и осенью в небольшом числе в стаях белолобых гусей. Молодой самец был куплен им 13.10.1908 в г. Новочеркасске; другой самец добыт в апреле 1912 г. у стан. Великокняжеской. В дельте Дона из стаи в 4 птицы 28.10.1918 убита самка.

Гусь серый (*Anser anser*)

Крыжняк, крыжневой гусь, галун (калмыки).

В дельте Дона в значительном числе гнезвился по заросшим

"прогноинам" на кучах старого камыша или в кочкарниках. В июле 1918 г. на взморье только у судоходного канала учитывали до 6-7 стай по 8-80 особей. В 1909 г. у ерика Зеленкова казаки собрали 50 яиц гуся, а 30.03.1919 два жителя хут. Рогожкино взяли 60 и более 100 яиц. В гнезде, найденном в дельте 25.03.1919, было 4 свежих яйца; в 1910 г. там найдено гнездо с 8 яйцами. По Манычу гуси встречались до устья реки, гнездясь обычно по заросшим "гирлам", где русло расширялось в лиманы. Местами гнезда гусей с кладками по 5-7 яиц находили там также среди кустов "сибирька" по балкам в степи в 2-4 верстах от воды. Выводки уходили оттуда на пруды, а затем на лиманы. С середины июля они поднимались на крыло и по утрам стаями летали кормиться на хлебные поля. В начале XX в. гуси были там обычны, но в 1910-е годы стали редки. Местами они гнездились к востоку от стан. Великокняжеской. Летом в небольшом числе держались также на Кривой косе.

Гусь белолобый (*Anser albifrons*)

Казарка, казарá (множ. число).

Массовый мигрант, летящий вдоль побережья Азовского моря и Дона и через Маныч. Начало весеннего пролета в низовьях Дона отмечали 26.02.1912; 20.02.1916; 18.02.1918; 28.02.1919. Осенью на Миусском лимане первые птицы появлялись 13.09.1905; 09.09.1909; 21.09.1911; 11.09.1912; в дельте Дона – 10.09.1918 и 23.09.1919. В дельте 29.09.1909 на рассвете наблюдался "громадный лёт казарок" на запад, и там на взморье на отмелях собралось несколько десятков тысяч птиц (рис.5). На Маныче, если осень была дождливая, и свежей зелени в степи было много, казарки летели с середины сентября до ноября, но если было сухо, то гуси пролетали незаметно стороной. Огромное число гусей собиралось осенью на Миусском лимане, откуда они летали кормиться в степь иногда за несколько десятков верст. Очень много гусей останавливалось также на Кривой косе. Ночевали они там на россыпях, т.е. на морских отмелях, а утром, еще затемно, летели в степь на стерни и зелена, где кормились до 9-10 час. Затем гуси возвращались на россыпи, где оставались до 12-14 час., а потом опять летели в степь и кормились до захода солнца. Когда выпадал снег, они весь день проводили в степи. В годы, когда был неурожай в полях, гуси летели на зимовку через Ейск и Ахтари, расположенные в Восточном Приазовье.

Белый гусь *Chen caerulescens*

В окрестностях г. Новочеркасска 23.03.1913 наблюдали 10-12 белых гусей, пролетевших на средней высоте над разливами в пойме Дона.

Лебедь-кликун (*Cygnus cygnus*)

Лебедь.

По словам С.Т. Павлова, кликун обычен на Дону в оба пролета.

Весной первых птиц отмечали 21.02.1916 и 28.02.1919. Осенью же в дельте Дона первые появились 06.10.1918 и 02.10.1919, а массовый пролет шел 10.12.1919, когда Дон уже замерз. Вес кликунов, добытых в марте 1918 г., составлял 9,6 кг (самец), 10,8 кг (взрослый) и 6,8 кг (молодой).




Рис. 5. Осенний пролет белолобых гусей в дельте Дона 29.09.1909
The autumn passage of the White-fronted Geese in the Don River delta 29.09.1909

По сведениям П.И. Янова, в 1870-е и даже в 1880-е годы лебеди гнездились на лиманах Маныча. На озера в низовьях Маныча (оз. Круглое, Песчаное, Кулаковское) лебеди в небольшом числе встречались в 1910-е годы почти каждое лето, а однажды там в июле была добыта молодая птица. Летом 1918 г. (июль - август) три лебедя держались также в дельте Дона. А в 1915 г. пара лебедей гнездилась на большом лимане у Кривой косы*.

Огарь (*Tadorna ferruginea*)

Огарь, гагара, гагарка, красная гагара.

По собранным сведениям, в начале XX в. был обычен на Нижнем Дону в районе стан. Пятиизбянской, Верхне- и Нижне-Чирской, Верхне-

* Опросные сведения о гнездовании лебедей на Дону и в Приазовье относятся, возможно, к лебедю-шипуну (*Cygnus olor*), которого сам М.М. Алфераки не наблюдал. Никаких сведений о гнездовании шипуна в Приазовье не имел и С.Н. Алфераки (1910), отмечавший его здесь только на весеннем пролете.

и Нижне-Курмоярской, а также на Среднем Дону в Усть-Медведицком округе, где гнезился в норах по оврагам правобережья или в дуплах старых ив и диких груш среди пойм Дона и Чира. Весной там собирали много яиц из гнезд, устроенных в дуплах верб. Изредка огарь отмечался в низовьях Дона у г. Новочеркасска, чаще встречался за Доном у стан. Багаевской. В дельте стайку наблюдали 17 октября. На Маныче в 1890-е годы огари нередко появлялись стайками летом и осенью, но их гнездование там не было известно.

Пеганка (*Tadorna tadorna*)

Гагара, рябак.

По сообщению П.И. Янова, обычна на Маныче, где гнездится в норах по глинистым береговым обрывам, иногда – в старых сурчинах или в лисьих норах, изредка по заброшенным зимовникам калмыков. В мае 1887 г. там найдена старая лисья нора, из которой вылетели 2 пеганки, а на глубине около 2 аршин раскопали 22 свежих яйца. Обычно же кладки состоят из 9-11 яиц. Близ Вагнеровской Грузской Санитарно-Лечебной станции на Маныче 01.10.1916 наблюдали массовый пролет пеганок, преобладавших там среди всех других очень многочисленных уток. На Нижнем Дону у г. Новочеркасска пеганка очень редко пролетает весной. Пара пеганок 25.07.1913 встречена на Кривой косе, где они случайно отмечаются ежегодно.

Кряква (*Anas platyrhynchos*)

Крыжень, крыжак, материк, матеровой, матеруха.

Гнездится на многих реках и озерах Донской области. На Маныче наиболее многочисленная из гнездящихся уток, нередко устраивая там гнезда в степи в нескольких верстах от воды. В начале июня на Маныче собираются, вероятно на линьку, сотенные стаи самцов. Осенью кряквы задерживаются на Дону до конца ноября, а на Азовском море у Кривой косы регулярно зимуют на полыньях.

Чирок-свистунок (*Anas crecca*)

Чирок, чирёнок, грязнушка.

Это один из самых обычных и многочисленных видов уток, гнездящихся в Донской области*.

Утка серая (*Anas strepera*)

Нерозень, полукрыжень, полуматёрка, середовая, серяка.

По сообщению П.И. Янова, серая утка обычна на гнездовье по Манычу, но значительно уступает в численности широконоске, крякве и чиркам. Летом эту птицу добывали у стан. Ольгинской в низовьях Дона

* Чирок-свистунок на Нижнем Дону сейчас гнездится редко, преимущественно в более северных районах, где в долинах рек имеются заболоченные леса. Южнее в большом количестве появляется только на пролетах.

(03.04.1917), на Песчаном лимане в низовьях Маныча (29.07.1918), на р. Сал близ стан. Семикаракорской (02.06.1909), на Маныче в Сальском округе (12.07.1919).

Связь (*Anas penelope*)

Свистуха, свистун, гого́лка.

Обычная пролетная птица Таганрогского, Ростовского, Черкасского, Сальского и 1-го Донского округов. Никаких сведений о ее гнездовании в Донской обл. нет. Весной прилетает рано, уже в конце февраля, одной из первых уток, и встречается в течение всего марта, изредка – до середины апреля. Летит днем и ночью большими стаями в основном на северо-восток. Летом лишь однажды, 08.07.1918, одиночная самка, возможно подранок, была добыта у г. Новочеркасска. На обратном пролете появляется в середине августа, в сентябре обычна, в октябре – начале ноября – многочисленна.

Шилохвость (*Anas acuta*)

Шилохвость, нерозень.

Обычна на пролетах, появляясь весной одной из первых уток (14.02.1919). Летом встречалась редко: две птицы добыты 7 и 17.07.1909 на р. Сал близ хут. Балабинка; 10-11.05.1917 много птиц наблюдалось на разливах у стан. Грушевской Черкасского округа. По опросным данным, на лугах в низовье Маныча изредка находили гнезда и выводки этой утки. Весной несколько раз наблюдалось токование и преследование самки группами самцов (09.04.1914 – устье р. Грузской Еланчик; конец марта 1918 г. – низовья р. Маныч).

Чирок-трескунок (*Anas querquedula*)

Чирок, чирёнок.

Многочислен на пролётах, местами обычен на гнездовье. Весной часто держится парами. На разливах у стан. Грушевской Черкасского округа много трескунок было 11.05.1917. На разливах Дона у стан. Манычской 09.05.1918 добыты 2 птицы, а 30.07.1918 там же на Песчаном лимане – 3 трескунка. Одиночная самка добыта 02.06.1919 в дельте Дона.

Широконоска (*Anas clypeata*)

Широконоска, шипуха, шлепаноска, шлепанос, лопанос, рябчик.

Обычная птица Донской области, гнездящаяся по озерам, лиманам и ерикам Донского займища и встречающаяся как на широких луговых угодьях (дельта Дона, Кривая коса), так и по небольшим степным речкам. Гнездо с 10 свежими яйцами найдено 06.05.1912 на Маныче в Сальском округе. Много широконосок было 11.05.1917 на разливах у стан. Грушевской Черкасского округа. Много их было также 31.05.-03.06.1917 на лиманах Маныча и степных прудах на западе Сальского округа.

Нырок красноносый (*Netta rufina*)*Синяк.*

В Сальском округе на Маныче, по словам П.И. Янова, редок, встречается только на пролете, чаще – в одиночку. Сведения о встречах на Дону в дневнике М.М. Алфераки отсутствуют.

Чернеть красноголовая (*Aythya ferina*)*Красноголовая гоголка.*

Гнездится на Маныче, от устья и выше, постепенно увеличиваясь в числе по направлению к востоку. Очень обычна на степных прудах в Сальском округе. В дельте Дона летом пара нырков встречена лишь однажды 13.06.1919.

Чернеть белоглазая (*Aythya nyroca*)

В Сальском округе на Маныче, по словам П.И. Янова, этот нырок не гнезился и лишь изредка наблюдался на пролетах. Но 3 и 13.07.1919 на лиманах Маныча были добыты 2 птицы. Изредка их добывали в дельте Дона (20.04.1911 – самец; 19.08.1919 – 2 молодые птицы), а также в устье Маныча (07.05.1918 – самка из пары).

Чернеть хохлатая (*Aythya fuligula*)*Черныш, чернь.*

Обычный пролетный вид, держащийся весной и осенью в пойме Нижнего Дона, на Маныче, на Миусском лимане и на лимане у Кривой косы. Одиночные самцы изредка встречаются летом в дельте Дона: 15.06.1919; 13.07.1919.

Чернеть морская (*Aythya marila*)*Гоголка.*

На пролете по Манычу в Сальском округе значительно уступает в численности хохлатой чернети. Редко отмечалась в дельте Дона (29.09.1909; 22.10.1919) и на Миусском лимане (26.09.1911).

Морянка (*Clangula hyemalis*)

По сведениям С.Т. Павлова, самка морянки была добыта однажды в районе г. Ейска.

Гоголь обыкновенный (*Bucephala clangula*)

Встречается на пролете в различных районах. Одиночный самец был добыт 18.07.1909 в окрестностях хут. Балабинка близ стан. Семикаракорской, но характер его пребывания остался неясен. С.Т. Павлов считал гоголя редким гнездящимся видом Донской обл. Им на Лебяжьем лимане близ стан. Новониколаевской 2 мая была добыта самка с гнезда, но М.М. Алфераки поставил в дневнике этот факт под сомнение.

Турпан обыкновенный (*Melanitta fusca*)

В дельте Дона 20.11.1919 добыт одиночный самец с мелкими раковинами [судя по рисунку – *Cardium* sp.] в зобу и желудке. Еще одна

птица добыта 03.10.1903 в Сальском округе на Маныче.

Савка (*Oxyura leucocephala*)

Синеклювая гоголка (Маныч, Сальский округ).

Одиноклая птица добыта 09.09.1909 у хут. Балабинка в 12 верстах от стан. Семикаракорской. Самец добыт 24.04.1911 у стан. Великокняжеской. М.М. Алфераки встретил стайку из 15 птиц, в том числе 5 самцов и 10 самок, 29.03.1919 в дельте Дона; из нее были добыты самец и самка. По опросным данным, изредка встречается на Маныче в Сальском округе.

Луток (*Mergus albellus*)

Северная утка.

По словам С.Т. Павлова, обычен на обоих пролетах, иногда задерживается до 19 декабря, а весной появляется в конце февраля. По наблюдениям М.М. Алфераки, очень обычен на пролете в Таганрогском, Ростовском, Черкасском и Сальском округах (дельта Дона, озера в пойме Дона, лиманы Маныча, Миусский лиман, Кривая коса). Весенний пролет заканчивается уже в начале апреля. Осенью появляется в начале октября, а разгар пролета наблюдается в ноябре, когда в дельте Дона лутки, держащиеся стаями до 50-60 особей, преобладают среди всех уток.

Крохаль длинноносый (*Mergus serrator*)

Две одиночные самки добыты 13 и 16.10.1912 на полыньях р. Миус у с. Троицкого. Еще одна самка добыта из пары 02.12.1918 в дельте Дона у г. Азова. В зобах обнаружены бычки и уклейки длиной по 7-10 см.

Крохаль большой (*Mergus merganser*)

Обычен на обоих пролетах в Таганрогском, Ростовском, Черкасском и Сальском округах. Весной встречается обычно в первой половине апреля, но значительно реже, чем осенью. Осенью держится стаями до 10-20 особей с конца октября - начала ноября и до ледостава, но разгар пролета наблюдается в ноябре.

Скопа (*Pandion haliaetus*)

Скопа-рыбница, шкапа.

Отдельными парами ежегодно гнездится в наиболее глухих и рыбных местах в дельте Дона на взморье. По наблюдениям С.Т. Павлова, в 1910 г. пара всё лето держалась у кордона "Маячного", а летом 1919 г. М.М. Алфераки неоднократно наблюдал пару птиц возле Лоцмейстерского поста. Гнезда делает в старых заброшенных садах или в непроходимых крепях на пластах старого, помятого водой тростника. Нередка на Сев. Донце (Аверин, 1911). По Нижнему Дону регулярно пролетает весной и осенью, но на лиманы Маныча даже не залетает. В Приазовье встречается редко и только на пролете. Весной появляется в конце марта - начале апреля (23.03.1913; 05.04.1914; 09.04.1919),

а осенью пролет идет с середины августа до середины октября (14.09.1916; 16.10.1916; 19.08.1918; 30.09.1919).

Осоed обыкновенный (*Pernis apivorus*)

Шулика, шульпика (укр. крестьяне).

Очень обычная, дважды пролетная птица Таганрогского, Ростовского, Черкасского и Сальского округов. В Приазовье весной летит в конце апреля - начале мая (28.04.-02.05.1913), а осенью пролет начинается с середины августа (13.08.1903; 15.08.1907; 10.08.1909; 15.08.1916), на 1-2 дня раньше канюков, и продолжается до середины сентября, но отдельные особи встречаются и позже. Осенью численность птиц значительно выше, и в это время по вечерам перед ночевкой они собираются над садами в стаи до 100-300 особей. На Маныче близ стан. Великокняжеской 2 птицы добыты 4 и 11.05.1912.

Коршун черный (*Milvus migrans*)

Коршун (Провалье).

Обычен в Провалье, где гнездится в байрачных лесах (19.05.1917 там найдено гнездо), а кормится трупами сурков и падалью на скотомогильнике, возле которого летом (17.06.1918) собирается в стаи до 40 особей. Обычен на Сев. Донце (Аверин, 1911). В Таганрогском и Ростовском округах летом редок: пара встречена 07.06.1906 на р. Мокрый Еланчик, 15.06.1910 коршун добыт у с. Новопавловка в Глухой балке, где раньше видели его гнезда, 13.07.1919 молодой коршун добыт в дельте Дона. Пролет выражен слабо. Весной первый коршун отмечен 28.03.1918 в устье Маныча.

Лунь полевой (*Circus cyaneus*)

Шулика, шульпика.

Много полевых луней было морозной снежной зимой в середине февраля 1917 г. на р. Миус у с. Троицкого (13.02.1917 там добыт самец). Много полевых луней было также 03.08.1913 на Кривой косе, где добыты и точно определены 2 самки.

Лунь степной (*Circus macrourus*)

Лунь, шулика, шульпика.

В южной части Таганрогского округа – наиболее обычный, самый многочисленный гнездящийся вид луней. Много этих луней было в мае 1918 г. также на Маныче у хут. Веселого. В долине р. Миус близ с. Троицкого в посевах ржи на опушке терновых зарослей 07.05.1916 найдено гнездо с 4 насиженными яйцами. Летом в разное время было добыто 18 самок, 1 самец и 6 особей неопределенного пола. Массовый пролет на запад наблюдался вечером 13.09.1905 на р. Мокрый Еланчик. Много пролетных луней было также 14.09.1916 в дельте Дона. Весной первый самец степного луня добыт 23.03.1917 в устье Маныча. На Миус-

се 11.08.1909 добыта самка-урод, с 3 пальцами на левой лапе, причем на 2 пальцах отсутствовали когти, и не было никаких признаков, что они имелись у птицы ранее (рис.6). Степные луни (но только самки) часто, но безуспешно охотились на домашних голубей, сорок, камышниц. Близ своих гнездовых их всегда преследовали тревожившиеся касатки.




Рис. 6. Естественные уродства
на лапе самки степного луны, добытой 11.08.1909
The natural deformities on the Pallid Harrier foot
shot 11.08.1909

Лунь луговой (*Circus pygargus*)

Шулика, шульника.

Довольно обычный гнездящийся вид южной части Таганрогского округа, но встречается значительно реже степного и болотного. На Миусе близ с. Троицкого на плешине диаметром около сажени среди трудно проходимых зарослей терна 11.06.1906 найдено гнездо с 5 пуховыми птенцами, возле которого добыты и определены самец и самка.

Лунь болотный (*Circus aeruginosus*)

Весьма обычная гнездящаяся птица южной части Донской области: в дельте и пойме Дона, на лиманах Маныча, по всему Ростовскому и Таганрогскому округам. Весной первые встречи в низовьях Дона регистрировались 22.03.1917; 29.03.1918; 25.03.1919.

Тетеревятник (*Accipiter gentilis*)

На юге Донской области не встречался ни разу. По опросным данным, этого ястреба наблюдали однажды в конце марта 1912 г. в старом заброшенном саду близ с. Новопавловка Таганрогского округа.

Перепелятник (*Accipiter nisus*)

Воробьятник.

Очень обычная гнездящаяся, многочисленная пролетная и отчасти зимующая птица Таганрогского, Ростовского, Донецкого, Черкасского и Сальского округов. Осенью пролет отмечался с середины августа - начала сентября (15.08.1903; 11.09.1905; 22.08.1907; 03.09.1909; 20.08.1910; 20.08.1916). На Миусе 27-28.08.1907 наблюдался массовый пролет ястребов, из которых 2 птицы были добыты. Летом 2 птицы добыты 19.07.1904 и 19.07.1907 на р. Мокрый Еланчик. Там же 24.04.1913

наблюдалась самка*.

Тювик (*Accipiter brevipes*)

В.Г. Аверин (1911) нашел гнездо тювика на Сев. Донце у стан. Митякинской Донецкого округа. Больше никаких сведений о тювике нет.

Зимняк (*Buteo lagopus*)

Много зимняков прилетает в Донскую область на зиму. Особенно многочисленны они были в 1912 г. в степях по Манычу. По данным Г. Сарандинаки (1909), они появляются у Азовского моря только в суровые зимы, а в мягкие зимы здесь не встречаются. В 1916-1919 гг. птицы регулярно отмечались все зимы, появляясь обычно в конце октября - ноябре (30.11.1916; 05.11.1917; 28.10.1918; 28.11.1919).

Курганник (*Buteo rufinus*)

Похожая, судя по окраске, птица встречена 23.05.1918 в степи близ хут. Веселого на Маныче.

Канюк обыкновенный (*Buteo buteo*)

Шулика, шульлика (укр. крестьяне).

Многочисленная, дважды пролетная птица Таганрогского, Ростовского и Черкасского округов. Изредка гнездится по старым байрачным лесам в Провалье, возможно и в некоторых других лесах (Горное лесничество в Черкасском округе, Глухое лесничество на севере Таганрогского округа). На пролете, особенно осенью, сарыч чрезвычайно многочислен, стаями до 200-300 особей собираясь перед посадкой на ночевку в леса или сады, в том числе в городские (Таганрога, Новочеркасска). Осенью первых птиц в Приазовье регистрировали 13.08.1903; 09.08.1905; 15.08.1907; 28.08.1909; 24.08.1910; 15.08.1916; 18.08.1919. Весенний пролет в Северном Приазовье не выражен. В низовьях Дона первых птиц встречали 26.03.1918 и 20.03.1919. Около 50 добытых сарычей можно разделить по окраске на 2 группы: кофейно-рыжие снизу, с частыми поперечными пестринами, и грязно-белые, с редкими продольными темно-бурыми стержневыми пятнами. Кроме того, можно выделить ряд промежуточных типов. Но при определении все они были отнесены к *B. b. vulpinus*; большой же сарыч (*B. b. vulgaris*) не встречен ни разу.

Змееяд (*Circaetus gallicus*)

Змееяд, охотившийся на постоянном месте всё лето с весны, встречен в Провалье в 1917 г. впервые за 10 лет. Он был добыт в начале

* Данные М.М. Алфераки о гнездовании перепелятника на юге Донской области, в частности находки ястребов на р. Мокрый Еланчик, могут относиться к тювику, позже обнаруженному во многих местах Нижнего Дона (Белик, 1986; Белик, Ветров, 1998). Вполне возможно, что и среди пролетных ястребов в августе - сентябре тоже могли быть тювики, определение которых даже по добытым птицам нередко приводило к ошибкам (см.: Белик, Ветров, 1998).

августа, а позже там же в глухой, заросшей старым лесом балке Разоренной наблюдалась еще одна птица, что позволяет предполагать ее гнездование. В зобу у добытой птицы оказались 4 гадюки.

Орел-карлик (*Hieraetus pennatus*)

Дважды пролетная птица южной части Таганрогского округа. Чаще встречается осенью. В Приазовье появляется в конце августа, в разгар пролета осоедов и канюков (28.08.1907; 04.09.1909; 17.09.1911). На Миусе у с. Троицкого наблюдался также в мае: 13.05.1913. – темный карлик; 20.05.1913 – пара светлых птиц. Карлики светлой фазы наблюдались чаще.

Орел степной (*Aquila rapax*)

По сведению С.Т. Павлова, в начале мая 1910 г. в Провальском Войсковом конном заводе была добыта самка с гнезда, сделанного из прутьев на макушке тернового куста. В гнезде было 2 насиженных яйца. На сенокосах по р. Аюта близ г. Новочеркасска из гнезда был взят еще не оперившийся птенец. В конце XIX в., по данным Г.Сарандинаки (1909), много орлов гнездились на скирдах сена в степи у с. Маргаритовка к югу от Таганрогского залива. В Сальском округе близ стан. Эркетиновской 19.08.1916 в степи был добыт молодой орёл-урод с 4 лапами, чучело которого осмотрено в 1918 г.* Его размеры: длина тела – 72,7 см; длина крыла – 50,5 см. На правой добавочной лапе у него было 3 пальца неправильной формы (рис.7).




Рис. 7. Естественные уродства у степного орла, добытого 19.08.1916
The natural deformities in the Steppe Eagle shot 19.08.1916

* В дневниках М.М. Алфераки этот орел определен как большой подорлик. Но довольно подробное описание окраски птицы и ее размеры свидетельствуют, что это был, скорее всего, молодой степной орел. В пользу этого определения говорит и район встречи птицы – Сальские степи в Дубовском р-не Ростовской обл.

Подорлик большой (*Aquila clanga*)

Орел, подорлик.

Одиночные пролетные птицы отмечались в Приазовье с конца августа (09.09.1905; 27.08.1907; 13.09.1909; 01.09.1910; 04.09.1918), первые две из них были добыты. Самка большого подорлика добыта также 12.06.1918 в Провальской степи на дереве (длина тела – 66 см; крыло – 50 см; хвост – 25,5 см; клюв по сгибу – 42 мм). Однажды подорлик наблюдался летом (18.05.1919) в дельте Дона.

Орлан-белохвост (*Haliaeetus albicilla*)

По опросным данным, в 1918 г. пара орланов гнездилась в старом заброшенном Полушкином саду в дельте Дона. Случайные встречи в дельте Дона отмечались в осенне-зимний период: 15.09.1916 (1 птица); 08.11.1918 (1); 24.11.1919 (3). Вечером 23.11.1919 в саду Лоцмейстерского поста на взморье на ночевку устроились 7 птиц (рис.8). Довольно много орланов держалось на взморье 28.11.1919.



Рис. 8. Орланы-белохвосты на ночевке в дельте Дона 23.11.1919
The White-tailed Eagles on roost in the Don River delta 23.11.1919

Стервятник (*Neophron percnopterus*)

С.Н. Алфераки (1910) видел пару стервятников на падали близ г. Таганрога.

Гриф черный (*Aegypius monachus*)

По данным С.Н. Алфераки (1910), у стан. Николаевской Таганрогского округа однажды появилось 12-15 грифов, державшихся там несколько дней, то разлетаясь, то собираясь вместе на ночевку. В коллекции С.Т. Павлова была шкурка грифа, пойманного в степи у стан. Великокняжеской из стаи в 8-10 птиц. Еще один гриф был убит под стан. Нижне-Чирской.

Сип белоголовый (*Gyps fulvus*)

С.Н. Алфераки (1910) добыл сипа в конце августа близ г. Таганрога. По сведениям С.Т. Павлова, 2 сипа из стаи в 8-9 птиц были убиты в начале сентября 1909 г. в дельте Дона. По опросным данным, такие же грифы гнездились [встречались - ?] в степи у стан. Верхне-Курмоярской и дальше к востоку в калмыцких степях.

Сапсан (*Falco peregrinus*)

В коллекции С.Т. Павлова было чучело сапсана, добытого у г. Ейска, а молодой сокол из Воронежской обл. жил у него в неволе. В Приазовье и на Нижнем Дону отмечены 3 встречи: 11.09.1905 на р. Мокрый Еланчик, 26.09.1911 на Миусском лимане, а 30.03.1918 в низовьях Маныча сапсан поедал добытого чирка-свистунка.

Чеглок (*Falco subbuteo*)

Кобчик (неправильно).

Обычная гнездящаяся птица Донской области, значительно уступающая в численности кобчику и обыкновенной пустельге. Гнездование известно на Сев. Донце (Аверин, 1911), в байрачных лесах Провалья, в дельте Дона, в рощах и глухих садах южной части Таганрогского округа.

Дербник (*Falco columbarius*)

Кобчик (неправильно).

В 1901-1903 гг. несколько дербников добыто на р. Мокрый Еланчик. Самец добыт 26.09.1911 на Миусском лимане. В 1911 г. еще дважды отмечались похожие соколы. По данным В.Г. Аверина (1911), самка дербника добыта 14.07.1910 в устье р. Деркул на Сев. Донце.

Кобчик (*Falco vespertinus*)

Кобчик, кобец, скобец, скобчик.

Широко распространен в Таганрогском, Ростовском, Черкасском и Донецком округах. В подходящих местах всюду обычен, местами – очень многочислен. Численность по годам колеблется, причем в годы обилия обыкновенной пустельги кобчики встречаются реже, и наоборот. Гнездится, как правило, колониями в лесах, рощах, запущенных степных садах, терновниках, среди которых есть крупные деревья, по лесным куртинам в поймах рек. Гнезда чаще всего устраивает в грачевниках, иногда в дуплах. Гнездо с 4 еще нелетными птенцами найдено 24.07.1904 в дупле вербы у р. Мокрый Еланчик. В терновниках по Миусу в сорочьем гнезде 24.06.1916 найдены 4 оперявшихся птенца.

Пустельга степная (*Falco naumanni*)

Кобчик, кобец, трясушка.

Довольно обычная гнездящаяся птица южной части Таганрогского округа, но ее численность здесь значительно меньше, чем у обыкновенной пустельги, составляя около 2-3% от всех добытых мелких соко-

лов. Эта пустельга добыта на Сев. Донце в низовьях р. Деркул (Аверин, 1911), дважды – в конце августа на Миусе (31.08.1909; 24.08.1910). В дельте Дона пролетевшая степная пустельга наблюдалась 16.03.1919.

Пустельга обыкновенная (*Falco tinnunculus*)

Кобчик, кобец, скобец, трясушка.

Весьма обычный, местами многочисленный вид южной части Таганрогского округа, часто гнездящийся по старым глухим садам, нередко в колониях грачей. Иногда встречается зимой (24.01.1917 на р. Миус). В некоторые годы преобладает среди мелких соколов, в другие, наоборот, доминирует кобчик. На Миусе в лесу у с. Троицкого 26.06.1916 найдено гнездо обыкновенной пустельги с 4 почти оперившимися птенцами. Там же 22.05.1917 осмотрены 2 гнезда – с 4 свежими яйцами и с 3 только что вылупившимися птенцами. Однажды пустельги гнездились там в разломанной скворечнице. В 1916-1919 гг. обыкновенные пустельги в значительном числе гнездились в г. Новочеркасске: в Соборе, в зданиях Областного правления, Судебных Установлений, Мариинской женской и Платовской мужской гимназий, за вывеской Центральной гостиницы, а также в редких случаях на наиболее высоких деревьях небольших садов. В зданиях птицы чаще всего селились под оторванным краем листа кровельного железа, в отдушниках и за вывесками*.

Тетерев (*Lyrurus tetrix*)

По опросным данным, в 1910-1918 гг. тетерева в небольшом числе встречались на целине, поросшей тернами, на правом берегу Среднего Дона близ стан. Перекопской Усть-Медведицкого округа, но с каждым годом становились там всё более редкими.

Куropатка серая (*Perdix perdix*)

Куropатка, курупатка (казаки), курипка (укр. крестьяне).

Очень обычная оседлая птица Донской области. В последние десятилетия численность сильно уменьшилась, в основном из-за уничтожения терновников в степи и по балкам. Там же, где заросли тёрна сохранились, например в Провальском войсковом конном заводе (22.000 га), и нет истребления куропаток зимой, они очень многочисленны до сих пор. В Сальском же округе в Приманычье, благодаря более мягким и менее многоснежным зимам в последние 15-20 лет, численность куропаток увеличилась. В большом количестве они гибнут в суровые зимы, а осенью во время дальних миграций нередко разбиваются о телеграфные провода. В Таганрогском округе 14.06.1911 на поле найдено гнездо

* Сведения о гнездовании в городе на зданиях относятся, возможно, к степной пустельге (см.: Алфераки, 1910).

с 19 яйцами. В Приманычье куропатки гнездятся недалеко от терновых балок и на целине в степи; в кладках обычно 12-15 яиц.

Перепел (*Coturnix coturnix*)

Перепел, перепёлка.

Многочисленная гнездящаяся птица. Весной прилетает обычно в первой половине апреля (24.04.1913; 03.04.1917; 08.04.1919), гнездится в степи, на лугах и в хлебах. 17.06.1911 в Таганрогском округе найдено гнездо с 11 яйцами; в Сальском округе находили гнезда с 16 яйцами. Токуют птицы до начала августа. Активное токование слышно в определенные часы: перед зарей, на заре до солнечного пригрева, днем около 17 час., сразу после захода солнца, ночью около 23 час. Перед отлетом перепела в большом числе собираются в Приазовье. Пролет длится весь сентябрь; в Приазовье последние птицы отмечались 18.09.1905; 22.09.1909; 17.09.1911. Как исключение, одиночки встречаются в конце октября (22.10.1919 – дельта Дона).

Стерх (*Grus leucogeranus*)

С.Н. Алфераки (1910) писал о добыче одной птицы из пары в 1880-х годах в степи у с. Лысая Горка в Таганрогском округе, а С.Т. Павлов в 1916 г. сообщал, что в коллекции М.И. Дехтяревского есть чучело стерха, добытого на весеннем пролете у г. Ростова. По Нордману, стерх встречается ежегодно весною на пролете в Екатеринославской губ., т.е. рядом с Таганрогским округом (цит. по: Мензбир, 1895).

Журавль серый (*Grus grus*)

Луговой журавль, болотный журавль.

По наблюдениям С.Т. Павлова, встречается тысячными стаями на обоих пролетах. На гнездовании редок, держится в основном по пустынным займищам Дона и Маныча. Гнездо с 1 свежим яйцом найдено им 07.05.1912 на небольшом мелком лимане с невысоким рогозом в пойме Маныча в низовьях р. Мокрой Кугульты. Оно располагалось на чистом месте посреди лимана, так как рогоз вокруг гнезда был вытоптан, и представляло собой кучу зеленого рогоза диаметром 1,5 аршина. Лоток возвышался над водой на 3 вершка и был выстлан старым рогозом. Весной первых птиц регистрировали 28.02.1912 (г. Новочеркасск), 23.03.1917 (стан. Багаевская), 26.03.1918 (низовья Маныча). Осенью они отмечались с 10.09.1909 (р. Миус) и с 26.09.1911 (Миусский лиман).

Красавка (*Anthropoides virgo*)

Степной журавль, степовой журавль, тогорул (калмыки).

По сведениям С.Т. Павлова, в большом числе обитает в степях по Манычу, Салу и дальше на восток в Калмыцкой степи в Сальском округе. Прилетает обычно в конце марта огромными стаями, которые сразу разбиваются на пары. В Задонских степях гнездится преимущественно

на целине или старых залежах на открытых местах по буграм. Но в Приазовье, у стан. Новониколаевской и близ г. Мариуполя, как и в Екатеринославской губ. (Боровиков, 1907), гнездится исключительно в хлебных полях. Возможно, именно переходом этих красавок к гнездованию в полях можно объяснить отсутствие их гнездовых в обширной целинной степи Провальского Войскового конного завода площадью 22.000 га, хотя в окрестных полях они гнездятся. В конце лета эти журавли сбиваются в огромные стаи, а вскоре после 15 августа, намного раньше серых журавлей, отлетают на зимовку.

По наблюдениям П.И. Янова, красавки прилетают в Приманычье в начале апреля. Гнездятся на целине, а с появлением молодняка уходят в бурьяны или хлеба. В начале июля они сбиваются в стаи от 10 до 200 особей и начинают летать кормиться на хлебные поля. В 1880-х годах красавок там было столь много, что они наносили очень существенный вред, разбивая копны хлеба, и специальными объездчиками приходилось разезжать по полям и холостыми выстрелами распугивать стаи журавлей. Ночуют стаи у воды; утром, еще в темноте, птицы вылетают на пашни, где кормятся до 7-8 час., а затем летят на водопой. После водопоя и плясок, стаи поднимаются в небо и с несмолкаемым криком долго кружатся на большой высоте. Вечерняя кормежка начинается примерно с 19 час. и продолжается 1,5-2,0 часа, после чего журавли летят на ночевку. На зимовку улетают в первой половине августа, а позже встречаются лишь отдельные особи. Вечером 10.09.1918 крик одиночного степного журавля отмечен над дельтой Дона*.

Пастушок (*Rallus aquaticus*)

По данным С.Н. Алфераки (1910), изредка гнездится в Приазовье. В августе и сентябре 1919 г. пастушки постоянно отмечались на одном из ериков в дельте Дона. Случайная птица встречена 28.08.1910 на Миусе. Одиночный пастушок наблюдался 07.01.1920 на степной речке близ стан. Крыловской в Кубанской обл.

Погоныш (*Porzana porzana*)

Курочка.

Обычный гнездящийся вид, наиболее многочисленный из погонышей. Обитает на заросших реках, озерах, прудах и болотах. Птицы добывались на Миусе и в дельте Дона с начала августа (09.08.1907) до середины сентября (18.09.1909; 18.09.1911; 13.09.1919). Однажды на р. Мокрый Еланчик этот погоныш добыт летом – 25.07.1904. В низовьях Маныча птица наблюдалась 19.03.1918.

* В это время на Нижнем Дону начинается осенний пролет серых журавлей, и определение красавки по голосу могло быть ошибочным.

Погоныш малый (*Porzana parva*)*Курочка.*

В южной части Таганрогского округа этот погоныш довольно обычен, но встречается значительно реже обыкновенного. Дважды добыт на р. Миус у с. Покровского (28.08.1910 и 28.08.1911).

Погоныш-крошка (*Porzana pusilla*)

С.Т. Павлов видел чучело этого погоныша, добытого в конце апреля в пойме Дона у стан. Багаевской. Случаи добычи погоныша-крошки в июле - августе в Донской области неоднократно отмечал в своих охотничьих дневниках Е.И. Балабин, но ни малого, ни обыкновенного погоныша он не встречал, поэтому достоверность определения этого вида нуждается в подтверждении.

Коростель (*Crex crex*)*Коростель, дергун, дергач, деркач.*

Обычная гнездящаяся птица Донской области. По сведениям П.И. Янова, гнездится также в Приманычье, но гнезд там находить не приходилось. Держится коростель по полям, окраинам болот, лугам, сырým балкам в степи. Осенью на пролете его численность сильно увеличивается и он вместе с перепелом встречается по сухим местам в степи, бурьянах, кукурузе и пр. Гнездо с 9 свежими яйцами найдено 09.06.1911 на высокотравном болоте у с. Новопавловка Таганрогского округа. Осенью последние коростели отмечены 21.09.1911 и 13.09.1919.

Камышница (*Gallinula chloropus*)*Курочка, большая курочка.*

Встречается на многих водоемах Донской области. Весной первая птица отмечена 22.03.1917 у г. Новочеркасска. Последние осенние регистрации приходились на сентябрь, в том числе на р. Миус (15.09.1905; 02.09.1910; 29.09.1911) и в дельте Дона (06.09.1919).

Лысуха (*Fulica atra*)*Лысуха, лыска, курочка.*

Очень обычная, местами многочисленная гнездящаяся птица Таганрогского, Ростовского, Черкасского и Сальского округов. Встречается на большинстве степных речек и прудов южной части Таганрогского округа, особенно много птиц на лиманах Кривой косы. Обычна в дельте и пойме Дона, очень многочисленна на лиманах Маныча и на прудах в Сальском округе. Некоторые жители стан. Манычской на лиманах в низовьях Маныча ежегодно собирают яйца лысух, набирая за одну "охоту" по несколько сотен яиц.

Дрофа (*Otis tarda*)*Дудак, драхва, дрофа, тодэк (калмыки).*

По сообщению С.Т. Павлова, в хлебных полях в 35 верстах от

стан. Новониколаевской 05.05.1911 найдено гнездо с 2 средне насиженными яйцами, лежавшими на земле среди редкой низкой поросли хлеба. Еще одно гнездо с сильно насиженными яйцами найдено 05.05.1912 в Сальском округе по р. Мокрая Кугульта, где дрофы охотно гнездятся по залежам в вершинах и отнoжинах балок. Самцы держались там стаями по 50-60 птиц. 31.05.-03.06.1917 в западной части Сальского округа за 4 дня пути на лошадях по степи встречено 6-7 стаяк по 7-20 птиц. В Таганрогском округе в окрестностях с. Марьевка на толоках*, стерне и целине 20.08.1907 встречены 3 табунка из 19, 16 и 3 птиц. В Провальском конном заводе Черкасского округа на обширной целине (20.000 га) дрофы, как и красавки, гнездятся очень редко. Там 22.05.1917 встречена лишь 1 пара птиц.

Стрепет (*Tetrax tetrax*)

Стрепет, стрепеток, дёштэ-яман (калмыки).

В Приманычских степях стрепет был очень многочислен в 80-90-е годы XIX в., когда при охоте на самцов на токах за зорю добывали до 5-9 птиц. Очень много их было там до середины 1910-х годов, но затем они вдруг исчезли, и в начале июня 1917 г. за 4 дня пути в основном по целинным степям в районе стан. Шаблиевки – Великокняжеской не было встречено ни одного стрепета. В Провальских степях 12.05.1917 встречены всего 3 стрепета, причем, по опросным данным, их численность там тоже сильно уменьшилась в самые последние годы, хотя площадь целинных степей по-прежнему составляла около 20.000 га. В 1910-1913 гг. еще много стрепетов было в целинной степи в 25 км к западу от стан. Новониколаевской. В Таганрогском округе на целинном участке у с. Марьевка 20.08.1907 встречены 2 стрепета, а 23.09.1909 – 36 птиц. По скошенным полям у р. Мокрый Еланчик 04.09.1909 учтено несколько стаяк по 5-16 особей, а 20.09.1909 – стая из 15 птиц. В гнездах стрепета, по сведениям П.И. Янова, находили до 5-9 яиц. В июле птицы держались еще выводками, а в начале августа собирались на поlynных участках степи в стаи по 50-200 птиц. В конце августа или в начале сентября они обычно улетали на зимовку. Пищей им часто служили цветки и листья одуванчика.

Дрофа-красотка (*Chlamydotis undulata*)

По сообщению С.Т. Павлова, эта дрофа была убита Л.А. Мозгалевским близ стан. Должанской Ейского отдела Кубанской обл., а по опросным данным, похожих птиц встречали в восточной части Задонских степей. В конце августа 1912 г. одиночная птица была добыта так-

* Толоки – очень сильно сбитые пастбища в окрестностях сёл или кошар, имеющие низкий и редкий травяной покров.

же близ стан. Николаевской 1-го Донского округа при охоте на стрепетов.

Авдотка (*Burhinus oedicnemus*)

Казак, бугровой кулик (по: Аверин, 1911)

По сообщению С.Т. Павлова, в степи в 12 верстах от стан. Великокняжеской 04.05.1912 добыта пара птиц (самец и самка).

Тулес (*Pluvialis squatarola*)

По С.Т. Павлову, весной наблюдается сотенными стаями по всему побережью Азовского моря. Прилетает в конце марта и держится до начала мая, после чего встречаются лишь одиночные особи. Самка добыта им 03.05.1911 на лимане у моря. М.М. Алфераки предполагал, что данные С.Т. Павлова относятся, возможно, к золотистой ржанке. Тулес же встречается редко: 2 самца добыты 25.07.1913 у стан. Новониколаевской и 01.08.1918 у г. Новочеркасска; пара добыта также 29.09.1919 в дельте Дона. Там же стайки встречены 15 и 27.10.1919.

Ржанка золотистая (*Pluvialis apricaria*)

Сивка, лобанчик.

По опросным данным, в значительном числе ежегодно пролетает на Кривой косе. Там 11.04.1914 из стаи добыты 2 самца и 2 самки. Эти стаи до 60-80 птиц кормились на зеленях в степи, а на ночь летели на солонцы. Ржанок добывали также 04.04.1917 у стан. Ольгинской и 10.05.1917 у стан. Грушевской.

Галстучник (*Charadrius hiaticula*)

Изредка добывались птицы, державшиеся в одиночку или стайками: 28 и 29.08.1910 у с. Покровского Таганрогского округа (1 и 2 птицы); 26.09.1911 на Миусском лимане у с. Николаевка; 15.09.1916 в дельте Дона; 06.07.1913 на Кривой косе. Там же 06.08.1913 появилось много пролетных галстучников, а 27.08.1919 стайка из 15 птиц встречена в дельте Дона.

Зуек малый (*Charadrius dubius*)

О гнездовании в Донской обл. у стан. Митякинской на Сев. Донце сообщал В.Г. Аверин (1911). На Дону у хут. Пухляковского 4 птицы добыты 26.07.1913. На Миусском лимане у с. Николаевка 2 зуйка добыты 27.08.1911. Малых зуйков неоднократно добывали на Кривой косе: 09.04.1914 (1 птица); 03.05.1911 (1); 27.07.1913 (5). Однако в 1913 г. в период с 5 июля по 6 августа они отмечались там лишь один день.

Зуек морской (*Charadrius alexandrinus*)

На солонцах у Кривой косы 08.04.1914 наблюдали несколько пар, отводивших от гнезд. В середине июля 1913 г. на Кривой косе встречен выводок пуховиков. Много этих зуйков, державшихся стайками до 15-40 особей, появилось там 01.08.1907 (добыто 7 птиц), но на следующий день их было уже значительно меньше. Там же 06.08.1913 наблюдался

пролет стаек по 6-15 особей.

Хрустан (*Eudromias morinellus*)

Туртушка.

Встречался только на осеннем пролете, часто – стаями по 20-60 особей, обычно вместе с чибисами, тиркушками и скворцами. Днем держится преимущественно у воды, а под вечер – в степи на толоках. Стаи встречались 19 и 23.08.1907 близ Миусского лимана, 25.08.1909 в дельте Дона и 21.09.1909 на р. Мокрый Еланчик, а 04.08.1913 у стан. Новониколаевской добыта одиночная, очевидно первая пролетная птица.

Кречетка (*Chettusia gregaria*)

В Сальском округе по р. Кугульта в долине Маныча 2 одиночные птицы добыты 18.07. и 16.08.1905. По сведениям С.Т. Павлова, самец был куплен 30.03.1908 на базаре в г. Новочеркасске.

Чибис (*Vanellus vanellus*)

Чибис, чибиска (казаки), *чайка* (крестьяне), *заркэ* (калмыки).

Очень обычная, широко распространенная гнездящаяся птица. Весной прилетает в конце февраля - начале марта, с первыми проталинами. С.Т. Павлов видел первого чибиса у г. Новочеркасска 20.02.1916, а в дельте Дона они встречены 27.02.1919. Гнездится в поймах, у озер и лиманов, по болотам, мокрым балкам, близ степных рек и прудов. Очень много чибисов гнездится на Кривой косе, в дельте и пойме Дона, на лиманах Маныча. В конце лета они собираются в стаи, которые значительно увеличиваются в сентябре. Вместе с ними держатся тиркушки, хрустаны, скворцы и грачи. Стаи кормятся утром и под вечер в степи по толокам, на свежей пахоте, реже на жнивье, а днем улетают к воде. Последние чибисы исчезают в начале ноября (07.11.1918) с наступлением морозов.

Камнешарка (*Arenaria interpres*)

Пролетный вид, ежегодно появляющийся около середины июля (17.07.1913 – Кривая коса) в обширных водно-болотных угодьях южной половины Донской обл. (дельта Дона, Кривая коса). Держится обычно в одиночку или в стайках других куликов, реже – отдельными стайками по 3-6 особей. Последние птицы отмечались в конце августа - сентябре (28.08.1913 – Кривая коса; 14.09.1916 – дельта Дона)

Ходулочник (*Himantopus himantopus*)

Царский кулик, красноногий кулик.

В небольшом числе гнездится на Кривой косе, где 12.05.1916 добыта пара, тревожившаяся у гнезда. Пара птиц добыта 01.05.1912 у г. Новочеркасска. Обычен ходулочник на гнездовании по соленым озерам и пресным прудам в Сальском округе на Маныче. Прилетает сюда весной в начале апреля, улетает в конце августа.

Шилокловка (*Recurvirostra avosetta*)

Чеботарь, сапожник, шилоклов.

По сведениям С.Т. Павлова, местами в большом количестве гнездится на соленых лиманах Маныча. П.И. Янов неоднократно находил там гнезда по берегам соленых озер. В 1910 г. пара залетных птиц добыта в пойме Дона у г. Новочеркасска. На Кривой косе птицы были отмечены 29.06.1913, и там же 11.04.1914 встречена пара. По опросным данным, шилокловки ежегодно бывают там на весеннем пролете, но не гнездятся. На Маныче осенью птицы регистрировались до 06.09.1905 и 05.09.1919.

Кулик-сорока (*Haematopus ostralegus*)

Кулик-сорока, "сорока".

Обычный пролетный вид Нижнего Дона, отмечался также на Кривой косе (11.04.1914). На Маныче одиночки изредка встречались с конца июля до сентября. Весной в низовье Дона появляется с конца марта (24.03.1919) и встречается до середины - конца апреля (30.04.1913; 14.04.1919). За весну 1919 г. в дельте Дона учтено 15 встреч (130 птиц), в том числе 3 стаи по 12-20-60 особей. На обратном пролете на Нижнем Дону они отмечались с 22.07.1913; 18.08.1916; 10.08.1918; 11.08.1919. В августе 1918 г. много одиночных птиц и небольших стаяк держалось по отмелям Дона между стан. Аксайской и Багаевской.

Черныш (*Tringa ochropus*)

Речной кулик.

По словам М.М. Алфераки, черныш – обычная гнездящаяся птица Донской области, без которой не обходится ни одно болото, речка или мокрая балка. Избегает лишь песчаных и солонцеватых берегов и поэтому редко встречается на морском побережье и соленых лиманах. Весной прилетает в середине - конце марта (30.03.1918; 16.03.1919), во время гнездового периода изредка встречается в одиночку (26.05.1913 – Миусский лиман; 07.05.1918 – Дон в устье Маныча; 08.06.1918 – балки Провалья) и лишь с середины июля вновь часто наблюдается выводками (по 4-6 птиц)*.

Фифи (*Tringa glareola*)

Весной отмечался с конца апреля (25.04.1913) до середины мая (12.05.1916; 11.05.1917; 09.05.1918), а затем появлялся в разные сроки в июле - августе: 22.07.1904; 02.08.1907; 21.08.1909; 22.08.1910; 27.08.1911; 07.07.1913; 23.07.1914; 24.08.1916; 10.08.1919.

* Черныш на Нижнем Дону является пролетным видом, весной пролетающим обычно до начала мая, а на обратных миграциях появляющимся в середине июня (Белик, 1990). Поэтому летние (в июне - июле) встречи одиночек и небольших стаяк, в которых черныши обычно держатся на пролете, в прошлом нередко приводили к ошибочному мнению о гнездовании этих птиц.

Улит большой (*Tringa nebularia*)*Тёлка большая.*

Немногочисленный пролетный вид. На Кривой косе в июле 1913 г. был редок. Чаше встречается с конца августа. Осенью последние птицы отмечались 14.09.1912 и 29.09.1919. Весной встречались с 22.03.1917.

Травник (*Tringa totanus*)*Просянка, тёлкун, тёвкун.*

На лиманах Маныча и степных прудах в Приманычье – обычная гнездящаяся птиц, местами встречающаяся в очень большом числе. Там на пруду по р. Мокрая Кугульта 06.05.1912 найдено гнездо с 4 насиженными яйцами и 1 птенцом. Гнездится также на Кривой косе и в других местах Донской области.

Щеголь (*Tringa erythropus*)

С.Т. Павлов добыл 2 птиц 02.05.1912 у стан. Великокняжеской. Остальные встречи имели место, в основном, в июле - сентябре. Наиболее поздняя птица добыта 01.10.1918 у г. Новочеркаска.

Поручейник (*Tringa stagnatilis*)*Тёлка малая.*

Гнездование на Нижнем Дону неизвестно, хотя возможно в соседних районах. Холостые птицы изредка задерживаются в Приазовье на лето (12.05.1916 – Кривая коса). Впервые М.М. Алфераки встретил поручейника 02.08.1907 на Кривой косе, а в июле 1913 г. там оказалось очень много пролетных птиц. Первые поручейники появились 07.07.1913, а массовый лёт стайками до 20 особей начался 24.07.1913. Много птиц летело до 2 августа, но 6 августа они полностью исчезли. Весной первые птицы регистрировались 10.04.1914 (Кривая коса), 04.04.1917 (стан. Ольгинская Черкасского округа), 30.03.1918 (низовья Маныча).

Перевозчик (*Actitis hypoleucos*)

Широко распространенная гнездящаяся птица Донской области, обычная по берегам всех рек и речек (Миус, все Еланчики, Сарматская, Самбек и др.), а также по берегу Азовского моря. Обитает по песчаным и каменистым берегам проточных вод, избегая заросших болот и стоячих водоемов*. Весной первых птиц отмечали 25.04.1913; 30.04.1918; 14.04.1919. Летом стайка (выводок) из 4 птиц встречена 29.06.1913 на Миусе у с. Троицкого. Обычно же они появлялись в июле - августе (08.07.1904; 15.07.1907; 09.08.1909; 20.08.1910; 12.08.1916; 20.07.1919).

* М.М. Алфераки дал точную характеристику биотопических предпочтений перевозчика, но ошибся в определении характера его пребывания на Нижнем Дону. Сейчас его гнездовья достоверно найдены лишь на Среднем Дону и на Сев. Донце у стан. Митякинской, а на юге Ростовской обл. с конца июня появляются птицы, начинающие ранние послегнездовые миграции (Белик, 1990, 1999, 2000).

Мородунка (*Xenus cinereus*)

В течение всего июля - начала августа 1913 г. была обычна, но немногочисленна на мелких, голых лиманчиках (бокаях) на Кривой косе, где было добыто 30 птиц. Еще 1 птица добыта 06.08.1918 на р. Кадамовка близ г. Новочеркасска.

Плавунчик круглоносый (*Phalaropus lobatus*)

Поплавок.

Довольно обычная дважды пролетная птица, более многочисленная осенью. На Кривой косе птиц отмечали с 02.07.1913, а в низовьях Дона первые птицы на обратных миграциях регистрировались 16.08.1903; 04.08.1907; 26.08.1909; 01.08.1913; 17.08.1916; 06.08.1919.

Турухтан (*Philomachus pugnax*)

Турахтан, просянник.

Очень обычная дважды пролетная птица Таганрогского, Ростовского, Черкасского и Сальского округов. На небольших степных реках встречается сравнительно редко. На Кривой косе по численности примерно соответствует краснозобику (в июле 1913 г. за месяц добыто 113 птиц)*. Весной в низовья Дона прилетает обычно в последней декаде марта (23.03.1917; 30.03.1918; 09.04.1919), а массовый пролет идет в апреле. На осеннем пролете появляется в начале июля, а массовый пролет наблюдается с середины июля до середины августа, иногда – до середины сентября.

Кулик-воробей (*Calidris minuta*)

Орешек.

Многочисленный пролетный вид, которого добывали только на осенних миграциях. На Кривой косе отмечался с начала июля (05.07.1913) и до начала ноября (06.11.1915). Массовый пролет идет в конце августа - начале сентября, когда птицы обычны в низовьях Дона. Здесь первые кулики регистрировались 15.08.1903; 16.08.1909; 22.08.1910; 27.08.1911; 27.08.1916; 29.08.1918; 06.08.1919. Последняя встреча в дельте Дона – 27.10.1919.

Песочник белохвостый (*Calidris temminckii*)

Орешек.

Встречался ежегодно на осеннем пролете, обычно в одиночку, реже – стайками по 3-7 особей. Добыты 3 птицы: 24.07.1904 на р. Мокрый Еланчик; 01.08.1907 и 24.08.1916 на Кривой косе. В численности значительно уступает кулику-воробью.

* М.М. Алфераки провел на Кривой косе с 05.07. по 06.08.1913, почти ежедневно охотясь с профилями на куликов на илистых озерах – "бокаях".

Краснозобик (*Calidris ferruginea*)

Обычная, местами многочисленная дважды пролетная птица. Особенно много птиц летит в течение всего июля на Кривой косе (за месяц добыто 111 птиц); обычны они на Миусском лимане и Маныче; регулярно встречаются в дельте Дона. Выше по Дону отмечаются редко. Осенью на Маныче последние птицы зарегистрированы 07.11.1917.

Чернозобик (*Calidris alpina*)

Обычная дважды пролетная птица. На Кривой косе в июле 1913 г. чернозобиков было в 4-5 раз меньше, чем краснозобиков (добыты 24 птицы). В дельте Дона в большом количестве появляется во время "верховки", когда восточный ветер выгоняет воду из Таганрогского залива и на взморье обнажаются обширные илистые отмели (29.09.1909 – стаи по 20-100 птиц; 21.10.1919 – стаи до 600 птиц).

Песчанка (*Calidris alba*)

Одинокая птица добыта 22.07.1913 на песчаной косе Дона у хут. Пухляковского.

Грязовик (*Limicola falcinellus*)

Массовый пролет идет на Кривой косе. В 1913 г. птицы появились там 26 июля, а 3 августа наблюдались большие стаи до 500 особей. Одиноким птицам отмечались 16.08.1909 на Миусском лимане, а у г. Новочеркасска 28.08.1918 из стайки добыто 6 птиц.

Гаршнеп (*Limnocryptes minimus*)

Встречается в небольшом числе весной и осенью на пролете. Весной регистрировался 24.03.1917 (стан. Багаевская) и 04.04.1914 (р. Неклиновка). Осенью отмечался с конца августа (28.08.1911 – р. Неклиновка) до начала ноября (02.11.1912 – р. Неклиновка; 05.11.1917 – Маныч).

Бекас (*Gallinago gallinago*)

Бекас, бекарик.

Многочисленная, дважды пролетная птица южной части Донской области. Сведений о гнездовании здесь нет. В гнездовой период изредка встречается на обширных болотах (Кривая коса и др.), но это, по-видимому, холостые птицы. Однажды в дельте Дона токующий бекас наблюдался осенью – 13.09.1919. Весной птиц летит значительно меньше, чем осенью. В последнее время, по сравнению с 80-90-ми годами XIX в., их численность заметно сократилась. На болотах в верховьях Миусского лимана С.Н. Алфераки добывал тогда до 140 бекасов в день! Весной на Нижнем Дону появляется в марте (27.03.1918; 16.03.1919), а на Маныче в теплые годы – в начале марта и даже в конце февраля. Летом пролет начинается в середине июля, максимум наблюдается в августе – начале сентября, а последние птицы исчезают в конце октября – начале

ноября (02.11.1912 – Миус; 06.11.1917 – Маныч; 05.11.1919 – дельта Дона).

Дупель (*Gallinago media*)

Дупель.

Встречается только на пролёте, в основном весной. Осенью же пролет везде проходит незаметно. Весной первая птица отмечена 29.03.1917 на р. Крепкая в Таганрогском округе. На Маныче появляется в начале апреля, когда за утреннюю охоту можно добывать до 15-20 птиц, а к концу апреля там исчезает. У г. Новочеркаска на заросших травой гривах среди весенних разливов Дона обычен до середины мая, с максимумом численности 5-15 мая, а в дельте Дона последние встречи 21.05.1919. Пара дупелей была добыта 16.07.1919 на Среднем Дону у с. Белогорье Воронежской обл. В середине июля дупеля появляются и на Сев. Донце (Аверин, 1911).

Вальдшнеп (*Scolopax rusticola*)

Вальдшнеп, вальшень, лежень.

Обычная, дважды пролетная птица Донской области. По опросным данным, в 1909 г. пара вальдшнепов держалась всё лето в обширном, глухом саду на берегу р. Мокрый Еланчик у с. Греково-Тимофеевского. Вечером 13.05.1913 тянущий вальдшнеп отмечен на р. Миус у с. Троицкого. Осенний пролет в Таганрогском округе начинается обычно во 2-й декаде сентября. Первые птицы в Приазовье встречены 05.09.1909 и 18.09.1911, последние отмечались 23.12.1912 в Таганрогском округе, 26.11.1917 в Провалье на Донецком кряже, 08.11.1918 и 22.10.1919 в дельте Дона. Осенью во влажные годы вальдшнеп нередок также в безлесных степях на Маныче, останавливаясь там в редких терновниках по балкам, а также возле стогов и скирд сена.

Кроншнеп тонкоклювый (*Numenius tenuirostris*)

Малый кроншнеп.

На лимане у Кривой косы 26.08.1913 добыт одиночный малый кроншнеп, а 24.08.1916 там же очень близко наблюдался 1 малый кроншнеп в стайке с 3 большими. Пара птиц убита 04.04.1917 из стайки в 9 особей, пролетевших над степной падиной близ стан. Ольгинской Черкасского округа. В низовьях Маныча 22.03.1918 встречены первые 5-6 пролетных стаек малых кроншнепов, по 10-20 особей в каждой, летевших на север и северо-восток, а 29.03.1918 там же наблюдалась стайка из 12 особей. В дельте Дона крик малых кроншнепов несколько раз отмечался 25.03.1919. Там же одиночная птица наблюдалась 10.08.1919. По наблюдениям П.И. Янова, в 80-90-е годы XIX в. малый кроншнеп неоднократно отмечался на Маныче в западной части Сальского округа, где гнезился среди озимых хлебов. Но в последние годы его там уже не встречали. Эти птицы резко отличались от большого кроншнепа разме-

рами и "тонким, чистым, певучим голосом". В маньчжских степях у стан. Великокняжеской самец тонкоклювого кроншнепа был добыт также 28.08.1907 из большой стаи чибисов и кроншнепов (Сарандинаки, 1909)*.

Кроншнеп большой (*Numenius arquata*)

Кроншнеп, степной кулик.

По сведениям П.И. Янова, в Сальском округе на Маныче в 80-90-е годы XIX в. кроншнепов было очень много, а в начале XX в. они встречались там уже в небольшом числе. Так, стайка из 15 птиц наблюдалась 02.06.1917 на р. Кугульта. Кроншнепы гнездились там и в целинной степи, и среди озимых хлебов – как в 5-6 верстах, так и в 100-200 м от прудов. В гнездах находили по 2-3 яйца. После подъема молодняка на крыло они 2-3 недели держались выводками, а потом объединялись в стаи до 25-100 птиц. Кормились они нередко вместе с чибисами по толокам, на скошенной степи или недалеко от солевозного шляха в 250 саженой шириной, а ночь и середину дня проводили на отмелях больших озер. Весной на Нижнем Дону первые птицы отмечались 23.03.1917; 22.03.1918 и 16.03.1919. В конце марта шел пролет кроншнепов вдоль Дона на северо-восток. Но в низовьях Маныча 26.03.1918 была добыта самка с уже "полуразвившимися яйцами". Выраженный, массовый обратный пролет отмечался по ночам 18.06.1919 у г. Новочеркасска и 04-06.08.1913 на Кривой косе. Летом на Нижнем Дону и в Приазовье изредка встречались одиночные птицы: 12.05.1916 – на Кривой косе; 07.05.1918 – близ устья Маныча (очень мелкий кроншнеп: крыло 27 см, клюв – 13 см).

Кроншнеп средний (*Numenius phaeopus*)

В дневниках М.М. Алфераки обнаружена единственная, вероятно пропущенная им самим, запись о наблюдении среднего кроншнепа, отмеченного 11.04.1914 на Кривой косе во время массового пролета больших кроншнепов в стайке вместе с ними. О редкости среднего кроншнепа на пролете в Приазовье писал и С.Н. Алфераки (1910).

Веретенник большой (*Limosa limosa*)

Гриц, грицик, грицуль.

По сведениям С.Т. Павлова, в значительном числе гнездится "колонирами в степи близ лиманов с болотистыми берегами" и по Манычу. В степи на высоком степном берегу лимана близ устья балки Сиберты

* Отсутствие в дневниках М.М. Алфераки четких, конкретных сведений о встречах среднего кроншнепа (*N. phaeopus*) может вызвать сомнения в точности определения этих двух похожих видов. Но наличие добытых птиц, определявшихся по справочникам, свидетельствует всё же о значительном пролёте через Приазовье и Нижний Дон именно малого кроншнепа. Однозначно сказать, какой вид кроншнепов гнезвился в прошлом на Маныче – сейчас труднее.

на р. Кугульта 06.05.1912 им были пойманы 2 пуховика. Там же 02.06.1917 найдена небольшая колония из 7 тревожившихся птиц. По словам П.И. Янова, веретенники были очень обычны там, гнездясь колониями по 3-4 пары на сухих лугах. В начале осени они держались выводками и отлетали незаметно, не сбиваясь в стаи. Весной в низовьях Дона первых птиц регистрировали 23.03.1917; 23.03.1918; 25.03.1919. Токовавшие пары наблюдались 03-05.04.1917 на разливах в степи близ стан. Ольгинской Черкасского округа. У Кривой косы С.Т. Павлов наблюдал веретенников 03-06.05.1911.

Тиркушка луговая (*Glareola pratincola*)

Эту тиркушку М.М. Алфераки никогда не встречал, но по опросным данным она гнездилась местами в очень небольшом числе.

Тиркушка степная (*Glareola nordmanni*)

Кирбитка, кибитка, старичок, красноустик.

Обычна на Кривой косе и в пойме Нижнего Дона, многочисленна на Маныче, гнездясь колониями у лиманов. В дельте Дона гнездовья не известны. Весной прилетает в середине апреля (18.04.1913 – р. Миус; 11.04.1914 – Кривая коса). В конце лета вместе с чибисами и хрустанами сбивается в стаи на толоках в степи. Пролет идет с начала августа до середины сентября. В Таганрогском округе 13.08.1913 наблюдались тысячные стаи пролетных птиц, которые несколько дней вились над степью как рои комаров, а затем сразу исчезли. В дельте Дона несколько тысячных стай наблюдалось однажды 29.09.1909.

Поморник короткохвостый (*Stercorarius parasiticus*)

Самка добыта 22.08.1918 в дельте Дона (рис.9).

Хохотун черноголовый (*Larus ichthyaetus*)

Единственный хохотун (молодая птица) был добыт 28.09.1914 в дельте Дона.

Чайка малая (*Larus minutus*)

Мартын.

Очень многочисленна на гнездовье в южной части Донской области*. Много малых чаек было на илистых лиманчиках Кривой косы 08-11.04.1914 и 14.05.1916. Пара чаек добыта 15.06.1919 в дельте Дона, но до этого их на Дону почти не было видно. Еще 1 птица добыта 31.10.1915 на Миусе у с. Троицкого.

Чайка озерная (*Larus ridibundus*)

Мартын, рыбалка.

* В настоящее время на Нижнем Дону и в Приазовье малая чайка не гнездится. Указания о ее гнездовании здесь в начале XX в. были, по всей видимости, ошибочными. Апрельские и майские встречи этих птиц здесь относятся сейчас, как и в прошлом, несомненно, к мигрантам.

Наиболее обычная гнездящаяся чайка всего Нижнего Дона, низовий Маныча и Миуса, а также Кривой косы. На Миусе у с. Троицкого много этих чаек держалось во второй половине июня 1913 г. Весной массовый пролет на северо-восток вдоль Дона наблюдался 25-29.03.1918. Осенью последние птицы на Дону задерживались до 02.11.1915 и 05.11.1919, а в Сальском округе на Маныче 04-07.11.1917 эти чайки были еще многочисленны.



Рис. 9. Голова короткохвостого поморника, добытого 22.08.1918
The Arctic Skua head shot 22.08.1918

Морской голубок (*Larus genei*)

Единственный самец добыт 15.09.1916 в дельте Дона.

Клуша (*Larus fuscus*)

С.Т. Павлов видел 26.06.1916 клуш, летевших парами над береговыми обрывами Азовского моря у с. Порт-Катон Ростовского округа.

Хохотунья (*Larus cachinnans*)

Мартын.

В значительном количестве гнездится в дельте Дона, где 09.04.1919 на взморье в колонии по берегам небольшого ерика из гнезд по 2-3 свежих яйца было собрано 17 яиц. Недалеко, на другом ерике, 13.04.1919 найдена еще одна колония, почти вся погибшая во время сильной низовки*. Третья колония из 100-120 птиц найдена там же 23.06.1919. Сделана она на заплаве среди трудно проходимых зарослей камыша. В ней поймано 5 птенцов разного возраста (от небольших пуховиков до наполовину оперившихся) и обнаружено гнездо с 2 насиженными яйцами, из которых дома через день вылупились птенцы. К середине июля в дельте на крыло поднялась лишь небольшая часть птенцов.

Чайка сизая (*Larus canus*)

Мартын.

На Нижнем Дону и Маныче – одна из наиболее обычных пролет-

* Сильный западный ветер, поднимающий воду в Таганрогском заливе и приводящий к затоплению дельты Дона.

ных чаек. Осенью встречается с середины сентября (15.09.1916) до начала ноября (04.11.1917; 08.11.1918; 05.11.1919), когда идет выраженный пролет чаек вниз по Дону, а весной эти чайки наблюдались в марте (23.03.1918).

Крачка черная (*Chlidonias niger*)

Каричёк.

В Сальском округе на пруду в б. Мокрая Кугульта в долине Маныча 02.06.1917 найдена колония из 30 черных крачек, в которой осмотрены 2 гнезда по 3 насиженных яйца. Много птиц держалось 23.05.1918 на лиманах у хут. Веселого в низовьях Маныча, летом они встречались также в дельте Дона. Весной в низовьях Дона появляются с конца апреля - начала мая (07.05.1917; 30.04.1918), а летом скопления кочующих и пролетных птиц отмечаются с начала - середины июля (05.07.1913 – Кривая коса; 14.07.1904 – р. Миус)

Крачка белокрылая (*Chlidonias leucopterus*)

Киричёк, каричёк.

На юге Донской области встречается значительно реже черной крачки. В низовьях Дона стайки белокрылых крачек несколько раз отмечались в апреле - мае 1918 г.

Крачка речная (*Sterna hirundo*)

Крячка, мартын.

Летом одиночные птицы изредка отмечались вдоль Дона, чаще они встречались в дельте.

Крачка малая (*Sterna albifrons*)

Киричёк.

Эти крачки несколько раз отмечались на Кривой косе в августе 1907 и июле 1913 г.

Саджа (*Syrhaptus paradoxus*)

Китайская куропатка.

Редкая залетная птица. За все годы наблюдений отмечена лишь во время массовой инвазии в 1908 г. Регистрировалась с весны до середины лета в разных частях Донской области. С.Т. Павлов указывал встречи саджи в Провальском конном заводе, где добыта 1 птица, а также у стан. Новониколаевской в начале мая, где отмечено несколько стаек, в том числе 2 птицы добыты. В Усть-Медведицком округе барон Каульбарс (Семья охотников, 1908, № 13) наблюдал пролет саджи почти весь апрель и начало мая, причем стайки летели с северо-востока и востока на запад с восхода солнца до 8-9 час. утра. Под г. Ейском Л.А. Мозгалеvский встречал саж с апреля до середины июня, в том числе 2 птицы были добыты (20.05. – самка и 02.06. – самец). Самец, добытый в августе 1908 г. в "армянских" степях у Ростова, был приобретен в кол-

лекцию. По сведениям П.И. Янова, в Приманычье на жнивье в полях по балке Сиберта в начале августа появились стая до 100-150 садж, из которой была добыта 1 птица*.

Вяхирь (*Columba palumbus*)

Витютень, припутьень.

На юге Таганрогского округа и в дельте Дона вяхирь встречается только на пролетах, но в начале 1910-х годов, по опросным данным, он гнезвился в глухих садах среди дельты. Его гнездование отмечали также в лесистых балках и старых дубовых Войсковых лесах у с. Новопавловка Таганрогского округа, обычен он на гнездовье в Донском Горном лесничестве (1300 га) в Черкасском округе, многочислен в байрачных лесах Провальской степи, обычен в пойменных лесах Сев. Донца у стан. Митякинской (Аверин, 1911). Однажды на Миусе встречен 01.12.1916.

Клинтух (*Columba oenas*)

Обычная пролетная птица южной части Донской области. Появляется в конце февраля (26.02.1915 – р. Миус) и встречается до конца марта (22.03.1918 – низовья Маныча). На обратных миграциях в Приазовье клинтухи отмечаются с конца августа - начала сентября (27.08.1911; 10.09.1909; 17.09.1911; 28.08.1914; 23.08.1916) до середины октября (01.10.1909; 14.10.1912; 21.10.1916). По наблюдениям М.С. Маркова, в Войсковых лесах у с. Новопавловка Таганрогского округа одиночные птицы и пары изредка отмечались в стайках вяхирей в июле и августе.

Голубь сизый (*Columba livia*)

Собственных наблюдений над сизым голубем в дневниках М.М. Алфераки нет. Приводятся лишь слова М.А. Мензбира (1895) из книги "Птицы России", в которой, ссылаясь на М.Н. Богданова (1871), он указывает, что дикий голубь распространен по скалистым берегам Дона, Донца, Волги и Белой.

Горлица обыкновенная (*Streptopelia turtur*)

Горлица, горлушка, орлица, горлинка.

Обычная, широко распространенная птица. Гнездится по всем лесам (избегая лишь больших и сплошных), рощам, тернам, предпочти-

* В коллекции Зоологического музея МГУ в Москве хранится серия садж, добытых во время последних инвазий на Дону и в ближайших к Придону регионов. Так, 3 птиц добыл в 1908 г. в окрестностях г. Ростова Г. Корнелио: 1 мая (самка) у с. Султан-Салы и 5 мая (2 самки) близ с. Койсуг. Кроме того, еще 1 саджа была добыта 07.04.1888 в Саратовской губ. и 4 саджи добыты в 1908 г. в Балашовском уезде Саратовской губ. В Астраханской губ. во время инвазии 1888 г. добыты 2 птицы: 18 марта у с. Кандагаш (самка) и 22 марта в песках у Ханской ставки (самец). Наконец, на Сев. Кавказе, вероятно в Кабардино-Балкарии, самец и самка были добыты С.П. Чунихиным в середине XX в. (даты и место на этикетках не указаны).

тельно возле воды. Встречается в городских и сельских садах (г. Новочеркасск, хут. Весёлый). Весной прилетает 15-25 апреля (21.04.1913). Осенний пролет начинается обычно 12-15 августа (15.08.1907; 12.08.1909; 13.08.1913; 12.08.1916), одновременно с началом пролета осоедов и канюков, но иногда позже – 20-25 августа. Разгар пролета, когда птицы встречаются стаями до 6-50 особей, наблюдается в конце августа - начале сентября, иногда – до конца 2-й декады сентября. Перед самым отлётом горлицы сбиваются на побережье Азовского моря в большие стаи. Замечено, что пролетные птицы всегда мельче местных.

Кукушка обыкновенная (*Cuculus canorus*)

Кукушка.

Очень обычная гнездящаяся птица. Держится, как правило, недалеко от воды по окраинам лесов, по степным садам, лесистым балкам, обширным зарослям тёрна, рощам в пойме. Весной первые отмечены 14.04.1913. Последних кукушек добывали 10.08.1903; 31.08.1909; 16.09.1911.

Сова белая (*Nyctea scandiaca*)

Очень редкая птица. В частных коллекциях имелись всего 2-3 чучела этих сов, добытых в разные годы в Таганрогском округе в суровые, снежные зимы.

Филин (*Bubo bubo*)

По сведениям С.Т. Павлова, филины ежегодно гнездятся в Провальском конном заводе по заросшим кустами балкам, в расселинах известняковых плит, выходящих на поверхность. Там 7 мая найдены 2 пуховых птенца. Близ г. Новочеркаска гнездо филина было найдено однажды на даче под ступенями полуразрушенного павильона. Два филина были добыты в конце апреля 1911 г. на зимовнике в окрестностях стан. Великокняжеской. По сведениям Г. Сарандинаки (1909), в Ростове и его окрестностях в ноябре 1906 г. наблюдалось массовое появление филинов, связанное с колоссальным нашествием мышей, а в конце XIX в. гнездо филина с 2 яйцами найдено в начале сентября под кустом терна в степи на юге Ростовского округа. Зимой филины изредка появляются в Таганрогском округе.

Сова ушастая (*Asio otus*)

Сова.

Скопление из 30-40 сов обнаружено 12.11.1915 в куртине терновников среди поля у с. Троицкого на Миусе, а в начале мая 1916 г. там же держалась пара токовавших ушастых сов. Совы отмечались в том месте до поздней осени 1916 г.

Сова болотная (*Asio flammeus*)

Сова.

Обычная оседлая птица Таганрогского, Ростовского и Черкасско-

го округов, встречающаяся здесь чаще всех остальных сов. В большом количестве появляется в "мышинные" годы, а также зимой. Держится в степях по Манычу, в полях у г. Новочеркасска, на целине Провальского конного завода, по всей пойме Дона. На Маныче в "камышках" на земле 17 мая найдено гнездо с 1 птенцом и 5 яйцами. Г. Сарандинаки (1909) нашел 08.04.1906 гнездо с 4 свежими яйцами в терновниках на берегу р. Чубурки. По данным В.Г. Аверина (1911), эти совы обычны на Сев. Донце, гнездясь в основном в степных балках, поросших густыми терновниками.

Сплюшка (*Otus scops*)

Сплюкала, сплюк.

По данным С.Н. Алфераки (1910), в 1880-е годы совка была обычна в садах Таганрогского округа, особенно по Миусу и Самбеку. Но М.М. Алфераки за все годы своих наблюдений сплюшку здесь ни разу не встречал. В садах и байрачных лесах Провалья в 1917-1918 гг. она была очень обычна. По сообщению С.Т. Павлова, гнездо с 5 пуховыми птенцами найдено в середине мая в дупле старой груши близ г. Новочеркасска.

Сыч мохноногий (*Aegolius funereus*)

В коллекции С.Т. Павлова был мохноногий сыч, добытый в стан. Заплавской Черкасского округа.

Сыч домовый (*Athene noctua*)

Сыч.

Обычная, более или менее повсеместно распространенная оседлая птица Донской области. Гнездится в строениях, на чердаках, в каменных заборах, сложенных без извести или глины, в каменоломнях. В Сальских степях гнездится в кучах кизняка, уложенного на зиму в большие скирды.

Неясыть серая (*Strix aluco*)

По данным В.Г. Аверина (1911), обычная гнездящаяся птица больших, тенистых пойменных лесов Сев. Донца. Там в устье р. Деркул 2 июля был добыт слётёк.

Козодой обыкновенный (*Caprimulgus europaeus*)

Молкосос (укр. крестьяне), *лежебок* (казаки).

Обычная дважды пролетная птица южной части Таганрогского, Ростовского и Черкасского округов. Гнездится в более северных лесистых районах: у стан. Митякинской на Сев. Донце (Аверин, 1911), в Провалье, где наблюдался 15.05.1917, и у с. Новопавловка на севере Таганрогского округа, где 02.07.1912 в Глухой балке М.С. Марков нашел гнездо с 2 яйцами. В течение всего лета встречался в Сальском округе на Маныче, но гнезд там не находили. Весной на Миусе птиц на-

блюдали 21-29.04.1913. Осенью в Приазовье они отмечались в конце августа - начале сентября (07.09.1905; 22.08.1909; 21.08.1910; 13.09.1911; 12.-26.08.1916; 02-17.09.1919).

Стриж черный (*Apus apus*)

Очень обычен в г. Таганроге, где гнездится в старых высоких зданиях – обычно под отставшими листьями железных крыш. На колокольне Греческого монастыря, например, обитали 15-25 пар, и вечером 01.07.1918 там летало около 60 птиц. По сообщению П.И. Янова, стрижи в небольшом числе гнездились на колокольне собора в г. Новочеркасске, но М.М. Алфераки не видел их там ни разу.

Сизоворонка (*Coracias garrulus*)

Ракиш.

Гнездящаяся птица Черкасского, Ростовского и Таганрогского округов. Обычна на Маныче и в Провалье. До 1907-1908 гг. повсюду была очень многочисленна, но затем численность с каждым годом стала сокращаться, и за всё лето 1913 г. на юге Таганрогского округа она встречена лишь 6-8 раз. Предпочитает запущенные сады, опушки лесов. Гнездится чаще всего в дуплах старых яблонь, груш и верб, нередко под крышами и отдушинами обособленных нежилых построек или в развалинах строений, иногда в старых скирдах. Несколько раз гнезда встречались в скворешницах, а однажды наблюдались сизоворонки, выбросившие из скворешницы скворчат и сделавшие в ней свое гнездо. На Маныче птицы гнездятся в глинистых обрывах, но только, по-видимому, в старых переделанных норах щурок. Осенью последних птиц встречали 02.09.1909 и 16.09.1911.

Зимородок (*Alcedo atthis*)

Рыбалка, водяной зяблик.

Обычная гнездящаяся птица Донской области. Очень обычен в дельте Дона, ежегодно встречался по Миусу. Постоянно наблюдался также на Маныче, но гнезд там не находили. Весной в дельте Дона первая птица отмечена 09.04.1919. Осенью в Приазовье регистрировался до 15.09.1905; 28.09.1916; 04.09.1918; 30.09.1919.

Щурка золотистая (*Merops apiaster*)

Щур, щурок, юрок, шнурок.

Очень обычная гнездящаяся птица Таганрогского, Ростовского, Черкасского, Сальского и Донецкого округов. Очень обычна на Маныче и в Провалье. Гнездится колониями по 5-15 пар в глинистых обрывах. Прилетает обычно в конце апреля (20.04.1913; 29.04.1918; 21.04.1919), а отлет происходит малозаметно в конце августа (21.08.1910; 25.08.1911; 21.08.1916; 20.08.1918).

Удод (*Урира еrops*)

Удод, одут (укр. крестьяне), *пустушка* (казаки).

Обычная гнездящаяся птица Донской области, редко удаляющаяся от жилья, и поэтому трудно даже представить себе улицу степного хутора без разгуливающего по ней удода. В низовья Дона прилетает в конце марта - начале апреля (03.04.1918; 23.03.1919). Гнездится в дуплах деревьев, в пнях, кучах камней, дров или кизяков, сложенных на зиму в скирды, а также в каменных заборах, соломенных загатах, в отдушниках и щелях нежилых и жилых строений. Гнездо с 2 яйцами найдено 14.06.1911 у с. Новопавловка Таганрогского округа.

Вертишейка (*Jynx torquilla*)

Вертишейка.

По данным В.Г. Аверина (1911), довольно редкая гнездящаяся птица старых лесов в пойме Сев. Донца. Выраженный пролет вертишейек в Ростовском округе наблюдали 07-12.04.1907 (Сарандинаки, 1909). В саду г. Новочеркасса птица добыта 15.05.1913, а на Миусе у с. Троицкого – 05.08.1904.

Дятел зеленый (*Picus viridis*)

С.Т. Павлов добыл зеленого дятла 26.09.1916 близ ст. Глубокая ЮВЖД (разъезд Дяткино) [Тарасовский район Ростовской обл.], а П.И. Янов встречал его поздней осенью в Глухом лесу в Таганрогском округе и в Горном лесничестве в Черкасском округе. По данным В.Г. Аверина (1911), этого дятла отмечали по крику в мае и июле на Сев. Донце в устье р. Деркул.

Дятел седой (*Picus canus*)

По В.Г. Аверину (1911), у стан. Митякинской на Сев. Донце довольно редкая гнездящаяся птица. Одиночная самка этого дятла добыта 25.09.1911 в саду на р. Миус у с. Покровского.

Желна (*Dryocopus martius*)

По опросным данным, желна дважды наблюдалась поздней осенью в 1903-1905 гг. в лесах по р. Миус у с. Троицкого.

Дятел пестрый (*Dendrocopos major*)

Дятел.

В 1901-1903 гг., обычно в августе, часто встречался по Миусу и Мокрому Еланчику, где добыто и определено несколько особей. Особенно много птиц наблюдалось 07-20.08.1903. Позже они отмечались почти ежегодно, но значительно реже. Одиночный дятел встречен 17.11.1919 возле ст. Персиановка ЮВЖД [между городами Шахты и Новочеркасском]. Несколько раз дятлов видели осенью также в садах г. Новочеркасска. О гнездовании на юге Донской области никаких сведений не было.

Литература

- Аверин В.Г., 1911. Орнитологические наблюдения летом 1909 и 1910 гг. в окрестностях станицы Митякинской, Донецкого округа области войска Донского // Тр. Об-ва испыт. природы при Харьк. ун-те, т.44, прил. - С.258-285.
- Алфераки М.М., Белик В.П., Франкьен И.Ж., Шергалин Е.Э., 2012. Грифы в окрестностях Одессы // Хищные птицы в динамической среде третьего тысячелетия: Труды VI Международн. конф. по соколообразным и совам Сев. Евразии.- Кривой Рог.- С.73-78.
- Алфераки С.Н., 1910. Птицы Восточного Приазовья // Орнитол. вестн., № 1-4. С.11-35; 73-93; 162-170; 245-252.
- Белик В.П., 1986. Европейский тювик на Дону // Акт. проблемы орнитологии. - М.: Наука. - С.128-143.
- Белик В.П., 1990. Миграции куликов в степной части бассейна Дона // Миграции и зимовки птиц Сев. Кавказа: Сб. науч. трудов/ Тебердинск. заповедник, вып.11.- Ставрополь: Кн. изд-во. - С.67-90.
- Белик В.П., 1992. Новые и редкие виды птиц Ростовской области // Кавказ. орнитол. вестник, вып.3.- Ставрополь. - С.53-74.
- Белик В.П., 1999. Перевозчик на степном юге Европейской части России: распространение, численность, экология // Гнездящиеся кулики Вост. Европы - 2000, т.2.- М.: СОПР. - С.73-76.
- Белик В.П., 2000. Птицы степного Придонья: Формирование фауны, ее антропогенная трансформация и вопросы охраны.- Ростов н/Д.: Изд-во РГПУ.- 376 с.
- Белик В.П., Ветров В.В., 1998. Европейский тювик на территории СНГ. Сообщение 1: Распространение и численность // Бранта: Сб. науч. тр. Азово-Черноморск. орнитол. станции, вып.1.- Мелитополь: Бранта. - С.24-36.
- Богданов М., 1871. Птицы и звери Черноземной полосы Поволжья и долины Средней и Нижней Волги (био-географические материалы) // Тр. О-ва естествоиспытателей при Казанск. ун-те, т.1, отд.1.- С.1-226.
- Боровиков Г.А., 1907. Материалы для орнитологии Екатеринославской губернии // Сб. студ. биол. кружка при Новоросс. ун-те, № 2.- С.1-141.
- Бостанжогло В.Н., 1911. Орнитологическая фауна Арало-Каспийских степей.- М.: Типография Императорского Московского Университета. - 410 с.
- Браунер А.А., 1907. Заметки об экскурсиях, совершенных в 1905 году в Ставропольской губ. и в Крыму // Зап. Новороссийск. о-ва естествоиспытателей, т.30.- С.113-126.
- Вальх Б.С., 1900. Материалы для орнитологии Екатеринославской губернии. Наблюдения 1892-1897 гг. // Труды О-ва испытателей природы при Харьков. ун-те, т.34.- С.1-90.
- Вальх Б.С., 1911. Материалы для орнитологии Екатеринославской губернии. Перечень птиц, найденных в губернии с 1892 по 1910 г. // Орнитол. вестн., № 3-4. - С.240-271.
- Динник Н., 1886. Орнитологические наблюдения на Кавказе // Тр. С.-Петерб. о-ва естествоиспыт., т.17, вып.1. - С.260-378.
- Кондратьев В., 1885. Систематическое описание животных в войске Донском, составленное в 1822 году // Казачий вестн., газ. - Новочеркасск, № 48-59.
- Мензбир М.А., 1895. Птицы России, т.1-2.- М.- 836 с.; 1120 с.

- Никольский А.М., 1891. Позвоночные животные Крыма.- СПб.- 484 с.
- Номикосов С., 1884. Статистическое описание Области Войска Донского. - Новочеркасск.- 761 с.
- Огнев С.И., Воробьев К.А., 1923. Фауна позвоночных Воронежской губернии. - М.: Новая деревня.- 255 с.
- Сарандинаки Г., 1909. Некоторые данные для орнитологии Ростовского н/Д. округа Донской области // Сб. студ. биол. кружка при Новоросс. ун-те, № 4.- С.1-75.
- Северцов Н.А., 1855. Периодические явления в жизни зверей, птиц и гад Воронежской губернии. - М.- 430 с.
- Сомов Н.Н., 1897. Орнитологическая фауна Харьковской губернии. - Харьков.- 680 с.
- Франкьен Ив, Шергалин Е.Э., 2010. Новое имя в орнитологии Приазовья – Михаил Михайлович Алфераки (1889-1958) // Стрепет, т.8, вып.2.- С.114-124.
- Хлебников В.А., 1890. Список птиц Астраханской губернии // Протокол заседаний Об-ва естествоиспытателей при Казанск. ун-те. 1906-1907, т.22, прил. № 121.- С.1-32.
- Хлебников В.А., 1928. Список птиц Астраханского края с распределением их по характеру пребывания в крае // Материалы к познанию природы Астраханск. края, т.1, вып.3. - Астрахань.- С.1-39.
- Шергалин Е.Э., в печати. Письма редактора журнала «Семья Охотников» Сергея Тихоновича Павлова Сергею Александровичу Бутурлину // IV Бутурлинские чтения.- Ульяновск.
- Яковлев В., 1872. Список птиц, встречающихся в Астраханской губернии // Bull. Soc. Imper. Naturalistes de Moscou, т.43, № 4.- С.323-361.