

мест рождения. Пролёт проходит в конце сентября, а последние птицы отмечены в самом начале октября (Птушенко, Иноземцев, 1968).

Работа ведётся при финансовой поддержке РФФИ, грант № 06-04-48415.

Литература

Калякин М.В., Волцит О.В. 2006. Птицы Москвы и Подмосковья. София-Москва: 372 с.

Птушенко Е.С., Иноземцев А.А. 1968. Биология и хозяйственное значение птиц Московской области и сопредельных территорий. М.: 462 с.

В.В. Гаврилов¹, Е.О. Веселовская, Е.В. Вострецова, М.Я. Горецкая

¹ Звенигородская биологическая станция им. С.Н. Сكاдовского биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, 119899, Россия, и

Ин-т биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, ул. Вавилова, 26, Москва, 117334, Россия; e-mail: vadimgavrilov@yandex.ru

V.V. Gavrilov¹, E.O. Veselovskaia, E.V. Vostretsova, M.J. Goretskaia

¹ Zvenigorod Biological Station, Biological Department, Moscow Lomonosov State University, Moscow, 119899, Russia; and

N.K. Koltsov Institute of Developmental Biology RAS, Vavilov Str., 26, Moscow, 117334, Russia; e-mail: vadimgavrilov@yandex.ru

О редких видах птиц природного парка «Кандры-Куль», Республика Башкортостан

On rare bird species of the Kandry-Kul Natural Reserve, Bashkortostan Republic, European Russia

Природный парк «Кандры-Куль» расположен в Туймазинском р-не на западе Республики Башкортостан. Он находится на стыке лесостепной и степной зон в самом центре Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Основную часть парка занимает оз. Кандрыкуль — второе по величине в республике. Озеро карстового происхождения, не имеет притоков и стока, пресное, округлой формы. С трёх сторон оно окружено холмами. Площадь озера 15.6 км², наибольшая глубина 16.5 м. На его берегу расположены три деревни и многочисленные базы отдыха. В северо-западной части находится о. Утрау общей площадью 4.5 га. На 3 км восточнее озера расположено Сайрановское болото площадью примерно 60 га. В 0.5 км южнее Кандрыкуля находится небольшое оз. Чириккуль, поросшее камышом и рогозом.

В данной работе мы приводим результаты исследований водных и околоводных птиц Природного парка «Кандры-Куль», которое проводилось в 2002–2008 гг.

Чернозобая гагара (*Gavia arctica*). После того, как в 2002 г. на оз. Кандрыкуль была встречена птица с двумя птенцами (Галиева, 2002), следующий факт гнездования её в пределах парка был установлен только в 2008 г. на Сайрановском болоте: отмечена взрослая гагара с двумя молодыми.

Черношейная поганка (*Podiceps nigricollis*). Немногочисленна. В 2002 г. в пределах парка достоверно гнездились 8 пар, в 2003 г. — 5, в 2004 г. — 2, в 2005–2006 гг. — 3, в 2007 г. — 2, в 2008 г. — 5 пар.

Красношейная поганка (*P. auritus*). Гнездование впервые установлено в 2004 г.: 3 пары гнездились на оз. Кандрыкуль и одна — на Сайрановском болоте. В последующие годы не отмечена.

Большой баклан (*Phalacrocorax carbo*). Впервые в районе исследований наблюдали 10 особей 28.07.2007 г. на открытой воде Сайрановского болота.

Выпь (*Botaurus stellaris*). На Сайрановском болоте в 2002–2004 гг. гнездились 2 пары, а с 2005 г. только одна; на оз. Кандрыкуль в 2002–2006 гг. — 3, с 2007 г. — 2 пары. На Чириккуле обнаружили пару в 2007 г.

Волчок (*Ixobrychus minutus*). Впервые в районе исследований самца, самку и двух птенцов отметили 28.07.2007 г. на Сайрановском болоте.

Кваква (*Nycticorax nycticorax*). Единственная встреча 25.05.2008 г. на оз. Кандрыкуль. Птицу испугнула самка **болотного луня** (*Circus aeruginosus*).

Во время осеннего пролёта в 2007 г. впервые за время исследований зарегистрировали стаи **белощёй казарки** (*Branta leucopsis*) из 13 особей и **чёрной казарки** (*Branta bernicla*) из 15 птиц.

Осенние пролётные стаи **серых гусей** (*Anser anser*), **пискулек** (*A. erythropus*) и **гуменников** (*A. fabalis*) примерно из 50 птиц были отмечены в 2003 и 2007 гг. На весеннем пролёте в 2008 г. видели только 13 гуменников.

Лебедь-шипун (*Cygnus olor*). В 2002–2003 гг. до 14 взрослых негнездящихся птиц наблюдали на оз. Кандрыкуль. В 2004–2008 гг. пара гнездилась здесь и вырастила в 2004 г. двух, а в последующие годы — по 6 птенцов. На Сайрановском болоте в 2007 г. всё лето держался взрослый самец, а в 2008 г. здесь впервые загнездилась пара и вырастила 3 птенцов.

Огарь (*Tadorna ferruginea*). На оз. Кандрыкуль 16.07.2003 г. впервые зарегистрировали самца, самку и 3 птенцов. Там же 14.05.2004 г. видели пару, но при последующих посещениях их не обнаружили. Следующая встреча произошла только 28.07.2007 г., когда отметили 2 взрослых и 5 молодых птиц. А 30.08.2008 г. зарегистрировали на пролёте 8 особей. На Сайрановском болоте впервые отметили 4 пролётных взрослых огарей 20.08.2004 г. Следующие встречи состоялись здесь 15 и 23.06.2007 г.: наблюдали пару, выводок не обнаружили. В 2008 г. загнездилась одна пара: 26.04 видели самца и самку, а 18.07 отметили их уже с 7 птенцами.

Только на пролёте в 2007 г. были зарегистрированы 2 особи **белоглазого нырка** (*Aythya nyroca*), стаи **гоголей** (*Bucephala clangula*) из 12 птиц, примерно 80 особей **синьги** (*Melanitta nigra*); 12.04.2004 г. отметили 4 **средних** (*Mergus serrator*) и 2 **больших крохалей** (*M. merganser*).

Ходулочник (*Himantopus himantopus*). Впервые за время исследований был зарегистрирован 18.07.2008 г. — две взрослые и одна молодая кормились на мелководье оз. Кандрыкуль.

Практически ежегодно на осеннем пролёте отмечали следующих представителей ржанкообразных: **галстучника** (*Charadrius hiaticula*), **кулика-сороку** (*Haematopus ostralegus*), **черныша** (*Tringa ochropus*), **большого улита** (*T. nebularia*), **щёголя** (*T. erythropus*), **мородунку** (*Xenus cinereus*), **круглоногого плавунчика** (*Phalaropus lobatus*), **турухтана** (*Philomachus pugnax*), **кулика-воробья** (*Calidris minuta*), **белохвостого песочника** (*C. temminckii*), **краснозобика** (*C. ferruginea*), **чернозобика** (*C. alpina*), **большого кроншнепа** (*Numenius arquata*), **большого веретенника** (*Limosa limosa*).

Черноголовый хохотун (*Larus ichthyaetus*). Единственная встреча взрослой птицы зарегистрирована 14.07.2003 г. у оз. Кандрыкуль.

Литература

Галиева Л.Ф. 2002. Интересные встречи птиц в Нагаево и на озере Кандрыкуль в Башкирии. — Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург: 86–87.

Л.Ф. Галиева

Башкирский гос. ун-т, ул. Фрунзе, 32, Уфа, 450007, Россия; e-mail: galieva-liliya@yandex.ru

L.F. Galieva

Bashkastostan State University, Frunze Str., 32, Ufa, 450007, Russia; e-mail: galieva-liliya@yandex.ru

О некоторых орнитологических находках на территории Курской области **On some ornithological findings in the Kursk Region, central European Russia**

Авифауна Центрально-Черноземного региона изучена далеко не полно, в частности, для Курской обл. не опубликован даже список видов. Приводимые данные уточняют её состав и были выполнены с финансовой поддержкой гранта Учёного совета Курского государственного ун-та в рамках темы «Исследование фауны наземных позвоночных животных разнообразных ландшафтов Северо-Западного (Свапского, лесистого) физико-географического района Курской области». Использованы фотографии, выполненные Н.И. Дегтярёвым, Н.В. и С.В. Жердевыми.

Наблюдения проводили в Кармановском лесничестве в юго-западной и южной части Железногорского р-на Курской обл. в период с 28.07 по 25.08.2006 г. Северная часть района подверглась сильным антропогенным изменениям: более 60% освоенных площадей — это карьер и отвалы, пульпохранилище. Лесистость в Железногорском р-не самая высокая в области за счёт западной и юго-западной частей и составляет 18.7%, тогда как юго-восточная и восточ-