

(Потапов, 1959; Иванов, 1969; Абдусаламов, 1971). В декабре и январе в юго-западных областях республики чернобрюхий рябок встречается редко. В пустынях левобережья реки за 4 зимних сезона наблюдений вид был отмечен только в январе 1989 г. В данном ландшафте в I–III декадах этого месяца за 3 дня наблюдений на площади 3 км² были зарегистрированы 16 особей. В среднем на 10 км маршруте насчитывали 11 птиц.

Гнездящиеся особи чернобрюхого рябка отмечались в заповеднике с III декады февраля или с I–II декады марта по II декаду июля. Наибольшие показатели обилия вида в период гнездования были зарегистрированы в глинисто-щебнистой пустыне предгорной зоны хребта Ходжа-Козиан. В данном ландшафте в 1988–1990 гг. плотность его населения изменялась от 6 до 9 ос./км², средний многолетний показатель плотности составил 7.4 ос./км². Индекс общности плотности населения птиц в разные годы наблюдений составил 45% при наибольшем значении амплитуды отклонения от среднего многолетнего значения плотности населения в 18%.

В зональных ландшафтах левобережья Вахша наибольшая численность рябков наблюдалась в песчаной пустыне. В данном ландшафте плотность населения вида в гнездовые периоды 1988–1992 гг. изменялась от 3 до 9 ос./км²; средний многолетний показатель плотности составил 5 ос./км². Индекс общности плотности населения птиц разных лет достиг 32% при наибольшем значении амплитуды отклонения плотности населения от среднего многолетнего в 28%.

В глинистой пустыне левобережья р. Вахш гнездование рябков наблюдали не каждый год. Плотность населения вида в гнездовые сезоны 1989–1991 гг. изменялась от 1 до 5 ос./км².

Можно заключить, что к концу XX в. наиболее крупные сезонные скопления чернобрюхого рябка в юго-западном Таджикистане сохранились на территории заповедника «Тигровая Балка». Установлено, что в зональных ландшафтах левобережья нижнего течения р. Вахш и в подгорной зоне хребта Ходжа-Козиан отмечается от 25 до 30% особей из территориальных группировок и субпопуляций вида, посещающих регион в различные сезоны года (Абдусаламов и др., 1980; Абдусаламов, Лебедев, 1986).

Литература

- Абдусаламов И.А. 1971. Фауна Таджикской ССР. Птицы. Т. XIX, Ч. 1. Душанбе: 404 с.
 Абдусаламов И.А., Лебедев Ю.А. 1986. Миграции птиц в Южном Таджикистане. Душанбе: 204 с.
 Абдусаламов И.А., Муратов Р.Ш., Лукьянов Г.Н. 1980. К изучению зимней орнитофауны на юге Таджикистана. — Миграции птиц в Азии. Душанбе: 307–310.
 Иванов А.И. 1969. Птицы Памиро-Алая. Л.: 448 с.
 Князьков В.В. 1988. Смены растительности в поймах рек Юго-Западного Таджикистана. — Дисс. ... канд. биол. наук. Душанбе.
 Молотковский Ю.И., Шмелева Г.А. 1990. Флора заповедника «Тигровая балка». М.: 80 с.
 Потапов Р.Л. 1959. Очерк летней орнитофауны заповедника «Тигровая Балка». — Тр. Ин-та зоологии и паразитологии АН ТаджССР. Т. 115. Душанбе: 179–201.
 Равкин Ю.С. 1967. Природа очагов клещевого энцефалита на Алтае. Новосибирск: 271 с.
 Разумовский С.М. 1988. Закономерности динамики биоценозов. М.: 228 с.
 Чернов Ю.И. 1971. О некоторых индексах, используемых при анализе структуры животного населения суши. — Зоол. журн., 50 (5): 461–470.
 Яблонкевич М.Л., Люлеева Д.С. 1981. Оптические наблюдения дневного высотного пролета птиц осенью 1977 г. на Куршской косе. — Методы обнаружения и учета миграций птиц. Л.: 37–44.

И.Б. Преображенская

Ул. Въезд Тринклера, 5–79, Харьков, 61023, Украина

I.B. Preobrazhenskaya

Viezd Trinklera Str., 5–79, Kharkov, 61023, Ukraine

Встречи некоторых редких видов птиц на юге Малоярославского района Калужской области

Records of some rare bird species in southern Maloyaroslavets District, the Kaluga Region

Материал собран в 2002–2006 гг. при проведении орнитологических наблюдений на юге Малоярославского р-на Калужской обл. в окрестностях д. Курдюковка и ближайших насе-

лётных пунктов, а также вдоль русла р. Суходрев. Приводятся данные о встречах нескольких редких для Калужского региона видов птиц, которые включены в Красную книгу области. Данный район представляет собой слабо преобразованный лесной ландшафт с сельхозугодьями и небольшими, неглубокими речками, впадающими в р. Суходрев (бассейн р. Оки). Окрестные леса — в основном смешанные лиственные массивы, с наличием старых еловых посадок; местами встречаются высокоствольные массивы с преобладанием сосны и ели.

Волчок (*Ixobrychus minutus*). Зарегистрирован по голосу в вечернее время в первых числах августа 2002 г. во влажной низине среди зарослей рогоза и другой болотной растительности рядом с прудом, находящимся западнее Курдюковки. Местное название этой болотистой низины с водоёмом и заливным лугом — «Курдюковское болото».

Полевой лунь (*Circus cyaneus*). Самец отмечен 30.04.2006 г. над полем у окраины д. Курдюковка.

Дербник (*Falco columbarius*). В июле 2002 г. близ д. Тимохино на небольшом распаханном участке поля примерно в 100 м от леса в течение нескольких минут наблюдали самца, которого удалось хорошо рассмотреть в бинокль на близком расстоянии. Также хорошо рассмотрели самца, который 10.05.2004 г. охотился на скворцов, сидящих на сосне в д. Курдюковка.

Речная крачка (*Sterna hirundo*). Трёх птиц видели 12.06.2006 г. во время кормёжки над затоном у д. Тимохино.

Удод (*Uripa eops*). Ежегодно отмечается токование на окраине д. Курдюковка у р. Суходрев. С полной уверенностью можно утверждать, что в этом месте постоянно гнездится одна пара (наблюдали регулярные полёты в одном и том же направлении с кормом). Сбор корма отмечали в период с 10.07 по 18.08.2002 г., а также 25.07.2003 г., 20.04.2004 г. и 12.06.2006 г.

Лесной жаворонок (*Lullula arborea*). Поющего самца наблюдали 27.07.2003 г. на границе поля и высокоствольного березняка по левому берегу р. Суходрев южнее д. Тимохино.

Кедровка (*Nucifraga caryocatactes*). Отмечена 24.07.2002 г. на сухом дереве на «Курдюковском болоте»; затем встречена 28.07.2002 г. среди густого ельника примерно в 5 км от места первой регистрации. В разные годы неоднократно наблюдалась в этом районе в первой половине августа, а 18.08.2002 г. здесь видели пару.

Ястребиная славка (*Sylvia nisoria*). Дважды встречена 4.06.2005 г. Одна птица найдена на территории, примыкающей к заброшенному свинарнику на окраине д. Курдюковка, среди зарослей бузины; её поведение — тревожные крики и короткие перепархивания по близ растущим кустам бузины, указывало на возможное гнездование птиц в данном месте. Вторая встреча произошла примерно в 1 км севернее той же деревни, на влажном болотце, расположенном среди деревьев, высохших после пожара 2002 г. По периметру болотца растут осины с примесью других пород и кустарников. Эта птица при приближении наблюдателя также беспокоилась.

Горихвостка-чернушка (*Phoenicurus ochruros*). Самца наблюдали на территории заброшенного свинарника около д. Курдюковка 18.04, 9.05 и 10.05.2004 г. Там же 5–6.08.2006 г. видели самку.

Снегирь (*Pyrrhula pyrrhula*). В зимние месяцы обычен. Пару наблюдали 30.04.2006 г. на краю лесного массива, представляющего собой смешанный высокоствольный лес с преобладанием ели и сосны северо-западнее Курдюковки; поведение птиц указывало на возможность их гнездования здесь. Они вели себя особенно беспокойно при приближении к зарослям ели и подпускали наблюдателя на расстояние до 2–3 м. Отмечены по голосам и 30.07.2006 г. на территории Рябцевского ОПУ в окрестностях д. Букрино, в нескольких километрах от места предыдущей встречи.

В.Г. Прохоров

Балаклавский просп., 30–2–44; Москва, 117303, Россия; e-mail: pvg.58@rambler.ru

V.G. Prokhorov

Balaklavsky Prosp., 30–2–44, Moscow, 117303, Russia; e-mail: pvg.58@rambler.ru