Some avifauna findings in the upper part of Maly Anyuy river (Chukotka Autonomous District)

I.V. Dorogoy

Institute of Biological Problems of the North, Far-East Branch of Academy of Sciences of Russian Federation, Portovaya Str., 18, Magadan, 685000, Russia; email: dor_1955@ibpn.ru

Поступила в редакцию 12 ноября 2018 г.

РАСШИРЕНИЕ ГНЕЗДОВОГО АРЕАЛА ЧЁРНОГО ДРОЗДА НА ЮГЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

С.Е. Черенков

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Ленинский просп., 33, г. Москва, 119071, Россия; e-mail: cherenkov.s@yandex.ru

Ключевые слова: чёрный дрозд, расширение ареала, Алтай
Key words: Blackbird, breeding range expansion, Altai Mountains

Сведения о встречах и статусе пребывания чёрного дрозда (*Turdus merula*) в южных районах Алтайского края очень скудны. По данным литературы (Ирисова и др., 2011), впервые вид отмечен в лесах, прилегающих к Тигирекскому заповеднику (в Чарышском заказнике) в 1993 г., подробности встречи не указаны. В 2011 г. чёрных дроздов трижды регистрировали на границе охранной зоны заповедника: 28.07 одиночная птица кормилась вместе с рябинниками (*Turdus pilaris*); 14 и 17.10 отмечены группы чёрных дроздов.

За период с 20 по 29.05.2015 г. на маршруте протяжённостью около 40 км в окрестностях Тигирекского заповедника я неоднократно отмечал чёрных дроздов. Поющий самец и тревожные крики ещё одной птицы отмечены 21–23.05 в районе кордона заповедника в долине р. Белой, в берёзово-пихтовом лесу, граничащим с высокотравными пойменными лугами. Другой поющий самец встречен 23.05 в районе пос. Андреевского. В окрестностях пос. Тигирек с 24 по 28.05 на водоразделе и на бортах долин рек Малый Тигирек и Львиный Ключ в берёзово-осиново-пихтовых высокотравных леса, граничащих с высокотравными лугами, отмечены 3 поющих самца. Там же, в 2 км от устья р. Львиный Ключ, 28.05 встречен выводок из 4 короткохвостых слётков, возраст птенцов примерно 14–17 дней. На северном макросклоне Тигирекского хребта в диапазоне высот 600–900 м над ур. м. плотность населения поющих самцов чёрного дрозда ориентировочно оценена в 0.5–2.0 особи/км^2.

Песенная активность всех встреченных самцов была высокой. Это может свидетельствовать как о высокой доле холостых птиц в популяции, так и о втором цикле размножения.

Литература

Ирисова Н.Л., Бочкарёва Е.Н., Пожидаева Л.В., Васеньков Д.А. 2011. Позвоночные животные Тигирекского заповедника (аннотированный список видов). – Биота Тигирекского заповедника. Труды Тигирекского заповедника. Вып. 4. Барнаул, с. 90–164.

Breeding range expansion of the Blackbird (*Turdus merula*) into the South of the Altai Region

S.E. Cherenkov

Severtsov's Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, Leninskiy ave., 33, Moscow, 119071, Russia; e-mail: cherenkov.s@yandex.ru

Поступила в редакцию 18 июля 2015 г.