

✓ 2. *Melanonyx neglectus* (Suschk.), камскій или уфимскій гуменникъ. Гнѣздится на Новой Землѣ и, вѣроятно, Колгуевѣ, въ большомъ числѣ пролетаетъ черезъ Уфимскую губ., добытъ на Енисеѣ, въ Рязанской губ. и въ Венгріи, найденъ зимой въ Персіи.

✓ 3. *Melanonyx arvensis* (Brhm), желтоклювый, или лапландскій, или полевой гуменникъ. Гнѣздится въ Скандинавіи, Лапландіи, Финляндіи, на Колгуевѣ и Новой Землѣ, на Онежскомъ оз., низовьяхъ Оби, и, повидимому, на востокъ до Таймыря. Пролетаетъ въ большомъ числѣ въ Выборгской, Новгородской, Рязанской, Московской, Томской г., зимуетъ въ Туркестанѣ, Закавказьѣ, Крыму, въ Британіи.

✓ 4. *Melanonyx arvensis sibiricus* Alpher., большой гуменникъ. Гнѣздится отъ Таймыря до Чукотскаго полуострова и Командорскихъ о-вовъ, идя на югъ до 50° с. ш., но почти не встрѣчаясь въ полярныхъ частяхъ Якутской обл. Зимуетъ въ Японіи и Китаѣ, но не встрѣченъ западнѣе озера Косогола, централн. ч. сѣв. Монголіи.

✓ 5. *Melanonyx segetum* (Gm.), малый, или пашенный, или темноклювый гуменникъ. Гнѣздится изобильно на Колгуевѣ, а также на нижней Печорѣ, рѣдко на Новой Землѣ, и, вѣроятно, идетъ къ востоку до Енисея. Пролетаетъ изобильно по средней Волгѣ и подъ Везенбергомъ въ Эстляндіи, добытъ (случайно?) на Байкалѣ. Не добытъ въ Туркестанѣ, на Ильменѣ и очень рѣдко въ Британіи.

✓ 6. *Melanonyx segetum carneirostris* Buturl., новоземельскій или красноносый гуменникъ. Гнѣздится на Новой Землѣ и, повидимому, на Ямалѣ (Б. М. Житковъ in litt.). На пролетѣ добытъ въ Уфимской, (гр А. Толстой), Рязанской, Кѣлецкой (г. Е. Катинъ) губ., на зимовкѣ добытъ въ Голландіи.

✓ 7. *Melanonyx segetum serrirostris* (Swinh), толстоклювый или восточно-сибирскій малый гуменникъ. Гнѣздится въ огромномъ числѣ въ полярныхъ частяхъ Якутской области, на востокъ идетъ въ Землю Чукчей, на западѣ, вѣроятно, распространенъ между нижними теченіями Лены и Енисея. На пролетахъ найденъ подъ Барнауломъ съ одной и на Сахалинѣ съ другой стороны, зимуетъ въ Японіи, и во множествѣ въ Китаѣ.

8. *Melanonyx segetum anadyrensis* nov. subsp., анадырскій гуменникъ. Гнѣздится, очевидно, на Анадырѣ, гдѣ

29 мая и 7 июня 1902 г. три экз. добыты у поста Ново-Маринского г. Сокольниковымъ, и описаны С. Н. Алфераки подъ именемъ *M. s. serrirostris*. Такъ какъ всѣ три экз. (изъ нихъ пара хотя взрослыхъ, но не старыхъ, д. б. перегодовалыхъ птицъ) отличаются отъ прекрасно мнѣ извѣстнаго *M. serrirostris* Якутской области не только совершенно другой окраской клюва, но и большимъ числомъ зубцовъ верхней челюсти, и даже слегка большими въ среднемъ размѣрахъ, то я не вижу возможности подводить эту птицу подъ наименованіе *M. serrirostris*: отношеніе тутъ похожее—только разница еще больше—съ отношеніемъ новоземельскаго гуменника къ *M. segetum*.

✓ 9 *Melanonyx segetum mentalis* (Oates), клювастый гуменникъ. Также извѣстенъ лишь по нѣсколькимъ пролетнымъ и зимующимъ экз. съ Командорскихъ о-вовъ, Японіи и Маньчжуріи, и одному залетному экземпляру съ дельты Колымы. Гнѣздится эта птица, надо полагать, въ Камчаткѣ.

Скудость и отрывочность этихъ вышеприведенныхъ данныхъ о распространеніи разныхъ гуменниковъ лучше всего показываютъ, какъ много могли бы добавить къ нашимъ познаніямъ объ этихъ птицахъ наши охотники, мѣстами сотнями добывающіе гусей, если бы захотѣли быть хотя немного внимательными къ своей добычѣ и дѣлиться добытыми данными.

С. Бутурлинъ.



проф. В. Г. Гюнтнер

Григорий Иванович
Ножков

Гуси-гуменники.

Выходъ въ свѣтъ англійскаго изданія роскошно иллюстрированной капитальной работы С. Н. Алфераки «Гуси Россіи» повлекъ за собою довольно оживленную полемику между С. Н. Алфераки и мною на одной сторонѣ и извѣстнымъ англо-индійскимъ натуралистомъ Евгеніемъ Отсомъ на другой. Полемика эта велась на страницахъ Лондонскаго «Фильда» и «Журнала Бомбейскаго Естественнаго-Историческаго Общества» и переносить ее на страницы русскаго изданія нѣтъ основаній. Но въ моей послѣдней статьѣ въ № 3, т. XVIII «Журн. Бомб. Е.-И. Об.» отъ 15 іюля 1908 г. я даю переработанную заново по довольно большому матеріалу таблицу для опредѣленія гуменниковъ, и полагаю, что она окажется не бесполезной и для нашихъ охотниковъ.

Среди другихъ болѣе или менѣе крупныхъ «сѣрыхъ» гусей съ яркими или блѣдными (не черными) лапами гуменники — не только старые, но и выросшіе молодые — легко отличаются темнымъ концомъ клюва и темнымъ основаніемъ его (или по крайней мѣрѣ нѣкоторой примѣсью чернаго цвѣта въ основаніи его половинѣ) — и свѣтлымъ предвершиннымъ пространствомъ; также отсутствіемъ черныхъ пятенъ на брюхѣ.

Отдѣльные виды гуменниковъ и разновидности (географическія формы) очень похожи другъ на друга, особенно въ видѣ сухихъ шкурокъ, и постоянно смѣшивались и до сихъ поръ смѣшиваются не только охотниками, но и зоологами, — что, по правдѣ сказать, послѣ опубликованія прекрасной работы С. Н. Алфераки уже не извинительно. Результатъ такого смѣшенія — совершенно недостаточная выясненность границъ гнѣздовых областей, мѣстъ зимовки и пролетныхъ путей, а также и образа жизни каждой отдѣльной формы. Поэтому весьма желательно, чтобы охотники почаще сообщали о своихъ встрѣчахъ съ гуменниками, точно опредѣляя ихъ и указывая всѣ тѣ при-

Зоологический
Музей МГУ

кн 18

сф 22