

à Monsieur le professeur A. S. Bogdanow
hommage de l'auteur.

AMPHIBIENS ET REPTILES

71 3/2

RECUEILLIS EN PORTUGAL PAR M. ADOLPHE F. MOLLER

PAR LE

Dr. J. de Bedriaga



COÏMBRE

IMPRIMERIE DE L'UNIVERSITÉ

1890



науч. 549
сб. 48

Longueur du bout du museau à l'anus: 34 mm, du membre postérieur: 46 mm.

Habitat

L'Alytes Cisternasi habite exclusivement la Péninsule Ibérique. Il paraît être peu commun en Portugal. M. Bosca l'a indiqué à Portalegre et dans la Serra de San Mamede. D'après M. Moller il se trouverait à Mertola.

11. *Salamandra maculosa* Laur. var. *Molleri* m. 1889

Salamandra maculosa Laurenti, l. c. p. 41. Bonaparte, op. cit. vol. II. fig. Leydig, Ueber die Molche der württembergischen Fauna, in Archiv für Naturgeschichte 1867, p. 239. Duméril et Bibron, op. c. vol. IX. p. 52. 1854. Fatio, op. cit. vol. III. p. 491. Schreiber, op. cit., p. 75. Lataste, l. c. Camerano, Monografia degli Anfibi urodeli italiani. Mem. R. Accad. di Scienze di Torino. Ser. 2. tom. XXXVI. pl. I. Boulenger, Catalogue of the Batrachia gradientia in the Collection of the British Museum. p. 3. London 1882.

Barbosa du Bocage, l. c. Sequeira, l. c. v. Bedriaga, l. c. Lopes Vieira, l. c. Boulenger, l. c. Bosca, in Bull. Soc. Zool. de France, V. p. 250. Boettger, op. cit. l. c.

Caractères

Tête haute en arrière, aplatie en avant, bien détachée du tronc, très-élargie en arrière au niveau de la commissure des lèvres; depuis les yeux elle s'atténue jusqu'au museau, qui est long et assez acuminé; le museau dépasse considérablement la mâchoire inférieure. Oeil gros et saillant, son diamètre est presque égal ou égal à l'espace internasal. Langue libre sur les bords et légèrement en arrière. Dents palatines en deux lignes fortement courbées,

dépassant les bords antérieurs des orifices nasaux internes, s'écartant en arrière brusquement et formant deux S. Parotides très développées. Pas d'arcade fronto-temporale. Tronc allongé, épais. Doigts et orteils assez déprimés, sans bordures; tubercules palmaires et plantaires très peu distincts. Queue épaisse et courte, d'une longueur égale à la distance du coin de la bouche au membre postérieur, elle se termine assez obtusément; sa partie basale est plus large chez le mâle que chez la femelle, la région anale est très renflée chez le mâle.

Noire, noire brunâtre ou grisâtre en dessus et en dessous, avec des taches jaunes, quelquefois très nombreuses en dessous et sur la gorge. Les taches jaunes sur le dos contiennent souvent des taches brunes grisâtres, tandis que les taches jaunes sur les côtés du tronc, sur les membres, sur la queue, sur la gorge, sur les parotides et sur les paupières sont tachetées de rouge; la gorge apparaît parfois d'un rouge intense.

Longueur totale de l'adulte: 174 mm, de la larve: 74 mm.

Habitat

La Salamandre tachetée habite l'Europe moyenne et méridionale; elle se trouve aussi en Algérie et en Syrie. Elle avait été indiquée en Portugal par M. Barbosa du Bocage. M. Moller m'en a envoyé quelques exemplaires de Coimbra et il m'informe qu'elle se trouve aussi à Bemfica près de Lisbonne, à Buarcos, à Monchique et à Mertola. D'après M. Lopes Vieira les sujets conservés au Musée de Coimbra proviennent de la Serra d'Aire et de Estarreja (Douro). M. Bôsea l'a observée à Portalegre et dans la Serra de S. Mamede et d'après M. Sequeira elle a été recueillie à Pinhão près de Porto. M. M. Boulenger et Boettger l'ont reçue de Porto et de la Serra da Arrabida (Estremadura).