

Сибирь до Верхоянского хребта и нижнего Амура. Въ западной Сибири южной границы не знаю, но среди хорошей серии (около 2 десятковъ) семипалатинскихъ птицъ типичнаго представителя этой формы нѣтъ. Слабо выдѣлившаяся форма: слегка крупнѣе (обычные размѣры крыла взрослыхъ 140—150 м/м.) и снизу снѣжно-бѣлая или слабо окрашенная. Красная затылочная полоса какъ будто пошире, по крайней мѣрѣ это замѣтно у якутскихъ особей (типомъ мнѣ служить ♂ ad., 12. IV. 1907, изъ подъ Олѣкминска, сбора Н. М. Харитоновъ). Форма, давно отличаемая, но ходящая то подъ именемъ *D. major* (при отождествленіи типовъ описанія Линнея съ сѣверо-скандинавской формой), то подъ именемъ *D. cissa*, хотя Палласъ вовсе не описывалъ этой формы, но просто *замѣнилъ* линнеевское названіе инымъ, не различая, какъ и Линней, мѣстныхъ подвидовъ.

11. f. *D. m. purus* Stejn. 1884 (*Picus kamtschaticus* Dyb. 1883 nec Malh. 1861); Камчатка; крупная птица съ всегда чисто-бѣлымъ низомъ, длиннымъ и стройнымъ клювомъ и, въ особенности, совершенно бѣлыми вершинными частями трехъ крайнихъ паръ рулей или съ ничтожными отмѣтинами на внѣшней лишь парѣ. По окраскѣ крыла походить на *D. m. tianshanicus*.

11. g. *D. m. kirghizorum* nov. subsp.; лѣса области верхняго теченія Иртыша, включая Семипалатинскъ; типы: ♂ ad., XI 1842 г., № 80, Семипалатинскъ, сборъ г. Самсонова; ♀ ad., X 1841, № 1291, и ♀ juv., IX 1841, № 1207, оба „in sylvis ad fl. Irtysch“ Г. С. Карелина — всѣ въ Музеѣ Московскаго университета, гдѣ есть и еще лѣтніе экземпляры (іюнь 1842 г.) изъ подъ Семипалатинска (но собранныя мною къ сѣверу отъ Семипалатинска птицы принадлежали къ *D. m. mongolus*). Крупная форма: крыло 138—144 м/м.; по окраскѣ похожа на сибирскихъ птицъ, только бѣлый цвѣтъ на крылѣ въ общемъ значительнѣе развитъ, хотя все же не преобладаетъ надъ чернымъ, какъ у *tianshanicus*; затѣмъ, бѣлый цвѣтъ на хвостѣ развитъ, наоборотъ, меньше, такъ что на второй парѣ рулевыхъ бѣлый цвѣтъ по стержню обычно не идетъ далѣе 2 снтм. отъ вершины, а третья пара въ сущности лишь помѣчена бѣлымъ. Но главный признакъ: чрезвычайно широкій клювъ, съ нѣсколькими выпуклою линіей боковъ. Размѣры клюва: длина отъ оперенья лба 24.4—28 м/м., отъ ноздрей 21.2—25.1 м/м., отъ черепа 28.2—33.5 м/м., высота клюва у лба 8.7—9.2 м/м. и у передняго края ноздрей 8.3—9.0 м/м., ширина его у лба 10.7—11.2 м/м. и у края ноздрей 9.3—10 м/м. Такимъ образомъ, при равной высотѣ съ клювомъ

D. major типичнымъ или *D. m. sibiricus*, форма, преобладающая на верхнемъ Иртышѣ, имѣетъ клювъ на цѣлый миллиметръ шире.

Кромѣ этихъ извѣстныхъ мнѣ формъ, несомнѣнно есть еще выдѣлившаяся расы (напримѣръ, на Балканскомъ полуостровѣ, въ Малой Азіи и, можетъ быть, въ другихъ мѣстахъ), — но для характеристики ихъ у меня не хватаетъ матеріала, между тѣмъ какъ описывать этихъ птицъ по 1—2 экземплярамъ невозможно даже при очень близкомъ знакомствѣ съ дятлами.



- 4.). Грудь свѣтлая, золотисто-желтая; въ вершинной половинѣ виѣшнихъ опахалъ второй пары рулей бѣлый цвѣтъ значительно преобладаетъ, имѣя лишь 1—2 неширокихъ черныхъ полосы или пятна; на виѣшнихъ опахалахъ крайней пары рулей бѣлый цвѣтъ доходить до или почти до стержня пера по меньшей мѣрѣ на протяженіи $2\frac{1}{2}$ —3 смт. отъ вершины; темныя полоски боковъ уже... **caucasicus** Bianchi.
5. (4.). Грудь густого золотисто-оранжеваго оттѣнка (цвѣта червоннаго золота); въ вершинной половинѣ виѣшнихъ опахалъ второй пары рулей черныи цвѣтъ преобладаетъ или по меньшей мѣрѣ не уступаетъ бѣлому, образуя три большихъ черныхъ полосы или пятна (иногда третья изъ нихъ сливается съ чернымъ полемъ основанія пера); на виѣшнихъ опахалахъ крайней пары рулей бѣлый цвѣтъ доходить до или почти до стержня пера лишь на протяженіи не болѣе $2-2\frac{1}{4}$ смт. отъ вершины; темныя полоски боковъ шире **colchicus** nov. subsp.
6. (3.). Третья пара рулей не помѣчена бѣлымъ (или рыжеватобурымъ); внутреннія опахала второй пары рулей лишь съ одной бѣлой полосой или пятномъ; внутреннія опахала крайней пары рулей съ двумя узкими бѣлыми полосами или пятнами.... **sancti-johannis** Blanf.



Предварительный списокъ большихъ пестрыхъ дятловъ.

С. А. Бутурлинъ.

A preliminary List of Larger spotted Woodpeckers,

by S. A. Buturlin.

Имѣ извѣстны слѣдующія формы центральной группы **Dendrocopus**:¹⁾

А. Съ черными плечевыми.

1. **D. himalayensis** (Jard.) 1836; з. Гималаи; в. Афганистанъ.
2. **D. cabanisi** (Malh.) 1854; ю. Китаи.
2. a. **D. c. luciani** (Malh.) 1857; з. Монголія, с. Китаи.

В. Безъ темной заушной полосы.

3. **D. scindeanus** (Horsf. et Moore) 1856—8; Афганистанъ, Пенджабъ.
4. **D. syriacus** (H. et Ehrb.) 1828; Малая Азія, Палестина, з. Персія.
4. a. **D. s. milleri** Zarudn. 1909; Белючистанъ.
4. b. **D. s. transcaucasicus** Buturl. 1910; в. Закавказье.

С. Съ пятнами на концахъ короткихъ третьестепенныхъ.

5. **D. japonicus** (Seeböhm) 1882; Японія, Курильскіе острова.
5. a. **D. j. tscherskii** Buturl. 1910; Южно-Хесурійскій край.

Д. Съ сильнымъ преобладаніемъ бѣлаго на крыль.

6. **D. leucopterus** (Salvad.) 1870—1; Камгарія, ю. Джунгарія.
6. a. **D. l. leptorhynchus** Severtz. 1875; Туркестанъ отъ среднего теченія Сыра и отъ Кульджи до Самарканда и подножья Памировъ.
6. b. **D. l. albipennis** Buturl. 1908 (**transcaspius** Zarudn. 1908, Apr.); Закаспійская обл., среднее теченіе Аму и низовье Сыра.

¹⁾ Т. е. у коней снизу и волевица безъ бѣлаго, подхвостье красное, низъ не пестреченъ чернымъ. Авт.