

Сырѣ-Дарьинскій чернохвостый сорокопутъ.

С. А. Бутурлинъ.

Lanius (Caudolanius) erythronotus jaxartensis nov. subsp.,

by S. A. Buturlin.

Полученные мною отъ г. Отто Бамберга четыре майскіе самца чернохвостаго сорокопута (подродъ *Caudolanius Bianchi*) съ Сырѣ-Дарьи по окраскѣ весьма сходны съ настоящимъ *Lanius erythronotus* (Vig.) съверо-западной Индіи и Афганистана, котораго я знаю по верхне-бухарскимъ сборамъ гр. А. А. Бобринскаго и Н. В. Богоявленскаго: черныя полосы боковъ головы широки и соединяются на лбу, образуя здѣсь полосу около $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ снтм. ширины; имѣется хорошо замѣтная бѣловатая бровь; верхъ головы и передняя часть спины пепельно-сѣры; плечи съ поясницей и надхвостьемъ свѣтло-рыжевато-охристы; хвостъ и крыло черно-буры; бѣлое зеркальце при основаніи первостепенныхъ у старыхъ экземпляровъ довольно велико, у прошлогоднихъ хотя прикрито кроющими, но замѣтно.

Плечевыя кажутся мнѣ болѣе свѣтлыми, чѣмъ у верхне-бухарскихъ (тоже лѣтнихъ экземпляровъ) *L. erythronotus*, но главное различіе—въ величинѣ. Сырѣ-Дарьинскія птицы, хотя и сильно обношенныя, значительно крупнѣе: у моихъ 4 экземпляровъ, включая двухъ годовалыхъ, крыло 93—100, въ среднемъ около 96 м.м.; хвостъ отъ кобчика 110—122, въ среднемъ около 117 м.м.; клювъ отъ ноздрей около $11\frac{1}{2}$ — $12\frac{1}{2}$ м.м.; плюсна $28\frac{1}{2}$ — 30 м.м., тогда какъ у стараго верхне-бухарскаго самца крыло $90\frac{1}{2}$, хвостъ 112, клювъ отъ ноздрей 11 и плюсна 28 м.м., — и даже въ свѣжемъ перѣ *L. erythronotus* имѣеть крыло не болѣе 92, а хвостъ не болѣе 115 м.м.

Называю эту крупную расу по мѣсту ея обитанія въ области Сырѣ-Дарьи *Lanius erythronotus jaxartensis*.

Оттискъ изъ журнала „Орнитологическій Вѣстникъ“, изд. подъ редакціей Г. И. Полякова, 1911 г., № 2. (Адресъ редакціи: Почт. отд. „Обираловка“ Московск. губ., им. „Саввино“).

Типографія Императорскаго Московскаго Университета. 1911.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Зоологическаго музея
Московскаго университета