

Уссурийскій долгохвостый снѣгирь.

С. А. Бутурлинъ.

Uragus sibiricus ussuriensis subsp. nov.

By S. A. Buturlin.

Уссурийскій долгохвостый снѣгирь обыкновенно отождествляется съ японскимъ *Uragus sibiricus sanguinolentus* (Tem. et Schl.), съ которымъ онъ сходенъ по окраскѣ, а также по меньшему росту сравнительно съ типичнымъ *U. s. sibiricus* (Pall.) изъ Западной и Центральной Сибири: у послѣдняго крыло около 72—81, а хвостъ около 81—90 м.м. Но у японскаго *sanguinolentus*, какъ видно и изъ прекраснаго оригинальнаго описанія, и изъ другихъ болѣе современныхъ измѣреній, — ростъ крайне мелкій: крыло около 61—68, хвостъ около 65—70 м.м. У уссурийскихъ птицъ, какъ я убѣдился на довольно большой серіи (около двадцати экзempl.), крыло около 65—71, хвостъ около 71—82, обыкновенно же 73—78 м.м., а потому ихъ слѣдуетъ отличать подъ именемъ *Uragus sibiricus ussuriensis*.

Типы въ моей коллекціи: ♂, 17 V 1909, с. Владиміръ Мономахъ; ♀, 1 X 1909, озеро Ханка.

Summary.

Uragus sibiricus ussuriensis n. subsp. is coloured like *U. s. sanguinolentus* (T. et Schl.), but is larger: wing about 65—71 m.m. (as against 61—68) and tail usually 73—78, exceptionally 71—82 m.m. (as against 65—70). About a score of specimens examined. Types are in my private collection: ♂ 30 May 1909 vil. Vladimir Monomakh; ♀ 14 Octob. 1909, lake Khanka.





№ 1

О РНИТОЛОГИЧЕСКІЙ ВѢСТНИКЪ

MESSAGER ORNITHOLOGIQUE

ORNITHOLOGISCHE MITTHEILUNGEN

ШЕСТОЙ ГОДЪ ИЗДАНИЯ

SIXIEME ANNEE

1915 г.

