

Сахалинскій шуръ.

С. А. Бутурлинъ.

Pinicola enucleator sakhalinensis subsp. nov.

By S. A. Buturlin.

Шуръ, найденный лѣтомъ 1910 г. д-ромъ Ф. А. Дербекъ въ большомъ количествѣ въ кедровникахъ и заросляхъ лагуны Чайво, въ сѣверо-восточной части Сахалина, отличается отъ шуровъ другихъ частей Палеарктики своимъ огромнымъ клювомъ: на 1—2 м.м. длиннѣе, чѣмъ у типичной европейской формы, при томъ при его гораздо большей массивности, и по крайней мѣрѣ на 2.5—3 м.м. длиннѣе, чѣмъ у камчатскаго *P. e. kamtschatkensis* Dyb. съ его короткимъ и толстымъ клювомъ. Размеры 3-хъ добытыхъ взрослыхъ экземпляровъ: крыло 101—109, хвостъ 80—88, хорда хребта клюва 17—17.6, высота его у оперенія лба 13—13.7 и ширина тамъ же около 10.2 м.м. Типы: ♂, 11 VII, во Владивостокскомъ музеѣ, и ♀, 23 VII, въ моей коллекціи.


Предлагаю для нихъ имя *Pinicola enucleator sakhalinensis*.

Summary.

The Pine-Grosbeak, which was numerous in summer of 1910, according to dr. F. A. Derbeck, in cedar-forests and jungle about Chakvo lagoon on the northern part of Saghalien, can be easily distin-

guished among its Palaearctic congeners by its huge bill: 1—2 m.m. longer and much stouter, than in *P. e. enucleator* (Pall.), and at least $2\frac{1}{2}$ —3 m.m. longer, than in *P. e. kamtschatkensis* Dyb. with its short, though powerful bill. Dimensions of 3 adults examined: wing 101—109; tail 80—88; exposed culmen (chord) 17—17.6, its height at front-feathering 13—13.7, its breadth there about 10.2 m.m. Types are: ♂ 24 July, in Vladivostok Museum; ♀ 5 August, in my private collection. I propose to name this race *Pinicola enucleator sakhalinensis*.





№ 1

О РНИТОЛОГИЧЕСКІЙ ВѢСТНИКЪ

MESSAGER ORNITHOLOGIQUE

ORNITHOLOGISCHE MITTHEILUNGEN

ШЕСТОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ

SIXIÈME ANNÉE

1915.

