

Сибирскій кобчикъ.

С. А. Бутурлинъ.

Erythropus vespertinus transriphaeus nom. emend.

By S. A. Buturlin.

Получая матеріалы отъ В. Е. Ушакова изъ юго-восточной части Тобольской губерніи, я замѣтилъ, что взрослые кобчики обоого пола въ общемъ темнѣе европейскихъ: у самцовъ это замѣтно по болѣе черновато-аспидному цвѣту особенно на головѣ и мантии, но также и подкрылья темнѣе, и брюхо и штаны болѣе каштаново-красны, чѣмъ рыжи. У самокъ также на головѣ и на нижней сторонѣ тѣла рыжій цвѣтъ ярче и гуще. Кромѣ того сибирскія птицы въ общемъ крупнѣе: у сибирскихъ крыло около 235—250, чаще около 245, хвостъ отъ кобчика 130—150, чаще около 140 m.m., у европейскихъ же крыло 225—245, чаще около 235, хвостъ 125—140, чаще около 135 m.m. Поэтому при всей близости этихъ формъ желательнo не смѣшивать ихъ. Впослѣдствіи я дополнилъ матеріалъ по этой формѣ личными сборами изъ степи юго-западной части Томской губерніи, и экземплярами изъ южнаго Алтая (Котонъ Карагай), Красноярска и восточной части Енисейской губерніи,—но составленнаго описанія не публиковалъ, такъ какъ раса эта по томскимъ экземплярамъ была названа фонъ Чузи въ 1904 году (Orn. Jahrb., S. 229)—*Falco vespertinus obscurus*. Такъ какъ, однако, болѣе темныя особи типичнаго *E. v. vespertinus* (Linn.) изъ Венгріи были еще въ 1855 году названы Х. Бремомъ—*Erythropus obscurus*, а кромѣ того въ номенклатурѣ терминъ „*Falco obscurus*“ употребленъ уже и Гмелиномъ, то я и публикую

это свое старое описание, типами которого являются взрослая пара отъ 6 V 1907 года изъ окрестностей Тары. Расу эту предлагаю назвать *Erythropus vespertinus transripheus*.

Summary.

The Red-footed Falcon of Siberia (I have a score of specimens from south-eastern part of Tobolsk gov., Tomsk gov., southern Altai, and Yenissei gov-t.) is not only darker and richer in colour of adults of both sexes, but also somewhat larger, than typical race (wing 235—250, ordinarily about 245, tail 130—150, ordinarily about 140 m.m.). Therefore it is better to admit this slightly differentiated race. But as „*Falco vespertinus obscurus*“ of v. Tschusi is invalidated by „*Erythropus obscurus*“ of Brehm and „*Falco obscurus*“ of Gmelin—I propose to name it as above.





№ 1

ОРНИТОЛОГИЧЕСКІЙ ВѢСТНИКЪ

MESSAGER ORNITHOLOGIQUE

ORNITHOLOGISCHE MITTHEILUNGEN

ШЕСТОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ

SIXIÈME ANNÉE

1915.

