

077.  
Б93.

2

The Nutsucker of Altai Mus. is considerably smaller than the  
Nucifraga caryocatactes rothschildi that nesting was  
observed exposed culmen about 15 (14-15) m.m.  
as against w. 200, ex. c. 130-140, its h. 15-16 m.m. in  
Tina-Shan bird; this last is also darker, more blackish. From N. s.  
macrohynchus Brehm the new form differs not in dimen-  
sions, but in brown above and not the warm cinnamon of  
chocolate the throat. Nucifraga cary-  
ocatactes rothschildi Hart. (Outram Bangs: Bull.  
Mus. Comp. Z. Harv. Coll., 1913, p. 474) in fresh plumage, 6 July  
1907, ex. Altaiensis in south Russian Altai, is in my private

### Алтайская кедровка.

С. А. Бутурлинъ.

### *Nucifraga caryocatactes altaicus* subsp. nov.

By S. A. Buturlin.

24761  
219.

Алтайскую кедровку одни изслѣдователи причисляли къ си-  
бирской формѣ *Nucifraga caryocatactes macrohyn-*  
*chus* Brehm (Hesse: Mitt. Z. Mus. Berl., 1913, p. 400), другіе къ  
туркестанской *N. s. rothschildi* Hart. (Outram Bangs: Bull.  
Mus. Comp. Z. Harv. Coll., 1913, p. 474),—въ дѣйствительности  
онѣ отличимы отъ обѣихъ. Отъ *N. s. rothschildi*—не  
только меньшею черноватостью оперенія (при сравненіяхъ, ра-  
зумѣется, свѣжаго пера со свѣжимъ и обношеннаго съ со-  
отвѣтственно обношеннымъ), но и меньшимъ ростомъ, и бо-  
лѣе слабымъ клювомъ: у *rothschildi* (по 10-ти взрослымъ  
экземплярамъ разныхъ мѣсяцевъ изъ Нарына, отъ д-ра К. А.  
Лауренти и В. И. Даценко) крыло около 200, клювъ по хребту  
около 42 (39.5—44.5), высота его у основанія, т.-е. у оперенья  
лба—15—16 и нѣсколько болѣе m.m. У *altaicus* крыло  
около 180, клювъ около 45 (40—50), высота его 14—15 m.m. Та-  
кимъ образомъ описываемая форма по размѣрамъ не отличается  
отъ *N. s. macrohynchus*, но мелкое перо не съ теплымъ  
коричневымъ или шоколаднымъ оттѣнкомъ бурога цвѣта, а  
съ кофейнымъ или даже какъ бы оливковатымъ. Типъ: взрослая  
самка въ свѣжемъ перѣ отъ 23 іюня 1907 года изъ-подъ ста-  
ницы Алтайской добыта д-ромъ А. П. Велижанинымъ), въ моей  
коллекціи.



1948

Summary.

The Nutcracker of Altai Mts. is considerably smaller, than *Nucifraga caryocatactes rothschildi* Hart., having wing about 180, exposed culmen about 45 (40 - 50), its height 14—15 m.m., as against w. 200, ex. c. 42 (39.5—44.5), its h. 15—16 m.m. in Tian-Shan bird; this last is also darker, more blackish. From *N. c. macrorhynchus* Brhm the new form differs not in dimensions, but its brown colour has not the warm cinnamon or chocolate tint of the common Siberian bird, but rather coffee or even olivaceous shade. I propose to name it *Nucifraga caryocatactes altaicus*. The type, adult ♀ in fresh plumage, 6 July 1907, st. Altaiskaia in southern Russian Altai, is in my private collection.



Оттискъ изъ журнала „Орнитологическій Вѣстникъ“, издав. подъ редакціей Г. И. Полякова, 1915 г., № 2. (Адресъ редакціи: Почт. отд. „Обираловка“, Московск. губ., имѣніе „Саввино“.)