

Уссурийская раса свиристеля.

С. А. Бутурлинъ.

Bombycilla garrulus ussuriensis subsp. nov.



By S. A. Buturlin.

Въ числѣ матеріаловъ Владивостокскаго Музея, проходившихъ черезъ мои руки, были и единичные экземпляры свиристелей, нѣсколько отличныхъ отъ типичныхъ, но которыхъ я, не имѣя въ рукахъ серій, не хотѣлъ описывать. Теперь, однако, я пересмотрѣлъ уже 7 экземпляровъ этихъ южно-уссурийскихъ птицъ, отъ октября по декабрь, и могу сказать, что при сравненіи съ свиристелями того же сезона изъ Европейской Россіи, центральной Европы, окрестностей Красноярска и Якутской области — уссурийскія птицы блѣднѣе, — но не розоватѣе и желтоватѣе, какъ *B. g. centralasiae* Poljak., а сѣрѣе: нижняя сторона, верхъ головы съ хохломъ и зашейкомъ, и щеки почти чистаго дымчато-сѣраго цвѣта, но не винно-буроватаго, какъ у типичной формы.

Называю эту расу *Bombycilla garrulus ussuriensis* subsp. nov. Типъ: ♂ отъ 11 декабря, деревня Руссовка, 35 верстъ къ сѣв.-зап. отъ селенія Камень Рыболовъ на озерѣ Ханка; въ моей коллекціи.

Summary.

Bombycilla garrulus ussuriensis subsp. nov. is paler, than series of typical bird from Germany, European Russia, Krasnoyarsk, Olekminsk, and much greyer on the head, nape and cheeks, as well as on the underside. From the pale race *B. g. centralasiae* Poljakov it differs in its purer grey, not roseate and yellowish, tinge. 7 specimens from South-Ussuri-land examined, type: ♂ from vil. Russovka, near Kamen-Rybolov, on lake Khanka, 24 December, in my collection.



№ 3

О РНИТОЛОГИЧЕСКІЙ ВѢСТНИКЪ

MESSAGER ORNITHOLOGIQUE

ORNITHOLOGISCHE MITTHEILUNGEN

ШЕСТОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ

SIXIEME ANNEE

1915 г.

