

это обратилъ вниманіе и Хартертъ, упоминая вскользь короткость плюсны у сибирскихъ птицъ, хотя и безъ указанія размѣровъ. Кромѣ того и пальцы покороче, что болѣе ясно выражено на заднемъ пальцѣ. Къ сожалѣнію, и здѣсь предѣлы колебаній велики и взаимно покрываются. Плюсну я измѣрялъ отъ выемки сзади голенно-плюсневой сустава до конца послѣдняго большого, короткаго и широкаго, щитка, покрывающаго сверху основаніе запястья. Задній палецъ измѣрялъ сверху, включая коготь. У сибирскихъ птицъ плюсна колеблется отъ 55 до 68 м.м., но около трехъ четвертей всѣхъ особей имѣютъ этотъ размѣръ менѣе 65; у европейскихъ птицъ плюсна 60—72 м.м., и около трехъ четвертей особей имѣютъ не менѣе 65. Задній палецъ съ когтемъ у сибирскихъ птицъ обыкновенно не болѣе $44\frac{1}{2}$, а у европейскихъ обыкновенно не менѣе $44\frac{1}{2}$ м.м. Различія эти таковы, что сравнивать измѣренія разныхъ лицъ трудно, и собственно сравнимы данныя, полученныя одною рукой и параллельно, т.-е. одновременно (мои цифры относятся къ сухимъ шкуркамъ). И все-таки точное опредѣленіе единичныхъ экземпляровъ (безъ данныхъ мѣстонахожденія) врядъ ли возможно. Но въ серіяхъ опытный человекъ можетъ разобраться, почему и стоитъ пожалуй сохранить особое названіе для сибирскихъ птицъ.

Взрослый воронъ, добытый въ 1901 году экспедиціей графа Бобринскаго на Памирахъ, отличался крупнымъ ростомъ (крыло 455), но слабымъ клювомъ и ногами (хребетъ клюва 68, отъ ноздрей 47, высота у основанія 25, у килевого угла 24, плюсна 60, средній палецъ съ когтемъ 58) и въ этомъ схожъ съ сибирскими птицами, но какъ отъ нихъ, такъ и отъ европейскихъ отличался отсутствіемъ рѣзкой вырѣзки внѣшняго опахала пятого махового, и значительно болѣе острымъ крыломъ: 3-е маховое много длиннѣе 4-го и на 60 м.м. длиннѣе 5-го, 1-ое равно 9-му (у типичнаго и сибирскаго вороновъ 3-е маховое немного длиннѣе, а чаще покороче, чѣмъ 4-ое, и равно 5-му или превосходитъ его не болѣе, какъ на 15 м.м.). Къ этимъ пластическимъ признакамъ присоединялись нѣкоторыя различія окраски (при разсматриваніи „за свѣтомъ“ нижняя сторона была зеленѣе, чѣмъ у другихъ птицъ). Такъ какъ ни одной изъ этихъ особенностей не отмѣчено для настоящаго гималайскаго *C. s. tibetanus* Hodgs., то описываемую птицу я назвалъ въ рукописной обработкѣ сборовъ экспедиціи графа Бобринскаго „*Corvus corax pamirensis*“, но не публиковалъ, не имѣя другихъ экземпляровъ, подтверждаю-

шихъ, что это дѣйствительно не *tibetanus*. Во всякомъ случаѣ интересно, что и у памирской птицы рѣзко выражена слабость клюва и ногъ, свойственная воронамъ сѣверной половины Азіи.

Summary.

Our energetic explorer Capt. V. C. Arseniev during his ethnographical and topographical researches in northern and middle part of Ussuri-land collected during 1906—1910 years 64 species of Birds in 104 specimens. 2 of them seem to represent unnamed races: *Corvus macrorhynchus mandshuricus* was already described by me in this same Journal (1913, № 1, p. 40), and *Perisoreus infaustus maritimus* is being described here from his specimen (28 oct. 1908 riv. Samargi) and other from De Kastrie bay (Vladivostok Museum): in general colouring very much nearer to Scandinavian specimens, than to those from Yakutsk gov.-t., but the cap darker. *Urinator pacificus* (Lawr.), ad. 9 oct. 1907, and *Falco peregrinus harterti* Buturl., ♀ ad. 16 Aug. 1908, middle part of riv. Anuiare so far I know first records for Ussuri-land. *Oenopopelia tranquebarica humilis* (Temm.) and *Glaucidium passerinum orientale* Tacz. form second specimens recorded. Other interesting records are: *Larus glaucus* Fabr., imm., 5 May 1909, Imperial Harbour, *Larus argentatus vegae* Palm., young, 12 Oct., riv. Botan. *Tetrastes bonasia septentrionalis* Seeb. (specimens from southern parts of Ussuri-land I cannot distinguish from the typical form), *Dendrocopus japonicus tscherskii* Buturl. (♂ and ♀), *Xylocopus minor minutillus* Buturl. (4 spec.), *Dendrodromas leucotus clarki* Buturl. (young male, mouths of Amur), *Garulus brandti* Ev. (typical, not *ussuriensis* Buturl.), *Pica pica* L. (moulting-first primary as in true *leucoptera* Gould, others most „typical“),—I consider the *Pica pica leucoptera* as a case of age dimorphism, something like, for instance, the baldness in *Homo sapiens*: only aged men become bald, and not all of them, but minor part, some earlier, some later. Just the same seems to be true about *leucoptera* variety, that is met with in some numbers nearly everywhere (I have Specimens from Sweden, and very extreme cases from Esthonia, and young bird of the true typical form from a nest of *leucoptera* parents).

Птицы Приморской Области.

С. А. Бутурлинъ.

Birds of the Ussuri-land.

By S. A. Buturlin.

с. 89-114


VI ¹⁾.

Сборы 1906—1910 г.г. шт.-кап. В. К. Арсеньева.

Энергичный изслѣдователь Уссурийскаго края, шт.-кап. Владимиръ Клавдіевичъ Арсеньевъ, предоставилъ мнѣ для опредѣленія орнитологическую коллекцію, собранную имъ въ его странствованіяхъ въ теченіе 1906—1910 г.г. въ сѣверной половинѣ Уссурийскаго края. Коллекція не велика, всего 64 вида въ 104 экземплярахъ, но нельзя не поблагодарить неутомимаго изслѣдователя, работающаго по совершенно инымъ специальностямъ, за то, что онъ все же находилъ время и для орнитологическихъ сборовъ, тѣмъ болѣе, что сборы эти, при всей ихъ отрывочности, заключаютъ въ себѣ интересныя новости. Значительное большинство экземпляровъ достаточно датированы относительно времени и мѣста.

По этимъ матеріаламъ здѣсь описывается одна новая форма—*Perisoreus infaustus maritimus*, а другая была мною описана отдѣльно, именно—*Corvus macrorhynchus mandshuricus*, близкая къ *C. m. japonicus* Вр., но съ менѣе

¹⁾ Статья I—„Наша Охота“, 1909 г., кн. XI; ст. II—тамъ же, 1910 г., книги V, VI, VII, VIII и IX; ст. III—тамъ же, 1911 г., №№ 14, 16, 17, 18, 20 и 21; ст. IV—тамъ же, 1913 г., № 17; ст. V—„Птицевѣдѣніе и Птицеводство“, 1913 г., в. 2 и 3.



MESSAGER ORNITHOLOGIQUE.

ОРНИТОЛОГИЧЕСКІЙ ВѢСТНИКЪ.

ORNITHOLOGISCHE MITTEILUNGEN.

Выходить четыре раза въ годъ: два №№ до и два—послѣ лѣтнихъ вакацій.

Подписная цѣна: за 1 годъ—4 руб., за 1/2 года—2 руб. и отдѣльные №№ по 1 руб. съ пересылкой въ Россіи и за границу.

Объявленія помѣщаются на слѣдующихъ условіяхъ: первый разъ за 1 страницу—8 р., за 1/2 страницы—4 р., за 1/4 страницы—2 р. и т. д., остальные разы съ половиною платою.

Всѣ заявленія, вопросы, справки, статьи и проч. просить адресовать на имя редактора Г. И. Полякова, Почтов. отд. «Обираловка», Московск. губ., имѣніе «Савино». Телефонъ № 7—51.

Paraissant quatre fois par an: deux №№—après le Nouvel an et deux №№—après les vacances d'été.

Prix d'abonnement pour la Russie et pour l'étranger (Union Postale Universelle): l'année Rbl. 4, la demi-année Rbl. 2, le numéro Rbl. 1.

Tarif pour les annonces: la première fois 1 page Rbl. 8, 1/2 page Rbl. 4, 1/4 page Rbl. 2, etc., les fois suivantes à moitié prix.

Tous les envois (tranco) pour le «Messager Ornithologique» doivent être adressés au Rédacteur G. I. Poliakov, Russie, Chemin de fer Moscou—Nijninovgorod. Station «Obiralovka», propriété «Savino».

Erscheint jährlich vier Mal: zwei №№—nach Neujahr und zwei №№—nach den Sommerferien.

Preise für Russland (mit Zustellung) und für das Ausland (Weltpostverein): jährlich Rbl. 4, halbjährlich Rbl. 2, Einzelnummer à Rbl. 1.

Preise der Inserate: das erste Mal 1 Seite Rbl. 8, 1/2 Seite Rbl. 4, 1/4 Seite Rbl. 2 u. s. w., für die folgenden Male die Hälfte dieses Preises.

Alle Sendungen für die «Ornithologischen Mitteilungen» sind, als solche bezeichnet an die Redaktion: G. I. Poljakow, Russland, Postabteilung. «Obiralowka», Moskauer Gouvernement, Gut «Sawino», zu adressieren.

СОДЕРЖАНІЕ.

Стр.

1. Птицы Приморской Области. С. А. Бутурлинъ	89
2. Къ орнитофаунѣ Кубанской области. Е. С. Птушенко	115
3. Птицы, наблюдавшіяся во время экскурсіи по Военно-Сухумской дорогѣ. Э. В. Шарлеманъ	118
4. Сибирскій кобчикъ. С. А. Бутурлинъ	126
5. Уссурийскій долгохвостый снѣгирь. С. А. Бутурлинъ	128
6. Сахалинскій шуръ. С. А. Бутурлинъ	129
7. Алтайская кедровка. С. А. Бутурлинъ	131
8. Центральнo-сибирская долгохвостая сова. С. А. Бутурлинъ	133
9. Новая форма вертишейки— <i>Jynx torquilla harterti subsp. nov.</i> Г. И. Поляковъ	135
10. Новая форма свиристеля— <i>Bombycilla garrulus centralasiae subsp. nov.</i> Г. И. Поляковъ	137
11. Алтайскій шуръ. Г. И. Поляковъ и С. А. Бутурлинъ	139
12. Къ географическому распространенію рода <i>Sitta Lin n.</i> Я. Б. Доманевскій	141
13. Имя сибирской хохотуны. С. А. Бутурлинъ	148
14. Къ нахожденію пятнистой кукушки [<i>Coccytes glandarius (Lin n.)</i>] въ Бессарабіи. С. Я. Парамоновъ	150