

ALAUDA

Série II, 4^e année. N^o 3.

Juillet-Septembre 1932

стр. 261-270

SUR LES RACES DU BÉCASSEAU CINCLE (OU VARIABLE) ET DU TÉTRAS A BEC NOIR

par S. A. BUTURLIN

Traduit de l'anglais par N. MAYAUD

I

LE BÉCASSEAU CINCLE (OU VARIABLE) *EROLIA ALPINA* (L.)

J'ai examiné quelques 300 spécimens de Bécasseau cincle de toutes les parties de l'Ancien monde; cependant, la race du Groënland *E. a. arctica* (SCHIOLER) m'est inconnue, et je ne la prends pas ici en considération.

1. *Erolia alpina schinzi* (BREHM) (? *Scolopax pusilla* GMELIN, *Sys. Nat.*, I, 2, p. 663, 1789, partim; *Pelidna Schinzii* CHR. BREHM, *Beitr. z. Vögelk.*, III, p. 355, 1822; *Tringa schinzi* LONDON und BUTURLIN, *J. f. O.*, 1908, p. 67).

Cette race fut tout à fait laissée de côté par SEEBOHM, SHARPE et tous leurs successeurs, et récemment par le Dr E. HARTERT, quoiqu'ayant été parfaitement bien décrite par de vieux maîtres de l'Ornithologie, CHR. BREHM et NAUMANN. Quand, en mai et juin 1907, mon ami le baron H. LONDON et moi-même redécouvrîmes, pour ainsi dire, cet oiseau dans ses colonies nidificatrices des rivages Ouest de l'Esthonie (baies de Hapsal et Matzal-wiek), nous fûmes tout à fait frappés de voir qu'il se distinguait facilement d'*E. alp.* même hors de portée de fusil, et que non seulement sa taille et sa coloration mais aussi sa voix, ses œufs et ses poussins en duvet étaient nettement différents de ceux de la race nominale. Et si je ne le considère ici que comme une sous-espèce, c'est seule-

27 %
28 %
55 %
45 %
29 %

108-126 mm.
112-125 mm.
116,7
17 %
26 %
43 %
57 %
26 %

types peuvent être
en plus des diffé-
d'*E. a. alpina*, les
brunâtres sans blanc
des barbes externes
le rachis chez plus
ont (dans environ
umes. En plumage
rieures sont plus
une teinte ocracée
ine et les parties
se de traits foncés
rine est plus légè-
oiseaux sont plus
es et plus claires ;
accentuée avec des

travers le Nord de
ie jusque sur l'Obi
usqu'au Spitzberg,
e de la Nouvelle-
Pskov et la haute
Sosva, le Tagil et
e hiverne en Médi-
ud-Ouest de l'Asie.

3. *Erolia alpina centralis* subsp. nov. (*Tringa alpina* groupe B BUTURLIN, *Waders of the Russ. Emp.*, II, p. 202, note, 1905 ; *Erolia alpina pusilla* apud HARTERT, *Die Vög. d. Pal. Fauna*, p. 1576, 1920, partim, nec FALK).

Les dimensions sont exactement les mêmes que celles des oiseaux européens (voir ci-dessus). Le Dr E. HARTERT établit que les oiseaux de la Sibérie occidentale, ainsi que de la Petchora, et ceux du bassin du Yenisseï ont des becs plus longs que ceux d'Europe et n'ont jamais d'aussi petites dimensions que parfois ceux-ci. Et il est dans le vrai s'il comprend *E. schinzi* dans les Bécasseaux cinctes, car naturellement il n'y a pas d'oiseaux aussi petits en Sibérie qu'*E. schinzi* (ou bien de tels oiseaux sont extrêmement rares). Mais de vrais Bécasseaux cinctes, de l'Ouest de l'Europe à la Léna et à la Jana, ont exactement les mêmes dimensions, ainsi que déjà relevé.

Et quand le Dr HARTERT déclare qu'en ce qui concerne la coloration, les oiseaux de la Sibérie occidentale et centrale sont identiques aux Européens, cela n'est vrai qu'en partie : comme je l'ai déjà fait remarquer en 1905 (*loc. cit.*), les oiseaux de l'Ouest de la Sibérie (*Sc. pusilla* de FALK) sont vraiment identiques aux typiques *E. a. alpina*, mais les oiseaux du Yenisseï, de la Léna et de la Jana (et de Transbaikalie) nommés alors par moi « groupe B », diffèrent légèrement de coloration, étant à cet égard quelque peu intermédiaires entre les oiseaux d'Europe et ceux du Pacifique.

Dans tous les plumages, les barbes externes des secondaires externes sont brunâtres, rarement avec quelque peu de blanc près du rachis à la partie apparente de la base ; par contre, les liserés blancs des barbes externes à la partie apparente de la base des primaires internes sont bien développés et chez la plupart des spécimens (65 % environ) atteignent le rachis sur les 7^e et 8^e primaires. Dans les détails de coloration saisonnière, cette race est quelque peu intermédiaire, néanmoins plus proche des oiseaux européens.

Mon type est un adulte ♂ 27 mai 1906, près Iakoutsk, n° 23 de ma collection déposée au Musée zoologique de l'Université de Moscou.

Cette race niche sur l'Yenisseï, le Taimyr, le Monjⁿero, la Léna et la Jana, au Nord, sur le Taimyr, jusqu'à environ 75° 30' de lat. N., au Sud, sur l'Yenisseï, jusqu'à 69° de lat. N., mais pas sur les îles de la Nouvelle-Sibérie. Elle émigre à travers la région du Baïkal et la Mongolie.

Série II, 4^e ANNÉE. — N° 3

Juillet-Septembre 1932.


ALAUDA

Revue trimestrielle d'Ornithologie

PUBLIÉE PAR

Paul PARIS

Chargé de Cours à la Faculté des Sciences de Dijon



Robert Haimond
(1932)

Gérance et Administration : **P. PARIS**, Faculté des Sciences
51, rue Monge, Dijon (Côte-d'Or)

Série II, 4^e ANNÉE. — N° 3

Juillet-Septembre 1932.


ALAUDA

Revue trimestrielle d'Ornithologie

PUBLIÉE PAR

Paul PARIS

Chargé de Cours à la Faculté des Sciences de Dijon



Robert Haimond
(1932)

Gérance et Administration : **P. PARIS**, Faculté des Sciences
51, rue Monge, Dijon (Côte-d'Or)