

[Ibis,

glers of *M. squamatus*
after the death of

Iceland.

panied by Mr. D. Haig-
Grafarlönd district of
n of the Geese of that
n this district and up
ed to be *A. albifrons*;
s visit in 1929 (Ibis,
one river, the so-called
brachyrhynchus. There
Grafarlönd Geese might
reve and Mr. Freme
mpanion and I saw
they were all unques-
actually found two
he Jokulsá to where
few pairs of *brachy-*
of lava between the
The scarcity of Geese
e tremendous number
farmers, though the
ere is at any rate no
and that the idea that
confusion between the
was thought to breed
fabalis were *A. anser*.
a trip to the Melsakka
ugh I failed to see any
nots (*Calidris canutus*),
pecies in this district,
(*Nyctea scandiaca*) on
Arenaria interpres) in
these are suspected as
could I find any signs

1934.]

Short Notes.

171

Larus taimyrensis armenicus, subsp. nov.

Black on primaries at least as fully developed as in *L. t. antelivus* Iredale, but mantle silvery grey, much paler than palest specimens of *L. t. taimyrensis* But.: near "pale neutral grey" (Ridgway, Nomencl. of Colours, ed. 1912, pl. liii.).

Breeds abundantly on lakes of Armenia—Gokcha, Abasgoel, Sevang, Ghilli, etc.

"Legs bright yellow; ring of eye-lids vermilion; bill horny yellow, with reddish spot near gonys" (notes from life by Count N. A. Bobrinskoi.)

Type.—Evidently ♂, June 1885, Lake Gokcha; collected by the Transcaucasian expedition of the I. Soc. Friends of Nat. Hist., Anthr. and Ethnogr. no. 24, in Moscow University Museum, R.6015. Wing 443, between tips of shortest secondary and longest primary 235; tail 174; tarsus 69; toes with claws, middle 65, outer 59.5, inner 48.2; exposed culmen 51.2; bill along tomia 79.6, from fore end of nostrils 22.8; height at base 20, at near end of nostrils 17, at the angle of gonys 18.3 mm.

Mr. George V. Sosnin, of the State Museum of Armenia, was kind enough to send me for comparison 8 adult ♂♂, 4 ad. ♀♀, 3 ♀♀ not quite mature, and 2 young birds, 17 specimens in all, collected mostly by himself in 1923, 1927, and 1928 between 5 June and 26 July on two neighbouring lakes, Sevang and Ghilli.

They are all extremely alike, and identical with the type-specimen. Dimensions of adult, 8 males: wing 420, 433–457, mean 440.3; tail 160, 170–184, mean 175.6; between ends of shortest and longest flight-feathers 225–245, mean 238; tarsus 60.8, 65.4–72.2, mean 67.8; middle toe with claw 57.9, 58.5–65.0, mean 61.5; exp. culmen 46.5, 49.2–55, mean 50.6; 4 females measure: wing 395–428, mean 407; tail 162–175, mean 168.5; between ends of shortest and longest flight-feather 220–235, mean 227; tarsus 60–65, mean 63; middle toe with claw 56.5–59.3, mean 57.9; exp. culmen 43.5–52.4, mean 46.23 mm.

Mantle is as pale as in *L. cachinnans* Pall. and in *L. mongolicus* Sushk., but the tint of the grey just a shade warmer; the wing, of course, of quite another pattern, as stated.

exp. 171-172.

THIRTEENTH SERIES.
VOL. IV. No. 1.

JANUARY, 1934.

Price 12/6 net.


из книг
Музея Зоологического
при МГУ
№ 234.

THE IBIS,

A
QUARTERLY JOURNAL OF ORNITHOLOGY.

EDITED BY

C. B. TICEHURST, M.A., M.R.C.S., F.R.G.S.



PUBLISHED BY THE
BRITISH ORNITHOLOGISTS' UNION.

AND SOLD BY
MESSRS. TAYLOR AND FRANCIS, RED LION COURT,
FLEET STREET, LONDON, E.C. 4

стр. 61-100

Птицы тазовской экспедиции Всероссийского географического общества 1926-1927 г.

С. А. Бутурлин

Birds of the Taz expedition of the Russian Geographical Society in 1926/1927 y. (with an english Summary)

by S. A. Buturlin.

В 1926/27 г. г. работала в низовьях р. Таза экспедиция Всероссийского Географического О-ва под начальством Р. Е. Кольса, главным образом, по топографической съемке (см. „Атлас нижнего течения р. Таз (Тасу-Ям)“ и „Река Таз (Тасу-Ям). Описание и пояснение к атласу нижнего течения реки Таза от Хальмер-Седэ до Сидоровской пристани или зимовья В. В. Седелникова“, Ленинград, 1930 г.). Попутно членами экспедиции был собран небольшой орнитологический материал в трех пунктах: в окрестностях г. Тюмени (17 видов в 32 экз.), в окрестностях Обдорска (22 вида в 36 экз.), и в низовьях Таза (52 вида в 244 экз., а всего вместе 68 форм в 312 экз.). Почти все сборы здесь сделаны у Хальмер-Седэ ($67^{\circ} 29,9'$ с. ш., $78^{\circ} 43,5'$ в. д. Гринв) и немногие экз. выше по реке до Мангазеи ($66^{\circ} 36,7'$ с. ш. $82^{\circ} 16,5'$ в. д.). Материал этот был передан Р. Е. Кольсом в Зоологический Музей Московского Государственного Университета с предоставлением мне его обработки, за что я приношу здесь ему и дирекции Музея свою благодарность.

Сборы представляют собою хорошо приготовленные шкурки, надлежаще этикетированные. Нижеприводимые измерения, в мм, делались мною штангенциркулем до 20 см. и деревянным складным метром для более крупных величин.

Если не оговорено в тексте иное, то клюв измерялся по хорде от передней границы лобного оперения до кончика верхней челюсти; если сказано „от ноздрей“, то имеется в виду передний край ноздреватого отверстия. При измерении плюсны один конец штангенциркуля помещался во впадинке на задней стороне голенно-плюсневой сустава, а другой — в месте соединения нижнего конца плюсны с тыловой стороной проксимального конца основной фаланги среднего пальца. Хвост измерялся от места вхождения в кожу средней пары рулевых до вершины самого длинного рулевого. Крыло измерялось от кистевого сгиба до вершины самого длинного из первостепенных маховых, причем крылу придавалось по возможности естественное положение, без вытягивания его во чтобы то ни стало. Если не было явных повреждений или неправильной препарировки, то измерялись оба крыла и записывалась большая цифра; в противном случае измерялось не поврежденное крыло. Если бралась высота основания клюва, то она измерялась у передней границы лобного оперения по нормали к разрезу рта.

r. nostr. от позд- рей	Height высота	
	at base у основ.	at gonys у кила
22	13,2	11,8
25,8	19,6	18,3
26,1	19,7	18,8
26,4	19,5	19,0
25	17,2	17,0
25,4	17,2	17,1
21	15,9	13,2
23	16,9	14,8
19,0	14	12,9
20,4	18	15,8
25	19,5	18,5
13,3	10	—
13,3	10,6	—

ально от Енисейского
дробно были рассмот-
налов Красноярского
по птицам Енисей-
я определения тазов-
ея МГУ и должен ос-
ь примеру некоторых
серебристых чаек и

века работавшим над
сходную монографию
rt. III, pp. 194, 206—7,
Larus argentatus Pon-
boks, omissus Pleske ex
цветовых отличий опе-
елесным или багрово-
ий и у клуш этот окрас
a. omissus нашего севе-
ясняться либо смеше-
ющимися тем, что раса
либо даже скрещиванием
рессор и я, экскурси-
здающейся в Финском

ске и П. П. Сушкин
айтом (см. Th. Pleske
5, 1928), объединяющим
ругих ноги во взрослом
луша и сибирская хох-
тоной хохотуньи, бу-
примеси более свежлого
очень близкими между
итков и Бутурлин,

По северу России, стр. 9—10 и 86, 1901). Но все же объединить их нельзя: клуша в общем гораздо мельче, с более слабой лапой. По общей окраске мантии типичная клуша (*L. fuscus fuscus* L.), встречающаяся на Белом море с сибирской хохотуньей (*L. taimyrensis antelius Iredale*) всегда резко отличается от последней, не давая ни переходов, ни помесей, так как у клуши мантия черная, или черно-аспидная (в выцветшем состоянии черно-бурая), а у самых темных особей сибирской хохотуньи—стально-серая.

Правда, у британской клуши (*L. fuscus affinis* Reinh.). мантия темно-серая, близкая к окрасу сибирской хохотуньи, но как раз ареалы этих двух птиц нигде и близко не сходятся, будучи разделены всем пространством между Британскими и Фарерскими о-вами и устьями Северной Двины. Кроме того, остается различие в величине и пластике. Плеске (Ic.) упоминает, что Сушкин нашел у этих двух групп различия в форме крыла, именно очень вытянутую форму крыла у клуши. Замеченная мною по материалам Зоол. музея МГУ разница касается собственно не формы крыла (по моим измерениям соотношения разных частей крыла одинаковы у обоих видов), но его относительной величины, которая действительно несколько больше относительно общей величины тела у *L. fuscus*.

Интересно отметить следующее параллельное явление в трех из групп этих чаек.

Клуша *L. fuscus* L., имеет три подвида: два северных, типичный *fuscus*—более восточный (Скандинавия, Кольский полуостров) и британский *affinis* Reinh.—более западный, и третий на дальнем юге—*atlantis* Западной Африки и Азорских и Канарских о-вов.

Серебристые чайки с красным кольцом краев век имеют три подвида: два северных, именно восточный *L. arg. vegae* Palm. (от Чукотского полуострова и Анадыря до Лены) и другой очень плохо и даже едва географически обособившийся, но более западный *L. arg. birulae* Pleske ex Sushkin (запад. и вост. Таймырь, до Новосибирских о-вов и Колымы). И третий далеко на юге *L. arg. mongolicus* Sushkin в северо-западной Монголии и юго-восточн. Алтае. (Другие расы имеют бледно-желтое кольцо век, по крайней мере в Палеарктике).

Наконец, сибирские хохотуньи *L. taimyrensis* But., также имеют три подвида: два на севере, чуть более светлый восточный *taimyrensis* But. от Енисейского залива до Хатанги, Есеея и Моньеро, другой потемнее—западный *antelius* Iredale от Енисейского залива до Белого моря (Хартерт и Двайт их соединяют, но Плеске и Сушкин вполне поддерживают различия, впервые указанные мною в 1911 г.). И третий подвид опять таки далеко на юге.

Этот подвид, намеченный мною много лет назад я назвал *Larus taimyrensis armenicus* subsp. nova. Тип—взрослый экземпляр Московского музея МГУ с ярлыком: „Закавказская экспедиция И. о-ва любит. естеств., антр. и этногр. июнь 1885 г., Гокча № 24. R-6015“. На оз. Гокча это довольно обыкновенный гнездящийся вид, как говорил мне член Закавказской экспедиции покойный К. А. Сатунин, а так же много позже бывший там Н. А. Бобринский. Я решаюсь описать подвид на 1 экз.,¹⁾ так как есть и цветовые и легкие пластические отличия: Ниже я даю некоторые измерения этого экземпляра параллельно с одним экз. *L. taim. antelius* с Ямала, оз. Нейто, 18 мая 1908 г. № 23, самец, сбор Б. М. Жит-

¹ Настоящая работа была уже готова к печати, когда Моск. зоологический музей получил благодаря Г. В. Соснину от музея Армении большую серию этих птиц, вполне подтверждающую отличия этой расы. Уже во время печатания настоящей статьи описание этой расы опубликовано в *The Ibis* 1934, январский номер, стр. 171.

zen über die Rodentia) VII.	
geographische Brachiones	3
Географическое видовой состав	14
Thos (Mammalia,	
and K. Flerov— matics of the Sub-	15
variation de colora- ys schapochnikov	44
Sur la variabilité co peregrinus dans de la région Pa-	45
Notes sur le ger-	54
Birds of the Taz ssian Geographical	95
Le v—Les races géo- a ulula L.	101
tskaia—Notes sur el'Asie centrale	112
11—Eine Hybriden- entilus aralensis Berg chalcoides aralensis	115
Neue und wenig sche Wespidenarten	117
avtsev—Über die hen Tenthredinidae nchulski Sammlung	148
ес в—Новые и мало (Znoidea из Восточ-	154
ev—Note sur la nique de l'Acrido-	156
Этюды по систе- leoptera, Meloidae)	157
Новый вид рода leoptera, Tenebrio-	160
Ави	161

СБОРНИК ТРУДОВ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

(при МГУ)

1

Archives du Musée Zoologique
de l'Université de Moscou

I

Издание Зоологического музея (при МГУ)
Москва — 1934 — Moscou