

над верхним краем ушей белая полоска; поперек зоба черная полоса, охватывающая кольцом сзади и основание шеи; белый цвет горла также охватывает шею белым кольцом. Крайняя пара рулевых белая, иногда с черной предвершинной полоской, другие рулевые бурые с белыми концами и черной или черно-бурой полосой перед белой вершиной; полоса эта нерезко отграничена от бурого цвета и на центральной паре она, как и белый кончик, мало или не заметна. Стержни первостепенных маховых в средних частях белы; внутренние из второстепенных маховых почти совсем белы. Основная половина клюва оранжево-желтая.

Самка и зимний наряд едва отличимы от летнего самца, но уши несколько буроваты. Молодая птица имеет зобное ожерелье и ушные партии темнобурые, темя не черное, и перья верха с бледными вершинными каемками.

Галстучник гнездится от самых северо-восточных частей Северной Америки, по всей почти Европе и северной Азии. На севере он гнездится в Гренландии, на Шпицбергене, Колгуеве и обоих островах Новой Земли, на Таймыре под 75° с. ш., на Ново-Сибирских островах, северном побережье Чукотской земли. К югу на гнездовании он идет включая Британские острова, Францию и, вероятно, Пиринейский полуостров, острова Сардинию и Сицилию, Италию, Македонию, Кавказский край (до 1900 м. над уровн. моря, редок), долину Волги. Восточнее Волги, Каспийского моря и Камы и вплоть до Лены далеко к югу не спускается, гнездясь в небольшом числе по среднему течению Илека, и, по словам Мензбира, изредка по Сыр-Дарье. Вообще в заволжских и зауральских степях, в бассейнах Иртыша, верхнего Енисея, в Барабе, Кулунде, Алтае, Саянах и на Енисее к югу от 64° с. ш. гнездящимся не найден. На Лене, однако, гнездится до района Киренска, обыкновенен на Индигирке, Колыме и Анадыре, но на Камчатке и Амуре не найден.

Зимует в южной Европе и на Британских островах и в юго-западной и южной Азии, включая южный Китай, но, главным образом, в Африке. Распадается на несколько рас.

(13) Среднеевропейский галстучник *Charadrius hiaticula hiaticula* L.

Ch. hiat. major Seebohm, 1885, Британские острова.

Отличается сравнительно бледной окраской верхней стороны и крупной величиной: крыло $12\frac{1}{2}$ —14 см, хвост $6\frac{1}{2}$ —7 см, плюсна 2,5—2,85 см, клюв 1,3—1,6 см. Гнездится в южной и средней Европе, к северу до Британских островов, южных частей Скандинавии и западных побережий Эстонии. Вероятно, сюда же относятся птицы Кавказа и нижнего и среднего Поволжья и Илека. В Азии, повидимому, не зимуют (в Индии не найден).

(14) Западносибирский галстучник *Charadrius hiaticula tundrae* (Lowe) (Харадриус гиатикуля тундрэ).

Aegialitis hiaticula tundrae Lowe Bull. Br. Orn. Cl. XXXVI, стр. 7, 1915, Енисей.

Отличается слегка более темной окраской и мелкой величиной: крыло $11\frac{1}{2}$ —13,2 см, хвост 5,2—6,4 см, плюсна 2,2—2,6 см, клюв $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ см. Гнездится от северной Скандинавии, Мурмана, Колгуева и Новой Земли на восток до Таймыра и, может быть, несколько восточнее. Сюда же относятся птицы района Ленинграда и Финского залива и верхнего Поволжья (районы Калинина, Костромы). Зимуют в Индии и юго-западной Азии до северо-восточных частей Африки.

(15) Колымский галстучник *Charadrius hiaticula kolymensis* But. (Харадриус гиатикуля колимензис).

Ch. h. kolymensis Бутурлид **Subsp. nov.** дельта Колымы.

Крупнее предшествующего (крыло около $12\frac{1}{2}$ — $13\frac{3}{4}$ см), темнее, более шоколадно-бурый сверху, и белый цвет на первостепенных маховых менее развит, чем у других рас, захватывая пристержневые части наружного опахала обычно лишь с 5-го пера и распространяясь до его наружного края лишь с 8-го или 9-го.

Гнездится в бассейнах Колымы, Индигирки и, вероятно, Лены и Анадыря (летние особи со среднего течения Лены в коллекции Бутурлина). Зимует, очевидно, в юго-восточной Азии.

ПОЛНЫЙ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПТИЦ СССР

С. А. БУТУРЛИНА и Г. П. ДЕМЕНТЬЕВА

ТОМ ПЕРВЫЙ

С. А. БУТУРЛИН

КУЛИКИ, ЧАЙКИ, ЧИСТИКИ
РЯБКИ и ГОЛУБИ

С 20 ТАБЛИЦАМИ РИСУНКОВ

К О И З

ВСЕСОЮЗНОЕ КООПЕРАТИВНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ ИЗД-ВО
МОСКВА 1934 ЛЕНИНГРАД

255стр