

Большой белый гусь *Anser hyperboreus nivalis* (Forst.).

Anas nivalis Forster Phil. Trans LXII, стр. 413, 1772, Гудзонов залив.

Имеет крыло около 44—45½ см, плюсну 8—8,9 см и, главное, клюв 6¼—6,9 см. Гнездится от Баффиновой земли до северной Гренландии, зимует по атлантическому побережью юга Соединенных Штатов Америки, во Флориде и у устьев Миссисипи и в Вест-Индии. Не раз залетал в Европу.

У нас на пролетах и зимовках в Поволжье и на Каспии иногда видят белых гусей¹. Но какой именно формы — за отсутствием экземпляров в коллекциях — сказать трудно. От Чукотской земли до Оби, Волги и Каспия — путь не ближе и не легче, чем от Гренландии. А наблюдатели не раз отмечали крупный рост этих гусей. Это, в связи с более частым залетом большого белого гуся в западную Европу, заставляет предполагать, что упомянутые волжские и каспийские белые гуси скорее принадлежат к крупной восточноамериканской расе, как это более 30 лет назад высказывал Бутурлин. Но это только предположение, почему эту расу мы приводим без номера.

Вопрос о восточноазиатской расе и быть не может, так как малый белый гусь именно оттуда и был впервые описан Палласом.

IV Г — Подрод: Гуменник *Melanonyx* But.

Melanonyx Бутурлин, Дикие гуси Росс. имп., стр. 22, 1901, тип: *Anser serrirostris* Swinh.

Гуменники — довольно большая группа, по меньшей мере из 4 хороших видов, а с подвидами — до 9 форм, из которых часть, однако, еще плохо выяснена. Они отличаются яркими или бледными ногами, черным ноготком клюва и двуцветной (черной с желтым или телесным) окраской остальной части клюва, причем зубцы клюва окрашены более или менее под цвет прилегающих частей клюва. Общая окраска тела с головой и шеей серовато-бурая (только, конечно, задняя часть брюшка с верхними и нижними кроющими хвоста белы), причем различия в оттенках у отдельных видов указаны в таблицах. Большой или меньший рыжеватый или золотистый налет на голове и шее не имеет значения (как и у лебедей, белых гусей и т. п.).

Ни в каком возрасте черных пятен на брюхе не бывает. У молодых цвета лап и клюва грязны, ноготок нередко с бледной вершинкой, светлые и темные цвета на клюве разграничены не резко, помимо уже указанной для гусей вообще возрастной разницы в форме перьев.

По нравам, общему облику и голосу гуменники — очень тесная группа, в которой издавна и, как это ни странно после работ Алфераки, повторившего открытия Брема и Науманна, — до сих пор очень путаются орнитологи, даже такие, как Хартерт. А по числу форм этот подрод почти заслуживал бы быть противопоставленным в качестве полного самостоятельного рода другим настоящим гусям.

Мы имели довольно редкую счастливую возможность, помимо музейских материалов, наблюдать живых гуменников на воле многими тысячами и стрелять их лично сотнями от берегов Балтийского моря до берегов Берингова пролива и от Новой Земли до Среднего Поволжья, почему нам и легче было разобраться с ними.

13. Коротконосый гуменник *Anser brachyrhynchus* Baill. (Анзэр брахиринхус).

Anser brachyrhynchus Baillon Mem. Soc. R. Abbeville 1833, стр. 74, Франция; *Melanonyx segetum* apud Bianchi Ежег. Зоол. муз. Ак. Н., XIV, стр. 14, 1917 пес Гм. См. табл. XI рис. 3; табл. XII рис. 7.

Коротконосый гуменник достаточно охарактеризован в таблице. Крыло 40—46 см, хвост 13¼—14¼ см, плюсна 5,6—7,7 см; вес 2,75—3,29 кг.

Гнездится в восточной части Гренландии, на Шпицбергене, повидимому

¹ И даже западнее: 20 октября 1926 г. Э. Сарандинаки наблюдал стаю в 9 штук на Днепре у Кременца.

в Исландии и может быть на Земле Франца-Иосифа, зимует в большом числе у берегов Британии и залетает в некоторые страны зап. Европы. По словам Бекера 1 экземпляр «несомненно» этого вида, с клювом 40,6 мм, был добыт в Индии (в Ассаме). К сожалению, об оперении Бекер ничего не говорит.

У нас коротконосый гуменник встречается в очень малом числе, как сказано, и может быть гнездится на Земле Франца-Иосифа и однажды (21 апреля 1912 г. Д. С. Шереметевым) был добыт на Ильмене у устья Ловати (словесное сообщение С. Н. Алфераки Бутурлину). Все другие указания на встречи с этим гуменником относятся, гораздо вероятнее, частью к тонконосому, частью к новоземельскому гуменникам. В частности, это замечание относится и к тем 4 гусям, выращенным из пухового состояния в неволе, которых видел в 1880 г. в Коле Ф. Д. Плеске и у которых были пепельно-серые мелкие и темнобурые большие кроющие крыла (как пишет в 1928 г. Ф. Д. по воспоминаниям в *Birds of the Eurasian Tundra*, стр. 313—314).

14. Тонконосый гуменник *Anser neglectus* Sushk. (Анзэр нэглэктус).

Anser neglectus Sushkin В. Br. О. Cl. V, стр. VI, 1895, район Уфы. См. табл. XI рис. 6; табл. XII рис. 8.

Тонконосый гуменник достаточно охарактеризован в таблицах. Крыло 45—50 см, плечо 7,4—8 см, клюв 5,4—6,9 см. Вес около 3,89 кг. Число зубцов в верхней челюсти с каждой стороны 23—28.

Странным образом, этот совершенно самостоятельный и резко отличный вид (в особенности характерен слабый клюв, с наибольшей глубиной нижней челюсти только около 6—6½ мм (у взрослых) до 1895 г. оставался совершенно неизвестным, а настоящая область его распространения не установлена и до сих пор. Он в огромном числе пролетает в Уфимском и Белебеевском районах, где и открыт Сушкиным. На зимовках встречен в Венгрии (Мадараш), Югославии, в Персии (Зарудный), Туркестане и не раз в Индии, где всегда, по розовой окраске лап и предвершинной части клюва, принимался за *Al. brachyrhynchus*¹. Был раз добыт на Енисее (Зибомом, по свидетельству Отса).

На гнездовии однако, найден только на Колгуеве (Тревор Бетти), вероятно на Новой Земле (Носилов, молодая птица; Маточкин Шар, Бутурлин, несколько особей осенью) и в дельте Печоры (1 экземпляр начала июля в коллекции Бутурлина). Почти наверное к нему же относятся указания на гнездование «*A. brachyrhynchus*» в Лапландии. Все это не объясняет его обильных пролетов в Уфимском районе, и его главная гнездовая область должна лежать где-либо в лесной полосе между Печорой и Обью, и еще не открыта.

15. Большой гуменник *Anser fabalis* (Lath.) (Анзэр фабалис).

Anas Fabalis Latham Gen. Synop. Suppl. I стр. 297, 1787, Британия; *A. segetum* Gmelin S. N. 1, 2, стр. 512, 1789.

Большой гуменник нередко называется в книгах «полевым»; но это название не имеет смысла. Как видно из таблицы признаков, этот гуменник имеет своеобразное строение клюва: он длинный, но сравнительно низкий и не очень толстый, со сравнительно коротким и круто загнутым вниз ноготком, длина которого содержится во всей длине клюва более 4 раз. Зубцов по каждому краю верхней челюсти 24—30 (Рис. 2 и 5 табл. XI, рис. 3 и 6 табл. XII).

Распадается на 2 резко различные формы, которые мы пока принимаем за подвиды условно, только ввиду недостатка материала из широкой промежу-

¹ Указание на Телецкое оз. в Алтае основано на неверном определении добытой 16 мая 1906 Гессе (Hesse) птицы.

Точной между их областями распространения полосы, где может быть будут найдены промежуточные особи, которых мы пока не знаем.

(17) Желтоклювый гуменник *Anser fabalis fabalis* (Lath.) (Анзер фабалис фабалис).

Anser arvensis Brehm Handb. Nat. Vögl. Deut., стр. 839, 1830, Германия; *A. middendorffii* Северцов Гор., и верт. распр. Туркес. жив., стр. 70, 149, 1872; *A. fabalis* apud Hartert partim!

Желтоклювый гуменник несколько поменьше следующей расы, хотя все же очень крупен — и у старых птиц желтый цвет на клюве развит не только перед ногой, но и на основной половине клюва, обыкновенно преобладавая над черным.

Крыло 41—49 см, обыкновенно 42—47 см, очень редко 50 см, хвост 13—16 см, плюсна 6,6—8,2 см, клюв 5,4—7,2 см, обыкновенно 5,9—6,9 см; наибольшая глубина нижней челюсти у взрослых 7—8½ мм, у молодых 6—8 мм; зубцов с каждого края верхней челюсти обыкновенно 24—28 (рис. 2 табл. XI; рис. 3 табл. XII). Вес 3,0—4,5 кг.

Ввиду постоянного смешения близких форм и даже разных видов гуменников, продолжающегося и у русских и у иностранных орнитологов до сих пор, распространение плохо выяснено. Гнездится в Скандинавии между 63 и 70° с. ш., в Лапландии, Финляндии к югу до 62° с. ш., в Карелии, изредка на Псковском оз., под Архангельском, на Колгуеве (Бугурлин), в низовьях Оби; на Новой Земле линяет в большом числе и вероятно гнездится, так как мало вероятно, чтобы он прилетал туда специально для линьки; многочислен на Енисее между 64° и 71° с. ш. и почти наверное распространяется еще несколько восточнее по низовьям всех трех Тунгузок.

Зимует в очень большом числе у берегов Британии, а также западной и южной Европы, на побережьях Черного моря, включая Крым, в Закавказье и в немалом числе в Туркестане, где крупные особи его послужили типами Северцовского *A. middendorffii* (типы исследованы Алфераки и Бугурлиным в музее Акад. Н.).

Возможно, что этот же гуменник гнездится в районе Алтая и у Барнаула. Но указания сводки Тугаринова (Зап. Сиб. Огд. Г. Русс. Геогр. О. т. I, в. I, стр. 6, 1927 г.) на гнездование его в тундровой полосе между Обской и Енисейской губами и в Таймырской тундре, вероятно, ошибочны: ни на Ямале, ни далее на восток большой гуменник в тундру не проникает. Его и местное население зовет лесным гусем.

(18) Сибирский большой гуменник *Anser fabalis sibiricus* Alph. (Анзер фабалис сибирикус).

Anser grandis Middendorff Bull. Ph. Math. Ac. Sc. St. P., III, № 19, стр. 298, 1844, В. Сибирь, nec Gm.; *A. middendorffii* auct. partim, nec Severtz.; *Melanonyx arvensis sibiricus* Алфераки Гуси России, стр. 9 и 98, 1904.

Сибирский большой гуменник — самый крупный из гуменников: крыло 45—51 см у старых чаще более 47 см, плюсна 7,4—8,8 см, клюв 6,4—8,3 см, глубина нижней челюсти 8,8—12 мм, у молодых и 8 мм (рис. 5 табл. XI; рис. 6 табл. XII). Основная часть клюва, включая ноздри, даже у самых старых птиц сплошь черная и желтый цвет (или оранжевый) образует лишь кольцо между ногой и ноздрями.

В Сибири его очень удачно называют лесным гуменником или лесным гусем, так как в тундре, занятой малым гуменником, он не гнездится, а распространен в лесной полосе от верховьев Хатанги (р. Котуй сбор А. Ф. Чирковой, определенный Бугурлиным) до Камчатки. Но на Командорские острова только изредка залетает, а для Земли Чукчей (также безлесной, как и эти острова) приведен Алфераки, да еще в качестве изобильного, по чистому недоразумению. К северо-западу идет до Боганиды на Таймыре. Встречается в верховьях Яны, но в низовьях Индигирки и Колымы, к югу до 67½° с. ш. экспедицией Бугурлина не встречен. Поэтому чрезвычайно странно, что в своей большой, не раз упомянутой работе о птицах тундры (1928 г., стр. 314 и 316) Ф. Д. Плеске «предполагает по аналогии с западной расой», что *A. f. sibiricus* — более северная птица, чем *A. s. serrirostris*, и предполагает, что последняя птица — только случайный гость тундры. Между тем еще за 75 слишком лет до выхода книги Плеске Миддендорф уже указывал, что у местных жителей притундровой полосы Сибири *A. f. sibiricus* носит характерное название лесного гуса, и за 20 лет до выхода книги Плеске Бугурлин в известных Плеске изданиях (как в «Нашей охоте» 1908, ноябрь, стр. 27, так и в классической работе Dresser 1910 г. о ойцах палеарктических птиц, в которой сотрудничал Бугурлин) на основании не предположений и аналогий, а длительных наблюдений и огромного материала, правильно указал географические соотношения этих птиц.

Гнездится далеко к югу, особенно в горах — Саяны, Танну-Ола, В. Н. Троицкий нашел его гнездящимся в Кузнецком Алатау и Сушкын даже приводит его для Алтая, а Хахлов — для Зайсан-нора. Гнездится даже в северо-западной Монголии и вероятно в Уссурийском крае.

В Европу не залетает и крайне редко залетает даже в Туркестан, зимует же в Китае и Японии и один раз добыт в Бирмане.

16. Малый гуменник *Anser serrirostris* Swinh. (Анзэр сэрирострис).

Anser segetum var. *serrirostris* Swinhoe Pr. Z. S. Lond. 1871, стр. 417, Китай.

Малый гуменник в противоположность большому распадается на целый ряд постепенно переходящих друг в друга подвидов. В целом, как вид, он резко отличается формой клюва, более короткого и высокого, с значительно более продолговатым (овальным или эллиптическим) ноготком, к тому же значительно менее круто загнутым на переднем конце вниз, так что длина ноготка (измеряя конечно в плане или проекции) содержится в длине всего клюва менее 4 раз. Не менее наглядна более значительная глубина и как бы вздутость или неравномерная утолщенность нижней челюсти. Желтый, или розовый, или красный цвет никогда не преобладает на клюве. Зубцов в верхней челюсти обыкновенно 20—24, редко 19 или больше 25 (рис. 1, 4, 7 табл. XI; рис. 1, 2, 5 табл. XII).

Все эти признаки совершенно постоянны и между многими сотнями исследованных нами гуменников (в том числе иногда серии, на которые делались ссылки для доказательства переходов) мы никогда никаких переходных или промежуточных особей между большим и малым гуменником не видели. Но понятно (как и в других близких видах птиц), что если брать только отдельные единичные признаки и притом у очень молодых птиц, то неопытному лицу определение будет трудно.

Даже живых птиц на порядочном расстоянии легко можно отличать, когда эти 2 вида бывают вместе, как иногда бывает на пролетах (хотя, вообще говоря, они имеют каждый свои пути и образуют отдельные стаи). Малый гуменник не только меньше, но и относительно как то покороче и повыше на ногах.

Если несмотря на превосходные работы Науманна и Алфераки орнитологи (в особенности с нележкой руки Хартерта, сделавшего из гуменников совершенную кашу) до сих пор безнадежно путаются в этой группе, так что большинство фаунистических работ приходится в этом случае отбрасывать по невозможности понять, о каком именно виде и подвиде приводит автор свои данные, то это печальное положение гораздо простительнее для западноевропейских, чем для наших орнитологов: все расы малого гуменника гнездятся только в нашей стране, да и залетают в западную Европу очень редко, почему там их и не знают, и почти не имеют в музеях.

Некоторые из нижеперечисленных рас основаны на очень незначительном материале. Мы, однако, считаем безусловно необходимым различать их, так как иначе никогда невозможно будет выяснить их истинное значение и распространение. Соединить оказавшиеся неправильно разделенными формы можно в любой момент и без малейшего труда. Но разделить данные, в которых спутаны две формы, в конце-концов оказавшиеся не тождественными, обыкновенно бывает окончательно невозможным и требует новых сборов и наблюдений. К сожалению и номенклатура этих гусей также невероятно перепутана, как и их систематика.

(19) Западный малый гуменник *Anser serrirostris rossicus* But. (Анзэр сэрирострис россикус).

Anser — или *Melanonyx segetum* «Gm.» всех авторов, отличавших малого гуменника, включая Бутурлина 1902 г. и Алфераки 1904 г., упускавших из вида, что Гмелин дал имя «*segetum*» тому самому гу, о котором говорил ранее Латам под именем «*fabalis*», т. е. большому гуменнику, единственному, кроме коротконосого, известному на Британских о-вах; *Anser (Melanonyx) serrirostris rossicus* Buturlin nom. emend.

Западный малый гуменник самый мелкий в пределах данного вида; крыло 41—45 см, плюсна 7,4—7,6 см, клюв 5,0—6,3 см, причем высота у основания 2,6—3,3 см, а глубина

нижней челюсти $7\frac{1}{2}$ —10 мм, изредка (в восточной части области) $10\frac{1}{2}$ мм. Желтый или оранжевый цвет на клюве под ноздри почти никогда не распространяется. Зубцов в верхней челюсти с каждой стороны 20—24, редко 25. (Рис. 1 табл. XI; рис. 1 табл. XII). Вес около 2,4—3,2 кг.

Западный малый гуменник в большом количестве гнездится в тундрах Колгуева, низовьях Печоры, в Большеземельской тундре и на Ямале, и далее на восток (заходя отчасти и в полосу лесотундры) до бассейна Хатанги, где еще многочислен: из 57 штук сбора А. Ф. Чирковой 1931 г., по определению Бутурлина 50 типичных малых западных гуменников, только 2 восточной формы и 5 более или менее переходных экземпляров. Местное население хорошо отличает его от большого гуменника, называя тундровым гусем. К западу, вероятно, доходит до Белого моря, так как на пролете в Эстонии, по наблюдениям Бутурлина значительно многочисленнее большого гуменника (и потому очень странно, что его так редко находят в Западной Европе). На Енисее особенно многочислен между 69° и 71° с. ш., но обыкновенен и между 71° — 73° , постепенно вытесняясь более северным белобым гусем.

Зимой на Британских островах встречаются лишь единичные особи, повидимому очень редок и в других частях западной Европы (но из-за смешения авторами видов быть уверенным трудно). Единичные же встречается на пролетах в области Ильмена, верхней Волги и Оки, но многочислен в Полтавщине и на средней Волге¹. Редок зимою в Туркестане, но пролетает в порядочном числе Кулундинской степью и пролетные встречены у Байкала, в восточной Монголии и даже в Алашане. Места массовых зимовок еще не известны!

(20) Новоземельский гуменник *Anser serrirostris carneirostris* But. (Анзэр сэррирострис карнеирострис).

Anser segetum Neuglia J. f. O. 1872, стр. 121; *A. segetum* var. Билькевич Мат. к исслед. млек. и пт. Нов. Земли, Прил. к учен. Записк. Казан. Унив. за 1904 г. стр. 24; *Anser (Melanonyx) carneirostris* Бутурлин «Дикие гуси etc. стр. 28, 1901; «*Anser fabalis fabalis*» part. i и «? *Anser neglectus*» pt. apud Hartert Vög. palaearct. стр. 1283 и 1286, 1920; ? *A. fabalis curtus* Lönnberg Fn. och. Fl. 1923, стр. 276.

Новоземельский гуменник отличается от предшествующей формы только тем, что предвершинная часть клюва не желтая или оранжевая, а красновато-телесная; кроме того, и оперение головы несколько потемнее. Ноги такие же оранжевые. Это было впервые отмечено Гейглином, затем самостоятельно отмечено на серии в 9 особей С. И. Билькевичем. Различие это не велико, притом на давно убитых, а тем более сухих экземплярах цвета клюва обыкновенно нельзя установить. Но все же это различие постоянное, так как на довольно большом количестве западной и огромных сериях восточной формы малого гуменника такой окраски никогда не наблюдалось нами. Поэтому приходится эту форму отличать.

Гнездится в довольно большом количестве на Новой Земле и, повидимому, в небольшом числе на Ямале (по сообщению Б. М. Житкова Бутурлину in litt.). На пролетах добыт в районах Уфимском, Пензенском, Рязанском и в Польше (Келецкий район). Один экземпляр добыт зимою в Голландии. Возможно, что сюда же относится мелкий гуменник несомненно этого же вида (*serrirostris* — старейшее видовое название), описанный, как особый подвид (*curtus*), по 4 экземплярам Лоннбергом из провинции Шанси в Китае. По крайней мере Лоннберг, не говоря о цвете клюва, отмечает очень темный цвет головы.

(21) Восточный малый гуменник *Anser serrirostris serrirostris* Swinh. (Анзэр сэррирострис сэррирострис).

Кроме видовой цитаты еще *Anser oatesi* Rickett Bul. Br. O. Cl. XI, стр. 46, 1901, Китай: описание никакая негодное, но типы подробно изучены Генри Дрессером для Бутурлина и согласно инструкции последнего.

Восточный малый гуменник отличается от западной формы только несколько большей величиной, особенно более сильным клювом: крыло $41\frac{1}{2}$ —48,8 см, плюсна 7,1—9,0 см, клюв 5,8—7,2 см, но обыкновенно 6,2—6,9 см; наибольшая глубина нижней челюсти $9\frac{1}{2}$ —12 мм, у молодых иногда 9 мм. Вес 2,66—3,69 кг, обыкновенно 3,25—3,59 кг. Зубцов в верхней челюсти обыкновенно 20—25, редко 19 или 26. Желтый цвет предвершинной перевязи клюва почти никогда не распространяется назад под ноздри (по серии в несколько сот штук, исследованных в дельте Колымы Бутурлиным) (рис. 7 табл. XI; рис. 5 табл. XII).

Гнездится в очень больших количествах в тундрах Якутии и в лесотундровой полосе, идя к востоку по меньшей мере до мыса Шелагского, а к западу нормально — до Лены,

¹ В 80-х и 90-х гг. в Среднем Поволжье он значительно преобладал над желтоносым гуменником. (Рузский, Бутурлин. Теперь по свидетельству А. А. Першакова имеет место обратное соотношение.

и даже до Хатанги, где, однако, уже редок (из 57 штук сбора А. Ф. Чирковой в 1931 г. только 2 несомненно этой формы). Отдельными парочками, повидимому, идет до Енисейского залива, но указание Тугаринова (Зап. Ср. Сиб. От. Г. Рус. Геогр. О. I, в. 1, стр. 6, 1927), будто он распространен в Обь-Енисейской тундре может, конечно, относиться только к самому побережью Енисейского залива. К югу гнездится еще в бассейне Вилюя (по крайней мере, в северной части). О гнездовании какого гуменника говорит Миддендорфф, упоминая о Шантарских островах и Становом хребте, сказать наверное трудно, но вероятно не об этом (а о *A. tabalis sibiricus*). На Ново-Сибирские острова не заходит.

На пролетах встречается от Барнаула до Сахалина и зимует в Японии и в огромном числе как на побережьях Китая, так и внутри его. (У колымских особей Бутурлин находил в мясе самодельных кованые железные крючки от перевесов, которыми их ловят китайцы зимой у порогов Ичанга на Голубой реке, а также китайскую чугунную дробь).

(22) Клювастый гуменник *Anser serrirostris mentalis* Oates (Анзэр сэрриро-стрис менталис).

Anser mentalis Oates Manual Game B. Ind. II, стр. 77, 1899, Япония.

Клювастый гуменник отличается исключительно своей еще более крупной величиной, как еще более восточная раса. Крыло 48—52 см, плюсна 8,2—10, клюв 6,9—7,5, высота у основания 3,6—4,2 см, и глубина нижней челюсти 12 и чаще 13—15½ мм. Зубцов в верхней челюсти с каждой стороны 20—25. Желтая предвершинная окраска клюва идет по бокам его далеко назад, под ноздри (рис. 4 табл. XI; рис. 2 табл. XII).

Известные нам особи этого гуменника добыты зимою в Японии и южной Манчжурии, на пролете на острове Беринга и 16 июля 1905 г. в дельте Колымы (где, несомненно, не гнездится), везде только по 1 экземпляру. Дальнейшая работа краеведов и охотников Дальнего Востока должна выяснить, где гнездится эта загадочная птица (может быть, на побережьях Охотского моря и в Коряцкой земле) и каковы действительные пределы колебаний ее размеров, а также не являются ли они просто редкими исключениями по величине, особь старыми особями восточного малого гуменника. Последнее предположение, конечно, мало вероятно, так как в подобном случае такие особи встречались бы и в других местах, в особенности там, где настоящий *A. ser. serrirostris* особо многочислен.

(23) Анадырский гуменник *Anser serrirostris anadyrensis* But. (Анзэр сэррирострис анадырэнзис).

Melanonyx segetum serrirostris Алфераки, Гуси России, стр. 121, 1904, part. nec Swinhoe; *Melanonyx anadyrensis* Бутурлин, Наша Охота, 1908, ноябрь, стр. 26—27, тип самец от 11 июня 1902 г. пост Ново-Маринский, в коллекции М. А. Мензбира,

Анадырский гуменник по величине почти не отличается от типичного *serrirostris*: крыло 44½—50½ см, плюсна 7½—8¼ см, клюв 6½—7 см, высота основания 3,8—4,1 см, глубина нижней челюсти 10—13½ мм. Зубцов с каждого края верхней челюсти 21—25 (всего по 5 известным особям). Ноги также оранжево-желты, но предвершинная полоса клюва красновато-телесного цвета, который идет назад под ноздри.

Известен пока только в низовьях Анадыря, где 3 штуки добыто в июне 1902 г. Сокольниковым и 2 были исследованы в сентябре 1925 г. в шкурках Бутурлиным.

V РОД: КАЗАРКА *BRANTA* SCOP.

Branta Scopoli Annus I Hist. Nat. стр. 67, 1769, тип: *Anas Bernicla* L.; *Bernicla* Boie Isis 1822, стр. 563, тип тот же.

Признаки этого рода и его подродов достаточно очерчены в таблицах. К типичному подроду, т. е. подроду *Branta* в узком смысле, относится всего 1 вид с 3 подвидами, птицы приморских частей тундры Старого и Нового Света.

17. Черная казарка *Branta bernicla* (L.) (Бранта берникля).

Anas bernicla Linnaeus S. N. I, стр. 124, 1758, Северная Европа; *A. Brenta* Tunstall Orn. Brit. стр. 4, 1771.

Общая окраска черной казарки довольно темная, серовато-бурая, голова и шея с зобом и маховые почти черные, задняя часть брюшка белая. У молодых нет белого пятна по бокам шеи или оно едва намечено; перья боков тела без беловатых вершин, а второстепенные маховые и большие кроющие крыла с беловатыми вершинными краями.