

цы сходны с чукотскими (подхвостом), но По размерам, например, с *rogersi*. Таким образом, *roselaari* (1983) относится к популяции исландского побережья Америки. Наличие не вызывает сомнения на юге США на исландских песочниках *rufa*, летящими из них (Harrington, 1986; как раз птиц с пригодными для сравнения (весенних) возможностями скапливания принадлежности. Совместно с Мексиканского кочующих крыла у Северной Америки. Часть гнездового периода обособлена.

кого песочника существенно; в дополнение (1983), следует выделить Аляски (рисунок). При географических группах вида легко группировать *islandica* из предполагаемой неизвестной области с о. Врангеля и в соответствии с прежним вариантом окраски третьей группы. По выделяются птицы, имеющие наиболее

встречаются только в Азии бывают Северной Америке песочники с о. Врангеля помимо шельфа на островах Мексиканском заливе, тихоокеанским по-

деленностью, основными са- Европу в Сибирь,

область зимовки песочников с о. Врангеля и с Аляски и подвидовая принадлежность песочников, гнездящихся на о. Шпицберген. Не ясно также, смешиваются ли на пролете и зимовках *rogersi* и песочники с Новосибирских о-вов.

Calidris canutus roselaari Tomkovich, ssp. n.

Материал. Голотип — взрослый самец, добыт в урочище Акатыланва на о. Врангеля 4/VI 1939 г. Коллектор: Л. А. Портенко. Экземпляр № 160439 в Зоологическом институте АН СССР. Размеры (мм): крыло — 168, клюв — 37,5, цевка — 32,2. Семенники: 13×6 и 10×5 мм.

Паратипы: взрослые птицы определенного пола с о. Врангеля в Зоологическом институте АН СССР: 24 экз. сборов Л. А. Портенко и 2 экз. А. И. Минеева; в Зоологическом музее МГУ: 1 экз. Р. Л. Бёме и 1 экз. А. В. Кречмара; на каф. биогеографии МГУ: 1 экз. В. Е. Флинта; в Институте биологических проблем Севера ДВО АН СССР: 1 экз. А. В. Кречмара; в Национальном музее естественной истории США (Вашингтон): 1 экз. из Барроу. Аляска, сборов J. Murdoch и 2 экз. из Сент-Майкл, Аляска, сборов L. M. Zurner.

Дифференциальный диагноз. По окраске сходен с *rogersi*, от которого отличается окрашенным брюхом и подхвостом, а также крупными размерами (табл. 1).

Распространение. Гнездится на о. Врангеля и на Аляске, совершает перелеты по тихоокеанскому побережью Северной Америки.

Этимология. Подвид назван в честь С. S. Roselaar, впервые предсказавшего существование самостоятельного подвида исландского песочника на о. Врангеля.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бируля А. А. 1907. Очерки из жизни птиц полярного побережья Сибири//Зап. Императ. АН по физ.-мат. отд. Т. 18. № 2. Гладков А. Н. 1951. Отряд кулики//Птицы Сов. Союза. Т. 3. М. Громадская Я. 1985. Исландский песочник — *Calidris canutus* (L.)//Миграции птиц Вост. Европы и Сев. Азии: Журавлеобразные — ржанкообразные. М. Козлова Е. В. 1962. Ржанкообразные. Подотряд кулики//Фауна СССР. Птицы. Т. 2, вып. 1, ч. 3. М.; Л. Куханов В. Д., Скокова Н. Н. 1967. Фауна птиц Айновых островов//Тр. Кандакшк. заповедника. Вып. 5. М. Портенко Л. А. 1972. Птицы Чукотского полуострова и острова Врангеля. Ч. 1. Л. Степанян Л. С. 1975. Состав и распределение птиц фауны СССР. Неворобьиные Non-Passeriformes. М. Татарникова И. П. 1982. О миграции куликов в Варангер-Фьорде//Экология и морфология птиц на крайнем северо-западе СССР. М. Томкович П. С. 1986. Изучение внутривидовой изменчивости и миграции птиц для целей кадастра на примере исландского песочника//Всесоюз. совещ. по пробл. кадастра и учета живот. мира. Тез. докл. Ч. 2. М. Barter M., Jessop A. 1988. Red Knot (*Calidris canutus rogersi*) in Australia. Part 1: Sub-species confirmation, distribution and migration//The Stilt. N 12. Bent A. C. 1927. Life histories of North American shore birds. Part 1. N. Y. Conover B. 1943. The races of the Knot (*Calidris canutus*)//The Condor. Vol. 45, N 11. Cramp S., Simmons K. E. L. (Eds.). 1983. The birds of the Western Palearctic. Vol. 3. Oxford; L., N. Y. Davidson N. C. et al. 1986. The origins of Knots *Calidris canutus* in arctic Norway in spring//Ornis Scandinavica. Vol. 17. N 2. Dick W. J. A. et al. 1976. Distribution and geographical origins of Knot *Calidris canutus* wintering in Europe and Africa//Ardea. Vol. 64, N 1—2. Dick W. J. A. et al. 1987. Spring migration of the Siberian Knots *Calidris canutus*: results of a cooperative Wader Study Group project//Ornis Scandinavica. Vol. 18, N 1. Engelman M. et al. 1983. Post-mortem changes in measurements of some waders//Ring and Migration. Vol. 4, N 4. Godfrey W. E. 1986. The birds of Canada. Ottawa. Harrington B. A., Leddy L. E. 1982. Sightings of Knots banded and color-marked in Massachusetts in August 1980//J. Field Ornithol. Vol. 53, N 1. Hayman P. et al. 1986. Shorebirds: An identification guide to the waders of the world. L.; Sydney. Johnsgard P. A. 1981. The Plovers, Sandpipers and Snipes of the World. Lincoln; L. Lø-

В целом на о. Геральд представлены практически все основные виды и группы видов птиц, населяющие аналогичные ландшафты о. Врангеля. Существенные отличия заключаются в высоком обилии и повсеместном распространении здесь чечетки и в обогащенности авифауны относительно «южными» насекомоядными воробьиными.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гладков Н. А. 1951. Отряд кулики//Птицы Сов. Союза. Т. 3. М. Портенко Л. А. 1972—1973. Птицы Чукотского полуострова и острова Врангеля. Л. Придатко В. И., Луцук О. Б. 1986. Авифауна острова Геральд (Чукотское море)//Вестн. зоол. № 2. Стишов М. С. 1985. Биотопическое распределение и широтно-ландшафтные группы птиц на острове Врангеля//Зоол. журн. Т. 64, № 5. Чернов Ю. И. 1975. Природная зональность и животный мир суши. М. Чернов Ю. И. 1978. Структура животного населения Субарктики. М. Соппос Р. 1983. Taxonomy, distribution and evolution of Golden Plover//Auk. Vol. 100, N 3. Freedman B., Svoboda J. 1982. Population of Breeding Birds at Alexandra Fjord, Ellesmere Island, N. W. T., compared with other Arctic Localities//Can. Field-Nat. Vol. 96, N 1. Hayman P. et al. Shorebirds. 1986. Bostin. Joensen A. N., Preuss N. O. 1972. Report on the ornithological expedition to Northwest Greenland, 1965//Medd. om Grønland. Bd 191, N 5. Кнох А. 1987. Taxonomic status of Lesser Golden Plovers//Brit. Bird. Vol. 80, N 10. Parmelee D. F., McDonald S. D. 1960. The Birds of West-central Ellesmere Island and adjacent areas//Bull. Nat. Mus. CAN. N 169. Renaud E. W. et al. 1981. The avifauna of the Pond inlet region, N. W. T.//Amer. Bird. Vol. 35, N 2. Watson A. 1963. Birds number on tundra in Baffin island//Arctic. N 2.

Поступила в редакцию
05.10.88

FAUNA AND LANDSCAPE DISTRIBUTION OF THE LAND BIRDS ON THE GERALD ISLAND (THE CHUKOTSK SEA)

M. S. Stishov

Summary

The scientific expedition to the Gerald island revealed 43—44 species of the land birds, out of which 12 species — 4 of snipes and 8 of sparrows — were common during the whole period of the research work. Nesting on the island was ascertained for *Plectrophenax nivalis* and *Acanthis hornemanni* and likely for *Calcarius lapponicus*. The coastal above-clific slopes covered by well developed vegetation and numerous refuges were found to be of great importance for the island fauna and land birds populations.

БЮЛ. МОСК. О-ВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. ОТД. БИОЛ. 1990. Т. 95, ВЫП. 5 C. 59-72.

УДК 598.333.2 : 591.152 : 57.063.7

АНАЛИЗ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ИСЛАНДСКОГО ПЕСОЧНИКА *CALIDRIS CANUTUS* (L.)

П. С. Томкович

Существует несколько мнений относительно числа подвидов у исландского песочника *Calidris canutus* (L.), распространенного циркумполярно со значительными разрывами гнездового ареала. В отечественной литературе (Гладков, 1951; Козлова, 1962; Портенко, 1972; Степанян, 1975) принята точка зрения, утверждающая существование трех подвидов: *C. c. canutus* (L.) — северная часть Канадского Арктического архипелага (в некоторых работах), Гренландия, Таймыр, Новосибирские о-ва; *C. c. rogersi* Math. — о. Врангеля, Чукотский п-ов и иногда Аляска; *C. c. rufa* (Wils.) — южная часть Канадского Арктического