

de la tête et des joues (plutôt des parotiques), par des lisérés clairs bien larges au manteau et par le grand développement du dessin foncé aux parties inférieures. La position systématique de ces Faucons, quoique proches de *leucogenys* (« *harterti* » apud Stegmann), paraît encore incertaine, mais ils n'ont rien à voir avec *ussuriensis*, nom qui doit être rangé parmi les synonymes de la race nordique de Faucons (et non celle de la zone boisée comme le fait à la page 225 de son étude M. Stegmenn).

Dans mes études précédentes sur les Faucons, je me suis abstenu de donner un nom quelconque à la forme propre aux parties méridionales et centrales de la Yakoutie que j'ai notée (« *Falco* », 1933, p. 10 et « *Systema Avium* » « *L'Oiseau* », 1933, p. 459, 463) comme *Falco peregrinus subspecies*. Elle ne saurait non plus porter le nom *harterti* sous lequel Stegmann englobe tous les Faucons de la Yakoutie et qui se rapportent en fait aux oiseaux des régions de la basse Kolyma et Indigirka appartenant à la race *leucogenys* Brehm (= *cæruleiceps* Stegmann). En renvoyant à la caractéristique de cette forme donnée en 1933 (O.O.C.C.), je me vois obligé de lui donner un nom et de choisir celui de :

***Falco peregrinus kleinschmidti* subsp. nova.**

Type: ♀ ad. Olekminsk, 26-VIII-1906, N. Kharitonow leg. le N. R. 8340 de la collection du Musée Zoologique de l'Université de Moscou.

Paratype: juv., 24-VI-1854, Viliui, Maack leg., au Musée Zoologique de l'Académie des Sciences à Léningrad.

Cette race, à la coloration vive et contrastante, paraît être proche du *F. p. anatum* américain, rassemblance intéressante du point de vue zoogéographique.

Quelques mots sur *F. p. pleski* Dementiev (*F. p. subspecies* de « *Systema Avium Rossicarum* », pl. I, in « *L'Oiseau* », 1933, p. 459; *F. p. pleskei* « *Falco* », 1933, p. 13). Les remarques de Stegmann concernant cette forme me paraissent peu fondées et, en partie, établie sur des méprises évidentes. Par exemple, il note que ma description est basée sur les deux exemplaires provenant des îles Chantares conservés au Musée de Léningrad (ce qui est

juste), en ajoutant: « *Färbang* sehr auf dem Original ».

J'ai examiné l'effet, il n'a rien à voir et sa provenance. Il doit être identique (mâle). Mais M. Stegmann, dans le *Journal Zoologique de Léningrad* venant des îles Chantares (originales) comme dit par lui-même et disséqué par lui-même. Pour éviter dorénavant la traduction de *leucogenys* par *peregrinus* subspecies, je propose de nommer cette forme *Falco peregrinus kleinschmidti* fl. Yakchina, 21-VI-1854, d'ailleurs dans « *L'Oiseau* », 1933, p. 459.

Le troisième exemplaire de la baie de Salak, à dire du continent, est dit M. Stegmann. Cette forme, sa répartition, se trouve également à *pleskei*, celle de la queue est de 48 mm. Cet oiseau, en mer, à bord du navire, en mer, à bord du navire (Buturlin, « *Nachrichten* », 1933, p. 13). On ne saurait voir dans cette forme une variation du sexe de *peregrinus* pareilles chez les autres formes ne dépassent évidemment pas les dimensions chez *leucogenys* (*brevirostris*) et sont très voisines de *peregrinus* graphiques de M. Stegmann. Les caractéristiques géographiques de M. Stegmann ne paraissent pas un géographisches unwahrscheinlich. On ne saurait donc dire qu'il s'agit d'une forme nouvelle, mais me semblent po

iques), par des le grand déve-rieures. La po-que proches de, paraît encore ssuriensis, nom e la race nordi-oisée comme le nenn).

Faucons, je me que à la forme de la Yakoutie ystema Avium » Falco peregrinus le nom harterti Faucons de la oiseaux des ré-partenant à la Stegmann). En me donnée en donner un nom

va.

N. Kharitonow e Zoologique de

leg., au Musée éningrad. rastante, paraît semblance inté-

ev (*F. p. subs-* ol. I, in « L'Oi- », 1933, p. 13). ette forme me lie sur des mé- ma description enant des îles rad (ce qui est

juste), en ajoutant « Das zweite ist ein alter Vogel und in der Färbang sehr gut als ♂ zu erkennen, als volches auch auf dem Original-Etikett bezeichnet! »

J'ai examiné l'oiseau en question en août 1932 ; en effet, il n'a rien à faire avec *pleskei* ; le sujet n'est pas daté et sa provenance même des îles Chantares n'est pas sûre. Il doit être identifié comme *F. p. kleinschmidti* adulte (mâle). Mais M. Stegmann devrait savoir qu'au Musée Zoologique de Léningrad se trouvent deux Faucons provenant des îles Chantares et notés sur leurs étiquettes originales comme des femelles. Ces deux Faucons furent tués et disséqués par un zoologiste de profession, M. Dulkeit. Pour éviter dorénavant toute méprise, je donnerai ici la traduction de leurs étiquettes originales : « N. 582. *Falco peregrinus* subsp. (*pealei*?). ♀ subad. île Bolchoï Chantar, baie Yakchina, 26 septembre 1925, etc » et « n° 488. *Falco peregrinus* subsp. ♂ subad. île Bolchoï Chantar, fl. Yakchina, 21 août 1925, etc ». Ces données se trouvent d'ailleurs dans « *Falco* », 1933, n° 1, p. 13.

Le troisième exemplaire de cette forme « naine » provient de la baie de Sakhalin (embouchures du fleuve Kol), c'est-à-dire du continent, et non pas de l'île de Sakhalin, comme dit M. Stegmann (L. c.). Je peux ajouter que, dans la littérature, se trouve mentionnée encore une femelle, indubitablement *pleskei*, ayant la longueur d'aile de 315 mm., celle de la queue de 155 mm. et le doigt médian sans ongle de 48 mm. Cet oiseau fut capturé le 11 septembre sur un navire, en mer, à 150 kilomètres à l'est de l'île de Sakhalin (Buturlin, « *Nacha Okhota* », 1911, n° 18, p. 4). On ne saurait voir dans ces quatre cas une erreur de l'identification du sexe de l'oiseau. D'un autre côté, des dimensions pareilles chez les femelles (aile de 302, 312, 313 et 315 mm.) dépassent évidemment les limites de la variabilité de dimensions chez les formes septentrionales de *Falco peregrinus* (*brevirostris*, *leucogenys*, *kleinschmidti*, *pealei*, *anatum*) et sont très caractéristiques. Les arguments zoogéographiques de M. Stegmann (o.c., p. 229 « Auch vom zoogeographischen Standpunkte ausgesehen ist es absolut unwahrscheinlich, dass der nordische Wanderfalke irgendwo eine Rasse mit winzigem Areal bilden sollte ».) me semblent pour le moment peu probants. Je n'ai nulle

стр. 476 - 488.

ÉTUDES SUR LES VARIATIONS  
DE *FALCO PEREGRINUS* TUNSTALL

par Georges DEMENTIEV

(Musée Zoologique de l'Université de Moscou)

Depuis la publication de la première partie de « *Systema Avium Rossicarum* », où j'ai proposé un nouvel arrangement des races de *Falco peregrinus*, ce même sujet fut traité deux fois encore : par moi, dans « *Falco* » (1933, n° 1, pages 1-17) et, tout récemment, par M. B. Stegmann dans le « *Journal für Ornithologie* » (1934, pages 222-236). C'est avec plaisir que je puis constater que nos systèmes — quant à leurs points essentiels — sont presque coïncidents. Les différences ne portent que sur des points particuliers, surtout ceux de la nomenclature.

Quant à cette dernière, elle est, pour les Faucons, extrêmement embrouillée depuis le XVIII<sup>e</sup> siècle. C'est pourquoi il est souvent excessivement difficile de choisir, parmi la grande quantité de noms donnés au Faucon, celui qui est « applicable » à telle ou telle autre race (cf. Dementiev « *Falco* », 1933, n° 1, p. 6 et Stegmann « *Journ. f. Ornith.* », 1934, p. 225). En rédigeant mes textes sur la variabilité géographique des Faucons, je voulais surtout éviter d'alourdir la nomenclature par l'emploi de nouveaux noms pour cet oiseau. Ce principe est bien exprimé par la table comparative des formes de *Falco peregrinus* admises, d'un côté par M. Stegmann, et d'un autre côté par moi.

G. Dementiev (1933).

- Falco peregrinus* « *leucogenys* ».
- Falco peregrinus* « *brevirostris* ».
- Falco peregrinus* « *subspecies* ».
- Falco peregrinus pleskei* Subsp. n.
- Falco peregrinus pealei*.
- Falco peregrinus caucasicus*.
- Falco peregrinus babylonicus*, forme foncée.
- Falco peregrinus babylonicus*, forme claire.

VARI.

*Falco peregrinus*  
*Falco peregrinus*

La solution de la race de je nomme *brevirostris* attribue le nom la comparaison *leucogenys*. M. Stegmann est favorable de réserver *leucogenys* appartient indubitablement à un Faucon de ces races et n'entreprend (ce fait est confirmé dans la Fauna », Bd I, etc.). Ce sont, d'après le d'André II, des « *grini* ». Et invinciblement de la tundra qu'on trouve en suivant surtout de ces migrations caractéristique. de *Falco peregrinus* schmidt dans *Falco peregrinus* », 1918, forme (v. surtout à l'oiseau qui est au contraire, ce qui est bien à la race n'est pas situées vers l'Orient. Les limites de la coloration

PARIS

22, RUE LA FONTAINE

G. Dementiev

Georges DEMENTIEV

28  
БИБЛИОТЕКА  
Г. ДЕМЕНТЬЕВА

Etudes sur les variations  
de *Falco peregrinus* Tunstall

EXTRAIT

DE

L'OISEAU et la REVUE FRANÇAISE D'ORNITHOLOGIE

N° 3 — 1934

n. 111  
n. 41

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
Зоологического музея  
Московского университета

PARIS

25, RUE LA CONDAMINE (XVII<sup>e</sup>)