

В обзоре форм кулика-сороки Л. А. Портенко (Mitteilungen aus d. Zoologisch. Museum in Berlin, т. 22, 1937, стр. 217—218) признает те же формы его, как и С. А. Бутурлин, но разграничивает их иначе. Номинальная форма (клюв самцов 6,43—7,42 мм, самок 6,67—7,89 мм) гнездится в СССР на севере от Кольского полуострова до устья Печоры; *H. o. borysthenticus* (клюв самцов 7,23—8,19 мм, самок 8,09—9,09 мм) встречается в СССР в европейской части всюду, кроме севера от Днепра на востоке до бассейна Оби; сюда Портенко относит и экземпляр с Чулыма; наконец *H. o. longipes* (клюв самцов 8,29—8,77 мм, самок 9,05—10,37 мм) гнездится в Туркестане от Аральского моря до Кульджи; переходные между этой и предыдущей формой экземпляры встречаются у Черного Иртыша и в б. Змеиногорском уезде.

В дополнение к этому (так как Л. А. Портенко приводит измерения небольшой серии в 65 экз.) приводим данные обмеров длины клюва у 59 взрослых экземпляров куликов-сорок в коллекции зоологического музея Моск. гос. университета:

	С а м ц ы	С а м к и
Лифляндия Мурманск, Архангельск, Канин, Белое море	63, 65, 65,5, 66, 66,5 72, 77	65, 68, 69, 70, 71, 73 —
Нижнее течение Оби		
Европейская часть СССР от бассейна Волги до Башкирии, Крыма и Северного Кавказа	68,5, 69, 69, 69, 70, 70, 72,5, 72,5, 75,5, 77	77, 79, 81, 81,8, 83, 85, 85
Западная Сибирь и Казахстан (устье Илека, Кустанай, Змеиногорск)	70, 73,5, 75, 75, 77,5 76	83,5, 89 87, 89, 101
Кара-Иртыш, Кальджир, Зайсан Туркестан (Сыр-Дарья, Сары-Су, Или, Тянь-Шань)	77,2, 80, 82,5 84, 87,5	90, 90, 92,5, 92,6, 95, 95, 96, 98, 100 91, 99,2
Восточная Азии (Китай).	—	

Эти цифры показывают, что максимальных размеров клюва кулики-сороки достигают в Туркестане. Что касается западносибирских, то отличие их от птиц из европейской части СССР (кроме Крайнего Севера) едва ли реально. Л. А. Портенко в своем обзоре указывает, что кулики из бассейна Черного Иртыша и змеиногорские переходны к *borysthenticus*. Между тем тип *H. o. longipes* из змеиногорского уезда, а котип — из Ленкорани, т. е., по мнению Портенко, *borysthenticus*. Наконец, в оригинальном описании С. А. Бутурлина («Орн. вестник», 1910 г., стр. 36) прямо указывается, что за *longipes* он считает птиц Каспийского и Обского бассейнов, и в частности ссылается на приволжских птиц. При таких обстоятельствах, принимая во внимание трансгрессивную изменчивость этого вида на территории Восточной Европы и Азии, приходится считать, что западносибирские птицы, как и птицы из европейской части Советского Союза, кроме северных *H. o. ostralegus*, должны носить название *longipes*; название же *borysthenticus* несомненно является синонимом *longipes*. При этом максимально длинноклювая туркестанская форма

кулика-сороки, отличающаяся к тому же наиболее бледным буроватым тоном верха, остается без названия. Я называю ее в память покойного С. А. Бутурлина *Haematopus ostralegus buturlini*, subsp. nova, базируясь на 10 взрослых экземплярах с низовьев Аму-Дарьи, Сыр-Дарьи (Байга Кум, Кара Узьяк), Или, Таласского Алатау и Центрального Тянь-Шаня. Тип — взрослая самка, низовья Сары-Су, 15/VI 1936 г. сб. А. А. Слудского (№ R. 30099 в коллекции зоолог. музея Моск. университета).

Стр. 68. Как показала ревизия кроншнепов, произведенная Л. А. Портенко (Mitteil. aus d. Zoolog. Museum in Berlin, Bd. 22, 1937, стр. 216), название *N. a. suschkini* Neumann отходит в синонимы *N. a. lineatus* Cuvier; сюда же, судя по серии в зоологическом музее Моск. университета, относятся и забайкальские, и монгольские, и тем более кулундинские кроншнепы, обозначенные в первом томе «Определителя» как *N. a. nasicus* Temm. Но так как название *Numenius lineatus* Cuvier есть в сущности помен nudum, то правильным названием сибирского кроншнепа будет *N. a. orientalis* Brehm (*Numenius orientalis* Brehm, Handb. Naturgeschichte, Vögel Deutschl., 1831, стр. 610, Индия).

Numenius cyanopus по всем вероятностям — подвид *N. arquata*, а не отдельный вид; для окончательного решения этого вопроса недостает материалов о деталях распространения этих птиц в восточных пределах областей их распространения (не совпадают ли частично?). Как доказал Neumann, (Anzeiger Ornithol. Gesellschaft Bayern, 1932, стр. 148—150), для этой формы кулика имеется линнеевское название *Scolopax madagascariensis* (Linnaeus, Systema Naturae, 1766, стр. 242, где по ошибке указан Мадагаскар вместо Макассара, Целебес).

Стр. 70. Малый кроншнеп *Numenius tenuirostris*, как это сообщил И. Б. Волчанецкий (Ornitholog. Monatsberichte, 1932, стр. 162), изредка гнездится в районе Камыш-Самарских озер.

Географическая изменчивость среднего кроншнепа *N. phaeopus* недавно изучена Л. А. Портенко (Mitteil. aus d. Zoolog. Museum in Berlin, т. 22, 1937, стр. 214—216).

Этот автор предлагает отличать в качестве особого подвида — по несколько более светлой окраске верхней стороны тела и по неиспещренной белой (или чуть испещренной) окраске подмышечных средних кроншнепов из степной полосы — Заволжья и Приуралья — под названием *N. ph. alboaxillaris* Lowe (Bullet. Brit. Ornithol. Club, XLI. 1921, стр. 110, Inhambane). Это название дано было зимующим в Восточной Африке птицам. *N. ph. alboaxillaris* Lowe, по данным Портенко, в среднем чуть покрупней номинальной формы, ограниченной в своем распространении лесотундрой и северной полосой тайги от Кольского полуострова до Оби (в зоологическом музее Моск. государств. университета, серия из окрестностей Обдорска).

N. variegatus (как и *hudsonicus*) должны рассматриваться как подвиды *phaeopus*. *N. ph. variegatus* добыт Минеевым на острове Врангеля (Портенко, «Проблемы Арктики», 1937 № 3, стр. 113).

Дополнение, сделанное С. А. Бутурлиным на стр. 246, т. III, относится не к *N. tenuirostris*, а к *N. phaeopus*.

Стр. 71. Повидимому, правильно рассматривать кроншнепа-малютку в качестве формы того же вида, как и эскимосский кроншнеп. В таком случае название кроншнепа-малютки будет *Numenius borealis minutus* Gould.

ПОЛНЫЙ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПТИЦ СССР

С. А. БУТУРЛИНА и Г. П. ДЕМЕНТЬЕВА

ТОМ ПЯТЫЙ

СПИСОК ПТИЦ СССР
ОБЩИЙ ОЧЕРК СТРОЕНИЯ
И ЖИЗНИ ПТИЦ.
БИБЛИОГРАФИЯ

К О И З

ВСЕСОЮЗНОЕ КООПЕРАТИВНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1941 ЛЕНИНГРАД

384 стр.