

О балканской форме филина

Г. П. Дементьев

Вопрос о систематическом положении живущих на Балканском полуострове филинов остается до последнего времени плохо изученным. Обычно (например и в известной сводке Хартерта, Hartert «Die Vögel der Paläarktischen Fauna», т. 2, 1912, стр. 960; также в IV дополнительном томе этого сочинения, Хартерт и Штейнбахер, 1935, стр. 381) полагают, что Балканский полуостров населен номинальным подвидом филина. В своем последнем обзоре филинов (Дементьев и др., «Птицы Советского Союза», т. I, 1951, стр. 354) я высказал некоторые сомнения по вопросу о возможности отождествлять балканских филинов с среднеевропейскими, т. е. с номинальным подвидом.

В 1951 г. Зоологическим музеем Московского университета была получена небольшая серия — всего 4 экземпляра — филинов из Албании; изучение ее заставляет поставить вопрос о систематическом положении балканских филинов по-новому. Все эти птицы оказались весьма однотипными и своеобразными и вместе с тем заметно отличными от особей номинального подвида (сравнивались с сорока экземплярами, преимущественно из Европейской части СССР). Различия выявились и при сравнении с украинскими, крымскими и кавказскими филинами. Как известно, географическая изменчивость у этого вида выражается в размерах и окраске. В последней особое значение имеет общий «фон» — он варьирует от рыжевато-белесоватого или сероватого. С другой стороны, меняется темный рисунок по интенсивности окраски пестрин — от черных до буроватых в разных оттенках.

Албанские филины — самые темные из изученных нами европейских экземпляров этой птицы. Общий фон их окраски интенсивный желтовато-рыжий, более темный, чем у птиц из других мест. Темный рисунок достигает наибольшего развития. Он резко преобладает над рыжим фоном на спинной стороне. На брюшной стороне темный продольный рисунок доходит почти до заднего (каудального) конца брюха и очень широк. На брюшной стороне поперечный рисунок широкий и правильный, он сильно развит даже на подхвостье и хорошо выражен на ногах. Темный рисунок очень интенсивный, густого черного цвета. Лицевой диск черновато-сероватый.

Таким образом, серия филинов из Албании достаточно четко отличается от номинальной формы и заслуживает выделения в особый подвид. Известную аналогию с этой формой в северной Азии представляет хорошо дифференцированный сахалинский подвид филина *B. b. borissowi* Hesse. Эта птица также очень темная как по основному фону, так и по развитию черноватого рисунка (однако по сравнению с албанскими птицами общий фон менее рыж, желтее, а рисунок на спинной стороне более «разбитый», менее сливается в сплошные черные поля).

Мы называем албанских филинов *Bubo bubo ognevi* в память незабвенного Сергея Ивановича Огнева.

Тип — взрослая самка из окрестностей Скутари, добытая 2/II 1951 г. (N. R. 74765 в Зоологическом музее Московского университета). Кроме того, изучена самка, добытая там же 4/XI 1950 г., самец из Дураццо от 24/III 1951 г. (в том же музее №№ R. 74766 и R. 74767) и самка из Дюрре от 14/XI 1950 г.

Размеры этих птиц таковы: общая длина самца 660, самок 613, 670 и 680 мм, размах крыльев самца 1710, самок 1430, 1440 и 1602 мм, вес самца 2900, самок 1750, 1960 и 2440 г (по отметкам коллекторов на этикетках). Длина крыла самца 488, самок 470, 474 и 495 мм.

Эти цифры уступают размерам номинального подвида филина и дают повод предполагать (для окончательного суждения мало материала), что албанские птицы, повидному, отличаются от среднеевропейских и североευропейских меньшей величиной. Для последних мы в свое время (Дементьев и др., «Птицы Советского Союза», т. I, 1951, стр. 357) приводили такие цифры измерений: общая длина тела самцов (4) 620—670, самок (4) 695—725 мм, размах самцов (2) 1550—1560, самок (3) 1676—1800 мм; вес самцов (6) 2100—2700, самок (6) 3075—3260 г; длина крыла самцов (20) 430—465, самок (20) 475—520 мм.

О распространении этой формы филина мы можем высказать пока только предварительные соображения. Можно полагать, что ареал ее занимает весь Балканский полуостров. В Болгарии филин широко распространен как на равнинах, так и в горах, где он поднимается до 1700 м над уровнем моря (Патев, Птиците на България, 1950, стр. 160). Встречается он и в Югославии, и в Греции.

Номенклатурное обозначение нового подвида оправдывается на наш взгляд следующими соображениями. Данное для филинов из Венгрии Рейхеном в 1910 г. название *B. b. hungaricus* всеми авторами относилось до сих пор в синонимы номинальной формы филина, а самый диагноз не подходит к албанским птицам (в частности, об этом уже писал Генглер, Gengler, Balkanvögel, 1920, стр. 195). Описанный в 1910 г. Хартертом и Ротшильдом из Испании *B. b. hispanus* отличается от номинальной формы более светлой окраской и тем самым никак не может быть идентифицирован с птицами, которых мы имеем в виду. Украинские, крымские и малоазиатские филины, обозначаемые обычно как *B. b. interpositus*, также отличаются от номинального подвида более бледной окраской. Что же касается линнеевского названия *atheniensis* (*Strix. Bubo*. β . *Bubo atheniensis*. Linnaeus. Systema Naturae, ed. XII, 1766, стр. 131), то оно, как давно указал Хартерт (*Die Vögel der Paläarktischen Fauna*, II, 1912, стр. 960), не является в сущности новоописанием, а содержащаяся у Линнея ссылка на Альбина ни в какой мере не разъясняет вопроса.