

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им.М.В.Ломоносова
ТУРКМЕНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
АКАДЕМИЯ НАУК ТУРКМЕНСКОЙ ССР
ИНСТИТУТ ЗООЛОГИИ

Г.М.ДЛУССКИЙ, О.С.СОЮНОВ, С.И.ЗАБЕЛИН

МУРАВЬИ
ТУРКМЕНИСТАНА

Ответственный редактор
профессор Т.Б.Токгаев



3. *Alloformica obscurior* Dlussky, SP. NOV.

Рис. 15, А, Б

Рабочий. Размеры (в скобках голотип) в мм и индексы: ДМ=1,65–1,90 (1,87); ДГ=1,10–1,32 (1,22); ШГ=0,90–1,15 (1,12); ГИ=1,02–1,25 (1,20); ДС=1,05–1,28 (1,20); ИС=1,09–1,24 (1,20).

Длина головы больше ширины. Затылочный край за глазами плавно округлен. Максиллярные щупики почти достигают затылочного отверстия, их 4-й членик меньше суммы 5- и 6-го. Грудь плотная, пропodeум угловатый, длина его основной поверхности приблизительно равна длине покатой. Чешуйка толстая, в профиль ее верхний край сильно округлен.

Тело черное, конечности желтовато-бурые. Голова сверху матовая, в плотной шагреновой скульптуре. Грудь слабоблестящая, с более тонкой поверхностной шагреновой скульптурой. Брюшко с тонкой поперечной струйчатой скульптурой, блестящее.

Отстоящее опушение реже, чем у известных видов. На скапусе имеется ряд из 5–8 отстоящих волосков на внешнем крае. Щеки без волосков. За глазами затылочный край головы с многочисленными отстоящими волосками. Последние имеются на всех тергитах груди и брюшка, мезоплевры без волосков. Голени с редкими отстоящими волосками и многочисленными приподнятыми. На брюшке длина прилежащих волосков меньше расстояния между ними.

Материал. Голотипы: Ашхабад, г. Душак, II.06.1988, Р. Кузнецов. Паратипы: 6 рабочих, собранных там же в тот же день.




Рис. 15. *Alloformica* (ориг.): А, Б - *A. obscurior* sp. nov. (голотип) (А - тело в профиль, Б - голова сверху); В - максиллярный щупик рабочего *A. abertana*; Г-Ж - самец *A. abertana* (андртип) (Г - тело в профиль, Д - голова сверху); Е - гениталии сверху, Ж - субгенитальная пластинка снизу).