

Вокруг да около.

Время от времени на страницах нашего уважаемого журнала продолжают появляться статьи по поводу необходимости съезда псовых охотников. Очевидно эта мысль бродить, а выродить никак не может, отлиться в осязательную конкретную форму. Препятствием этому служить, конечно, наша общая инертность и непонятная халатность к общему, казалось бы, любимому делу, как говорить г. Ладженский в своей подернутой дымкой сомнительной статье в 36-м № нашего журнала. Очевидно дело и не пойдет дальше старых погудок, если какое-либо особенно счастливое соединение обстоятельств не даст ему толчка. Очевидно чистая идея не нарушить нашей инертности и разобщенности, нужно нечто другое. И я смею думать, что это нечто уже есть. Я думаю даже, что и съезды псовых охотников существуют уже давно, только мы не хотим воспользоваться ими в наших же целях. Я имѣю въ виду Першинскія садки, на которыхъ съѣзжается все-таки достаточное число псовыхъ охотниковъ, настолько достаточное, что далъ бы Богъ видѣть такое и на всероссійскомъ съѣздѣ. Почему этому собранію не дать названія *съѣзда* и не заняться тамъ выработкой основныхъ

положеній охотничьяго закона или части его, касающейся псовой охоты? Для облегченія и ускоренія работъ съѣзда необходимо только, чтобы предварительно была выработана возможно болѣе простая программа съѣзда, выработать которую, я думаю, не откажется и уважаемая редакция нашего журнала. Если такая программа будетъ выработана и своевременно опубликована на страницахъ «Псов. и Руж. Охот.», то я увѣренъ, многіе охотники съѣдутъ къ ней замѣчанія и дополненія и явятся на садки съѣзда съ готовымъ матеріаломъ, который дастъ имъ возможность сказать свое вѣское слово на съѣздѣ. Наконецъ, редакция можетъ отъ себя обратиться къ лицамъ, пользующимся авторитетомъ въ дѣлѣ псовой охоты съ просьбой подготовиться къ съѣзду и высказать свое мнѣніе по важнѣйшимъ вопросамъ. Поѣздка въ Першиню и жизнь тамъ обойдется дешевле жизни, напр., въ Москвѣ и потому, я думаю, туда прѣдутъ и тѣ охотники, которые въ Москву, пожалуй, и не поѣхали бы. Въ Першинѣ уже прежде всего всякій будетъ застрахованъ отъ соблазновъ городской жизни и это одно дастъ возможность относиться гораздо серьезнѣе къ задачамъ съѣзда, а жизнь въ деревнѣ избавитъ съѣхавшихся отъ лишннихъ затратъ на жизнь въ гостиницахъ. Неужели это не выполнимо, господа?

В. Чайкинъ.

Орнитологическія наблюденія.

Интересныя находки.

V.

При ближайшемъ опредѣленіи длиннохвостыхъ (или «уральскихъ») неяснѣйшѣ мнѣ удалось выяснитъ, что нѣкоторыя ихъ формы, давно описанныя и названныя, неосновательно забыты, нѣкоторыя же еще не отличены. Судя по тѣмъ четыремъ десяткамъ экз., которые я имѣлъ въ рукахъ, слѣдуетъ отличать шесть формъ: типичная Палласовская *Sygnium uralense* Урала, Западной Сибири и восточной половины Евр. Россіи, включая всю Симбирскую губ. Затѣмъ центрально-сибирскую форму (изъ Томска) Чуси отличилъ подъ именемъ *S. u. sibiricum*. Большая часть указанныхъ имъ отличій не дѣйствительны, но такъ какъ единственный осмотрѣнный мною красноярскій экз. нѣсколько отличался отъ типичныхъ, то я пока оставляю эту форму. Далѣе, въ Скандинавіи и сѣверо-западной Россіи (Петербургская г., Прибалтійскій край) живетъ опять отличная форма, которую я пока обозначаю Нильсоновскимъ именемъ — *S. u. lituratum* (но можетъ быть къ ней слѣдуетъ относить болѣе старое имя Вольфа «*maculatum*»). Въ Московской губ. встрѣчаются пере-

ходы между этой и типичной формами. Далѣе, на Сахалинѣ и въ бассейнѣ нижняго Амура (Уссури, Буря) встрѣчается очень хорошо отличаемая форма (осмотрѣно 17 экз.), которую я назвалъ въ честь изслѣдователя Сахалинской фауны А. М. Никольскаго *S. u. nikolskii*. Японію населяетъ описанная Темминкомъ и Плерелемъ *S. u. rufescens* (они же ее называли и *fuscescens*). Наконецъ, птицы центральной Европы рѣзко отличны отъ нашихъ и скорѣе приближаются къ японскимъ. Повидимому, самое старое имя для нихъ *S. u. macrocephalum* Мейснера.

Вотъ краткая характеристика формъ:

А. Окраска темная съ рыжеватымъ налетомъ:

- а) рыжій оттѣнокъ очень силенъ, центральные рули не полосаты, отмѣтины мельче... *rufescens* T. et. Sch.
- б) рыжій цвѣтъ блѣднѣе, средніе рули полосаты, темныя отмѣтины крупнѣе... *macrocephalum* Meisn.

Б. Окраска свѣтлая, съ бѣлымъ или охристымъ оттѣнкомъ.

- в) темныя части, особенно мелкія кроющія предплечья, рыжеватобуры (верхъ довольно темный, фонъ низа бѣловатъ) *nikolskii* Buturl.

г) темныя частіа кроющія предплечья блѣдно-бѣлыя

1. основныя

блѣдно-бѣлыя

верхней

вочаши

2. основныя

бѣловатъ

чисто-бѣлыя

*) ав

ия

бо

б

рѣ

наг

**) на

рѣ

ме

не

оч

ль

Опредѣляя свои Колы болѣе 80-ти ястребовъ, обыкновенно въ Камчатѣ (*Astur albus* Pall. = *Cand. shan* на Колымѣ, но съ Индигирки и видѣтъ с. ш. Молодые птицы в роко (до Астрахани!). Ос востока Якутской области и я назвалъ его *Astur* около полутора аршинъ рики сверху, включая и сѣраго цвѣта, снизу бѣ. очень узкихъ поперечныхъ лоски эти обычно тол достигая 1 1/2 м толщ но крайней мѣрѣ въ 3-наго *A. palumbarius* L., ташіи до Японіи, попереч толще 2 м, достигая 4 или лишь немного болѣе межутками, и верхъ т блѣдностью окраски и р лось на рулевыхъ гораздо бѣлаго ястреба, чѣ все же отличаются от примѣсно бѣлыхъ пятен хвостѣ.

Благодаря любезности съ типомъ его тибетск Bianchi. По моему убѣжденію въ свое время пр экземплярамъ называлъ мнѣ известна въ 10 экз

части его, касания и ускорения, чтобы предположить простую горюю, я думаю, нашего журнала работана и своеобразна. Руж. ки сдѣлаютъ кн. ся на садки, который дастъ бское слово на отъ себя образовать въ отовитесь кн. ю важнѣйшимъ сизнь тамъ обоеквѣ и потому, ки, которые въ м. Въ Першинѣ страхованъ отъ одно дастъ возгѣ къ задачамъ гь сѣхавшихся гостинницахъ.

В. Чайкинъ.

мами. Далѣе, на Амуре (Уссури, личаеая форма валь въ честь А. М. Никольяетъ описанная scens (они же гь, птицы ценъ нашихъ и сковидимому, самое halum Мейснера. мь: гь налетомъ: нгь, са- fescens T. et. Sch. ед- бя - ocephalum Meisn ли

л- ы- ь- то- nikolskii Buturl.

г) темныя части, особенно мелкія кроющія предплечья, аспидно- или землисто-буры;

1. основная окраска низа блѣдно-охриста, пятна верхней стороны сливочнаго цвѣта. . . lituratum Nilss.

2. основной фонъ низа блѣловатъ, пятна верха чисто-бѣлы;

*) затылокъ и передняя часть спины съ большей примѣсью болѣе чистаго и рѣзче ограниченнаго блѣлаго цвѣта... sibiricum Tsch.

**) названные части раструшены менѣе чистымъ и не столь рѣзко очерченнымъ блѣлымъ цвѣтомъ... uralensis Pall. typ.

VI.

Опредѣляя свои Колымскіе сборы, я пересмотрѣлъ болѣе 80-ти ястребовъ-голубятниковъ. О гнѣздованіи обыкновенно въ Камчаткѣ чуднаго блѣлаго ястреба (*Astur albus* Pall. = *Candidissimus* Dyb.) я лишь слышалъ на Колымѣ, но получилъ незрелую птицу съ Индигирки и видѣлъ другую съ Яны подъ 70° с. ш. Молодые птицы зимою видимо летаютъ широко (до Астрахани!). Обыкновенный ястребъ сѣверовостока Якутской области оказался новымъ видомъ и я назвалъ его *Astur caesius*. Это крупная птица, около полутора аршинъ въ размахѣ даже самца; старики сверху, включая и голову, блѣдно-голубовато-сѣраго цвѣта, снизу бѣлы съ небольшимъ числомъ очень узкихъ поперечныхъ темныхъ полосокъ (полоски эти обычно тоньше 1^м/м, изрѣдка лишь достигая 1 1/2^м/м толщины, бѣлыя же промежутки по крайней мѣрѣ въ 3—4 раза шире; у обыкновеннаго *A. palumbarius* L., распространеннаго отъ Британіи до Японіи, поперечныя темныя полосы всегда толще 2^м/м, достигая 4 и даже 5^м/м, съ равными или лишь немного болѣе широкими бѣлыми промежутками, и верхъ темнѣе). Незрелыя птицы блѣдностью окраски и рѣзкостью поперечныхъ полосъ на рулевыхъ гораздо болѣе похожи на молодыхъ блѣлаго ястреба, чѣмъ нашего голубятника, но все же отличаются отсутствіемъ или ничтожной примѣсью бѣлыхъ пятенъ на крыльяхъ, плечахъ и хвостѣ.

Благодаря любезности В. Л. Бианки я ознакомился съ типомъ его тибетскаго ястреба *A. khamensis* Bianchi. По моему убѣжденію это та же птица, которую въ свое время пр. Мензбиръ по 4 иркутскимъ экземплярамъ назвалъ *A. p. schvedowi*, и которая мнѣ известна въ 10 экз. какъ изъ Иркутска, такъ

и изъ южной части Якутской области (Марха). Дѣйствительно, единственный извѣстный экз. *A. khamensis* едва замѣтно почернѣе на спинѣ и плечахъ, чѣмъ *A. schvedowi*, но никакихъ другихъ отличій нѣтъ, а это единственное отличие воплотѣ, на мой взглядъ, объясняется тѣмъ, что тибетскій экз., убитый въ февралѣ, имѣетъ болѣе свѣжее, менѣе выцвѣтшее перо, чѣмъ сибирскіе, добытые въ апрѣлѣ и позже.

Что касается черноголоватаго *A. schvedowi* вообще, то о его значеніи высказаться трудно. Съ одной стороны обыкновенный *A. palumbarius* идетъ черезъ всю южную половину Сибири, встрѣчаясь и подъ Иркутскомъ, да и въ молодыхъ птицахъ разницы незамѣтно, — такъ что скорѣе можно признать *A. schvedowi* лишь за типъ личныхъ измѣненій. Но съ другой стороны эта птица известна лишь южной части Якутской области, Иркутской губ., Забайкалья и Восточ. Тибета, не встрѣчаясь въ Европѣ и западной половинѣ Азіи, почему и благоразумнѣе пока оставить эту форму особо, до выясненія.

VII.

Собравъ на Колымѣ большую серію сапсановъ, я при опредѣленіи ихъ выяснилъ себѣ, что въ Палеарктической области есть семь географическихъ формъ, хотя и варьирующихъ и соединенныхъ переходами, но въ старыхъ (т. е. взрослыхъ) особяхъ при сравненіи различимыхъ. Типичный *Falco peregrinus* Tunst. обитаетъ центральную и сѣверо-западную Европу (вѣроятно, къ нему относится Бремское названіе «cornicium»); похожъ на него, но еще темнѣе, сапсанъ Средняго и Южнаго Урала, котораго я, по классическому названію этихъ горъ, предлагаю назвать *F. p. girphaeus*. Наоборотъ, посвѣтлѣе средне-русская форма, *F. p. brevirostris* Menzb., извѣстная мнѣ изъ Московской, Петербургской, Харьковской губ., а въ одномъ экз. даже изъ Устьянска (вѣроятно, случайно залетный). Еще свѣтлѣе сапсанъ восточныхъ тундръ, отъ Лены до Колымы, названный мною *F. p. harterti*. Еще свѣтлѣе, но различны между собой, съ одной стороны сокола западныхъ тундръ, отъ Новой Земли до Оленека (нѣсколько зимующихъ экз. видѣлъ изъ Ленкорани) — *F. p. griseiventris* Brhm, а съ другой стороны птицы Дальняго Востока: Уссурийскаго Края и Японіи, которыхъ я назвалъ *F. p. ussuriensis*. Эта послѣдняя форма, повидимому, распространяется и на Анадырь, но я видѣлъ отъ туда лишь одинъ взрослый экз., такъ что увѣренно высказаться трудно. Наконецъ, самая блѣдная форма — *F. p. leucogenys* Brhm — населяетъ степи отъ Дуная до Алтая.

Различія этихъ формъ свожу въ табличку, куда для полноты включилъ и *F. p. pealei* Ridgw. изъ С. З. Америки.

A. Усы очень узки и отдѣлены отъ темныхъ частей ушной партіи перьевъ, начиная отъ самаго глаза; нижнія кроющія крыла бѣлы,

съ довольно рѣдкими отмѣтинами (верхняя сторона свѣтлая, сизая, низъ охристый, довольно мало испещренный). *leucogenys* Brhm.

Б. Усы широки и темнымъ подглазнымъ пространствомъ соединены съ темной ушной партіей, нижнія кроющія крыла густо испещрены темнымъ и часто съ сѣроватымъ налетомъ;

а) общая окраска верха темная съ сильнымъ преобладаніемъ черноватаго на головѣ и передней части спины, нижняя сторона сильнѣе испещрена, включая зобъ;

1. темная окраска ушей и кроющихъ ухо почти совершенно слиты, передняя сторона шеи безъ пестринъ;

*) окрасъ сверху посвѣтлѣе, снизу поблѣднѣе, болѣе охристый... *peregrinus* Tunst. typ.

**) верхъ темнѣе, низъ ярче рыжеватъ... *riphaeus* nov. subs.

2. усы хорошо отдѣлены отъ ушныхъ перьевъ, передняя часть шеи — кромѣ горла — и даже пространство между усами и затылкомъ испещрены *pealei* Ridgw.

б) верхъ свѣтлѣе, сѣрѣе; зобъ безъ пестринъ (усы хорошо отдѣлены отъ ушныхъ партій);

3.) сверху темнѣе, грудь обыкновенно вся болѣе или менѣе испещрена пятнышками или стержневыми полосками, щеки обыкновенно блѣднѣе и бока безъ или почти безъ сѣраго налета, усы короче (темныя части оперенья сильно буроватаго оттѣнка, даже какъ бы коричневатаго, черно-буры, а не аспидно-черны, полосы въ вершинной половинѣ хвоста рѣзко выражены) *brevirostris* Menzb.

4.) сверху блѣднѣе, съ большимъ развитіемъ пепельно-сѣраго окраса на счетъ темныхъ частей перьевъ; щеки по-

грязнѣе, бока обыкновенно съ легкимъ сѣрымъ налетомъ, усы длиннѣе, грудь менѣе испещрена;

*) грудь замѣтно испещрена (окраска сверху очень блѣдная и пепельная, включая голову) *ussuriensis* Buturl.

**) грудь не или почти не испещрена;

а1) сверху блѣднѣе, съ большимъ развитіемъ пепельнаго; темныя части, особенно межпальцевое пространство, буроватѣе и пестрины низа черно-буры... *griseiventris* Brhm.

б1) сверху потемнѣе, со значительно меньшимъ развитіемъ пепельнаго на головѣ и передней части спины и съ чистымъ темно-аспиднымъ оттѣнкомъ этихъ частей; отмѣтины низа аспидно-черны . . . *harterti* Buturl.

С. Бутурлинь.

Водяная курочка (камышница). «*galinula chloropus*» въ неволѣ.

Камышница въ Ново-Оскольскомъ уѣздѣ не рѣдка. Ихъ часто приходится видѣть на озерахъ плавающими или расхаживающими со своими семействами.

Гнѣздъ камышницъ мнѣ не приходилось встрѣчать.

Въ 1905 году я имѣлъ молодую, но уже летавшую водяную курочку (камышницу), которая прожила у меня болѣе трехъ мѣсяцевъ (до первыхъ чиселъ

ноября). Помѣщеніе маленькая кладовка, кладовки быть не

Эта интересная волѣ, кажется, ни озерамъ. Все время мышница не про солнца всегда стар и оставалась до ра оставляла свой но Бла водяная куро

В

Ирл

Кобели

Въ общемъ весьма собакъ могутъ полд всякой первоклассной ландцверъ есть на для продолженія это

«Рексъ», ркмоо Лная собака во всѣхъ шихъ украшеній вы сивая голова съ привусть, хорошія ноги, движенія хороши, л всегда ему сильный 1-я зол. медаль, при «Мать», ркмоо 97 лѣтний могучій раб и глазомъ; желател длиннѣе; немного по корпусъ, отличныя переднія лапы могли расъ прекрасные, о вяль и какъ-будто мед. и зол. мед. въ

«Гальтиморъ», рк большой эlegantный вой, хорошій корпусъ тельно передъ повыв хороши. 3-я зол. мед: «Чайльдъ-Гарольдъ Голова грубовата и с сина и ребра; въ об окрасъ и псовина хо движенія недурны. Бо «Роверъ», ркмоо Лшой костистый кобели мами; голова недурна, кія хорошія ноги; ди очень пріятный, но в 2-я бол. сер. медаль.

«Дюкъ», ркмоо № 1.