

Bemerkungen über die geographische Verbreitung der Vögel im nordöstlichen Sibirien.

Von S. A. Buturlin.

(Übersetzung der englisch verfaßten Handschrift von O. Haase.)

Im Jahre 1905 machte ich eine lange Reise durch das nordöstliche Sibirien, und obgleich meine Hauptaufgabe nicht zoologisches Sammeln war, gelang es mir doch, etwa 2000 Vogelbälge zusammen zu bringen. Mit dem Material, welches ich während der Reise in den Museen von Irkutsk und Jakutsk und in verschiedenen Privatsammlungen untersuchen konnte, und mit demjenigen, welches ich von meinen Sammlern erhalten, endlich mit dem in den Museen der St. Petersburger Akademie und der Moskauer Universität besichtigten, beläuft sich mein Studienmaterial aus dem oben erwähnten Gebiete auf mehr als 4000 Stück.

Es erscheint deshalb nicht wunderbar, daß viele interessante Tatsachen unsere Kenntnis der geographischen Verbreitung der Vögel des nordöstlichen Sibiriens erweiterten. Unter „nordöstliches“ Sibirien verstehe ich das Lena-Tal, die Wasserbecken ihrer östlichen Zuflüsse nördlich des 59° n. Br. und das ganze Festland nebst Inseln Sibiriens nördlich und östlich dieser Grenze mit Ausschluss von Kamtschatka und den Küsten des Ochotskischen Meeres.

Zunächst ist zu beachten, daß die Vögel — überhaupt das organische Leben im allgemeinen — in Ostsibirien sehr weit nach Norden reicht, viel weiter als in dem westlichen Teile der paläarktischen Region oder in Nord-Amerika. Die Ursache ist offenbar das kontinentale Klima des östlichen Teils der paläarktischen Region.

Wenn wir das vornehmste neuere Werk „Die Vögel der Arktis 1904“ von H. Schalow als Liste der arktischen Vögel zu Grunde legen, so kann ich dieser Liste 22 Genera und 73 Species

(darunter 17 Genera und 57 Species als Brutvögel¹⁾ aufügen. Und diese Liste könnte noch erweitert werden, wenn ich solche Arten mit aufnehmen wollte, welche von Herrn Schalow nur für Europa oder Amerika und nicht für Asien erwähnt sind. Für 7 Vögel, welche Herr Schalow als nicht brütend in der Arktis aufführt, ist das regelmäßige Brüten daselbst jetzt erwiesen.²⁾

In der folgenden Liste dieser Nachträge bedeuten: ein Stern (*): Brutvogel nördlich des Polarkreises, *kursiv*: Genera, welche in Schalow's Werk nicht vorkommen. In runde Klammern sind die Namen derjenigen Vögel gesetzt, welche nicht aus meinen persönlichen Untersuchungen stammen, sondern der Literatur entnommen sind, in eckige Klammern sind diejenigen gebracht, welche in Schalow's Werk vertreten sind, aber nur als seltene Erscheinungen aufgeführt sind.

Tab. I: Ergänzungs-Liste der Arktischen Vögel.

<i>Anthropoides virgo</i> L.	[*Anas penelope L.]
*Botaurus stellaris L.	[*Nettion crecca L.]
*Gallinago stenura Bp.	[*N. formosum Georgi]
* <i>Lymnocyptes gallinula</i> L.	Glaucionetta clangula L.
* <i>Limicola sibiricus</i> Dress.	*Fuligula fuligula L.
*Tringa ruficollis Pall.	[*Oidemia americana Sw. et Rich.]
Tr. crassirostris T. et Schl.	
(*Actitis hypoleucos L.)	*O. stejnegeri Ridgw.
*Totanus glareola L.	*Mergus albellus L.
*T. erythropus Pall. Adumbr.	*Anser rhodorhynchus Buturl.
<i>Heteractitis brevipes</i> Vieil.	*Melanonyx serripes Swinh.
*Terekia cinerea Güld.	M. sibiricus Alph.
*Numenius variegatus Scop.	M. mentalis Oates.
* <i>Mesoscolopax minutus</i> Gould.	*Archibuteo lagopus Brünn.
*Sterna longipennis Nordm.	* <i>Circus taissiae</i> nov. ³⁾
Larus minutus Pall.	*Astur caesius Buturl.
*L. ridibundus L.	* <i>Accipiter nisus</i> L.
*L. kamtschatchensis Bp.	Falco saturatus Buturl.⁴⁾
*Lyrurus tetrix L.	*Tinnunculus tinnunculus L.
*Tetrao parvirostris Bp.	*Cuculus johanseni Tschusi.
*Tetrastes bonasia L.	(C. saturatus Blyth.)
*Anas clypeata L.	*Cypselus pacificus Lath.

1) Für einen dieser Vögel, *Nettion formosum* Georgi, war das Brüten vor langer Zeit von Middendorff festgestellt worden. Offenbar ist diese Art in „Vögel der Arktis“ übersehen worden.

2) [Vergl. die Anmerkung am Schlusse dieser Abhandlung.

Schriftleitung.]

3) *Circus C. cyaneus similis*, sed non solum jugulo pectoreque autem tota cinerascens. Dem Fräulein Taissia Michailovna Akimova, Ärztin in Kolyma, gewidmet.

4) Dunkele Form von *F. subbuteo* L.

тельно свѣтлѣе, чѣмъ описанный мною въ 1908 г. чеглокъ Якутской области (Journ. f. Orn. 1908, Apr., p. 283), отличающийся общей темной окраской и въ особенности густой окраской штановъ *), потому отношу его къ типичной формѣ. Размѣры: крыло—263 мм., хвостъ—135, плюсна—35, сред. палецъ безъ когтя—33,5, хребетъ клюва (хорда)—16 мм.

81. *Амурскій кобчикъ*. *Erythrops amurensis* (Radde).

Цѣлый рядъ экз. отъ 10 мая по 14 июня съ Ханка. А. И. Ч. Самки этого вида до крайности схожи опереніемъ съ чеглокомъ, но, конечно, сразу отличаются (кромѣ блѣдныхъ, почти сливочно-охристыхъ штановъ и полосатаго хвоста) короткостью пальцевъ: средній палецъ безъ когтя всегда значительно короче 3 см.

82. *Уссурийскій сапсанъ*. *Falco peregrinus ussuriensis* Buturl.

Этотъ сапсанъ, отличающийся очень блѣдной пепельной (включая и голову) окраской верхней стороны, длинными усами и слабо, но все же испещренной грудью, описанъ мною еще въ 1907 г. («Псов. и Ружейн. Охота», 4^о, № 7, отъ 10 марта). Онъ распространяется и въ Японію, и, судя по 1 экз., и до Анадыря. Сѣверная же тундры, отъ Лены по меньшей мѣрѣ до Большого Баранова мыса, обитаетъ очень крупная и темная форма, названная мною *F. p. harterti*.

Въ коллекціи одинъ экз. «8?» отъ 17 августа, съ Ханка, № 265, А. И. Ч.; размѣры его: крыло—312 мм., хвостъ—155, плюсна—45, ср. палецъ безъ когтя—48, клювъ по хребту (хорда)—27, по разрѣзу—28 мм. Экземпляръ годовалый, но не старый.

Ноги (по дневнику А. И. Ч.) лимонно-желты. Оперенье верхней стороны сизовато-дымчато-бурое, всѣ перья узко окаймлены не рѣзко выделяющимся охристымъ цвѣтомъ, на нижней же части спины и верхнихъ кроющихъ хвоста эта каемка становится широкой, до 1, даже 2 миллим. Лобъ бѣлый, и бѣловатое пространство, испещренное темными центрами перьевъ, покрываетъ всю переднюю часть темени и малоокругленнымъ

*) Описанъ подъ именемъ *Falco saturatus*, но теперь я полагаю что чеглокамъ лучше придавать значеніе рода, а не подрода въ родѣ *Falco*. Сверхъ того одинъ «*Falco saturatus*» имѣется въ орнитологін (Blyth «Handb. B. ind.» p. 277), потому данное мною якутскому чеглоку имя я замѣняю другимъ, *Nyrotriorchis subbuteo jakutensis* nom. emend.

СОДЕРЖАНІЕ:

Иностранное обозрѣніе. С. А. Бутурлинъ.
Письма къ племяннику. К. П. Ваковецкій.

Кое о чемъ. Е. Г. Надеждинъ.

Васино горе. В. И. Ди—въ.

Петровъ лень. Н. Вульфъ.

Замѣтки рыболова. М. А. Колмаковъ.

Стычныя удилица. Н. В. Сибилевъ.

Отъ редакціи.

Одесская выставка 1910 г. А. П. Ивашенцовъ.

Изъ пѣсенъ лѣсного бродяги. Изв. Оксениторнъ.

Птицы Приморской области. С. А. Бутурлинъ.

Къ вопросу о русскихъ сторожевыхъ собакахъ. М. Г. Дмитриева-Сулма.

Г. Тара, Тобольской губерніи. В. Е. Ушаковъ.

Изъ Дагестана. А. С. Кривенко.

Изъ Термеза. Venator.

Ящикъ для винтовки. Н. М. Михайловскій.

Совѣты и рецепты.

Анатолій Николаевичъ Савельевъ. Н. Н. Фокинъ.

Объявленія.

Редакторъ Н. Н. Фокинъ.

Издательница А. Н. Фокина.

Птицы Приморской области.

ИЗЪ МАТЕРІАЛОВЪ ВЛАДИВОСТОКСКАГО МУЗЕЯ ОБЩЕ
СТВА ИЗУЧЕНІЯ АМУРСКАГО КРАЯ.

(Продолженіе.)

X. Горлицы. *Peristeridae*.

59. Восточно-сибирская горлица. *Turtur ferrago orientalis* (Lath.).

XI. Триперстки. *Turnicidae*.

60. Китайская триперстка. *Turnix blanfordi* Blyth.

Самка отъ 20 мая и самецъ отъ 14 іюня, Ханка, А. И. Ч.

XII. Куропатки и фазаны. *Phasianidae*.

61. Уссурийскій перепелъ. *Coturnix japonicus ussuriensis* Bogd.

Перепела—весьма трудная группа птицъ. Съ общей болѣе-шинству куриныхъ птицъ легкой измѣнчивостью подъ вліяніемъ виѣщнихъ условій, и значительнымъ разнообразіемъ возрастныхъ и половыхъ нарядовъ у нихъ соединяются не только большое разнообразіе чисто индивидуальное, но и привычка длинныхъ сезонныхъ перелетовъ, облегчающая и залеты и смѣшиваніе и образованіе помѣсей.

Тѣ видовые признаки перепеловъ, которые мы обыкновенно находимъ въ разныхъ руководствахъ (включая и мой Синопт. Табл.)—годятся лишь для меньшинства экземпляровъ, и въ порядочной серіи уссурийскихъ или японскихъ птицъ мы всегда находимъ извѣстное количество птицъ, весьма похожихъ на европейскаго перепела, и еще больше—возможнаго промежуточного вида.

Въ виду этого Огильви Грантъ, считающійся авторитетомъ по куринымъ птицамъ, такъ прямо и утверждаетъ, что перелетный европейскій перепелъ распространенъ отъ Атлантическаго до Тихаго океана, при чемъ въ западной части своего распространения онъ на зимовкахъ скрещивается съ красногорлой осѣдлой южно-африканской расой, откуда происходятъ болѣе окрашенные на горлѣ европейскіе экземпляры (и даже

*Взвешивание
Взвешивание
всех.*

НАША

Взвешивание

ОХОТА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ.

Взвешивание

Двѣнадцать книгъ въ годъ, посвященныхъ
охотѣ ружейной, псовой и рыболовству.

ГОДЪ ИЗДАНИЯ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Книга VI—Іюнь.

1910 г.

Редакторъ Н. Н. Грокина.

Издательница А. Н. Грокина.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія В. Я. Мильштейна, Нижегородская ул., д. № 14.

*нач. 20
с. 71*