

Тертищ В.Г.

В. Г. Тертищ
1927.12.30

А. В. ФЕДЮШИН. О палеарктических расах дербника (*Falco columbarius* L.).
ЗМ 17 XII 1926.

[A. FEDIUŠIN. Sur les races paléarctiques du *Falco columbarius* L.].

(Представлено Академиком Секретарем в ОФМ 5 I 1927).

I.

При сравнении экземпляров дербников, собранных в пределах Белоруссии (б. губ. Минская, Витебская и Могилевская) с экземплярами коллекции Зоологического Музея АН, первые оказались заметно отличными от птиц из других районов. Эти отличия, главным образом, в окраске молодых птиц, заставили предпринять ревизию вида *Falco columbarius* L., представленного несколькими подвидами на территории Европы, Средней и Северной Азии и Северной Америки. Богатая коллекция Зоологического Музея давала большую возможность для сравнительного изучения. Всего было просмотрено свыше 200 экземпляров, начиная от Исландии на западе и кончая экземплярами с берегов Тихого океана и Японии на востоке. Кроме того, в коллекции оказались три экземпляра *Falco columbarius columbarius* L. (Сев. Америка). Согласно Hartert'у («Die Vögel der paläarktischen Fauna», S. 1074—1078), подвиды *F. columbarius* распределяются таким образом:

a. *F. c. regulus* Pall. (terra typica — Зап. Сибирь). Северная Скандинавия; (среди. и сев. части европ. СССР); Зап. Сибирь; Исландия; Фарерские о-ва, Шотландия, Ирландия, Великобритания (Пеннинские горы до Дэрбишира и Норд-Йоркшира).

b. *F. c. insignis* (Clark.) (terra typ. — Фузан, Корея). От Туркестана (Джаркент, Семпреченск, Иссык-Куль) до Китая, Японии и Уссурийского края.

c. *F. c. pallidus* (Suschk.) (terra typ. — западная часть Киргизских степей). Киргизская степь, Мугоджарские горы, Южный Урал.

d. *F. c. lymani* Bangs (terra typ. — Чеган-Бургази на Алтае). Распространение точнее не указано, а самостоятельность формы взята под знак вопроса.

e. *F. c. columbarius* L. (terra typ. — Каролина). Сев. Америка от Сев.-Зап. Аляски до Калифорнии и Орегона, от Кееватина, Унгава и Ньюфаундленда до Мичигана, Онтарио и Маина.

нач. 19
окт. 28.

f. *F. c. suckleyi* Ridgw. — От Ситки до северной Калифорнии.

g. *F. c. richardsoni* Ridgway. — Центральные части Сев. Америки (форма как бы викария азиатской — *F. c. pallidus*).

Последние три подвида, как принадлежащие другой зоогеографической области, непосредственного отношения к разбираемому вопросу не имеют, и мы на них не будем останавливаться, так как и фактически этого сделать невозможно из-за отсутствия достаточного материала из Америки. [Укажем только, что на основании сравнения имеющихся трех экземпляров *F. c. columbarius*, эта форма легко отличается от всех палеарктических дербников не только очень темною однотонною, у молодых доходящей до черно-бурого цвета окраской, но еще и тем, что у всех виденных экземпляров, в полную противоположность всем азиатским и европейским экземплярам, внешнее опахало первого махового однообразного цвета и без всяких светлых пестрин или каймы, что всегда в свою очередь, наблюдается у дербников палеарктических]. Что же касается первых четырех групп, то просмотренный материал в ЗМ заставляет прийти к некоторым новым выводам относительно нечерняющегося размещения всех форм Европы и Азии подвидового значения среди указанных, а также самостоятельности некоторых из них. То обстоятельство, что форма, именовавшаяся, по Hartert'у (V. p. F. Bd. II, S. 1074), *Falco columbarius regulus* Pall., в силу номенклатурных правил о приоритете была им впоследствии (I. c., Bd. III, S. 2200) переименована в *Falco columbarius aesalon* Tunst. и таким образом, первое название, данное Палласом для сибирского дербника, как бы отошло в синонимы названия, данного Тунсталем для птицы без terra typica (по описанной по экземпляру из Реомюровского музея Бриссоном, называвшем его: «L'Emerillon» и на этом основании, с условным принятием для последней в качестве terra typica Франции) заставляет сделать по этому поводу следующие замечания: если даже допустить, что птица, названная Тунсталем *Falco aesalon* (1771 г.) действительно добыта во Франции, а не только «вероятно происходит» оттуда, как предполагает Hartert, то и в этом случае решительно невозможно догадаться, о какой именно форме дербника шла речь, так как последний во Франции бывает, главным образом, в качестве зимнего гостя или на пролетах и сам Hartert о гнездовании дербника во Франции ничего не говорит, наоборот, считает все показания старых авторов относительно гнездования этой птицы к югу от Немецкого и Балтийского морей «alle auf Irrtümern beruhen, oder auf voreiligen Schlüssen aus ausnahmsweise späten Durchzügeln und zurückgebliebenen Exemplaren» (I. c., S. 1076). Таким образом, действительно остается думать, что имя *aesalon* было дано какой-то зимней или перелетной форме дербника. Но дело в том, что, как показали последние исследования, на зимовках и во время пролета могут встречаться в одних и тех же местах разные подвиды одного вида, как правило, разобщенные географически во время гнездовья, и во Франции могут быть встречены осенью, зимой и весной как светлые — восточные, так и темные — западные формы дербника.

Вот, почему название, данное Тунсталем, для дербника с невыясненной patria, при наличии нескольких географических форм только на территории палеарктики, не может быть употреблено в подвидовом значении, а может считаться синонимом фактически для любой или, по крайней мере, для трех подвидов дербника, могущих оказаться на зимовках или на перелете во Франции. С другой стороны, имя, данное Палласом для сибирского дербника *Falco regulus* (1773 г.), должно быть сохранено в качестве подвидового названия для части сибирских дербников, населяющих Западную Сибирь, и для птиц из других районов, идентичных с западно-сибирскими (кроме киргизского дербника *F. c. pallidus* Suschk.). Как мы увидим ниже, к подвиду *F. c. regulus* Pall., должны быть отнесены гнездящиеся птицы в большей части северных, средних и восточных областях СССР в Европе, в Западной и Восточной Сибири, кроме горных участков центральной Азии. Что же касается северо-западной части СССР, т. е. северной половины Белоруссии, губ. Псковской, Новгородской, Ленинградской, Кольского полуострова, затем, вероятно, Финляндии, Швеции, Эстонии и Латвии, то здесь, как оказалось, гнездится особая форма дербника, хорошо отличающаяся от восточно-европейской и сибирских форм. Этот новый подвид особенно легко может быть узнан по молодым птицам, значительно темнее окрашенным, чем у восточных рас. Даже среди самых темно окрашенных сибирских экземпляров *F. c. regulus* нет вполне соответствующих экземплярам из западной части СССР. Поэтому, чтобы отличить их от среднерусских и сибирских птиц, всегда светлее окрашенных, и, повидимому, более крупных, предлагаю назвать северо-западную форму новым именем — *Falco columbarius alaunicus* subsp. nova, по месту открытия этой формы — в алаунской части, так называемого алауно-литовского орнитогеографического округа, установленного основателем русской орнитологии, проф. М. А. Мензбром, в 1882 году.

1. *Falco columbarius alaunicus* subsp. nov. Diagnose: dunkler (besonders junge Vögel) als *F. c. regulus* Pall.; Oberkopf, Oberrücken, Schulterfedern, Schwanzdecken und Flügeldecken auch Steuerfedern stets dunkler gefärbt als bei allen anderen Merlinfalken von Osteuropa und Sibirien. Strichelung am Oberkopf breiter, als bei den östlichen Unterarten; bei ♀ auf dem Schwanz nicht mehr als vier helle Querbänder, die anderen sind unter den Schwanzdecken verborgen; die Querbänderung auf den mittleren Steuerfedern ist auch bei ad. ♂♂ vorhanden, wenn auch nicht immer, so doch längere Zeit sichtbar als bei anderen Unterarten (ausser *F. c. columbarius*); Masse kleiner als bei allen anderen Unterarten Europas und Asiens; Flügel: ad ♂♂ — 190—199 mm (5 St.); ♀♀ — 220 mm. Schwanz: ad. ♂♂ — 114—117 mm. Beschrieben nach 19 Exemplaren.

Typus: ♂ и ♀ 21 VII 1924. Sebeschskij Kreis Gouv. Pskov (Pleskau), Coll. des Zoologischen Cabinets der Weissrussischen Staats-Universität in Minsk.

Terra typica: Sebeschskij Kreis, Gouv. Pskov, und Lachta, Gouv. Leningrad.

Ad. ♂♂: верх головы значительно темнее, чем у *F. c. regulus*; черные наствольные итрихи шире, чем у остальных подвидов; ржавый цвет ошейника ярче,

чем у типичных *regulus*; все перья дорзальной стороны темнее окрашены, чем у всех других подвидов; передняя часть спины заметно темнее остальных частей и иногда носит ясный черноватый налет; рулевые перья сохраняют поперечную полосатость на средней паре дольше (если даже считать этот признак возрастным), чем у других подвидов; нижняя сторона охристо-ржавая и подвержена таким же вариациям в тоне окраски, как и у *regulus*. В остальных подробностях оперения схожи с типичными экземплярами из Сибири. Ad. ♀♀: менее отличимы от сибирских птиц, но все же в общем темнее. Juv. ♂ и ♀ легко отличимы от молодых сибирских дербников своей темной окраской верхней части тела. Экземпляры из окрестностей Лахты (сбор Б. Штегмана, колл. ЗМ) имеют довольно одноцветную окраску спинной стороны: рыжеватые каймы по краям контурных перьев выражены весьма слабо; рыжий цвет развит менее нежели у сибирских; горло с охристым налетом. Во всяком случае, приведенные у Н. Dresser'a рисунки в его «History of the Birds of Europe» (Vol. VI. p. 2, 8), совершенно не подходят к описанному мною подвиду (гораздо темнее окрашенному, чем на рисунках) и могут быть отнесены (за исключением изображения на второй таблице самки, относящегося, как полагает Hartert, к американской форме *F. c. richardsoni*) к *F. c. regulus* typ. Точно решить вопрос, из какой местности происходят взятые Дрессером птицы в качестве оригиналов, решить нельзя, так как ad. ♂ рисовался с экземпляра коллекции Дрессера, добытого на о-ве Мальте в октябре, стало быть, с экземпляра пролетной птицы. То же самое надо сказать и для ♀, оригиналом которой была апрельская птица из Штеттина. Что касается таблицы с молодыми, то она была срисована с оригинала, купленного у J. Wolf'a, и о происхождении изображенных на ней птиц тоже ничего не известно.

Размеры крыльев у 5 старых ♂♂: 190, 194, 196, 198, 199; у молодых размеры неполные и их не привожу; у ad. ♀ крыло = 220.

Экземпляры коллекций: Зоол. Кабинет Б. Г. Университета: 1) ♂ juv. 21 VII 1924 Себежский уезд, Пековск. губ.; 2) ♀ juv. 21 VII 1924 ibid.; 3) ♀ juv. 21 VII 24 ibid.; 4) ♂ juv. 16 VII 1925 Клямовичи, Могилевск. округа; 5) ♀ 15 VII 1926 Колодище Минск. о.; 6) ♂ juv. 16 VII 1925 Клямовичи, Могил. округа (сборы А. Федюшина; Зоологич. Музея АН); 7) ad. ♂ 21 VII 1924 Мыс Зеленый, Кольский залив (сбор Капустина); 8) ♀ ad. 21 VII 1924 ibid.; 9) ad. ♂ Эстляндия (sine dato); 10) ♂ ad V 1898 Петергофский уезд; 11) ad ♂ 1853; 12) ad. ♂ 2 V 1920 Иоканга, Архангельск. губ.; 13) ♂ juv. 30 VII 1922 Лахта, Ленинградск. губ. (сбор Штегмана); 14) ♂ juv. 30 VII 1922 ibidem. 15) ♂ juv. 31 VIII 1890 колл. Сомова (Харьковск. губ.); 16) ♂ VIII 1905 Островки, Шлиссельбургского уезда; 17) ♀ juv. 23 VII 1922 Лахта, Ленингр. губ.; ♀ 14 IX Москва (tr.); 18) ♂ 19 IX 1918 Skinnskatteberg (ю.-в. Швеция); 19) ♀ 8 X 1911 Upsala.

Географическое распространение: средние и северные провинции Белорусии (б. губ. Минская, сев. часть; Могилевская, Витебская), Смоленская (?),

Пековская, Ленинградская, Новгородская, Эстония, Латвия, Финляндия, Мурман и Швеция.

Замечательно, что уже А. Е. Brehm в своей статье «Beiträge zur Ornithologie Nord-Ost-Afrikas» (Naumannia, 1856, S. 213—218) ясно делает различие между двумя формами дербников — светлой, которая известна, ему как зимующая птица в Египте и которую он называет «*Falco acesalon* Linn.», и очень темной формой, родной которой он считает Исландию и встречающуюся в Германии только на зимовках, называемую им «*Falco lithofalco* L. Gm. et Brehm». Брем считал эти две формы за отдельные даже виды, вот его слова: «je mehr ich beide Vögel betrachte, um so mehr werde ich von der spezifischen Verschiedenheit derselben überzeugt. Naumann hat *Falco lithofalco* abgebildet, *Falco acesalon* aber wahrscheinlich nicht gekannt, weil er ihn sonst gewiss auch bildlich dargestellt haben würde. Das junge Männchen, welches wir vor uns haben, ist noch dunkler, als die Naumannsche Abbildung; es mag wohl jünger sein; sein Vaterland ist Island. Diesem Vogel gegenüber gehalten tritt der ganz verschiedene Charakter unseres jungen *Falco acesalon* so auffallend hervor, dass man beide sofort für verschiedene Arten erklären muss. Diese Ansicht erhält dadurch noch besonderes gewicht, dass unter den vielen Exemplaren des *Falco acesalon*, welche ich aus Ägypten mitgebracht habe, sich auch nicht ein einziges Exemplar, von *Falco lithofalco* befand. Es mag, dass *Falco acesalon* unter einem andern Himmelsstriche lebt als *Falco lithofalco* der Bewohner Island, Norwegens etc. und Gast in Deutschland (welches *F. acesalon* zuweilen ebenfalls besucht; so haben wir Exemplare aus der Gegend von Leipzig). Dies ist für uns aber kein Grund sie als «klimatische Varietäten» zu erklären, sondern wir halten beide Vögel für besondere «gute Arten». Beide Vögel lassen sich freilich weit leichter unterscheiden, als beschreiben...». Chr. L. Brehm в своей работе «Ornis oder das Neueste und Wichtigste der Vögelkunde» (III Heft, 1827. p. 9, 10) еще, повидимому, не отличал исландского дербника от европейских и, объединяя их под названием «*Falco subacesalon* Br. (*F. acesalon* Linn.)», в диагнозе этой формы говорит: «Patria Islandia, hieme in Germaniam migrat» (стр. 9) и далее, на стр. 10: «Er wandert aus seinem Vaterland, aus Island im Winter nach Deutschland». Таким образом, оба автора говорят о птице из Исландии, и А. Е. Brehm описывает ее, как «вид», гораздо темнее окрашенный, чем зимние птицы из Египта и чем изображение у Naumann'a. Из этого описания можно было бы заподозрить, не является ли описываемая нами форма, тоже более темная, чем сибирские *F. c. regulus* (между прочим, известные на зимовках и в Египте) — той птицей, которую уже знал А. Brehm под названием *F. lithofalco* и Chr. L. Brehm еще раньше под названием *F. subacesalon* и описанной недавно Kleinschmidt'ом (*Falco*, 1917, p. 9) под именем «*Falco alfred-edmundi*» (отнесенным Hartert'ом в синонимы *F. subacesalon* Chr. Brehm, так как темные дербники из Исландии были, как указано выше, известны Брему сто лет тому назад)? Нашедшийся в коллекции ЗМ экземпляр старого ♂ из Исландии рассеял сомнения относительно возможной идентичности *F. c. alanicus* и птицы из Исландии. Исландский экземпляр оказался крупнее (кр. = 203;