

Оседло живет на Монероне, где также редок. За время пребывания на острове мы его отмечали только однажды — 18 июля 1949 г., близ ключа, в восточной части острова.

В близлежащих районах крапивник отмечен в Приморье.

Селится в самых различных насаждениях по ключам и горным рекам, но чаще всего отмечался среди кустарников по берегам рек и ключам. В горы поднимается до крайнего предела распространения кустарниковой растительности.

335. Южнокурильский крапивник. *Troglodytes troglodytes fumigatus* Temminck

Экземпляры: 1—4) два самца и две самки взрослые, 8—9.X 1948 г.; 5) самка молодая, 9.X 1948 г., о-в Кунашир, близ с. Южно-Курильска, сбор Гизенко; 6) самка молодая, 14/IX 1950 г., о-в Оннекотан, сбор Васина. Размеры: крыло 55 мм, клюв от переднего края ноздрей 9,6 мм; экз-р в свежем оперении.

Крапивник живет оседло на всей Курильской гряде; обыкновенен, но немногочислен.

Нами отмечался на о-ве Шикотане, на горе Сикотан, 2 сентября 1948 г. Несколько птиц нами добыто на о-ве Кунашире в октябре 1948 г. Бергман собрал несколько птиц на о-ве Уруп, наблюдал их на о-ве Ушишире, 30 июля 1946 г. одна птица добыта в зарослях бамбука на о-ве Уруп (Воробьев, 1947); Б. Н. Васин добыл 14 сентября 1950 г. молодую самку на о-ве Оннекотане. Встречается на о-ве Парамушире (Ямасина, 1929). На Уруп отмечался нами в августе — сентябре 1952 г. в большом количестве.

Крапивников с Курильских островов Бергман отнес к форме *fumigatus*, т. е. к птицам, населяющим Японию. Мы сравнивали птиц из Японии с сахалинскими и курильскими. Курильские птицы темнее сахалинских, крыло у них длиннее и клюв массивнее. Сахалинские ближе к приморским, но брюшко у них темное. Экземпляр, доставленный Б. Н. Васиным с о-ва Оннекотана, по размерам и окраске сходен с формой *T. t. pallescens*. К. А. Воробьев (1947) экземпляр, добытый с о-ва Урупа, отнес к форме *T. t. pallescens*. Быть может, правильное будет птиц с северных и средних островов, включая о-в Уруп, относить к форме *pallescens*, а птиц с Итурупа, Кунашира и Шикотана — к форме *T. t. fumigatus*.

336. Сахалинская бурая оляпка. *Cinclus pallasii dementievi* Gizenko (subsp. nova)

Экземпляры: 1—4) два самца взрослые, самка и экз-р без определения пола, 6—11.XII 1947 г.; 5—19) семь самцов взрослых, семь самок и экз-р без определения пола, 7.IX—19.XII 1948 г., окрестн. Южно-Сахалинска, пойма р. Сусун; 20—23) три самца и самка взрослые, 26.III 1949 г.; 24, 25) самцы молодые, 21.IX 1949 г., окрестн. г. Холмска, по речкам; 26) самка молодая, 5.XI 1949 г., окрестн. пос. Гомон, р. Муйка, сбор Гизенко; 27) № 74376, самец, 17.XI 1949 г., р. Мобай; 28) № 74377, птенец, 3.VIII 1949 г., р. Осо, Средне-Сахалинский заповедник, сбор Волкова, музей МГУ.

Живет оседло на Сахалине и южных островах Курильской гряды; обычна, местами многочисленна.

Бурая оляпка населяет весь Сахалин. Нами она добывалась как в северной, так и в южной половине острова. Отмечена зимой в верхнем течении р. Тыми, при сильном морозе (Schrenck, 1860). Из более поздних находок с р. Тыми можно отметить самку, добытую в январе 1913 г. (Hesse, 1915). На Курильских островах оляпка встречается от Кунашира и до Урупа включительно. Молодые добывались в августе на о-ве Уруп (Bergman, 1935).

Мы отмечали ее однажды, 27 августа 1948 г., на о-ве Шикотане, по речке, впадающей в бухту Инемусири; в августе-сентябре 1952 г. обычна на Урупe. По Бергману, бурая оляпка севернее Урупа не встречается.

Оляпка с Сахалина описана нами как новая форма. От всех других восточноазиатских бурых оляпок она отличается по окраске. Птицы с Сахалина значительно темнее (Hesse, 1915). Что касается меристических признаков сахалинских оляпок, то они также, хотя менее резко, подтверждают самостоятельное систематическое положение описанной формы. Сахалинские птицы несколько крупнее охотско-уссурийских: крыло у них 99,72 мм (13 экз.), у охотско-уссурийских — 98,30 мм; длина клюва от оперения лба, соответственно, 18,43 и 17,63 мм, плюсна — 33,07 и 30,80 мм. Какая форма населяет Курильские острова, — до сего времени не установлено. По данным Бергмана (1935), собранная им серия (13 птиц) с Курильских островов отлична от птиц, встречающихся в Японии и Китае. Вполне возможно, что Курильские острова населяет другая географическая форма, отличная и от японской, и от сахалинской.

337. Уссурийская ласточка — касатка. *Hirundo rustica gutturalis* Scopoli

Экземпляры: 1) экз. без определения пола, 3.V 1949 г., вес 14,5 г, окрестн. г. Холмска; 2) самец взрослый, 14.VII 1949 г., вес 17,5 г, о-в Монерон, сбор Гизенко. Из сборов, хранящихся в ЗИН: 3) Сахалин, сбор Супруненко; 4—6) самцы молодые, 10.X 1884 г., о-в Уруп, сбор Вознесенского.

Гнездится на Сахалине, Монероне и Курильских островах; обыкновенна, но немногочисленна.

На Сахалине уссурийская ласточка отмечалась нами в Поронайском и Углегорском районах, где она обыкновенна по берегам бухт и близ населенных пунктов. Вероятно, населяет весь Сахалин. И. С. Поляков (1884) отмечал ее в северной части Сахалина 16 мая 1881 г. На о-ве Монероне добыта нами 14 июля 1949 г. в восточной части острова. Повидимому, она здесь гнездится, хотя встречается редко — нами наблюдалась только один раз.

Населяет и Курильские острова, в ЗИН хранятся сборы с о-ва Урупа, от И. Г. Вознесенского. Нами эта ласточка отмечалась на Урупe 14 сентября 1947 г., птицы были многочисленны по берегу моря в бухте Мисими-Ван. Первого сентября 1948 г. пара ласточек, вероятно этого же вида, встречена нами на о-ве Шикотане, близ бухты Тихой, у населенного пункта. На Урупe, Симушире, Ушишире и Рашуа ласточки стали гнездиться с 1923 г., когда там возникли рыбацкие поселки (Yamashina, 1931).

338. Восточносибирская береговая ласточка. *Riparia riparia* *ijimae* Lönnberg

Экземпляры: 1—5) два самца взрослые, две самки и птенец, 2—16.VIII 1947 г.; 6) два самца и две самки, взрослые, 13—16.VI 1949 г.; 10) самец взрослый, 3.VIII 1949 г., окрестн. поселка Сахалинского филиала АН СССР, обрывистый берег реки, сбор Гизенко. Из сборов с Сахалина, хранящихся в ЗИН: 11) самец взрослый, 10.VIII 1881 г., г. Александровск, сбор Полякова. Размеры: длина крыла 98—105,3 мм, среднее 102,63 мм; размах крыльев 210—263 мм, среднее 225,6 мм; длина тела 119—130 мм, среднее 125,4 мм; вес 12—15,5 г, среднее — 13,9 г.

Гнездится на Сахалине и Курильских островах; многочисленна.

Береговая ласточка встречается на гнездовье по всему Сахалину. Небольшие и редкие колонии птиц встречены по берегам р. Сууи. Несколько колоний птиц отмечено по берегам р. Найбути; на этой же речке отмечены колонии ласточек 29 мая 1914 г. (Munsterhjelm, 1920).

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
САХАЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ

А. И. Тизенко

П Т И Ц Ы
САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА · 1955