

В. Г. ГЕПТНЕР и Г. Ш. ШУКУРОВ

К СИСТЕМАТИКЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЮ
АФГАНСКОЙ ПОЛЕВКИ (*MICROTUS AFGHANUS THOS.*)

(Представлено академиком К. И. Скрябиным 19 VI 1950)

Афганская полевка относительно недавно обнаружена в пределах Советского Союза. До последнего времени она была известна всего в нескольких экземплярах из немногих пунктов юга Туркмении. В последние годы выяснилось, что этот вид широко распространен в Южной Туркмении, и был собран значительный коллекционный материал (4). Область распространения этой полевки занимает пространство между Мургабом и Тедженом на север до Мары (Мерва) и Серахса. Восточнее Мургаба этот вид пока не известен, но, очевидно, водится здесь на юге (Карабиль). Западнее Теджена известно два местонахождения этого вида в предгорьях Копет-дага к ЮВ от Ашхабада (4). По всей остальной полосе предгорий и по пригорной равнине Копет-дага, как и в горах, афганская полевка до настоящего времени не найдена. В Каракумах и вообще в песчаных пустынях отсутствует.

В южной части Мургаб-Тедженского междуречья (Бадхыз) эта полевка весьма обыкновенна и годами встречается в огромных количествах. Будучи одним из основных вредителей пастбищ, она в то же время, очевидно, играет серьезную роль в почвообразовании и имеет известное эпидемиологическое значение.

В свете приведенных данных весьма интересно обитание афганской полевки в горном массиве Больших Балханов в Западной Туркмении. Первые экземпляры были добыты здесь еще в 1929 г. С. А. Александровым, однако они не были обработаны, или, как и некоторые, собранные позже, определялись неправильно (4). В 1947—1949 гг. хорошую серию этого вида собрал здесь Г. Ш. Шукуров.

Балханские зверьки оказались относящимися к особому новому подвиду, который мы обозначаем как

Microtus afghanus balchanensis subsp. nova

Тип: № S-50534. Череп и шкурка. 6 VIII 1947. Г. Шукуров leg. Хранится в Зоологическом музее Московского государственного университета. Кроме типа, еще 15 экз.

Locus classicus: родник Кендырли, северный склон гор Большие Балханы (1000 м над уровнем моря). Зап. Туркмения.

Диагноз: *Microtus afghanus balchanensis* Heptner et Shukurov по размерам тела и черепа и по строению черепа и зубов совершенно сходна с *Microtus afghanus afghanus* Thos., но отличается от нее серым цветом меха.

Размеры (по 7 взрослым экз.): длина тела 93,4—110,0 (M 99,3); длина хвоста 24,9—28,0 (M 26,4); длина задней ступни 16,0—18,6 (M 17,1); высота уха 8,4—10,0 (M 8,8). Вес 31—39 г.