

СБОРНИК ТРУДОВ ЗООЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ МГУ
ТОМ XXV

ARCHIVES OF ZOOLOGICAL MUSEUM MOSCOW STATE UNIVERSITY
Vol. XXV

Павлинов И. Я., Россолимо О. Л. Систематика млекопитающих СССР: (Исследования по фауне Советского Союза) / Под ред. В. Е. Соколова. — М.: Изд-во МГУ, 1987. — с. 285.

В справочном издании по систематике современных млекопитающих СССР приведена подробная классификация млекопитающих фауны Советского Союза от отряда до вида. Даны полные списки синонимов для всех таксонов, указаны типы и уточненные (с учетом современного административно-территориального деления) типовые местонахождения, места хранения типовых экземпляров. Рассмотрены вопросы номенклатурного статуса названий.

Книга рассчитана на териологов — систематиков, зоогеографов, экологов.

Рецензенты:

доктор биологических наук, профессор *В. Е. Флинт*,
кандидат биологических наук *Л. С. Степанян*

Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Московского университета

- Туркмения, Марыйская обл., Байрам-Али. Тип в ЗММУ.
1933. *Pallasiomys erythrourus oxianus* Heptner, *ibid.*, 8: 153. Узбекистан, Кашкадарьинская обл., Гузар. Тип в ЗММУ.
1933. *Pallasiomys erythrourus sogdianus* Heptner, *ibid.*, 8: 153. Узбекистан, Ферганская обл., Фрунзенский р-н, Мирза-Арал. Тип в ЗММУ.
1936. *Meriones erythrourus heptneri* Argyropulo, Тр. Биол. ин-та Арм ФАН СССР, 3: 75. Азербайджан, Баку. Nom. nudum (без описания).
1977. *Meriones libycus schwarzovi* Toktosunov, в кн.: Экология и мед. значение песчанок фауны СССР, М.: 96. Киргизия, Иссык-Кульская обл., Иссык-Кульская котловина. Nom. nudum (без описания).

Meriones libycus afghanus Pavlinov, subsp. nov. (описывается здесь). Афганистан, Нангархар, Джелалабад. Тип S-104894, коллекция ЗММУ. Отличается очень светлой окраской: верх тела светло-палево-песчаный почти без бурых тонов, низ тела чисто-белый (волосы с белыми основаниями), хвост без красно-кирпичного оттенка. Вост. Афганистан (Джелалабад, Кундуз), крайний юго-запад Таджикистана (запов. «Тигровая балка»).

Включает *caudatus* Thos.; возможно, не включает *arimalius* Cheesman et Hinton. О номенклатуре см. И. Я. Павлинов (1982в).

Группа видов «tristrami»

***Meriones (P.) tristrami* Thomas, 1892 —
малоазийская песчанка**

1892. *Meriones tristrami* Thomas, Ann. Mag. Nat. Hist., 9: 148. Израиль, Мертвое море. Тип в БМЕИ.
1931. *Meriones bogdanovi* Heptner, Zool. Anz., 94: 121. Азербайджан, Сальянский р-н, Мильская степь, «Пирхан-Тапа». Тип в ЗММУ.

Непосредственное сравнение морфологических материалов из Закавказья, Зап. Турции, Ирака и Израиля (Павлинов, orig. данные) позволяет согласиться с предположением (Harrison, 1972) о конспецифичности *tristrami* Thos. и *blackleri* Thos.

Группа видов «meridianus»

***Meriones (P.) meridianus* (Pallas, 1773) —
полуденная песчанка**

1773. *Mus meridianus* Pallas, Reise Versch. Prov. Russ. Reichs, 2: 702. Астраханская обл., Красноярский р-н, Досанг (уточнено в связи с выделением неотипа — Б. С. Виноградов и др., 1936: 173). Тип в ЗММУ.