

INSECTES DU CAUCASE

ET

DES PROVINCES TRANSCAUCASIENNES

RECUEILLIS ET DÉCRITS

PAR

T. VICTOR.

MYRIAPODES Latr.

LEIOSOMA Victor nov. gen. Tab. I. fig.—A^v.

Corps aplati, allongé et proportionnellement plus large que dans les autres genres de *Monozaica* Brandt; il est parallèle et se rétrécit vers les deux extrémités. Les côtés latéraux sont tranchants et très faiblement relevés, les angles postérieurs des segments avancent de manière que les bords latéraux se présentent en scie. La tête (fig. A^u) est beaucoup plus étroite que le corps, triangulaire, plate, appliquée vers le ventre et cachée sous les 4 premiers segments du corps. Sa surface se compose au dessus de quatre pièces: 1) d'une plaque principale, triangulaire et tronquée en avant, qui occupe

dale est presque bi-valvé, vers la tête il y a deux segmens et vers le bout du corps un segment dépourvus de pieds et le second caudale n'a qu'une seule paire. Les plus grands exemplaires, et que je prends pour des adultes, n'ont pas plus de 29 segments et 51 paires de pattes. Les pieds et les boutons sur l'épiderme sont d'un blanc transparent, tout le reste du corps est d'un rose clair et luisant. Cette espèce est peu agile et se contracte faiblement.

Je l'ai découverte à Natlim-Zéméli en Kahétie où elle se tenait accrochée aux troncs des arbres en décomposition dans des lieux humides.

FOURMIS.

FORMICA CADUCA Vict. Tab. II. fig. d'.

Atra, nitidissima, pilis fuscis modice adspersa, capite, thorace, tarsisque rubidis, capite maximo.

Long $3\frac{1}{2}$ lign. — larg. de l'abdomen $\frac{1}{2}$ lign. de la tête presque une ligne.

Cette Fourmi appartient aux Fourmis bossues de Latreille et atteint à peu près la même grandeur. La tête est grosse, presque carrée, convexe, rougeâtre et plus grande que l'abdomen; sur le vertex on voit un faible enfoncement transversal et des rides longitudinales qui se confondent avec la ligne imprimée du milieu, et vers les mandibules deux enfoncements très prononcés et deux fortes carènes entre eux. La lèvre supérieure est transversale. Les mâchoires sont fortes, arquées et plus claires que

la tête. Les yeux sont noirs et peu saillants. Les antennes ont la longueur des deux tiers du corps, le premier article est arqué et très long, les dix suivants sétacés et tous ensemble de la longueur du premier. Le corselet est de la couleur de la tête, étroit, convexe, finement rugueux et couvert de quelques poils épars, cependant en plus grande abondance que la tête; sa partie postérieure est plus large et plus lisse que l'antérieure. Le dos est séparé du corselet par un étranglement un peu aplati; il est scutiforme à deux nœuds égaux, un peu carrés, noirs et luisants. L'abdomen est plus large que le corselet, ovale, très lisse et parsemé de quelques poils épars. Les pattes sont noires, avec les tarses plus clairs.

Cette espèce ne mord presque pas et tombe bien vite par terre. Elle fait son nid dans la terre sous les pierres et le remplit de toutes sortes de petites tiges sèches. Je l'ai prise en Arménie près du bord de l'Araxe.

Elle doit être placée près de la *F. capitata* Latr.

COLÉOPTÈRES.

La 2^e partie de la *Fauna Entomologica Transcaucasica* de M. Falderman ayant paru, je me vois réduit à la nécessité de faire les observations suivantes: page 404, M. Falderman a publié une *Coccinella distincta*, et page 423, on en trouve une autre que j'ai nommé *C. fulvimana*; toutes deux ont au premier abord beaucoup d'analogie avec la