

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ IMPÉRIALE

DES NATURALISTES

DE MOSCOU.

TOME XXXII.

ANNÉE 1859.



Nº. III.



MOSCOU.

IMPRIMERIE DE L'UNIVERSITÉ IMPÉRIALE.

1859.



CATALOGUE

dès insectes rapportés des environs du fl. Amour, depuis la Schilka jusqu'à Nikolaëvsk, examinés et énumérés

PAR

V. MOTSCHULSKY.

Le catalogue contient un grand nombre d'espèces nouvelles, dont une partie est décrite dans le voyage de M. Schrenk, une autre se trouve diagnostée dans les Feuilles qui suivent et sera décrite plus en détail dans ce Bulletin.

I. COLÉOPTÈRES.

A. ENTOMOPHAGES.

Carabiques.

Cicindela sylvatica L.

- *restricta* Fisch.
- *spinigera* Eschh.
- *transbaicalica* Motsch.
- *laetescripta* Motsch.
- *Elisae* Motsch.

Elongato-parallela, *nigro-aenea*, *cupreo-variegata*, *subtus albo-villosa*; *elytris lunulis ha-*

matibus tribus margineque angustotestaceo-albis.

Long. 3—3 $\frac{3}{4}$ l. — lat. 1 $\frac{1}{4}$ —1 $\frac{2}{3}$ l.

De la forme et avec les dessins de la *contorta*, mais tache suturale à l'extrémité, courte.

Elaphrus riparius L.

Bembidium striatum F.

— *conicollé* Motsch.

— *foveum* Motsch.

Eurytrachelus amurensis

Motsch.

Notaphus tenebrosus Motsch.

Rivulaires.

Salda littoralis L.
— *oblonga* Stål.

Plotères.

Gerris paludum F.

VII. HOMOPTÈRES.

Cicadaïres.

Cicada hyalina Grm.

Fulgozelles.

Delphax sp.?

Asiraca sp.?

Cicadelles.

Aphrophora coleoptrata L.

Ptyela spumaria L.

Bytascopus sp.?

Tettigonia atramentaria Motsch.

Elongata, parallela, nitida, supra nigro-subaenea, macula scutellaris, altera frontali, capituli lateribus, elytrorum limbo, corpore subtus pedibusque dilute flavo-subviridis.

Long. $2\frac{2}{3}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Jassus? larva.

Deltocephalus? larva.

Psyllides.

Psylla sp.?

Aphides.

Aphis sp.?

VIII. DIPTÈRES.

Cousins.

Culex caspius Pall.

— *flavus* Motsch.

Dilute fusco-testaceus, capite thoraceque subinfuscato, tarsi anticis fusco-annulatis.

Long. 3 l. — lat. $\frac{2}{3}$ l.

Anopheles sp.?

Chironomus annularius F.

— *viridulus* L.

Tipulaires.

Limnobia sp.?

Tipulina breviceps Motsch.

Tipuliformis, fusco-testacea, abdomine testaceo annulato, femoribus tibiisque basi testaceis; capite brevi, antennis filiformibus, 16 articulis apice attenuatis, capite plus duplo longioribus; abdomine apice subdilatato, rotundato-obtusio.

Long. $4\frac{1}{3}$ l. — lat. thor. $\frac{3}{4}$ l. — exp. alar. $8\frac{1}{2}$ l.

Scatopsides.

Simulia reptans L.

Crapitula sibirica Gimmerth.

Agromyza pulicaria Meig.

— *pygmaea*? Meig.

Oscinides.

Oscinis nitens Fall.

— *Nasuta* Meig.

*Stomyzides.**Dryomyza* sp.?*Opomyzides.**Calobata cibaria* L.*Orthalides.**Trypera continua* Meig.*Scatomyzides.**Cordylura haemorrhoidalis* Meig.*Dolichopodes.**Dolichopus unguatus* L.

— sp.?

*Muscides.**Anthomyza tabida* ...— *cunicularis* L.

— sp.?

Musca domestica L.*Exorista prominens* Meig.*Erebica tremula* L.*Sarcophaga albiceps* Meig.*Phorocera pallata* ...*Gonia nitroiceps* Motsch.

Tantum Gon. capita, sed capite minore, angustiore, abdominis lateribus postice testaceis.

*Rhyzomyzides.**Trixa? nodifrons* Motsch.*Ocyptera borealis? Zetterst.**Coriaces.**Hippobosca oculata* Motsch.

Dilatata, depressa, fusco picea, fronte, scutello femoribusque te-

staceo subvirescentibus, oculis magnis, nitidis, nigris, abdomine postice biloba.

Long. $3\frac{1}{4}$ l. — lat. abd. $2\frac{1}{4}$ l.*Oestracides.**Oestrus trompe* Modeer.— *tarandi* L.*Conopsides.**Myopa testacea* F.— *tessellatipennis* Motsch.

Fusco-picea, nitida, abdomine fascii cinereis tribus, ore frontisque pallide-testaceis, antennis rostro pedibusque plus minusve brunneis; alis dilute infuscato tessellatis, nervis nigro-piceis,

Long. $3\frac{1}{4}$ l. — lat. thor. 1 l. exp. alar. 7 l.

*Syrphides.**Paragus rufiventris* Motsch.— *obscurus* Meig.*Eristalis* sp.?*Scaeva vitripennis* Meig.— *arcuata* Fall.*Syrphus florens? Fall.*

— sp.?

Volvucella tabanoides Motsch.

Magna, nigro-picea, fronte, ore, rostro, thoracis lateribus maculae basali, scutello alarumque basi flavotestaceis, abdomine dimidio antice albo-testaceo; alis fusco bifasciatis.

Long. $6\frac{5}{4}$ l. — lat. thor. $2\frac{1}{3}$ l. — exp. alar. 18 l.

Merodon narcissus Meig.

Milesia speciosa

Xylota segnis L.

Empides.

Rhamphomyza sp.?

Empis borealis? L.

Hybosides.

Hybos muscarius F.

Leptides.

Leptis scolopacea? F.

— *tessella* Motsch.

*Subabbreviata, nigra, cinereo
sparsim puberula, abdomine och-
raceo, medio nigro maculato;
elytris lato fusco variegatis.*

Long. 3 l. — lat. thor. $\frac{5}{4}$ l. — exp.
alar. 7 l.

Anthracides.

Anthrax flava Meig.

— *maura* F.

Tabanides.

Chrysops bipunctatus Motsch.

*Niger, fronte, thoracis lineis
quatuor margineque segmentorum
abdominis postice cinereo pube-
rulis; ore antennarum basi ab-
dominisque dimidio antice albo-
testaceis, hoc in medio punctis
nigris duobus; alis hyalinis, fas-
cia media costaque antica nigris.*

Long. 4 l. — lat. abd. $1\frac{1}{2}$ l. — exp.
alar. 8 l.

Haematopoda pluvialis F.

Tabanus tarandinus L.

— *fulvus*? Fall.

— *oculatus* Motsch.

— *bromius* L.

Asilides.

Dasypogon sp.?

Asilus culiciformis Pall.

— *germanicus* Meig.

Laphria rufipes Fall.

VIII. LÉPIDOPTÈRES.

1. Rhopalocères.

Papilio Maakii Ménér.

— *xuthus* L.

— *machaon* L.

Parnassius Nomion Fisch.

— *Phoebus* F.

— *Stubbendorffii* Ménér.

Leucophasia sinapis L.

— *amurensis* Ménér.

Pieris crataegi L.

— *daplidici* L.

— *napi* L.

— *melete* Ménér.

Anthocharis cardaminis L.

Gonopteryx rhamni L.

— *Aspasia* Ménér.

Colias palaeno L.

Argynnis Paulina Nordm.

— *Sagana* Doubld.

— *paphia* L.

— *adippe* L.

— *laodice* Pall.

— *daphne* F.

— *ino* Rott. Esp.