

НОВЫЙ ПОДВИД ЧЕРНОЗОБИКА — *CALIDRIS ALPINA*  
*LITORALIS* SSP. N. (AVES, CHARADRIIDAE) С САХАЛИНА

В. А. НЕЧАЕВ, П. С. ТОМКОВИЧ

Гнездование чернозобика *Calidris alpina* (L.) на северо-востоке Сахалина доказано только недавно (Нечаев, 1979, 1983). В ходе изучения изменчивости чернозобиков Дальнего Востока (Томкович, 1986) установлен более сложный, чем предполагалось ранее, подвидовой состав в регионе и отмечено своеобразие единственного имевшегося в коллекциях гнездового экземпляра чернозобика с Сахалина. Кроме того, со значительной долей вероятности показано, что типовой экземпляр, носящий имя *C. a. sakhalina* Vieill., 1816, добыт на пролете на юге Сахалина (вне современной области гнездования вида) и принадлежит, скорее всего, не сахалинской гнездовой популяции, а одной из более северных рас. Морфологические характеристики местных сахалинских чернозобиков, приводимые ниже, подтверждают правильность последнего мнения. Коллекционные и биологические материалы, собранные В. А. Нечаевым, позволяют описать новый подвид чернозобика с Сахалина и провести его сравнение с другими подвидами из Восточной Азии.

*Calidris alpina litoralis* Nechaev et Tomkovich, ssp. n.

Материал. Голотип — взрослый самец, добыт на побережье залива Чайво, Сахалин, 4.VII 1985 (Нечаев). Экземпляр № R-107523 в Зоологическом музее МГУ. Размеры (мм): длина клюва — 28,8; длина цевки — 22,6; длина крыла — 104,5. Выполнял отвлекающие демонстрации возле выводка. Паратипы: 3 взрослых самца с той же этикеткой, добыты 4.VII (№ R-107524 в Зоомузее МГУ), 6.VII (№ 168292/246-985 в ЗИН АН СССР, Ленинград) и 18.VII 1985 (хранится в музее Биолого-почвенного института ДВНЦ АН СССР, Владивосток). Взрослый самец с о-ва Лярво, залив Даги, Сахалин, 23.VII 1984 (Нечаев). Экземпляр № R-106030 в Зоомузее МГУ.

Описание. Пять июльских взрослых самцов с северо-восточного Сахалина, судя по поведению, добытые от выводков, имели следующие размеры (мм): длина клюва (до границы оперения лба) 28,4—31,3, в среднем —  $29,2 \pm 1,2$  ( $\bar{x} \pm \sigma$ ); длина цевки 22,6—24,7, в среднем  $23,9 \pm 0,8$ ; длина крыла (хорда прижатого к линейке крыла) 104,5—111, в среднем —  $107,6 \pm 2,6$ . При сравнении с аналогичными характеристиками самцов трех подвигов чернозобика Восточной Азии и двух подвигов Аляски (Томкович, 1986) становится ясно, что сахалинские местные птицы наиболее мелки.

Сравнение по критерию Стьюдента с самцами *C. a. centralis* But. из Якутии показывает, что птицы описываемой выборки достоверно мельче якутских по всем указанным характеристикам (соответственно  $t=4,28$ ,  $df=28$ ,  $p<0,001$ ;  $t=3,19$ ,  $df=24$ ,  $p<0,01$ ;  $t=4,36$ ,  $df=21$ ,  $p<0,001$ ). Размеры крупных камчатских *C. a. kistchinski* Tomkovich почти не перекрываются с размерами сахалинских птиц (слабо перекрывается только длина цевки). Вес трех типовых сахалинских самцов чернозобиков, собранных 4 и 6.VII 1985, равен 35,5, 36,0 и 40,2 г, что опять-таки существенно меньше веса июльских самцов *C. a. centralis* (41,6—48,1, в среднем —  $44,2 \pm 2,2$  г;  $n=7$ ), чукотских *C. a. sakhalina* (42,0—55,0, в среднем —  $48,6 \pm 3,0$  г;  $n=28$ ) и *C. a. kistchinski* (43,7—46,8, в среднем —  $45,8 \pm 1,8$  г;  $n=3$ ).

Три самца в начале июля имели еще слабо обношенное контурное оперение тела, что позволило установить сходство окраски спинной стороны этих птиц и *C. a. centralis*, а также *C. a. kistchinski*. Перья темени образуют отчетливо окопунктированную шапочку почти черного цвета, в отличие от *C. a. kistchinski*, у которых более широкие рыжевато-коричневые краевые поля опахал перьев создают общий более коричневый цвет темени. Сходно с *C. a. centralis* и *C. a. sakhalina* у большинства сахалинских чернозобиков (у 4 из 5 экз.) основной фон затылка и верхней части шеи осветлен до светлосерого цвета, что создает контраст с темным цветом темени, тогда как среди *C. a. kistchinski* таких птиц мало (4 из 16 экз. в Зоомузее МГУ), а остальные имеют различную только в тональностях одинаковую общую окраску верха.

Черное пятно брюха в среднем более обширно и с меньшим числом вкрапленных белых перьев по сравнению с *C. a. kistchinski*, но сходно с *C. a. centralis* и *C. a. sakhalina*. Белая поперечная полоса на груди перед черным брюшным пятном, характерная для многих особей Дальнего Востока и Аляски, но отсутствующая у *C. a. centralis*, выражена у 3 из 5 экз. рассматриваемой серии. У всех экземпляров подхвостье белое без пестрин (только у одного есть темный наствольный штрих на подхвостье), в отличие от остальных подвигов, у которых все (*C. a. centralis*) или большинство особей (*C. a. sakhalina*, *C. a. kistchinski*) имеют на подхвостье отчетливые темные пестрины.

Для чернозобиков Дальнего Востока и Аляски характерным признаком считается значительное развитие белого цвета на открытых частях внешних опахал внутренних первостепенных маховых, так что белый цвет доходит до стержней перьев и сливается в маленькое белое «зеркальце». Такое «зеркальце» есть только у одного из пяти сахалинских чернозобиков; еще у 1 экз. такое «зеркальце» хорошо выражено, но белый

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

---

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ

Том LXVI

(ОТДЕЛЬНЫЙ ОТТИСК)

стр. 1110-1113

7

---

МОСКВА · 1987

# ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Том LXVII, вып. 10, 1988, с.1596.

УДК 598.333.2 : 592/599 : 001.4

## НОВОЕ НАЗВАНИЕ САХАЛИНСКОГО ЧЕРНОЗОБИКА (AVES, CHARADRIIDAE)

В. А. НЕЧАЕВ, П. С. ТОМКОВИЧ

Недавно нами описан новый подвид чернозобика с о-ва Сахалин, получивший название *Calidris alpina littoralis* (Нечаев, Томкович, 1987). Однако Л. С. Степанян любезно указал нам на то, что это название преокупировано и поэтому не может использоваться. Действительно, удалось выяснить, что вид *Tringa maritima* Brunnich, 1764, переведенный в род *Calidris* (Cuvier, 1829), имеет синоним *Tringa littoralis* Brehm, 1831. Т. е. имя *littoralis* относится к видовой группе рода *Calidris* (статья 46a International code..., 1985). В таком случае использованное нами для сахалинского чернозобика название *littoralis*, относящееся к той же видовой группе названий, является младшим вторичным гомонимом и поэтому недействительно (статья 57). На этом основании, согласно статье 60, это название должно быть заменено при отсутствии синонимов новым названием. Взамен прежнего названия предлагается новое — *Calidris alpina actites* Nechaev et Tomkovich nomen novum (от греч. *actites* — прибрежный).

## ЛИТЕРАТУРА

Нечаев В. А., Томкович П. С., 1987. Новый подвид чернозобика — *Calidris alpina littoralis* ssp. n. (Aves, Charadriidae) с Сахалина // Зоол. ж., 66, 7, 1110—1113.  
International code of zoological nomenclature, 1985. Huddersfield, England, 1—338.

Биолого-почвенный институт  
ДВО АН СССР (Владивосток);  
Зоологический музей МГУ

Поступила в редакцию  
22 февраля 1988 г.

## A NEW NAME FOR SAKHALIN DUNLIN (AVES, CHARADRIIDAE)

V. A. NECHAEV, P. S. TOMKOVITCH

Institute of Biology and Pedology, Far East Science Center,  
USSR Academy of Sciences (Vladivostok);  
Zoological Museum, Moscow State University

## Summary

The earlier suggested name for Sakhalin dunlin *Calidris alpina littoralis* Nechaev et Tomkovich, 1987, turned out to be preoccupied. It has been replaced by a new one *Calidris alpina actites* nom. n.