

Дорогому Владимиру Георгиевичу
Фейтшину на память
от автора

ЗООЛОГИЯ

С. И. ОГНЕВ

ОБЗОР НЕКОТОРЫХ ТУШКАНЧИКОВ РУССКОЙ ФАУНЫ
(GLIRES, DIPODIDAE)

(Представлено академиком Л. А. Орбелем 9 I 1946)

Подготавливая монографическую обработку тушканчиков (*Dipodidae*), я заново пересмотрел большие коллекционные материалы и пришел к новым выводам относительно некоторых систематических группировок. В частности, пришлось сильно изменить и исправить систему подвидов *Alactaga sibirica* Forster сравнительно с предложенной в монографии Б. С. Виноградова (1).

В настоящее время в русской фауне я отмечаю следующие подвиды *Alactaga sibirica*.

1. *A. s. sibirica* Forster (1760) *Dipus Jaculus* var. *mangolica* Radde (1861).

Наиболее интенсивно окрашенная и крупная форма.

2. Распространение охватывает южное Забайкалье, от Троицкосавска, Кахты, Борзи на восток к оз. Далай-Нору, Баргу, Маньчжурию. Вероятно, что к этому подвиду принадлежат экземпляры из окрестностей оз. Буир-Нора и р. Халха-Ингола. Повидимому, с номинальным подвидом идентичен *Alactaga sibirica longior* Miller (1911) из Гань-Су. К номинальной расе близок *A. s. annulata* Milne-Edw. (1868—1874) из окрестностей Бейпина.

2. *Alactaga sibirica saltator* Eversm. (1848).

Мелкая раса, окраска меха спины бледная серовато-палевая.

Распространен в Чуйской степи, в Кобдо и на Гобийском Алтае.

3. *Alactaga sibirica suschkini* Satun. (1900).

Довольно интенсивно окрашенная раса, близкая к номинальному подвиду.

Водится в южных частях бывших Тургайской, Акмолинской, и Семипалатинской обл., на север до 50° с. ш. Южная граница распространения проходит в Казахстане около 45° с. ш.

4. *Alactaga sibirica ruckbeili* Thomas (1914).

Крупная, наиболее светло окрашенная форма.

От Усть-Урта, Приаралья и Прибалхашья до Джаркента. Особняком стоит находка в Закаспии близ Арман-сагыза.

Alactaga sibirica altorum subsp. n.

Аксакий тушканчик — 1936. *Alactaga saltator* subsp. Шнитников (2), стр. 243.

Место, откуда описан тип, где хранится тип: № М II 2911 ♂ ad., 8 VIII 1944 г. Центральный Тянь-Шань, долина р. Арпа, урочище Семи-Саз, 3500 м. С. М. Чельцов. Тип в коллекции С. И. Огнева.

Количество просмотренного материала: 6 шкурок с черепами.

Диагноз. По общему тону окраски спинного меха близок к *Alactaga sibirica saltator* Everism., но заметно крупнее (уши и хвост длиннее). Расцветка меха спины сероватого тона с палевой примесью (light drab и drab, Ridgway. 1912. pl. XLVI, с большей или меньшей примесью avellaneous и wood brown, pl. XI).

На общем светлом фоне спины отмечается ясная более темная черновато-серая волнистость вследствие наличия черно-сероватых окончаний у многих остевых волос. Цвет меха верха головы бледно-сероватый (pale drab grey, pl. XLVI) с легким мелким черно-сероватым узором. На боках тела виден очень бледный палево-желтоватый тон (pale pinkish buff, pl. XXIX), слегка затемненный сероватым струйчатым узором. Расцветка боков книзу постепенно бледнеет и переходит в белый тон брюшной области. В задней части бедер по направлению к корню хвоста дифференцируется с каждой стороны по относительно небольшому белесому пятну. Бедра с наружно-серым мехом. Хвост на верхней части своего стержня одет очень коротким бледным палево-серым мехом (по тону средним между pale drab gray, pl. XLVI и pinkish buff, pl. XXIX).

Перед черный или черно-бурый, дорзальной концевой зоной хвостового знамени (длина этой зоны, при измерении по дорзальной части, колеблется от 42 до 52 мм.) дифференцируется слабо заметный белесый перешеек, шириной в 18—28 мм. Белая концевая часть знамени достигает 24—28 мм в длину.

Длина тела 150—180 мм; длина хвоста (без концевых волос) 240—220; длина задней ступни (без когтей) 61—74; длина уха 41—48 мм (обыкновенно более 44). Вес 107 г и более.

Общая длина черепа 36,1—38,3 мм, кондило-базальная длина черепа 34,5—37,3 (обычно более 35); ширина скул 24,7—26,6; длина носовых костей 15—16,5, длина верхнего ряда коренных зубов 7,1—7,9 мм (обычно более 7,5).

Сравнительные измерения *Alactaga sibirica saltator*: длина тела 130—145 мм; длина хвоста (без концевых волос) 172—205 (обычно около 182), длина задней ступни (без когтей) 60—72; длина уха 36—44 (обычно около 40). Общая длина черепа 33—36,2 (обычно около 35); кондило-базальная длина черепа 32,3—35,2 (обычно около 34); ширина скул 22,6—25,1 (обычно около 24); длина носовых костей 13,1—14,8; длина верхнего ряда коренных зубов 6,4—7,2 мм.

Систематические заметки

По сероватому тону окраски спинного меха этот тушканчик, при изучении серий, несомненно ближе всего подходит к подвиду, водившемуся в Чуйской нагорной степи. Однако от *Alactaga sibirica saltator* Everism. новый подвид легко отличается большими размерами тела (длиной хвоста, ушей), а также более крупным черепом (ср. данные диагноза).

Помимо всего, необходимо отметить, что мех этого подвида длиннее, чем у смежных форм, что, видимо, стоит в связи с его обитанием в высокогорье.

Географическое распространение

Впервые для высоких гор Ак-сая (в Центральном Тянь-Шане) этот тушканчик был отмечен В. Н. Шнитниковым⁽²⁾, обратившим внимание на необычность стационарных условий этой формы. Шнитников высказал предположение, что это, может быть, новый подвид, но тогда не было достаточного фактического материала (был добыт