

НОВЫЙ ВИДЪ СЛАВКИ ИЗЪ ЗАКАВКАЗЬЯ.

Sylvia caucasica sp. nov.

C. 237-246.

С. П. Огневъ и В. Б. Баньковского.

[Ognev (Ognev), S. J. et Bańkowski (Bańkovskij), V. B. Espèce nouvelle des Sylviens. *Sylvia caucasica* sp. nov.]

[Представлено 27 октября 1909 г.]

Просматривая большую коллекцію закавказскихъ птицъ, собранныхъ въ теченіе послѣднихъ трехъ лѣтъ В. Б. Баньковскимъ въ окрестностяхъ г. Тифлиса и Мцхета, я вмѣстѣ съ В. Б. Баньковскимъ, заинтересовался довольно большой (въ 14 экземпляровъ) серіей славокъ, уже на первый взглядъ отличавшихся отъ типичныхъ *Sylvia curruca curruca* L. Благодаря обычной любезности П. П. Сушкина я имѣлъ возможность просмотрѣть его многочисленную коллекцію славокъ изъ разныхъ мѣстъ Европейской и Азіатской Россіи. Проглядѣвши затѣмъ богатые сюиты разныхъ *Sylvia*, хранящихся въ Зоологическомъ Музеѣ Императорской Академіи Наукъ, которыя были любезно предоставлены мнѣ для изученія академикомъ Н. В. Насоновымъ и В. Л. БIANКИ, я убѣдился, наконецъ, что имѣю дѣло съ еще неописанной формой славки, формой стоящей ближе всего къ *Sylvia althea* Нуме, но отличающейся отъ послѣдней суммой довольно рѣзкихъ и постоянныхъ признаковъ.

С. Огневъ.

	№ 1. ♂ 30. V. 08. Мухеть.	№ 2. ♂ 6. IV. 08. Мухеть.	№ 3. ♂ 18. VI. 08. Мухеть.	№ 4. ♂ 18. VI. 08. Мухеть.	№ 5. ♂ 18. VII. 08. ♂ sub. Мухеть.	№ 6. ♀ 13. VII. 08. Мухеть.	№ 7. ♀ 15. VII. 08. Мухеть.	№ 8. sub. 18. VII. 08. Мухеть.	№ 9. 18. VII. 08. Мухеть.	№ 10. 18. VII. 08. Мухеть.	№ 11. 18. VII. 08. Мухеть.	№ 12. ♀ 9. VI. 08. Мухеть.	№ 13. sub. 9. VI. 08. Мухеть.	№ 14. ♂ 1. VII. 09. Мухеть.
Длина крыла	65,3	65	64	62	63	62	62	63	60	60,8	62	61,5	61	60,2
Culmen	12,3	13,2	12,8	13	13	13	12,5	13	12	12,3	12	13	9,8	13
Клювъ отъ разрѣза рта до конца верхн. челюсти ..	14,2	14	14	15	14	14	13	14	13	14	13,5	12,5	11,5	12,8
Отъ конца ноздри до конца верхн. челюсти	7	7	7	7	7	7	6,8	6,2	6,7	7	7	7	4,9	7
Длина хвоста	59	61	58	58	59	56,3	57	59	58	58	58	53	def.	55,4

Приводимъ далѣе размѣры *Sylvia althea* Нуме.

	№ 10252. ♂. 30. V. 78. Урлюке-Тау. Туркестанъ. Руссовъ.	№ 10255. Ингушъ-Бухара. 28. VI. 85. ♂. Грумъ-Гржимайло.	№ 340. Исхандеръ-Куль. ♂. 20. VI. 92. Глазунъ.	№ 6175. Ферганская область. ♂. 5. VI. Сибирцовъ.	№ 2564. ♂. subadlt. Кара-Дюке. Зарудный.	№ 10251. Кипушъ. ♂. Туркестанъ. 8. VII. 78. Руссовъ.	№ 10254. ♀. 7. VI. 95. Карнакъ. Бухара. Грумъ-Гржимайло.	№ 6174. Р. Уганъ, западный Тянь-Шань. Сиверцовъ.	№ 6176. ♀. Вѣрный. 4. V. Сиверц.	№ 10256. Бальджуанъ. Бухара. 30. V. 85. Грумъ-Гржимайло.	№ 298. Аргунинъ. 9. VI. 92. ♀. Глазунъ.	♂. Конетъ-Даръ восточн. 22. VIII. 89. Зарудный.	№ 10253. Исхандеръ-Куль. 18. VII. 78. ♂. Руссовъ.	№ 10640. Али-Галабонъ Кара-тиганъ. 6. VII. 87. Дидский.	Туркестанъ. 25. V. ♀. Федченко.	Ibid. 21. V. ♂. Федченко.	Памиръ. ♂. Боговяленокій.
Длина крыла	68	68,6	66	66,2	66,5	68,5	def.	69,8	66,5	65,2	66,5	67,5	67	68,5	67	66	69
Culmen	13,1	14,9	13,5	13,9	13	15	15	13,8	14	13,5	14,2	14	14,5	14	13,5	14,5	14
Клювъ отъ разрѣза рта до конца верхн. чел.	15,6	15,5	15,2	15,3	14	16	15	15,2	16,2	15,2	15	15	16,2	16	16	16	15,2
Отъ конца ноздри до конца верхн. чел.	7	8,2	7,8	7,5	7	8	8	8	7,5	7,5	8,5	8	8	8	7,5	7,8	8
Длина хвоста	58,6	63	57	58,6	57	57	64	60,5	58	58	61	63	58,5	58	59,5	58	59

Экземпляры изъ коллекцій Зоол. Музея Имп. Академіи Наукъ.

Изъ колл. Зоол. Муз. Моск. Унив.

Сопоставляя maximum и minimum разныхъ измѣреній *Sylvia caucasica* sp. nov. и *Sylvia althea* Нуме, получаемъ:

Sylvia caucasica sp. nov.

Длина крыла: 60—65,3 (два изъ 14 экз.; чаще всего 60—62).
Culmen: 12—13,2.

Отъ разрѣза рта до конца верхней челюсти: 12,5—15 (чаще всего 13).

Отъ конца ноздри до конца верхн. челюсти: 6,7—7 (чаще всего 7).

Хвостъ: 53—61.

Sylvia althea Нуме.

Длина крыла: 65,2 (одинъ изъ 17 экз.) — 69,8.

Culmen: 13—15.

Отъ разрѣза рта до конца верхней челюсти: 14—16,2.

Отъ конца ноздри до конца верхней челюсти: 7—8,5 (чаще всего 8).

Хвостъ: 57—64.

Итакъ, по своимъ размѣрамъ *Sylvia althea* Нуме несомнѣнно крупнѣе, чѣмъ *Sylvia caucasica* sp. nov. Надо замѣтить, что клювъ *Sylvia althea* Нуме въ большинствѣ случаевъ шире у своего основанія, чѣмъ у славки изъ Закавказья, кромѣ того, у послѣдней онъ съ боковъ сжатъ значительно сильнѣе, чѣмъ у алтайской формы. Послѣдній признакъ не всегда постояненъ и рельефно выступаетъ лишь на сюитахъ этихъ птичекъ.

Что касается до крыловой формулы *Sylvia caucasica* sp. nov., то она довольно постоянна и хорошо отличается отъ *Sylvia althea* Нуме. Именно, изъ 14 экземпляровъ *Sylvia caucasica* sp. nov. (у двухъ ее вычислить было нельзя) у 8 экземпляровъ крыловая формула была такова $2 > 6 < 5$, только 2 экземпляра (№ 9 и № 10) имѣли формулу $2 = 6 > 7 < 5$ и, наконецъ, только одинъ (№ 11) $2 < 6 > 7$. У *Sylvia althea* Нуме крыловая формула въ преобладающемъ числѣ такова $2 < 6 > 7$ или, что встрѣчается часто, $2 = 7 < 6$ и, наконецъ, рѣже $2 < 7 > 8$. Такимъ образомъ, по крыловой формулѣ *Sylvia caucasica* sp. nov. приближается къ *Sylvia curruca curruca* L. Резюмируя все сказанное, мы видимъ, что *Sylvia caucasica* sp. nov. похожа въ общемъ на *Sylvia althea* Нуме, но отличается отъ нея болѣе темной окраской во всѣхъ

СТАТЬИ.— MÉMOIRES.

ЕЖЕГОДНИКЪ ^{ОГНЕВЪ.}
ЗООЛОГИЧЕСКАГО МУЗЕЯ

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.

ТОМЪ XV.
1910.

Съ 10 таблицами, 3 картами и 92 рис. въ текстѣ.

Издание Императорской Академіи Наукъ.

ANNUAIRE
DU
MUSÉE ZOOLOGIQUE
DE
L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES
DE ST.-PÉTERSBOURG.

TOME XV.
1910.

Avec 10 planches, 3 cartes et 92 figures dans le texte.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. — ST.-PÉTERSBOURG.
ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.

Вас. Остр., 9 лнн., № 12.

Цена: 6 р.; Prix: 13 Mk. 35 Pf.