

## Уссурийская большеклювая ворона.


С. А. Бутурлинъ.

### *Corvus macrorhynchus mandshuricus* subsp. nov..

By С. А. Buturlin.

Энергичный изслѣдователь Уссурийскаго края штабсъ-капитанъ В. К. Арсеньевъ добылъ въ долину рѣки Самарги два экземпляра этой птицы: 21 ноября 1908 года самца и 16 ноября (ст. ст.)—безъ опредѣленія пола. По сравненію съ двумя имѣющимися у меня экземплярами японской расы—*C. m. japonicus* Вр., оказывается, что послѣдняя крупнѣе. Что результатъ этотъ не случайный, вслѣдствіе малочисленности экземпляровъ, доказывается тѣмъ, что размѣры моихъ японскихъ птицъ сходны съ даваемыми Зибомомъ въ его работѣ о птицахъ Японіи, и что и др. Хартертъ отмѣчаетъ сравнительно мелкій ростъ континентальныхъ птицъ. Различать эти двѣ расы проще всего такъ: у японской наибольшая глубина нижней челюсти больше 11 м.м., а наибольшая высота верхней челюсти (отъ средней линіи хребта до рѣжущаго края по прямой) противъ середины ноздрей—болѣе 19-ти м.м., а у *C. m. mandshuricus* эти измѣренія меньше указанной границы. Южно-азиатская *C. m. levaillanti* Less. еще гораздо мельче: послѣднее измѣреніе меньше 16 м.м.

*Corvus macrorhynchus mandshuricus* of Ussuri land has lighter bill, than *C. m. japonicus* Вр.: maximal depth of mandibula less than 11 millim., and heighth of maxilla opposite nostrils less than 19 millim..



## Новый подвидъ полевого воробья.

С. И. Огневъ.

### Eine neue geographische Form des Feldsperlings: *Passer montanus volgensis* subsp. nov..

S. I. Ognew.

Во время непродолжительной весенней поѣздки въ дельту Волги, организованной въ мартѣ 1912 года *Б. М. Житковымъ*, мнѣ удалось добыть небольшую серію полевыхъ воробьевъ, сразу обратившихъ на себя мое вниманіе особенностями окраски. При тщательномъ сличеніи съ большими серіями типичныхъ *Passer montanus montanus* Linn. быстро выяснился рядъ признаковъ, дифференцирующихъ воробья волжской дельты въ особый подвидъ. Отъ средне-русскаго полевого воробья *Passer montanus volgensis* subsp. nov. отличается общимъ болѣе сѣрымъ тономъ окраски всей верхней стороны. Этотъ оттѣнокъ особенно замѣтно сказывается на перьяхъ спины. Здѣсь каждое перо характеризуется широкимъ сѣроватымъ краевымъ ободкомъ, придающимъ всей спинной области замѣтный сѣроватый оттѣнокъ, рѣзко отличающійся отъ рыжеато-каштановыхъ краевъ спинныхъ перьевъ типичнаго *Passer m. montanus* Linn.. Далѣе, поясница и рулевья перья гораздо сѣрѣе, чѣмъ у обычнаго полевого воробья. Наконецъ, характернымъ цвѣтовымъ признакомъ является окраска шапочки. У всѣхъ добытыхъ мною экземпляровъ новаго подвида она удивительно однообразна и отличается темнымъ коричневымъ цвѣтомъ, съ очень рѣзко выраженнымъ сѣро-лиловатымъ оттѣнкомъ. Интересно отмѣтить, что по тону шапочки замѣчается наибольшее сходство съ цвѣтомъ ея у восточно-сибирскаго воробья, таксономическое значеніе котораго еще требуетъ дальнѣйшаго выясненія и котораго большинство

авторовъ считаетъ за *Passer montanus saturatus* Stejn.. Помимо чисто цвѣтовыхъ признаковъ, воробей волжскихъ низовій легко отличается отъ типичнаго своими меньшими размѣрами. Такъ, клювъ новаго подвида замѣтно короче, чѣмъ у *Passer montanus montanus* Linn.; то же надо сказать и про длину крыла, хвоста и плюсны.

Остается выяснитъ взаимоотношенія волжскаго воробья и *Passer montanus transcaucasicus* Buturl. <sup>1)</sup> По С. А. Бутурлину, послѣдній подвидъ отличается отъ типичныхъ замѣтно болѣе бѣловатымъ брюхомъ, а также нѣсколько болѣе свѣтлымъ оттѣнкомъ верхней стороны. Отъ туркестанскаго *Passer montanus dilutus* Richm. закавказскія птицы дифференцируются своей сѣрватою, а не желтоватою поясницей и сѣрватымъ, а не охристымъ налетомъ боковъ. Кромѣ того, закавказскій воробей меньше типичнаго.

Благодаря любезности С. А. Бутурлина, приславшаго мнѣ всѣхъ воробьевъ своей коллекціи, среди которыхъ было нѣсколько *Passer montanus transcaucasicus* But., я могъ сравнить этотъ подвидъ съ вновь найденнымъ мною. Тщательный просмотръ серіи показалъ мнѣ, что *Passer montanus volgensis subsp. nov.* по окраскѣ отличается отъ закавказскаго воробья еще болѣе замѣтно, чѣмъ отъ типичнаго. Это сразу отнимаетъ возможность считать новый подвидъ переходной формой.

Итакъ, волжскій воробей отличается отъ *P. m. transcaucasicus* But. отсутствіемъ желтовато-глинистаго оттѣнка спины, который характеренъ для послѣдняго подвида. Далѣе, основанія перьевъ спины, помимо черной полосы, проходящей по конечной части одного изъ опахалъ каждаго пера, у закавказскаго воробья глинисто-буроватая съ желтоватымъ оттѣнкомъ. Совершенно иной видъ имѣютъ они у волжскаго воробья, отличаясь своимъ тусклымъ сѣрвато-каштановымъ цвѣтомъ. Поясница *Passer montanus volgensis subsp. nov.* замѣтно сѣрѣе, чѣмъ у закавказскаго подвида, а шапочка много темнѣе и очень рѣзко отличается своимъ лиловато-сѣрымъ оттѣнкомъ, тогда какъ у послѣдняго она даже свѣтлѣе, чѣмъ у типичнаго. Что касается до болѣе бѣловатаго брюха *Passer montanus transcaucasicus* But., признака, которому С. А. Бутурлинъ придаетъ особое значеніе, то дѣйствительно это отличіе можетъ быть констатировано на серіи и является общимъ съ моимъ новымъ подвидомъ. Спѣшу отмѣтить

<sup>1)</sup> „The Ibis“, 1906, p. 423.

только, что къ этому признаку надо относиться довольно осторожно. Дѣло въ томъ, что болѣе свѣтлая брюшная сторона птицы легко пачкается и дѣлается поэтому темнѣе своей дѣйствительной окраски. По размѣрамъ волжскій воробей стоитъ ближе къ закавказскому, чѣмъ къ типичному. Въ короткихъ словахъ діагнозъ *Passer montanus volgensis subsp. nov.* можетъ быть резюмированъ слѣдующимъ образомъ. *Этотъ подвидъ отличается: своимъ тусклымъ сѣрымъ тономъ спины, съ сѣрвокаштановыми основаніями перьевъ этой области; сѣрой поясницей и рулевыми перьями; очень темной буро-лиловато-сѣрой шапочкой и мелкими общими размѣрами.* Серія въ пять экземпляровъ этого подвида была добыта мною 21, 22 и 26 марта 1912 года въ поросляхъ камышей на островахъ по берегамъ Никиткинаго банка (пролива), въ западной части волжской дельты, въ 7 верстахъ отъ взморья. Въ этотъ періодъ воробьи, вѣроятно, уже гнѣздились въ камышахъ и своими звонкими криками, показавшимися мнѣ болѣе громкими, чѣмъ щебетанье обычнаго *Passer montanus* Linn., сразу обращали на себя вниманіе.

Изъ литературныхъ свѣдѣній имѣется послѣднее новое указаніе на распространеніе полевого воробья по волжской дельтѣ въ работѣ В. Н. Бостанжогло <sup>1)</sup>, который считалъ его обычнымъ *Passer montanus* Linn.. Эта неожиданная находка новаго подвида въ мѣстности, которая уже видѣла много изслѣдователей, невольно заставила меня обратиться къ просмотру серіи воробьевъ, любезно присланныхъ мнѣ С. А. Бутурлинымъ и Г. Э. Юганzenомъ, а также воробьевъ, имѣющихся въ большомъ количествѣ у Г. П. Полякова. Отъ послѣдняго я получилъ не только любезное разрѣшеніе воспользоваться экземплярами его коллекціи, но и нѣсколько цѣнныхъ указаній относительно описываемаго мною подвида и потому считаю долгомъ выразить ему здѣсь особую благодарность. Это болѣе детальное знакомство съ разными представителями полевыхъ воробьевъ ясно показало наклонность къ большой измѣнчивости этой птицы, яркую дифференцировку ея на хорошо выраженные подвиды, связанные переходными формами. Своимъ результатамъ этого просмотра я думаю посвятить особую статью.

Въ заключеніе привожу измѣренія *Passer montanus volgensis subsp. nov.* параллельно съ таковыми близкихъ къ нему формъ.

<sup>1)</sup> В. Н. Бостанжогло: „Орнитологическая фауна Арало-Каспійскихъ степей“. („Матеріалы къ познанію фауны и флоры Россійской имперіи“, отд. зоолог., вып. XI, 1911.), стр. 236—237.

	Длина крыла.	Длина хвоста.	Длина плюсны.	Сидител.	Длина клюва: отъ передняго края ноздри до конца верхней челюсти.	Длина клюва: отъ разрыва рта до конца верхней челюсти.
	т.т.	т.т.	т.т.	т.т.	т.т.	т.т.
<b>Passer montanus volgensis</b> subsp. nov..						
1. ♂; 22. III. 1912; заросли камыша по берегамъ Никиткина банка, западная часть дельты Волги.	70	57	16,1	12,2	8,8	12,1
2. ♀; 22. III. 1912; ibidem . . . . .	67,4	59,4	17,6	12	8,7	11,4
3. ♀; 26. III. 1912; ibidem . . . . .	67,3	58,5	16,3	12,2	8,7	12
4. ♂; 21. III. 1912; ibidem . . . . .	69,3	59	16,6	12,8	9,1	11,7
5. ♂; 26. III. 1912; ibidem . . . . .	70,9	57,2	16	12,4	8,4	11,6
<b>Passer montanus transcaucasicus</b> But..						
1. ♂; 14. III. 1882; Тифлисъ; г. Г. Раде (коллекція Зоологическаго Музея Московскаго Университета) . . . . .	69,4	63,2	16,7	12,3	8,3	11,5
2. ♂; 9. VII. 1904; Тифлисская губернія, Горійскій уездъ; А. Кобылинъ (t u r u s, коллекція С. А. Бутурлина) . . . . .	70,2	57,3	16,9	13,7	9,5	13,6
3. ♀; 18. III. 1905; Ахалцыхскій уездъ, окрестности Ахалцыха, Тифлисская губернія; А. Кобылинъ (коллекція С. А. Бутурлина) . . . . .	66	62,7	15,5	12	9,2	12,3
4. ♀; 18. III. 1905; ibidem . . . . .	66,5	59	16,3	11,7	8,9	11
5. ♀; 1. XII. 1904; Ахалцыхъ, долина р. Посковъ-Чай; А. Кобылинъ (коллекція С. А. Бутурлина) . . . . .	68,2	59,2	14,9	11,7	8,4	11,2
6. ♀; 15. V. 1907; Кубанская область (коллекція В. Б. Баньковскаго) . . . . .	65,3	56	15,6	12,5	9	11,5

	Длина крыла.	Длина хвоста.	Длина плюсны.	Сидител.	Длина клюва: отъ передняго края ноздри до конца верхней челюсти.	Длина клюва: отъ разрыва рта до конца верхней челюсти.
	т.т.	т.т.	т.т.	т.т.	т.т.	т.т.
<b>Passer montanus montanus</b> Linn..						
1. ♀; 12 января; Московская губернія; О. К. Лоренцъ (коллекція Зоологическаго Музея Московскаго Университета) . . . . .	70	62,4	17,8	13,4	9,7	13,5
2. ♀; январь; Воробьевы горы, близъ Москвы; К. А. Сагунинъ (ibid.) . . . . .	70	59,2	16,2	13,5	9,3	12,5
3. ♀; 21 января; Московскій уездъ; О. К. Лоренцъ (ibidem) . . . . .	71,6	60	18,5	13,8	9,8	12,4
4. ♂; 3. II. 1887; Москва; О. К. Лоренцъ (ibidem) . . . . .	73,4	62,5	19,8	13,5	9,6	12,5



5392

В. В. Е.

1913 г. Четвертый год издания.—Quatrième année. № 1.

### Отъ Редакціи.

1) Редакція не принимаетъ на себя ответственности за своевре-  
менную доставку журнала, если подписчикъ не былъ адресованъ непо-  
средственно къ ней или

2) При сообщеніи адреса подписчика въ разное время объ-  
яснить или отчество, или имя, а также губернно, уездъ и волостное  
почтовое учрежденіе. Редакція не отвѣчаетъ за аккуратную доставку  
журнала по адресамъ желѣзнодорожныхъ станцій, при которыхъ имѣ-  
ются почтовые отдѣленія. Жалобы о неполученіи журнала удовлетворяютъ  
Редакція только въ тѣхъ случаяхъ, если таковая посылка отъ  
подписчиковъ не позже получения ими слѣдующаго номера. Въ при-  
ложеніи удостоверяющаго Белой почтовой конторой.

3) При заведеніи о мелованной бумаге и о переносѣ адреса  
просьба писать въ печатанъ адресѣ, по которому въ слѣдующемъ номерѣ  
въ журналѣ будутъ сообщены. Въ № 1 при заведеніи о переносѣ  
адреса сълужитъ прилагать 25 коп. почтовыми марками.

4) Письма, обращенныя или менно въ Редакцію съ вопросами  
или полученія отвѣта проситъ прилагать почтовую марку. На вопросы  
повышеннаго общаго интереса отвѣты помѣщаются на страницахъ журнала.

5) Напечатаннымъ читателемъ рукописи журнала не выставляются.

6) Рукописи, посылаемыя въ Редакцію должны быть четко напи-  
саны, обязательно за полною подписью автора и съ указаніемъ его  
точного адреса. При этомъ авторамъ проситъ писать на одной сто-  
ронѣ листа и оставлять поля. Желательно, чтобы статьи снабжались  
авторами, кромѣ русскихъ названій, названіями на какомъ либо западно-  
европейскомъ языкѣ, а также, чтобы научныя наименованія птицъ въ  
рубрикахъ были подчеркнуты авторами одной разѣ. За посылку руко-  
писей на научныя отдѣленія отвѣтственность несетъ на авторахъ.

7) Исправленія рукописей поавляются за счетъ авторовъ. Не  
исправленныя рукописи не возвращаются обратно.

8) При издѣніи рукописей въ журналѣ авторамъ предлагается имѣть  
въ виду слѣдующее:

# MESSAGER ORNITHOLOGIQUE. Орнитологическій Вѣстникъ.

## ORNITHOLOGISCHE MITTHEILUNGEN.

Выходить четыре раза въ  
годъ: два №№ до и два—  
послѣ лѣтнихъ вакацій.

Подписная цѣна за 1 г.—  
4 руб., за 1/2 года—2 руб. и  
отдѣльные №№ по 1 руб. съ  
пересылкой въ Россіи и за  
границу.

Объявленія помѣщаются  
на слѣдующихъ условіяхъ:  
первый разъ за 1 страницу—  
8 р., за 1/2 страницы—4 р.,  
за 1/4 страницы—2 р. и т. д.,  
остальные разы съ половин-  
ною платою.

Всѣ заявленія, вопросы,  
справки, статьи и проч. про-  
сятъ адресовать на имя  
редактора Г. И. Полякова,  
Почтов. отд. «Обираловка»,  
Московск. губ., имѣніе «Сави-  
вино». Телефонъ № 7—51.

Paraissant quatre fois par  
an: deux №№—après le Nou-  
vel an et deux №№—après  
les vacances d'été.

Prix d'abonnement pour la  
Russie et pour l'étranger (Uni-  
on Postale Universelle) l'an-  
née Rbl. 4, la demi-année Rbl.  
2, le numéro Rbl. 1.

Tarif pour les annonces: la  
première fois 1 page Rbl. 8,  
1/2 page Rbl. 4, 1/4 page Rbl.  
2, etc., les fois suivantes à  
moitié prix.

Tous les envois (franco)  
pour le «Messager Ornitholo-  
gique» doivent être adressés  
au Rédacteur G. I. Poliakov,  
Russie, Chemin de fer Mos-  
cou—Nijninowgorod. Station  
«Obiralovka», propriété «Savi-  
vino».

Erscheint jährlich vier Mal:  
zwei №№—nach Neujahr und  
zwei №№—nach den Sommer-  
ferien.

Preise für Russland (mit  
Zustellung) und für das Aus-  
land (Weltpostverein) jähr-  
lich Rbl. 4, halbjährlich Rbl. 2  
Einzelnnummer à Rbl. 1.

Preise der Inserate: das erste  
Mal 1 Seite Rbl. 8, 1/2 Seite  
Rbl. 4, 1/4 Seite Rbl. 2 u. s.  
w., für die folgenden Male die  
Hälfte dieses Preises.

Alle Sendungen für die «Or-  
nithologischen Mitteilungen»  
sind, als solche bezeichnet an  
die Redaktion: G. I. Poljakow,  
Russland, Postabteilung. «Obi-  
ralowka», Moskauer Gouverne-  
ment, Gut. «Sawino», zu ad-  
ressieren.

### СОДЕРЖАНІЕ.

	Стр.
1. Предварительный перечень птицъ Тарскаго уѣзда, Тоболь- ской губерніи. <i>В. Е. Ушаковъ</i> . . . . .	3
2. О нѣкоторыхъ птицахъ Кѣлецкой губерніи. (Продолженіе). <i>Е. Я. Катинъ</i> . . . . .	17
3. Къ орнитофаунѣ Закаспійской области и сосѣднихъ съ нею частей Персіи. <i>Н. А. Зарудный</i> и <i>С. І. Билькевичъ</i> . . . . .	20
4. Новая форма тростниковой камышевки. <i>В. В. Станчинскій</i> . . . . .	34
5. Уссурійская большеклювая ворона <i>С. А. Бутурлинъ</i> . . . . .	40
6. Новый подвидъ полевого воробья. <i>С. И. Омегъ</i> . . . . .	41
7. Новыя формы ремезовъ ( <i>Remiza</i> ). <i>Н. А. Зарудный</i> . . . . .	46
8. Имена сѣрыхъ синицъ. <i>С. А. Бутурлинъ</i> . . . . .	51
9. Краткія сообщенія:	