

ФАУНА СССР

НАСЕКОМЫЕ ДВУКРЫЛЫЕ

Том VII, вып. 2

Н. Г. ОЛСУФЬЕВ

СЛЕПНИ

Семейство TABANIDAE



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Ленинград 1977

Рисунок варьирует: иногда желтая окраска появляется по бокам на III и последующих тергитах, выделяя две резких черных продольных полосы, начинающихся на II тергите; наиболее светлая окраска брюшка у экземпляров из Тувы. Иногда срединная желтая полоска, лежащая между черными продольными, слегка треугольно расширена кзади на каждом кольце. Снизу брюшко в основной части желтое, IV или III и последующие кольца черные. II стернит иногда с небольшим темным пятном посредине. VIII стернит шире длины, слегка угловатый по бокам, гонопофиз с незначительной апикальной выемкой; церки обычной формы. 7—11 мм.

♂. Лицевые мозоли б. м. крупные, блестяще-черные. Щечные мозоли хорошо развиты. Усики умеренной длины; 1-й и 2-й членики коричневые, 3-й черный. Щупальца черные, остроконечные, равны $\frac{3}{4}$ длины хоботка. Боковые стороны спинки и бочки груди в желтом налете и такого же цвета волосках. Крылья как у ♀; базальные ячейки затемнены почти целиком, за исключением небольшого прозрачного участка в вершинной части. Окраска ног как у ♀. Брюшко сверху желтое, с двумя черными продольными полосками посредине, простирающимися на II—IV тергиты. Эти полосы слиты вместе в передней части II тергита. III—IV тергиты по бокам, последующие тергиты целиком черные. Снизу брюшко в основной половине желтое, с небольшим темным пятном на II стерните, IV (или III) и последующие кольца черные. 8—9 мм.

Распространение: восточносибирско-дальневосточный лесной вид (рис. 59, 2). В СССР распространен от окр. Семипалатинска, Кемерова, Тогучина Новосибирской обл. и Томска на восток до Хабаровского и Приморского краев, к северу известен до Сев. Приангарья Красноярского края, Усть-Кута в Иркутской обл., Центральной Якутии и севера Амурской обл., к югу до Тувы, южного Забайкалья и Посета Приморского края. Сев. и Вост. Монголия, Сев.-Вост. Китай, Корейский п-ов, Япония. Местами обычен. Середина июня—июль, иногда позднее. Указание Ченфу и Ву (Chenfu a. Wu, 1940) на нахождение этого вида в Китае (о. Тайвань), видимо, ошибочно, так как он не упоминается для этого острова в известных монографиях Шираки (Shiraki, 1918) и Такахазы (Takahasi, 1962).

15b. *Chrysops* (s. str.) *suavis sakhalinensis* Pl.

Pleske, 1910b, Ann. Mus. Zool. St. Petersburg, 15, 4 : 472 (*Chrysops sakhalinensis*); Stackelberg, 1926b : 325.

Представляет собой меланистическую форму.

♀ отличается от номинативного подвида следующим: на II тергите брюшка черные полосы достигают его переднего края, сливаясь с черным пятном на I тергите; III и последующие тергиты по бокам черные; снизу брюшко черное начиная с III стернита, I и II стерниты обычно с черным срединным пятном; иногда средние голени целиком черные. 9—10 мм.

♂ также отличается от номинативной формы более темной окраской брюшка: на II тергите вместо двух черных полос имеется образованное их слиянием крупное срединное прямоугольное черное пятно с маленьким желтым треугольником по заднему краю, боковые стороны тергита желтые; III тергит черный с 3 небольшими желтыми продольными полосками — срединной и боковыми, IV и последующие тергиты черные, с едва намечающейся желтоватой срединной полоской; снизу брюшко черное, боковые стороны I—II стернитов желтые; средние голени темно-коричневые. 8.5 мм.

Распространение: о. Сахалин, о. Кунашир (рис. 59, 3). Обычен. Июнь—сентябрь.

Отмечаются переходные экземпляры к номинативной форме — у ♀ черные продольные полосы на II тергите немного не достигают его переднего края или на III тергите по бокам имеется по небольшому желтому пятну. С этими переходными экземплярами сходны экземпляры из Центральной Якутии.

1 ♀ с о. Кунашир от 1 IX 1953 (Н. А. Виолович) имеет резко отличающийся темный рисунок на II тергите брюшка: вместо двух продольных черных пятен имеется одно черно-коричневое поперечное полукруглое пятно по заднему краю тергита, III тергит целиком черно-коричневый, IV тергит черный, с едва заметной желтоватой полоской посредине. Строение головы, окраска крыльев, ног, низа брюшка и так далее, как у *Ch.* (s. str.) *suavis sakhalinensis*. Мы обозначаем эту уклоняющуюся форму как *Ch.* (s. str.) *suavis* var. *kunashiri* Ols., var. *nova*.

16. *Chysops* (s. str.) *ricardoae* Pl. — Пестряк Рикардо.

Изменчив. В СССР представлен тремя подвидами: номинативным *Ch.* (s. str.) *ricardoae ricardoae* Pl., *Ch.* (s. str.) *ricardoae volgensis* Ols. и *Ch.* (s. str.) *ricardoae jakutensis* Ols.

16a. *Chrysops* (s. str.) *ricardoae ricardoae* Pl. (рис. 96) — Пестряк Рикардо номинативный.

Pleske, 1910b, Ann. Mus. Zool. St. Petersburg, 15 : 461; Szilady, 1917 : 124; Kröber, 1920 : 76; Kröber in Lindner, 1925 : 19; Олсуфьев, 1937a :