

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

(ОТДЕЛЬНЫЙ ОТТИСК)

МОСКВА • 1994

НОВЫЙ ВИД РОДА *TOXONEURA* (DIPTERA, PALLOPTERIDAE) ИЗ ТАДЖИКИСТАНА

Описание нового вида приводится по материалам из коллекции Зоологического музея МГУ. Я выражаю сердечную признательность коллеге и другу А. И. Шаталкину, обнаружившему экземпляры этого вида при просмотре ватных сборов из Таджикистана, смонтировавшему и передавшему мне их для изучения.

Toxoneura alticola sp. n.


Материал. Голотип ♂, с этикеткой «Гиссар. хр., Кондара Квак, 1800 м, 15.VIII 1969, Келейникова». Паратипы: 1 ♂, 2 ♀♀, там же, 6.VIII 1969, Келейникова.

Описание. Тело, усики и ноги бледно-желтые, покрыты тонким беловатым налетом.

Голова и профиль овальной формы, высота головы больше длины. Длина лба чуть меньше ширины. Высота щек под глазом примерно равна вертикальному диаметру глаза или немного меньше его. Имеются следующие пары щетинок: 1 *or*, 1 *oc*, 1 *roc* (обе щетинки короткие волосковидные), 1 *o vt*, 1 *i vt*. Низ щек с рядом тонких волосков. Postgena с двумя длинными светлыми волосковидными щетинками. Поверхность затылочного склерита в коротких светлых щетиночках. 3-й членик усиков суживающийся книзу, его длина в 1,2 раза больше ширины в верхней части. Ариста длинная, в коротких, направленных вперед волосках.

Среднеспинка в коротких светлых волосках, со следующими парами щетинок: 1 *prpn*, 2 *npl* (задняя на треть короче передней), 0 + 2 *spal*, 1 + 1 *ial*, 1 + 3 *dc*. Щиток с двумя парами щетинок. Проземероны с одной светлой волосковидной щетинкой. Анэпистерны у заднего края с несколькими светлыми волосками. Катэпистерны в светлых волосковидных щетинках, более длинных и толстых в нижней половине и с одной черной крепкой щетинкой в задней половине у верхнего края.

Передние бедра с рядом из пяти—семи длинных заднеventральных и рядом из пяти—семи примерно таких же заднедорсальных щетинок. Средние бедра с одной щетинкой в апикальной половине на передней поверхности. Средние голени с крепкой заднеventральной вершинной щетинкой. Задние бедра с одной



Крыло *T. alticola* sp. n.

дорсальной и одной переднедорсальной щетинками у вершины. Передние и задние голени без щетинок.

Крыло (рисунок) с тремя темными пятнами: небольшим у костальной жилки между *Sc* и *R*₁, широким вдоль костальной жилки у вершины крыла и пятном вокруг задней поперечной жилки (*tp*).

Брюшко самца в светлых волосках и щетинках; IV и V тергиты на заднем крае с рядом черных щетинок. У самки волоски и волосковидные щетинки на брюшке от желтоватых до черных; III—VI тергиты на заднем крае с рядом черных щетинок.

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з. Новый вид наиболее похож на *T. trimacula* (Meigen), но отличается следующими признаками:

T. alticola sp. n.

1. Акростикальные щетинки на среднеспинке отсутствуют
2. Высота щек под глазом заметно больше половины вертикального диаметра глаза
3. Волоски на анэпистернах и катэпистернах бледно-желтые
4. Средние бедра с черной щетинкой в апикальной половине на передней поверхности

T. trimacula

1. Акростикальные щетинки на среднеспинке имеются
2. Высота щек под глазом равна примерно четверти вертикального диаметра глаза
3. Волоски на анэпистернах и катэпистернах черные
4. Средние бедра без черной щетинки в апикальной половине на передней поверхности

Зоологический музей МГУ

Поступила в редакцию
14 октября 1993 г.

A. L. OZEROV
A NEW SPECIES OF THE GENUS *TOXONEURA* (DIPTERA, PALLOPTERIDAE)
FROM TAJIKISTAN

Zoological Museum, Moscow State University, Russia

Summary

Toxoneura alticola sp. n. is described basing on material from Tajikistan (Gissar Ridge). The new species is similar to *T. trimacula* (Mg.) differing from the latter by the following characters: absence of acrostichal setae on mesotergite, width of gena exceed the half of vertical diameter of eye, anepisternum with yellow hairs, each of the 2nd femora having a black anterior seta on its apical half.