

Новая форма желтой трясогузки.

Г. И. Поляков.

Eine neue Form der Schafstelze: *Budytes flava zaisanensis* subsp. nov.

Von G. J. Poljakow.

Motacilla flaveola: P. Pallas, «Zoographia Rosso-Asiatica», 1811, I, p. 501 (partim).

Motacilla flava L.: Finsch, «Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876», 1879, p. 173 (*M. cinereocapilla*: Finsch, «Ibis», 1877, p. 50, 53 et 57) (partim).

Motacilla flava beema Sykes: Dr. Ernst Hartert, «Die Vögel der paläarktischen Fauna», 1905, Heft III, p. 290 (partim).

Finsch говоритъ, что самецъ желтой трясогузки, добытый имъ 1. VI (нов. ст.) на Кара-Иртышѣ, по сѣрой окраскѣ головы совершенно тождественнѣ съ нѣмецкими экземплярами и съ рисункомъ у Дрессера (фиг. 1) ¹⁾.

Желтая трясогузка постоянно и въ большомъ количествѣ наблюдались мною съ 27. V по 4. VII (ст. ст.) 1909 года въ слѣдующихъ частяхъ Зайсанской котловины: по берегамъ озера Зайсанъ-нора, отъ мыса Топольнаго (Тугуль-агачъ) на югъ до Кара-суата (наименованіе берега южнаго угла упомянутого озера) и отсюда на сѣверо-востокъ до устья Старога (Чернаго) Иртыша; по всей рѣкѣ Комарухѣ²⁾; по берегамъ Старога (Чернаго) Иртыша, въ его устьѣ и вверхъ по теченію на протяженіи прибли-

зительно 12 верстѣ; у озеръ Юталъ; по берегамъ всего протока Ак-булата ³⁾; по берегамъ Чернаго Иртыша, отъ его устья до р. Кальджира, и, наконецъ, въ долину послѣдняго, вблизи устья и вверхъ по теченію на протяженіи приблизительно 4 верстѣ.

На р. Кальджирѣ птицы эти попадались главнымъ образомъ по арыкамъ, въ заросляхъ чіа (*Lasiagrostis splendens*) и разныхъ мелкихъ кустарниковъ, а въ остальныхъ мѣстностяхъ—по луговымъ (степнымъ) берегамъ съ зарослями рѣдкаго камыша (*Arundo phragmites*).

Изъ добытыхъ здѣсь желтыхъ трясогузокъ въ числѣ 21 экземпляра оказалось: 12 взрослыхъ (adult.) самцовъ, 7 взрослыхъ самокъ и 2 молодыхъ (juv.) птицы.

Всѣ взрослые самцы въ свѣжемъ мелкомъ перѣ, но съ довольно сильно отрепанными вершинами рулевыхъ и маховыхъ. У всѣхъ, за исключеніемъ экземпляровъ за №№ 2, 3 и 5, на темени и затылкѣ въ большей или меньшей степени примѣсь оливковаго цвѣта, что, по свидѣтельству В. Л. Біанки ²⁾, указываетъ на свѣжесть перьевъ.

Въ такомъ же состояніи и опереніе всѣхъ взрослыхъ самокъ за исключеніемъ одной, добытой 10. VI (ст. ст.) у устья р. Кальджира (экземпляръ за № 19), которая въ нѣсколько болѣе выцвѣтшемъ и отрепанномъ мелкомъ перѣ.

Молодые птицы, убитыя 3 и 4. VII (ст. ст.) въ заросляхъ рѣдкаго камыша Кара-суата, одѣты въ рыхлое гнѣздовое перо.

Размѣры всѣхъ этихъ птицъ слѣдующіе³⁾.

	Клювъ (откры- тый хребетъ).	Плюсна.	Задній палецъ съ когтемъ.	Хвостъ (отъ корня рулей).	Крыло (сло- женное).
Самцы:	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.	m.m.
экз. № 1.	11,1	22,8	16,4	70,2	78,3
" " 2.	11,4	22,4	17	69,7	79,4
" " 3.	11,4	22,8	15,5	69,8	77,4
" " 4.	11,7	23,2	15,7	72,7	79

¹⁾ Протокъ этотъ соединяетъ Старый и Новый Черные Иртыши немного ниже р. Комарухи. *Аст.*

²⁾ В. Біанки: «Матеріалы для авифауны Монголіи и восточнаго Тибета», стр. 46. *Аст.*

³⁾ Измѣренія сдѣланы штангенциркулемъ, по шкуркамъ. *Аст.*

¹⁾ Finsch: «Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876» (Verhandl. K. K. Zool.-Bot. Gesell. Wien, 1879), p. 173. *Аст.*

²⁾ Рѣка Комаруха—одинъ изъ протоковъ дельты Чернаго Иртыша. *Аст.*

	Клювъ (откры- тый хребетъ).	Плюсна.	Задній палецъ съ когтемъ.	Хвостъ (отъ корня рулей).	Крыло (сло- женное).
	м.м.	м.м.	м.м.	м.м.	м.м.
экз. № 5.	11,4	22,6	16,2	69,5	79
" " 6.	11,7	22,8	15,8	69	80,1
" " 7.	11,5	22,5	15,3	70	79,1
" " 8.	12,7	22,4	15,4	71,4	79,1
" " 9.	11	21,5	15,5	67	79,4
" " 10.	11,4	23,2	16,5	67	77,1
" " 11.	12	23,6	16	71,7	79,5
" " 12.	12,1	23,4	15,4	69,2	79,6
Отъ и до:	11—12,7.	21,5—23,6.	15,3—17.	67—72,7.	77,1—80,1.
Среднее:	11,6.	22,7.	15,8.	69,7.	78,9.

Самки:	м.м.	м.м.	м.м.	м.м.	м.м.
экз. № 13.	11,9	23	16,5	68	78,3
" " 14.	11	22,4	16,5	67,8	74,8
" " 15.	10,8	21,5	16,3	65,9	72,5
" " 16.	12	22,3	16,4	68	74,6
" " 17.	10,9	21,7	15,1	65	74,8
" " 18.	11,5	22,3	16,4	66,4	74,9
" " 19.	11,7	22,4	17,5	65,4	73
Отъ и до:	10,8—12.	21,5—23.	15,1—17,5.	65—68.	72,5—78,3.
Среднее:	11,4.	22,2.	16,3.	66,6.	74,7.

Молодые птицы:

	м.м.	м.м.	м.м.	м.м.	м.м.
экз. № 20.	10	22,3	15,9	65	74,3
" " 21.	12	23,4	16,5	70	81,8.

При сравненіи самцовъ зайсанской желтой трясогузки съ типичными самцами очень хорошей серіи *Budytes flava borealis* (Sund.) (отъ Швеціи до Колымы) и типичными самцами *B. f. flava* (Linn.) коллекции С. А. Бутурлина выяснилось, что отъ первыхъ (сравнивая, конечно, также весеннихъ) мои птицы отличаются болѣе свѣтлой окраской головы, задней стороны и боковъ шеи и ушныхъ перьевъ, а также и меньшими размѣрами:

у всѣхъ самцовъ формы *borealis* коллекции С. А. Бутурлина плюсна 24—25, задній палецъ съ когтемъ 16,5—21, хвостъ (отъ корня рулей) 73—78 и крыло (сложенное) 80—85 м.м. Отъ типичныхъ же самцовъ формы *flava* онѣ отличаются болѣе темнымъ тономъ сѣрой окраски головы и задней стороны шеи, а также и сравнительно слабымъ развитіемъ бѣлой надглазной полосы, которая у зайсанскихъ птицъ въ величинѣ и формѣ варьируетъ и у нѣкоторыхъ (экземпляры за №№ 7 и 9) имѣется лишь въ видѣ небольшихъ бѣлыхъ пятнышекъ и только позади глаза. Кромѣ того, онѣ въ среднемъ оказались мельче и этой послѣдней формы, такъ какъ у экземпляровъ *flava* коллекции С. А. Бутурлина самая меньшая плюсна 23 м.м. Отъ типичныхъ самцовъ формы *Budytes flava beema* (Sykes) самцы желтой трясогузки Зайсанской котловины легко отличаются,—кромѣ болѣе темнаго тона сѣрой окраски головы, задней стороны шеи и слабого развитія бѣлой надглазной полосы,—тѣмъ, что щеки ихъ и ушныя перья не бѣлыя, а одной или даже болѣе темной сѣрой окраски съ остальными частями головы.

Не довольствуясь результатомъ этого сравненія, я рѣшилъ сличить зайсанскихъ птицъ съ желтыми трясогузками, добытыми мною въ это же время (т.е. весною и въ началѣ лѣта) въ имѣніи „Саввино“ и его ближайшихъ окрестностяхъ, въ Богородскомъ уѣздѣ Московской губерніи,—каковыхъ оказалось въ моей коллекціи 72 экземпляра. Изъ нихъ: 56 взрослыхъ самцовъ, 14 взрослыхъ самокъ и 2 молодыхъ, въ первомъ (гнездовомъ) перѣ, птицы. По степени изношенности оперенія всѣ эти экземпляры очень близко стоятъ къ зайсанскимъ птицамъ.

Но прежде, чѣмъ приступить къ сравненію, я счелъ необходимымъ раздѣлить желтыхъ трясогузокъ Московской губерніи на нѣсколько группъ, руководствуясь при этомъ главнымъ образомъ наблюдающимся у нихъ различіемъ въ тонѣ сѣрой окраски головы, задней стороны и боковъ шеи, а также въ величинѣ бѣлой надглазной полосы¹⁾.

Это позволило мнѣ раздѣлить самцовъ на слѣдующія четыре группы.

¹⁾ По указанію др. Hartert'a («Die Vögel der paläarktischen Fauna», Heft III, p. 292), небольшая бѣлая надглазная полоса наблюдается иногда и у самцовъ формы *borealis*. Нѣсколько такихъ экземпляровъ съ Колымы я видѣлъ въ коллекціи С. А. Бутурлина. *Авт.*

	Клювъ (откры- тый хребетъ).	Плюсна.	Задній палецъ съ когтемъ.	Хвостъ (отъ корня рулей.	Крыло (сло- женное).
	м.м.	м.м.	м.м.	м.м.	м.м.
Экз. № 62.	11,9	22,5	16,4	70	79,3
" " 63.	11,6	22,6	16,9	68,4	76,5
" " 64.	12	22,3	16,9	70	77,5
" " 65.	11,8	23,4	18,9	66,7	77,8
" " 66.	11,2	24	17,8	70	79
" " 67.	12	24	17,7	64,8	77,6
" " 68.	12,3	24	18,7	69,5	79,5
" " 69.	12,6	23,6	17,9	71,6	78
" " 70.	10,8	23,2	19,7	65,4	79,1
Отъ и до:	10,8—12,6.	22,3—24.	16,4—19,7.	64,8—71,6.	76,5—79,5.
Среднее:	11,8.	23,2.	17,8.	68,4.	78,2.

При сравненіи самокъ желтой трясогузки Зайсанской котловины съ таковыми Московской губерніи выяснилось, что по тону окраски головы съ задней стороны шеи и по величинѣ бѣлой надглазной полосы 3 изъ нихъ (экземпляры за №№ 16, 17 и 18) подходятъ къ экземплярамъ, отнесеннымъ мною въ первую группу, а 4—довольно близко стоятъ къ самкамъ второй группы, но, какъ и самцы, отъ московскихъ птицъ легко отличаются болѣе свѣтлыми, почти бѣлыми краями вершинъ среднихъ и большихъ верхнихъ кроющихъ крыла. Кромѣ того, зайсанскія птицы, какъ это видно изъ табличекъ, отличаются отъ московскихъ экземпляровъ обѣихъ группъ и размѣрами: плюсна ихъ въ среднемъ значительно меньше.

Вслѣдствіе недостаточности имѣющагося въ моемъ распоряженіи матеріала, нѣтъ возможности выяснить пока, какими причинами обусловливается различіе тона окраски головы и задней стороны шеи у самокъ Зайсанской котловины, на основаніи котораго возможно дѣленіе ихъ, какъ и птицъ Московской губерніи, на двѣ группы. Такъ какъ темныя пятна на груди имѣются у зайсанскихъ экземпляровъ, какъ первой, такъ и второй группы, то объясненію этого различія разницей въ возрастѣ птицъ не можетъ быть мѣста. Нельзя также предположить, что поблѣднѣнне буровато-сѣрой окраски у самокъ, стоящихъ ближе къ московскимъ самкамъ второй группы, обуслов-

ливается выплѣтаніемъ, такъ какъ изъ трехъ птицъ первой группы одна убита почти мѣсяцемъ позднѣе¹⁾.

Но, во всякомъ случаѣ, оба приведенные мною выше признака отличія зайсанскихъ самокъ желтой трясогузки отъ самокъ этого вида Московской губерніи могутъ быть сочтены за опредѣленные признаки, на основаніи которыхъ эти формы должны быть разсматриваемы отдѣльно²⁾.

Что же касается до молодыхъ, въ первомъ (гнѣздовомъ) перѣ, зайсанскихъ желтыхъ трясогузокъ, то изъ сравненія ихъ съ молодыми этого вида Московской губерніи, вслѣдствіе крайней недостаточности матеріала, я никакихъ заключеній вывести не могъ.

Такимъ образомъ, резюмируя все вышеизложенное, можно сказать, что желтыя трясогузки Зайсанской котловины представляютъ форму близкую къ типичной *Budytes flava flava* (Linn.), отъ которой отличаются болѣе темнымъ тономъ окраски головы, задней стороны шеи и ея боковъ, болѣе свѣтлыми, почти бѣлыми, краями вершинъ среднихъ и большихъ верхнихъ кроющихъ крыла, въ общемъ сравнительно мало развитою бѣлою надглазною полосой и меньшими размѣрами плюсны.

Отъ двухъ близкихъ къ *B. f. flava* (Linn.) формъ: *B. f. borealis* (Sund.) и *B. f. beema* (Sykes) зайсанскія желтыя трясогузки (самцы) могутъ быть еще легче отличимы: отъ типичныхъ особей первой—много болѣе свѣтлой сѣрой окраской головы, задней стороны шеи и ея боковъ, присутствіемъ бѣлыхъ надглазныхъ полосъ, болѣе свѣтлыми, почти бѣлыми краями вершинъ среднихъ и большихъ верхнихъ кроющихъ крыла и гораздо меньшими размѣрами плюсны; а отъ типичныхъ особей второй формы—гораздо болѣе темнымъ тономъ сѣрой окраски головы, задней стороны шеи и ея боковъ, сѣрыми же щеками и ушными перьями и въ общемъ очень слабо развитыми бѣлыми надглазными полосами. Судя по размѣрамъ, даннымъ

¹⁾ Самки первой группы добыты: 30. V (2) и 3. VII (ст. ст.), а второй—27. V (2), 29. V и 10. VI (ст. ст.). *Авт.*

²⁾ М. А. Мензбиръ въ «Птицахъ Россіи» (т. II, стр. 770 и 771) говоритъ: «я не могу не согласиться съ мнѣніемъ П. П. Сушкина, что желтыя трясогузки представляютъ собою примѣръ аналогичный существованію полиморфныхъ самцовъ у нѣкоторыхъ видовъ насѣкомыхъ. Есть ли это начало новообразованія видовъ—сказать трудно, но въ этомъ нѣтъ ничего невозможнаго. Во всякомъ случаѣ, если бы самки разныхъ желтыхъ трясогузокъ различались хоть какими-нибудь опредѣленными признаками, кромѣ мѣстныхъ измѣненій въ тонѣ окраски, то, конечно, упомянутыя формы по необходимости разсматривались бы отдѣльно». *Авт.*

Г. Э. Иоганзенъ въ „Матеріалахъ для орнитофауны степей Томскаго края“¹⁾ для 8 самцовъ *Bee ma*, зайсанскіе самцы желтой трясогузки по размѣрамъ плюсны отъ этой формы не отличимы (размѣръ плюсны въ среднемъ тотъ же, т. е. 22,3 м.м.).

Такъ какъ на основаніи литературныхъ указаній²⁾ въ Зайсанской котловинѣ скорѣе надо было бы ожидать встрѣтить восточную форму желтой трясогузки, *Budytes flava* *Bee ma* (Sykes), а добытые мною здѣсь 12 самцовъ по тону сѣрой окраски головы довольно однотипны, то, мнѣ думается, возможно усматривать въ этихъ птицахъ обособившуюся въ названной мѣстности расу, которую, какъ географическую, я и рѣшаюсь назвать *Budytes flava zaissanensis* subsp. nov.

Турис: ♂ ad., 30. V. 1909 (ст. ст.), правый берегъ Чернаго Иртыша, приблизительно въ 15 верстахъ отъ устья, Семипалатинская область [плюсна 22,5, задній палецъ съ когтемъ 15,3, хвостъ (отъ корня рулей) 70 и крыло (сложенное) 79,1 м.м.], экземпляръ за № 91; ♂ ad., 31. V. 1909 (ст. ст.), здѣсь же [плюсна 21,5, задній палецъ съ когтемъ 15,5, хвостъ (отъ корня рулей) 67 и крыло (сложенное) 79,4 м.м.], экземпляръ за № 110; ♀ ad., 30. V. 1909 (ст. ст.), здѣсь же [плюсна 22,3, задній палецъ съ когтемъ 16,4, хвостъ (отъ корня рулей) 68 и крыло (сложенное) 74,6 м.м.], экземпляръ за № 83; ♀ ad., 30. V. 1909 (ст. ст.), здѣсь же [плюсна 21,7, задній палецъ съ когтемъ 15,1, хвостъ (отъ корня рулей) 65 и крыло (сложенное) 74,8 м.м.], экземпляръ за № 95. Всѣ четыре экземпляра въ моей коллекціи.



¹⁾ 1907 г. Стр. 66 и 67: *Motacilla flava* *Bee ma* Sykes. *Авт.*
²⁾ М. А. Мензбиръ: «Птицы Россіи», т. II, стр. 771 (1895 г.); Dr. Ernst Hartert: «Die Vögel der palaarktischen Fauna», Heft III, p. 287 und 290 (1905); Г. Э. Иоганзенъ: «Оологическая и нидологическая коллекція Зоологическаго Музея Имп. Томскаго Университета», стр. 33 и 34 (1906 г.) и «Матеріалы для орнитофауны степей Томскаго края», стр. 65 и 66 (1907 г.). *Авт.*

Къ налету клеста-еловика (*Loxia curvirostra* L.) въ 1909 году.

Э. Шарлеманъ.

Zur Masseninvasion des Fichten-Kreuzschnabels (*Loxia curvirostra* L.) im Jahre 1909.

Von E. Scharleman.

Налетъ клестовъ-еловиковъ (*Loxia curvirostra* L.) 1909 года, столь много трактовавшійся въ западно-европейской орнитологической литературѣ, остался у насъ почти неотмѣченнымъ. v. Tschusi zu Schmidhoffen въ своей статьѣ: „Über den heurigen Massenzug des Kreuzschnabels“, говоря о движеніи этихъ птицъ въ Западной Европѣ, добавляетъ, что „nach Osten hin schon in Ostpreussen und Livland ein auffallendes zahlreiches Auftreten nicht konstatiert worden zu sein scheint“ („Ornithologische Monatsberichte“, 1909, p. 170). С. А. Бутурлинъ, сообщая о названной статьѣ, высказывается по этому вопросу болѣе определенно, утверждая, что „въ Восточной Пруссіи, не говоря о Прибалтійскомъ нашемъ краѣ, его (т.-е. налета еловиковъ) не замѣтно“ („Орнитологическій Вѣстникъ“, 1910, стр. 69). Изъ послѣднихъ словъ можно вывести заключеніе, что въ Россіи вовсе не было налета клестовъ. Въ дѣйствительности же это явленіе, правда въ не столь интенсивной формѣ, какъ на Западѣ, наблюдалось и у насъ.

28. VI. 1909 (всѣ даты по старому стилю) на птичьемъ рынкѣ г. Варшавы (улица Лешно) я былъ пораженъ обиліемъ *Loxia curvirostra*. Изъ разспросовъ птицелововъ я узналъ, что клесты въ большомъ количествѣ появились въ окрестно-

5390
1911 г. Второй годъ изданія.—Seconde année. № 3—4.

MESSAGER ORNITHOLOGIQUE,
Орнитологическій Вѣстникъ.
ORNITHOLOGISCHE MITTHEILUNGEN.

Выходить четыре раза въ годъ: два №№ до и два — послѣ лѣтнихъ вакацій.

Подписная цѣна за 1 г.— 2 руб. 50 коп., за 1/2 года— 1 руб. 50 коп., отдѣльные №№ по 75 к. съ пересылкой въ Россіи; за границу—3 р. за 1 годъ, 1 руб. 75 коп. за 1/2 года и отдѣльные №№ по 1 руб.

Объявленія помѣщаются на слѣдующихъ условіяхъ: первый разъ за 1 страницу— 8 р., за 1/2 страницы—4 р., за 1/4 страницы—2 р. и т. д., остальные разы съ половинною платою.

Всѣ заявленія, вопросы, справки, статьи и проч. просить адресовать на имя редактора Г. И. Полякова, Почтов. отд. «Обираловка», Московск. губ., имѣніе «Савино». Телефонъ № 7—51.

Paraissant quatre fois par an: deux №№—après le Nouvel an et deux №№—après les vacances d'été.

Prix d'abonnement (pour la Russie) l'année—Rbl. 2.50, la demi-année Rbl. 1.50, le numéro à part Rbl.—0.75; pour l'étranger (Union Postale Universelle) l'année Frs. 8, la demi-année Frs. 4, le numéro Frs. 3.

Tarif pour les annonces: la première fois 1 page Frs. 23, 1/2 page Frs. 11.50, 1/4 page Frs. 6 etc., les fois suivantes à moitié prix.

Tous les envois (franco) pour le «Messager Ornithologique» doivent être adressés au Rédacteur G. I. Poliakov, Russie, Chemin de fer Moscou — Nijninowgorod. Station «Obiralovka», propriété «Savino».

Erscheint jährlich vier Mal: zwei №№—nach Neujahr und zwei №№—nach den Sommerferien.

Preise für Russland (mit Zustellung) jährlich Rbl. 2.50, halbjährlich Rbl. 1.50, Einzelnummer à 75 Kop.; für das Ausland (Weltpostverein) jährlich Mk. 7, halbjährlich Mk. 3.50, Einzelnummer à Mk. 2.

Preise der Inserate: das erste Mal 1 Seite Mk. 17, 1/2 Seite Mk. 8.50, 1/4 Seite Mk. 4.25 u. s. w., für die folgenden Male die Hälfte dieses Preises.

Alle Sendungen für die «Ornithologischen Mitteilungen» sind, als solche bezeichnet an die Redaktion: G. I. Poliakov, Russland, Postabteilung «Obiralowka», Moskauer Gouvernement, Gut «Sawino», zu adressieren.

СОДЕРЖАНІЕ.

	Стр.
1. Къ орнитофаунѣ Херсонской губерніи. <i>И. К. Пачоскій</i>	212
2. О нѣкоторыхъ птицахъ Кѣлецкой губерніи. (Продолженіе). <i>Е. Я. Катинъ</i>	224
3. Наблюденія надъ птицами Бугурусланскаго уѣзда, Самарской губерніи, за три года (съ 1907 г. до 1910 г.). <i>Е. И. Исполотовъ</i> .	227