

ней птицы клювъ за исключеніемъ самаго кончика и основанія нижней челюсти очень темной окраски; ноги ея сильно буроваты. У лѣтнихъ птицъ части эти окрашены нѣсколько свѣтлѣе.

Fam. Phasianidae.

Coturnix japonicus ussuriensis Bogd.

1. ♂, 22. IV. 1909, ст. Вяземская.—2. ♀, 3. V. 1912, вблизи Хабаровска.—3. ♂, 6. V. 1912, здѣсь же.—4 и 5. 2 ♂, 9. V. 1912, здѣсь же.

Мелкое перо равномернo мало изношенное; вершины крайнихъ первостепенныхъ маховыхъ немного обиты.

Размѣры: крыло—99.4, 97.5, 94.5, 98.0 и 91.0; плюсна—24.4, 26.0, 25.5, 26.3 и 26.2; надклювье отъ передняго края ноздрей—7.3, 7.2, 7.0, 6.5 и 7.0 m.m.

Горло ♀ грязно-желтовато-бѣлое (сливочно-бѣлое), а у остальныхъ экземпляровъ (♂♂) рыжеватое съ темнымъ, буроватымъ, пятномъ. Отъ перепеловъ изъ Московской губерніи всѣ легко отличаются болѣе рѣзкимъ рисункомъ верха: темная окраска черноватѣе, а свѣтлыя наствольныя полосы ярче и гораздо шире; у ♀ темныя пятнышки на груди черноватѣе и расположены значительно чаще.

Perdix daurica suschkini subsp. nov.

1 и 2. 2 ♂, 8. II. 1910, Хабаровскъ.

Въ равномернo мало изношенномъ опереніи.

Длина крыла—147.5 и 144.0 m.m.

Отъ 6 экземпляровъ типичной формы коллекціи профессора П. П. Сушкина (одного забайкальскаго, двухъ минусинскихъ и трехъ алтайскихъ), оба рѣзко отличаются слѣдующими признаками: рыжая окраска простирается на весь бокъ головы и захватываетъ часть шеи; сверху и на крыльяхъ гораздо рыжѣе—скорѣе рыже-бурая, чѣмъ сѣро-бурая; продольныя бѣловатыя полосы чуть не вдвое шире; верхъ головы рыжевато-бурый, безъ примѣси сѣрой окраски и съ очень узкими бѣловатыми наствольными полосками перышекъ; рыжая полоса на лбу гораздо шире. — Въ окраскѣ туркестанской расы ¹⁾ рыжій цвѣтъ развитъ гораздо слабѣе.

Называю форму эту въ честь профессора П. П. Сушкина.

¹⁾ *P. d. turcomana* Stolz., Bull. de la Soc. Imp. des. Nat. de Moscou, 1897 (= *P. d. occidentalis* Buturl., Ornith. Monatsb., 1908).

стр. 3-55

Къ орнитофаунѣ Приморской области.

Г. И. Поляковъ.

Zur ornithologischen Fauna des Ussuri-Gebietes.

Von G. I. Poljakow.

Предлагаемая ниже замѣтка — результатъ обработки небольшой коллекции птицъ Приморской области, собранныхъ Э. А. Борсовымъ въ 1908—1912 г.г. въ ближайшихъ окрестностяхъ Хабаровска, Никольска-Уссурийскаго и слѣдующихъ станцій Уссурийской желѣзной дороги: Корфовская, Вѣрино, Вяземская, Котиково и Розенгартовка.

Въ коллекціи этой оказалось всего 119 экземпляровъ, относящихся къ 60 видамъ и подвидамъ. Полъ птицъ приводится въ статьѣ согласно помѣтокъ на этикеткахъ названнаго коллектора. — Обмѣры дѣлались мною по шкуркамъ штангенциркулемъ и — на крупныхъ экземплярахъ — рулеткой; крылья измѣрялись въ сложенномъ видѣ по прямой отъ кистевого сгиба до вершины самага длиннаго махового, плюсны — отъ мѣста скрѣпленія съ голенью сзади до мѣста скрѣпленія со среднимъ пальцемъ спереди, а хвосты — отъ корня до вершины самыхъ длинныхъ изъ рулей; о способахъ измѣренія клюва оговорено въ каждомъ случаѣ отдѣльно. Всѣ даты приведены по старому стилю.

Для удобства пользованія настоящей статьей, я перечисляю формы въ ней въ порядкѣ семействъ, принятомъ С. А. Бутурлинымъ въ его двухъ послѣднихъ работахъ, касающихся авифауны этого же района — „Птицы Приморской Области“ и „Птицы Приморской и Амурской Областей“¹⁾.

¹⁾ Отдѣльные оттиски изъ журнала „Наша Охота“ за 1909 г. — кн. XI, 1910 г. — кн. V—IX, и 1911 г. — кн. 14, 16, 17, 18, 20 и 21.



№ 1

ОРНИТОЛОГИЧЕСКІЙ
ВѢСТНИКЪ

MESSAGER ORNITHOLOGIQUE
ORNITHOLOGISCHE MITTEILUNGEN

ШЕСТОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ

SIXIEME ANNEE

1915 г.

