

что прилетѣли и держались небольшими стайками по альпійскимъ лугамъ. Горы Гань-су составляютъ сѣверную границу географическаго распространѣнія описываемаго вида.

157. *Carpodacus Davidianus*, Milne-Edw.

Nouv. Arch. du Muséum, I, 1865. pl. II et III.

Этотъ видъ, весьма близкій къ *C. rhodochrous*, Vig., встрѣчается довольно часто въ юго-восточной Монголіи, въ Ала-шаньскомъ хребтѣ и въ горахъ Гань-су. Гнѣздится какъ въ лѣсномъ поясѣ, такъ и въ области альпійскихъ кустарниковъ. Въ концѣ апрѣля и въ началѣ мая, въ горахъ Гань-су, описываемыя птички попадались очень часто на весеннемъ пролетѣ; въ концѣ августа мы встрѣчали ихъ, вѣроятно на отлетѣ, въ кустарникахъ долины Хуанъ-хэ.

158. *Carpodacus dubius*, nov. sp.

Таб. XIII.

C. Thurae simillimus. Mas abdomine medio albo; genis totis roseis; vitta superciliari argentea, postice candidissima. Fem. uropygio ochraceo, fusco striato; vitta superciliari antice ochracea, postice alba.

Размѣры:

	Длина.	Ширина.	Слож. крыло.	Хвостъ.	Клювъ (отъ зѣва).	Плюсна.
♂ . . .	6,7"	11,7—12	3,27—3,36	3,1—3,15	0,5—0,52	0,82—0,87
♀ . . .	6,8—7,1"	11,7—12	3,13—3,24	2,87—3,1	0,49—0,51	0,82—0,86

Изъ маховыхъ 4-ое самое длинное; $3=2$ лишь немного короче; $5>3$; $1<6$. Верхняя челюсть черноватая, нижняя свѣтло-роговая; тарзы свѣтло-роговыя; зрачекъ коричневый.

Описываемый видъ очень близокъ къ *C. Thuga*, Br., но отличается отъ него: а) вся щека малиноваго цвѣта, тогда какъ у *C. Thuga* верхняя часть щекъ темно-бурая; б) середина живота у нашего вида нечисто-бѣлая, между тѣмъ у *C. Thuga* весь низъ тѣла кармино-розовый; в) серебристо-розоватыя брови у *C. dubius* на зашейкѣ дѣлаются чисто-бѣлыми; брови же у *C. Thuga* на всемъ своемъ протяженіи кармино-розовыя. Кромѣ того, самка новаго вида имѣетъ надхвостье и брови охристаго цвѣта; между тѣмъ на рисункѣ самки *C. Thuga* въ «Proc. zool. soc. London, 1855, pl. CXIV», надхвостье сдѣлано бурымъ. Охристое надхвостье находится у самки *C. saturatus*, Blanf., но ея самецъ отличенъ отъ нашего.

Самецъ: верхъ головы и тѣла оливково-бурый; каждое перо съ черноватою полоскою по стволу. Щеки, низъ туловища, надхвостье, верхнія и нижнія кроющія хвоста малиноваго цвѣта, болѣе свѣтлаго на надхвостѣ. Перья на горлѣ заострены и украшены узкими

серебристыми настрѣлками, иногда съ темными туловища оливково-бурого цвѣта; брови малиновыя; ушные боковыя шеи. Крылья перьевъ. Бол. ватую каймою; р. на крылѣ попере. новыми ободками; верхнихъ и нижнихъ тымъ настрѣлками.

Самка: сверху охристое съ черноватой, испещренной брови охристаго и

Описываемый и въ горахъ Гань-по долинамъ, въ и. чается также по заходитъ въ алы обыкновенный же или вообще при (ковъ, въ родѣ: бр

Осенній отлетъ горахъ, въ началѣ концѣ апрѣля и приступили къ и шаньскій хребетъ котораго уже нѣтъ

15

E. incarnata Sew. стр. 117.

Найдена въ и Гань-су, вновь п

Любимымъ мѣ. высокіе глиняные щіе обрывами. (устяхъ горныхъ сѣмена солянковъ

по альпійскимъ
аницу географи-

dw.

Vig., встрѣчается
Ала-шаньскомъ
лѣсномъ поясѣ,
концѣ апрѣля и
птички попадались
ста мы встрѣчали
и Хуанъ-хэ.

genis totis roseis;
uropygio ochra-
postice alba.

Плюсна.
52 0.82—0.87
51 0.82—0.86

немного короче;
свѣтло-роговая;

Вр., но отли-
та, тогда какъ у
середина живота у
Thuga весь низъ
ови у *C. dubius* на
Thuga на всемъ
го, самка новаго
; между тѣмъ на
London, 1855, pl.
хвостье находится
нъ отъ нашего.

; каждое перо съ
вища, надхвостье,
вѣта, болѣе свѣт-
украшены узкими

серебристыми наствольными полосками. Срединѣ живота нечисто-бѣлая, иногда съ черноватыми черточками по стволу перьевъ; бока туловища оливково-бурые. Лобъ и брови серебристо-розоватые; продолженіе бровей на зашейкѣ чисто-бѣлаго цвѣта; уздечка темно-малиновая; ушные перья не отличаются отъ цвѣта задней части и боковъ шеи. Крылья и хвостъ темно-бурые съ желтоватыми ободками перьевъ. Большія кроющія крыла снабжены широкою желтоватою каймою; розовые кончики среднихъ кроющихъ образуютъ на крылѣ поперечную полоску; малыя кроющія съ грязно-карминовыми ободками; нижнія кроющія крыльевъ бѣлыя. Переднія изъ верхнихъ и нижнихъ кроющихъ хвоста снабжены узкими черноватыми наствольными полосками.

Самка: сверху того же цвѣта, какъ и самецъ, но надхвостье охристое съ черноватыми полосками; низъ туловища изжелта-бѣловатый, испещренный черноватыми полосками, болѣе узкими на животѣ; брови охристаго цвѣта; продолженіе ихъ на зашейкѣ бѣлое.

Описываемый видъ найденъ былъ нами въ Ала-шаньскомъ хребтѣ и въ горахъ Гань-су. Держится въ лѣсномъ поясѣ, преимущественно по долинамъ, въ густыхъ береговыхъ заросляхъ рѣчекъ, но встрѣчается также по можжевельнымъ лѣсамъ, вмѣстѣ съ которыми заходитъ въ альпійскую область. Пѣніе самца довольно плохо: обыкновенный же голосъ, издаваемый также при видѣ опасности, или вообще при безпокойствѣ, состоитъ изъ неблагозвучныхъ звуковъ, въ родѣ: брыжж, брыжж, брыжж...

Осенній отлетъ *C. dubius* наблюдался нами въ Ала-шаньскихъ горахъ, въ началѣ октября, а весенній прилетъ въ Гань-су — въ концѣ апрѣля и въ началѣ мая; съ половины этого мѣсяца птички приступили къ постройкѣ гнѣздъ, но яицъ еще не имѣли. Ала-шаньскій хребетъ составляетъ сѣверную границу описываемаго вида, котораго уже нѣтъ въ лѣсныхъ горахъ Муни-ула.

159. *Erythropsiza mongolica*, Swinh.

E. incarnata Sew. Вертик. и горизонт. распредѣленіе Туркестанскихъ животн. стр. 117.

Найдена въ южной Халхѣ, Ордосѣ и Ала-шанѣ; затѣмъ, минуя Гань-су, вновь появляется на Куку-норѣ и въ Цайдамѣ.

Любимымъ мѣстообитаніемъ описываемаго вида служатъ невысокіе глиняные или мергельные холмы, въ особенности изобилующіе обрывами. Отсюда птички посѣщаютъ каменные розсыпи въ устьяхъ горныхъ долинъ и ближайшіе солончаки, гдѣ отыскиваютъ сѣмена солянковыхъ растений. Голосъ, издаваемый на лету, состоитъ

копия из книги, имеющейся у А.С. Степанюка (2000 г.)

Пржевальскій


МОНГОЛІЯ И СТРАНА ТАНГУТОВЪ

ТРЕХЛѢТНЕЕ ПУТЕШЕСТВІЕ
ВЪ ВОСТОЧНОЙ НАГОРНОЙ АЗІИ

Н. ПРЖЕВАЛЬСКАГО,
Подполковника Генеральнаго Штаба, Дѣйствительнаго Члена Императорскаго Русскаго
Географическаго Общества.

Томъ II.

ИЗДАНИЕ ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.



САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

1876.

(Переводъ безъ согласія автора не допускается.)