

шаня, добытые нами экземпляры *L. Sophiae*, при сравнении съ типичными экземплярами г. Сѣверцова, не отличаются отъ нихъ и имѣютъ такую же густую окраску какъ бурыхъ перьевъ, такъ и ультра-мариновыхъ. Тѣже экземпляры (всего 17) *L. Sophiae* которые добыты нами въ промежуточной области отъ бассейна верхней Хуанъ-хэ до Тянь-шаня, со включеніемъ сюда даже южнаго безлѣснаго склона этого послѣдняго, словомъ въ мѣстностяхъ пустынныхъ и съ крайне сухимъ климатомъ, всѣ имѣютъ блѣдную окраску въ особенности ультра-мариновыхъ перьевъ на надхвостьѣ, горлѣ, груди и бокахъ туловища. По величинѣ же и другимъ признакамъ какъ блѣдные такъ и болѣе темные экземпляры не различаются. Впрочемъ этотъ блѣдный видъ признавъ за разновидность нашимъ извѣстнымъ орнитологомъ М. А. Мензбиромъ и описанъ имъ въ «Ibis 1885 p. 353» подъ именемъ *L. Sophiae var. major*.

По образу жизни *L. Sophiae* представляетъ осѣдлую птичку и принадлежитъ главнымъ образомъ горамъ, гдѣ въ различныхъ раіонахъ своего распространенія, попадаетъ начиная отъ 3 до 13 тысячъ футовъ абс. высоты. Въ подгорныхъ оазисахъ Тянь-шаня, Аксу и Учъ-Турфанѣ, эта птичка довольно обыкновенна, но въ обширныхъ равнинныхъ мѣстностяхъ, какъ по Тариму и въ Цайдамѣ, встрѣчается рѣдко. Всюду обитаетъ исключительно въ густыхъ кустарникахъ — будутъ ли то заросли барбариса, тальника, шиповника и тамариска въ ущельяхъ южнаго склона Тянь-шаня, или густѣйшія заросли рододендровъ, *Caragana jubata*, *Potentilla* и *Salix* въ альпійской области горъ Гань-су; или наконецъ заросли *Myricaria*, хармыка и тамариска въ ущельяхъ Тибетскихъ горъ крайнихъ Цайдаму и котловинѣ Тарима. Въ лѣсныхъ горахъ, какъ вышеупомянуто, живетъ главнымъ образомъ въ альпійской кустарной области и лишь по ущельямъ горныхъ рѣчекъ изрѣдка спускается въ болѣе низкій лѣсной поясъ. Въ кустарной густицѣ лазаетъ очень проворно и быстро бѣгаетъ по землѣ. Голосъ — тихій пискъ. Въ альпійской области горъ Гань-су *L. Sophiae* встрѣчается часто, обыкновенно

венно небольшими стайками въ сообществѣ съ *Poecile superciliosa*.

Въ лѣсахъ верхней Хуанъ-хэ, именно на горѣ Джахантъ-Фидза, мною найдено было $16\frac{1}{28}$ апрѣля 1880 года гнѣздо вполне приготовленное, но еще пустое. Гнѣздо это было подвѣшено, на высотѣ около сажени отъ земли, къ суку можжевельника и поддерживалось снизу другою вѣткою того же дерева. Сдѣлано было изъ мха, бараньей шерсти и пуха цвѣтовъ тальника; внутри выложено пушистыми кроющими перьями *Crossoptilon auritum*. Форму имѣло шарообразную и до пяти дюймовъ въ діаметрѣ; узкій входъ находился сверху.

3. *Accentor Koslowi*, n. sp.

Относится къ той группѣ завирушекъ, къ которой принадлежатъ *A. modularis (orientalis)* и *A. rubidus (fervidus)*, но рѣзко отличается отъ нихъ тѣмъ, что не имѣетъ полосатыхъ ушныхъ перьевъ, чего ради могъ бы представить типъ особой подгруппы рода *Accentor*.

Notaeo toto brunnescente fulvo, longitudinaliter sordide brunneo maculato; uropygio concolore. Pectore abdomineque fulvescente albis; corporis lateribus longitudinaliter brunneo maculatis; gula pallide fusca; regione parotica haud striata. Marginibus tectricum alarum duas fascias pallidas transversas fingentibus. Femina mari simillima.

Размѣры:

	Длина.	Ширина.	Слож. крыло.	Хвостъ.	Клювъ (culmen)	Плюсна.
♂	155	219	68 — 74	67 — 72	9 — 11	19 — 20
♀	148 — 155	211 — 214	68	68	10	20.

Изъ маховыхъ 1-ое недоростающее немного длиннѣе верхнихъ кроющихъ; 2 > 7; 3, 4 и 5-ое, самыя длинныя, равны между собою; 6-ое лишь немного ихъ короче. Въ хвостѣ крайняя рулевая пара отъ 4 — 6-мм. короче 4-ой = 5 > 6.

Клювъ черный, основаніе обѣихъ челюстей свѣтло-роговое; ноги тѣлеснаго цвѣта, когти темно-роговаго. Глаза свѣтло-каріе.

Въ зимнемъ перѣ¹⁾ верхъ головы и туловища изжелта-свѣтло-бурый съ черноватыми наствольными пятнами болѣе рѣзкими на спинѣ, менѣе явственными на зашейкѣ и головѣ; на лбу эти пятна сливаются въ общій свѣтло-бурый цвѣтъ; надхвостье безъ пятенъ, но на самыхъ длинныхъ изъ верхнихъ кроющихъ хвоста иногда замѣтны наствольныя пятна. Горло дымчато-бурое, въ нижней части съ бѣловатыми, еще не отертыми (въ декабрѣ и январѣ) кончиками перьевъ, представляющими неясный полуошейникъ; того же дымчато-бураго цвѣта ушные перья, которыя вовсе не имѣютъ наствольныхъ полосъ; бровей также нѣтъ.

Исподъ туловища изжелто-бѣлый съ бурымъ оттѣнкомъ на груди, съ рыжеватымъ на бокахъ, гдѣ на заднихъ перьяхъ темныя наствольныя полоски; животъ бѣлый; нижнія кроющія хвоста рыжегато-бѣлыя безъ пятенъ. Рулевья, маховыя и верхнія кроющія крыльевъ бурья съ желтовато-рыжеватыми ободками, болѣе широкими на заднихъ махахъ и на покровныхъ перьяхъ крыла. Изжелто-бѣлые кончики большихъ и среднихъ кроющихъ образуютъ на крылѣ двѣ узкія полоски. Подбой крыльевъ буровато-рыжеватый.

Самка по оперенію не отличается отъ самца.

Этотъ видъ, названный мною именемъ многополезнаго дѣлу экспедиціи моего спутника при IV путешествіи въ Центральной Азіи П. К. Козлова, встрѣченъ былъ нами впервые въ декабрѣ 1883 года по пути изъ г. Урги въ Ала-шань. Добыли мы тогда лишь одинъ экземпляръ. За тѣмъ въ январѣ 1884 г. тотъ же видъ найденъ былъ въ достаточномъ числѣ въ среднемъ Ала-шанѣ въ небольшой почти безплодной горной группѣ возлѣ колодца Шангынъ-далай; замѣченъ однажды и въ южномъ Ала-шанѣ въ пескахъ Тынгери. Вообще рѣдокъ въ Гоби, гдѣ несомнѣнно лишь зимуетъ. Гнѣздится же, по всему вѣроятію, въ

¹⁾ Нами добыто 7 экз. (4 самца, 1 самка и 2 безъ обознач. пола), всѣ зимніе

южной Сибири и въ лѣсныхъ горахъ соединяющихъ Гобійской пустынь, каковы хребты Ала-шанскій и Муни-ула. Голось описываемаго вида (зимою) весьма пискливый. Помимо Гоби въ другихъ мѣстностяхъ Центральной Азіи *A. Koslowi* нами не найденъ, но одинъ экземпляръ того же вида поступилъ въ музей Императорской Академіи Наукъ отъ г. Березовскаго, добывшаго эту птичку въ декабрѣ въ окрестностяхъ г. Кобдо, въ сѣверо-западной Монголіи.

4. *Budytes leucocephala*, n. sp.

Mas ¹⁾: capite albo; cervice colloque postico cinereo tinctis. Dorso, scapularibus, uropygio, supracaudalibusque flavescente vel virescente olivaceis; gula, pectore, abdomine, lateribus corporis et subcaudalibus intense flavis. Alis duabus fasciis transversis flavescente-albis ornatis. Duabus rectricibus, utrinque externis, albis, parte inferiore pogoniorum internorum nigro marginata.

Изъ маховыхъ 1 = 2, самыя длинныя; 3-лишь немного ихъ короче; наиболѣе длинное изъ заднихъ маховыхъ не покрываетъ лишь три длиннѣйшихъ переднихъ маха. Клювъ и ноги черныя; глаза темно-каріе.

Самецъ: лобъ, темя, ушные перья, щеки, уздечка и подбородокъ бѣлые; затылокъ и задняя часть шеи бѣловато-сѣрые (у менѣе стараго самца свинцово-сѣрые, этотъ цвѣтъ простирается здѣсь и на темя). Горло, грудь, низъ и бока туловища, равно какъ подхвостныя перья, ярко-желтые. Верхъ тѣла желтовато или зеленовато-оливковый; лишь на переднихъ изъ верхнихъ кроющихъ хвоста проглядываетъ темно-бурый цвѣтъ. Маховыя темно-бурья съ желтоватыми ободками широкими на самыхъ заднихъ махахъ. Желтовато-бѣлые кончики большихъ и среднихъ кроющихъ крыла образуетъ здѣсь двѣ полоски.

¹⁾ Описаніе сдѣлано по двумъ экзempl. взрослыхъ самцовъ; самка нами не добыта.

НОВЫЕ ВИДЫ ПТИЦЪ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ.

Статья Почетнаго члена Академіи Н. М. Пржевальскаго.

Читана въ засѣданіи Физико-Математическаго Отдѣленія 13 января 1887 г.

Послѣ изданія въ 1876 г. «Матеріаловъ для орнитологической фауны Монголіи и Тайгутской страны»¹⁾, заключающихъ въ себѣ мои орнитологическія наблюденія перваго путешествія по центральной Азій, мнѣ удалось совершить здѣсь еще три путешествія. Однимъ изъ главныхъ предметовъ специальныхъ моихъ занятій при этихъ путешествіяхъ были, по прежнему, орнитологическія изслѣдованія, доставившія въ общей суммѣ значительную массу наблюденій надъ птицами столь обширной и орнитологамъ почти вовсе неизвѣстной внутренности Азіатскаго материка. Всего здѣсь найдено мною до сихъ поръ около 430 видовъ пернатыхъ.

Однако періодически повторяющіяся путешествія, писаніе географическихъ о нихъ отчетовъ и другія занятія не позволяютъ мнѣ приняться за специальную обработку собранныхъ матеріаловъ и вынуждаютъ откладывать это дѣло до болѣе благопріятнаго времени. Такъ и теперь — я могъ только описать новые виды птицъ, найденные при II, III и IV путешествіяхъ²⁾. Такихъ ви-

¹⁾ Монголія и страна Тангутовъ. Томъ II. Отдѣлъ II «Птицы».

²⁾ Новые виды птицъ (всего 20), найденные мною при первомъ путешествіи, описаны въ тѣхъ же «Матеріалахъ для Орнитолог. фауны Монголіи и Тангутской страны».

довъ оказалось девять, но весьма возможно, что при болѣе тщательной обработкѣ имѣющагося матеріала, найдутся и еще нѣкоторыя новости ускользнувшія при бѣгломъ обзорѣ собранной коллекціи¹⁾.

Считаю долгомъ выразить искреннюю признательность ученому консерватору Зоологическаго Музея Императорской Академіи Наукъ Ф. Д. Плеске за его обязательное содѣйствіе при настоящей моей работѣ.

1. *Leptopoeile elegans*, n. sp.

Mas: vertice et occipite pallide violaceo-cinereis, fronte pallidior; crista alba; loris nigris; genis, superciliis, collique partibus postica et laterali castaneis. Dorso cyanescente olivaceo; scapularibus brunnescente olivaceis, uropygio caeruleo; gastraeo toto cinnamomeo, abdomine pallidior, lateribus violaceo tinctis. Remigibus, rectricibusque fuscis, pallide caeruleo marginatis.

Fem.: capitis parte superiore sordidior quam in mare; crista brevior; loris maculisque nuchalibus nigris. Striis superciliaribus angustis nigro-castaneis. Collo postico rufescente olivaceo; dorso scapularibusque fusciscentioribus. Uropygio cyanescente olivaceo; genis cinerascens; gula pectoreque sordide albis, abdomine rufo tincto, lateribus rufescente violaceis. Remigibus rectricibusque ut in mare, marginibus rectricum magis olivaceis.

Размѣры (въ миллиметрахъ):

	Длина ²⁾	Ширина (размахъ крыльевъ)	Слож. крыло.	Хвостъ.	Клювъ (culmen)	Плюсна.
♂	104 — 112	152 — 165	53 — 55	48 — 55	9	19,5 — 20,5
♀	104 — 110	158 — 165	54 — 56	46 — 49	9 — 10	20

¹⁾ За всѣ четыре путешествія нами собрано около 5000 экз. птицъ и эта коллекція передана въ музей Императорской Академіи Наукъ.

²⁾ Измѣрялось отъ вершины клюва до конца хвоста всегда по свѣжимъ экземплярамъ.

ЗАПИСКИ
ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ.

ТОМЪ ПЯТЬДЕСЯТЬ ПЯТЫЙ.

КНИЖКА I.

(СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ ПОРТРЕТА В. Н. ТАТИЩЕВА И ИЗОБРАЖЕНІЯ МЕДАЛИ
Н. М. ПРЖЕВАЛЬСКАГО).

Н. М. Пржевальский. Новые виды
птиц Центральной Азии.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЪ, 1887.

ПРОДАЕТСЯ У КОМИССИОНЕРОВЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ:
Н. Глазунова, въ С. П. Б. Эггерса и Коми, въ С. П. Б.
Н. Киммеля, въ Ригѣ.

Цена 1 руб. 55 коп.

C 76 -
-95