

Включена каталог

1953

ТРУДЫ


ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ

при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Казанскомъ Университетѣ.

Томъ XXXVIII, вып. 4, 5 и 6.

МУРАВЬИ РОССИИ

(Formicariae Imperii Rossici).




Систематика, географія и данныя по биологii
русскихъ муравьевъ

М. Ружскаго.

Часть первая.

(Съ 176 рисунками въ текстѣ).



КАЗАНЬ.

Типо-литографія Императорскаго Университета.

1905.

неясно отграниченная. Спинай профиль ровный. Шипы на заднеспинкѣ длинныя, равныя по крайней мѣрѣ $\frac{2}{3}$ — $\frac{3}{4}$ основной ея поверхности, тонкіе, острые, на концѣ загнутые. Пер-




Рис. 140. Грудь и стебелекъ *Leptothorax affinis*, subsp. *Kirilleni*
♀ (Уфимск. губ.).

вый узелокъ стебелька сверху тупоугольный. Членики стебелька и бока торакса съ точчатой морщинистостью. Голова и спинка торакса продольно-морщинистыя. Дл. 1,8—2,3 mm.

Этотъ изящный лептотораксъ былъ найденъ мной первоначально въ Самарской губ., а потомъ въ окр. ст. Шафраново, 2 іюля 1901 г., во время совмѣстной экскурсіи съ проф. Казанск. Ветерин. Института Г. П. К и р и л л о в ы м ъ, которому и посвящается.

Мѣстонахожд.: *Уфимская губ.*, Белебеевск. у., окр. Шафраново, на опушкѣ дубоваго лѣса, найдены отдѣльн. экземпляры ♀♀, ползавшіе на пнѣхъ березы, 2. VII. 1901 (!); *Самарская*, окр. Ставрополя, найдены 2 ♀♀ на землѣ при основаніи дуба, въ молодомъ дубовомъ лѣсу, ползавшими вмѣстѣ съ *Solenopsis orientalis*, при разрываніи гнѣзда послѣдняго, 13. VI. 99 (!).

103. *Leptothorax tuborum oxianus* nov. subsp.

♀. Голова удлиненная. Глаза маленькіе. Лобъ и темя блестящіе и гладкіе; остальная часть поверхности головы, равно какъ поверхность груди и стебелька матовыя, топкоморщинистыя, частью штриховатыя, частью мелко точчатые. Членики стебелька мелко точчато-морщинистыя. Лобная пло-

щадка гладкая и блестящая; личной щитокъ блестящій, по срединѣ гладкій, по бокамъ съ мелкими продольными морщинками; по срединѣ его проходитъ возвышенная, продольная морщинка, образующая какъ-бы киль; передній край личного щитка ровный, закругленный. Челюсти блестяція съ мелкими продольными морщинками и ямками.

Профиль груди слабо выпуклый съ небольшимъ, иногда едва замѣтнымъ углубленіемъ между средне- и заднеспинкой. Шипы заднеспинки короткіе, очень широкіе при основаніи, острые, направленные назадъ и немного вверхъ. Брюшко гладкое и блестящее. Тѣло покрыто довольно длинными отстоящими тупыми волосками, очень рѣдкими, и сверхъ того на головѣ имѣются тонкіе, короткіе тоже отстоящіе волоски бѣловатаго цвѣта; на усикахъ и ножкахъ — прилегающіе волоски такого-же цвѣта. Членики стебелька очень сходны съ таковыми-же у *Leptoth. nitens* Em. изъ Сѣв. Америки.

Цвѣтъ тѣла желтовато-коричневый (голова, thorax и стебелекъ); брюшко, ножки, челюсти, усики и переднеспинка коричневато-желтые. Булава усиковъ не отличается по цвѣту отъ остальной части жгутика. На первомъ членикѣ брюшка сверху широкая, темная поперечная полоса, занимающая двѣ заднихъ трети членика. Дл. 2—2,7 mm.

Близокъ къ *Lept. exilis* Em. и *corticalis* Schnk (typ.).

Мѣстонахожд.: Восточн. Бухара, Дамбурачи, сист. р. Сурхоба, близъ Алайской долины, VI. 1901 (Богоявленскій).

104. *Leptothorax tuborum unifasciatus* (Latr.).

1. *Formica unifasciata* Latreille 465, стр. 47; 467, стр. 257 (♀, ♂, ♀).
 2. *Myrmica unifasciata* Nylander 596, стр. 44. Schenck 682, стр. 101.
 3. *Leptothorax unifasciatus* Mayr 507, стр. 172; 511, стр. 59.
 4. — *tuborum*, r. *unifasciatus* Forci 257, стр. 85. André 13, стр. 299.
- Син.: Dalla Torre 95, стр. 129.

♀. Весь желтый, или свѣтлый оранжево-желтый, съ желтыми челюстями, ножками и брюшкомъ; на брюшкѣ проходитъ поперечная коричневая или черно-коричневая полоса,