

Включена каталог

1953

ТРУДЫ


ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ

при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Казанскомъ Университетѣ.

Томъ XXXVIII, вып. 4, 5 и 6.

МУРАВЬИ РОССИИ

(Formicariae Imperii Rossici).




Систематика, географія и данныя по биологii
русскихъ муравьевъ

М. Ружскаго.

Часть первая.

(Съ 176 рисунками въ текстѣ).



КАЗАНЬ.

Типо-литографія Императорскаго Университета.

1905.

главн. хребта, по дорогѣ изъ Владикавказа на ст. Балта (4. VII. 99 !); ползали по корѣ у основанія бука.




Рис. 151. Спинной профиль и стебелекъ ♀: 1. *M. muscorum* var. *fagi*;
2. *M. muscorum*, var. *scamni* (Кавказъ).

2. — var. *scamni* nov. var.

♀. Шипы на заднеспинькѣ большіе, длинныя, слабо изогнутыя, пальцевидныя, равныя по крайней мѣрѣ $\frac{3}{4}$ основной поверхности (у типичнаго *muscorum* они равны только $\frac{1}{2}$ названной поверхности); при самомъ основаніи шипы довольно широкіе, но тотчасъ быстро суживаются, оставаясь до самаго конца (т. е. приблизительно на $\frac{2}{3}$ или $\frac{1}{2}$ своего протяженія) узкими, круглыми и одинаково тонкими; на концахъ они тупыя, закругленныя (у типичн. *muscorum* шипы равномерно и постепенно утончаются къ концу и оканчиваются остро). Морщинистость тѣла болѣе тонкая и частая, чѣмъ у типа, на членикахъ стебелька и значительной части торакса мелко точчатая по преимуществу. Задняя поверхность перваго стебельковаго узелка значительно выпукла. Окраска и величина какъ у типичной формы.

Собраны были отдѣльные экземпляры ♀♀, ползавшіе на скамейкѣ у горной дорожки въ смѣшанномъ бору ок. Абастумана (14. VII. 99 !); ок. Владикавказа пайдено небольшое гнѣздо въ корѣ стараго дуплистаго бука (3. VII. 99 !).

Изъ южной и средней Европы извѣстна еще одна разновидность *M. muscorum* — var. *gredleri* Mayr (507; стр. 166), отличающаяся болѣею величиной (3—3,5 mm.) и продолльнымъ вдавленіемъ на личномъ щиткѣ.

M. muscorum очень близокъ къ *M. acerorum*, отличаясь главнымъ образомъ болѣе тонкой и нѣжной пластикой тѣла,