

Н. М. Муравьев


ТРУДЫ
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ
при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Казанскомъ Университетѣ.
Томъ XXXVIII, вып. 4, 5 и 6.

МУРАВЬИ РОССИИ
(Formicaridae Imperii Rossici).

Систематика, географія и данныя по биологiи
русскихъ муравьевъ

М. Рузскаго.

Часть первая.
(Съ 176 рисунками въ текстѣ).



КАЗАНЬ.
Типо-литографія Императорскаго Университета.
1905.

ихъ другъ съ другомъ, вслѣдствіе сходнаго характера мѣстообитанія. Долженъ еще замѣтить, что вполне типичная *M. laevinodis* у насъ вообще рѣдка сравнительно съ *M. ruginodis* и ихъ переходными формами.

var. *minuta* nov. var.

♀. Отличается отъ типичной *laevinodis* меньшей величиной (дл. тѣла 3,5—3,8 mm.), иной формой 1-го узелка стебелька, который сверху болѣе широкій и плоскій какъ-бы ссѣзанный (у типичной *laevinodis* онъ сверху болѣе угловатый). Морщинистость обоихъ узелковъ стебелька болѣе сильная; первый узелокъ стебелька болѣе сильно морщинистъ и почти матовый, второй узелокъ сверху шероховатъ и съ болѣе слабымъ блескомъ, почти полуматовый. Глаза немного меньше и выпуклѣе чѣмъ у типа. Членики 2—5 жгутика усиковъ почти столь-же длинны, какъ и широки. Шипы заднеспинки какъ у типа. Окраска болѣе темная (брюшко и голова сверху темнокоричневая); довольно частые отстоящіе волоски на тѣлѣ.

Мѣстонахожд.: *Памиръ*. Андеманъ, перевалъ на Памирскомъ плоскогоріи, ♀♀ 28. VI. 95 (Богоявленскій).

— var. *tenuispina* For. (870, стр. 7).

♀. Отличается отъ типа главнымъ образомъ меньшей величиной (дл. тѣла 3,5—4 mm.), формой головы и шиповъ на заднеспинѣ. Шипы болѣе длинны и тонкіе, очень мало расширенные при основаніи и одинаково тонкіе на всемъ своемъ протяженіи, острые на концѣ и прямые. Голова болѣе прямоугольная съ почти прямымъ затылочнымъ краемъ и менѣе выпуклыми боками. Узелки стебелька сверху шероховатые, не блестящіе, а полуматовые. Глаза немного меньше. Первый членикъ стебелька съ болѣе короткой передней цилиндрической частью и съ нѣсколько болѣе толстымъ узелкомъ. Остальное какъ у типа.

Описана Ф о р е л е мъ изъ Ферганской обл. и восточной Бухары. Я согласенъ съ мнѣніемъ названнаго ученаго, что форма эта скорѣе заслуживаетъ наименованія расы, что не сомнѣнно и выяснится, когда будутъ найдены ♀ и ♂.

Мѣстонахожд.: *Самаркандская обл.*, Куль-Кулянъ, озеро системы Зеравшана (Богоявленскій, 1901).