

*Н. М. Муравьев*


**ТРУДЫ**  
**ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ**  
при **ИМПЕРАТОРСКОМЪ Казанскомъ Университетѣ.**  
**Томъ XXXVIII, вып. 4, 5 и 6.**

**МУРАВЬИ РОССИИ**  
**(Formicariae Imperii Rossici).**

Систематика, географія и данныя по биологiи  
русскихъ муравьевъ

*М. Рузскаго.*

**Часть первая.**  
**(Съ 176 рисунками въ текстѣ).**



КАЗАНЬ.  
Типо-литографія Императорскаго Университета.  
1905.

Или, на влажной почвѣ, поросшей густымъ камышемъ и на берегу рѣки, кр. ♀ и ♂ зг. VIII. и г. IX. 1903 (Бергъ).

Гнѣздится въ землѣ, въ норахъ. Любитъ посѣщать растенія ради тлей и растительныхъ соковъ.

*M. bergi* по моему мнѣнію ближе всего стоитъ къ *M. stangeana*, которую и можно считать за ея подвидъ. Но форма рукояти усиковъ у ея ♀ и ♂ весьма сходна съ *M. sulcinodis*, тогда какъ у *stangeana* усики ♀ и ♂ приближаются уже къ группѣ *M. scabrinodis*, такъ что черезъ посредство нея *M. bergi* соединяется съ группой *M. scabrinodis*. Самцы *M. bergi* по формѣ усиковъ и общему габитусу также приближаются къ *M. scabrinodis*, только волоски на ножкахъ у нихъ другіе (не какъ у *scabrinodis*, а какъ у *lobicornis*, *ruginodis* или скорѣе *sulcinodis*). Съ другой стороны въ строении торакса, головы и стебелька у ♂♂ *M. bergi* замѣчается много сходныхъ чертъ съ *M. ruginodis*, у ♂♂ которой волосистость ножекъ, какъ только что упомянуто, напоминаетъ таковую же у ♂♂ *M. bergi*.

— var. *barchanica* nov. var.

♀. Бока головы съ болѣе сильной и частой сѣтчатостью. Почти безъ отстоящихъ волосковъ на верхней поверхности тѣла (имѣются только отдѣльные отстоящіе волоски на переднеспинкѣ, членикахъ стебелька и основаніи брюшка). На головѣ рѣдкіе, очень тонкіе и короткіе волоски. Рукоять усиковъ почти безъ волосковъ. Морщинки на груди менѣе правильныя, не ровныя. Скульптура члениковъ стебелька болѣе слабая. Окраска болѣе свѣтлая, чѣмъ у *bergi*, сходная съ *stangeana*; ножки свѣтлѣе торакса, желтовато-красно-коричневые; основаніе брюшка свѣтлѣе остальной его части. Дл. 4,5—5,2 mm.

Найдена въ пескахъ около Ханской Ставки (Астраханск. губ.) мной и А. Гордягинымъ во время нашей совмѣстной туда экскурсіи въ началѣ іюня 1902 г. Живетъ въ барханахъ, среди довольно обильной растительности (гл. обр. тополь и ива, въ мѣстности, называемой „Семь сестеръ“). Гнѣздится въ норахъ, въ пескѣ. Находилъ я ее также ползающей на растеніяхъ.

#### 134. *Myrmica bergi stangeana* Ruzsky.

1. *Myrmica stangeana* n. sp. Русскій 657, стр. 3 (♀).
2. — *stangeana* Ruzsky 646, стр. 474.

♀. Рукоять усиковъ согнута дугообразно, подъ прямымъ угломъ (почти колѣнообразно), часто съ маленькимъ мало замѣт-