

Включена каталог

1953

ТРУДЫ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ

при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Казанскомъ Университетѣ.

Томъ XXXVIII, вып. 4, 5 и 6.

МУРАВЬИ РОССИИ

(Formicaridae Imperii Rossici).




Систематика, географія и данныя по биологii
русскихъ муравьевъ

М. Ружскаго.

Часть первая.

(Съ 176 рисунками въ текстѣ).



КАЗАНЬ.

Типо-литографія Императорскаго Университета.

1905.

даннаго ей всѣми прежними авторами, начиная съ Л иннея и кончая Л атрейлемъ и Форелемъ.

142. *Myrmica commarginata* nov. sp.

♀. Грудь сверху въ области средне-заднеспинки сильно сжата, вслѣдствіе чего спинная поверхность въ области этихъ частей имѣетъ видъ узкаго, плоскаго гребня, ограниченнаго двумя острыми боковыми краями, отходящими отъ переднеспинки, сближающимися по срединѣ основной поверхности заднеспинки, затѣмъ снова расходящимися и непосредственно переходящими на шипы, служащіе какъ-бы ихъ продолженіемъ; такимъ образомъ заднеспинка является наиболѣе суженной въ средней части своей основной поверхности. Перетяжка между meso-notanotum маленькая, не глубокая. Шипы очень короткіе, расходящіеся, съ широкимъ основаніемъ, острые, немного изогнутые и сжатые по бокамъ; длина ихъ не превышаетъ $\frac{1}{2}$ основной поверхности заднеспинки. Рукоять усиковъ при основаніи дугообразно согнута (почти какъ у *M. bergi*), безъ лопасти или зубца на стибѣ. Членики 3—5 жгутика усиковъ самые короткіе, почти равные другъ другу, столь-же широкіе, какъ и длинные; булава усиковъ 4 члениковая. Первый членикъ стебелька короткій, толстый и довольно вязкій, безъ передней цилиндрической части; узелокъ его низкій, спереди угловатый, сверху очень слабо выпуклый, почти плоскій и какъ-бы сръзанный; второй узелокъ толще перваго и немного выше его, обычной формы. Оба узелка довольно блестящіе, съ продольными бороздками, которыя на первомъ узелкѣ имѣются только на его бокахъ, а на второмъ и на бокахъ и сверху; выпуклые промежутки между бороздками сверху втораго узелка блестящіе и съ очень мелкой и нѣжной морщинистостью; верхъ перваго узелка съ мелкою, частою тотчатостью. Голова и грудь матовыя, сильно и грубо морщинистыя. На верху головы и на личномъ щитѣ морщинки продольны и штриховаты, на бокахъ головы имѣютъ видъ гладкихъ, крупныхъ петель. Лобная площадка блестящая и гладкая, съ нѣсколькими штриховатыми морщинками въ верхней части, спускающимися со лба. Покатая поверхность заднеспинки между шипами, какъ и брюшко, гладкая и блестя-

шая. Челюсти съ 6 зубчиками, на верхней поверхности съ мелкими, острыми продольными морщинками и ямками. Лобные валики не очень большіе. Глаза среднихъ размѣровъ, выпуклые, лежатъ почти по срединѣ боковъ головы, но все-таки немного ближе къ переднимъ краямъ головы. Голова продолговатая, правильно закругленная на затылкѣ, съ слабо выпуклыми боками. Отстоящіе волоски довольно частые на головѣ и брюшкѣ, рѣдкіе на груди и стебелькѣ. Ножки блестящія, съ рѣдкими, тонкими прилегающими волосками. Рукоять усиковъ съ болѣе длинными, наклонно стоящими волосками. Темно-красновато-коричневый, съ черно-коричневыми головой и брюшкомъ; ножки коричневые; лапки и усики болѣе свѣтлые (желтоватые). Дл. 3,7 mm.

Мѣстонахожд.: *Забайкальская обл.*, песчаная степь по дорогѣ изъ сл. Кяхты въ г. Троицкосавскъ (въ 23 в. отъ города), ♀ 27. VII. 1901 (Моллесонъ).

По строенію торакса мирмика эта совершенно отличается отъ другихъ мнѣ извѣстныхъ представителей рода.

Gen. *Stenamma* Westw.

(стр. 107 и 167).

143. *Stenamma westwoodi* Westw. s. str.

1. *Stenamma Westwoodii* Westwood 817, стр. 226.
 2. *Myrmica lippula* Nylander 596, стр. 41 (♀); 597, стр. 88.
 3. — *Minkii* Foerster 252, стр. 63; *M. debilis*, ibid., стр. 52 (♂).
 4. *Asemorhoptrum lippulum* Forel 257, стр. 80 (♀ и ♀).
 5. *Stenammu westwoodi* St. Forel 257, стр. 82 (♂).
- André 13, стр. 311—313. Насоновъ 587, стр. 73.
Син.: Dalla Torre 95, стр. 121—122.

♀. Голова большая, по длинѣ почти равная груди, прямоугольная, съ довольно ровнымъ затылочнымъ краемъ. Глаза очень малы и лежатъ ближе къ переднимъ угламъ головы. Личной щитокъ гладкій, блестящій, съ 2 килевидными возвышеніями, идущими отъ основанія лобныхъ валиковъ. Рукоять усиковъ не достигаетъ до задняго края головы; членики 2—5 жгутика усиковъ болѣе широкіе, чѣмъ длинные; булава 4 чле-